

MILTKRUID,
STEENVAREN.De XXIV^{te} CLASSE.Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, II^{de}
Deel XIV^{de} St., bl. 127.STEENVAREN met Vindeelig Loof,
de Kwabben overhoeks, jaenloo-
pende, stomp.

- a. De Oppervlakte van het Loof.
b. Het onderste of de agterzyde, met
het beginzel der Vrugtmaakinge.
c. Dezelfde onderzijde, volkomen
uitgegroeid en Schubbig rood.

BLOEITIJD. Het groeit aan
Muuren of in de Spleeten der Steen-
rotsen, der Zuidelijke deelen van
Europa, als ook in Duitschland,
Frankrijk en de Westelijke deelen
van Engeland; doch hier te Lande
schijnt het nog niet gevonden te zijn.

ASPLENIUM
CETERACH.CLASSIS XIX^{na}.Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, Tom. II^{di} Part.
II^{de} pag. 1301.CETERACH Frondibus pinnato-fidis,
Lobis alternis confluentibus
obtusis.

- a. Superficies Frondium.
b. Inferior sive posterior pars ea-
rundem cum Fructificationis
initio.
c. Idem latus perfecte excretum,
Squamosum, rubrum.

TEMP. FLOR. Crescit ad Muros
aut in fissuris Rupium, in Aus-
trioribus Europæ plagis, etiamque
in Germania, Gallia & Occiden-
talibus Angliæ; in nostris Regio-
nibus autem nondum repertum esse
videtur.

GEBRUIK. Deeze *Ceterach*, die men ook wel *Scolopendria* plagt
te noemen, wordt, zo wel als de voorgaande Steenruite, *Ruta Mu-
raris*, geteld onder de vijf Haairplanten, *Herbæ Capillares*, met
welken zy in Reuk en Smaak niet alleen, maar ook in Kragten,
veel overeenkomst hebben. Doch dit wordt als een bijzonder
Geneesmiddel tegen de Miltzugt, en de benaauwdheden, daar uit
ontstaande, die men gemeenlijk *Hijpochondrie* noemt; aangemerkt te
dienen, en dus het eigentlijke *Asplenium* te zijn. Zulks wordt toe-
geschreeven aan een zagtelijk afzettende hoedanigheid, zo door 't
Wateren als Afgang, maar dan moet met het gebruiken verscheide
Dagen, ja Weeken, worden aangehouden, tot eene volkomene
Geneezing. Men kan deswegen het Werk van HILL, over de *Milt-
ziekte*, nazien.

RUIZE



Asplenium ceterach L.



