

LIBER TERTIUS.

CAP. I.

De morborum generibus.

RAEVYSIS omnibus , quae per-
tinent ad universa genera mor-
borum , ad singulorum curatio-
nes veniam. Hos autem in duas
species Graeci diviserunt ; aliosque ex his
acutos , alios longos esse dixerunt. Ideo-
que , quoniam non semper eodem modo
respondebant , eosdem alii inter acutos , alii
inter longos retulerunt. Ex quo , plura eo-
rum genera esse , manifestum est. Quidam
enim breves acutique sunt , qui cito vel tol-
lunt hominem , vel ipsi cito finiuntur. Qui-
dam longi , sub quibus neque sanitas in pro-
pinquo , neque exitium est. Tertiumque
genus eorum est , qui modo acuti , modo
longi sunt , idque non in febribus tantum-
modo , in quibus frequentissimum est ; sed
in aliis quoque fit. Atque etiam , praeter hos ,
quartum est ; quod neque acutum dici po-
test , quia non perimit ; neque utique lon-
gum , quia , si occurritur , facile sanatur.
Ego , cum de singulis dicam , cuius quisque
generis sit , indicabo .

Dividam autem omnes in eos , qui in to-
tis corporibus consistere videntur , & eos ,
qui oriuntur in partibus. Incipiam a prio-
ribus , pauca de omnibus praefatus . In nul-
lo quidem morbo plus fortuna sibi vendi-
care

405, 16.

L. 1. F. M. P. Artium Aurelii Cornelii Ceisi Liber ter-
tius incipit. L. 4. F. M. P. Provisis. L. 14. F. M. P. a-
sique.

care, quam ars : ars, quam natura, potest : utpote cum, repugnante ¹ natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medieo est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breve spacium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, aeger extinguitur : ibi & deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus infedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur. ²

¹⁵
18, 13² Alterum illud ignorari non oportet ; quod non omnibus aegris eadem auxilia convenient. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola, venditaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare auctorem, quanti aegrum, & experiri ³ aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus, ut facit, sic ²⁵ etiam solvit, non + statim condemnetur, si quid non statim profuit, minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur.

CAP.

¹ Hippocrat. Lex. T. II. 10. Seneca de Tranq. An. c. VI. ² Hipp. de A. T. xx. 6. ³ Philo Judaeus de Josepho pag. 531. ed. 1631. ⁴ Cael. Aurel. Tard. pag. VI. 3. pag. 454.

C A P. II.

*Quonodo morbi cognoscantur, & an increscant;
an minuantur, & qua ratione ab initio, qui
languere incipit, curari debeat.*

5 **P**ROTINUS autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solum, in quibus semper ita se habet; sed in his quoque, in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graves urgent, acutus morbus est. Ubi lenti dolores, lentae febres sunt, & spatia inter accessiones porrigitur, acceduntque ea signa, quae in priore volumine exposita sunt, longum hunc futurum esse, manifestum est.

Videndum etiam est, morbus an increscat, an consistat, an minuantur: quia quedam remedia increcentibus morbis, plura inclinatis convenient. Eaque, quae crescentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget, in remissionibus potius experienda sunt. Increcit autem morbus, dum graviores dolores, accessionesque veniunt; haec & ante, quam proximae, revertuntur, & postea desinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notae non habentibus, scire licet, increscere, si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foetidiores dejectiones, si tardior sensus, si prior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si id magis pallet. Ea vero, quae contraria his sunt, decedentis ejus notae sunt.

Prae-

I. 2. F. M. P. an consistant. I. 7. F. M. P. solis. I.
8. P. etiam. I. 10. P. accessionum dolore gravi urgentur. I.
19. M. P. inclinantibus. I. 20. F. M. P. quae de crescentibus. I. 29. M. P. om. foetidiores.

Praeter haec, in acutis ¹ morbis serius aeger alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut inedia, dempta materia, impetum frangat. In longis maturius, ut sustinere spatum affecturi mali possit. At, si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis molliri, quam partis; cum per eam partes aegrae sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam: ¹⁰ quia curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, aghuc integris viribus vivit, admota curatione momento restituitur.

Sed cum ab his coeperim, quae notas ¹⁵ quasdam futurae adversae valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur, si quid ex his, quae proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, ² quies ²⁰ & abstinentia: si quid bibendum, aqua; idque interdum uno die fieri satis est; interdum, si torrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguis, bibenda aqua, postero die ²⁵ etiam vinum, deinde invicem alternis diebus, modo aqua, modo vinum, donec omnis causa metus finiatur. per haec enim saepe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die pretinus sublaturos languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. non quod non interdum id incidat,

¹. 2. F. M. P. ut primo. ¹. 5. P. adventuri. ¹. ead. M. P. Ac. ¹. 8. P. molliri. ¹. ead. F. M. propriae. ¹. 24. P. abstinenere etiam. ¹. 28. F. M. P. causae. ¹. 34. F. M. P. quo.

¹ Aph. I. 4. & 10. ² Liv. XXII. c. 18.

dat, aut non decipiat, sed quod saepius falso lat; solaque abstinentia sine ullo periculo medeatur. Cum praesertim etiam pro modo terroris moderari liceat: &, si leviora indicia fuerunt, satis sit a vino tantum abstinerre; quod substractum plus, quam si cibo aliquid dematur, adjuvat: si paulo graviora, satis sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere: interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, & olere potissimum. Satisque fit, tum ex toto a cibo, a vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehementes notae terruerunt. Neque dubium est, quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per haec mature morbo occurrit, aegrotet.

C A P . III.

De febrium generibus.

ATQUE haec quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur vero curatio febrium, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Et his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quaedam redeunt, sed id raro evenit. In prioribus, & morbi sunt, & medicina.

Ac quartanae quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum est. ita quarto die revertitur.

Tertianarum vero duo genera sunt. Alterum

I. 1. F. M. P. quo. I. 8. F. M. P. facil. I. 15. P. irruerunt. I. 25. P. tercia.

¹ I. Epidem. III. 14. &c. ² I. Epidem. III. 17.

terum eodem modo, quo quartana, & incipiens, & desinens; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem praefstat integrum, tertio reddit. Alterum longe perniciiosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem & quadraginta horis fere sex & triginta per accessionem occupat (interdum etiam vel minus, vel plus) neque ex toto in remissione desistit; sed tandem levius est. Id genus plerique medici ¹⁹ appellant.

Quotidianae vero variae sunt, & multiplices. Aliae enim protinus a calore incipiunt, aliae a frigore, aliae ab horrore. Frigus ¹⁵ voco, ubi extremae partes membrorum inalgescunt: horrorem, ubi totum corpus intremit. Rursus aliae sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliae sic, ut aliquantum quidem minuantur ex febre: nihilominus tamen quaedam reliquiae remaneant, donec altera accessione accedit: ac saepe aliae vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut coepere, continuant. Deinde, aliae fervorem ingentem habent, aliae tolerabilem: aliae quotidie pares sunt, aliae ²⁵ impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores: aliae tempore eodem postridie revertuntur, aliae vel serius vel celerius: aliae diem noctemque accessione & decessione impleunt, aliae minus, ³⁰ aliae plus: aliae, cum decedunt, sudorem movent, aliae non movent; atque alias per sudorem ad integratem venitur, alias corpus tantum imbecillius redditur. Acces-

*I. 13. a frigore ignorat P. I. 22. F. M. P. remittant.
I. ead. coepere absit a M. P. I. 23. F. M. P. continent.
I. 30. F. M. P. accessionem & decessionem.*

¹ Est proprium verbum medicorum, Gronov. ad Senec. Epist. 53.

cessiones etiam , modo singulae singulis diebus fiunt , modo binae pluresve concurrunt. Ex quo saepe evenit , ut quotidie plures accessiones remissionesque sint ; sic tamen , ut unaquaeque alicui priori respondeat.

Interdum vero accessiones quoque confunduntur , sic ut notari neque tempora earum , neque spatia possint. Neque verum est ; quod dicitur a quibusdam , nullam febrem inordinatam esse , nisi aut ex vomica , aut ex inflammatione , aut ex ulcere. Facilius enim semper curatio foret , si hoc verum esset. nam , quod evidentes causae faciunt , facere etiam abditae possunt. Neque de re , sed de verbo controversiam movent , qui , cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt , non easdem inordinate redire , sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret , etiam si vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia , modo vix ulla sunt.

C A P . IV .

De Curationum diversis generibus.

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum vero diversa genera sunt , prout autores aliquos habent. Asclepiades officium esse medici dicunt , ut tuto , ut celeriter , ut jucunde curet. Id votum est : sed fere periculosa esse nimia & festinatio & voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit , ut quantum

I. 1. P. non. I. 10. P. nullam non febrem. I. 14. F. M. P. sed. I. 18. F. M. P. accedant. I. 20. P. dicit & ut. I. 30. P. celeriter , & ut. I. 31. F. M. P. nimium.

tum fieri potest , omnia ista contingent , prima semper habita salute , in ipsis partibus curationum considerandum erit.

Et ante omnia quaeritur , primis diebus aeger qua ratione continendus sit. Antiqui ,⁵ medicamentis quibusdam datis , concoctionem moliebantur ; eo quod cruditatem maxime horrebant : deinde eam materiam , quae laedere videbatur , ducendo saepius alvum subtrahebant. Asclepiades medica-

^{29, 7.} menta sustulit ; alvum non toties , sed fe-
^{85, 7.} re tamen in omni morbo , subduxit. Febre vero ipsa praecipue se ad remedium uti pro- fessus est. Convellendas etiam vires aegri putavit , luce , vigilia , siti ingenti ; sic , ut 15 ne os quidem primis diebus elui fineret. Quo magis falluntur , qui per omnia ju- cundam ejus disciplinam esse concipiunt. Etenim ulterioribus quidem diebus cu- bantis etiam luxuriae subscriptis , primis 20 vero tortoris vicem exhibuit.

+ Ego autem , medicamentorum dari po- tiones , & alvum duci non nisi raro debere , concedo. Et id non ideo tamen agendum , ut aegri vires convellantur , existimo : quo- 25 niam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superan- tem oportet ; quae naturaliter digeritur , ubi nihil novi accedit. Itaque abstinentia a ci- bo primis diebus est , & in luce habendus 30 aeger (nisi infirmus) interdiu , quoniam corpus ista quoque digerit : isque cubare quam maximo conclavi debet.

Quod ad sitim vero somnumque perti- net ,

I. 14. P. enim. I. 18. F. M. P. contendunt. I. 19. M. F. P. Isenim. I. 26. P. quoniam & ex. I. 28. F. M. detraha- tur. I. 30. F. M. P. om. &. I. 31. F. M. P. interdiu est , quoniam.

I Aph. I. 22.

net, moderandum est, ut interdiu vigilet; noctu, si fieri potest, conquietat: ac neque potet, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi & siccum est, & ipsi foctet. quamvis id tempus aptum potionis non est. Commodeque Erasistratus dixit, saepe, interiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere; neque ad rem, male haberi aegrum, pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est.

Optimum vero medicamentum est, opportune cibus datus, qui quando primum dari debeat, queritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe sexto, 15 & id fortasse vel in Asia, vel in AEgypto, coeli ratio patitur. Asclepiades, ubi aegrum triduo per omnia fatigaverat, quartum diem cibo destinabat. At Themison nuper, non, quando coepisset febris, sed quando desisset, 20 aut certe levata esset, considerabat, &, ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea vel deserat, vel, si assidue inhaerebat, si certe se inclinaverat, cibum dabat.

25 Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas; 30 potest post plures. Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale coelum, quae aetas, quod tempus anni. Minimeque, in rebus multum inter se differentibus, perpetuum esse praeceptum temporis potest. In morbo,

I. i. P. interdum. I. 7. F. M. P. inferiore. I. 17. F. M. P. ignorantie. I. ead. F. M. P. quarto. I. 33. P. differentibus, quod intermittendum non est.

bo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est: itemque eo i. coelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica nullo die aeger abstineri recte videtur. Maturius etiam puerο, quam juveni: aestate, quam hieme, dari debet. ⁵ Unum illud, & semper, & ubique servandum est, ut aegri

^{78, 13.} vires subinde affidens medicus inspiciat, &
^{131, 21.} quamdiu supererunt, abstinentia pugnet;
^{295, 22.} si imbecillitatem vereri coepit, cibo subveniat. Id enim ejus officium est, ut aegrum, neque supervacua materia oneret, neque imbecilliorem fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis parum docuit, quando venter, quando ¹⁵ corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, haec esse videnda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires supererent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse.

Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit. Sed, qui quaestui ser-
viant, quoniam is major ex populo est, li-
benter amplectuntur ea praecepta, quae se-
dulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re.
Facile est enim dies vel accessiones nume-
rare his quoque, qui aegrum raro vident:
ille assideat necesse est, qui, quod solum ³⁰ opus est, visurus est, quando nimis im-
becillus futurus sit, nisi cibum acceperit.
In pluribus tamen ad initium cibi dies quar-
tus aptissimus esse consuevit.

Est

*I. 6. F. M. P. est. I. 7. F. M. P. quod. I. 13. M. F.
P. imbecillitatem. I. cad. P. prodat. I. cad. itaque. I. 17.
P. visenda.*

¹ Aph. 1. 15. ² Aph. 1. 9.

Est autem alia etiam de diebus ¹ ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum ² impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de aegris judicaretur, *relegimus* ³ nominabant. ⁴

5 Hi erant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus & vigesimus; ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & vigesimo daretur. Igitur sic aegros nutriebant, ^{138, 9.}

10 ut dierum imparium accessiones expectarent: deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus instantibus, darent: adeo ut Hippocrates; ⁵ si alio die febris defisiit, recidivam timere sit solitus.

15 Id Asclepiades jure ut vanum repudiat; neque in ullo die, quia par imparve esset, aegris vel majus vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies patres fiunt; & opportunius post febrium accessiones cibus datur. Nonnumquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur; sive gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur.

20 25 Qui cum octavum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octavum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi potentiorem:

30 plus enim tribuebant nono, & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo, non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei, quem septimus

I. 5. P. In his erat. I. 17. F. M. iis. P. bis. I. 19. F. M. P. eorum. I. 27 F. M. P. *septenarius numerus inciperet.* I. 29. F. M. P. *sumendum.*

1 I. Epidem. III. de Parru septim. VII. VIII. 2 Julian. Imper. Epist. pag. 207. 3 Cael. Aurel. Acut. Morb. I. 14. 4 Aph. II. 23. 24. 5 Aph. IV. 61.

timus dies liberatus sit , quartum esse gravissimum. Ita , illo quoque auctore , in die pari & gravior febris esse potest , & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem , ut in utrumque effigie apprehendit ; id est , quartum , septimum , undecimum , quartumdecimum , decimumseptimum : in quo ab impari ad paris rationem transit. Et ne in hoc quidem propositum conservavit : cum a septimo die undecimus , non quartus , sed quintus sit. Adeo apparet , quacumque ratione ad numerum respexerimus , nihil rationis , sub illo quidem auctore , reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fellerunt : cum hic quoque medicus non numerare dies debeat , sed ipsas accessiones intueri ; & ex his conjectare , quando dandus cibus sit.

Illud autem magis ad rem pertinet , scire , cibumne oporteat dari , cum jam bene venae conquerierunt , aut etiam manentibus reliquis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades , inclinata quidem febre , sed adhuc tamen inhaerente. In quo vanam rationem secutus est : non quod non sit interdum maturius cibus dandus , si mature timetur altera accessio : sed quod scilicet non nisi quam sanissimo dari debeat. ²⁵ minus enim corruptitur , quod integrum corpori infertur. Neque tamen verum est , quod Themisoni videbatur , si duabus horis

I. 8. F. M. P. quo & ab. I. 9. F. M. P. paris numeri rationem. I. ead. F. M. P. om. in. I. 13. respexerimus abest a F. P. M. I. 22. F. M. P. tum. I. 24. P. febi tum. I. 28. F. M. P. quo. I. 30. M. F. P. quo. I. 31. F. M. P. omitt. non nisi.

¹ Aph. I. 19.

ris integer futurus eset aeger , satius esse tunc dare ; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset , id eset optimum. Sed cum 5 hoc breve tempus non praestet , satius est , principia cibi a decadente febre , quam reliquias ab incipiente excipi. Ita , si longius tempus fecuturum est , quam integer-rimo dandus est : si etiam breve , antequam 10 ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est , eodem est remissio , quae maxime in febre continua potest esse. At hoc quoque queritur , utrum tot horae expec-tandae sint , quot febrem habuerunt : an 15 satis sit , primam partem earum praeteriri , ut aegris jucundius incidat , quibus inter-dum non vacat. Tuttissimum est autem , ante totius accessionis tempus praeterire : quamvis , ubi longa febris fuit , potest in-20 dulgeri aegro maturius , dum tamen ante minimum pars dimidia praetereratur. Id que non in ea sola febre , de qua proxime dictum est , sed in omnibus ita servandum est.

C A P . V.

De febrium speciebus , & singularum cura-tionibus : & primo , quando cibus febricitantibus dandus sit.

30 **H**AEC magis per omnia genera febrium perpetua sunt : nunc ad singulas ea-rum species descendam. Igitur si semel tantum accessit , deinde defit , eaque vel ex tinguine , vel ex lassitudine ; vel ex aestu ,

I. 5. F. M. P. esse. I. 8. F. M. P. secundum. I. 9. F. M. P. breve etiam. I. 11. F. M. maxime. I. 12. F. M. P. Atque bic. I. 21. M. P. minime. I. 33. Malim san-guine vel ingluwie. Quomodo enim ex inguine posset oriri febris ? dein enumerat causas externas , quas in-ter inguen censeri non potest.

aestu , aliave simili re fuit , sic , ut interior nulla causa metum fecerit , postero die , cum tempus accessionis ita transit , ut nihil moveret , cibus dari potest . At , si ex alto calor venit ; & gravitas vel capitis vel praecordiorum secuta est ; neque appetet , quid corpus confuderit ; quamvis unam accessionem secuta integritas est : tamen , quia tertiana timeri potest , expectandus est dies tertius ; & , ubi accessionis tempus praeterit , cibus dan-
dus est , sed exiguis ; quia quartana quoque timeri potest . At die quarto demum , si corpus integrum est , eo cum fiducia uten-
dum . Si vero postero , tertiove , aut quar-
to die secuta febris est : scire licet , morbum
esse . Sed tertianarum , quartanarumque
(quarum & certus circuitus , & finis integer ,
& liberaliter quieta tempora sunt) expedi-
tior ratio est . de quibus suo loco dicam .

Nunc vero eas explicabo , quae quotidie 20 urgent . Igitur tertio quoque die cibus ae-
gro commodissime datur ; ut alter febrem
minuat , alter viribus subveniat . Sed is dari
debet , si quotidiana febris est , quae ex toto
definat , simulatque corpus integrum fac-
tum est : fin , quamvis non accessiones ,
febres tamen junguntur , & quotidie qui-
dem increscent , sed sine integritate tamen
remittunt , cum corpus ita se habet , ut
major remissio non expectetur : si altero 30
die gravior , altero levior accessione est , post
graviorem . Fere vero graviorem accessionem
levior nox sequitur : quo fit , ut gra-
viorem accessionem nox quoque tristior an-
tecedat .

At ,

*I. 12. M. F. P. Et. I. 17. M. F. P. circuitus est , & .
I. ead. M. F. P. integer est. I. 18. M. F. quia liberaliter.
P. & quia liberaliter quieta. I. 21. F. negent. I. 26. M.
P. F. si .*

I. Aph. II. 13.

At, si continuatur febris, neque levior unquam sit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna diffensio est. Quidam, quia fere remissus matutinum tempus aegris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est aegris, dari debet. Si vero ne tunc quidem illa requies aegris est, quia hoc ipso pejus id tempus est, quod, cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum, a quo cum omnis aeger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali aegro cibum dant. Sed, cum eo² tempore fere pessimi³ sint, qui aegrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquidasperius. Ob haec alii differunt ad medium noctem, decurso jam gravissimo tempore, eodemque longissime distante. Securius vero datur antelucanis horis; quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore; quod natura sua levissimum est.

Si vero febres vagae sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur: quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At, si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paresne per omnia sint (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem eibus dari debet, quae non inter meridiem & vesperem desinit. Si impares sunt: consideran-

I. 7. M. F. remissor. I. ead. M. F. aeger. P. aegro. I. 8. M. F. P. om. quia. I. 18. M. F. P. ignorant alii differunt. I. 19. M. F. P. decurso id est finito jam. I. 21. M. P. securis. I. ead. datur abea a M. P. I. 32. M. F. P. sint.

1 Cael. Aurel. Morb. Chronic. 11. 14. p. 427. Buxtorf. Lex. Chald. p. 520. 2 Cael. Aurel. A. M. I. 1. c. 15. p. 48. 3 Achill. Tatius de Clitophont. pag. 21.

fiderandum est, quo distent. Nam, si altera gravior, altera levior est, post graviorem dari debet: si altera longior, altera brevior, post longiorem: si altera gravior, altera longior est, considerandum est, utra magis affligat, illa vi, an haec tempore, & post eam dandus est. Sed plane plurimum interest, quantae qualesque inter eas remissiones sint. Nam, si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est; integro corpore, cibo tempus aptius est.

Si semper febricula manet; sed alterum tamen longius tempus remissionis est; id potius eligendum est: adeo ut, ubi accessiones continuantur, protinus, inclinata priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest; cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere: &, hoc salvo, dare quam integerrimo corpore. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed, cum sit aptissimum, tertio quoque die cibum dare; tamen, si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoque magis, si continentibus febres sine remissione sunt; quantoque magis corpus affligunt; aut si duae plures accessiones eodem die veniunt. Quae res efficit, ut & a primo die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venae conciderunt: & saepius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his servandum est; ut post eas febres

I. 21. M. F. P. corpori.

I. Aph. I. II.

bres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decadat, deinde in defessione consistat, aut finiatur; scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde, cum defessio ejus consistit: tertium, si necesse est, quandocunque defecit: caetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse; consistente jam incremento febris, aliquid offerre, quam crescente: satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

15 Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interveniunt.

20 Cum vero semper aegros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum praecipue, ubi cibum sumpferunt. Itaque, si qua sunt, quae exasperatura eorum animos sunt; optimum est, ea, dum aegrotant, eorum notitiae subtrahere: si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum, postque somni tempus, & cum experrecti sunt, tum exponere.

120, 8.

358, 11.

C A P . VI.

30 Quando potiones febricitantibus dari expediat.

SED de cibo facilior quidem cum aegris ratio est: quoniam saepe stomachus hunc

*l. 25. P. eadem aegrotantium. l. 27. M. F. P. usque.
l. 33. M. F. P. quorum.*

hunc respuit, etiamsi mens concupiscit. De potionē vero ingens pugna est; coquemagis, quo major febris est. Haec enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigit, cum illa periculosisima est. Sed dōcēndus aeger est, ubi febris conquiererit, protinus sitim quoque quieturam: longior remque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum: ita celerius eum definere fitire, qui non bibit. Necesse est tamen, quanto facilius etiam fani famem, quam sitim sustinent, tanto magis aegris in potionē, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic venae conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo vero, caeterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna fitis urgebit, potio dari potest.

Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum, ratione caret: ubi aut bilis aegrum, aut cruditas male habet; expeditre quoque per modicas potionē misceri novam materiam corruptae. Illud videntum est, ut, qualia tempora cibo leguntur, talia potionē quoque: ubi sine illo datur, diligantur, cum aegrum dormire cupiemus: quod fere fitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum praecipue esse feminis, quae ex partu in febres inciderunt.

Sed cum tempora cibo potionique febris & remissionis ratio det, non est expedi-

I. 6. conomitunt M. F. P. I. 23. M. F. P. medicas.
I. 27. M. F. P. diligantur, aut cum.

¹ Aph. I. 16.

peditissimum scire , quando aeger febricitet , quando melior sit , quando deficiat : sine quibus dispensari illa non possunt.

Venis enim maxime credimus , fallacissimae rei ; quia saepe istae lentiores celeriores sunt , & aetate , & sexu , & corporum natura . Et plerumque satis fano corpore ,

5 si stomachus infirmus est , nonnunquam etiam incipiente febre , subeunt & quies-

10 cunt : ut imbecillus is videri possit , cui facile laturo gravis instat accessio . Contra saepe eas concitat & resolvit sol , & balneum , & exercitatio , & metus , & ira , & quilibet alias animi affectus . adeo ut , cum

15 primum medicus venit , solicitude aegri dubitantis , quomodo illi se habere videatur , eas moveat . Ob quam causam , per-

20 riti medici est , non protinus ut venit , apprehendere manu brachium ; sed primum residere hilari vultu , percunctarique , quem-

admodum se habeat ; & , si quis ejus me-

25 tis est , eum probabili sermone lenire ; tum deinde ejus carpo manum admovere . Quas venas autem conspectus medici mo-

vet , quam facile mille res turbant ! Altera res est , cui credimus , calor , aequa fallax . Nam hic quoque excitatur aestu , labore , somno , metu , sollicitudine .

Igitur intueri quidem etiam ista oportet : sed his non omnia credere . Ac pro-

20 tinus quidem scire , non febricitare eum , cujus venae naturaliter ordinatae sunt , te-

porque talis est , qualis esse sanis solet : nec protinus etiam sub calore motuque febrem

sefer

I. 5. M. F. P. leniores. l. 10. In alio quopiam exemplari legitur cui facile adduc laturo. Jo. Caesarius. l. 16. M. F. P. ille. l. 83. M. F. P. corpori. l. 29. P. quidem omnia etiam. l. 33. M. F. P. non. l. 34. M. F. P. autem.

1 Pancirolez observ. iv. 2 De decent. ornatu T. ix. x. Pallad. Sophist. in l. v. Epidem. pag. m. 201. Actuar. de M. M. II. 2.

sese concipere : sed ita , si summa quoque arida inaequaliter cutis est ; si calor & in fronte est , & ex intimis praecordiis oritur ; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit ; si color , aut rubore , aut pallore novo mutatus est ; si oculi graves , & aut perseci , aut subhumidi sunt ; si sudor , cum fit , inaequalis est ; si venae non aequis intervallis moventur . Ob quam causam medicus neque in tenebris , neque a capite aegri 10 debet residere ; sed illustri loco adversus eum , ut omnes notas , ex vultu quoque cubantibus perspiciat.

Ubi vero febris fuit , atque decrevit , spectare oportet , num tempora , partesve corporis aliae paulum madescant , quae sudorem venturum esse testentur . Ac si qua ejus nota est , tunc demum dare potui calidam aquam , cujus salubris effectus est , si sudorem per omnia membra diffundit . Hujus autem rei causa , continere aeger sub veste satis multa manus debet ; eademque crura , pedesque contegere : qua mole plerique aegros in ipso impetu febris , potissimeque ubi ardens ea est , male habent . Si sudare 20 corpus coepit , linteum tepefacere oportet , paulatimque singula membra detergere . At ubi sudor omnis finitus est , aut si is non venit , ubi quam maxime tepuit , & idoneus esse cibo aeger videtur , sub veste leniter 30 ungendus est , tum detergendus , deinde ei cibus dandus .

Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus , aut humori certe quam proxi-

I. 3. M. F. P. omitt. ex. I. 7. M. F. sit. I. 13. P. illuftri loco percipiatur. I. 14. M. F. P. exspectari. I. 17. P. At. M. F. P. omitt. ejus. I. 23. P. male. I. 24. M. F. P. pessimeque. I. 29. M. F. P. potuit. M. F. P. om. &. I. 33. P. bis.

proximus: utique ex materia quam levissima; maximeque sorbitio: eaque, si magnae febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte adjicitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, supervacuum est; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest, vel ^t intrita ex aqua calida, vel alica elota; si firmus est stomachus, & compressa alvus, ex aqua mulsa; si vel ille languet, vel haec profuit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo vero aliud adjici potest, ex eodem tamen genere materiae, vel olus, vel conchylium, vel pomum. At, dum febres quidem increscent; hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima, adjiciendum vero aliud ex media, ratione habita subinde & virium hominis, & morbi.

Apponendi vero aegro varii cibi (sicut Asclepiades praecepit) tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis vires sufficiunt: ut paulum ex singulis degustando, famem vitet. At si neque vis, neque cupiditas defest, nulla varietate solicitandus aeger est; ne plus assumat, quam concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios; eduntur quidem facilius: ad concoctionem autem materiae genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque incremente ² morbo, tutum est, aegrum cibo impleri; sed ubi

78, 14.
120, 2.

I. 11. M. F. P. pusca. I. 15. M. F. P. Et. I. 22. M. F. P. ponendi. I. 29. P. ea. I. 30. P. educuntur enim, M. F. eduntur enim.

¹ Hippocr. de Vet. M. xi. xii. ² Aph. i. 7, §,

ubi inclinata jam in melius valetudo est.

Sunt aliae quoque observationes in febris necessariae; atque id quidem videntum est, quod quidam solum praecipiunt, an adstrictum corpus sit, an profluat. Quorum alterum strangulat, alterum digerit. Nam, si adstrictum est, ducenda alyus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodet. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaque aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in folio cum aqua calida miscere; uti cibo rarius & serius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo; maximeque oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malva: vel jure etiam concharum, musculorumve, aut locustarum: neque danda caro, nisi elixa, est. At † potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc, ultra quam sitis coget. Poteritque a balneo etiam pingue jus, aut dulcior dari vinum: poterit semel, aut bis interponi Graecum salsum.

Contra vero, si corpus profluet, sudor coercendus, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, quandocunque volet, utendum; non nisi levi gestatione corpus agitantum, & pro genere mali subvenientium. Nam, si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, libera-

37, 7.
147, 19.

I. 3. M. F. P. quoque. I. 6. M. F. P. strangulat quod continet, alterum. I. 14. P. dimittere. M. F. item. I. 19. M. F. P. lapathum. I. 25. M. P. pinguis. I. 30. M. somnique. P. somnisque. I. ead. P. quando velit. I. 31. F. leni.

beraliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere; nisi aut fauces, aut praecordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est.

5 Si vero sudor exercet, duranda cutis est, vel nitro, vel sale; quae cum oleo miscentur. At, si levius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austерum
10 sit adjectum.

Quisquis autem fluore aeger est, cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vi-
15 tium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Ubi ad cibum ventum est,
dari debet his valens, frigidus, siccus, sim-
plex, qui quam minime corrumpi possit,
panis tostus, caro assa, vinum austерum,
vel certe subausterum; &, si venter pro-
20 fluit, calidum: si sudores nocent, vomi-
tusve sunt, frigidum,

C A P. VII.

*Quomodo pestilentes febres curari
debeant.*

25 D E S I D E R A T etiam propriam animad-
versionem in febribus pestilentiae
casus. In hac minime utile est, aut
fame, aut medicamentis uti, aut ducere
alvum. Si vires finunt, sanguinem mitte-
30 re optimum est; praecipueque, si cum ar-
dore febris est. Si id parum tutum est, ubi
febris aut tenuata est, aut levata, vomitu-
pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam
in

*I. 13, P. dimittendus. I. 16. M. F. P. is. I. 18.
M. F. P. asperum. I. 19. M. F. P. omitt. &. I.
30. M. F. P. dolore. I. 32. M. F. P. levata est,
vomitu.*

in aliis morbis , ducere in balneum opus est ; vinum calidum , & meracius dare , & omnia glutinosa : inter quae quoque carnem , generis ejusdem . Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt , eo matutius auxilia , etiam cum quadam temeritate , rapienda sunt . Quod si puer est , qui laborat ; neque tantum robur ejus est , ut sanguis mitti possit , cucurbitulis ei utendum est ; ducenda alvus vel aqua vel ptisanae crenore ; tum demum is levibus cibis nutriendus . Et ex toto non sic pueri , ut viri , curari debent . Ergo , ut in alio quoque genere morborum , parcius in his agendum est : non facile sanguinem mittere , non facile ducere alvum , non cruciare vigilia , fameve , aut nimia siti , non vino curare . Vomitus post febrem eliciendus est : deinde dandus cibus ex levissimis ; tum is dormiat : postero die , si febris manet , abstineat : tertio , ad similem cibum redeat . Dandaque opera est , quantum fieri potest , ut inter opportunam abstinentiam cibo opportuno , omisis caeteris , nutriatur .

2. Curatio ardantis febris.

Si vero ardens febris extorret , nulla medicamenti danda potio est ; sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus , est : quae miscenda manu sunt , donec abscent . Etiam amplio conclavi tenendus , quo multum & purum aërem trahere possit ; neque multis vestimentis strangulandus , sed admodum levibus tantum velandus , est . Possunt etiam super stomachum imponi

I. 9. M. F. P. siti. I. 18. M. F. P. curare satis convenit .
Vomitus . I. 20. M. F. P. postero quoque die . I. 21. M. F. P. abstineatur . I. 23. M. F. P. cibosque . I. 24. M. F. P. opportunos . I. cad. M. P. opportuno , ab omisis . I. 25. F. M. P. ignorant curatio ardantis febris . I. 30. M. F. P. Et .

poni folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendum maturius est, id est a die tertio, & ante eum iisdem perungendus. Si pituita in 5 stomacho coijt, inclinata jam accessione, vomere cogendus est; & tunc dandum frigidum olus, aut pomum, ex his, quae stomacho convenient. Si siccus manet stomachus, protinus vel ptisanae, vel aliciae, vel 10 oryzae, tremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum, magna siti antecedente, frigida aqua copiose praestanda est, ut bibat etiam 15 ultra satietatem; &, cum jam venter & praecordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa 20 aqua frigida, tantum ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, 131, 21. & collocandus, ut dormiat. Fereque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infraictum calorem, plenus 25 somnus venit; per quem ingens sudor effunditur, idque praesentissimum auxilium est: sed in his tantum, in quibus praeter ardorem, nulli dolores, nullus praecordiorum tumor; nihil prohibens, vel in pulmo- 30 ne, vel in faucibus; non ulcus, non defec- tio, non profluvium alvi fuit. Si quis au- tem in hujusmodi febre leniter tussit, is neque vehementi siti conflictari, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo curan-

I. 27. M. F. iis tamen. P. bis tamen. I. 29. M. F. P. addunt vel in thorace. I. 31. M. F. P. defessio. non dejetio, non. I. 31. Si quis - - - praecepitur. Haec omnia absunt a F. I. 32. P. leviter. I. 33. P. conflicitur.

136 A. CORN. CELSI Lib. III.
curandus est, quo in caeteris febribus praecipitur.

C A P. VIII.

*Curatio semiteriana febris, quae
dicitur,*

5

At, ubi id genus tertiana est, quod Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentiores accessiones decessionesque, ut aliud morbi genus videri possit; porrigiturque febris in horas viginti quatuor, & triginta sex; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quae vera est; &, ubi ea venit, protinus dari. Plurimique sub alterutro currantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibus, qui neque incitet febrem, & tamen longum ejus spatium sustineat,

C A P. IX.

Curatio lentarum febrium.

NON NUNQUAM etiam lentae febres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi opportunior fiet. Saepe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium quod-

¶ 11, M. F. P. omitt. typ.

quoddam novi motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo & sale lubris videtur.

5 At, si diu frigus est, & torpor, & jactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris; & major ortus calor simul 10 & priora mala tollit, & spem remissionis, inque ea curationis, ostendit.

Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi aegros, qui sub cautoribus medicis trahebantur, in- 15 terdum contrariis remediis fanant. Siqui-
dem apud antiquos quoque ante Herophi-
lum & Erasistratum, maximeque post Hip-
pocratem fuit Petron quidam, qui febricitan-
tem hominem, ubi acceperat, multis

20 vestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret. Deinde, ubi paulum remitti cooperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se aegrum indicabat: si non mo-
25 verat, plus etiam aquae frigidae ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam af-
fam, & vinum homini dabat. Si non libe-
raverat, decoquebat aquam sale adjecto,
30 eamque bibere cogebat, ut vomendo ven-
trem purgaret.

Et intra haec omnis ejus medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hip-
pocratis successores non refecerant: quam nunc

19, 15.

134, 34.

I. 4. Alias utilis J. Caesar. I. 7. Rom. legit, mulvae.
I. 11. M. F. P. om. que. I. 12. M. P. hercules. I.
18. M. F. P. Petro. I. 24. M. P. indicabat. I. 30. M.
P. movendo.

I Senec. de Clem. I. 9.

475. 19. nunc est his , quos Herophili vel Erasistrati aemuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina ; quia plures , si protinus a principiis exceptit , interemit. Sed , cum eadem omnibus convenire non possint , fere , quos ratio non restituit , temeritas adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos aegros , 121. 9. quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis , & novare interdum , & augere morbum , & febres accendere ; quia curationem , ubi id , quod est , non recipit , potest recipere id , quod futurum est.

C A P . X.

Remedia in febribus ad capitis dolorem , & praecordiorum inflammationem , & ariditatem , & scabritiem linguae.

CONSIDERANDUM etiam est , febres ne solae fint , an alia his quoque mala accedant ; id est , num caput doleat , num 20 lingua aspera , num praecordia intenta fint. Si capitis dolores sunt , rosam cum aceto miscere oportet , & id ingerere : deinde habere † duo pitacia , quae latitudinem frontis , longitudinemque acquent : ex his in- 25 vicem alterum in aceto & rosa habere , alterum in fronte : aut intinctam iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit , pura rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit , oleo acerbo. Si ista parum juvant , 30 teri potest vel iris arida , vel nuces amarae , vel quaelibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum , dolo-

I. 23. M. F. P. & in id.

1 Exemp. vide apud Valleriolam lib. III. obs. 4.

dolorem minuit ; sed magis aliud in alio.
Juvat etiam panis cum papavere injectus ,
vel cum rosa, cerusa, spumave argenti. Ol-
facere quoque vel serpillum , vel anethum ,
5 non alienum est.

At, si in praecordiis inflammatio & do-
lor est , primo superimponenda sunt cata-
plasmatina reprimientia ; ne , si calidiora fue-
rint , plus eo materiae concurrat. Deinde ,
10 ubi prima inflammatio se remisit , tunc de-
mum ad calida & humida veniendum est ;
ut ea , quae remanserunt , discutiant. Notae
vero inflammationis sunt quatuor , rubor ,
& tumor , cum calore , & dolore. Quo ma-
15 gis erravit Erasistratus , qui febrem nullam
sine hac esse dixit.

Ergo , si sine inflammatione dolor est ,
nihil imponendum est. hunc enim statim
ipsa febris solvet. At , si neque inflammatio ,
20 neque febris , sed tantum praecordiorum
dolor est ; protinus calidis & siccis fomen-
tis uti licet. Si vero lingua sicca est , &
scabra , detergenda primum penicillo est
ex aqua calida : deinde ungenda mixtis in-
25 ter se rosa & melle. Mel purgat , rosa re-
primit , simulque siccescere non finit. At
si scabra non est , sed arida , ubi penicillo
detersa est , ungi rosa debet , cui cerae sit
paulum adjectum.

5, 7.

70, 5.

I. 10. P. primo. I. 12. M. F. P. remanserint. I.
19. M. P. solvit.

C A P.

C A P. XI.

*Remedia contra frigus, quod febrem
praecedit.*

SOLET etiam ante febres esse frigus; idque vel molestissimum morbi genus est. Ubi id exspectatur, omni potionē prohibendus aeger est: haec enim paulo ante data, multum malo adjicit. Item maturius veste multa tegendus est. Admovenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta: sic, ut ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increcent. Perfricandae quoque eae partes manibus unctis ex vetere oleo sunt, eique adjiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres quatuor forbitonis cyathos, etiamnum manente febre, dant: deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido & levi. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibus, semel & post febrem datus, prodest.

Sed curiose prospiciendum est, ne tempus remissionis decipiatur. Saepe enim in hoc quoque genere valetudinis jam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quae etiam immoratur, & jactationem, fervoremque corporis, quem ζέτω Graeci vocant, minuit. Illud satis convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum:

*I. 11. fomentatio, P. J. Caesar, P. I. ead. M. F. P.
om. ut. I. 18. M. F. P. tres aut quatuor. I. 19. M.
etiamnum ultra manente. I. ead. P. etiam nunc. I. 20.
P. restituunt. I. 21. M. F. P. leni. I. 24. M. F. P.
perficiendum. I. 29. M. F. P. foetoremque quendam
oris, quem ozen.*

dum : si impares , post graviorem , cibum ;
post leviorem , aquam mulsam .

C A P . XII.

Curatio horroris in febribus.

HORROR autem eas fere febres antecep-
dit , quae certum habent circuitum , &
ex toto remittuntur ; ideoque ¹ tutissi-
mae sunt , maximeque curationes admit-
tunt . Nam ubi incerta tempora sunt , ne-
que alvi ductio , neque balneum , neque vi-
num , neque medicamentum aliud recte da-
tur . Incertum est enim , quando febris ven-
tura sit : ita fieri potest , ut , si subito vene-
rit , summa in eo pernicies sit , quod auxilii
causa fuit inventum . Nihilque aliud fieri
potest , quam ut primis diebus bene absti-
neat aeger : deinde , sub decessu febris ejus ,
quae gravissima est , cibum sumat .

At ubi certus circuitus est , facilius om-
nia illa tentantur ; quia facilius propone-
re nobis & accessionum & decessionum
vices possumus . In his autem , cum vetera-
verunt , utilis fames non est . Primi tan-
tummodo diebus ea pugnandum est : dein
25 de dividenda curatio est , & ante horror ,
tum febris discutienda . Igitur cum pri-
mum aliquis inhorruit , & ex horrore inca-
luit , dare ei oportet potui tepidam aquam
subfalsam , & vomere eum cogere : nam
30 fere talis horror ab his oritur , quae biliosa
in stomacho resederunt . Idem faciendum
est , si proximo quoque circuitu aequa ac-
cessit : saepe enim sic discutitur . Jam-
que ,

*I. 8. M. F. P. maxime quae. I. 13. M. F. poterit.
I. 15. M. F. P. sit. I. 16. F. qui. I. 17. M. F. absti-
neatur. I. ead. M. F. successu. I. 22. inveteraverunt ,
Rittershusius ad Phaedr. I. Fab. 2, I. 32. M. F. P.
om. ac.*

1 Aph. IV. 43.

que, quod genus febris sit, scire licet.

Itaque sub expectatione proximae accessionis, quae instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera est, ut per tempus horroris in folio sit. Si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartae faciat: siquidem eo quoque modo saepe is discutitur. Si nec balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere: siquidem ea quoque assumpta calorem movent; qui horrorem non admittit. Deinde eodem modo, quo in frigore praeceptum est, antequam inhorescere possit, operiatur, fomentisque protinus calidioribus totum corpus circumdare convenit, maximeque involutis extinctis testis & titionibus.

95, 20.

Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur; cui aequa ex calefientibus aliiquid sit adjectum: adhibeturque frictio, quantam is sustinere poterit, maximeque in manibus & pedibus: & spiritum ipse contineat. Neque desistendum est, etiam si horror redit. Saepe enim pertinacia juvantis malum corporis vincit.

Si quid evomuit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est; utendumque eidem est, donec horror finiatur. Sed praeter haec ducenda alvus est, si tardius horror quiescat: siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima post haec auxilia sunt, gestatio & ambulatio. Cibus autem

I. 13. M. F. P. omitt. dem. I. 15. P. fermentisque se protinus. I. 16. M. F. P. validioribus I. 26. M. F. P. eff. I. 33. M. F. P. corpori. I. ead. ultima quoque post. I. 34. M. F. P. frictio.

autem in ejusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum praefert, ac caro glutinosa. Vinum cum dabitur, austерum fit.

C A P. XIII.

Curatio quotidiana febris.

HAEC ad omnes circuitus febrium pertinet: discernendae tamen singulae sunt, sicut rationem habent dissimilem.
 10 Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibis, + altero quoque die uti. Si res inveteraverit, post febrem experiri balneum, & vinum; magisque, si, horrore sublato, haec su-
 15 peref.

C A P. XIV.

Curatio tertiana febris.

SI vero tertiana, quae ex toto intermit-
 tit, aut quartana est, mediis diebus,
 20 & ambulationibus, uti oportet, aliquique
 exercitationibus, & unctionibus. Qui-
 dam ex antiquioribus medicis Cleopantus,
 in hoc genere morborum, multo ante ac-
 cessionem, caput aegri multa calida aqua
 25 profundebat, deinde vinum dabat. Quod,
 quamvis pleraque ejus viri praecepta secu-
 tus est Asclepiades, recte tamen praeterit:
 est enim anceps.

Ipse, si tertiana febris est, tertio die post
 30 accessionem dicit alvum duci oportere:
 quinto, post horrorem vomitum elicere:
 deinde post febrem, sicut illi mos erat, ad-
 huc

I. 2. M. F. P. om. ac. I. 4. M. F. P. om. sit. I. 18. P.
 tertiana vero. I. 32. M. F. P. sicuti.

I. Aph. VII. 42.

huc calidis dare cibum & vinum: sexto die, in lectulo detineri: sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri posse, verisimile est. Tutius tamen est, hoc ipso ordine tria remedia, vomitus, alvi ⁵ ductionis, vini potus, per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare: nec vinum, nisi post accessionem, die septimo bibere.

Si vero primis diebus discussus morbus ¹⁰ non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur: tum, cibo assumpto, bibat aquam: postero die, quo a cibo vacat, & ab exercitatione unctioneque, aqua tan- ¹⁵ tum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urget, & post febrem vinum; & medio die paullum cibi debet assumere.

C A P. XV.

20

Curatio quartanae febris.

EADEM in quartana facienda sunt. Sed cum haec tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio praecipiendum est, quid in ea ²⁵ debeat fieri. Igitur, si cui cum horrore febris accessit, eaque desit, eodem die & postero tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere; biduo proximo, ³⁰ quantum fieri potest, ne hanc quidem: quartto die, si cum horrore febris revertitur, ² vomere; sicut ante praeceptum est: deinde post

1.4. M. F. P. est, ut hoc. 1.5. M. F. P. ordine utamur tria. 1.9. M. F. P. bibat. 1.14. M. F. P. om. a. 1.31. M. F. P. si quarto die.

1 I. Epidem. III. 17, 2 De Affect. xix. 2,

post febrem, modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioque die abstinere; aqua tantummodo calida, si sitis est, assumpta. Septimo die balneo frigus 5 praevenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitis est, ut: ac tum ita nono die balneo frigus praevenire, &, si febris redierit, ducere alvum; ubi ex eo corpus conquieverit, inunctione vehementer perficari, eodem modo sumere cibum, & vino biduo proximo se abstine-re, frictione servata. Decimo tertio die rursus balneum experiri: &, si postea febris accessit, aequa perficari, vinum co-15 piosius bibere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum, & abstinentia cum caeteris, quae praecipiuntur, febrem tollant.

Si vero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est eurationis genus; id-20 que agendum, ut, quod diu iustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam alvum, deinde abstinentiam in septimum 25 diem dixit. Quod ut sustinere aliquis pos-
fit: tamen etiam febre liberatus vix refec-tioni valebit. adeo, si febris saepius accesserit, concidet. Igitur, si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante 30 febrem, neque post eam tentandum erit; nisi interdum jam horrore discussio. Hor-ror ipse per eadem, quae supra praescripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, & vehementer perficari 5 cibum

I. 4. M. F. fitiet. I. 5. Et aqua - - - praevenire.
Hacc absunt a M. F. I. 6. P. si fitiet ac tum. I. 7. P.
septimo. I. 8. P. omitt. &. I. 11. M. F. P. vinum, P.
ead. M. F. P. omitt. ut. I. 12. M. F. P. omitt. tertio,
I. 13. P. ignorat &. I. 15. M. F. P. si. I. 16. M. F. P.
omitt. ut. I. ead. M. F. ut abstinentia, I. 24. M. F. P.
abstinentiam usque in. I. 29. F. omitt. re, I. 34. P. debet.

cibum & validum, & fortiter assumere; vino uti, quanto libebit: postero die, cum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perficari fortiter; cibum accipere sine vino, tertio die abstinere.

Quo die vero febrem expectabit, ante surgere, & exerceri, dareque operam oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat: sic enim saepe illa discutitur. At, si in opere occupavit, tum de-⁵
muin se recipere. In ejusmodi valetudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est.

Sed haec facile validiores faciunt: sin imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. Si haec quoque vehemens onerat, intra quietem, & unctuonem, & cibum consistendum est: dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidiana id malum vertat. Nam quartana neminem ² jugulat: sed, si ex ea facta quotidiana est, in malis aeger est: quod tamen, nisi culpa vel aegri ³ vel curantis, nunquam fit.²⁵

C A P. XVI.

Curatio duarum quartanarum.

At, si dueae quartanae sunt, neque, quas proposui, exercitationes adhiberi posunt: aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare, hinc considerare, diligenter involutis pedibus

I. 2. M. F. P. quantum. I. 7. M. F. P. operam non oportet. I. 15. M. F. P. si. I. 20. M. F. omitt. con. P. sustinendum. I. 29. M. F. P. neque haec, quas. I. 32. M. F. P. leviter. I. 33. M. F. P. ignorant hinc.

¹ Aristot. Probl. Sect. II. 58. ² Tulpia observ. I. III. cap. 53. ³ Hippocr. I. Epidem. Sect. III. 4.

bus & capite. Quoties febris accessit & deficit, cibum modicum sumere, & vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. At, si duae febres pene junguntur, post utramque cibum sumere: deinde vacuo tempore, & moveri aliquantum, & post unctionem cibo uti. Cum vero vetus quartana raro, nisi vere solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impedit. Prodestque in vetere quartana, mutare subinde victimus genus, a vino ad aquam, ab aqua ad vinum, a lenibus cibis ad acres, ab acribus ad lenes transire: esse radicem, deinde vomere: jureve pulli gallinacei ventrem resolvere: oleo ad frictiones adjicere calefacientia: ante accessionem forbere, vel aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum tribus Graeci vini falsi, vel mixta paribus portionibus; & in aqua diluta, piper, catoenum, lafer, myrrham. Per haec enim similiaque corpus agitandum est, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur.

Si febris quievit, diu meminisse ejus diei convenit: eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim revertitur, nisi a fano quoque aliquandiu timetur.

C A P. XVII.

Curatio quotidiana febris, quae ex quartana facta sit.

At, si ex quartana, quotidiana facta est; cum id initio inciderit, per bidentalium

I. 4. M. F. P. Aut. I. 6. M. F. P. aliquid. I. 16.
M. F. P. oleum. I. ead. M. F. P. adjicere: calefacientia. I. 33. M. F. P. vitio.

¹ Epidem. VI. Sect. VI. 42.

duum abstinere oportet, vespere frictione
uti, & aquam tantummodo potui dare.
tertio die faepe fit, ne febris accedat. Sed
sive fuit, sive non fuit, cibus post accessio-
nis tempus est dandus: &, si manet, per bi-
duum abstinentia, quanta maxima impe-
rari corpori potest, & fricatione quotidie
utendum est.

C A P. XVIII.

De tribus infaniae generibus: & primo de ejus curatione, quae a Graecis φρενίς dicitur.

Et febrium quidem curatio exposita
est. Supersunt vero alii corporis affec-
tus, qui huic superveniunt, ex quibus 15
eos, qui certis partibus † assignari pos-
sunt, protinus jungam. Incipiam ab insa-
nia, primamque hujus ipsius partem ag-
grediar, quae & acuta, & in febre est. Graeci
φρενίνη appellant.

Illud ante omnia scire oportet, inter-
dum in accessione aegros despere, & † loqui
aliena. Quod non quidem leve est; neque
incidere potest, nisi in febre vehementi,
non tamen aequa pestiferum est. nam ple-
rumque breve esse consuevit; levatoque
accessionis impetu, protinus mens reddit.
Neque id genus morbi remedium aliud
desiderat, quam quod in curanda febre
praeceptum est.

Phrenitis i vero tum demum est, cum
continua dementia esse incipit; aut cum
aeger, quamvis adhuc sapiat, tamen quaf-
dam

*I. 1. vespere abesta M. F. P. I. 2. M. P. F. omitt. & I.
ead. M. F. P. tantummodo vesperi potui. I. 5. M. F. P.
at. I. 6. M. F. P. maxime. I. 7. M. F. P. om. & I. 12. M.
F. P. phrenesis. I. 13. M. F. P. ratio. I. 16. M. F. P. assig-
nari non possunt. I. 20. M. F. P. phrenesin. I. 31. M. F.
phrenesis.*

¹ Trallian. I. 13. Cael. Aurelian. Praef. Lib. 1.
Auctor. Morb. pag. 7.

dam vanas imagines accipit: perfecta est,
ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus
autem plura genera sunt: siquidem ex
phreniticis alii hilares, alii tristes sunt: alii
5 facilius continentur, & intra verba despi-
piunt; alii insurgunt, & violenter quaedam
manu faciunt; atque ex his ipsis, alii nihil
nisi impetu peccant, alii etiam artes adhi-
bent; summamque speciem sanitatis in cap-
10 tandis malorum operum occasionibus pre-
bent; sed exitu deprehenduntur.

Ex his autem eos, qui intra verba despi-
piunt, aut leviter etiam manu peccant,
onerare asperioribus coercitionibus fu-
15 pervacuum est. Eos vero, qui violentius
se gerunt, vincere convenit; ne vel sibi vel
alteri noceant. Neque credendum est, si
vincitus aliquis, dum levari vinculis cu-
pit, sanum jam se fingat; quamvis pruden-
20 ter & miserabiliter loquatur, quoniam is
dolus insanientis est.

Fere vero antiqui tales aegros in tene-
bris habebant; eo quod illis contrarium
esset, exterreri; & ad quietem animi tene-
25 bras ipsas conferri aliquid judicabant. At
Asclepiades, tanquam ipsis tenebris terren-
tibus, in lumine habendos eos dixit. Neu-
trum tamen perpetuum est. Alium enim
lux, aliud tenebrae magis turbant. repe-
30 riunturque, in quibus nullum discrimen
deprehendi, vel hoc, vel illo modo possit.
Optimum itaque est, 2 utrumque experiri;
& habere eum, qui tenebras horret, in lu-
ce; eum, qui lucem, in tenebris. At ubi
nul-

1. 4. M. F. P. phreneticis. 1. 6. M. F. P. confurgunt.
1. 10. M. F. P. majorum. 1. 16. M. P. alteri sibi. 1.
23. P. eis. 1. 26. P. tenebris ipsis. 1. 27. M. F. P. effo.

1 Cael. Aurel. M. A. l. 1. c. 15. p. 40. 2 Cael.
Aurel. Acut. Morb. l. 9. Arretaeus de Curat. Acut.
l. 1.

nullum tale discrimen est, aeger, si vires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est.

Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque increscit. Tum itaque nihil nisi continendus aeger est. Ubi vero res patitur, festinanter subveniendum est. Aelepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si ¹ trucidentur: hanc rationem sequutus, quod neque infania esset, nisi cum febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur. Ipse in his somnum multa frictione quaesivit. Sed cum & intentio febris somnum impedit, & ¹⁰ frictio non, nisi in remissione ejus, utilis sit: hoc quoque auxilium debuit praeterire. Quid igitur est? Multa in praeципiti ² periculo recte fiunt, alias omittenda. Et continua quoque febris habet tempora, quibus, et si non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, ut non optimum, sic satis tamen secundum remediis tempus. Quod si vires aegri patiuntur, sanguis quoque mitti debet.

Nec minus dubitari potest, an alvus ducenta sit. Tum, interposito die, convenit caput ad ⁴ cutem tondere: deinde aqua fovere, in qua verbena aliquae decoctae sint ex reprimentibus; aut prius fovere: deinde ³⁰ tondere, & iterum fovere: ac novissime rosa caput naresque implere; offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, & movere sternutamenta medicamentis ad id effi-

¹ I. 6. M. Itaque tum. I. 11. M. F. P. om. cum. I. 13. M. F. P. mitteretur. Sed ipse. I. 14. M. F. P. om. sed. I. 17. M. F. P. sit: itaque hoc. I. 20. M. F. P. continuata. I. 22. M. F. P. om. fatis. I. 23. M. F. P. remedii. I. 26. M. F. P. deliberari. I. 29. M. F. P. sint vel ex. I. 33. M. F. P. om. &. I. 34. M. F. P. in.

² V.S. quando & qualis convenientia Cael. Aur. Acut. Morb. I. c. 10. ³ Cael. Aur. Acut. Morb. I. 25. ³ Valeriola Obsery. I. lib. I. ⁴ Cael. Aur. Acut. Morb. I. 10. & c. 15.

efficacibas. Quae tamen facienda sunt in his, quibus vires non defunt. Si vero imbecillitas est; rosa tantum caput, adjecto serpylo, similiue aliquo, madefaciendum est. Utiles etiam in quibuscumque viribus herbae duae sunt, solanum & muralis, si simul ex utraque, succo expresso, + caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est; parcus tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cujusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt: sicut in homine praedivite famem timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabantur. Quorundam audacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continendis plaga quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestivus risus objurgatione & misericordia prohibendus est. Quorundam discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusque proficiunt. Saepius tamen assentiendum, quam repugnandum est: paulatimque, & non evidenter, ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens abducenda. Interdum etiam elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim advertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si qua meminerunt, cogen-

I. 2. P. tamen. I. 6. M. F. P. omitt. si. I. 21. M. F. P. risus & objurgatione. I. 27. M. F. P. dicentur. I. 28. M. F. mens ejus abducenda. I. ead. M. F. P. Abducenda est. Interdum. I. 33. M. F. P. convertere.

di sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocaverunt.

Omnibus vero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim plerique ⁵ sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliantur potui dando a ¹⁰ quam, in qua papaver aut hyoscyamus decocta sint: alii mandragorae mala pulvino subjiciunt: alii vel anomum, vel fycamini lachrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud Medicos reperio. Sed cur Graeci morum ¹⁵ οὐκέτινος ² appellant, cum mori nulla lachryma sit? Sic vero significatur lachryma arboris in AEgypto nascentis, quam ibi οὐκέτινος appellant. Plurimi decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua cum spongia os & caput subinde fovent.

Asclepiades ea supervacua esse dixit: quoniam in lethargum saepe convertunt. Praecepit autem, ut primo die, a cibo, potionē, somno abstineretur: vespere ei daretur potui aqua: tum frictio admoveretur lenis, ita ut ne manum quidem, qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde dic, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio & aqua, rursusque frictio ²⁵ adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut, illo confidente, nimia frictio etiam lethargi periculum afferat.

Sed

I. 9. M. F. P. vigilantii. I. 12. M. F. P. sit. I. 15. M. F. P. cun. I. 16. M. F. P. om. cum. I. 17. M. F. P. eff. I. 19. M. F. moroficon. I. 20. M. F. P. subinde. I. 21. M. F. P. om. subinde. I. 23. M. F. converterent. P. competenterent. I. 26. M. P. tunc. I. 34. M. F. P. frictio.

¹ Aph. II. 2. ² Bodæus a Stapel ad Theophrast, Histor. Plant. IV. 2,

Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoque necessaria est; ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possumus.
 5 + Confert etiam aliquid ad somnum silanus juxta cadens; vel gestatio post cibum, & noctu; maximeque lecti suspensi motus.

Neque alienum est, si neque sanguis an-
 10 te missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, ² occipitio inciso cucurbitu-
 lam admovere: quae quia levat morbum,
 potest somnum facere. Moderatio autem
 in cibo quoque adhibenda est: nam neque
 15 aeger est implendus, ne insaniat, neque
 jejunio utique vexandus est, ne imbe-
 cillitate in cardiacum incidat. Opus est
 autem cibo infirmo, maximeque forbitio-
 nis, & potionē aquae mulsae, cuius tenuis
 20 cyathos hieme, aestate vero quatuor dedisse
 fatis est.

Alterum genus insaniae est, quod spa-
 tium longius recipit; quia fere sine febre
 incipit, leves deinde febriculas excitat: &
 25 consistit in tristitia, quam videtur bilis ³ atra
 + contrahere. in hac utilis detractio sanguine
 est. Si quid hanc prohibet, prima est
 abstinentia: secunda, per album veratrum
 vomitumque purgatio: post utrumlibet
 30 adhibenda bis die frictio est. Si magis va-
 let, frequens etiam exercitatio: in jejuno
 vomitus; cibus, sine vino, dandus ex me-
 dia materia est. Quam quoties posuero,
 scire licet, etiam ex infirmissima dari posse,
 dum

155, 26.

*I. 1. M. F. P. acercedendus. I. 6. P. saliens. I. 13. M.
 F. ^{1.} potest etiam somnum. I. 17. P. recidat. I. 19. M. F.
 P. forbitio. I. ead. M. F. P. omitt. &. I. 20. M. F.
 P. cyathos bis hieme. I. ead. M. F. P. quater aestate.*

¹ Cael. Aurel. A. M. I. 15. p. 46. ² Cael. Aurel.
 I. c. 11. p. 27. ³ Aretacus de Morb. Diut. I. 6. Tral-
 han. I. 16.

dum ne ea sola quis utatur: valentissimam tantummodo esse removendam. Praeter haec, servanda alius est quam tenerima: removendi terrores, & potius bona spes afferenda: quaerenda delectatio ex fabulis, ⁵ ludisque, quibus maxime capi sanus affuerat: laudanda, si qua sunt, ipsius opera, & ante oculos ejus ponenda: leviter objurganda vana tristitia: subinde admonendus, in his ipsis rebus, quae sollicitant, cur non ¹⁰ potius laetitiae, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliae febres curanda est.

Tertium insaniae genus est ex his longissimum; adeo ut vitam ipsam non impedit. quod robusti corporis esse consuevit. Hujus autem species duac sunt. Nam quidam imaginibus, non mente fallunt; quem insanientem Ajacem vel Orestem poetarum fabulae ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes, an hilares sint. In tristitia, nigrum veratrum dejectionis causa; in hilaritate, album, ad vomitum excitandum, dari debet. Idque, si in potionē non ²⁵ accipit, pani adjiciendum est, quo facilius fallat. Nam, si bene se purgaverit, ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam, si semel datum veratrum parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leviorem esse morbum cum ¹ risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus ali-

I. 1. P. illa. I. ead. M. F. P. valentissima. I. 2. M. F. P. removenda. I. 17. F. ipsius. M. P. bujus autem ipsius. I. 18. M. F. P. falluntur. I. 26. M. F. P. acceptit.

¹ Aph. VI. 53.

aliquis est , ventrem ejus ante solvendum esse : ubi a superiore , comprimentum .

Si vero consilium insanientem fallit , tormentis quibusdam optime curatur . Ubi perperam aliquid dixit , aut fecit , fame , vinculis , plagis coēcendus est . Cogendus est & attendere , & ediscere aliquid , & minifesse . Sic enim fiet , ut paulatim metu cogatur considerare , quid faciat . Subito etiam terri , & expavescere , in hoc morbo prodest ; & fere , quicquid animum vehementer perturbat . Poteſt enim quaedam fieri mutatio , cum ab eo statu mens , in quo fuerat , abducta est . Interest etiam , si ipſe sine causa ſubinde rideat , an moestus demiffusque fit . Nam dementis hilaritas terroribus his , de quibus ſupra dixi , melius curatur . Si nimia triftitia eſt , prodeſt lenis , fed multa bis die frictio : item ſuper caput aqua frigida infuſa , demiffumque corpus in aquam & oleum .

Illa communia ſunt : insanientes vehementer exerceri debere : multa frictione uti ; neque pinguem carnem , neque vinum alſumere ; cibis uti poſt purgationem , ex media materia , quam levifimis , non oportere eſſe vel folos , vel inter ignotos , vel inter eos , quos aut contemnant , aut negligant ; mutare debere regiones , & , ſi mens redit , annua peregrinatione eſſe jaſtandos .

Raro , ſed aliquando tamen , ex metu delirium naſcitur . Quod genus insanientium , ſpecie ſimile , ſimiliq[ue] vietus gene re curandum eſt : praeterquam quod in hoc

153, 32.
170, 16.

L. 15. M. F. P. dimiffusque. l. 16. M. F. P. demen-
fis. l. 18. P. fit. l. 19. M. F. P. fer.

z. Aph. VII. 70.

C A P. XIX.

De Cardiacis.

His morbis praecipue contrarium est ⁵ id genus, quod ~~καρδιας~~ a Graeciis nominatur; quamvis saepe ad eum phrenitici transeunt: siquidem mens in illis laborat, in hoc vero constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis; quod, stomacho languente, immodo sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore, ex ¹⁵ toto thorace, & cervicibus, atque etiam ex capite prorumpit, pedibus tantummodo, & cruribus siccioribus, atque frigidis. Acuti id morbi genus est.

Curatio prima est, supra praecordia imponere, quae reprimunt, cataplasmata: seunda, sudorem cohibere. Id praefstat acerbum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrtleum. Quorum aliquo corpus leniter perungendum; ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est.

Si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel subinde horum pulvere respergendum. Idem praefstat pulvis ex contritis ³⁰ aridae myrti vel rubi foliis, aut ex austeri & boni vini arida feces. Pluraque similia sunt, quae si defunt, satis utilis est quilibet

ex

I. 4. M. F. P. cardiaci morbi curatio. I. 5. M. F. P. huic morbo. I. 8. M. P. phrenitici. I. 9. M. F. P. labat. I. ead. F. M. P. om. vero. I. 17. M. F. P. om. ex. I. 18. M. F. P. frigentibus. I. 19. M. P. At ubi. I. 21. M. F. P. reprimant, I. 22. M. F. P. prohibere. I. 24. M. F. P. leviter. I. 29. M. F. P. vel etiam subinde. I. 31. M. F. P. aridi.

¶ Cacl. Aur. Acut. Morb. II. 30, 31. Trallian. VII. 9.

ex via pulvis injectus. Super haec vero , quo minus corpus insudet , levi veste debet esse coniectus , positusque loco non calido , fenestris patentibus , sic ut perflatus 5 quoque aliquis accedat.

Tertium auxilium est , imbecillitati ja-centis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem , sed saepe tamen nocte ac die dandus est ; ut nutriat , neque one-10 ret. Is esse debet ex infirmissima materia , & stomacho aptus. Nisi autem necesse est , ad vinum festinare non oportet. Si verendum est , ne deficiat , tum & intrita ex hoc , & hoc ipsum austерum quidem , sed tamen tenue , 15 meraculum , egelidum subinde & liberali-ter dandum est ; adjecta polenta , si modo is aeger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet , neque nullarum virium , ne-que ingentium : recteque tota die ac nocte , 20 duas vel tres heminas aeger bibet ; si vastius corpus est , plus etiam : si cibum non acci-pit , perunctum ante perfundere aqua fri-gida convenit , & tum dare.

Quod si stomachus resolutus parum 25 continet , & ante cibum , & post eum spon-te vomere oportet ; rursusque post vomi-tum cibum sumere. Si ne is quidem man-ferit , sorbere vini cyathum , interposita-que hora , sumere iterum. Si id quoque 30 stomachus reddiderit , totum corpus bul-bis contritis superillinendum est : qui , ubi inaruerunt , efficiunt , ut vinum in stoma-cho contineatur , exque eo toti corpori ca-lor venisque vis redeat.

Ulti-

I. 3. M. F. P. ignorant positusque. I. 15. M. F. P. meracum. I. 19. P. &. I. 20. M. F. P. omitt. duas. I. 27. M. F. P. id. I. 29. M. F. P. alterum.

† Ultimum auxilium est, in alvum ptisanae vel alicae cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque vires tuerit. Neque alienum est, naribus quoque aestuantis admovere, quod reficiat; ut est rosa & vinum: &, si qua in extremis partibus frigent, unctis & calidis manibus sovere. Per quae si conséqui potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse praefidio. Ubi esse in tuto videtur, verendum tamen est, ut ne in eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere; donec satis virium corpori redeat.

15

C A P. XX.

De Lethargicis.

ALTER quoque morbus est; aliter phrenitico contrarius. In eo difficilior somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: in hoc māreor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas.
2 οὐτεποιοι Graeci nominarunt. Id quoque genus acutum est, &, nisi succurritur, celeriter jugulat.

25

Proinde ex eo aegros ³ quidam excitare nintuntur, admotis his, per quae sternutamenta evocantur, & his, quae odore foedo movent, qualis est pix usta, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cappa. Juxta etiam galbanum incidunt, aut cornu cervinum: si non est, quodlibet aliud. Haec enim cum comburuntur, odore foedo movent.

Thar-

1. 5. P. id. l. 6. M. F. P. rofam. l. 11. M. P. in tuto esse. l. 12. M. F. P. om. ut. l. ead. P. ad. l. 17. M. F. P. De lethargo & ejus curatione. l. 20. M. F. P. illo difficult. l. 21. M. F. P. est ar in. l. 23. M. F. P. nominant. l. ead. M. F. P. Atque id. l. 26. M. F. P. hos. l. ead. M. F. P. quidam subinde excitare. l. 27. M. F. quae per. l. 29. M. F. P. cruda. l. 31. M. F. P. incidunt, aut pilos aut. l. 33. M. F. P. odorem. l. 34. M. F. P. foedum.

1 Alex. Trall. l. 14. 2 Cael. Aur. M. A. l. 11. c. 1.

3 Trallian. l. 15. Arctaens de Morbor. Acut. Curat. l. 2.

Tharrias vero quidam, accessionis esse id malum, dixit, levarique, cum ea decessit. Itaque eos, qui subinde excitant, fine usū male habere. Interest autem, in decessione 5 expurgiscatur aeger, an, cum febris levatur, aut, levata quoque ea, somnus urgeat. Nam si expurgiscitur, adhibere ei, ut sopito, supervacuum est. neque enim vigilando melior fit; sed per se, si melior est, vigi- 10 lat. Si vero continens ei somnus est, utique excitandus est; sed his temporibus, quibus febris levissima est, ut excernat aliquid, & sumat. Excitat autem validissime repente aqua frigida superinfusa. Post 15 remissionem itaque, perunctum oleo multo totum corpus, tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si aequalis aegro spiritus erit, si mollia praecordia. Sin aliter 20 haec erunt, ea potiora, quae supra comprehensa sunt. Et, quod ad somnum quidem pertinet, commodissima haec ratio est.

Medendi autem causa, caput radendum; deinde posca fovendum est, in qua laurus, 25 aut ruta decocta sit. Altera vero die impo- nendum castoreum, aut ruta ex aceto con- trita, aut lauri baccae, aut hedera cum ro- fa & aceto. Praecipue proficit, & ad excitandum hominem, naribus admo- 30 tum; & ad morbum ipsum depellendum, capiti fronte impositum finapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest: maximeque opportune cibus datus, id est, in remissio- ne, quanta maxima inveniri poterit. Ap- tissima

I. 5. M. F. P. febris non levatur. I. 5. M. F. P. leve-
tur. I. 12. M. F. P. ut & cernat. I. 14. M. F. P. om.
super. I. 16. M. F. P. om. totum. I. 24. M. F. P.
postea. I. ead. M. F. P. est aqua. I. 25. M. F. P.
altero. I. ead. M. F. P. om. vere. I. 34. M. F. ma-
xime.

tissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat. Si autem quotidie gravis accessio est, haec quotidie detur: si alternis post graviorem, sorbitio; post leviorum, mulsa aqua. Vinum quoque cum 5 tempestivo cibo datum non mediocriter adjuvat.

Quod si post longas febres ejusmodi torpor accessit, caetera eadem servanda sunt. Ante accessionem autem, tribus quatuorve horis, si venter adstrictus est, dandum est castoreum cum scammonia; si non est, per se ipsum castoreum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus; si dura, in iisdem sorbitonibus subsistendum; impoundumque praecordiis, quod simul & reprimat & emolliat.

C A P. XXI.

De Hydropicis.

451.

20

SED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi enim primis diebus succurritur, in ὕδωπα, quam Graeci vocant, incident. Ejus tres species 25 sunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus, ex motu spiritus, sonus est: modo corpus inaequale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua 30 contrahitur; &, moto corpore, ita moveatur, ut impetus ejus conspici possit. Primum, πυπαντη; secundum, λασιηφλεγματικη, vel

I. 2. M. F. P. sic ut si. I. 9. M. F. P. torpor corpori accessit.
I. 11. M. F. P. castoreum mixtum cum scammonia. I. 12.
M. F. P. om. dandum, I. 13. M. F. P. om. castoreum. I.
17. M. F. P. imponendumque est praecordiis. I. 20. F. P.
De aqua inter cutem hoc est hydropico morbo. M. inter
cutem. I. 23. M. F. P. om. enim. I. 24. M. F. P. discussus
est, Hydropa Graeci vocant. Atque ejus tres species, I. 39,
M. F. P. unum.

I. Aretaeus de Diuturn. Morb. II, 1.

vel in *mīcāgōnā*; tertium *αρχιτόνη* Graeci nominarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia: ob quam ne ulcerā quidem in his aegris facile faneſ-
ſunt. Saepe vere hoc malum per se incipit: 68, 7.
ſaepe alteri vetusto morbo, maximeque quartanae, supervenit.

Facilius in servis, quam in liberis tollitur. quia, cum desideret famem, ſitim, & mille alia taedia, longamque patientiam, promptius iis ſuccurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas eſt. Sed ne hi quidem, qui ſub alio ſunt, ſi ex toto ſibi temperare non poſſunt, ad falu-
tem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chryſippi diſcipulus, apud Antigonum regem, amicū quendam ejus, notae intemperantiae, mediocriter eo morbo implicitum, negavit poſſe ſanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus ſe fanaturum polliceretur; respondit, illum ad morbum aegri respicere; ſe, ad animum. Neque eum res ſcēllit. Ille enim cum ſumma diligentia non medici tantummodo, ſed etiam regis custodiretur, tamen malagmata ſua devorando, bibendoque ſuam urinam, in exitum ſe preecipitavit.

Inter initia tamen, non diſcillima curatio eſt, ſi imperata ſunt corpori, quies, fitis, inedia. At ſi malum inveteravit, non ſine magna mole diſcutitur. ² Metrodorum tamen, Epicuri diſcipulum, referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque aequo animo neceſſariam ſitim ſuſtineret, ubi diu ab-

I. 1. M. F. P. hypoſaren. I. 2. M. F. P. nominant. I. cad. omnium abeft a M. F. P. I. 9. M. F. P. om. & I. 11. P. bis. I. 18. Apulei. Metam. x. medicus notae perfidiae. L. 3. §. 4. de liber. exhibend. notae nequitiae homo. I. 27. M. F. exitum. I. 30. M. P. inverteraverit. I. 31. M. F. P. molaffia. I. 34. M. F. P. animo ferret neceſſariam. I. cad. M. F. P. ignorant ſuſtineret.

¹ Aph. vi. 8. ² Ejus vitam deſcribit Diog. Laertius.

abstinuerat, solitum bibere, deinde evomere. Quod, si redditur, quicquid receptum est, multum taedio demit: si a stomacho retentum est, morbum auget. ideoque in quolibet tentandum non est.

Sed si febris quoque est, haec in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre aeger est, tum deinceps ad ea venendum est, quae ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque, quaecumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquando, & superiores maxime partes sic perfricandae, ut calorem in cutem evocet: inter quae, spiritum ipse contineat. Evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel cibano, similibusque aliis: maximeque utiles sunt naturales, & siccae sudationes; quales super¹ Batas habemus in myrtetis. Balneum, atque omnis humor alienus est. Jejuno recte catabotia dantur, facta ex duabus absinthiis, myrrae tertia parte.

Cibus esse debet ex media² quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quae urinam mouet. Alvum moliri cibo melius est, quam medicamento. Si tamen res coget, ex his aliquid, quae id praestant, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum,

¹ L. 14. M. F. aliquid. ² ead. M. F. om. Et. L. 15. calorenz in cutem evocet: inter quae. Haec absunt a M. F. P. L. 17. M. F. P. non exercitatione tantummodo. L. 21. M. F. P. Baias. L. 23. M. F. taputia. L. 30. M. F. P. sed id ipsum tamen moliri cibo quam medicamento melius est. L. 32. M. F. P. praestent.

¹ Cicero Epist. ad Fam. IX. 12. ² Supra II. 18.

dum, crocum, cinnamomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oenanthe, ¹ panaces, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, quam ⁵ *συρίδα ἀργία* Graeci nominant, abrotanum, rosae folia, acorum, amarae nuces, tragoriganum, styrax, costum, junci quadrati & rotundi flos; illum *κύπερον*, hunc *σχοῖνος* Graeci vocant. quae quoties posuero, ¹⁰ non quae hic nascuntur, sed, quae inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen, quae lenissima ex his sunt, id est, rosae folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est austерum, sed quam te- ¹⁵ nuissimum.

Commodum est etiam, lino quotidie ventrem metiri, &, qua comprehendit alvum, notam imponere: postero quoque die videre, plenius corpus sit, an extenuetur. id enim, quod extenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est, metiri & potionem ejus, & urinam. nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundae valetudinis spes est. Ascle- ²⁰ piades in eo, qui ex quartana in hydro- pa deciderat, se abstinentia bidui, & fricatione usum; tertio die, jam & febre, & aqua liberato, cibum, & vinum dedisse, memoriae prodidit. Hactenus communi- ²⁵ ter de omni specie praecipi potest: si ve- hementius malum est, diducenda ratio cu- randi est.

Ergo, si inflatio, & ex ea dolor creberet, utilis quotidianus, aut altero quoque

L 2 die

I. 1. M. F. P. *cinnamum*. M. F. P. *anomum*. I. 4. M. F. P. *timinia*. I. 7. M. F. *florax*. I. 8. alias *odorati* Caesar. I. ead. M. F. P. *semen*. I. ead. M. F. P. *illud*. I. ead. M. F. *echinon* hoc. I. 9. P. *σκένος* hoc. I. 12. M. F. P. *levissima*. I. 14. M. F. P. est & austерum. I. 18. M. F. P. om. quoque. I. 19. M. P. F. *videre*, si plenius. I. 20. M. P. F. om. ex. I. 26. M. P. F. *friktione*. I. 29. M. F. om. di. I. 30. M. F. P. dici. I. 33. *inflammatio*. I. 34. M. F. P. alterno.

¹ Rhodius ad Scribon. Largi Comp. V. p. 37.

die post cibum, vomitus est. Fomentis deinde siccis calidisque utendum est. Si per haec dolor non finitur, necessariae sunt fine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his utendum. Ultimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam quotidie ter quaterve opus est uti fricatione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione a ventre abstinentum est. Imponendum vero in eum crebrius sinalpi, donec cutem erodat; ferramentisque candardibus pluribus locis venter exulcerandus est, & servanda ulcera diutius. Utiliter etiam scilla cocta deligatur super cutim. Sed diu post has inflationes abstinentum est ab omnibus inflantibus.

At, si id vitium est, cui *λευκοφλεγματια* 20 nomen est, eas partes, quae tument, subjicere soli oportet; sed non nimium, ne febriculam incendat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumque fricatione. madefactis tantum manibus aqua, cui sal 25 & nitrum & olei paulum sit adjectum; sic, ut aut puerilis aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem, tota hora; post meridiem, semihora fieri 30 oportet. Utilia sunt etiam cataplasmata, quae reprimunt: maximeque, si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque super talum, quatuor fere digitis, ex parte interiore

*I. 1. M. F. P. om. deinde. I. 8. M. F. P. copiose. I.
10. M. F. P. fricatione. I. 17. M. F. P. definitur cutis.
I. 18. M. F. P. inflammationes. I. 23. M. F. P. febricula
cula incidat I. 24. M. F. P. fricatione. I. 33. M. F. P.
quoque est super talum.*

teriore est : quo per aliquot dies frequens humor feratur : atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet : concutendumque corpus est multa gestatione , atque , ubi inductae vulneribus cicatrices sunt , adjicendum exercitationibus & cibis , donec corpus ad pristinum statum revertatur. Cibus valens esse debet , & glutinosus , maximeque caro. Vinum , si per stomachum licet , dulcius sed ita , ut invicem biduo tri-duove , modo aqua , modo id bibatur. Prodest etiam lactucae marinae , quae grandis juxta mare nascitur , semen , cum aqua potui datum. Quod si valens est , qui id accipit , ei scilla cocta simul super ventrem deligatur. Auctoresque multi sunt , inflatis vefcis pulsandos tumores esse.

Si vero id morbi genus est , quo in uterum multa aqua contrahitur , ambulare , sed magis modice oportet , malagma , quod digerat , impositum habere ; idque ipsum superimposito triplici panno , fascia , non nimium tamen vehemente , astringere. quod a Tharria profectum , servatum esse a pluribus video. Si jecur , aut lienem affectum esse , manifestum est , sicut pingue contusam , adjecto melle , superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur , sed humor nihilominus abundat , celeriori via succurrere , ut is per ventrem ipsum emitatur. Neque ignoro , Erafistrato displacuisse hanc curandi viam. morbum enim hunc jocineris putavit : ideoque illud esse fanandum ; frustraque aquam emitti , quae , vitiato

I. 1. M. F. P. om. est. I. ead. M. F. P. qua. I. 6. M. F. P. adjiciendum & exercitationibus. I. ead. exercitationibus est & cibis. I. 7. M. F. P. habitum. I. 14. M. F. P. ignorant quod. I. 15. M. F. P. sicut supra dixi , delimitur. I. 33. M. F. P. ideoque ita illum.

vitiato illo subinde renascantur. Sed pri-
mum, non hujus visceris unius hoc vitium
est. Nam & splene affecto, & in totius cor-
poris malo habitu fit. Deinde, ut inde coe-
perit, tamen aqua nisi emititur, quae con-
tra naturam ibi subsistit, & jocinori, & cae-
teris interioribus partibus nocet. Conve-
nitque, corpus nihilominus esse curandum.
Neque enim sanat emissus humor, sed me-
dicinae locum facit, quam intus inclusus 10
impedit. Ac ne illud quidem in contro-
versiam venit, quin non omnes in hoc
morbo sic curari possint; sed juvenes ro-
busti, qui vel ex toto carent febre, vel cer-
te satis liberales intermissiones habent. 15
Nam quorum stomachus corruptus est,
quive ex atra bile huc deciderunt, quique
malum corporis habitum habent, idonei
huic curationi non sunt. Cibus autem, quo
die primum humor emissus est, superva-
cuus est, nisi si vires desunt. In sequenti-
bus diebus, & his vinum meracius qui-
dem, sed non ita multum dari debet, pau-
latimque revocandus aeger est ad exercita-
tiones, fricationes, solem, sudationes, fati-
gationes, & idoneos cibos, donec ex toto 20
convalescat. Balneum rarum res amat; &
frequenter in jejuno vomitum. Si aestas
est, in mari natare commodum est. Ubi
convaluit aliquis, diu tamen alienus ei ve-
neris usus fit. 25

I. 1. M. F. P. om. re. I. 3. F. M. P. om. &. I. 7.
M. F. P. inferioribus. I. 24. M. F. P. evocandus. I. 25.
M. F. P. frictiones. I. 26. M. F. P. navigationes. I. 27.
M. F. P. om. &. I. 29. M. F. mare. I. 31. M. P. eff.

Cap.

C A P . XXII.

De Tabe, & ejus speciebus.

DIUTIUS saepe & periculosius tabes eos male habet, quos invasit. Atque hujus quoque plures species sunt. Una est, qua corpus non alitur, &, naturaliter semper aliquibus decadentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa macties oritur; &, nisi occurritur, tollit. ¹⁰ *τάρσοφιαν* hanc Graeci nominant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit: ita vel, quod deest, infirmat: vel, quod superat, ¹⁵ corruptitur.

Altera species est, quam Graeci *κακεζίων* appellant: ubi malus corporis habitus est; ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod fere fit, cum longo morbo vitia- ²⁰ ta corpora, etiam si illo vacant, refectionem tamen non accipiunt; aut cum malis medicamentis corpus affectum est; aut, cum diu necessaria defuerunt; aut, cum inusitatos & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidve ²⁵ simile incidit. Huic, praeter tabem, illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulceras, summa cutis exasperetur, vel aliquae corporis partes intumescent.

³⁰ Tertia est, longeque periculosissima species, quam Graeci *φθίνων* nominaverunt. Oritur fere a capite: inde in pulmonem distillat. Ex hoc exulceratio accidit, & febricula

I. 2. M. F. P. & curationibus. I. 10. M. F. P. vocant. I. 33. M. F. P. huic. I. ead. M. F. P. acebat. I. ead. M. F. P. ex hac.

¹ Erant apud veteres, qui tabem & longos morbos inducere poterant, *Philo Judaeus de specialib. leg. 16.* pag. 792. & 1691. ² *Cael. Aurel. Morb. Chron. II. 14.*

cula lenis sit; quae etiam, cum quievit, tamen repetit. In ea quoque frequens tussis est, & pus excreatur; interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem ¹ impo-
72, 1. fitum est, mali odoris est. Itaque, qui de 5
morbo dubitant, hac nota utuntur.

² Cum haec genera tabis sint, animadver-
tere primum oportet, quid sit, in quo labo-
ratur. Deinde, si tantum non ali corpus ap-
paret, causam ejus attendere; &, si cibi mi-
nus assumpsit aliquis quam debuit, adjicere
oportet: sed paulatim, ne si corpus insue-
tum subita multitudine oneraverit, stomachus gravetur, & concoctionem impedit.
Si vero plus justo quis assumere solitus est, 15
abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo
incipere; quotidie adjicere, donec ad ju-
stum modum perveniat. Praeter haec con-
venit ambulare locis quam maxime frigi-
dis, sole vitato: per manus quoque exerce-
ri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfri-
cari. si potest, maxime per se ipsum, saepius
eodem die, & ante cibum, & post eum, sic
ut interdum oleo quaedam adjiciantur ca-
lefacientia, donec insudet. Prodestque je-
juno prehendere per multas partes cutem,
& attrahere, ut relaxetur; aut, imposita
resina, & abducta, subinde idem facere. U-
tile est etiam interdum balneum, sed post
cibum exiguum. Atque in ipso folio recte 30
cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc fri-
catio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse
debent ex his, qui facile concoquuntur,
maximeque alunt. Ergo vini quoque, sed
au-

*I. 1. M. F. P. levis. I. 2. M. F. P. tamen & repetit. I. ead.
M. F. P. ignorant in ea quoque. I. ead. E. P. om. & I. 8. M.
F. P. tantum modo non. I. 11. F. M. P. debet. I. 12. M. F. P.
om. oportet. I. 14. stomachus gravetur, & abest a M. F. P.
I. 19. M. F. P. minime. I. 26. M. F. P. praetendere. Prae-
tendere alias prendere. Caesarius in margine. I. 27. P. om.
im. I. 32. M. F. P. filio. I. 34. M. I. P. qui maxime.*

¹ Aphor. V. 11. ² Cael. Aurel. Morbor. Chronic.
II. 14. p. 421. Trallian. V. 2.

austeri, necessarius usus est, movendae urinae.

At si malus habitus corporis est, primum abstinentum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, unctionibus, fricationibus. Utilius his frequens balneum est, sed jejunis; etiam usque ad sudorem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino au-

10 stero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut caetera quoque eodem modo serventur.

Quod si mali plus est, & vera phthisis
 15 est, inter initia protinus occurrere necef-
 sarium est: neque facile enim hic mor-
 bus, cum inveteraverit, evincitur. Opus
 est, si vires patiuntur, ¹ longa navigatione,
 coeli mutatione sic, ut densius quam id est,
 20 ex quo discedit aeger, petatur. Ideoque
 aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fe-
 re que id posse inter principia corpus pati
 debet, cum hic morbus aetate firmissima
 25 maxime oriatur, id est ab anno ² duodevi-
 gesimo usque ad annum quintum & trige-
 simum. Si id imbecillitas non sinit, nave
 tamen, sed non longe, vectari commodissi-
 mum est. Sin navigationem aliqua res pro-
 30 hibet, lectica, vel alio modo corpus mo-
 vendum est: tum a negotiis abstinentum
 est, omnibusque rebus, quae solicitare ani-
 mum possunt: somno indulgendum: ca-
 vendae distillationes, ne, si quid cura
 levarit, exasperent; & ob id, vitanda cru-
 ditas,

¹ M. F. P. *movenda urina.* ² P. *corporis habitus.*
 1.5. M. F. P. *frictionibus.* ¹ 7. M. F. om. *ad l. 16.* M. F.
 bis. ¹ 24. M. F. P. *duodecimo.* ¹ 25. M. P. *ignorant usque.*
¹ 27. M. F. P. om. *sed.* ¹ ead. M. F. P. *gepari.* ¹ 28. M.
 P. *Si.* ¹ 29. M. F. P. *corpus dimovendum est.*

¹ Aretaeus de Diuturn. Curar. I. 8. Trallian. VII. 2.
 Plin. N. H. xxviii. 4. ² Aphor. V. 9. VIII. 7.

ditas, simulque & sol, & frigus; os obtengendum, fauces velandae, tussicula suis remediis finienda: &, quamdiu quidem febricula incursat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestivis cibis mendendum: eoque tempore bibenda aqua. Lac¹ quoque, quod in capitib² dolóribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia siti, ac, sive praecordia tument, sive biliosa urina est, sive fanguis fluxit, pro veneno est; in² phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficultibusque febriculis, recte dari potest.

Quod si febris aut nondum incursat, aut jam remisit, decurendum est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes, item lenes fricationes. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, laetula: deinde lenis sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adjecto. Oryza quoque, &, si nihil aliud est, far idem praestat. Tum invicem modo his cibis, modo illis utendum est: adjiciendaque quaedam ex media materia, praecipue vero ex prima, cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet leve austерum.

Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus

l. 1. M. F. P. om. & l. 9. M. F. P. om. ac. l. 15. P. recurrendum. l. 16. M. F. P. frictiones. l. 21. M. F. P. om. de. l. ead. M. P. lenis ut sorbitio. l. 22. M. F. P. adjecto. Idem oryza. l. 23. M. F. P. om. idem. l. 26. praecipueque vel ex vero. l. 27. M. F. P. a pruna.

¹ Aph. V. 64. ² Aph. V. 64.

pus appetet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro carenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque; item sub imis ossibus scapularum, quas *άνωπλάτης* Graeci vocant, sic, ne sanescere finas ulcera, nisi tussis finita fuerit: cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremae partes perfricandae sunt: thorax leni manu pertractandus; post cibum intermittenda hora & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis denis diebus, demittendus aeger in solium est, in quo sit aqua calida & oleum. Caeteris diebus bibenda aqua: tum vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum: si vero est, egelidum. Utile est etiam in remissionibus quotidie cibos dari: frictiones gestationesque similiter adhiberi: quarto, aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel plantaginis succus per se, vel marrubii, si cum melle sit incoctus; ita ut illius cyanthus forbeat, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mixta, & incocta resinae terebinthinae pars dimidia, butyri & mellis pars altera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt vietus, vehiculum, & navis, & sorbitio. Alvis ² cito utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo frequens, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, ad dicere debet exercitationes, fricationes, ci-
bos:

91, 34.

1.5. M. F. P. omotidas. 1.6. M. F. P. ulcera, sinamus. 1.7. M. F. P. tussi. 1. ead. M. F. P. om. fuerit. 1.10. M. F. P. om. sunt. 1. ead. M. F. P. levii. 1.15. M. F. P. tum & vi- num. 1.17. M. F. P. aestas. 1.20. M. F. adhiberi: eadem acris quarto. P. itemque acris. 1.24. M. F. P. marrubium ex melle coctum. 1.32. M. F. P. morbo si frequens. 1. ead. M. F. P. frequens est, perniciosus est. 1.34. M. F. P. frictiones.

¹ Trall. v. 3. p. 476. ² Aph. v. 12, 14. Trall. II. 2. p. 313.

205, 4. bos: deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere a vino, ¹ balneo, venere.

C A P. XXIII.

² De Comitiali morbo.

5

INTER notissimos morbos est etiam is,
qui ³ comitialis, vel major nominatur.
73, 20. Homo subito concidit, ex ore spumae
moventur, deinde interposito tempore ad
se redit, & per seipsum consurgit. Id ge-
nus saepius viros, quam feminas occupat;
ac solet quidem etiam longum esse, usque
ad mortis diem, & vitae non periculosem.
Interdum tamen cum recens est, hominem
consumit; & saepe eum, si remedia non su-
47, 4. stulerunt, in ⁴ pueris veneris, in puellis men-
struorum initium tollit. Modo cum di-
stensione membrorum aut nervorum pro-
labitur aliquis; modo sine illa.

Quidam hos quoque iisdem, quibus le- 20
thargicos, excitare conantur: quod admodum
supervacuum est: &, quia ne lethargi-
cus quidem his sanatur; &, quia, cum possit
ille nunquam expurgisci atque ita fame in-
terire, hic ad se utique revertitur.

25

Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum
distentio accessit, utique ⁵ sanguis mitti de-
bet: si accessit, non utique mittendus est,
nisi alia quoque hortantur. Necessarium
173, 23. autem est, ducere alvum, vel nigro vera-
87, 19. tro purgare, vel utrumque facere, si vires
patiuntur: tunc caput tondere, oleoque &
aceto perungere; cibum post diem ter-
tium

30

I. 5. M. F. P. De comitialis morbi curationibus. I. 19.
P. modo sine illa quiaem. I. 20. P. ignorat quidam.

¹ Colum. I. 6. ² Aræaeus de Diuturn. M. I. I. c.
4. ³ Vocatur: lues deifica, morbus Sacer. ⁴ Aph. II.
45. V. 7. ⁵ Vallgriol. I. III. obs. 7.

tium , simul ac transit hora , qua concidit , dare. Neque sorbitones his aut alioqui molles , & faciles cibi ; neque caro , minimeque suilla convenit ; sed mediae materiae : nam
 5 & viribus opus est , & cruditates cavendae sunt. Cum quibus fugere oportet solem , balneum , ignem , omniaque calefacientia : item , frigus , vinum , venerem , loci praecipitis conspectum , omniumque terrentium ,
 10 vomitum , lassitudinem , sollicitudines , negotia omnia : & , ubi tertio die cibus datus est , intermittere quartum , & invicem alterum quemque ; eadem hora cibi servata , donec quatuordecim dies transeant. Quos
 15 ubi morbus excessit , acuti vim depositus : at si manet , curandus jam ut longus est.

Quod si non , quo die primum is incidit , medicus accessit ; sed is , qui cadere consuevit , post ei traditus est ; protinus eo genere
 20 vietus habito , qui supra comprehensus est , expetandus est dies , quo prolabatur ; utendumque tum vel sanguinis ² missione , vel
 ductione alvi , vel nigro veratro , sicut praeciputum est . In sequentibus deinde diebus ,
 25 per eos cibos , quos proposui , vitatis omnibus , quae cavenda dixi , nutriendus est.

Si per haec morbus finitus non fuerit , confugiendum erit ad album veratrum ; ac
 30 iter quoque aut quater eo utendum , non ita multis interpositis diebus ; sic tamen , ne iterum unquam sumat , nisi conciderit. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendae ; quibusdam , praeter ea , quae supra scripta sunt , adiectis. Ubi mane experrectus

96.

87, 10.

172, 30.

89, 19.

*I. 1. M. F. P. cum. I. ead. M. F. P. transit. I. 2.
 M. F. P. autem bis aliisque. I. 11. M. F. P. om. &
 I. 17. M. F. P. id. I. 19. M. F. P. om. post. I. 26.
 M. F. P. om. est. I. 33. M. F. P. ignorant supra.*

*1 Trallian. I. 15. 2 Cacl. Autelian. Tard. pass. 1.
 4. p. 272.*

tus est , corpus ejus leniter ex oleo vetere (cum capite , excepto ventre) permulceatur : tum ambulatione quam maxime longa & recta utatur : post ambulationem loco tepido vehementer & diu , ac non minus ducenties ; nisi infirmus erit , perfricetur : deinde super caput multa aqua frigida perfundatur ; paulum cibi assumat ; conquiescat ; rursus ante noctem ambulatione utatur ; iterum vehementer perfricetur , sic ut neque venter , neque caput contingatur : post haec coenet , interpositisque tribus aut quatuor diebus , uno aut altero acria assumat :

Si ne per haec quidem fuerit liberatus , 15 caput radatur ; ungatur oleo vetere , adjecto acetо & nitro ; perfundatur aqua salsa ; bibat jejunus ex aqua castoreum ; nulla aqua , nisi decocta , potionis causa utatur . Quidam jugulati ¹ gladiatoris calido sanguine 20 poto tali morbo se liberarunt . Apud quos miserum auxilium tolerabile miseriis malum fecit . Quod ad medicinam vero pertinet , ultimum est , juxta talum , ex utroque crure paulum sanguinis mittere : 25 occipitum incidere , & cucurbitulas admoveare : ferro candente in occipitio quoque & infra , qua summa vertebra cum capite committitur , adurere duobus locis , ut per ea perniciosus humor evadat . Quibus 30 si finitum malum non fuerit , prope est , ut perpetuum sit . Ad levandum id , tantummodo utendum erit exercitatione , cibisque his , qui supra comprehensi sunt : prae- cipue-

I. 1. M. F. P. leviter . I. 7. M. F. P. om. su. I. 16. M. F. radat . I. 21. M. F. P. epoto . I. 23. M. F. P. medicum . I. 33. exercitatione multa , frictione , cibisque his .

¹ Plin. xxviii. 1. Lang. Epist. 14. lib. 1. Minucius Felix . pag. 34. Vide duo exempla ejus noxam indicantia apud Tulpium Obs. I. IV. c. 4.

cipueque vitanda omnia, quae ne fierent,
excepimus.

C A P. XXIV.

De Regio Morbo.

AEQUE notus est morbus, quem interdum arquatum, interdum regium nominant. Quem Hippocrates ait, si post septimum diem ² febricitante aegro supervenit, tutum esse, mollibus tantummodò praecordiis substantibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse; si post hunc febris, occidere. 72, 7.
 10 Cilic autem eum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus, quod album esse debet, sit luteum. Soletque accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & praecordiorum dextra parte durities; &, ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio: at-
 15 que, ubi diutius manet morbus, totum cor-
 20 pus cum pallore quodam inalbescit.

Primo die abstinere aegrum oportet: se-
 cundo ducere alvum: tum, si febris est,
 eam victus genere discutere: si non est,
 25 scammoneam potui dare, vel cum aqua
 betam albam contritam, vel cum aqua
 mulsa nuces amaras, absinthium, anisum,
 sic, ut pars hujus minima sit. Asclepiades
 aquam quoque falsam, & quidem per bi-
 30 duum, purgationis cauta bibere cogebat, iis,
 quae urinam movent, rejectis. Quidam, su-
 perioribus omisis, per haec, & per eos cibos,
 qui extenuant, idem se consequi dicunt.

Ego

l. 4. M. F. P. *De regii morbi curatione.*

¹ Plin. H. N. XXII. 24. ² Aph. IV. 62.

Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia praefero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere Graecum falsum, 5 ut solutio ventris remaneat: tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satietur; omisso Graeco vino bibere nigrum austерum; atque ita per haec variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione, &, si hiems est, 15 balneo: si aestas, frigidis natationibus: lecto etiam, & conclavi ¹ cultiore, usu, loco, ludis, lascivia, aliis, per quae mens exhilaretur: ob quae regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super prae- 20 cordia datum prodest; vel arida ibi fucus imposita, si jecur aut lienis affectus est.

C A P. XXV.

² De Elephantia.

IGNOTUS autem pene in Italia, fre- 25 quentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ἐλεφαντίαν* Graeci vocant; isque longis annumeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitiari dicantur. Summa pars corporis 30 crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inae- quali-

*L. 1. M. F. P. ubique. L. 2. M. P. imbecillia. L. 4. M. F. P. oportere. L. 6. M. F. P. ut resolutio. L. ad. M. F. P. om. re. L. 11. M. F. P. integrum. L. 15. M. F. P. frictione L. ad. M. F. P. om. &. L. 17. M. F. P. clauso loco uti, ludis. L. 18. M. P. om. alis. L. 24. M. F. P. De elephantiae curatione. L. 27. M. F. P. *ἐλεφαντία*. L. 28. M. F. P. om. quo. L. 32. M. F. P. barum.*

¹ Seren. Sammon. de Regio morbo. ² Mercurial. Variar. Lect. I. 2.

qualiter crassa, tenuis, dura, mollisque,
quasi squamis quibusdam exasperatur, cor-
pus emacescit, os, surae, pedes intumes-
cunt. Ubi vetus morbus est, digiti in mani-
bus pedibusque sub tumore conduntur; fe-
brieula oritur, quae facile tot malis obru-
tum hominem consumit.

Protinus ergo inter initia sanguis per
biduum mitti debet; aut nigro veratro
10 venter solvi. Adhibenda triduum, quan-
ta sustinere potest, inedia est: paulum deinde
vires reficiendae & ducenda alvus: post-
haec, ubi corpus levatum est, utendum est
15 exercitatione, praecipueque cursu: sudor
etiam fccis sudationibus evocandus: fri-
cato adhibenda: moderandumque inter
haec, ut vires conserventur: balneum ra-
rum esse debet: cibus sine pinguibus, sine
20 glutinosis, sine inflantibus. Vinum, praeter-
quam primis diebus, recte datur. Corpus
contrita plantago & illita optime tueri vi-
detur.

C A P . XXVI.

De Attonitis.

25

ATTONITOS quoque raro videmus,
quorum & corpus & mens stupet.
Fit interdum iectu fulminis, interdum
morbo. hunc $\delta\pi\pi\lambda\eta\zeta\alpha$ Graeci appelle-
30 lant. His sanguis mittendus est. Vera-
tro quoque albo, vel alvi ductione uten-
sum. Tum adhibendae frictions; & ex
media

84, 34.

I. 10. M. F. P. tum. I. 11. M. F. P. sustineri.
I. 16. M. F. P. frictio. I. 25. M. P. F. adjunt &
corum curatione. I. 29. P. $\delta\pi\pi\lambda\eta\zeta\alpha$ hunc. I. 32. M.
F. P. frictiones.

M

media materia minime pingues cibi; quidam etiam acres: & a vino abstinentum.

C A P. XXVII.

De Resolutione nervorum.

AT resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud ^{λύπη λαγής}; hoc ^{λύγην} nominaverunt. nunc utrumque ^{λύγην} appellari video. Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi. ac si correpti non sunt, diutius quidem vivunt; sed raro tam ad sanitatem pervenient; & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria ¹⁵ quoque amissa. In partibus vero nonnunquam acutus, saepe longus, fere ² + insanabilis morbus est.

³ Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit ²⁰ 78, 34. vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit; saepe mortem tantum differt; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit & motus & mens, nihil spei supereft: si redit, sanitas ²⁵ quoque prospicitur.

At, ubi pars resoluta est, pro vi & malo corporis, vel sanguis mittendus est, vel alvus ducenda. Caetera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem vitare praecipue convenit frigus; paulatimque ad exercitationes revertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crux ³⁰ 76, 1. 2.

I. 4. M. F. P. addunt quae λύπη λαγής vel πνεύματα dicuntur. I. 12. M. P. corratti. I. 16. M. F. P. om. non. I. 17. M. F. P. om. in. I. 25. M. F. redit. I. 27. M. F. providet. P. proderit. I. 28. P. M. F. missus. I. 29. M. F. P. dueta.

¹ Cael. Aurel. Acur. Morb. III. ² Aretaeus de Morb. Diuturn. I. 7. ³ De praeervatione Crato apud Schol. consilio 35. 36.

rum imbecillitas prohibet, vel gestetur, 91, 121
 vel motu lecti concutatur: tum id mem-
 brum, quod deficit, si potest, per se; sin mi-
 nus, per alium moveatur, & vi quadam ad
 5 consuetudinem suam redeat. Prodest etiam
 torpentis membra summa cutedi exasper-
 rasse, vel urticis caesam, vel imposito sina-
 pi; sic, ut ubi rubore coepit corpus: haec
 removeantur. Scilla quoque contrita, bul-
 10 bique contriti cum thure recte imponun-
 tur. Neque alienum est, resina cutedi ter-
 tio quoque die diurius vellere, pluribus
 etiam locis, aliquando sine ferro, cucurbi-
 tulas admovere. Unctioni vero aptissimum
 15 est vetus oleum, vel nitrum acetō & oleo
 admixtum. Quinetiam fovere aqua calida
 marina, vel, si ea non est, tamen falsa, mag-
 nopere necessarium est. Ac, si quo loco
 vel naturales, vel etiam manufactae tales
 20 natationes sunt, iis potissimum utendum
 est; praecipueque in his agitanda membra,
 quae maxime deficiunt. si id non est, bal-
 neum tamen prodest. Cibus esse debet ex
 media materia, maximeque ex venatione:
 25 potio, sine vino, aquae calidæ. Si tamen
 vetus morbus est, interponi quarto vel
 quinto die purgationis causa vinum Grae-
 cum falsum potest. Post coenam utilis vo-
 mitus est.

30 2. *De Dolore nervorum.*

Interdum vero etiam nervorum dolor
 oriri solet. In hoc casu non vomere, non
 medicamentis urinam movere, non exerci-
 tatione sudores, ut quidam praecipiunt, ex-
 pedit.

I. 3. M. F. P. deficit. I. ead. M. F. P. si. I. 6. torpentibus
 membris. Caesar, in marg. ita habet Parisi. I. 16. M. F. P.
 om. ad. I. 18. M. F. P. At. I. 28. M. F. P. prodest. I. 30.
 a M. F. P. absunt haec *De dolore nervorum.* I. 32. M. F. P.
 non oportet vomere. I. 33. M. F. P. non sine exercitatione.

5
pedit. Bibenda aqua est bis die. + In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est; deinde, retento spiritu, in ipsa exercitatione potius superiores partes movendae: balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus coelum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est, deinde involvenda, & subjicenda pruna lenis, & sulphur; atque ita id suffumigandum; idque aliquandiu facientem, sed jejuno, cum bene jam concoixerit. Cucurbitulae quoque saepe dolenti parti admovendae sunt, pulsandusque leniter inflatis vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam sevum miscere cum cumini & urticae contritis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, idque imponere: fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum. Atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione vehementer est. quod in aliis doloribus pestimum est.

3. De Tremore nervorum.

Tremor autem nervorum aequo vomitu 25 medicamentisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam habet balnea, assaque sudationes. Bibenda aqua est: acri ambulatione utendum, item unctionibus, fricationibusque, maxime per seipsum: pila, similibusque superiores partes + dimovendae: cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur. Secundum cibum, curis abstinentendum: rarissima venere uten-

I. 3. M. F. P. ab. I. 13. M. F. P. leviter. I. 15. M. F. P. cum hysciam. I. 24. M. F. P. ignorant De Tremore nervorum. I. 30. M. F. P. frictionibusque.

utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perficari manibus puerilibus potius, quam virilibus, debet.

5 4. *De Suppurationibus internis.*

† Suppurationes autem, quae in aliqua interiori parte oriuntur, ubi ortae fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasma, quae reprimunt, ne coitus inutilis 10 materiae fiat. deinde, si haec vieta sunt, ut per ea malagmata, quae digerunt, dissipetur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evocetur: deinde, ut maturescat. omnis tum vomicae finis est, ut rumpatur. 15 Indicumque est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quominus, quicquid est puris, exeat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Ubi pus ferri desit, transeundum ad faciles 20 quidem, sed tamen validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoque cum melle quaedam edenda, ut nuclei pinei, vel Graeciae nuces, vel avellanae. Postea submovendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus vel porri vel marrubii, & omni cibo porrumb ipsum adjectum. Oportebit autem uti in his partibus, quae non 25 afficiuntur, frictionibus, item ambulacionibus lenibus. Vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione fanectionis ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo vendus fanguinis vomitus est.

LI-

I. 2. M. F. P. leviter. I. 5. M. F. P. om. *De suppurationibus internis.* I. 7. M. F. P. notae. I. 10. M. F. om. ut. I. 11. P. dissipentur. I. 14. P. tunc. I. 17. M. F. P. excedat. I. 30. M. P. afficiuntur. I. ead. M. . P. frictionibusque.

M 3