

vero ex toto convaluerit , periculose vtae
genus subito mutabit , & inordinate ager.
Paulatim ergo debebit , omisiss his legibus ,
eo transire , ut arbitrio suo vivat. †

5 LIBER QUINTUS.

P R A E F A T I O .

Dixi de his malis corporis , qui-
bus vietus ratio maxime sub- 3, 29.
venit. nunc transeundum est ad
eam medicinae partem , quae
magis medicamentis pugnat.
His multum antiqui auctores tribuerunt , &
Erasistratus , & hi qui se *inventi* nominaverunt ; praecipue tamen † Herophilus , deduc-
15 tique ab illo viri ; adeo ut nullum morbi ge-
nus sine his curarent. Multaque etiam de
facultatibus medicamentorum memoriae
prodiderunt , qualia sunt vel Zenonis , vel
Andreae , vel Apollonii , qui Mus cognomi-
20 natus est. Horum autem usum ex magna
parte Asclepiades non sine causa sustulit ; & 29, 7.
cum omnia fere medicamenta stomachum 85, 7.
laedant , malique succi sint , ad ipsius vietus 84, 25.
rationem potius omnem curam suam trans-
tulit. Verum , ut illud in plerisque mor-
bis utilius est , sic multa admodum corpori-
bus nostris incidere consuerunt , quae sine
medicamentis ad sanitatem pervenire non
possunt. Id ante omnia scire convenit ,
30 quod omnes medicinae partes ita connexae
sunt , ut ex toto separari non possint : sed ab
eo

I. 5. M. F. P. praeponit *Corn. Cel. de Medicina. I.*
6. a. M. F. P. abest *Praefatio. I. 13. F. ii. l. 29. F.*
M. P. illud. I. 30. M. F. P. innexae,

I. Scribon. Larg. c. 68.

eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quae vietu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quae praeципue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem vietus debet; quae multum admotum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac saepe simplicia opitulentur, saepe mixta; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & misturas eorum: quo minor ipsam curationem exsequentibus mora sit.

C A P. I.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta sunt: 15
& primo de bis, quae Sanguinem suppressimunt.

SANGUINEM suppressimunt, atramentum sutorium, quod Graeci *χάλκωθος* appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua ly-
 cium, thus, aloë, gummi, plumbum com-
 bustum, porrum, herba fanguinalis, creta
 vel cimolia vel figuralis, misy, frigida aqua,
 vinum, acetum, alum, melinum, squa-
 ma & ferri & aeris; atque hujus quoque 23
 duae species sunt, alia tantum aeris, alia ru-
 bri aeris.

C A P. II.

Quae vulnus glutinent.

GLUTINANT vulnus, myrra, thus, 30
 gummi, praecipueque acanthinum,
 psyllium, tragacantha, cardamomum;
 bul-

I. 3. M. F. P. &c. l. 11. M. F. P. ipsius. I. ead. M. F. P. curationis. l. 15. M. F. P. sunt. l. 25. Et utriusque ferri legendum dicit Rubeus, p. 193. l. 29. M. F. glutinant.

bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusae cum testis suis cochleae, mel coccum, spongia vel ex aqua frigida, vel ex ^{293, 20.} vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana succida, si levis plaga est; etiam aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod ^{293, 20.} vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, aerugo, chalcitis, atramentum futorium.

C A P. III.

Quae concoquunt, & moveant pus.

CONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sevum, adeps, oleum.

C A P. IV.

Quae aperiant vulnera. ²

VULNERA aperiunt tanquam ora in corporibus, quod ^{ἀναστούσι} Graece dicitur, cinnamomum, balsamum, panaces, juncus quadratus, pusegium, flos albae violae, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetustus, piper, pyrethrum, chamaepitys, uva tamnia, sulphur, alumen, rutae semen.

C A P. V.

Quae purgent.

PURGANT, aerugo, auripigmentum, quod ^{ἀποειρίκων} a Graecis nominatur (huic autem

¹ l. 7. M. F. P. om. reprimunt. ² l. 12. M. F. concoquunt. ³ l. ead. M. F. movent. ⁴ l. 19. M. F. aperiunt. ⁵ l. 21. M. F. P. ^{ἀναστούσι}. ⁶ l. 26. F. chamaepitys. ⁷ l. 29. M. F. purgant.

¹ Petron. Sat. c. 58. ² Oribas. Synops. II. 42. 47.

tem & sandarachae in omnia eadem vis;
sed validius est) squama aeris , pumex , iris,
balsamum , styrax , thus , thuris cortex , re-
fina , & pinea , & terebinthina liquida , oenan-
the , lacerti sterlus , sanguis columbae , & 5
palumbi , & hirundinis , ammoniacum ,
bdellium (quod in omnia idem , quod am-
moniacum , potest ; sed hoc valentius est)
abrotonum , ficus arida , coccus gnidium ,
scobis eboris , omphacium , radicula , coa-
gulum , sed maxime leporinum (cui eadem ,
quaes caeteris coagulis , facultas , sed utique
validior est) fel taurinum , vitellus crudus ,
cornu cervinum , gluten , mel crudum , misy ,
chalcitis , crocum , uva taminia , spuma 15
argenti , galla , squama aeris , lapis haema-
tites , minium , costum , sulphur , pix cruda ,
sevum , adeps , oleum , ruta , porrum , lenti-
cula , ervum .

C A P. VI.

20

Quae rodant.

RODUNT , alumen liquidum , sed magis
rotundum , aerugo , chalcitis , misy ,
squama aeris ; sed magis rubri , aes com-
bustum , sandaracha , minium finopi-
cum , casia , balsamum , myrrha , thuris cor-
tex , galbanum , resina , terebinthina liquida ,
piper utrumque , sed rotundum magis , car-
damomum , auripigmentum , calx , nitrum ,
& spuma ejus , apii semen , narcissi radix , 30
omphacium , alcyonium , oleum ex amaris
nucibus , allium , mel crudum , vinum , len-
tiscus , squama ferri , fel taurinum , scam-
monea ,

I. 2. M. F. P. validior. I. 4. F. oenanche. I. 8. M. F. P.
om. hoc. I. 12. F. M. P. ubique. I. 13. M. F. P. om. tau-
rinum. Post gluten inferunt taurinum M. P. I. 14. M.
F. misyos. P. misyos. I. 15. M. F. timinia. I. ead. M. P.
abrotonum. I. 21. F. rodunt. I. 26. M. F. P. galla-
I. 27. M. P. humida. I. 31. M. omphacum.

x Casaubonus ad Capitolin. in Verum , pag. 436.

monea, uva taminia, cinnamomum, styrax,
ruthae semen, resina, narcissi semen, sal, nu-
ces amarae, ut oleum earum, atramentum
sutorium, chrysocolla, concharum cinis.

5

C A P. VII.

Quae exedant corpus.

EXEDUNT corpus, acaciae succus, hebe-
nus, aerugo, squama aeris, chrysocolla,
cinis Cyprus, nitrum, cadmia, spuma
10 argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripig-
mentum, sulphur, eruca, sandaracha, sa-
lamandra, alcyonium, aeris flos, chalcitis,
atramentum sutorium, ochra, calx, acetum,
galla, alum, lac caprifici, vel lactucae
15 marinae, quae *τιθυανθος* a Graecis nomina-
tur, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula,
mel, oleae folia, marrubium, lapis haema-
tites, & Phrygius, & Asius, & scissilis,
misy, vinum, acetum.

20

C A P. VIII.

Quae adurant. ⁊

ADURUNT, auripigmentum, atramen-
tum sutorium, chalcitis, misy, aeru-
go, calx, charta combusta, sal, squa-
ma aeris, fex combusta, myrra, stercus &
25 lacerti, & columbae, & palumbi, & hirun-
dinis, piper, coccus gnidium, allium, di-
phryges, lac utrumque (quod proximo ca-
pite supra comprehensum est) veratrum &
30 album & nigrum, cantharides, corallium,
pyrethrum, thus, salamandra, eruca, san-
daracha, uva taminia, chrysocolla, ochra,
alu-

*I. 1. M. F. timinia. I. 2. M. F. P. cicutae. I. ead. M.
F. P. fel. I. 3. M. F. P. oleumque. I. 4. M. P. veratrum.
I. 6. M. F. exedunt. I. 11. M. F. P. cicuta. I. 16. F. M.
P. nominatur, alcyonium fel. I. 18. M. F. Tafius. I. 21.
M. F. adurunt. I. 32. M. F. timinia.*

⁊ Plin. H. N. XXXVI. 19. ⁊ Oribas. Synops. II. 48.

Q 3

246 A. CORN. CELSI Lib. v.
alumen scissile, ovillum stercus, oenanthe.

C A P. IX.

Quae crustas ulceribus inducant.

EADEM fere crustas ulceribus tanquam igne adustis inducunt, sed praecipue chalcitis, utique si cocta est, flos aeris, aerugo, auripigmentum, misy, & id quoque magis coctum.

C A P. X.

Quae crustas ulceribus resolvant.

10

CRUSTAS vero has resolvit, farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adjectum est.

C A P. XI.

Quae discutiant ea, quae in aliqua parte corporis coierunt.

15

AD discutienda vero ea, quae in cor-
poris parte aliqua coierunt, ma-
xime possunt, abrotонum, helenium,
amaracus, alba viola, mel, lilium, 20
fansucus, cyperus, lac, fertula campana,
serpyllum, cypressus, cedrus, iris, viola
purpurea, narcissus, rosa, crocum, prasium,
juncus quadratus, nardum, cinnamomum,
casia, ammoniacum, cera, resina, uva ta-
minia, spuma argenti, styrax, ficus arida,
tragoriganus, lini & narcissi semen, bitu-
men, + fordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut
molaris, crudus vitellus, amarae nuces,
sulphur. 25

30

*L. 3. M. F. inducunt. L. 10. M. quo. L ead. M. F. re-
solvunt. L. 18. F. coērunt. L. 21. M. F. P. cyprius. L.
23. M. F. P. paſſum. L. 25. M. F. timinia.*

C A P.

C A P. XII.

Quae evocant, & educant

EVOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omniphasium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, sterlus columbae, pumex, farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccae, nitrum, sal.

10

C A P. XIII.

Quae exasperata laevent.

LAEVANT id, quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

15

C A P. XIV.

Quae carnem nutrit, & ulcus impletant.

CARNEM alunt, & ulcus impletant, resina pinea, ochra Attice, mel, asteriace, cera, butyrum.

20

C A P. XV.

Quae molliant.

MOLLIUNT, aes combustum, terra Eretria, nitrum, papaveris lachryma, ammoniacum, bdellium, cera, sevum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula Campana, narcissi & radix & semen, rosae folia, coagulum, vitellus crudus, amarae nubes, medulla omnis, stimmi, pix, cochlea cocta, cinctae semen, plumbi re-
30 trimentum, *οὐαρίας μολύβδος* Graeci vo-
cant,

267, 17.

I. 2. M. F. evocant. I. ead. M. F. educunt. I. 12. F. M. P. laevat. I. 16. M. F. nutritant. I. ead. M. F. implet. I. 17. M. F. P. alit. I. ead. M. F. P. implet. I. 18. M. F. Aeticae, vel, asterace. I. 21. M. F. molliant. I. 28. M. F. flebis. P. fibi. I. 29. M. F. P. recrementum.

I Gorraeus Defin. Medic. V. ὥχεια.

Q 4

cant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, uva taminia, styrax, iris, balsamum, fordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

C A P. XIV.

Quae cutem purgent.

5

CUTEM purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel aerugine.

C A P. XVII.

10

De misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum.

EXPOSITIS simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quaeque ex his fiant. Miscentur autem varie, neque hujus ullus modus est, cum ex similibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt; quae comprehendi si possent, tamen esset supervacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quae vel desiderari in prioribus potuerunt; vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam sic, ut tandem, quae magis communia sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis commo-

I. 1. M. F. panacis. I. 2. M. F. timinia, I. 5. M. F. purgant. I. 6. M. item. I. 12. M. F. P. addunt & quid malagma & emplastrum & pastillæ inter se differant. I. 15. M. F. P. om. que. I. 17. M. F. P. parvis. I. ead. M. P. paucis accommodata.

modata sunt, in ipsorum locum differam.

Sed & ante sciri volo, [†] in uncia pondus denariorum septem esse. Unius deinde denarii pondus dividi a me in sex partes, id est sextantes, ¹ ut idem in sextante denarii habeam, quod Graeci habent in eo, quem ¹⁶⁰ ~~εσολα~~ ² appellant. Is ad nostra pondera ³ relatus paulo plus dimidio scrupulo facit.

¹⁰ 2. Quid ⁴ Malagma, & Emplastrum, &
Pastillus inter se differant.

Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos ^{τροχίνες} Graeci vocant, cum plurima eadem habeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque ¹⁵ etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integrum cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt; ne laedant vulnera, cum imposita fiunt. Inter emplastrum autem & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo ²⁰ humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. Arida medicamenta per se teruntur: deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alias non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. ²⁵ Ea vero, quae liquari possunt, ad ignem simul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quae separatim fieri debuerunt, in

I. 2. M. F. P. antea. I. 5. M. F. P. sexuncias. I. ead. M. F. P. sexuncia. I. 7. M. F. P. id. I. 7. M. F. P. relatum. I. 9. M. F. P. ignorant Quid malagma, & emplastrum, & pastillus inter se differant. I. 14. M. F. odoribus.

1 Rhod. de Ponderib. p. 24. 2 Rhod. de Ponderib. p. 27. 3 Rhod. de Ponder. p. 24. 4 Reines. Variar. Lect. II. §. 189.

in unum omnia miscentur. At pastilli haec ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui, ut vino vel acetō, coguntur, & rursus coacta, inarescunt: atque, ubi utendum est, ejusdem generis humore diluantur. Tum emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori, † aut cerato misceatur.

C A P. XVIII.

De Malagmatis. 10

1. *Malagma adversus calidas podagras.*

His cognitis, primum malagmata subjiciam; quae fere non sunt refrigerandae; sed calefaciendi causa reperta. Est tamen, quod refrigerare potest; ad calidas podagras aptum. Habet gallae & immaturae & alterius, coriandri seminis, cicutae, lachrymae aridae, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati cloti, quod *πιπλαντίον* Graeci vocant, felibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quaedam digerunt materiam, quaedam extrahunt, quae *επιπλαντία* vocantur: pleraque certis partibus membrorum accommodata sunt.

2. *Malagma ad materiam extrahendam.* 25

Si materia extrahenda est, ut in hydropeo, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque medocri, aptum est id, quod habet resinae aridae, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum p.*. cerae p.*. Aut in quo haec sunt: aeruginis rasae, thuris, singulorum p. 11.*. ammoniaci

I. 3. M. F. P. aut. I. ead. M. F. coquuntur. I. 4. M. F. P. P. cocta. I. 11. M. F. P. adversum. I. 15. M. F. P. possit. I. 23. M. F. P. certis magis partibus. I. 31. M. F. pond. I. ead. M. F. cerae pendo.

AEgineta VII. 18. Oribas. Synopf. III.

moniaci salis p. vi. * squamae aeris, cerae,
singulorum p. viii. * resinae aridae. p. xii. *.
aceti cyathus. Idem praefstat cumini farina
cum struthio, & melle p. ii. *.

5. 3. *Malagma ad jecur dolens.*

Si jecur dolet, id in quo est balsami la-
chrymae p. xii. *. costi, cinnamomi, cassiae,
corticis, myrrae, croci, junci rotundi. bal-
sami semenis, iridis illyricae, cardamomi,
10 momi, nardi, singulorum. p. xvi. *. Qui-
bus adjicitur nardinum unguentum, do-
nec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem
recentis usus est: si vero servandum est, re-
15 finae terebinthinae p. xvi. *. cerae p. x. *. ex
vino leni contunduntur, & cum eo miscen-
tur.

4. *Malagma ad liensem.*

At, si lienis torquet, glandis, quam *μυρο-* 216, 15.
εάνων Graeci vocant, cortex & nitrum pa-
20 ribus portionibus contunduntur, resper-
gunturque acetо quam acerrimo: ubi cerati
crassitudinem habet, linteо, ante in aqua
frigida madefacto, inlinitur, & sic imponi-
nitur, supraque farina ordeacea injicitur:
25 sed manere ibi non amplius sex horis debet,
ne liensem consumat: satiusque est id bis, aut
ter fieri.

5. *Malagma commune pluribus.*

Commune autem & jocinori, & lieni, &
30 abscessibus, & strumae, parotidibus, arti-
culis, calcibus quoque suppurantibus, aut
aliter dolentibus, etiam concoctioni ven-
tris, Lysias composuit ex his: opopanacis,
galbani, resinae, singulorum p. ii. *. am-
monia-

I. 7. M. P. cassiae. I. 11. M. F. nardium. I. 15. M. F.
P. ignorant & cum eo miscentur. *I. 18. M. F. P. om.*
μυροβάλανον. *I. 22. M. F. P. antea. I. 23. M. P. illinitur.*
I. 28. M. F. P. om. malagma commune pluribus. I. 29.
M. F. P. communem. *I. 33. M. F. P. byssopi. I. ead. M.*
F. P. opopanacis, *styracis galbani.*

252 A. CORN. CELSI Lib. v.
moniaci, bdellii, cerae, sevi taurini, iridis
aridae p. 1111.*. cachryos acetabulo, piperis
grani¹ quadraginta. quae contrita irino un-
guento temperantur.

6. *Malagma ad laterum dolorem.*

Ad laterum autem dolores compositio
est² Apolophanis: in qua sunt resinae te-
rebinthinae, thuris fuliginis, singulorum
p. iv.*. bdellii, ammoniaci, iridis: sevi aut
vitulini, aut caprini a renibus, visci, sin-
gulorum p. iv.*. Haec autem omnem dolo-
rem levat, dura emollit, mediocriter calefacit.

7. *Ad idem Andreae.*

Ad idem valet Andreae quoque malagma,
quod etiam resolvit, humorem educit,
pus maturat, ubi id maturum est, cutem
rumpit, & ad cicatricem perducit. Prodest
impositum minutis majoribusque abscessi-
bus: item articulis, & coxis, & pedibus
dolentibus: item, si quid in corpore colli-
sum est, reficit: praecordia quoque dura &
inflata emollit: ossa extrahit: ad omnia de-
nique valet, quae adjuvare calor potest. Id
habet cerae p. xi.*. visci, sycamini, quam
alias sycomorum vocant, lachrymae, sin-
gulorum p. i.*. piperis & rotundi, & lon-
gi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, iri-
dis Illyricae, cardamomi, xylobalsami,
thuris masculi, myrrae, resinae aridae, sin-
gulorum p. x.*. pyrethri, cocci gnidii,
spumae nitri, salis ammoniaci, radicis ari-
stolochiae Creticae, cucumeris agrestis ra-
dicis, resinae terebinthinae liquidae, singu-
lorum

1. 2. M. F. P. *cachrios*. I. 5. M. F. P. *dolores*. I. 9. M. F. P.
om. aut. I. 10. M. F. P. *siccii*. I. 11. M. F. P. *eadem*. I. 12.
F. P. *levant*. I. ead. M. F. P. *emolliunt*. I. ead. M. F. P. *fa-*
ciant. I. 13. M. F. P. om. *Ad idem Andreae*. I. 14. M. F. P.
latus. I. ead. M. F. P. *malagma*, est quod, I. 19. M. F. P. *ar-*
ticulis, ideoque &c. I. 24. M. F. om. *. I. 26. M. F. P. XI.
I. 31. M. P. *aristolochiae Creticae radicis*. I. 32. M. F. P.
radicis ex cucumere agresti resinae.

1 Rhod. de Pond. p. 26. 2 Orib. Syn. III. C. Aur. A.M.
II. 24. dicitur *Polyarchion* Marc. de M. c.xx. E.g. vii. 18.

lorum p. xx.*. quibus adjicitur unguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

8. *Malagma ad resolvenda, quae adstricta sunt; & mollienda, quae dura sunt;*
& digerenda, quae coēunt.

Praecipuum vero est ad resolvenda, quae adstricta sunt, mollienda, quae dura sunt, digerenda, quae coēunt, id, quod ad Polychrum auctorem refertur. Habet junci quadrati, cardamomi, thuris fuliginis, amomi, cerae, resinae liquidae, pares portiones.

9. *Aliud malagma ad eadem.*

15 Aliud ad eadem Nilei: crocomagmatis, quod quasi recrementum ejus est, p. iv.*. ammoniaci thymiamatis, cerae, singulorum p. xxx.*. ex quibus duo priora ex acetato teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum 20 omnia junguntur.

10. *Malagma Moschi ad molliendum.*

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis p. iii.*. cerae, ammoniaci 25 thymiamatis trientes¹, picis aridae p. ii.*. aceti heminas tres.

11. *Malagma Medi ad digerenda, quae coēunt.*

Fertur etiam ad digerenda, quae coēunt, + sub auctore Medo: quod habet cerae p. iii.*. panacis p. *. semis, squamae aeris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum p. i.*. plumbi combusti p. i.*. & semis.

12. *Malagma Panthemi ad eadem.*

Ad eadem Panthemus utebatur, calcis.
 p. *.

L. 15. M. croci malgmati. P. crocimagnati. L. 17. F. om. thymiamatis. L. 18. M. F. P. XX. L. 24. M. F. 2. L. 25. M. F. om. *. P. iii. *. L. 29. M. F. 2. L. 30. M. F. om. *. L. 31. M. F. om. *. L. 32. M. F. om. *

¹ Rhodius de Ponderib. p. 12.

p. *. semis, sinapis contriti, item foeni græci, aluminis, singulorum p. I. *. sevi bibuli p. II. *. & semis.

13. *Malagma ad strumas.*

Ad strumam multa malagmata invenio. 5
Credo autem, quo pejus id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quae in personis varie respondeunt. Andreas auctor est, ut haec misceantur: urticae seminis p. I. *. piperis rotundi, 10 bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinæ aridae, singulorum p. IV. *. resinæ liquidae, cerae, pyrethri, piperis longi: lactucae marinae seminis, sulphuris ignem non experti, quod $\alpha\pi\omega\gamma$ vocatur, pares 15 portiones.

14. *Aliud Miconis ad idem.*

Hoc autem Miconis: est: fecis aridae, aceti, spumae nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cucumeris sylvestris, resinæ, singulorum p. IV. *. Quae ex leni vino contunduntur. 20

15. *Aliud Malagma ad idem valens.*

Expeditus ad idem fit, quod habet visci, felini steroris, resinæ, sulphuris ignem 25 non experti pates portiones. Et in quo est sulphuris p. I. *. lapidis, quem pyriten vocant, p. IV. *. cumini & acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una, sulphuris duae partes, resinæ terebinthinae partes tres. 30

16. *Malagma ad strumam, & phymata.*

Arabis autem cujuſdam est ad strumam, & orientia tubercula, quae $\phi\mu\alpha\tau\alpha$ vocantur, quod haec digerit. Habet myrrhae, salis amonia-

I. 1. M. F. om. *. I. 2. M. F. om. *. I. 3. M. F. P. om.
II. *. I. 5. M. F. P. om. pates portiones. I. 20. M. F. P.
radicis ex cucumere sylvestri. I. 21. M. F. P. VIII. I. 23.
M. om. ad idem. I. 25. M. F. semen.

¹ Plin. H. N. XX. 23. *Mictionis*, ubi alii *Myconis*, meminit. ² I. Rhodius de Ponderib. p. 34.

moniaci, thuris, resinae & liquidae & aridae,
crocimagnatis, cerae, singulorum p. I. *.
lapidis ejus, quem πυετην vocant, p. IV. *.
quibus quidam adjiciunt sulphuris p. II. *.

5 17. *Malagma ad strumam, & tubera, &*
καρκινωδη.

Est etiam proficiens in struma; & in his
tuberibus, quae difficulter concoquuntur;
& in his, quae καρκινωδη vocantur, quod ex
10 his constat: sulphuris p. II. *. nitri p. IV.
. *. myrrae p. VI. *. fuliginis thuris p. *. se-
mis, falso ammoniaci p. III. *. cerae p. I. *.

18. *Malagma Protarchi ad parotidas,*
& favum, & mala ulcera.

15 Protarchus autem ad παροτίδας atque tu-
bercula, quae μελιπέδες, id est favi, vel
φύματα nominantur, item mala ulcera, pu-
micias, resinae pineae liquidae, thuris fuligi-
nis, spumae nitri, iridis, singulorum p.
20 VIII. *. cum cerae p. IX. *. miscebat, hisque
olei cyathum & dimidium adjiciebat.

19. *Malagma adversus panum, &*
phymata.

At adversus panum, tum primum orien-
25 tem quod φύγεθλον Graeci vocant, & omne
tuberculum, quod φύμα nominatur, mis-
cebat ochra, quae Attice nominatur, cum
duabus partibus similae, hisque, dum con-
tunduntur, subinde mel instillatur, donec
30 malagmatica crassitudo sit.

247, 25.

20. *Malagma adversus phymata.*

Discutit etiam omne tuberculum, quod
φύμα vocatur, id, quod habet calcis, sru-
miae nitri, piperis rotundi, singulorum p.
I. *.

I. 2. M. F. crocimagnatis. I. 4. M. F. om. *. I. 6. M. P.
καρκινωδης. I. 12. M. F. 2. I. ead. M. F. om. *. I. 15.
M. F. P. eaque. I. 16. M. F. P. μελιμηρωδης. I. 25. M. F.
Φύγεθλον. I. 28. M. F. P. om. dum. I. 29. M. F. P.
contunditur.

I. *. galbani p. II. *. salis p. IV. *. quae excipiuntur cerato ex rosa facto.

21. *Malagma ad suppressendum omne, quod abscedit.*

Supprimit quoque omne, quod abscedit, id, in quo est galbani, fabae fressae, singulorum p. I. *. myrrae, thuris, corticis ex radice capparis, singulorum p. IV. *. Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adjecto.

22. *Malagma ad sanguinem suppressendum.*

At, si plus satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinae & aridae & liquidae pineae: item ex lentisci, thuris, iridis, singulorum p. II. *.

23. *Malagma ad carcinomata & phymata lenienda.*

Carcinomata vero & phymata commode his leniuntur: galbani, vilci, ammoniaci, resinae terebinthinae singulorum p. I. *. sevi taurini p. *. semis, fecis combustae quam maxima portione, dum id siccius non faciat, quam esse malagma oportet.

24. *Malagma ad faciem contumam ejusque livorem.*

Quod si facie contusa livor subcruentus est, haec compositio nocte & die imposita tollit. Aristolochiae, thapsiae, singulorum p. II. *. bdellii, styracis, ammoniaci thymiamatis, galbani, resinae aridae, & ex lentisco liquidae, thuris masculi, iridis Illyricae, cereae, singulorum p. IV. *. Eadem faba quoque imposita proficit.

25.

*I. 4. M. F. P. que. I. 6. M. F. ex radice capparis, cornicis. I. 12. M. F. P. suppressendum & phymata. I. 13. M. F. P. om. plus. I. 19. M. F. P. carcinodas. I. 21. M. F. P. carcinodae. I. 23. M. F. P. in singulis. I. ead. M. F. om. *. I. 27. M. F. P. ad livorem faciei contumae.*

25. *Malagmata ad aperiendum.*

Sunt etiam quaedam malagmata , quae
ἀνασφυτικὰ Graeci vocant , quoniam ape-
 riendi vim habent. Quale est , quod ex his
 5 constat : piperis longi , spumae nitri , singu-
 lorum p. II. *. erysimi p. IV. *. quae cum
 melle miscentur. Idoneaque etiam strumae
 aperienda sunt. Ejus generis , vehemen-
 tiusque ex his est , quod habet calcis p. IV. *.
 10 piperis grana sex , nitri , cerae , singulorum 282.
 p. X. *. mellis p. III. *. olei heminam.

26. *Miconis Malagma , ad resolvendum
 aperiendumque ac purgandum.*

Miconis quoque est , quod resolvit , ape-
 rit , purgat. Habet alcyonium , sulphur ,
 15 nitrum , pumicem , pari pondere ; quibus
 tantum picis , & cerae adjicitur , ut fiat ce-
 rati crassitudo.

27. *Malagma ad ossa & nervos.*

20 Ad ossa autem Aristogenis , fit ex his :
 sulphuris p. I. *. resinæ terebinthinae , nitri
 spumae , & ex scilla partis interioris , plum-
 bi eloti , singulorum p. II. *. thuris fuliginis
 25 p. VIII. *. ficus aridae quam pinguissimæ ,
 levi taurini , singulorum p. VIII. *. cerae
 p. XII. *. iridis Macedonicae p. VI. *. fesami
 fricti acetabulum. maximeque nervis & ar-
 ticulis malagma hoc convenit.

28. *Malagma Euthyclei ad articulos , &
 ad omnem dolorem.*

Euthyclei quod est , & ad articulos , & ad
 omnem dolorem , & ad vesicae , & ad recenti
 cicatrice contractos articulos , quas *ἄγκλας*
 Graeci nominant , conveniens , habet fu-
 ligi-

I. 1. M. F. P. stomachica. I. 3. M. F. P. stomachica. I. 9.
 M. P. est , id quod. I. 11. M. F. 2. I. 12. M. Niconis.
 I. 14. M. Niconis. I. 16. M. F. P. paribus portionibus.
 I. 26. M. F. P. xi. I. ead. M. Macedonia. I. 28. M. F.
 P. om. hoc. I. 31. M. F. P. igitur Euthyclei. I. ead. M.
 F. Pom. quod. I. 34. M. F. P. om. conveniens. I. ead.
 M. F. P. conveniens quod habet.

liginis thuriacetabulum, resinae tantundem, galbani sine furculis fescunciam, ammoniaci, bædelli, singulorum p. *. cerae p. *. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. xiv. *. resinae liquidae p. vi. *. cerae p. xvi. *.

29. *Malagma Sosagorae ad dolores articulorum.*

Ad dolores articulorum Sosagorae: plumbi combusti, papaveris lachrymae, corticis 10 hyoscyami, styracis, peucedani, sevi, resinae, cerae par pondus.

30. *Chrysippi Malagma, ad idem valens.*

Est & Chrysippi: resinae liquidae, sandarachae, piperis, singulorum p. xii. *. quibus cerae paululum adjicitur.

31. *Ctesiphontis Malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.*

Ctesiphontis: cerae Creticae, resinae terebinthinae, nitri quam ruberrimi, singulorum p. *. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, & cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Prodest vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum.

32. *Malagma ad articulos.*

Ad articulos, fici quoque aridae partem nepetae mistam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit.

33. *Malagma Aristonis, adverfus podagras*

& recentia phymata, & omnes dolores.

Eadem podagrae praesidio sunt. Sed ad eam

*I. 3. M. F. 2. P. 111x. I. ead. M. F. om. *. I. 12. M. F. P. pares portiones. I. 14. M. F. P. om. est & I. 16. M. P. paulum. I. 17. M. Ctesiphontis. I. 19. M. Ctesiphontis. I. 21. M. F. om. *. I. 24. M. P. forteff. I. 29. M. F. P. aridi. I. 30. M. F. timiniam. I. 34. M. F. praesidia.*

eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, cassiae, chamaelcontis, junci rotundi, singulorum p. viii. *. fevi caprini ex irino liquati p. xx, *. iridis p. i. 5 *. quae in aceto quam acerrimo jacere per xx. dies debet. Idem autem etiam recentia phymata doloresque omnes discutit.

34. *Theoxeni Malagma ad pedum dolores.*

At Theoxenus ad pedum dolores, fevi 10 a renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superinjiciebat ammoniacum thymiam in aceto liquatum.

35. *Numenii Malagma ad podagrum, caetero que articulos induratos.*

At Numenius podagrum, caeterosque articulos induratos hoc molliebat: ab rotuni, rosae aridae, papaveris lachrymae, singulorum p. iii. *. resinae terebinthinae 20 p. iv. *. thuris, spuma nitri, singulorum p. viii. *. iridis, aristolochiae, singulorum p. xii. *. cerae p. iii. *. quibus adjicitur cedriæ cyathus unus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius.

25 36. *Dexii Malagma, si quando callus in articulis increvit.*

Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius docuit imponere, calcis p. iv. * cerussæ p. viii. resinae pineæ p. xx. * 30 piperis grana xxx. cerae p. ii. *. Quibus dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

I. 2. M. P. cassae. I. 8. M. F. P. Theoxeni. I. 9. M. F. P. Theoxenus. I. 13. M. F. Thymiana. I. 22. M. F. sm. *. I. 23. P. cedri. M. F. laurii. I. 32. M. F. 2.

Ex emplastris autem nulla majorem usum praestant, quam quae cruentis protinus vulneribus injiciuntur. *erasma Graeci* vocant. Haec enim reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit; atque tum illius quoque impetum minuant, & glutinant vulnera, quae id non patiuntur, & cicatricem iisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque *alinae* a Graecis nominantur.

1. Barbarum Emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus injicitur.

Optimum ex his est, quod Barbarum ² nominatur. Habet enim aeruginis rafae p. xii. *. spumae argenti p. xx. *. aluminis, picis aridae, resinae pineae aridae, singulorum p. i. *. quibus adjiciuntur olei & aceti fungulae heminiae.

2. † Choacon Emplastrum nigrum, ad idem valens.

Alterum ad idem, quod Choacon vocant, habet spumae argenti p. x. *. resinae aridae tantundem. sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est. qui fere talis fit, ex pice atque resina: ut ex bitumine nigerrimus: ex aeragine, aut aeris squama, viridis: ex minio ruber; ex cerussa, albus.

3. Basilicon Emplastrum nigrum ad idem. ³

Paucae admodum compositiones sunt, in quibus aliquid misturae varietas novat. Ergo id quoque nigrum est, quod *basilicin*.

I. 8. M. F. P. om. *tum.* I. 9. M. F. P. *tum.* I. ead. M. F. P. om. *non.* I. 10. M. F. P. om. & I. 12. M. F. P. *ali-*
pene. I. 15. M. F. P. *vocatur.* I. 16. M. F. P. om. *enim.* I. 23. M. F. P. xc. I. 27. M. F. P. *at.*

¹ P. Aegineta VII. 17. ² Scribon. Larg. c. LXXXVII. c. 207. ³ Oribas. Synopf. III.

nominatur. Habet opopanacis p. I. *. galbani p. II. *. picis, & resinae singulorum p. x. olei dimidium cyathum.

4. *Smaragdinum Emplastrum ad idem.*

5 At, quod perviride est, Smaragdinum appellatur, in quo sunt resinae pineae p. IIII. *. cerae p. I. *. aeruginis, p. *. semis, thuris pollinis p. II. *. olei tantundem, & aceti, quo pollen & aerugo in unum cogantur.

10 5. *Emplastrum rufum ad idem.*

Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris p. I. resinae p. II. *. squamae aeris p. IIII. *. spumae argenti p. XX.

15 *. cerae p. c. *. olei heminam.

6. *παεργαληποι Emplastrum ad idem.*

Praeterea est, quod παεργαληποι a glutinando vocant. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis p. IV. *. spumae argenti p. IV. *. & olei veteris hemina.

7. *Cephalicum Emplastrum Philotae,*
capiti conveniens.

Praeterea sunt quaedam generis ejusdem, quae, quia capitibus fractis maxime conveniunt, κεφαλικά a Graecis nominantur. Philotae compositio habet terrae Eretiae, chalcitidis, singulorum p. IV. *. myrrae, aeris combusti, singulorum p. X. *. ichthyo-collae p. VI. *. aeruginis rasae, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiae, singulorum p. VIII. *. sqamae aeris p. XX. thuris masculi p. II. *. cerae p. I. rosae, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

8. *Em-*

I. I. M. F. P. panacis. I. 3. M. F. P. xx. I. 7. M. F. om. *. I. 8. M. F. P. fuliginis. I. ead. M. F. 2. I. ead. F. M. om. & I. 9. M. F. P. fuligo. I. 14. F. M. iv. I. 15. F. xc. I. 17. M. F. quam. I. ead. M. F. om. παεργαληποι. I. 20. M. F. x. I. 26. M. F. P. Eritriae. I. 29. M. F. collae singulorum p. vi. I. 30. M. F. myst. I. 31. M. F. x. I. 32. M. F. om. *

i. Scribon. Larg. c. LXXXIII.

R 3

8. *Emplastrum viride ad idem valens.*

Aliud ad idem viride. Habet aeris combusti, squamae aeris, myrrae, ichthyocollac, singulorum p. vi. * misyos crudi, aeruginis rafae, aristolochiae, aluminis rotundi, singulorum p. viii. * cerae p. vi. olei heminam, aecti quod satis fit.

9. *Tetrapharmacum Emplastrum,*

ad pus movendum.

Puri autem movendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est, & ² ~~me~~ ^{ad} purgando a Gracis nominatur. Habet partes portiones cerae, picis, resinae, levi taurini; si id non est, vitulini.

10. *Enneapharmacum Emplastrum ad pus mo-* 15
vendum, & ad purgandum valens.

Alterum ad idem, ³ ~~me~~ ^{ad} purgandum nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrra, rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel bubula, ocsypo, butyro. Quorum quoque pondera paria miscentur.

11. *Emplastrum, quibus utriusque rei facultas est.*
Sunt autem quaedam emplastra, quibus utriusque rei facultas est. quae, nisi singula habenda sit, meliora sunt; alias deteriora, nec, nisi cum utraque opus est, aut in singulis singulorum inopia, utenda veniunt: sed in copia rejicienda sunt; his potius adhibitis, quae id proprie, quod eo tempore 30 opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponantur.

Attalum Emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum: quod ha-
bet

I. 2. M. F. P. om. babet. I. 4. M. F. misi. I. 6. M. F. 1. Z. ead. M. F. P. kemina. I. 11. M. P. om. & I. 21. M. F. P. lysopo. I. ead. F. M. P. quorum ipsorum quoque. I. 23. M. F. P. ignorant. Emplastra, quibus utriusque rei facultas est. I. 25. M. F. P. si. I. 26. M. P. F. sunt. I. ead. a M. F. P. haec absunt: alias deteriora, nec, nisi cum utraque opus est, aut in sing. singul. inopia, utenda veniunt. I. 30. M. P. proprie id.

1 Scribon. Larg. cap. LXXXI. c. 211. 2 Casaub. ad Spart. Adriani. c. 21. p. 192. 3 Casaub. ad Spartian. Adriani. c. 21. p. 192, 232.

bet squamae aeris p. vi. *. thuris fuliginis p. xv. *. ammoniaci tantundem resinae terebinthinae liquidae p. xxv. *. fevi taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

5 *Judaei Emplastrum, fracto capiti
accommmodatum.*

At inter ea, quae fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod ad auctorem Judaeum refertur, Constat ex his: salis p. iv. *. squamae aeris rubri, aeris combusti, singulorum p. xii. *. ammoniaci thymiamatis, thuris fuliginis, resinae aridae, singulorum p. vi. *. resinae Colophoniae, cerae, fevi vitulinii curati, singulorum p. xx.

15 *. additur aceti sesquicyathus, olei minus ^{271, 8.} cyathos ^{2.} Quae πηροπτεύα Gracci appellant, nos curata vocamus; cum ex sevo puta omnes membranulae diligenter exemptae sunt, aut ex alio medicamento.

20 12. *Emplastrum epoxianum.* ³

Sunt etiam quaedam emplastra nobilia ad extrahendum, quae ipsa quoque ^{επιοπτεύα} nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, ^{Ἄρδαριστον} appellatur. In eo est, resinae terebinthinae p. x. *. nitri, cerae, picis aridae, baccarum lauri, singulorum p. xx. *. olei paululum. Quoties autem baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuerit, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

30 13. *Aliud Ἀρδαριστόν, ad extrahendum,
επιοπτεύα movendum.*

Aliud eodem nomine, quod puri quoque movendo est. Sevi vitulinii, ammoniaci

R 4

I. i. M. F. P. xvi. I. ead. om. thuris. I. 13. M. P. colophoniae. I. 15. M. P. om. additur. I. ead. M. F. P. sesquicyathum. I. 16. F. M. P. cyathum. I. ead. F. M. P. om. quae. I. 17. F. M. P. quae. I. ead. M. F. P. vocant. I. 19. M. F. P. om. aut. I. 20. M. P. ^{Ἀρδαριστόν} emplastrum ad extrahendum. I. 27. M. F. P. paulum. I. ead. M. F. P. aut. I. 33. M. F. P. eo.

¹ Aëtius Terrab. IV. Serm. III. 14. ² Rhodus de Ponderib. & Mensur. p. 35. ³ Scrib. Larg. c. LXXXVI.

niaci thymiamatis, picis, cerae, nitri, bac-
carum lauri, resinae aridae, aristolochiae, py-
rithri, pares portiones.

14. *Philocratis Emplastrum, ad extrabendum,*
& pus movendum.

Praeter haec, est Philocratis: quod habet
falis ammoniaci p. vii. *. aristolochiae p.
viii. *. cerae, resinae terebinthinae, fuli-
ginis thuris, singulorum p. xv. *. spumae ar-
genti p. xxxii. *. Quibus, ut pus quoque 10
moveant, iridis p. iii. *. galbanij p. vi. *.
adjiciuntur.

15. *Purādes Emplastrum, ad extrabendum.*

Optimum tamen ad extrahendum est
id quod a similitudine fordium *purādes*, 15
Graeci appellant. Habet myrrhae, croci,
iris, propolis, bdellii, capitulorum pu-
nici mali, aluminis scissilis & rotundi, mi-
syos, chalcitidis, atramenti futorii cocti,
opopanacis, falis ammoniaci, visci, singu-
lorum p. iv. *. aristolochiae p. viii. *. squa-
mae acris p. xvi. *. resinae terebinthinae p.
lxxv. *. cerae, & fevi vel taurini vel hircini
singulorum p. c. *.

16. *Emplastrum Hecataei, ad extrabendum.* 25

Hecataeo quoque auctore emplastrum
generis ejusdem fit ex his: galbani p. ii. *.
fuliginis thuris p. iv. *. picis p. v. *. cerae,
& resinae terebinthinae, singulorum p.
viii. *. quibus paulum irini unguenti mis- 30
cetur.

17. *Alexandrinum Emplastrum viride, ad*
extrabendum.

Valensque ad idem emplastrum viride
Ale-

I. 6. M. F. P. bac. I. 11. M. F. P. iv. I. 18. M.
F. P. aluminis & scissilis. I. 18. M. F. P. misfi. I. 19.
M. F. P. chalcitis. I. 20. M. P. Panacis. I. 23. M. F.
lxv. P. lxxxvi. I. 24. M. F. P. om. singulorum. I. ead.
M. F. P. xc.

Alexandrinum est. Habet aluminis scifilis p. viii. *. salis ammoniaci , p. vii. *. squamae aeris p. xvi. *. myrrae, thuris, singulorum p. xviii. *. cerae p. cl. *. resinae
5 Colophoniae aut pineae p. cxc. *. olei heminam, aceti sextarium.

18. *De Emplastris exedentibus.*

Quaedam autem sunt emplastra exedentia, quae ἐνπεπτὰ Graeci vocant, quale est id,
10 quod habet resinae terebinthinae, fuliginis thuris, singulorum p. ii. *. squamae aeris p. i. *. ladani p. ii. *. aluminis tantundem, spumae argenti p. iv. *.

19. *Emplastrum, quod exest corpus, offa resolvit,*
15 & supercrescentem carnem coercet.

Exest etiam vehemente corpus, atque offa quoque resolvit, & supercrescentem carnem coercet, id, quod habet spumae argenti, squamae aeris, uncias singulas; nitri 20 ignem non experti, lapidis Afii, aristolochiae p. sextantes¹, cerae, resinae terebinthinae, thuris, olei veteris, atramenti futorii, salis ammoniaci p. semis, aeruginis rafae p.² bessēm, aceti scillitici heminam, vini amīnae tantundem.

20. *Emplastra adversus morsus, & alia recentiora vulnera.*

Emplastrum Diogenis nigrum.

Sunt etiam adversus morsus quaedam accommodata; quale est Diogenis nigrum: quod habet bituminis, cerae, resinae pineae aridae, singulorum p. xx. *. spumae argenti p. c. *. olei § sextarium. Aut in quo sunt lquamae aeris p. iv. cerusiae, & aeruginis rafae fin-

I. 2. M. F. viii. I. 5. M. F. P. colophoniae. I. ead. F. cxxc. I. 9. M. F. P. ἐνπεπτὰ. I. 11. M. F. *. P. iii. I. 14. M. F. P. corpus & offa. I. 20. M. F. Tafii. I. 24. M. scilliti. I. 28. M. F. P. ignorant Emplastrum Diogenis nigrum. I. 30. M. F. Diogeni. I. 34. M. F. P. paffae.

¹ I. Rhodius de Ponderib. p. 13. ² I. Rhodius de Ponderib. p. 11, 12. §. I. Rhodius de Ponderib. p. 27.

singulorum p. viii. *. ammoniaci p. xii. *. cerae, resinae pineae, singulorum p. xxv. *. spumae argenti p. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aeris p. xiv. *. galbani p. vi. *. cerussae, & aeruginis rafac, singulorum p. viii. *. ammoniaci p. xii. cerae, resinae pineae, singulorum p. lv. *. ex quibus spuma argenti concoquitur.

21. *Ephesum Emplastrum rubrum,*
ad idem valens.

Rubrum quoque emplastrum, quod Ephesum vocatur, ¹⁰ huc aptum est. Habet resinae terebinthinae p. ii. *. galbani p. iv. *. minii sinopici p. vi. *. thuris fuliginis p. vi. *. cerae p. viii. *. spumae argenti p. lvi. *. olei veteris heminam.

22. *Aliud Emplastrum, ad idem valens.*

Item id, quod ex his constat; squamae aeris, thuris fuliginis, singulorum p. iv. *. galbani p. vi. *. fali ammoniaci p. xii. z. *. ²⁰ cerae p. xxv. *. olei tribus heminis. Haec autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte imponuntur.

23. *Alia Emplastra non gravibus vulneribus accommodata, & maxime senilibus.*

Sunt etiam alba lenia, ²⁵ Graeci vocant, fere non gravibus vulneribus accommodata, praecipueque senilibus. Quale est quod habet cerussae p. lii. *. sevi vitulini curati, & cerae, singulorum p. lviii. *. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur.

24. *Elephantinum Emplastrum.*

Aliud, quod habet cerussae p. xx. *. cerae. ³⁰ p. lv. *.

I. 5. P. vi. I. 6. M. F. p. xxii. I. cad. P. om. ammoniaci. p. xxii. I. cad. F. P. cereae. M. cerae. I. 7. M. F. P. om. ex quibus. I. 9. M. F. P. Ethesium. I. 12. M. F. P. Ethesium. I. 34. M. F. P. xi.

¹ Oribas. Synops. I. III.

p. lv. *. olei heminam , aquae sextarium . Quae quoties adjiciuntur cerussae vel spumae argenti , scire licet , illa ex his coquenda esse . Est autem ea percandida compositio , quae supra posita est , ideoque elephantina nominatur .

25. *Lenia Emplastra.*

Lenia quoque quedam emplastra sunt , quae ^{λιναὶ} fere Graeci nominant ; ut id quod habet minii p. iv. *. spumae argenti p. xxv. *. cerae , & adipis suillae singulorum p. xxxv. *. vitellos ovorum quatuor .

26. *Emplastrum lene.*

Alia compositio generis ejusdem : cerae , resinae terebinthinae , singulorum p. v. *. cerussae p. viii. *. spumae argenti , plumbi retrimenti , (^{οὐεταὶ μονίσθι Graeci vocant}) singulorum p. x. *. cicini olei , & myrtei , singulorum heminac tertia .

27. *Archagathbi Emplastrum lene.*

Alia , quae ad auctorem Archagathum refertur : mifyos cocti , aeris combusti , singulorum p. iv. *. cerussae coctae p. viii. *. resinae terebinthinae p. x. *. spumae argenti p. vi. *.

28. *Emplastra ejusdem generis , ad leniendum apta.*

Etiamnum generis ejusdem : spumae argenti , cerae , adipis suillae , singulorum p. xxvi. *. vitelli cocti , rosae hemina . Aut compositio haec : cerati ex oleo myrteo facti partes tres , adipis suillae pars quarta , paullum ex plumbi retrimento . Aut haec compositio : spumae argenti ² & felibra ; ex olei hemina , & aquae marinae altera , cocta do-

247, 341

nec

¹ 9. M. F. P. quas . I. ead. M. F. P. ^{λιπαρέις} . I. 12. M. F. P. xxxvii. I. ead. M. F. P. om. ovorum . I. 15. M. F. vi. I. 17. M. P. recremento . I. ead. M. F. ^{μονίσθι} . I. 18. M. F. P. xx. I. 19. M. F. P. om. tertia . I. 21. F. tertia . I. 22. M. F. P. ^{μητήρ} . I. 29. F. cocti iv. rosae . I. 30. M. F. P. ignorant aut compositio haec . I. 31. M. F. P. paulum . I. 32. M. F. P. recremento . I. ead. M. F. P. om. haec compof.

¹ Plin. XIII. 9. & XXXIII. 6. ² Rhodius de Pon- derib. p. 12.

nec bullire desierit, cui paulum cerae sit adjectum. Aut haec: pares portiones cerac, servi, stibii, spumae argenti, cerussae.

C A P. X X.

De Pastillis.

Et primo de his, qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt.

PASTILLI quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti. Qualis est, 10 qui habet chalcitidis, misyos, spumae nitri, floris aeris, gallae, aluminis scissilis modice cocti, singulorum p. I. *. aeris combusti, capitulorum mali punici, singulorum p. III. *. Hunc oportet diluere aceto, ac 15 sic, ubi vulnus glutinandum est, illinere. At, si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona hujus sit.

I. Alius Pastillus ad glutinanda vulnera. 20

Alius ad idem. Constat ex his: bitumis, aluminis scissilis, singulorum, p. I. *. aeris combusti p. IV. *. spumae argenti p. XI. * olei sextario.

2. De Spfragide Pastillo, quem Polyidas 25 confecit ad glutinandum vulnus.

Sed longe Polyidae celeberrimus est: οπερης autem nominatur. Qui habet aluminis scissilis p. IV. *. atramenti futorii p. XI. *. myrrae p. V. *. aloës tantudem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum p. VI. *. quae contrita vino austero excipiuntur.

3. Pastil-

I. 2. M. F. P. om. haec. I. 3. M. F. stibis. I. 11. M. F. P. chalcitis. I. ead. M. F. P. misyi. I. 15. M. F. P. om. ac. I. 25. M. F. Polybus. P. Polybius. I. 27. M. F. Polybi. P. Polybii. I. 29. M. F. XI. 2.

I Caelius Aurelian. de Acut. Morb. III. 3.

3. *Pastillus ad ulcerā fōrdida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obfcoenīs partibus, inflammatione que eorum.*

Ad ulcerā fōrdida, & nigritiem in auribus, naribus, obfcoenīs partibus, inflammatione que eorum: chrysocollae p. I. *. atramenti futorii, aluminis scissilis, singulorum p. II. *. halicacabi corticis p. IV. *. minii p. VI. *. spumae argenti p. XII. *. cerusfae p. XVI. *. quae ex aceto coguntur, &, ubi utendum est, diluuntur.

4. *Pastillus Andronis ad uvam inflammatam, ad naturalia fōrdida, etiam cancro laborantia.*

Andronis vero est ad uvam inflammatam, ad naturalia fōrdida, etiam cancro laborantia: gallae, atramenti futorii, myrrae, singulorum p. I. *. aristolochiae, aluminis scissilis, singulorum p. II. *. capitulorum punici mali p. XXV. *. ex passo coactorum &, cum usus exigit, aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est.

5. *Pastillus ad fissā ani, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum.*

Proprie autem ad ani fissā, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum valet: aeruginis p. II. *. myrrae p. IV. *. gummi p. VIII. *. thuris p. XII. *. fibil, lacrymae papaveris, acaciae, singulorum p. XVI. quae ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

6. *Pastillus ad expellendum calculum ex vesica.*

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur haec compositio: cassiae, croci,

I. 2. M. F. om. & in. I. 8. M. baliacab. I. 10. M. F. P. aceto & coguntur. I. 18. M. F. capitula. I. 19. M. F. coacta. I. 20. M. F. diluta. I. 21. M. F. P. lenius. I. ead. M. fixa. I. 27. M. F. P. om. valet. I. ead. M. F. P. XII. I. 28. M. P. F. om. gummi. P. VIII. *. thuris p. XII. I. ead. M. F. P. fibis. I. 29. M. F. P. XVI. *. quae. I. 32. M. F. P. cum urina. I. 34. M. P. cassae.

¹ Oribas. Synops. III. Galen. de Comp. Med. secund. loc. III. 3.

croci, myrrae, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radieis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant p. i. *. hique singuli quotidie mane jejuno 5 dantur.

C A P. XXI.

De Peffis.

HAEC tria compositionum genera, id 10
pastillisque sunt, maximum praeципue-
que varium usum praestant. Sed alia
quoque utilia sunt: ut ea quae feminis
subjiciunt. ~~περιστασίς~~ Graeci vocant. † Eorum
haec proprietas est: medicamenta compo- 15
sita molli lana excipiuntur, eaque lana na-
turalibus condituri.

1. Ad sanguinem evocandum.

Ad sanguinem autem evocandum, cau- 20
neis duabus adjicitur nitri p. i. *. aut allii
femen conteritur, adjicitur myrrae pau-
lulum, & unguento fusino miscetur. Aut
cucumeris sylvestris pars interior ex lacte
muliebri diluitur.

2. Ad vulvam molliendam.

Ad vulvam molliendam, ovi vitellus,
& foenum Graecum, & rosa, & crocum
temperantur. Aut elaterii p. III. *. salis
tantundem, uvae taminiae p. VI. *. melle ex- 30
cipiuntur.

3. Alia Peffi compositio, ad idem valens.

Aliud Boëthio auctore: quod habet croci,
resinæ terebinthinae, singulorum p. IV. *.
myr-

1. 14. M. F. P. subjiciuntur. I. 19. M. F. canneis. I.
28. M. F. 2. I. 29. M. F. timintae. I. 32. M. F. P.
aut. I. cad. M. F. P. om. quod habet.

1 Ejus meminit Cicero de Divin. II. 12.

myrrhae p. III. *. rosae p. I. *. sevi vitulini
p. III. cerae p. II. *. miscentur.

4. *Ad inflammaciones vulvae Numenii Pessus.*

Optima autem adversus inflammations
vulvae Numenii compositio est, quae habet
croci p. IIII. *. cerae p. I. *. butyri p. VIII. *.
adipis anserinae p. XII. *. vitellos coctos duos,
rosae minus cyatho.

263, 15.

5. *Ad ejiciendum e vulva infantem mortuum.*

Si vero infans intus decessit, quo facilius
ejiciatur, malicorium ex aqua terendum,
eoque utendum est.

6. *Si mulier vitio locorum concidit, qua
curatione utendum sit.*

† Si concidere vitio locorum mulier solet,
cochleae cum testis suis comburendae, conte-
rendaeque, deinde his mel adjiciendum.

7. *Si mulier non comprehendit.*

Si non comprehendit, adeps leonina ex
rosa mollienda est.

C A P . XXII.

De Medicamentis, quibus aridis utimur.

1. *Ad carnem supercrescentem exedendam.*

Q U A E D A M misturae medicamentorum
sunt, quibus aridis neque coactis uti-
mum sic, ut inspergamus; aut cum ali-
quo liquido mixta illinamus: quale est, ad
carnem supercrescentem exedendam, quod
habet squamae aeris, fuliginis thuris, fin-
gulorum p. I. *, aeruginis p. II. *. Haec
autem eadem cum melle purgant ulcera;
& cum cera, implet. Misy quoque &
galla, si paribus portionibus misceantur,
corpus consumunt: eaque vel arida in-
sper-

I. 11. M. F. malocorium. I. 17. M. F. P. adjicien-
dum est. I. 18. a. M. F. P. absunt haec: si mulier non
comprehendit. I. 24. M. F. quaedam autem misturae. I.
29. M. F. P. om. aeris. I. 32. M. F. P. om. &.

2. *Ad putrem carnem continendam, ne ultra
serpat, eamque leniter exedendam,
plures compositiones.*

Putrem vero carnem continet, neque ⁵
ultra serpere patitur, & leniter exest, mel
vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel
cum oleae foliis, ante ex vino decoctis.
Item fertula campana in mulso cocta, de-
inde contrita. Aut calx cum cerato. Aut ¹⁰
amarae nuces cum allio, sic ut hujus pars
tertia sit, paululumque his croci adjiciatur.
Aut quod habet spumae argenti p. vi. *. cornu
bubuli combusti p. xi. *. olei myrtei, &
vini cyathos ternos. Aut quod ex his con- ¹⁵
stat: floris punici mali, atramenti sutorii,
aloës, singulorum p. ii. *. aluminis scissilis,
thuris, singulorum p. iv. *. gallae p. viii. *.
aristolochiae p. x. *. Vehementius idem fa-
cit, etiam adurendo, auripigmentum cum ²⁰
chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta
combusta. Item fal cum aceto. Vel ea com-
positio, quae habet chalcitidis, capitulorum
mali punici, aloës, singulorum p. ii. *. alu-
minis scissilis, thuris, singulorum p. iv. *. ²⁵
gallae p. viii. *. aristolochiae p. x. *. mellis
quantum satis sit ad ea cogenda. Vel can-
tharidum, sulphuris, singulorum p. i. *.
loli p. iii. *. quibus adjicitur picis liquidae
quantum satis est ad jungendum. Vel chal- ³⁰
citis quoque cum resina & ruta mixta: aut
cum eadem resina diphryges: aut uva ta-
minia cum pice liquida. Idem vero possunt
& feces vini combustae, & calcis & nitri
pares

I. 12. M. F. P. paulumque. I. 27. M. F. P. cantha-
rides. p. xi. I. 28. M. F. P. om. singulorum. I. 32.
M. F. timinia. I. 34. M. F. P. om. &.

pares portiones. Vel aluminis scissilis p. i.
thuris, sandarachae; nitri, singulorum p. i.
*. gallae p. viii. *. aristolochiae p. x. *. mel-
lis quantum satis est.

5 3. *Herae compositio.*¹

Est etiam Herae compositio, quae habet
myrrae, chalcitidis, singulorum, p. ii. *.
aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum
p. iv. *. aristolochiae, gallae, immaturae, sin-
gulorum p. viii. *. malicorii contriti p.
xx. *.

10 4. *Judaei compositio.*

Est & Judaei: in qua sunt calcis partes
duae, nitri quam ruberrimi pars tertia:
15 quae urina impuberis pueri coguntur, do-
nec strigimenti crassitudo sit. Sed subinde
is locus, cui id illinitur, madefacientius est.

15 5. *Jollae compositio.*

At Jollas, chartae combustae, sandara-
chae, singulorum p. i. *, calcis p. ii. p. au-
ripigmenti tantudem miscebat.

6. *Ad sanguinis profluvia vel ex membrana
cerebri, vel aliis locis; & ad cancrum, & ad
inducendam cicatricem, & ad coercen-
dam carnem increcentem.*

25 Si vero ex membrana, quae super cere-
brum est, profluit sanguis, vitellus com-
bustus & contritus inspergi debet. Si ex
alio loco sanguinis profluvium est, auri-
30 pigmenti, squamae aeris, singulorum p. i. *.
sandarachae p. ii. *. marmoris cocti p. iv. *.
inspergi debent. Eadem cancro quoque ob-
sistunt. Ad inducendam cicatricem, sqa-
mae aeris, thuris fuliginis, singulorum
p. ii. *.

l. 5. M. F. P. Hierae. l. 6. M. P. F. Hierae. l. 10.
M. malacorit. l. 11. F. om. xx. l. 13. F. om. & M.
etsi. l. 25. M. F. P. crescentem. l. 28. M. F. P. ex. l.
31. M. F. om. *. l. 32. M. r. debet.

1 Oribas. Synops. L. III. de Pestillis.

p. II. *. calcis p. IV. p. Eadem crescentem quoque carnem coercent.

7. *Timaei compositio ad ignem sacrum
vel cancrum.*

Timaeus autem ad ignem sacrum, & ad cancerum his utebatur: myrrhae p. II. *. thuris, atramenti futorii, singulorum p. III. *. sandarachae, auripigmenti, sqamae aeris, singulorum p. IV. *. gallae p. VI. *. cerusiae combustae p. VIII. *. Eadem vel arida insperfa, vel melle excepta idem praestant.

8. *Ad sternutamenta excitanda.*

Sternutamenta vero & albo veratro, vel struthio conjecto in nares excitantur. vel his mistis: piperis, veratri albi, singulorum p. III. castorei p. I. *. spumae nitri p. II. *. struthii p. III. *.

9. *Gargarizationes quibus fieri debeant.*

Gargarizationes autem aut laevandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Laevant, lac, tremor vel ptisanæ, vel furfurum. Reprimit autem aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulae decoctæ sunt. Evocant, sinapi, piper.

25

C A P. XXIII.

*De Antidotis,
& quibus malis opitulentur.*

ANTIDOTA raro, sed praecipue interdum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, late-

I. 1. M. F. P. om. p. II. *. I. 4. F. vel ad cancrum.
I. 5. M. F. P. vel. I. 16. M. F. I. I. 17. P. VIII. I.
22. M. F. P. om. autem. I. 33. M. om. in.

laterum , faucium , interiorumque partium doloribus . Maxime autem desideranda sunt adversus venena , vel per morsus , vel per cibos , aut potionis nostris corporibus inferta .

5 *1. Compositio antidoti .*

Unum est , quod habet lacrymae pavonis p. *. z. acori , malabathri p. v. *. iridis Illyricae , gummi , singulorum p. ii. *. anisi p. iii. *. nardi Gallici , foliorum rosae aridorum , cardamomi , singulorum p. iv. *. petroselini p. *. iii. z. trifolii p. v. *. cassiae nigrae , filis . bdellii , carpobalsami , seminis papaveris albi , singulorum p. *. z. styracis p. *. v. z. myrrhae , opopanaxis , nardi Syri , thuris masculi , hypocistidis succi , singulorum p. vi. *. castorei p. vi. *. costi , piperae albi , galbani , resinae terebinthinae , croci , floris junci rotundi , singulorum p. vi. *. z. dulcis radicis p. viii. *. z. quae melle vel passo excipiuntur .

15 *2. Aliud antidotum ,¹ Ambrosia nominatum ; quod Zopyrus Ptolemaeo regi compositum .*

Alterum , quod Zopyrus regi Ptolemaeo dicitur compoisse , atque Ambrosiam nominasse , ex his constat : costi , thuris masculi , singulorum p. v. *, piperae albi p. *, z. floris junci rotundi p. ii. *. cinamomi p. iii. *. cassiae nigrae p. iv. *. croci Cilicii p. *. iv. z. myrrhae , quam staeten nominant , 25 p. v. *. nardi Indici p. *. v. z. quae singula contrita melle cocto excipiuntur : deinde , ubi utendum est , id , quod ² AEgyptiae fabae magnitudinem impleat , in potionem vini diluitur .

S 2

3. An-

¹ M. F. om. *. l. ead. M. F. iv. l. ead. f. perfodi;
l. ead. M. F. om. *. l. 12. M. F. P. balsami. l. 13. M. F.
P. piperis. l. 14. F. om. *. M. viii. P. viii. *. l. 19. M.
F. om. *. l. ead. M. F. om. *. l. 20. F. quae vel melle. l.
26. M. F. om. *. l. 27. M. F. om. *. l. ead. M. F. om. *.
l. 28. M. F. om. *. l. ead. M. F. om. *. l. 29. M. F. om.
*. l. ead. M. F. P. nominat. l. 30. M. F. om. *. l. ead. M.
F. om. *. P. viii.

² Ambrosiac Junii Crispi meminit Marcellus de Med , cap. XXIII , p. 345 . ² Rhodius de Ponderib , p. 25 .

3. *Antidotum Mithridatis.*¹

Nobilissimum autem est Mithridatis. quod quotidie sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tutum corpus suum reddidisse. In quo haec sunt: costi p. *. z. acori p. v. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciae succi, iridis Illyricae, cardamomi, singulorum p. ii. *. anisi p. iii. *. nardi Gallici, gentianae radicis, aridorum rosae foliorum, singulorum p. iv. *. papaveris lachrymae, petroselini, singulorum p. *. iv. z. cassiae, sileris, lolii, piperis longi singulorum p. vi. *. styracis p. *. v. z. castorei, thuris, hypocistidis succi, myrrae, opopanax, singulorum p. vi. *. malabathri 10 folii p. vi. *. floris junci rotundi, resinae terebinthinae, galbani, dauci Cretici semenis, singulorum p. *. v. z. nardi, opobalsami, singulorum p. *. vi. z. thlaspis p. *. vi. radicis Ponticae p. vii. *. croci, zinziberis, 20 cinnamomi, singulorum p. *. viii. Haec contrita melle excipiuntur, & adversus venenum, quod magnitudinem nucis Graecae impletat, ex vino datur. In caeteris autem affectibus corporis pro modo eorum vel quod 2 Aegyptiae fabae vel ervi magnitudinem impletat, satis est.

C A P. XXIV.

De Acopis.³1. *Acopum nervis utile.*

A COPA quoque utilia nervis sunt. Quale est, quod habet floris junci rotundi p. *. ii. zz. costi, junci quadrati,

I. 6. M. F. om. *. I. cad. F. om. *. I. 8. M. F. om. *. I. 10. M. F. om. *. I. 12. M. F. scilicet, I. 13. F. om. *. I. 15. M. F. om. *. I. 18. M. F. vi. I. 19. F. V. *. 22. I. 21. F. om. viii. *. I. 26. M. F. vel quod ervi.

¹ Plin. H.N. XXIII. 18. ² Jo. Rhodius de Ponderib. p. 26. ³ Scriben. Larg. cap. CLIV. c. 26.

drati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum p. *. iv. z. myrrae, aeris combusti, singulorum p. vii. *. iridis Illyricae, cereae, singulorum p. iv. *. Alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum p. xviii. *. sevi p. i. *. unguenti irini cyathum.

2. *Acopum Elodes nervis utile.*

Alterum, quod ελασθι vocant, hoc modo fit: cerea p. *. z. olei tantundem, resinae terebinthinae ad nucis juglandis magnitudinem; simul incoquuntur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, & rosae terni cyathi.

3. *Eryngium ad ulcera purganda & implenda.*

Ἐργίγειον autem Graeci vocant liquida, quae illinuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda & implenda, maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullae vitulinae, sevi vitulini, adipis anterinae, cereae, mellis, resinae terebinthinae, rosae, olei cicini. Quae separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

4. *Ad sacrum ignem.*

Ad sacrum ignem: spuma argenti p. vi. *, cornu bubuli combusti p. ii. *. conteruntur, adjiceturque invicem vinum, & id, quod specialiter sic vocatur, & myrtleum, donec utriusque terni cyathi conficiantur.

C A P .

*I. 3. F. *. vir. I. 5. M. F. asphalti. I. 8. M. F. P. Elaeodes. I. 23. M. F. P. ciliarii. I. 32. M. P. sit.*

¹ Omnes edit. *Sil.* cuius meminit Plin. H. N. XXXIII. 13. Plura loca congesit Rhodus ad Scriboniam, cap. XXX. c. 126. &c. in Lexico.

C A P. XXVI.

De Catapotiis.

1. *Catapotium ad somnum accersendum, & levationem doloris, & simul ad coquendum.*

CATAPOTIĀ quoque multa sunt, variis-
que de causis fiunt. *Aναστάτων* vocant,
quae somno dolorem levant. Quibus
uti, nisi nimia necessitas urget, alienum
est. Sunt enim ex vehementibus medica-
mentis, & stomacho alienis. Prodest tamen 10
etiam ad concoquendum, quod habet pa-
paveris lachrymae, galbani, singulorum p.
i. *. myrrae, castorei, piperis, singulorum p.
ii. Ex quibus, quod ervi magnitudinem
habet, satis est devorasse. 15

2. *Catapotium valentius ad somnum.*

Alterum, stomacho pejus, ad somnum
valentius, ex his fit: mandragorae p. *. z.
apii seminis, item hyoscyami seminis, sin-
gulorum p. iv. *. quae ex vino teruntur. 20
Unum autem ejusdem magnitudinis, quae
supra positā est, abunde est sumpsiſſe.

3. *Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.*

Sive autem capitis dolores, sive ulcera, 25
sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus dif-
ficultas, sive intestinorum tormenta, sive
inflammatio vulvae, sive coxae est, sive je-
cur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio
locorum aliqua prolabitur & obmutescit, 30
occurrit dolori per quietem ejusmodi ca-
tapotium. Silis, acori, rutae silvestris semi-
nis, singulorum p. ii. *. castorei, cinamomi,
fin-

I. 4. ad concoquendum. I. 10. M. F. P. potest. I. 14.
*M. F. P. 11. *. ex. I. 20. F. *. iv. I. 21. M. P. vi-*
zum. I. 28. M. F. P. est, sive coxa. I. 33. M. F. I.
*P. i. **

singulorum p. II. *. papaveris lachrymae,
panacis radicis , mandragorae malorum ari-
dorum , junci rotundi floris , singulorum
p. II. *. piperis grana LVI. Haec per se con-
5 trita , rursus instillato subinde passo , simul
omnia teruntur , donec crassitudo sordium
fiat. Ex eo paulum aut devoratur , aut aqua
diluitur , & potui datur.

4. *Catapotium aliud ad multa valens.*

10 + Quinetiam silvestris papaveris , cum jam
ad excipiendam lachrymam maturum est ,
manipulus , qui manu comprehendi potest ,
in vas demittitur , & super infunditur aqua ,
quae id conteget , atque ita coquitur. Ubi
15 jam bene manipulus is coctus est , ibidem ex-
pressus projiciatur ; & cum eo humore pas-
sum pari mensura misceatur , inferveatque ,
donec crassitudinem sordium habeat. Cum
infixit , catapotia ex eo fiunt , ad nostrae
20 fabae magnitudinem , habentque usum
multiplicem. Nam & somnum faciunt , vel
per se assumpta , vel ex aqua data & aurum
dolores levant , adiectis exiguo modo rutae
succo , ac passo : & tormina suppressunt ex
25 vino liquata : & inflammationem vulvae
coercent , mixta cerato ex rosa facto , cum
paululum his croci quoque accessit : & ex
aqua fronti inducta , pituitam in oculos
decurrentem tenent.

30 5. *Catapotium ad inducendum somnum , quem
vulva dolens prohibuit.*

Item , si vulva dolens somnum prohibet ,
croci p. II. *. anisi , myrrae , singulorum
p. I. *. papaveris lacrymae p. IV. *. cicutae
femi-

I. 4. F. *. II. I. 16. M. F. P. projectur. I. ead. M.
F. P. passi. I. 17. M. F. P. miscetur. I. 24. succi. I.
ead. M. F. passi. I. 27. M. P. paulum. I. 30. M. F. P.
quod. I. 32. M. F. P. prohibuit. I. 34. F. M.

1 Rhodius de Ponder. p. 25.

S 4

seminis p. viii. *. miscentur, excipiunturque vino veteri & quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquae diluitur. Id tamen in febre periculoſe datur.

6. *Ad jecur sanandum.*

Ad sanandum jecur, nitri p. *. z. croci, myrrae, nardi Gallici, singulorum p. i. *, melle excipiuntur, daturque, quod AEgyptiae fabae magnitudinem habeat,

7. *Ad finiendos dolores lateris.*

Ad lateris dolores finiendos piperes, aristolochiae, nardi, myrrae pares portiones.

8. *Ad thoracis dolores finiendos.*

Ad thoracis, nardi p. i. *, thuris, cassiae, singulorum p. iii. *. myrrae, cinnamomi, singulorum p. vi. *. croci. p. viii. resinæ terebinthinae quadrans, mellis heminae tres.

9. *Catapotium Athenionis ad tussim.*

Ad tussim, + Athenionis: myrrae, piperis, singulorum p. i. *. castorei, papaveris lacrymae, singulorum p. i. *. Quae separatim contusa postea junguntur, & ad magnitudinem fabae nostrae, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

10. *Catapotium Heraclidis Tarentini*

ad tussim & somnum.

At, si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci p. i. *. cinnamomi, castorei, papaveris lachrymae, singulorum p. i. *. myrrae, piperis longi, cocti, galbani, singulorum p. *. z.

11. *Catapotium ad purganda ulcera
in fauicibus tuffientibus.*

Quod si purganda sunt ulcera in fauibus

I. 7. F. *. 1. I. 14. M. F. *. 1. I. 15. M. F. *. 111.
I. 27. M. F. P. om. At. I. cad. M. F. utr que. I. 30.
M. F. *. 1.

bus sufficientibus , panacis , myrrae , resinæ terebinthinae , singulorum p. v. *. galbani p. *. z. hyssopi p. *. z. conterenda sunt , hisque hemina mellis adjicienda , & quod d⁵ gito excipi potest , devorandum est .

12. *Colice Cassii medici.*

Colice vero Cassii ex his constat : croci , 224, 1. anisi , castorei , singulorum p. IIII. *. petroselini p. IV. *. piperis & longi , & rotundi , singulorum p. V. *. papaveris lacrymae , junci rotundi , myrrae , nardi , singulorum p. VI. *. quae melle excipiuntur . Id autem & devorari potest , & ex aqua calida sumi .

13. *Ad infantem mortuum aut secundas expellendas.*

Infantem vero mortuum , aut secundas expellit aquae potio , cui falso ammoniaci p. I. *. aut cui dictami Cretici p. I. *. adjectum est .

14. *Laborantibus ex parte quid dari debet.*

Ex partu laborantibus , erysimum ex vi-
no tepido jejuni dari debet .

15. *Ad adjuvandum vocem.*

Vocem adjuvat , thuris p. I. *. in duabus cyathis vini datum .

25. 16. *Adversus difficultatem urinae.*

Adversus urinae difficultatem : piperis longi , castorei , myrrae , galbani , papave-
ris lacrymae , croci , costi , unciae singulæ ,
styram , resinæ terebinthinae pondo sex-
30 tantes , mellis absinthii cyathus . Ex quibus
ad magnitudinem fabae AEgyptiae manc &
coenato dari debet .

17. *Arteriaces compositio quomodo fiat.*

Arteriace vero hoc modo fit : cassiae , iri-
dis ,

I. 2. M. F. x. I. 6. M. F. Collicet I. 7. M. V. et Mi-
ce. I. ead. forte celi , ut Libro IV. c. 14. Sed malim
ibi legere croci . I. a. Scribon. Larg. cap. xxix . cuius
descriptio in aliis variat . I. 21. F. laboranti . I. ead. M.
J. P. jejunae . I. 23. M. F. P. *. I. I. 30. M. P. mel.
I. 31. M. F. P. Aegyptia & mane .

dis, cinnatomi, nardi, myrrae, thuris, singularum p. I. *. croci p. I. *. piperis 1 grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrae, thuris singularum p. I. *. conjiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut ejusdem passi heminae tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat; & adjicitur tritiae cassiae p. I. *. 10

C A P. XXVI.

De quinque generibus noxarum corporis.

CUM facultates medicamentorum proponam; genera, in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus laesit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quae intumescens in variem convertitur. Cum quid deest, aut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ego, dilatis his, quae praecipue scalpellum in manum postulant, nunc 25 de his dicam, quae maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem; & ante dicam de his, quae in quamlibet partem corporis incident; tum de his, quae certas partes infestant. Incipiam a vulneribus.

I. *De vulneribus, quae per tela inferuntur.*

In his autem ante omnia scire medicus debet,

I. 2. M. F. *. I. I. ead. M. F. *. I. I. 5. M. F. *. I. I.
10. M. F. *. I. I. 12. M. F. P. addunt & primo de vulneribus,
quae maxime per tela inferuntur. I. 21. M. F. P. ut.
I. 23. M. F. P. quibus plus medicamenta. I. 24. M. F. P.
ergo. I. 25. M. F. P. & I. ead. legendum est aut vel ac. I.
29. M. P. om. debis. I. 30. M. t. inducunt. I. 32. a M. F.
P. absunt haec: *De vulneribus, quae per tela inferuntur.*

I pag. 252. 257.

debet, quae insanabilia sint, & quae difficultem curationem habeant, quae promptiorum. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem fors ipsius interemit. Deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficulti rem esse: ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefeller videatur. Sed ut haec prudenti viro convenient: sic rurus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus praetitissime videatur. Obligari aequum est confessione promptae rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentia fiat.

2. *Quae vulnera insanabilia sint.*

Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jocinoris portae, cui in spina & medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuissimum intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venae, vel arteriae praecisae sunt.

25 3. *Quae vulnera difficultem curationem habeant.*

Vix autem ad sanitatem perveniant, quibus ulla parte aut pulmo, aut jocinoris crassum, aut membrana, quae continet cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, aut 30 ullan intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in praecepsit sunt, in quibus usque ad grandes intusque con-

14, 1.

81, 23.

512, 53.

I. 1. M. P. om. & I. 6. M. F. P. peremit. I. 10. M. F. P. fefeller se videatur. I. 14. M. F. P. obligari que aequum. I. 27. M. F. P. om. aut.

¹ Hipp. de Arte T. IV. 6. XXIII. 5, 6. Apuleius de Doctr. Platon. L. II. Cicero ad Attic. L. XVI. Ep. 15. Rittershus. ad Isidor. Pelusior. L. II. Epist. 16. ² Aegin. VI. 88. ³ Aph. VI. 18. Coac. Not. III. 387. II. Praedict. XIX. XLII. ⁴ Exemplum vide apud Tulpium Obs. L. III. c. 27. ⁵ Aph. VI. 24. Coac. Not. III. 379, 389.

conditas venas in alis vel poplitibus mucro defedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubi cuncte venae maiores sunt, quoniam exhaustare hominem profusione sanguinis possunt. Idque evenit non in aliis tantum, atque poplitibus; sed etiam in his venis, quae ad anum testiculorumque perveniunt. Praeter haec malum vulnera est, quodcunque in aliis vel feminibus, vel in anibus locis, vel inter digitos est. Item quodcunque muscularum, aut

81, 23. nervum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem laetit.

4. *Quae vulnera tutiorem curationem habeant.*

Tutissimum omnium, quod in carne est. Et haec quidem loco vel pejora, vel meliora sunt. Modo vero periculum facit, quodcunque magnum est.

5. *Observationes in vulneris genere & figura.*

Aliquid etiam in vulneris genere figuraque est. Nam pejus est, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est, adeo ut acuto quoque, quam retuso telo, vulnerari commodius sit. Pejus etiam vulnera est, ex quo aliquid excisum est; ex quove caro alia parte absissa, alia dependet. Pessima quaque plaga curva est: tutissima, quae linea modo recta est. Quo deinde proprius huic illive figurae vulnera est, eo uel deterius vel tolerabilius est.

18, 33. 6. *AEtatis observatio, & corporis, &*
119, 31. *vita, & temporis.*

Quin etiam confert aliquid & aetas, & corpus, & vitae propositum, & anni tempus, quia facilis sanescit puer vel adolescentis, quam senior: valens, quam infirmus:

neque

1. 2. Caeſarius in margine descendit. 1. 9. M. F. P. *Iocis,*
vel in articulis. 1. 18. M. F. P. *Observationes quaedam &*
aetatis & corporis & vitae & temporis in vulneribus. 1. 22.
F. retinac. 1. 25. M. F. om. que. P. quae. 1. ead. M. P. in
orbem. 1. 29. a M. F. P. haec absunt: *Aetatis observatio*
& corporis & vitae & temporis.

1. Hippoc. Coac. Not. III. 390, & I. de Morb. III.
5. 2 II. Praed. xxiv. 2. Coac. Praen. III. 389. 3 II.
Prædict. xix. 7.

neque nimis tenuis, neque nimis plenus,
quam si alterum ex his est: integri habitus,
quam corrupti: exercitatus, quam iners:
fobrius & temperans, quam vino veneri-
que deditus. Opportunissimumque curatio-
ni tempus, vernum est; aut certe neque fer-
vens, neque frigidum, siquidem vulnera &
nimis calor & nimium frigus infestant;
maxime tamen horum varietas: ideoque perni-
ciosissimus autumnus est.

42, 17.

33, 33.

7. *Signa eorum, quae intus laesa sunt.*

Sed pleraque ex vulneribus oculis sub-
jecta sunt: quorundam ipsae sedes indices
sunt, quas alio loco demonstravimus, cum
15 positus interiorum partium ostendimus.
Veruntamen, quia quaedam vicina sunt,
interestque, vulnus in summa parte sit, an
penitus penetraverit, necessarium est notas
subjicere, per quas quid intus ictum sit, sci-
20 re possimus; & ex quibus vel spes, vel de-
speratio oriatur.

8. *Signa percussi cordis.* ²

Igitur, corde percusso, sanguis multus
fertur, venae languefcunt, color pallidissi-
25 mus, sudores frigidi, malique odoris, tan-
quam in aegroto corpore oriuntur: extre-
misque partibus frigidis ³ matura mors sequi-
tur.

9. *Signa pulmonis icti.* ⁴

30 Pulmone icto, spirandi difficultas est: san-
guis ex ore spumans, ex plaga rubens, si-
mulque etiam spiritus cum fono fertur: in
vulnus inclinari juvat: quidam sine ratio-
ne consurgunt. Multi si in ipsum vulnus
inclini-

1. 11. M. F. P. ignorant *signa eorum, quae intus lie-
sa sunt.* 1. 17. M. P. quoque. 1. 18. M. F. P. penitus.
1. 19. M. F. P. acutum. 1. 21. M. L. P. oritur. 1. 26.
M. F. P. vorato.

1 Aph. VI. 47. 2 Aeginet. VI. 88. 3 Aph. VIII.
12. 4 Aeginet. VI. 88.

10. *Signa jocinoris vulnerati.*

Jocinoris autem vulnerati notae sunt: multus sub dextra parte praecordiorum profusus sanguis: ad spinam reducta praecordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum scapularum os, intenti. quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

11. *Signa percussorum rerum.*

Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit: difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruar fertur.

12. *Signa vulnerati lienis.*

At, liene isto, sanguis niger a sinistra parte prorumpit: praecordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens originatur: dolor ad jugulum, sicut jocinore vulnerato, venit.

13. *Signa percussae vulvae.*

At, cum vulva percussa est, dolor in inguinibus, & coxis, & feminibus est: sanguinis pars per vulnus, + pars per naturam descendit: vomitus bilis insequitur. Quaedam obmutescunt: quaedam mente labuntur; quaedam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quae corde vulnerato, patiuntur.

14. *Signa percussi cerebri, vel membranae ejus.*

Si cerebrum membranave ejus vulnus accepit,

I. 9. M. F. P. latus. I. 9. M. F. P. intentum. I. 12. M. F. renium. I. 24. M. F. P. om. in. I. 25. M. P. F. femoribus. I. 26. M. P. naturale. I. 31. M. F. P. tandem. I. 34. M. F. P. fin.

accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis & vomitus insequuntur: quorumdam sensus obtunduntur, appellati que ignorant: quorumdam trux vultus est: quorundam oculi, quasi resoluti, huic illucque moventur: fereque tertio, vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nervi & distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. *Signa stomachi percussi.*

Ubi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequuntur: si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescunt: sudores tenues oriuntur; per quos extremae partes frigescunt.

20. *Signa jejunii intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.*³

Communes vero jejunii intestini & ventriculi vulnerati notae sunt. Nam cibus & potio per vulnus exirent: praecordia indurescant: nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Caetera intestina icta vel sterlus &, vel odo rem ejus exhibent.

25. *Signa percussae medullae, quae in spina est.*

Medulla vero, quae in spina est, discisa, nervi resolvuntur, aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo fine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam sterlus excernunt.

18. *S.*

I. 6. M. F. P. huc atque illuc. I. 10. M. F. P. deligatum. I. 15. M. F. P. singultus. I. cad. M. F. ea. I. 29. M. F. P. discissa.

¹ Aph. VI. 50. Aeginet. VI. 88. Hippoc. Coac. Not. III. 383, 384. ² Aegin. VI. 90. ³ Aeginet. VI. 88. ⁴ Valleriola Obs. L. II. Obs. 9.

18. *Signa septi transversi percussi.*

At, si septum transversum percussum est, praecordia fursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

19. *Signa vesicae vulneratae.*

Vesica vero vulnerata, dolent inguina: quod super pubem est, intenditur: pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaque aut 10 bilem vomunt, aut singultiunt: frigus, & ex eo mors sequitur.

20. *Desanguine, & sanie, & pure, & eorum species: quandoque meliora, deterioravae sint.*

His cognitis, etiamnum quaedam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus 20 crassissimum albidiissimumque, glutinosus & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. Pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Rursus 25 & sanies & pus quasdam species Graecis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies, quae vel ιχνε, vel μελιτη nominatur. Est pus, quod ιλαίδης appellatur. Ιχνε tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi, nervo laeso, inflamatio secuta est. Μελιτη crassior est, glutinosior, & subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur haec quoque ex malis ulce-

I. 9. M. F. P. Aut. I. 28. M. F. hydrops. I. ead. P. μελιτησια. vi. melitera. I. 30. M. F. hydrops. I. 32. ιχνεσια. M. melitera. I. ead. M. F. P. om. ejcl. I. 33. M. F. P. & glutinosior.

I Mercurial. Variar. Lect. IV, 12.

ulceribus, ubi nervi circa articulos laesi sunt; & inter haec loca, maxime ex genibus. *Eλαστερ* tenue, subalbidum, quasi unguinosum colore, atque pinguitudine 5 oleo albo non dissimile appetet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus est autem sanguis, nimium aut tenuis, aut crassus; colore vel lividus, vel niger; aut pituita mixtus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemque postea spes in his major est, ex quibus melioris generis quaeque proveniunt. 10 Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae ipsum ulcus, & junctam ei cutem erodit. Melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. *Ιχαρ* autem pejor est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui que caetera omnia contraria prioribus habet. Melicera 15 autem mala est, multa, & percrassa: melior, quae & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoque pejus est, multum, tenue, dilutum; magisque, si ab initio tale est; itemque, si colore 20 fero simile, si pallidum, si lividum, si faeculentum. Praeter haec, si male olet; nisi tam locutus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius: itemque, si laeve est, si nihil olet, si 25 aequa-

82, 14:

321, 20:

I. 4. M. F. P. ~~metum~~. I. 17. M. F. P. quae & ipsum.
 I. 19. M. F. P. om. est. I. 20. M. F. hydrops. I. 23.
 M. F. P. qui. I. 24. P. meliceria. M. melitera. I. 30.
 M. F. P. faeculentum est.

T

aequale est. Modo tamen, convenire & magnitudini vulneris, & temporis debet. Nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. ^{Ἐλαττό-}
^{δε} quoque pejus est multum, & parum ⁵ pingue: quo minus autem, quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

21. *Curatio adversus profusionem sanguinis
in vulneribus.*

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatione interimat. Si profusionem timemus (quod ex sede vulneris, & ex magnitudine ejus, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest) siccis linamentis vulneris implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua ² frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, saepius linamenta mutanda sunt. Et, si sicea parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem suppressandum est: ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rufus metus subest; ne, nimis valenter ibi retenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quae res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, (quamvis pleraque ex his sanguinem suppressimunt) sit utendum: sed, si semel ad ea decurritur, his potius, quae mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venae, quae sanguinem fundunt, appre-

I. 6. M. F. P. etiam. I. 13. Vir doctus in margine codicis scripsit interveniat. M. F. P. om. interimat. I. 14. M. F. P. om. ex. I. 27. M. F. om. ut. I. 30. M. P. sit utendum. I. 32. M. F. P. om. bis.

¹ Aeginet. IV. 53. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II. 51.

² Frigidam potui exhibet Aëtius Terr. I. Serm. III. c. 145. Cels. P. 204, 31.

apprehendendae , circaque id , quod ictum est , duobus locis diligendae intercidendaeque sunt , ut & in se ipse coēant , & nihilominus ora praeclosa habeant . Ubi ne id quidem res patitur , possunt ferro candenti aduri . Sic etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco , quo neque nervus , neque musculus est , utputa in fronte , vel superiore capitinis parte , commodissimum est , cucurbitulam 10 admoveare adversa parte , ut illuc sanguinis cursus revocetur .

22. *Curationes adversus vulnerum inflammationem.*

Et adversus profusionem quidem in his auxilium est : adversus inflammationem autem , in ipso sanguinis cursu . Ea timeri potest , ubi laesum est vel os , vel nervus , vel cartilago , vel musculus , aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit . Ergo 20 quoties quid tale erit , sanguinem mature suppressore non oportebit ; sed pati fluere , dum tutum erit , adeo ut , si parum fluxisse videbitur , mitti quoque ex brachio debeat ; utique , si corpus juvenile , & robustum , & 25 exercitatum est : multoque magis , si id vulnus ebrietas praecessit . Quod si musculus laevis videbitur , praecidendum erit . nam percussus , mortiferus est : praecisus , sanitatem recipit .

30 23. *De glutinatione vulnerum.*

Sanguine autem vel suppresso , si nimius erumpit ; vel exhausto , si per se parum fluxit ; longe optimum est , vulnus glutinari . Potest autem id , quod vel in cute , vel

I. 6. M. F. P. sed. I. 9. M. F. P. commodissimum tamen est. I. 10. M. F. P. a diversa. I. 34. M. P. vel quod.

vel etiam in carne est ; si nihil ei praeterea mali accedit. Potest caro , alia parte dependens , alia inhaerens ; si tamen etiamnum integra est , & coniunctione corporis fovetur.

In his vero , quae glutinantur , duplex curatio est . Nam si plaga in molli parte est , sui debet : maximeque , si discissa auris ima est , vel imus nasus , vel frons , vel bucca , vel palpebra , vel labrum , vel circa guttur cutis , vel venter . Si vero in carne vulnus est , hiatque , neque in unum orae facile attrahuntur , futura quidem aliena est : imponendae vero fibulae sunt (*αντηρες* Graeci nominarunt) quae oras , paulatim tamen , contrahant ; quo minus lata postea cicatrix sit.

Ex his autem colligi potest , utrum id quoque , quod alia parte dependens , alia inhaerebit , si alienatum adhuc non est , futuram , an fibulam postulet . Ex quibus neutra ante debet imponi , quam intus vulnus purgatum est : ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur . Id enim & in pus vertitur , & inflammationem movet , & glutinari vulnus prohibet . Ne linamentum quidem , quod supprimendi sanguinis causa inditum est , inibi relinquendum est . nam id quoque inflamat .

Comprehendi vero futura , vel fibula , non cutem tantum , sed etiam aliquid ex carne , ubi suberit haec , oportebit ; quo valentius haereat , neque cutem abrumpat . Utraque optima est ex ¹* acia molli , non nimis torta , quo mitius corpori insideat . Utra-

I. 6. M. F. P. om. eft. I. 14. M. F. P. nominant. I. ead. M. F. P. paulum. I. 17. M. F. P. om. utrum. I. 34. M. F. P. infidat.

¹ De ea librum scripsit Joan. Rhodins. Turneb. Advers. XVII; 21. * H.F. ab Aquapendente , Oper. Chirurg. P. 1. c. 17. pag. 70. Salmahus Epist. 45. & 49.

Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra injicienda est. Si nimis rara est, non continet; si nimis crebra est, vehementer afficit; quia, quo saepius acus corpus transfigit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammations oriuntur; magisque aestate. Neutra etiam vim ullam defiderat: sed ea haec tenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Fere etiam fibulae latius vulnus esse patiuntur: futura oras jungit, quae ne ipsae quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quod intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet.

Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex¹ aceto expressa. Si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum est. Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea, quocunque modo imposita est, dum madet, prodest: itaque, ut inarefcat, non est committendum. Licitque sine peregrinis, & conquifitis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex his, quae cruentis vulneribus apta esse proposui: maximeque si caro est, Barbarum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est: eminentibusque partibus

290, 21.

204, 16.

268, 269.

260.

16.

268.

264, 32.

I. 4. M. F. transfigit. Ita Caesarius in margine. I. 10. M. P. tamen. I. 13. M. P. quid. I. 14. M. quia. I. 23. M. P. inhaerefcat. I. 32. P. Polybii.

¹ Maledictam methodum dicit Ettmuller in Comment. ad Schrod. & Morell. pag. 408.

bus ea, quam Graeci *πύρισσαν* vocant.

Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire; nisi musculi, nervique juxta sunt, quos incidi non expedit. ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At, si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet; adhibenda sunt ea, quae 10 humorem leniter extrahant; praeципueque ex his, id, quod *πυρᾶδες* vocari proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus est grave, impositum, quo id juvetur, infra super circumdare lanam succidam ex accerto & oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. *Quomodo vulnus ligari conveniat.*

Fascia vero ad vulnus deligandum linea aptissima est: eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paululum utrinque oras ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si aequa ab utraque, transverse 25 comprehendere oras debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utramque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & contineat, nec adstringat, quod non continetur; elabitur: quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme saepius fascia circuire debet: aestate, quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus acu 30 assuen-

I. 1. P. *Πάττυσσαν*. M. *Rhaptus am.* I. 2. Vir doctus enim. I. 5. M. F. P. *sunt.* I. 6. M. F. *deductum.* I. 8. M. bis is. I. ead. M. F. *deductum.* I. 20. M. F. P. *lintera.* I. 22. M. F. P. *paulum.* I. 23. M. F. P. *utrinque etiam oras ejus.* Vit doctus, etiam ultra oras ejus. I. 25. M. F. P. *transversa.* I. 30. M. F. P. *neque.* I. 32. *cancro.* Vir doctus *Gangraena*, potius legendum putat.

assuenda est, nam nodus vulnus laedit. nisi tamen longe est.

Porro neminem decipi decet, ut propriam viscera curationem requirant, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel sutura, vel alio medicinae genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid aut ex jocinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, id praecidatur. Alioquin vulnus interior ea vietus ratio eaque medicamenta sanabunt, quae cuique visceri convenire superiore libro propofui.

25. *Quomodo vulnerato agendum sit.*

15 His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: isque si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patientur, ante inflammationem, cibo debet: bibere, donec sitem finiat, aquam calidam, vel, si aestas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis aestimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem 25 scilicet, & exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis interrorientes ante ullam curationem vino reficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum vulneri est.

30 26. *De notis vulnerum.*

Nimis vero intumescere vulnus, periculum: nihil intumescere, periculosisimum est. illud indicium magnae inflammationis: hoc, emortui corporis est. Pro-

tinus

299, 21.

I. 1. M. F. P. *ulcus.* *I.* 3. M. F. P. *illo.* *I.* 4. M. F. P. *requirat.* *I.* ead. M. F. P. *viscerum.* *I.* 8. M. P. *aut si quid.* *I.* 10. M. F. P. om. *id.* *I.* ead. F. *alioqui.* *I.* 14. M. F. P. *De ratione vietus & notis vulnerum;* *curationibusque eorum.* *I.* 18. M. F. P. *inflammationem, a cibo.* *I.* 20. M. F. P. om. *ac.* *I.* 22. M. P. *viribus.* *I.* 30. M. F. P. om. *De notis vulnerum.* *I.* 33. M. F. P. *indicium est magnae.* *I.* 34. M. F. P. om. *est.*

¹ Athen. Deipn. L. 1. c. 8. p. 10. ² Aph. V. 66. ³ II. Epidem. III. 128.

tinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnerum sanum fore. At ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnera, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciosa est, 5
 quae vel levi vulneri supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum ¹ rigorem aut distensionem, quae ex vulnera orta est, ea non finit. Vomitus quoque biliosus non 10
 voluntarius, vel protinus, ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum 15
 est; praecipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

52, 18.

287, 2.

27. *De curationibus vulnerum.*

20

² Biduo sic vulnero habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies + ex aqua frigida est, eademque rursus injicienda sunt. Quinto jam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto vulnero, considerandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnerum esse, idque, quandocunque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vulnerum, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi haec sine dolore, tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vul-

I. 3. M. F. P. Ac. I. 8. M. F. P. rigor. I. 9. M. F. P. diffentio. I. ead. M. F. P. eam. I. 20. M. F. P. om. De curationibus vulnerum. I. 31. M. F. P. ulcer.

¹ Aph. IV. 57. II. 26. ² De Fractur. XXXIII. 5.

vulnus , aut leviter intumuit , eadem sunt imponenda , quae primo fuerunt.

Si gravis inflammatio est , neque glutinandi spes est , neque movetur , aquae quoque calidae necessarius usus est , ut materiam digerat ; & duritiam emoliat , & pus citet. Ea sic temperanda est , ut manu contingenti jocunda sit ; & usque eo adhibenda , donec aliquid minuisse ex tumore ca-
loremque ulceri magis naturalem reddisse videatur. Post id fomentum , si late plaga non patet , imponi protinus emplastrum debet , maximeque , si grande vulnus est , tetrapharmacum : si in articulis , digitiis , locis cartilaginosis , *per se*. At si latius hiat , idem illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet , eoque inlita finimenta disponi per plagam : deinde emplastrum supra dari , & super id lanam succidam ; minusque etiam , quam primo , fasciae adstringendae sunt.

294, 12.

28 *Curationes propriae articulorum.*

Sed propria quedam in articulis visenda sunt. In quibus si praecisi nervi sunt , qui continebant , debilitas ejus partis sequitur. Si id dubium est , & ex acuto telo plaga est , & ea transversa , commodior est : & si ex retuso & gravi est , nullum in figura discernere est : at videndum est , pus supra articulum , an infra nascatur. Si sub eo nascitur , albusque & crassum diu fertur , nervum praecisum esse credibile est : magisque , quo majores dolores inflammationesque , & quo maturius excitatae sunt. Quamvis autem

T 5 non

*I. 1. M. F. leniter. I. 4. M. F. P. eaque pus moveant. I. 5. M. F. r. ut & materiam. I. 7. M. P. ut & manu. I. 8. M. F. P. om. & I. 11. M. F. P. *per se*. Post id fomentum , si late plaga non patet , imponi protinus emplastrum debet. I. 15. M. F. P. & I. 16. M. F. P. om. idem. I. 23. M. F. P. om. sed. I. ead. M. F. P. proprie. I. 27. M. F. P. om. & M. F. om. ex. I. 29. M. F. P. visendum. I. 32. M. F. P. magis quoque. I. 33. Vir doctus : si maturius excitatae sunt. I. 33. M. F. P. om. &.*

1 Aph. V. 22. 2 Coac. Praen. III. 385. I. de Morb. III. 2.

non abscissus nervus est; tamen, si circa durus tumor diu permanet, necesse est, & diuturnum ulcus esse, & sanato quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tarde membrum id vel extendatur, vel 5 contrahatur. Major tamen in extendendo

257, 33. mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est; quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod iustum est, ratione certa 10 debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit: si jam pus profluit, ut devexum sit.

248, 21. Optimum etiam medicamentum, ¹ quies 15 est. Moveri, & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen periculosum his est, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit, femine, aut 20 crure, aut pede laborante. Locus, in quo cubat, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum vultus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & tumidum & sordidum reddit. Ex quibus ad cancerum 25 transitus esse consuevit. Lenis fricatio recte adhibetur; sed his partibus, quae longe absunt à vulnere.

29 *Vulnus quomodo purgandum est.*

Inflammatione finita, vultus purgandum est. Id optime faciunt tintæ in melle linamenta: supraque id emplastrum vel πτεροφάρμακον vel ινεαφάρμακον dandum est. Tum demum vero purum ulcer est, cum

I. 3. M. F. P. fano. I. 5. M. F. P. om. vel. I. 12. M. F. om. in. I. 18. M. om. in. I. 22. M. F. P. cubabit. I. ead. M. P. debet. I. 24. M. P. humidum. I. 26. M. F. P. levius. I. ead. M. F. P. frictio. I. 27. M. F. P. longius. I. 32. M. F. P. om. vel πτεροφάρμακον. I. 34. M. parum.

¹ Hippocrat. de Ulcer. T. 11. 3.

cum rubet , ac nimium neque siccum , ne-
que humidum est. At , quocunque sensu
caret , quod non naturaliter sentit : quod
nimium aut aridum aut humidum est ;
5 quod aut albidum , aut lividum , aut nigrum
est ; id purum non est.

30. *Quonodo vulnus implendum est.*

Purgato vulnere , sequitur , ut impleatur ;
iamque calida aqua eatenus necessaria est ,
10 ut sanies removeatur. Lanae succidae su-
pervacuus usus est : lota melius circum-
datur. Ad implendum autem vulnus profi-
ciunt quidem etiam medicamenta aliqua :
itaque ea adhiberi non alienum est : ut bu-
15 tyrum cum rosa , & exigua mellis parte ;
aut cum eadem parte mellis aut cum eadem
rosa , ~~περοφάγων~~ ; aut ex rosa linamen-
ta. Plus tamen proficit balneum rarum.
Cibi boni succi ; vitatis omnibus acribus.

20 Sed jam plenioribus , avis , & venatio , &
fuilla elixa dari potest. Vinum omnibus ,
dum febris , dum inflammatio est , alienum
est : itemque usque ad cicatricem , si nervi ,
musculive vulnerati sunt ; etiam , si alte caro.

25 At , si plaga in summa cute generis tutioris
est , potest non pervetus , modice tamen da-
tum , ad implendum quoque proficere. Si
quid molliendum est , quod in nervosis lo-
cis , musculosisque necessarium est , cerato

30 quoque super vulnus utendum est. At , si
caro supercrevit , modice reprimit siccum
linamentum ; vehementius , squama aeris.
Si plus est , quod tolli opus est , adhibenda
funt etiamnum vehementioria , quae corpus
exedant.

295, 284

*I. 2. M. P. Ac. I. 5. M. F. P. quod aut pallidum aut.
I. 8. M. F. P. om. vulnere. I. 15. M. F. P. is. I. 16.
M. F. P. om. mellis. I. 20. M. F. P. plenioribus , nam
& avis. I. 25. M. F. P. ait.*

exedant. Cicatricem, post omnia haec, com-mode inducit lycium ex passo aut lacte dilutum; vel etiam per se impositum sic-cum linamentum vehementius.

31. *De ulceribus, quae extrinsecus per vulnera 5
incidunt, curationibusque eorum.*

Hic ordo felicis curationis est. Sed quae-dam tamen periculosa incidere consue-runt. Interdum enim vetustas ulcus occu-pat, induciturque ei callus, & circum orae 10
^{331, 411.} crastae livent. Post quae, quicquid medi-camentorum ingeritur, parum proficit; quod fere negligenter curato ulceri super-venit.

Interdum vel ex nimia inflammatione, 15
^{294, 31.} vel ob aestus immodosos, vel ob nimia fri-gora, vel quia nimis vulnus adstrictum est,
^{533, 31.} vel quia corpus senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus a Graecis diductum in species est, nostris vocabulis 20 non est. omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupavit; sed etiam fer-pit: deinde aliis aliisque signis discernitur. Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit, isque cum dolore procedit: 25
ἰπεινῖας Graeci nominant: modo ulcus nigrum est, quia caro ejus corrupta est, id-que vehementius; etiam in putrescendo inten-ditur, ubi vulnus humidum est, & ex nigro ulcere humor pallidus fertur, mali-30 que odoris est, & caro intus corrupta: interdum etiam nervi ac membranae resol-vuntur, specillumque demissum descen-dit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio non-

I. 1. M. F. exedunt. I. 4. M. F. P. ignorant vehementius.
I. 5. M. F. vulneribus. I. 18. M. F. P. corpus aut senile.
I. 18. M. F. P. om. in. I. 31. M. F. P. carunculaeque
corruptae.

¹ In principio difficillime cognoscitur teste Galeno M. M.XIV. Vide Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 1. Obs. 1.

nonnunquam os afficitur: modo oritur ea,
quam Graeci ~~γένεται~~ appellant.

303.

Priora in qualibet parte corporis sunt:
haec in prominentibus membris, id est, in
5 inter ungues, & alas, vel inguina; fereque in
senibus, vel in his, quorum corpus mali
habitus est. Caro illi ulceri vel nigra, vel
livida est; sed sicca & arida, proximaque
cutis, plerumque subnigris pustulis impletur;
10 deinde ei proxima, vel pallida, vel livida fere-
que aeruginosa & sine sensu est. Deterior
in inflammatione est, omniaque ea simul fer-
punt: ulcus, in locum pustulosum: Pustulae,
in eum, qui pallet aut livet: pallor aut livor,
15 in id quod inflatum est: inflammatio,
in id quod integrum est, transit. Inter haec
deinde febris acuta oritur, ingensque sitis:
quibusdam etiam delirium accedit: alii,
quamvis mentis suae compotes sunt, bal-
20 butiendo vix sensus suos explicant, incipit
affici stomachus: fit foedi spiritus ipse odo-
ris. Atque initium ejus quidem mali reci-
pit curationem: ubi vero penitus insedit,
insanabile est. plurimique sub frigido fudo-
25 re moriuntur.

51, 30.

32. *Curatio veteris ulceris.*

Ac pericula quidem vulnerum haec sunt.
Vetus autem ulcus scalpello circumcidendu-
m est, excidendaque ejus orae, &, quie-
30 quid super eas livet, aequa incidentum. Si
varicula intus est, quae id sanari prohibet,
ea quoque excienda. Deinde, ubi san-
guis emissus, novatumque vulnus est, eadem
curatio adhibenda, quae in recentibus vul-
neri

1. 1. M. F. P. nonnunquam quoque os. 1. 3. M. F. P. prio-
res. 1. 4. M. F. P. hoc. 1. 6. M. P. om. in. 1. 7. M. P. F.
in ulcere. 1. 11. M. F. P. rugosa. 1. ead. M. F. P. ulti-
mior. 1. 20. M. F. P. balbutiendo tamen vix. 1. ead. M.
suos os explicant. P. ore 1. 21. F. foedus. M. foedius. 1.
26. M. F. P. om. veteris. 1. 28. F. concidendum. P. inci-
dendum. M. conjiciendum. 1. 31. M. F. P. his.

neribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit: &, cum ulcus sub eo exesum est, id, quo cicatrix inducitur.

33. *Curatio Erysipelatum.*

Id autem, quod ἐρυθρίτης vocari dixi, non solum vulneri supervenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interduin periculum magnum adfert; utique, si circa cervicem aut caput constitit

Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimenta & refrigerantia; maximeque cerusam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluviatili exceptam; aut ex eadem aqua subiectam farinam cupresso adjecta, aut, si tenerius corpus est, lenticula. Quicquid impositum est, betae folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo: sulphuris p. I. *. cerussae, croci, singularum p. x. *. eaque cum vino contredenda sunt, & id his illinendum: aut, si durior locus est, solani folia contrita suillae adipi miscenda sunt, & illinita linteolo superinjicienda.

At, si nigrities est, quae nequedum serpit, imponenda sunt, quae carnem putrem lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic, ut caetera, nutriendum est. Si magis putre est, jamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne haec quidem evincunt, aduri locus debet, donec nul-

I. 5. M. P. Erysipelarum. I. 9. M. F. P. majus. I. 10. M. F. P. cervices. I. 15. M. F. pluviali. I. 17. M. F. P. lenticulari. I. 22. M. F. P. x. I. cad. M. P. cerussae, & croci. I. 23. M. P. xx. I. 26. F. M. P. illita. I. 28. M. F. P. om. quae.

¹ Aëtius Tetr. IV. Serm. II. c. 59. Aeginet. IV. 21.

² Oribas. de Morb. Curat. III. 47. 3 Aph. VII. 20.

nullus ex eo humor feratur. nam quod sanum est, siccum est, cum aduritur. Post ustionem putris ulceris, superponenda sunt, quae crustas a vivo resolvant: *amara*
5 panca Graeci nominant. Ubi exciderunt, purgandum ulcus, maxime melle & resina est. Sed iis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

10

34. Curatio Gangraenae.¹

Gangraenam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficultum est; utique in corpore juvenili; & magis etiam, si musculi integri sunt; si nervi vel laesi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nuditus est; aut carnis in eo loco paululum est, ideoque non multum quod putreficeret, fuit, consistitque uno loco vitium; quod maxime fieri in digito potest. In ejusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde, quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque ad sanum corpus

25 concidere.

Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quae pus movere consuerunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimentia, 30 aliena sunt; sed his quam levissimis opus est. superque ea, quae inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihil magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.

Prae-

*I. 4. M. F. P. eas escharas. I. 5. M. F. P. vocant.
 I. 7. M. F. P. alii. I. 17. M. F. P. paulum. I. 19. M. F. eo. I. 24. M. F. eo.*

¹ Aeginet, IV. 19.

Præcipueque in hoc casu petendum, non a medicamentis solum, sed etiam a vi-
ctus ratione præsidium est. Neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corpo-
ris est. Ergo primo, nisi imbecillitas pro-
hibet, abstinentia utendum. Deinde danda,
quae per cibum potionemque alvum, 5
ideoque etiam corpus adstringant; sed ea levia.
Postea, si vitium constitit, imponi super
vulnus eadem debent, quae in putri ulcere
præscripta sunt. Ac tum quoque pleniori-
bus cibis uti licebit ex media materia; sed
tamen non nisi alvum, corpusque fiscantibus:
aqua vero pluvialili frigida. Balneum,
nisi jam certa fiducia redditæ sanitatis est, 15
alienum est; si quidem emollitum in eo ul-
cus cito rursus eodem malo afficitur. Sol-
lent vero nonnunquam nihil omnia auxilia
proficere, ac nihilominus serpere sub his
cancer. Inter quae miserum, sed unicum, 20
auxilium est; ut caetera pars corporis tuta
sit, membrum, quod paulatim emoritur,
abscindere.

35. *Curatio vulnerum, ubi quid collisum est,*
aut detritum; aut infixum.

Hæ gravissimorum vulnerum curationes
sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi
interior pars collisa; aut ubi derisum, de-
tritumve aliquid est; aut ubi surculus cor-
pori infixus est; aut ubi tenue, sed altum 30
vulnus insedit.

In primo casu commodissimum est ma-
liciorum ex vino coquere, interioreunque
ejus partem continere, & cerato miscere

ex

I. 12. M. F. P. sic. I. 14. M. F. pluviali. I. 16. M.
F. P. vulnus. I. 19. M. F. P. om. sub. I. 24. a M. F. P.
haec absunt: *Curatio vulnerum, ubi quid collisum est,*
aut detritum, aut infixum. I. 27. M. F. ubi integra cute
interior. I. 28. M. F. collisa est; aut. I. 29. M. P. F.
attritumve. I. 33. M. interiorumque. I. 34. M. F. P.
conterere.

ex rosa facto, idque superponere: deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, qualis $\lambda\alpha\delta\delta\gamma$ est.

267, 9:

Deraso vero, detritoque, imponendum est emplastrum $\tau\epsilon\gamma\phi\theta\zeta\mu\pi\gamma$, minuendusque cibus & vinum subtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores iectus, contemnendum erit; siquidem ex ejusmodi casibus saepe cancri fiunt. Quod si levius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento.

Surculum vero, si fieri potest, oportet vel manu, vel etiam ferramento educere. Si vel praefractus est, vel altius descendet, quam ut ita fieri possit, medicamento evocandus est. Optime autem educit superimposita arundinis radix; si tenera est, protinus contrita; si jam durior, ante in malso decocta, cui semper mel adjiciendum est aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex surculis, arundo est; quia aspera est. Eademque offensa etiam in silice est. Sed usu cognitum est, utramque adversus alteram medicamentum esse, si contrita ac superimposita est. Facit autem idem in omnibus surculis, quodcumque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratii: huic Hecataei emplastrum maxime convenit.

264

36. *Quomodo cicatrix vulneri inducenda, purgandaque sit.*

Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est (quod per-

pur-

I. i. M. P. supponere. I. 3. M. P. quale. I. 13. M. F. P. ejicere. I. 24. M. F. P. om. ac.

t Aeginet. IV. 45.

purgatis jam , repletisque ulceribus neces-
farium est) primum ex aqua frigida lina-
mentum , dum caro alitur : deinde cum
jam continenda est , siccum imponendum
est , donec cicatrix inducatur : tum deligari 5
super album plumbum oportet , quo & re-
primitur cicatrix , & colorem maxime fa-
no corpori similem accipit . Idem radix
silvestris cucumeris praefstat . Idem com-
positio , quae habet elaterii p. I. *. spumae 10
argenti p. II. *. glandis unguentariae pondo
IV. *. quae excipiuntur resina terebinthina ,
donec emplastrum crassitudo ex omnibus fiat .
At nigras quoque cicatrices leniter pur-
gant , paribus portionibus mixta , aerugo 15
& plumbum elotum , eademque resina co-
cta ; sive eo ungitur cicatrix , quod in facie
fieri potest ; sive id ut emplastrum imponi-
tur , quod in aliis partibus commodius . est .

At , si vel excrevit cicatrix , vel concava 20
est , stultum est , decoris causa , rursum &
dolorem & medicinam sustinere : alioquin
res utriusque succurri patitur . Siquidem ultra-
que cicatrix exulcerari scalpello potest . Si
medicamentum aliquis mavult , idem effi- 25
ciunt compositiones hae , quae corpus exe-
dunt . Cuta exulcerata , super eminentem
carnem exedentia medicamenta conjicien-
da sunt : super concavam , implentia : do-
nec utrumque ulcus fanae cuti aequetur , & 30
tum cicatrix inducatur .

I. 11. M. F. P. ignorant *glandis*. I. ead. M. F. P.
unguenti. I. 14. M. F. P. *Ac.* I. 16. M. F. P. om. &
I. ead. M. F. P. *rosa*. I. 17. M. F. P. om. *eo*. I. 21.
M. F. P. *rursum*, I. 29. F. *eae*.

C A P. XXVII.

*De vulneribus, quae per morsus inferuntur
eorumque curationibus.*

5 **D**I XI de his vulneriōis, quae maxime per tela inferuntur. † Sequitur, ut de his dicam, quae morsu fūnt, interdum ¹ hominis, ² interdum simiae, saepe canis, nonnunquam ferarum, aut aliorum animalium, aut serpentium. Omnis autem 10 † ferae morsus habent quoddam virus.

Itaque, si vehemens vulnus est, ³ cucurbitula admovenda est: si levius, protinus emplastrum injiciendum, praecipueque Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, 15 quae adversus morsus proposui. si ea non sunt, viride Alexandrinum; si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his, quae recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoque his, praecipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est, si aridus vulneri imponitur, superque id duobus digitis verberatur. Exsanitat enim. Ac salfamentum quoque recte super id vulnus deligatur.

25 2. Curatio adversus rabiosi canis morsum. *

Urtique autem, si rabiosus canis fuit, cucurbitula virus ejus extraēendum est. Deinde, si locus neque nervosus, neque musculosus est, vulnus id adurendum est. 30 Si uiri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum ustō quidem vulneri superimponenda, quae caeteris ustis sunt. Ei vero, quod expertum ignem non est,

263,

264,

1. 9. M. F. P. ferorum. 1. 14. M. F. P. Diogeni. 1.
21. M. F. P. manus.

1 Dom. Panarolus Pentec. 11. Obs. 32. 2 Seren,
Samm. XLV. 3 Aeginet. V. 2. 4 Aeginet. V. 3.
Actuar. M. M. VI. 11.

est, ea medicamenta, quae vehementer exedunt. Post quae nullo novo magisterio, sed jam supraposito vulnus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt; eumque ibi patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vulnera aperto; quo magis ex eo quoque virus distillet: deinde multo meracoque vino excipiunt. quod omnibus venenis contrarium est. Id que cum ita per triduum factum est, tutus esse homo a periculo putatur.

Solet autem ex eo vulnera, ubi parum occursum est, aquae timor nasci. *ιδροφολίας* Graeci appellant. Miserrimum genus morbi: in quo simul aeger & siti & aquae metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non ante ei provisam projicere, &, si natandi scientiam non habet, modo mersum bibere pati, modo attollere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquae metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, a piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum ² autem (praecipue id, quod primo loco posui; ubi id non est, aliud) si nondum aeger aquam horret, potui ex aqua dandum est: &, si amaritudine offenditur, mel adjiciendum est: at, si jam is morbus occupavit, per catapotia sumi potest.

275.

3. Cu-

I. 3. M. F. P. ulcer. I. 6. M. F. P. ibique. I. 7. M. F. P. ulcere adaperto. I. 12. M. F. P. violetur. I. 14. M. P. tumor. I. ead. hydrophlogas. I. 33. M. F. P. &c.

¹ Cassii Problem. 73. ² Scribon. Larg. c. XLIIIB. c. 171.

3. *Curationes communes adversus omnes
morsus serpentium.*

Serpentum quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant : quamvis in ea multum antiqui variarunt ; adeo ut in singula anguum genera singula medendi praeciperent ; aliique alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis supra vulnus id membrum deligandum est : non tamen nimium veherenter , ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est , ante scalpello circa vulnus incidere , quo plus vitiati jam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est , (quod tamen vix incidere potest) tum quodlibet simile vas , quod idem possit. Si ne id quidem est , homo & adhibendus est , qui vulnus exsugat.

Neque hercule scientiam praecipuam habent hi , qui & † Psylli nominantur ; sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis , ut quaedam etiam venatoria venena , quibus Galli praecipue utuntur , non gustu , sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur : ictus ejus occidit , & si stupente ea (quod per quaedam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit , neque percussus est , nulla in ejus saliva noxa est. Ergo quisquis , exemplum Psylli secutus , id vulnus exsuxerit , & ipse tutus erit , & turum hominem praefabit. Illud interea ante debebit attendere , ne quod in gingivis , palato , aliave parte

l. 6. M. F. P. om. adeo. l. 7. M. P. medendi genera praecciperent. l. ead. M. F. P. atque aliis. l. 9. M. F. P. super. l. 20. M. P. Hercules. l. 30. M. F. P. ea. l. 33. M. F. P. ne intereat,

1 Aetii Tetrab. IV. Serm. 1. c. 1. 2. & seqq. 2 Aegip. V. 2. Actuar. M. M. VI. 11. 3 Vocantur alio nomine Marfi. Vido Reines. Variar. Lect. 1. c. 8. p. 26.

te oris ulcus habeat. Post haec is homo loco calido collocandus est, sic, ut id, quod percussum erit, in inferiore partem inclinetur.

Si neque qui exsugat, neque cucurbitula est, forbere oportet jus anserinum, vel 5 vitulinum, & vomere. Vivum autem gal-

linaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere sic, ut pars interior corpori jungatur. Fa-

cit id etiam hoedus agnusve discissus, & 10 calida ejus caro statim super vulnus im-

posita. Emplastrum quoque, quae supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel 15

265. Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Praesensque in aliquo antidoto praescidium 15

est. Sin id non est, necessarium est exfor-

bere portionem meri vini cum pipere, vel

quidlibet aliud, quod calor movendo est,

nec humorem intus coire patitur. nam ma-

xima pars venenorum frigore intermit. 20 Omnia etiam urinam moventia, quia ma-

teriam extenuant, utilia sunt.

4. *Speciales curationes adversus ictus serpentium:*
& primo adversus ictum Apidis.

Haec adversus omnes ictus utilia sunt, 25

cumuniaque: usus tamen ipse docuit,

cum, quem ² Aspis percussit, acetum potius

bibere debere. Quod demonstrasse dicitur

casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus

effet, & partim ob ipsum vulnus, partim ob

immodicos aestus siti premeretur, ac locis

siccis alium humorem non reperiret, ace-

tum, quod forte secum habebat, ebibit, &

libera-

I. 6. M. F. P. vel ovillum vel vitulinum. I. 18. M. F. P. quo calor movendus eff. I. 19. M. F. P. ne. I. cad. M. P. patidur. I. cad. M. maxima. I. 25. M. F. P. om.

utilia. I. 26. M. F. P. communia: sunt.

¹ Aeginet. V. 18. Aënius Tetrab. IV. Serm. I. 20.

² De Apide videatur Ammian. Marcellin. L. XXII. Cap. 15. pag. 338. Ejus mortum sanari posse negat Aelian. de Animal. 1. Cap. 54.

liberatus est. Credo quoniam id , quamvis refrigerandi vim habet , habet tamen & dissipandi. Quo fit , ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissificem quoque intus humorem hominis ab codiscuti , & sic dari sanitatem.

5. *Adversus iictum Scorpionis.*¹

In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio ipse sibi pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt. Quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt. Quidam super prunas eo imposito , vulnus suffumigant , undique veste circumdata , ne is fumus dilabatur ; tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris (quam *ἀποτέλεσμα* Graeci vocant) semen , vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto , vel ruta silvatica recte imponitur , vel cum melle sal tus. Cognovi tamen medicos , qui ab scor pione iictis nihil aliud , quam ex brachio sanguinem miserunt.

25. 6. *Adversus Aranei & Scorpionis iictum.*

Ad scorpionis etiam , & ad aranei iictum , allium cum ruta recte miscetur , ex oleoque contritum superimponitur.

30. 7. *Adversus Cerastes , & Dipsadis , &*
*Haemorrhoidis iictum.*²

At , si cerastes , aut dipsas , aut haemorrhoidis percussit , asphodeli , quod AEgyptiae fabae magnitudinem aequet , arefactum in duas

1. 2. M. F. P. tamen habet etiam. 1. 10. M. F. P. sibi ipse. 1. 14. prunam. 1. 26. M. F. P. etiam. Et ad S. autem. 1. 29. M. F. P. Dipsae. 1. 32. M. F. spoli.

1 Aëtius Tetrab. IV. Serm. I. 19. 2 Aëtius Tetrab. IV. Serm. I. 16. Ex eo mors. Dom. Panarolus Pentec. 1. Obs. 45. 3 Describitur ab Aelian. de Animal. I. c. 57. Aëtius. 4 Tetrab. IV. Serm. I. 22. 23.

duas potiones dividendum est sic, ut ei rutae paululum adjiciatur. Trifolium quoque & mentastrum, & cum aceto panaces aequo proficiunt. Costumque, & cassia, & cinnamomum recte per potionem assumuntur.

8. *Adversus Cherydri iictum, & Cerastris.*

Adversus Cherydri vero iictum, panaces, aut lafer, quod sit scrupulorum p. 11. *. vel porri fucus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus sterlus caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita, melle adjecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerastes fecit, aequo valet.

9. *Adversus Phalangii iictum.* ²

Ubi vero phalangium ³ nocuit, praeter eam curationem, quae manu editur, saepè homo demittendus in solium est, dandus que ei myrrhae & uvae taminiae par modus ex passi hemina; vel radiculae semen, aut lolii radix ex vino; & super vulnus furfures ex aceto cocti; imperandumque, ut is conquiescat.

10. *Adversus iictus Italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.* ²⁵

Verum haec genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt; maxime, quae aestuosis gignuntur locis. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte 30 falubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis profiticit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel agrimonria, vel trixago, vel

I. 2. M. F. P. paulum. I. 6. M. F. P. chelydri. I. 7. M. F. P. Chelydri. I. 10. M. F. panacis. I. 18. M. F. P. redditur. I. 20. M. F. taminiae. I. 28. M. P. maximeque.

¹ Aëtius Terrab. IV. Serm. I. 35. ² Aëtius Terrab. IV. Serm. I. 18. ³ Salmasius in Notis ad Spartianu Hadrian. C. 20. pag. 190. Ed. Hackian.

vel personata, vel marinae pastinacae; si vel singulae binaeve tritae, & sic potui datae sunt cum vino, & super vulnera impositae. Illud ignorare non oportet, omnis serpentina 5 ictus & jejuni & jejuno magis nocere. ideoque perniciosissimi sunt, † cum incubant: utilissimumque est, ubi ex anguis metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpsit.

10 11. *Remedium generale adversus omnia venena, vel in cibo, vel in potionē assumpta.*

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potionē sumperferunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue ictū: ideo ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo 20 multo epoto vomere. Deinde, ubi praecordia exhausit, bibere antidotum: si id non est, vel merum vinum.

12. *Specialia remedia adversus quaedam venena, & primo adversus Cantharidas.*

25 Sunt tamen quaedam remedia propria adversus quaedam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet.

30 13. *Adversus Cicutam.*

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus: posteaque lafer ex vino dandum. Isque, si febre vacat, in cali-

I. 1. M. F. P. personina. I. ead. M. F. P. om. si vel. I. 2. M. F. P. om. sic. I. ead. M. F. P. cum vino, potui datae. I. 3. M. F. P. om. sunt. I. 4. M. F. P. ignorari. I. 5. M. F. perniciosissimae. I. 15. M. F. P. ita. I. 28. M. P. galbano. I. 31. M. F. cicuta.

1 Aeginet. V. 30. Scribon. Larg. LVII. Actuar. M. M. V. 12. 2 Aeginet. V. 41. Scribon. Larg. XLVII. Actuar. M. M. V. 12.

calidum balneum mittendus: si non vacat, ungendus ex calcifacientibus est. Post quae quies ei necessaria est.

14. *Adversus Hyoscyamum.*¹

Si hyoscyamus, fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asinimum.

15. *Adversus Cerussam.*²

Si cerussam, jus malvae, vel juglandis ex vino contritae, maxime profunt.¹⁰

16. *Adversus Sanguisugam, si epota est,*

& lac, quod intus coit.³

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut cum aceto laser.¹⁵

17. *Adversus Fungos inutiles.*⁴

Si fungos inutiles quis assumpsit, radicula aut e posca, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi vero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturae generare idonei fieri. Nam five ex oleo inferbuerunt, five piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.²⁰

18. *De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.*⁵

Adustis quoque locis extrinsecus vis infertur; itaque sequi videtur, ut de his dicam. Haec autem optime curantur foliis aut lili, aut linguae caninae, aut betae in vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum ad sanitatem perducit.³⁰

Sed dividi quoque curatio potest in ea, quae mediocriter exedentia reprimentia que,²⁵

I. 9. M. F. P. juglandis. I. 14. M. F. P. aut passum coagulum aut. I. 17. M. P. L. assumpserit. I. 18. M. F. P. L. epota. I. 21. Alii idonei sunt. I. 29. M. F. P. L. in vetere vi-
no. I. 34. Vir doctus exsiccantia.

1 Aeginet. V. 38. 2 Scribon. Larg. XLVII. 3 Aegi-
net. V. 36. Plin. H. N. XXII. 23. 4 Aeginet. V. 54.
Scrib. Larg. LXVI. 5 Aegin. IV. 11. Seren. Saman.
LX. Aetius Tetrab. IV. Serim. II. 64.

que, primo & pustulas prohibeant, & sum-
mam pelliculam exasperent: deinde ea,
quae lenia ad sanitatem perducant. Ex
prioribus est lenticulae cum melle farina:
5 vel myrra cum vino; vel creta cimolia
cum thuris cortice contrita, & aqua coac-
ta, atque, ubi usus necessitas incidit, aceto
diluta. Ex insequentibus, quaelibet ^{267.}
Sed idonea maxima est, quae vel plumbi
10 retrimentum, vel vitellos habet.

Est etiam illa adustorum curatio, dum
inflammatio est, impositam habere cum
melle lenticulam: ubi ea declinavit, fari-
nam cum ruta, vel porro, vel marrubio,
15 donec crustae cadant, tum ervum cum mel-
le, aut irim, aut resinam terebinthinam,
donec ulcus purum sit: novissime siccum li-
namentum.

C A P. XXVIII.

20 De interioribus ulceribus, quae, aliqua cor-
porum parte corrupta, nascuntur.

I. De carbunculo.

A b his, quae extrinsecus incident, ad
25 ea veniendum est, quae interius, cor-
rupta aliqua corporum parte, nascun-
tur. Ex quibus non aliud carbunculo
pejus. Ejus hae notae sunt. Rubor est, super-
que eum non nimium pustulae eminent,
maxime nigrae, interdum sublividae, aut
30 pallidae. In iis sanies esse videtur; infra co-
lor niger est. Ipsum corpus aridum, & du-
rius, quam naturaliter oportet. Circaque
quasi crusta est; eaque inflammatione cin-
gitur.

I. 4. M. F. P. L. vel. I. 5. M. F. P. L. om. vel. I. 10.
M. F. P. L. recrumentum. I. 13. M. F. L. farina. I. 22. M.
F. P. De carbunculo & ejus curatione. I. 28. F. M. eminet.
I. 30. M. P. jus. I. 32. M. F. P. circa quem.

¹ Aeginet. IV. 25. Actuar. M. M. II. 12. Oribas.
Synops. VII. 12.

gitur. Neque in eo loco levari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget. Nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit; interdum celerius, interdum tardius. Supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit; circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit.

Nihil melius est, quam protinus adure re. Neque id grave est, nam non sentit; quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde ulcus, sicut caetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crux: quae undique a viva carne diducta, trahit secum, quicquid corruptum erat: purusque jam sinus curari potest implantibus. At, si in summa cute vitium est, possunt succurrere quedam vel excedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodecumque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus a via corruptam partem resolvet.

Certaque esse fiducia potest fere, si undique vitiosa caro excidat, qua hujuscemodi medicamen exest: si id non sit, medicamentumque malo vincitur, utique ad ustionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit.

2. De

I. 15. M. F. P. vulnus. I. 19. purusque vir doctus, ubi priusque legebatur. I. ead. M. F. P. priusque. I. 25. M. F. P. possum. I. 26. M. F. P. resolvit. I. 27. M. F. P. ut. I. 28. M. F. P. excedat. I. ead. M. F. P. bujusveri, I. 29. M. F. medicamentum.

2. De Carcinomate.

Non idem periculum *καρκίνων* affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, ² mammae feminarum. Et ex jecore, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inaequaliter tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae venae quasi recurvantur: haecque pallent, aut livent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem: interdum simile his est, quae vocant Graeci *κορδυλώματα*; aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque ejus ruber est, aut lenticulae similis. Neque tuto secatur. nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Saepe homo ictus obmutescit, atque ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si idipsum pressum est, quae circa sunt, intenduntur & intumescunt. Namque pessimum id genus est, fereque primum id sit; quod *κακόντες* a Graecis nominatur. Deinde ex eo id *καρκίνων*, quod sine ulcere est. Deinde ulcus; & ex eo, thymum.
 † Tollit nihil, nisi *κακόντες*, potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo major vis adhibita est, eo magis quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro ad-

I. 1. M. F. P. *De carcinomate & ejus curatione.* I. 6.
 M. F. P. in. I. ead. M. F. P. *jecore, autem aut.* I. 8. M.
 F. P. *inaequalis.* I. 21. M. F. i^r. *fertur.* I. 26. F. ob *quae,*
 M. P. *nam quae.* I. 30. M. F. P. om. &.

1. Aegin. II. III. 22. 2. Scribon. Larg. xxxiiii.

aduferunt : quidam scalpello exciderunt. neque ulli unquam medicina profuit : sed adusta, protinus concitata sunt, & increverunt, donec occident. Excisa etiam post induc^tam cicatricem, tamen reverterunt, & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent ; sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blandiantur, quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Dicernere autem cacoethes, quod curationem recipit, a carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimen^{to}.

Ergo, ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ustionem. Si protinus irritatum est, scire licet, jam carcinoma esse ; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed, si sine ulcere is locus durus est, imponi sicum quam pinguissimam, aut ^{264, 14.} *πυνάδης* emplastrum satis est. Si ulcus aquale est, ceratum ex rosa injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex aqua, qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama aeris est (quae 30 lenissima ex adurentibus est) eatenus, ne quid eminere patiatur ; sed ita, si nihil exacerbavit : fin minus, eodem cerato conteniti esse debebitus.

3. De

I. 2. M. F. P. proficit. I. 11. M. F. P. prohibentur, I. 11. M. P. discedere. I. 14. M. F. sed. I. 23. M. F. om. durus. I. 28. M. F. P. om. aqua. I. 33. M. F. P. si.

1 Aphor. VI. 38.

3. De Theriomate.

Est etiam ulcus, quod *γειανα* Graeci vocant. Id & per se nascitur, & interdum ulceri ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel niger: odor foetidus: multus, & muco similis humor. Id ipsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit: prurigine tantum moveretur. circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. Atque id quoque malum serpit. quo omnia saepe intenduntur. Fitque ex his ulcus, quod *ἐπηντα ιδιωπος* Graeci vocant; quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ad ossa, corpus vorat. Id ulcus inaequale est, † coeno simile; inestque multis humor glutinosus; odor intolerabilis; majorque, quam pro modo ulceris, inflammatio. Utrumque, sicut omnis cancer, fit maxime in senibus; vel his, quorum corpora mali habitus sunt.

Curatio utriusque eadem est: sed in maiore malo major vis necessaria. Ac prius, a victus ratione ordinandum est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo abstineat: aquam quamplurimam assumat. Alvis quoque ei ducatur. Dein, post inflammationem, cibum boni succi capiat: vitatis omnibus acribus: potionis quantum volet, sic, ut interdiu quidem aqua contentus sit: in coena vero etiam vini austeri aliiquid bibat. Non aequa tamen fame in his, quos *ἴππης* urgebit, atque in his, qui *γειανα* adhuc habebunt, utendum erit.

Et

167, 18.

84, 9.

I. i. M. F. P. *De Theriomate & ejus curatione.* l. 6. M. F. P. *mucci.* l. 6. M. F. *ipsum.* l. 7. F. *tracatum.* l. 8. M. F. P. *movetur, at citra.* l. 11. M. F. P. *at.* l. 12. M. F. P. *quae.* l. 15. M. F. P. *om. ad.* l. 16. *Vir doctus ita inscribit:*
Id ulcus inaequale est, inestque multis humor glutinosus, coeno similis. l. 23. M. F. P. *magis.* l. 24. M. P. *ordinandus,* l. 31. M. F. P. *om. vero.* l. 33. F. *iis.* l. *ead.* M. P. *om. in,*

x *Actuar.* M. M. II. 12. *Aeginet.* IV. 10.

Et victus quidem talis necessarius est.

Super ulcus vero inspergenda est arida aloë contrita, &, si parum proficiet, chalcitis. At, si quis nervus, exesa carne, nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quae vehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur, a verso specilio infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleae folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque, qua tumor ex inflammatione est, imponenda, quae reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, qui apparent, ante connectis. Adustum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

4. De Sacro igne.¹

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Ejus duae species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore; exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimae pere exiguae. In his semper fere pus, & saepe rubor cum calore est: serpitque id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi, ruptis pustulis, ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter

I. 2. M. F. P. om. eff. I. 3. M. F. P. oenanthē eff.
I. 4. M. F. P. Ac. I. 7. M. P. etiam nūn remediis. I. 18.
M. F. P. nervis, si qui. I. 23. M. F. P. De sacro igne
& curatione.

¹ Aeginet. IV. 12. Seren. Sammon. XLI. Aëtius T̄rab. IV. Serm. 59.

ter saniem & pus videri potest. Sit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueque in plantis. Alterum autem est in summae cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inaequaliter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac saepe id, quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur. At circa, proxima cutis, quae vi-

10 tium receptura est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniora tentantur, aut quae mali habitus sunt; sed in cruribus maxime.

15 Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his, quae serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum ejus fortissimum est, uno die febris, quae humorem noxiun absumat. Pus, quo craf-

20 sius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra ulcera locum caedi, quo plus puris exeat; & id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alvi duc-

25 tione opus est. In omni vero sacro igne, neque lenibus & glutinosis cibis, neque falsis & aeribus utendum est; sed his, quae inter utrumque sunt: qualis est panis sine fermento, pisces, hoedus, aves, excep-

30 toque apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austерum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet.

Ipsa

289, 33.

I. 8. M. F. P. videbitur. I. 12. M. F. modo. I. 18.
edit. Aldi, Stephani aliaeque fortuitum. I. 19. M. F. P.
cujus. I. 21. M. F. P. os ulcerum iuedi. I. 23. M. F.
exstabat.

Ipsa autem ulcera, si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fovenda sunt. Deinde acu pustulae, quaecumque sunt, aperiendae. Tum impo-
 nenda ea, quae putrem carnem exedant. 5
 Ubi inflammatio sublata, ulcusque purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere, possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atque
173, 262. contrita: potest emplastrum vel Herae, vel 10
 πτερφέρμακον; cui quinta pars thuris adjecta sit; potest nigra hedera ex vino au-
 stero cocta, ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere,
 quod in summa cute esse proposui, satis ad 15
 sanitatem eadem lenia medicamenta pro-
 ficiunt.

5. De Chironio ulcere.¹

† Chironium autem ulcus appellatur, quod & magnum est, & habet ² oras duras, 20
 callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis: odor malus. neque in ulcere,
 neque in ejus tumore ulla est inflammatio. dolor modicus est. Nihil serpit, ideoque nullum periculum adfert; sed non facile 25
 sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcusque renovatur. Fit maxime in pedibus & cru-
 ribus.

Super id imponi debet, quod & lene ali- 30
 quid, & vehementer, & reprimens habeat. Quale ejus rei causa fit ex his: squamae
 aeris, plumbi eloti combusti, singulorum p. vi. *. cadmiae, cerae, singulorum p. viii. *.
 rosae

L. 5. M. exedunt. L. 7. M. leve. L. 10. M. F. P. Hierae. L. 16. M. F. P. proficient. L. 18. M. F. P. ul-
 cere & ejus curatione. L. 20. M. F. P. duas. L. 23. M. F. P. est nulla. L. 34. M. F. P. iv.

¹ Aegin. IV. 46. ² Pollux IV. c. 25.

*. rosae quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. *De Ulceribus, quae ex frigore in pedibus & manibus oriuntur.*

5 Fiunt etiam † ex frigore hiberno 1 ulceræ, maxime in pueris, & praecipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus: prurigo major est. Nonnunquam humor exit, sed non multus; qui referre vel pus, vel faniem videtur.

15 In primis multa calida aqua fovendum est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliquae verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adapertum ulcus est, aes, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alumen, aequa portione cum thure contritum, tum vino adjecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

25 7. *De Struma.* ²

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quaedam ex pure & sanguine quasi glandulae oriuntur. Quae vel praecipue fatigare medicos solet, quoniam & febres 30 movent, nec unquam facile maturescunt; &, sive ferro, sive medicamentis curantur, plerumque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta saepius: quibus id quoque accedit, quod longo

1. 4. M. F. P. oriuntur & eorum curationibus. l. 17. M. P. om. est. l. 21. M. F. P. cum. l. 25. M. F. P. De struma, & ejus curatione. l. 33. M. F. P. medicamento est opus saepius;

1 Aeginet. III. 79. 2 Aëtius Tetrab. IV. Serm. III. c. 5. Actuar. Meth. Med. II. 12. Aegin. IV. 33. Oribas. Synops. VII. 29.

longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque feminarum se reperisse, chirurgus Meges auctor est.

Propter haec & album veratrum recte datur, atque etiam saepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quae humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus ⁵ quoque quidam utuntur, quae exedunt, crustaque eum locum adstringunt: tum vero ut ulcus curant. Quaecunque autem ratio curandi est, corpus, puro ulcere, exercendum atque alendum est, donec ad ¹⁰ cicatricem perveniat. Quae cum medici doceant, ab iis requirenda. Quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

383, II.

8. *De Furunculo.*

Furunculus vero, est tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore; maximeque ubi jam in pus vergit. Qui ubi adapertus est, & exiit pus, subter appareat pars carnis in ²⁵ pus versa, pars corrupta subalbida, subruba; quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeat: maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut ³⁰ potior medicina sit, quae maturius liberet.

Proprium ejus medicamentum galbanum est. sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si caetera defunt, imponi debet, pri-

I. 4. M. F. P. chirurgicus. I. 12. M. F. P. tunc. I. 17. M. F. P. om. ab iis requirenda. I. 21. M. F. P. adduc & ejus curatione. I. 23. M. F. P. Aldi & aliae inflat'one. I. 24. F. M. verit. P. veritetur. I. 25. M. F. P. exit. I. ead. M. F. P. deest pus. I. ead. M. F. P. super. I. 34. M. F. P. debent.

¹ Aeginet. IV. 23. Seren. Sammon. XXXVIII.

primum, non pingue emplastrum, ut id
reprimat: deinde, si non repressit, quod-
libet puri movendo accommodatum. si ne
id quidem est, vel resina, vel fermentum.
5 Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria
est.

9. *De Phymate.*

Phyma vero nominatur tuberculum fu-
runculo simile, sed rotundius & planius,
10 saepe etiam majus. Nam furunculus ovi di-
midii magnitudinem raro explet, nun-
quam excedit. Phyma etiam latius patere
consuevit: sed inflammatio dolorque sub eo
minores sunt. Ubi divulsum est, pus eodem
15 modo appetet: ventriculus qui in furun-
culo, non invenitur: verum omnis corrup-
ta caro in pus vertitur. Id autem in pueris
& saepius nascitur, & facilis tollitur: in
juvenibus rarius oritur, & difficilis cura-
20 tur. Ubi aetas induravit, ne nascitur quidem.
Quibus vero medicamentis discuteretur, su-
pra propositum est.

10. *De Phygetlo.*

Φύγετλον autem est tumor, non altus, sed
25 latus, in quo quiddam pustulae simile est.
Dolor distentioque vehemens est, & major
quam pro magnitudine tumoris: interdum
etiam febricula. Idque tarde maturescit,
neque magnopere in pus convertitur. Fit
30 maxime aut in cervice, aut in alis, aut in
inguinibus. Panum, ad similitudinem fi-
gurae, nostri vocant. Atque idipsum quo
medicamento tolleretur, supra demonstra-
vi.

258, 19.

255.

II. *De*

I. 7. M. F. P. addunt & ejus curatione. I. 14. M. F.
P. evulsum. I. 15. M. F. P. quod. I. 23. M. F. De
Phygetro & ejus curatione. P. Phygetlo &c. I. 24. F.
M. phlygetron. I. ead. F. M. om. sed. I. 30. M. F. P.
vertice. I. 31. M. F. P. panem.

I. Seren. Samm. XL. Aeginet. IV. 22.

X 3

II. *De Abscessibus.*

Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans. Idque fere sit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Saepiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquando intumescit ad similitudinem ejus, quod *φυνα* vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter adolescit, & sifim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquae punctiones. Et, quod de subito durius non est, melius est: & quod, quamvis rubet, coloris tamen in album mutati est, quae signa jam pure oriente nascuntur: tumor enim ruborque multo ante incipiunt.

Sed, si locus nobilis est, avertendus materiae aditus est per cataplasma, quae simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias & paulo ante in erysipelate proposui. Si jam durior est, ad ea veniendum est, quae digerant, & resolvant: qualis est ficus arida contusa: aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cumeris silvestris radix, cui ex farina duae partes adjectae sint, ante ex mulso decoctae. Licit etiam miscere aequis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adjicere myrrae dimidio minus,

1. I. M. F. P. om. *De abscessibus.* 1. 4. M. F. P. *decstorum.*
1. 8. M. F. P. *aliquid.* 1. 12. M. F. P. *innocenter.* 1.
ead. M. F. P. *indolefcit.* 1. 18. M. F. P. om. *quod.* 1.
ead. M. F. P. *quamvis non rubet.* 1. ead. M. F. P. *alter.* 1.
20. M. F. P. om. *enim.* 1. 22. M. F. P. *mollis.*
1. ead. M. F. P. *avertendus is materiae.* 1. 25. M. F. P.
erysypela. 1. 30. M. F. P. om. *silvestris.*

1 Aeginet. IV. 18. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II.
32. Oribas. Synops. VII. 28.

nus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quae supra explicui.

Quod per haec discussum non est, necesse est, maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex aqua cocta, cui & olerum aliquid recte miscetur. Eadem aut haec in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra edidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantummodo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est, & gravitas, & ardor, & distensio, & dolor, & rubor, & durities; &, si major abscessus est, horror, atque etiam febricula permanet: penitusque condita suppuratione pro his, quae aliqui cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, jamque is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratio est. Ex qua, ubi vel per se, vel per medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti. Tum, si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In caeteris quoque partibus, si imma plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, aequa linamenta supervacua sunt. In reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commodo vero mel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut maliorum ex vino coctum, quae & per se & mista idonea sunt.

X 4

Si

I. 7. M. F. P. om. Cui & olerum aliquid. I. 8. M. P. F. autem haec. I. 10. M. F. P. reddidi. I. 12. M. F. P. magis. I. 15. M. F. P. aut. I. 16. M. F. P. penitus. I. 17. M. F. P. suppuratio. I. ead. F. M. P. si pro. I. ead. M. F. P. alibi, I. 19. M. F. P. cutis. I. 20. P. sublivida. I. ead. P. subalbida. I. 21. F. M. P. eaque. I. ead. M. F. P. om. vel per se. Caelarius in margine & aqua. I. 22. F. M. per ipsa medicamina. I. 25. M. F. P. una. I. 30. M. F. P. deest magna. I. ead. F. M. deberet. I. 31. F. M. vel.

Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel foeni Graeci linnive semen ex passo coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo 5 neminem decipi decet, ut in hoc genere cерato utatur. Caetera, quae pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, convenientque vulneribus, exposita sunt.

10

12. *De Fistulis.*¹

412, 413. Nonnunquam autem ex ejusmodi abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulae oriuntur. Id nomine est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quaedam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt, siquidem aliae breves sunt, aliae altius penetrant: aliae recta intus feruntur, aliae multo que plures transversae: aliae simplices sunt, aliae duplices triplicesve; quae ab uno ore orae intus tres sunt, aut etiam in plures sinus dividuntur: aliae rectae, aliae flexae, & tortuosa sunt: aliae intra carnem desinunt, 25 aliae ad ossa aut cartilaginem penetrant; aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniant: aliae deinde facile, aliae cum difficultate curantur, atque etiam quaedam insanabiles reperiuntur.

30

Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem. Adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel

I. 9. M. F. P. quar in. I. 11. M. F. P. addunt & earum generibus & curationibus. I. 20. M. F. P. recte. I. 21. F. M. transverse. I. 22. M. F. P. om. quae intus. I. 32. M. F. P. ipsum.

¹ Aëtius Terrab. IV. Serm. II. 55. ² Hippocr. Coac. Praen. III. 394.

vel cartilaginem , vel nervum , vel musculos laefit ; si articulum occupavit ; si vel ad vesicam , vel ad pulmonem , vel ad vulvam , vel ad grandes venas arteriasve , vel ad 5 maxillas , guttur , stomachum , thoracem penetravit . Ad intestina quoque eam tendere , semper periculosum , saepe pestiferum est . Quibus multum mali accedit , si corpus vel aegrum , vel senile , vel mali habitus 10 est .

Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit ; ut , quo tendat , & quam alte perveniat , scire possimus . Simul etiam , prorius humida , an siccior sit , quod extractum specillo patet . Id quoque dici potest , in osle vitium sit , necne : & , si jam eo fistula penetravit , quatenus nocuerit . Nam , si molle est , quod ultimo specillo contingitur , intra carnem adhuc vitium est : si magis id renitur , ad os ventum est . Ibi deinde si dilabitur specillum , nondum caries est : si non dilabitur sede , qua innititur , caries quidem , verum adhuc levis est : si inaequale quoque & asperum subest , vehementius os exesum est . At cartilago ubi subfit , ipsa sedes docet : perventumque esse ad eam , ex renisu patet .

Ex his quidem colliguntur fistularum sedes , spatia , noxae . Simplices vero hae 30 sint , an in plures partes diducantur , cognosci potest ex modo puris . Cujus si plus fertur , quam quod simplici spacio convenient , plures sinus esse manifestum est . Cumque fere juxta sint caro , & nervus , & aliqua

I. 5. M. F. P. *inania ut.* I. 14. M. F. P. *protinus.*
I. 15. M. P. F. Si vero os in vicino est , id quod disci perficit sic : jam nec ne &c. I. 21. M. P. F. *labitur.* I. 22. M. F. P. *labitur.* I. ead. M. F. P. *sed aequali.* I. 25. M. F. P. *haefit.* I. 27. M. F. P. *renixu.* I. 28. M. F. P. *sed ex.*

qua nervosa, quales fere tunicae membranaeque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diversa corporis genera perferent. Siquidem ex carne pulsae, album copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius & minus: ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint, quia saepe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pulsus ferri, quod jam defierat, iterum incipit; testaturque, non solum aliud sinus esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere.

Si in carne & recens & simplex est; ac neque sinuosa neque cava sede; neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salēm vel alumēm, vel squamam aeris, vel aeruginem, vel ex metallicis aliiquid. Exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat. quae in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo superimponendum; supraque injicienda spongia est, in acetum ante demissa: solisque quinto die satis est. Genus vietus adhibendum est, quo carnem ali docui.

At,

I. 8. F. M. P. *inguinatio*. I. 12. M. F. P. *deest iterum*.
 I. 16. M. F. P. *sed si*. I. *ead*. M. F. P. *etsi*. I. 17. M.
 F. P. *rugosa*. I. 26. M. F. P. *est*, altera antecedente,
 I. 31. M. P. *om*, *est*, I. *ead*, M. F. *cum*. I. 33. M. F. P.
genusque vietus.

At , si longius a praecordiis fistula est , ex intervallo jejunum radiculas esse , deinde vomere , necessarium est.

Quum vetustate callosa fit fistula (callus 300, 9.
 5 autem neminem fallit , quia durus est , & aut albus , aut pallidus) tum validioribus medicamentis opus est. Quale est , quod habet papaveris lachrymae p. 1. *. gummi p. 111. *. cadmiae p. 1111. *. atramenti futo-
 10 rii p. viii. *. ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallae p. 1. *, aeruginis , sandarachae , aluminis Aegyptii singulorum p. 1. *. atramenti futorii combusti p. II. *. Aut quod constat ex chalciti-
 15 de , & e faxo calce ; quibus adjicitur auripigmenti dimidio minus , quam in singulis prioribus est ; eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex praecep-
 20 to Megetis , aeruginis rasae p. 11. *. conte-
 rere , deinde ammoniaci thymiamatis p. 11. *. aceto liquare , eaque infuso aeruginem cogere. Idque ex primis medicamentis est. Sed , ut haec maximi effectus sunt , si cui ista non adfert , facile tamen est callum qui-
 25 buslibet adurentibus medicamentis erode-
 re : satisque est vel papyrum intortum , vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta & mixta cum calce , callum exest.
 30 Si quando vero longior & transversa fi-
 stula est , demissio specillo , contra principium hujus incidi commodissimum est , & collyrium , quod volueris demitti.

At si duplicem esse fistulam vel multipli-
 cem

I. 1. M. Ac. I. ead. M. F. P. om. ex. I. 2. M. F. P. ediff. I. 4. M. F. P.
 om. quum. I. 6. M. F. P. sed tum. I. 8. M. F. om. *. I. 9. M. F. om. *. I.
 ead. M. F. om. *. I. 11. M. F. P. x. I. 15. M. F. P. om. e. I. ead. M.
 F. P. calcis. I. ead. M. F. P. om. adjicitur. I. 17. M. F. P. est ; adjicitur
 eaque. I. 21. F. M. ex aerugine colligere. P. ex aceto liquare , eaque infuso
 aeruginem cogere. I. 23. M. P. sic. I. 25. Vir doctus tunc & mox perdere
 loco prodere. I. ead. M. F. P. prodere. I. 26. M. F. P. aut quibus haec maxi-
 me in effectu sunt erodere satisque. I. ead. P. intortam. I. 33. M. F. P.
 utrumque. Ita quoque edit. Aldi & Stephani. Alii legunt utrimque. I. 34.
 M. F. P. aut. I. Oribas. Synop. VII. 30.

cem existimamus, sic tamen ut brevis, infraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calatum scriptorium conjicienda sunt, isque ori fistulae aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda sunt; vel, si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto; atque intus infundendum, quicquid inditum est. Superponenda sunt, quae refrigerent & reprimant. nam fere, quae circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rufus alia medicamenta injiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere; si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si jam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paululum adjiciatur.

Fere vero fit, ut ea tunica, quae inter foramen & integrum carnem est, victa tot medicamentis exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contingit, imponenda glutinantia sunt; praecipueque spongia melle cocto illata. Neque ignoro, multis placuisse linamentum in modum collyrii compositum & tinctum melle, implendi causa demitti. sed celerior sic glutinantur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori junctum non coeat, adjectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos jungat.

13. De

I. 8. M. F. P. om. sunt. I. 10. M. F. P. aceto sunt. I. 16. M. F. P. conjiciat. I. 20. M. F. P. paulum. I. 21. F. M. ferrumen. I. 22. F. M. P. om. tot. I. 23. M. F. P. medicamentis tota ex eat. I. 27. M. F. P. om. &. I. 28. M. F. P. ignorant implendi causa. I. 29. M. F. P. id.

13. *De Ulceris genere, quod κνείον nominatur.*

Est etiam ulceris genus, quod a favi si-
5 miltudine κνείον¹ Graecis nominatur. Id-
que duas species habet. Alterum est subal-
bidum, & furunculo simile: sed majus, &
cum magno dolore. Quod, ubi maturefecit,
habet foramina; per quae fertur humor glu-
tinofus, & purulentus: nec tamen ad ju-
stam maturitatem pervenit. Si divisum est,
10 multo plus intus corrupti, quam in furuncu-
lo, appetet, altiusque descendit. Raro fit
nisi in capillis.

Alterum est minus, & super caput emi-
nens, durum, latum, subviride, subpalli-
15 dum, magis exulceratum: siquidem ad
singulorum pilorum radices foramina sunt,
per quae fertur humor glutinofus, subpalli-
dus, crassitudinem mellis, aut visci refe-
rens, interdum olei: &, si inciditur, viridis
20 intra caro appetet. Dolor autem, & inflam-
matio ingens est, adeo ut acutam quoque
febrem movere consuerint.

Super id, quod minus crebris foramina-
bus exasperatum est, recte imponitur & fi-
25 cus arida, & lini semen in mulso coctum,
& emplastra ac malaginata materiam educen-
tia, aut quae proprie hic pertinentia supra
posui.

Super alterum, & eadem medicamenta,
30 & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium
resinae terebinthinae misceatur; & ficus in
mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti
sit adjectum; & uvae tamiae pars quarta
fico adjecta. Quod si parum in utrolibet
genere

*I. 1. M. F. P. Melicera. I. 3. M. F. P. melicera a. I. 4. M.
F. P. om. ejſt. I. 5. M. F. P. om. &. I. 6. M. F. P. dolore
majore. I. 12. M. F. P. scapulis. I. 13. M. F. P. om. &.
I. ea i. M. F. P. corpus. I. 19. M. F. P. &. I. 25. Alii quod
in vino. I. 29. M. F. P. om. eadem. I. 33. F. M. timiniae.*

¹ Actuar. M. M. II. 12. & IV. 16. Aeginet. III. 3.
Trallian. I. 9.

genere medicamenta proficiunt, totum
ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet.
Ulcere ablato, super plagam medica-
menta danda sunt; primum, quae pus ci-
tent; deinde, quae purgent, tum, quae im-
pleant.

14. *De Acrocordone, & Thymio,
& Myrmecis, & Clavo.*

Sunt vero quedam verrucis ¹ similia;
quorum diversa nomina, ut vitia sunt, 10
Ακροχερδόνα Graeci vocant, ubi sub cu-
te coit aliquid durius, & interdum paulo
asperius, coloris ejusdem; infra ad cutem
tenue, supra latius. Idque modicum est,
quia raro fabae magnitudinem excedit. Vix 15
unum tantum eodem tempore nascitur; sed
fere plura, maximeque pueris: eaque non-
nunquam subito desinunt, nonnunquam
mediocrem inflammationem excitant. sunt,
quae etiam in pus convertuntur. 20

Απορίαι, ² nominatur, quod super cor-
pus quasi verrucula eminet, ad cutem la-
tius, supra tenue, subdurm, & in summo
perasperum. Id, qua summum, colorem flo-
ris thyimi repraesentat; unde ei nomen est; 25
ibique facile finditur, & cruentatur; non-
nunquam aliquantum sanguinis fundit: fe-
re que circa magnitudinem fabae *Aegyptiae*
est, raro majus, interdum perexiguum.
Modo autem unum, modo plura nascun-
tur, vel in palmis, vel in inferioribus pe-
dum partibus: pessima tamen in obsecenis
sunt; maximeque ibi sanguinem fundunt. 30

Mugnizia ³ autem vocantur humiliora
thymio

*I. 3. M. F. P. & ulcere. I. 8. M. Myrmetio. I. ead. M.
F. P. clavo curationibusque eorum. I. 14. M. F. P. om. ad
cutem supra. I. 17. M. F. P. maximeque in pueris. I. 21. M.
F. P. *Alybynion*. I. 24. M. P. F. que. I. 28. M. F. P. circa.
I. 30. M. F. P. unum, modo autem. I. 31. M. F. P. vel in
talis vel palmis. I. ead. M. r. P. om. in.*

¹ Aeginet. IV. 15. VI. 87. ² Aëtius Terrab. IV.
Serm. I. 3. Oribas. Synops. VII. 39. ³ Actuar. M. M.
II. 11. Oribas. Synops. VII. 43.

thymio durioraque. quae radices altius
+ exigunt, majoremque dolorem movent,
infra lata, supra autem tenuia, minus sanguini-
nis mittunt: magnitudine vix unquam lu-
5 pini modum excedunt. Nascuntur ea quo-
que aut in palmis aut in inferioribus par-
tibus pedum.

Clavus ¹ autem nonnunquam quidem
etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime
10 nascitur, praecipue autem ex contuso,
quamvis interdum aliter: doloremque,
etiamsi non alias, tamen ingredienti mo-
vet.

Ex his Acrochordon & acrothymium
15 saepe etiam per se finiuntur, &, quo minor a
sunt, eo magis. Myrmecia & clavi sine cu-
ratione vix unquam desinunt. Acrochor-
don, si excisa est, nullam radiculam relin-
quit, ideoque ne renascitur quidem. Acro-
20 thymio clavoque excisis, subrotunda radic-
ula nascitur, quae penitus descendit ad
carnem: eaque relictâ, idem rursus exit.
Myrmecia latissimis radicibus inhaerent:
25 ideoque ne excidi quidem sine magna exul-
ceratione possunt. Clavum subinde rade-
re, commodissimum est. nam sine ulla vi-
fic mollescit. at, si sanguinis quoque aliquid
emissum est, saepe emoritur. Tollitur etiam,
si quis eum circumpurgat, deinde imponit
30 resinam, cui miscuit pulveris paululum,
quem ex lapide molari contrito fecit. Caetera
vero genera medicamentis adurenda sunt.
Aliisque id, quod ex fece vini: myrmeciis
id, quod ex alumine & sandaracha fit, antis-
fumum

L.II. M. F. P. tamen. L. 14. M. F. P. sive thymium. L. 19.
M. F. P. thymio. L. 20. M. F. P. subter rotunda. L. 22.
M. F. P. exigit. L. 25. M. F. P. subinde deradere. L. 27.
M. F. P. sic enollescit. L. ead. M. F. P. ac. L. 30. M. F.
P. paulum.

¹ Aeginet. III. 80. VI. 87.

simum est. Sed ea, quae circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur: deinde postea lenticula imponi. Tollerit aerothymum etiam ficus in aqua decocta.

5

15. *De Pustularum generibus.*

At pustulae maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve aspreudo quaedam fit, similis his pustulis, quae ¹⁰ ex urtica, vel ex sudore nascuntur: ² ἔξωθηματα Graeci vocant, eaeque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures, similes varis oriuntur, nonnunquam majores. Pustulae, lividae, ¹⁵ sunt, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestque illis humor. Ubi hae ruptae sunt, infra quasi exulcerata caro appetet. ³ φλύκταναι ελάσσεις Graece nominantur. Fiunt vel ex frigore, ²⁰ vel ex igne, vel ex medicamentis.

[†] Φλύκταναι autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta. ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut ²⁵ aridiora, aut humidiora: & modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione ac dolore, exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in aetate puerili: raro, in medio corporo- ³⁰ re: saepe, in eminentibus partibus.

Pessima pustula est, quae ⁴ ἵπνυκται, vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem

vehe-

L. 1. M. F. P. om. cft. I. 3. M. F. P. imponi solet. I. 4. M. F. P. thymium. I. ead. M. F. P. cocta. I. 6. M. F. P. De pustularum generibus & earum curationibus. I. 10. F. iis. I. 12. M. F. P. eaque. I. 16. M. F. P. om. sunt. I. 17. M. F. P. bis. I. 19. M. F. P. dicit φλύκταναι. I. 20. M. F. P. nominatur. I. 22. M. F. P. φυγάναι. I. 25. M. P. sunt. I. 28. M. F. P. aut.

¹ Aph. III. 20. ² Aet. M. M. II. 11. Trall. I. 5. ³ Aet. M. M. VI. 8. 4 Aet. M. M. II. 11. Orib. Syn. VII. 37. 42.

vehemens inflammatio est; &, cum aperta est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humoris suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est: neque enim ea faba 5 major est. Atque haec quoque oritur in eminentibus partibus, & fere noctu. unde nomen quoque a Graecis ei *έπιμυκης* est impositum.

In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acribus & extenuantibus. eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Praeter haec, is, qui tam robustus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspargere; oleoque vinum miscere, & sic ungii; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pustularum genitus occupavit, imponenda lenticula est; detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia transendum. *Επιμυκης* post lenticulam, recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur.

25 Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine foeni Graeci mixta sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo effiat. Proprie ad eas pustulas, quae infantes 30 male habent, lapidis, quem *τρειτον* Graeci vocant, p. viii. *. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungii ex cerussa pustulæ debent, & tum hoc illini.

16. De

I. 1. M. F. P. cum adaperta. I. 3. M. P. calor eff. I. 14. M. F. P. jam. I. 25. M. P. om. vero. I. 28. M. F. P. om. ei. I. 30. M. F. P. om. Graeci. I. 34. M. F. P. om. et.

¹ Oribas. de Morb. Curat. III. 54.

16. De Scabie.¹

Scabies vero est durities cutis rubicundior. ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiiores, quaedam sicciores. Exit ex quibusdam fantes; fitque ex his continuata exulceratio pruriens; serpitanus in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto definit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. † Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam, quae talis est, *άρεταν* Graeci appellant, id est, feram.

In hac quoque victus ratio eadem, quae supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est; quod fit ex spodi, croci, aeruginis, singularum p. i. *. piperis albi, omphacii, singularum p. i. *. cadmia p. viii. *. At, ubi jam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris p. i. *. cerae p. iv. *. picis liquidae hemina, olei sextariis duobus. quae simul usque ad crassitudinem mellis incoquuntur. Est etiam, quod ad Protarchum auctorem refertur. Habet hoc farinae lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidae heminam, resinae humidae selibram, acetii cyathos tres. Crocum quoque, lycium, aerugo, myrra, cinis, aequis portionibus recte miscentur, & ex passo coquuntur. Idque omnem utique scabiem fanat. Ac, si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pici liquidae mixtum, † sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

17. De

L. 1. M. F. P. De Scabie & ejus curatione. I. 2. M. F. P. duritior. I. ead. F. rubicundus. I. 5. M. F. P. continuata. I. 18. M. F. P. aut. I. 21. M. F. P. dum crassitudo mellis fiat. I. 27. M. F. P. lycium. I. 30. M. F. P. utique scabiem fanat. Pituitam ubique sustinet. I. 31. M. F. P. At. I. 32. M. F. P. pice. I. 33. M. F. P. liquida. I. ead. M. F. P. mixta. I. ead. M. F. P. in.

¹ Oribas. de Morb. Curat. III. 58.

17. *De impetiginis speciebus.*¹

Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quae similitudine scabiem repreäsentat. nam & rubet, & durior est, & exulcerata, & rodit. Distat autem ab ea, quae magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet, videnturque esse in ea quasi bullulae quaedam, ex quibus interposito tempore quasi squamulae solvuntur, certioribusque haec temporibus revertitur.

Alterum genus est pejus & simile papulae fere, sed asperius rubicundiusque, figuræ varia habens: squamulae ex summa acute decidunt, rosio major est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam, quam prior, temporibus & fit, & definit. Rubra cognominatur.

Tertia etiamnum deterior est. nam & crassior est, & durior, & magis tumet; in summa cœte finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra est: proceditque & latet, nec tardat: minus vero errat in temporibus, quibus aut oritur, aut definit; neque ex toto tollitur. Nigrae cognomen est.

Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes: quibus demptis, profluit sanguis nonnunquam. Alioqui vero humor ejus albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque latius.

Haec vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus; atque ungues

I. 1. M. F. P. *De impetiginis speciebus & curationibus.* I. 5. M. F. P. exulcerata est. I. ead. M. F. P. roditur. I. 6. M. F. P. quia. I. 9. M. F. P. om. quasi. I. ead. M. F. P. squamulae resolvuntur. I. 10. M. P. F. hoc. I. 11. M. F. P. pejus est. I. ead. M. F. P. om. &. I. 14. M. F. P. discidunt. I. 15. M. F. P. etiam nonnunquam. I. 16. P. priori. I. ead. M. F. P. rubrica. I. 21. M. F. P. om. est. I. ead. M. F. P. procedit. I. 22. M. F. P. late & tarde enim serpit. I. 23. M. F. P. om. quibus. I. 31. M. P. *aliоquin.*

¹ Oribas. de Morb. Curat. III. 59, Synops. VII. 49.

gueſ ſequuntur infenſtare. Medicamentum non aliud valentius eſt, quam quod ad ſcabiem quoque pertinere fuit ſub auctore 338, 23. Protarcho retuli. Serapion autem, nitri p. II. *. ſulphuris p. IV. *. excipiebat resina ſu- copioſa, coque utebatur.

18. *De papulis.*

Papularum vero duo genera ſunt. Alterum eſt, in quo per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leviterque roditur, medium habet pauxillo levius: tarde ferpit. idque vitium maxime rotundum incipit, eademque ratione in orbem pro- 338, 11. cedit. Alterum eſt, quam *āreūs* Graeci appellant. In qua ſimiliter quidem, ſed ma- 15 gis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, & interdum etiam pilos remittit.

Quae minus rotunda eſt, diſſicilius fanefcit: niſi ſublata eſt, in impetiginem vertitur. Sed levis papula etiam, ſi jejuna ſaliva quotidie defricetur, fanefcit. Major, comodiſſime murali herba tollitur, ſi ſuper eadem trita eſt. Ut vero ad composita me- dicamenta veniamus, idem illud Protar- 25 chi tanto valentius in his eſt, quanto mi- nus in his vitii eſt. Alterum ad idem, Mi- conis; nitri rubri, thuris, ſingulorum p. I. * cantharidum purgatarum p. II. *. ſul- phuris ignem non experti tantudem, re- 30 finiae terebinthinae liquidae p. XX. farinae lolii ſext. III. git cyathi tres, picis crudae ſext. unum.

19. *De*

*I. 7. M. F. De papulis & earum curatione. I. 8. M. F. P. altera. I. 9. M. F. P. qua. I. 14. M. F. P. altera autem. I. ead. M. F. P. *āreūs* id eft feram. I. 17. M. F. P. om. & I. 19. F. ſenefcit. I. 21. F. defricatur. I. ead. F. ſenefcit. I. 23. M. F. P. Jub. I. 24. M. F. P. ea detrita. I. 27. M. F. P. Mironis. I. 32. M. F. P. ſem. I. ead. M. F. P. *cathartes*. I. 33. M. F. P. om. ſext.*

19. De Vitiliginis speciebus, id est, de Alpho,
& Melane, & Leuce.¹

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adferat: tamen & foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Ejus tres species sunt. *Aλός* vocatur, ubi color albus est, fere subasper & non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse videantur. Interventum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. *Mέλας* colore ab hoc differt, quia niger est, & umbrae similis. caetera eadem sunt. *Λευκη* habet quiddam simile alphο, sed magis albida est, & altius descendit; in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia haec serpunt: sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos & Melas in quibusdam temporibus oriuntur & definunt. Leuce, quem occupavit, non facile dimittit.

20 Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum vix unquam sanescit; ac, si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non; experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. si sanguis exit, quod fere sit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinentendum est.

30 Super id vero, quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Irenaicum auctorem refertur. Alcyonium, nitrum, cumi-

num,

I. 2. F. Mela. I. ead. F. Leuce & eorum curatione.
I. 4. M. F. P. om. &c. I. 17. M. F. P. temporibus & oriuntur.
I. 24. M. F. P. non sit.

¹ Actuar. M. M. II. 11. VI. 8. Oribas. de Morb. Cur. III. 58. Aëtius Tetrab. IV. Serm. I. 132.

num, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole vitiligo perungitur: deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, cluitur. Proprie quidem, Micone auctore, eos, quos Alphos s. vocari dixi, hoc medicamento perungunt: sulphuris p. ii. *. nitri p. iv. *. myrrhae arridae contritae acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum haec inducunt. Hi 10 vero, quos Melanas vocari dixi, curantur, cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba, eaque sine oleo in balneo ante sudorem insperguntur, ac tum genus id vitiliginis defricatur.

15.

LIBER SEXTUS.

CAPUT I.

De Vitiis singularum corporis partium.

Dixi de his vitiis, quae per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. nunc ad ea veniam, quae non nisi in singulis partibus incidere consueverunt, orfus a capite.

I. *De Capillis fluentibus.* 1

In hoc igitur capillis fluentibus maxime 25 quidem saepe radendo succurritur. Adjectit etiam vim quandam ad continendum, ladanum cum oleo 2 mistum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo minus caput quibusdam aetate 30

334, 27.

l. 5. M. F. P. Mirone. l. 10. F. ii. l. 13. M. F. P. om. eaque. l. 14. M. F. P. om. ac. l. 16. M. F. C. Celsi de Medicina Liber Sextus. l. 19. F. iis. l. 23. M. F. P. confuerunt. l. 27. M. F. P. enim.

¹ Trall. I. 2. Act. M. M. II. 5. IV. 9. Orib. de Loc. Affect. Cur. IV. 5. ² Scil. myrtle. Th. Priscian. I. 2.