

LIBER SEPTIMUS.

PRAEFATIO.

*De Chirurgica, & qui in ea claruerint, &
5 qualis esse Coirurgus debeat, & quid
hoc in libro describatur.*

DERTIAM esse medicinae partem, quae manu curet, & vulgo notum, & a me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem o-
10 mitit; sed manu tamen plurimum praestat. est que ejus effectus inter omnes medicinae par-
tes evidentissimus. Si quidem in morbis cum multum fortuna conferat, eademque sae-
pe salutaria, saepe vana sint; potest dubitari,
15 secunda valetudo medicinae, an corporis be-
neficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime utimur, quamvis profectus evidenter est, tamen sanitatem & per haec frustra quaeri, & sine his reddi sae-
20 pe, manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest; qui a medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quae manu curat, evidens est, om-
nen profectum, ut aliquid ab aliis adju-
25 vetur, hinc tamen plurimum trahere. Haec autem pars, cum sit vetustissima, magis ta-
men ab illo parente omnis medicinae Hip-
pocrate, quam a prioribus exculta est. De-
inde, posteaquam diducta ab aliis habere
30 professores suos coepit, in AEgypto quoque increvit, Philoxeno maxime auctore, qui plu-

18, 17.
19, 18.
111, 34.
112, 17.

2, 7.

I. 1. a M. F. P. absunt Cornelii Celsi de Medicina LIBER SEPTIMUS incipit. Praefatio. l. 4. M. P. chirur-
gicus. l. 13. remedii quidam adscripti margini edit. Caesari. l. 17. P. utimur. l. 23. F. M. curata. l. 31. M. Philoxemo.

I. Hippocr. de Arte. V.

Cc 3

pluribus voluminibus hanc partem diligenter comprehendit Gorgias quoque & Sostratus, & Herones & Apollonii duo, & Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quaedam repererunt. Ac 5 Romae quoque non mediocres professores, maximeque nuper Tryphon pater, & Euelpistus Phlegetis filius, &, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinae adjecerunt.

Essē autem Chirurgus debet adolescentis, aut certe adolescentiae propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra 15 promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, & immisericors, sic, ut sanguini velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, se- 20 cet: sed perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur.

Potest autem requiri, quod huic partis proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, 25 quas alibi executus sum, Chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio: atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti 30 ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit; & in quibus vulneribus ulceribus plus profici manu, quam medicamento, credo: tum, quicquid ad ossa pertinet.

I. 3. M. F. P. Hieron, I. 8. F. deest Phlegetis filius.
I. 18. M. F. P. accipit. I. 21. M. F. faciat, I. 22. M. F. P. oriatur. I. 23. M. F. P. quid, I. 24. M. F. P. vendicandum, I. 33. M. F. P. perficit.

¹ Rhod. ad Scrib. Larg. pag. 291. ² Theodoret, Graec. Affect. I. pag. m. 4.

tinet. Quae deinceps exequi aggrediar, dilatisque in aliud volumen ossibus, in hoc caetera explicabo: praepositisque his, quae in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quae 5 proprias sedes habent, transibo.

C A P U T I.

*De Vexatis.*¹

VEXATA igitur in quacunque parte corporis sint, quamprimum sic 10 curari debent, ut, qua dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, detergeaturque eodem adverso profluens sanguis. quod si paulo tardius subveniatur, jamque etiam rubor est; qua ru 15 bet corpus: si tumor quoque accedit, quacunque is est, id idem optimum auxilium est. Tum superdanda reprimenta sunt; maximeque lana succida ex ² aceto & oleo. Quod si levior is casus est, possunt 20 etiam, sine scalpello, imposita eadem mederi. Et, si nihil aliud est, cinis quoque; maxime ex farmentis: si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

25

C A P . II.

*De bis, quae per se intumescunt, quomodo
incidenta, & curanda sint.*

VERUM hoc quidem promptum est. In his autem negotium majus est, 30 quae per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant. Ea

1. 7. M. F. P. luxatis. 1. 8. M. F. P. luxata. 1. 9. M. F. P. sunt. 1. 11. M. P. detergaturque. 1. 13. M. P. subvertitur. 1. 16. M. F. P. om. idem. 1. 27. M. F. P. excienda. 1. cad. M. F. P. sunt.

1 Aëtius Tetrab. IV, Serm. II, 68. 2 Aguar. M. M. IV, 16.

Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea excutus sum: nunc supereft, ut dicam, quae in iis manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitula accommodare oportet; quod, quicquid illud malae corruptaeque materiae coijit, extrahat: idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excebat. Neque tamen fas est, nihil a cucurbitula agere.

Interdum etiam fit, sed raro, ut quicquid abscedit, velamento suo includatur. id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit, non 15 nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed subiecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo modo pertinet; quia quicquid, si tunica est, idem, si callus est, 20 fieri debet: neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari: tum, pure quoque maturiore, haec interdum esse confuevit, ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam 25 non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, sive id incidit, sive jam durities est, in hac auxiliis nihil est: sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel 30 ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil praeterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem & inguinibus raro secundum est: item ubicunque

I. 1. M. abscessum. I. 2. M. P. eis. I. 4. M. bisdem. P. iisdem. I. 6. M. F. P. quae. I. 9. M. F. P. excidat. I. 10. M. F. P. fas non est. I. ead. M. F. P. om. a. I. 12. M. F. P. enim, I. ead. M. F. P. om. ut. I. 13. M. F. P. includitur. I. 15. M. F. P. dicit. I. 19. M. F. P. loco. I. 20. M. P. F. quidquid dixi. I. 23. M. F. maturior. I. 29. M. F. P. et. I. 32. M. praeter est.

que mediocris abscessus est: item quoties
in summa cute, vel etiam carne vitium est;
nisi festinare curandi imbecillitas cogit. Sa-
tisque est cataplasmatibus efficere, ut per
5 se pus aperiatur. nam fere sine cicatrice po-
test esse is locus, qui expertus ferrum non
est. Si autem altius malum est, considera-
ri debet, nervosusne is locus sit, an non
sit. Nam, si sine nervis est, candardi ferra-
10 mento aperiri debet, cujus haec ratio est,
quod exigua plaga diutius ad pus evocan-
dum pateat, parvaque postea cicatrix sit.
At, si nervi juxta sunt, ignis alienus est; ne
distendantur & membrum debilitent: ne-
15 cessaria vero opera: scalpelli est. Sed caetera
etiam subruda aperiiri possunt; inter ner-
vos ultima expectanda maturitas est, quae
cutem extenuet, eique pus jungat, quo
propius reperiatur. Jamque alia rectam
20 plagam desiderant, ut in carne: alia vero
vehementer cutem extenuant, in quibus
tota ea super pus excidenda est. Semper au-
tem, ubi scalpellus admovetur, id agendum
est, ut & quam minimae & quam paucissimae
25 plagae sint: cum eo tamen, ut necessitati
succurramus, & in modo, & in numero.
Nam majores sinus, latius; interdum etiam
duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dan-
daque opera, ut imus sinus exitum habeat;
30 ne quis humor intus subsidat, qui proxima
& adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in
rerum natura, ut cutis latius excidenda sit.
Nam, ubi post longos morbos totius corpo-
ris habitus vitiatus est, lateque se sinus suf-
fudit,

Cc 5

1. 3. M. F. P. curantis. 1. 4. F. P. cataplasmati. M. cataplasmata.
1. 10. M. F. P. gratia. 1. 11. M. F. P. patet. 1. ead. M. F. fit. 1.
13. M. F. in his periculum ignis alienum est. 1. 13. M. P. ne vel di-
stendantur. 1. 14. M. F. P. bi vel. 1. 17. M. F. P. vos vero ulti-
ma. 1. 19. M. F. P. itemque aliam. 1. 20. M. F. P. om. ut. 1. ead.
M. F. P. carne: quia fere. 1. 21. M. F. P. extenuat. 1. ead. M. F.
P. deest in quibus. 1. 28. M. F. P. pluribus. 1. 33. M. F. P. totus. 1.
34. M. F. vitatus. 1. ead. M. diffudit.

† H. F. ab Aquapend. Chirur. p. 442.

fudit, & in eo jam cutis pallet; scire licet, eam
jam emortuam esse, & inutilem futuram.
Ideoque excidere commodius est: maxime,
si circa articulos majores id evenit, cuban-
temque aegrum fluens alvus exercuit, ne-
que per alimenta quicquam corpori acce-
dit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad simi-
litudinem myrtei folii fiat, quo facilius fa-
nescat. Idque perpetuum est; ubicunque
medicus & quacunque de causa cutem ex-
cidit. Pure effuso, in alis vel inguinibus linamen-
to opus non est; sed sponsia ex vino
imponenda est. In caeteris partibus, si aquae
ea linamenta supervacula sunt, purgationis
causa paulum mellis infundendum: dein 15
glutinantia superdanda: si illa necessaria
sunt, super ea quoque similiter dari spon-
gia eodem modo ex vino expressa debet.
Quando autem linamentis opus sit, quan-
do non sit, alias dictum est. Caetera eadem, 20
incisa suppuratione, facienda sunt, quae
ubi per medicamenta rupta est, facienda
esse proposui.

C A P. III.

De bonis, malisve signis Suppurationum. 25

PROTINUS autem, quantum curatio effi-
ciat, quantumque aut sperari aut time-
ri debeat, ex quibusdam signis intelli-
gi potest: fereque iisdem, quea in vulneri-
bus exposita sunt. Nam bona signa sunt 30
fomnum capere, facile spirare, siti non con-
fici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea
vacare: itemque habere pus album, laeve,
non

I. 1. M. F. P. pars. I. 5. M. F. exaruit. P. exbau-
fit. I. 10. M. P. ex. I. cad. M. F. P. om. de. I. 12.
M. F. P. om. sed. I. 25. F. M. P. exulceratorum.

non foedi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris; pus nigrum, aut feculentum, & foedi odoris: item procedente curatione eruptio san-
guinis; aut si, antequam sinus carne im-
pleatur, orae callosae² fiunt, illa quoque ipsa
carne hebete, nec firma. Deficere tamen
animam vel in ipsa curatione, vel postea,
pessimum omnium est. Quinetiam mor-
bus ipse, sive subito solitus est, dein sup-
puratio exorta est; sive effuso pure per-
manet, non injuste terret. Estque inter cau-
fas timoris, si sensus in vulnere rodentium
non est. Sed ut haec ipsa + fortuna huc illucve
discernit; sic medici partium est, eniti ad
reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ul-
cus ressolverit, eluere id, si reprimendus
humor videbitur, vino & aqua pluviajili
mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit,
debet: si purgandum erit, mulso, rur-
susque imponere eadem. Ubi jam repres-
sus videbitur humor, ulcusque purum erit,
producit carnem conveniet, & foveri ulcus
pari portione vini ac mellis, superque im-
poni spongiam ex vino & rosa tintam per
quae caro producitur. Plus tamen, ut alias
quoque dixi, victus ratio eo confert. Ea est,
folutis jam febris & cibi cupiditate redi-
ta, balneum rarum; quotidiana, sed lenis
gestatio; cibi potionisque corpori faciendo
aptiae. Quae omnia, per medicamenta quo-
que suppuratione rupta, sequuntur. Sed,
quia magno malo vix sine ferro mederi li-
cket, in hunc locum reservata sunt.

C A P .

I. 6. M. F. P. carnosae, I. 8. M. F. P. om, in. L.
18. M. P. ex, I. 23. M. F. P. vulnus. I. 25. M. F. P.
spongia. I. ead. M. F. P. tincta. I. 26. M. P. F.
quae cum caro. I. ead. M. F. P. producatur. I. 27. F.
M. P. id. I. 30. M. F. P. reficiendo. I. 31. F. apic.
M. P. apteque omnia.

¹ Aphor. VII. 43. ² Aphor. VI. 4.

300, 10.

ADVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti¹ collyrium non possit, si tortuofae sunt, si multiplices, majus in manu, quam in medicamentis, praefidum est; minusque operae est, si sub cute transversae feruntur, quam si recta intus tendunt. Igitur, si sub cute transversa fistula est, demitti² specillum debet, supraque id ea incidi. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi rivuli ostendunt. Ubi ad fines fistulae ventum est, excidendum¹⁵ ex ea totus callus est, superque fibulae dandae, & medicamentum, quo glutinatur. At, si recta subter tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est; excidi is sinus debet: dein fibula oris cutis injicienda est,²⁰ eique glutinantia medicamenta superanda sunt; aut, si corruptius ulcus est (quod interdum osse vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia.

2. *De Costarum fistulis.*

Solent autem inter costas fistulae subter ire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte praecidenda³ & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent quoque, ubi costas transierunt, septum id,³⁰ quod transversum a superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi potest & ex loco, & ex magnitudine dolores,³⁵

¹. 9. F. si sic sub. l. ead. M. F. P. recte. l. 14. M. F. P. ramuli. l. 15. M. F. excidendum, l. 16. M. F. P. totó. l. 21. M. F. P. & aequ. l. 22. M. F. P. om. est. l. 25. M. F. P. ignorant De costarum fistulis. l. 26. M. F. P. subter exire. l. 28. M. F. P. decidenda. l. 30. M. F. P. om. quoque. l. 33. M. F. P. om. potest.

² Aeginet. IV. 49. ³ Aëtius Tetrab. IV. Serm. II. c. 55. ³ H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. p. i. c. 4.

ris, & q̄ia nonnunquam spiritus eo cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinae locus nullus est. In caeteris, ve-
5 ro, quae circa costas sanabilia sunt, pinguia medicamenta inimica sunt, caeteris, quae ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta im-
10 ponuntur.

3. De Ventris fistulis.

Ventri nullum os subest; sed ibi perniciose admodum fistulae fiunt: adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. Id non ex
15 toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri potest, tūtior fistula est contra jecur, & lienem, & ventriculum, quam contra intestina: non quo perniciosior ibi res sit, sed quo alteri
20 periculo locum faciat. Cujus experimen-
to moti quidam auctores parum modum rei cognoverunt. Nam venter saepe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futurae compre-
25 hendunt. quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perrupit, excidere eam licet, futuraque oras conjungere. Si vero ea fi-
stula intus patuit, excisa necesse est latius
30 foramen relinquat. quod nisi permagna vi sui non potest; utique ab interiore parte, qua quasi membrana quaedam finit abdomen, quam ~~επιτόνος~~ Graeci vocant. Er-
go, ubi aliquis ingredi ac moveri coepit,
rum-

I. 1. M. P. doloris potest. I. 4. M. F. P. medicami-
ni. I. 11. M. F. P. ignorant De ventris fistulis. I. 27.
M. V. P. perrumpit. I. 30. M. F. P. magna. I. 31. M.
I. P. usque ab interiore parte, sui non potest.

rumpitur illa futura, atque intestina solvuntur, quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

493.

4. *De Ani fistulis.*¹

Propriam etiamnum animadversionem desiderant eae, quae in ano sunt. In has demislo specillo, ad ultimum ejus caput incidi cutis debet: dein novo foramine specimen educi lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum fit. Ibi linum apprehendendum ligandumque cum altero capite est, ut laxe cutem, quae super fistulam est, teneat. Id que² linum debet esse crudum, & duplex triplexve, sic tortum, ut unitas in eo facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lavare, cibum capere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis in die, soluto nodo, ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quae superior fuit. Neque committendum est, ut id linum putrefiat; sed tertio quoque die nodus resolvendus est, & ad caput alterum recens linum alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quae supra fistulam est, incidit: simulque & id sanescit, quod a lino relictum est; & id, quod ab eo mordetur, inciditur. Haec ratio curationis longa, sed sine dolore est.

Qui festinant, adstringere cutem lino debent, quo celerius secetur; noctuque ex peni-

I. 8. M. F. P. ea. I. 12. M. F. P. perforatum. I. 13. M. F. P. apprehendendum. I. ead. M. F. P. vinciendoque. I. 17. M. P. om. in eo. I. 19. M. F. P. lavari. I. 20. M. F. P. om. in. I. 21. M. F. P. solvo. I. ead. M. modo. I. 22. M. P. fuerit. I. 25. M. F. P. alligandum est. I. 33. M. F. P. fessinat. I. 34. M. F. P. debet. I. ead. M. P. fecet. I. ead. M. F. P. om. ex.

1 Aeginet. VI. 78. H. F. ab Aquapendente Oper. Chir. P. 1. c. 93. Petr. de Marchettis Observ. Medic. Chirurgic. in fine multa.
2 Quid sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 93.

penicillo tenuia quaedam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extenditur. sed haec dolorem movent. Adjicitur celeritati, sicut tormento quoque, si & lignum, & id, quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur ex iis, quibus calidum exedi proposui. Potest tamen fieri, ut ad scalpelli curationem etiam illo loco veniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in haec genera demissio specillo, duabus lineis incidenda cutis est, ut media inter eas habenula tenuis admodum injiciatur, ne protinus orae coëant; sitque locus aliquis linamentis, quae quam paucissima superinjicienda sunt; omniaque eodem modo facienda, quae in abscessibus posita sunt. Si vero ab uno ore plures sinus erunt, recta fistula scalpello erit incidenda; ab eo caeterae, quae jam patebunt, lino excipiendae. Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto pervenire non poterit, collyrium demittendum erit.

Cibus autem in omnibus ejusmodi casibus, sive manu, sive medicamentis agetur, 25 dari debet humidus; potio liberalis, diuque aqua. ubi jam caro increvit, tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corporis impletibus.

C A P . V.

30 De Telis e corpore extrahendis. *

TE LA quoque, quae illata corporibus intus haeserunt, magno negocio saepe ejiciuntur. Sunt enim quaedam difficultates

I. 7. M. F. P. posui. I. ead. M. F. P. poterit. I. 8.
M. F. P. loci. I. 13. M. F. P. ejiciatur. I. ead. M. F.
P. ora. I. 16. M. F. P. qui. I. 17. M. F. P. positus
est. I. 33. M. F. P. que.

* Aeginet. VI. 88.

tates ex generibus eorum; quaedam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit. illic viam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic, a scalpello accepit. nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum infedit, & in summa carne est, aut certe magnas venas & loca nervosa non transit, nihil melius est, quam, qua venit, id revelare. Si vero plus est, per quod telo revertendum, quam quod perrumpendum est: jamque venas nervosque id transit, commodius est aperire, quod superest, eaque extrahere. nam & proprius petitur, & tu¹⁰ tius evellitur. Et in majore membro, si medium mucro transit, facilius sanescit, quod pervium est: quia utrinque medicamento fovetur. Sed, si retro telum recipiendum, amplianda plaga est; quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflamatio: quae major sit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo postea transeunte amplietur. In summa autem utraque parte ista habenda cura est, ne nervus, ne vena major, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumque a scalpello. Ubi autem incisum est satis, telum eximendum est: tunc quoque eodem modo, & eadem cura habita, ne sub eo, quod eximitur, aliquid eorum laedatur, quae tuenda esse proposui.

2. De

I. 4. M. F. P. qua. I. 10. M. F. P. evellere. I. 13. M. F. P. transit. I. 14. Alii itaque. I. 19. M. F. P. recipiendum est. I. 20. M. F. P. amplianda scalpello plaga. I. 26. M. F. P. om. in. I. ead. M. F. P. ita. I. 30. M. F. P. om. a. I. 31. M. F. P. satis incisum est. I. 33. M. F. P. eximetur.

2. *De Sagittis recipiendis.*

Haec communia sunt: praeter quae propria quaedam in singulis telorum generibus sunt, quae protinus subjiciam. Nihil tam facile in corpus, quam sagitta, conditur, eademque altissime insidit. Haec autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa angusta est. Saepius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est; praecipueque, quia fere spiculis cingitur; quae magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde, aperta via, caro diduci debet ferramento facto ad similitudinem Graecae literae: deinde, ubi apparet mucro, si ei arundo inhaeret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit. Si jam illa decidit, solumque intus ferrum est; mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. nam, ampliato magis vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi; si ea majora valentioraque sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid dilacerent, sic evellenda sunt. & in sagittis quidem haec observatio est.

3. *De Latis telis educendis.*

Latum vero telum, si aliquis intus in carne habuerit, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulneri ipsi quoque in-

I. 1. M. F. P. om. *De sagittis recipiendis.* I. 2. M. F. P. deest quae. I. 4. M. F. P. generibus subjicienda sunt. I. 5. M. F. corpore. I. 6. M. i. insedit. I. 8. M. F. P. in angusto. I. 14. M. F. P. v. I. 14. M. F. P. apparuit si mucro. I. 15. F. om. ei. P. si mucroni ar. I. 16. M. F. P. forcipe. I. 22. M. F. P. om. magis. I. 25. M. P. forcipe. I. 28. M. F. P. fixis. I. 29. M. F. P. lacerent. I. 31. M. F. P. om. *De lati telis educendis.* I. 32. M. F. P. conditum est.

ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo quodam genere ferramenti, quod *Dionisius* γεγραπτον Graeci vocant; quoniam auctorem Dioclem habet; quem inter priscos maximosque medicos fuisse, jam 5 posui. Lamina est ferrea, vel aenea etiam; ab altero capite duos utrinque deorsum conversos uncos habens; ab altero duplicita lateribus, leviterque extrema eam in partem inclinata, quae sinuata est; insuper 10 etiam ea parte inclinata, quae perforata est. Haec juxta telum transversa demittitur: deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paululum torquetur, ut telum foramine suo excipiat: cum in cavo mucro est, illico 15 duo digiti, subiecti partis alterius uncis, simul ferramentum id extrahunt, & telum.

4. *De alio telorum genere.*

Tertium genus telorum, quod interdum evelli debet, est plumbea glans, aut 20 lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta cute, integrum intus infedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque, quod ineft, ea, qua venit, forcipe extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub 25 omni iictu, si telum vel ossa inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demerit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; & tunc vel manu vel forcipe telum extrahendum est. 30 Et vix unquam ita telum non sequitur, sed, si morabitur, excuti quoque cum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi non

I. 3. F. Diocoris Graecis Besalkon. M. Diocris Graeci be-
salkum. P. Diocleum Erapifcum Gr. v. I. 6. M. F. P. vel. I.
ead. F. abenea. I. 8. M. F. P. habet. I. 10. M. F. P. insuper
ibi etiam. I. 11. M. P. om. ea. I. 14. M. F. P. paulum. I.
16. M. F. P. simul & ferramentum. I. 18. M. F. P. om. De
alio telorum genere. I. 19. M. F. P. telorum est. I. 20. M.
F. P. om. est. I. 24. M. F. P. forifice. I. 29. M. F. P. sum.
I. 30. M. F. P. forifice. I. 33. M. F. P. iictum.

non evellitur , terebra juxta forare , & ab eo foramine , ad speciem literae , contra telum os excidere sic , ut lineae , quae diducuntur , ad telum spectent : eo facto , id ne-
cessum est labet , & facile auferatur .

Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit , circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda , & per has in diversas partes diducenda sunt , ut nervos distendant : quibus extensis , laxius inter ossa spatium est , ut sine difficultate telum recipiatur . Illud videndum est , sicut in aliis locis posui , ne quis nervus , aut vena , aut arteria a telo laedatur , dum id extraehitur : eadem scilicet ratione , quae supra posita est .

5. De venenato telo evellendo .

At , si venenato quoque telo quis ictus est , iisdem omnibus , si fieri potest , etiam festinantis actis , adjicienda curatio est , quae vel epoto veneno ¹ , vel a serpente ictis adhibetur . Vulneris autem ipsius , extracto telo , medicina non alia est , quam quae essent , si corpore icto nihil inhaesisset . de qua satis alio loco dictum est .

C A P . VI.

305.

De Gangliis , & Meliceride , & Atheromate ,
2 & Steatomate , capitinis tuberculis .

30 H AEC evenire in qualibet parte corporis possunt : reliqua certas sedes habent , de quibus dicam , orsus a capite . In hoc multa variaque tubercula oriun-

l. 1. M. F. P. om. &c. l. 2. M. F. P. eo quoque foramine. l. ead. M. F. P. ¶ l. 17. M. F. P. ignorant De venenato telo evellendo. l. 27. F. M. gangiliis. l. 28. F. M. beronate. l. 29. M. F. P. venire.

¹ Scribon. Larg. C. XLV. c. 175. ² Aeginet. IV.
34. VI. 36. Actuar. M. M. IV. 16.

oriuntur ¹ γάγγηα, μελικεῖδες, & ἀσεπί-
μα nominant ; aliisque etiamnum voca-
bulis quaedam alii discernunt ; quibus ego
~~σταύρωμα~~ quoque adjiciam. quae quamvis
& in cervice, & in alis, & in lateribus ori-
ri solent ; per se tamen non posui ; cum ista
omnia mediocres differentias habeant, ac
neque periculo terreat, neque diverso
genere curentur. Omnia autem ista & ex
parvulo incipiunt, & diu paulatimque in-
crescent, & tunica sua includuntur. Quae-
dam ex his dura ac renitentia, quaedam
mollia cedentiaque sunt : quaedam spatio
nudantur, quaedam testa capillo suo per-
manent, fereque fine dolore sunt. Quid 15
intus habeant, ut conjectura praesagiri po-
test ; sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta
sunt, non potest. Maxime tamen in his,
quae renituntur, aut lapillis quaedam simi-
lia, aut concreti confertique pili reperiun-
tur. In his vero, quae cedunt, aut meli-
20 simile aliquid, aut tenui pupliculae, aut qua-
si rafae cartilagini, aut carni hebeti & cruentae,
quibus alii aliquae colores esse conser-
verunt. Fereque ganglia renituntur : athe-
romati subest quasi tenuis puplicula : meli-
ceridi liquidor humor ; ideoque pressu
circumfluit : steatomati pingue quiddam,
idque latissime patere consuevit, resolvit-
que totam cutem superpositam sic, ut ea la-
bet ; cum in caeteris sit adstrictior. Omnia,
derasa ante, si capillis conteguntur, per
medium oportet incidere, ut effundatur,
quicquid intus coit. Sed steatomatis tuni-
ca

288, 32.

*I. 1. M. F. P. γαγγίται. I. cad. M. F. ἄσεπώματα. I.
8. M. ne. I. 24. M. F. P. aliqui. I. 24. M. F. P. con-
suerunt. I. 25. M. F. gangilia. I. 27. M. F. pressum.
P. pressus.*

¹ Aeginet. IV. 16. & VI. 39. Actuat. M. M. II.
XL.

ca quoque secunda est: quia non facile a
cute & subiecta carne ea separatur. At in
caeteris ipsa tunica inviolata servanda est.
Protinus autem, cum ista alba & intenta se
5 ostendit, tum scalpelli manubriolo diduc-
cenda a cute & carne est, ejiciendaque cum
eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab
inferiore parte tunicae musculus inhaesit, ne
is laedatur, superior pars illius decidenda,
10 alia ibidem relinquenda est. Ubi tota ex-
empta est, committendae orae, fibulaque
his injicienda, & super medicamentum
glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica,
vel aliquid ex ea relictum est, pus moventia
15 adhibenda sunt.

C A P . VII.

*De Oculorum vitiis, quae scalpello
& manu curantur.*

20 **S**ED ut haec neque genere vitii, neque
ratione curationis inter se multum dis-
stant: sic in oculis, quae manu postu-
lant, & ipsa diversa sunt, & aliter alter-
que curantur. Igitur in superioribus pa-
pebris vesicae ² nasci solent, pingues graves-
25 que; quae vix attollere oculos sinunt, le-
vesque pituitae cursus, sed astidios, in ocu-
lis movent. Fere vero in pueris nascuntur.
Oportet, compresso digitis duobus oculo,
atque ita cute intenta, scalpello transversa
30 linea incidere, suspensa leviter manu, ne
vesica ipsa vulneretur, & ut, loco ei pate-
facto, ipsa prorumpat; tum digitis eam ap-
prehendere, & evellere. facile enim sequi-
tur.

L. 2. M. F. P. om. & l. ead. M. F. P. separaretur. l.
ead. . . P. om. At. l. 4. M. F. P. om. cum. l. 29. l.
F. transversam. l. 30. M. F. ¹ lineam. l. 31. M. F. P.
locus. l. ead. M. F. P. patescusest. l. 32. M. F. P. appre-
hendere oportet. l. 33. M. F. P. autem.

¹ Actuar. M. M. IV. 16. ² De hisce agit H. F. ab
Aquapend. Oper. Chirurg. Part. 1. c. 9.

tur. Dein superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur: quo paucissimis diebus cicatricula inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica est, effundit enim humorem; neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quae puri movendo sunt.

12. *De Critbe.*¹

In eadem palpebra super pilorum locum tuberculum paryulum nascitur, quod a similitudine ² hordei, a Graecis ^{κερα} nominatur. Tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foveri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed facile a parte sustineatur. hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, &, quicquid intus humoris est, exprimi: eodem deinde vapore postea quoque foveri, & superinungi, donec ad sanitatem perveniat.

3. *De Chalazio.*³

Alia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur; sed neque utique figurae ejusdem, & mobilia, simulatque dito huc vel illuc impelluntur. Quae, quia grandini similia sunt, + ^{χαλαζία} Graeci vocant. Haec incidi debent, si sub cute sunt ab exteriore parte; si sub cartilagine, ab interiore: dein scalpelli manubriolo deducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus plaga est, inungendum primo lenibus, dein

¹ I. 1. M. F. P. superungi. I. 3. M. F. P. om. quo. I. cad. M. F. P. paucissimisque diebus. I. 9. M. F. P. addunt tritervculo palpebrarum. I. 17. M. F. P. ea. I. 24. M. F. P. De chalazia palpebrarum. I. 29. M. F. P. ideoque ea ^{χαλαζία} vocant.

² Aegin. III. 22. Act. M. M. II. 7. ³ Varulus dicitur Marc. de Med. C. VIII. pag. 272. 3 Act. M. M. II. 7.

deinde acrioribus : si extra , superdandum emplastrum , quo id glutinetur.

4. De *Ungue oculorum.*¹

Unguis vero , quod *πηγύιος* Graeci vo-
cant , est membranula nervosa , quae oriens
ab angulo , nonnunquam ad pupillam quo-
que pervenit , eique officit . Saepius a narium ,
interdum etiam a temporum parte nasci-
tur . Hunc recentem non difficile est discu-
tere medicamentis , quibus cicatrices in
oculis extenuantur . Si inveteravit , jamque
ei crassitudo quoque accessit , excidi debet .
Post abstinentiam vero unius diei , vel ad-
versus in sedili contra medicum is homo
15 collocandus est , vel sic aversus , ut in gre-
mium ejus caput resupinus effundat . Qui-
dam , si in sinistro oculo vitium est , adver-
sum : si in dextro , resupinum collocari
volunt . Alteram autem palpebram a mini-
stro diduci oportet , alteram a medico : sed
ab hoc , si ille adversus est , inferiorem ; si
supinus , superiorem . Tum idem medicus
hamulum acutum , paulum mucrone intus
recurvato , subjicere extremo ungui debet ,
25 eumque infigere ; atque eam quoque pal-
pebram tradere alteri : ipse , hamulo appre-
henso , levare unguem , eumque acu traji-
cere linum trahente : deinde acum ponere ,
lini duo capita apprehendere , & per ea
30 erecto ungue , si qua parte oculo inhaeret ,
manubriolo scalpellī diducere , donec ad an-
gulum veniat : deinde invicem modo remit-
tere , modo attrahere , ut sic & initium ejus , &
finis anguli reperiatur . Duplex enim pericu-
lum

*I. 3. M. F. P. addunt quod Ptegion a Graecis voca-
tur. I. 6. M. F. P. angulo , quae nonnunquam. I. 15.
M. F. adversus.*

*1 Aeginet. III. 22. VI. 18. H. F. ab Aquapend.
Oper. Chirurg. Part. 1. Cap. 18.*

lum est; ne vel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex angulo quoque caruncula abscedatur; quae, si vehementius unguis ducitur, sequitur quoque ac decidit.⁵ Si abscessa est, patet foramen, per quod postea semper humor descendit: [†] ^{πνέω} Graeci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui ubi satis constitutus non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda membranula, ne quid ex angulo laedatur. Ei deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia aut lana succida: proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebrae glutinentur (siquidem id quoque tertium periculum accedit) eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur.¹⁵

Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemen. De qua re, ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt: alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit: sicut in vulneribus, & fistulis: alia, in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum & facile est; sicut evenit in iis, quae & tarde ³⁰ increscunt, & dolore non cruciant. In his ver expectandum est: aut, si quid magis preficit, melior tamen autumnus quam hiems vel aestas est; atque is ipse medius, jam fractis

285, 5.

*I. 4. M. F. P. abscedatur. I. 5. M. F. P. ideoque decipit
ac si. I. 6. M. F. P. patescit. I. 7. Alii πνέω. I. 11. M.
F. P. om. sic. I. ead. M. P. excidenda ea membranula.
I. 12. M. F. P. eo. I. 22. M. F. P. sed. I. 28. M. F. & in
fistulis. I. 33. M. F. P. vel aestas quam hiems. I. 34. M.
F. P. bis.*

² Trallian. II. 8.

tis aestibus , & nondum ortis frigoribus.
Quo magis autem necessaria pars erit , quae
tractabitur , hoc quoque majori periculo
subjecta est. & saepe , quo major plaga fa-
cienda , eo magis haec temporis ratio ferva-
bitur.

5. *De Encantibide.*¹

Ex curatione vero unguis , ut dixi , vitia
nascuntur , quae ipsa aliis quoque de causis
oriri solent. Interdum enim sit in angulo ,
parum ungue exciso , vel aliter , tubercu-
lum , quod palpebras parum diduci patitur :
*εγκαυδίς*² Graece nominatur. Excipi hamu-
lo , & circumcidi debet : hic quoque dili-
15 genter temperata manu , ne quid ex ipso
angulo abscindatur. Tum exiguum lina-
mentum respergendum est vel cadmia , vel
atramento futorio ; inque eum angulum , di-
ductis palpebris , inferendum , supraque eo-
20 dem modo deligandum : proximisque die-
bus similiter nutriendum , ut primo tantum
aqua egelida , vel etiam frigida foveatur.

6. *De Aencyloblepharo.*³

Interdum inter se palpebrae coalescent ,
25 aperirique non potest oculus. Cui malo
solet etiam illud accedere , ut palpebrae
cum albo oculi cohaerescant ; scilicet , cum
in utrovis fuit ulcus negligenter curatum.
fanescendo enim , quod diduci potuit &
30 debuit , glutinabitur ; *ἀγκυλοβλέφαρον* sub
utroque vitium Graeci vocant. Palpebrae
tantum inter se cohaerentes , non difficul-
ter diducuntur ; sed interdum frustra , nam
rursus glutinantur. Experiri tamen oportet :

I. 1. M. F. P. *aestibibus.* I. ead. M. F. P. om. &. I. 7. M. F. *Deen-*
canthide tuberculo. I. 13. M. F. P. *excidi.* I. 15. M. F. *quod.* I. 16. M.
F. P. om. *angulo.* I. ead. M. F. *abscidat.* I. 21. F. om. *primo.* I. ead. M.
P. *tantum ut primis.* I. 23. M. F. P. *addunt oculorum vitio.* I. 28. M.
F. P. *utroque.* I. 30. M. F. P. *glutinabit.* I. ead. M. F. *ἀγκυλοβλέφαρον.*
I. 31. M. F. P. *vitio.*

1 Tulpius Observ. lib. 1. c. 29. H. F. ab Aquap. Oper. Chir. Part.
1. c. 19. 2 Aeg. III. 22. Act. M. M. IV. 11. 3 Aeg. III. 22. VI. 15.

tet; quia bene res saepius cedit. Igitur adversum ¹ specillum inferendum, diducendaque eo palpebrae sunt: deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio ejus loci finiatur. At, ubi albo ipsius oculi palpebra inhaesit, Heraclides Tarentinus auctor est, adverso scalpello subsecare, magna cum moderatione, ut neque ex oculo, neque ex palpebra quicquam abscedatur; ac, si necesse est, ex palpebra potius. Post haec, inungatur ¹⁰ oculus medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieque palpebra vertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne inhaerent: ipsique etiam aegro praeципiatur, ut saepe eam duobus digitis attollat. ¹⁵ Ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse, neque unquam profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhaeserit, memoriae prodidit.

17. *De Aegilope.* ²

20

Etiannum in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo vitio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita assiduo defillat: *αίσιλοντα* Graeci vocant. Idque assidue male habet oculum: nonnunquam etiam exeso osse, usque ²⁵ ad nares penetrat. Idque interdum naturam carcinomatis habet: ubi intentae venae & recurvatae sunt, color pallidus, cutis dura est, & levi tactu irritatur, inflammationemque in eas partes, quae coniunctae sunt, evocat. Ex ³⁰ his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoque ea res ma-

*I. i. aversum legendum esse constat ex H. F. ab Aquap. Chirurg. Oper. Pars I. c. 7. qui meretur inspici. l. 9. M. F. abscedatur. l. 14. M. F. P. ne rursus inhaerent. l. 14. M. F. P. om. aegro. l. 19. M. F. P. prodit. l. 20. M. F. P. addunt *fistula oculorum*.*

¹ Quid sit, docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 7. p. 46. ² Actuar. M. M. IV. 11. Aetius Tetr. II. Serm. III. 86. H. F. ab Aquap. Oper. Chirurg. Part. I. c. 21.

maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum. neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse difficultatem. quanto autem angulo proprius id foramen est, tanto difficilior est, quoniam perangustum est, in quo versari manus possit: recenti tamen re mederi facilis est. Hamulo autem summum ejus foraminis 10 excipiendum; deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum; oculoque & caeteris junctis partibus bene obiectis, os ferramento adurendum est vehementius. quod si jam carie vexatum est, quo crassior huic squama abscedat, quidam adurentia imponunt; ut atramentum futorium, vel chalcitidem, vel aeruginem rasam. quod & tardius & non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur 20 eadem, quae in caeteris ustis.

8. De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebrae summa cutis relaxatur, & 25 procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit: modo sub ordine naturali pilorum aliis ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes vero hae sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem spathae lata, in ignem conjicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum currentis

I. 4. M. F. P. eam non. I. 5. M. F. P. quantoque autem. I. ead. M. F. P. deest autem. I. 9. M. F. P. sed hamulo, I. ead. M. F. P. om. autem. I. 15. M. F. P. bis. I. ead. M. F. P. accedit. I. 23. M. F. P. consuerunt. I. 24. M. F. P. palpebrae superioris summae. I. 30. M. F. P. om. vero. I. 32. M. F. P. hastae.

¹ Aeginet. VI. 13. H. F. ab Aquapend. Operat. Chir. Part. I. c. 12.

rantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebrae transvehat: deinde iterum, tertioque ad alterum angulum. quo fit, ut omnes pilorum radices adustae emoriantur. 5 Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat: atque ubi crustae exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facilius autem id genus sanescit. Quidam ajunt, acu translui juxta 10 pilos exteriorem partem palpebrae oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse injiciendum, & per eum in superiore 15 rem palpebrae partem attrahendum, ibique corpori agglutinandum, & imponendum medicamentum, quo foramen glutinetur. sic enim fore, ut is pilus in exteriore partem postea spectet. Id primum fieri non potest, 20 nisi in pilo longiore; cum fere breves eo loci nascantur. Deinde si plures pili sunt, necesse est longum tormentum sit, & toties acus transiens magnam inflammationem moveat. Novissime, cum humor aliquis 25 ibi subsit, oculo & ante per pilos & tum per palpebrae foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vincitus est pilus, non resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi abductus est, redeat. Ea vero curatio, quae 30 palpebrae laxoris ab omnibus frequenter, nihil habet dubii. Siquidem oportet coniecto oculo medium palpebrae cutem, sive ea superior, sive inferior est, apprehendere

I. 2. M. F. P. radicibus ab angulo. I. 4. M. F. P. tertioque usque ad. I. 11. M. F. P. pilos in exteriorem. I. 15. M. F. cojiciendum. I. 18. M. F. P. foramen quoque glutinetur. I. 21. M. F. P. loco. I. 23. M. F. P. cum. I. 24. M. P. transfuet.

^x Aeginet. VI. 13.

dere digitis, ac levare. tum considerare, quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit; si parum, ne nihil actum sit, & frustra se-
 5 etus aliquis sit. Quod deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento no-
 tandum est sic, ut inter oram, quae pilos
 10 continet, & propiorem ei lineam, aliquid relinquatur, quod apprehendere acus po-
 stea possit. His constitutis, scalpellus adhi-
 bendus est: &, si superior palpebra est, ante;
 si inferior, postea proprius ipsis pilis in-
 15 cidendum: initiumque faciendum in fini-
 stro oculo, ab eo angulo, qui tempori: in
 dextro, ab eo, qui naribus propior est: id-
 que, quod inter duas lineas est, exciden-
 dum. deinde orae vulneris inter se simplici
 20 futura committenda operiendusque ocul-
 us est: &, si parum palpebra descendet, la-
 xanda utique; si nimium, aut adstringenda,
 aut etiam rursus tenuis habenda ab ulte-
 riore ora excienda. Ubi secta est, aliae su-
 25 turae adjiciendae, quae supra tres esse non
 debent. Praeter haec, in superiore palpebra
 sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab in-
 feriore parte diducti pili sursum spectent.
 Idque, si levis inclinatio est, etiam solum
 30 fatis tuetur. Inferior palpebra eo non eget.
 His factis, spongia, ex aqua frigida expref-
 sa, super deliganda est. Postero die glutini-
 nans emplastrum injiciendum. Quarto su-
 turae tollenda est, & collyrio, quod inflam-
 matio-

I. 7. M. F. P. qua. I. 9. M. F. P. de interiore. I.
 20 M. F. P. propiore lineam linea.

mationes reprimit, superinungendum.

9. De Lagopitbalmo. 1.

Nonnunquam autem, nimium sub hac curatione excisa cute, evenit, ut oculus non contegatur. Idque interdum etiam ⁵ alia de causa fit. *λαγωφθαλμος* Graeci appellant. In quo si nimium palpebrae deest, nulla id restituere curatio potest: si exiguum, mederi licet. Paulum infra superciliū cutis incidenda est lunata figura, ¹⁰ cornibus ejus deorsum spectantibus. Altitudine esse plagae usque ad cartilaginem ² debet, ipsa illa nihil laesa nam, si ea incisa est, palpebra concedit, neque attolli postea potest. Cuta igitur tantum diducta sit, ut paullum in ima oculi ora descendat; hiante scilicet super plaga, in quam linamentum injiciendum est, quod & conjungi diductam cutem prohibeat, & in medio carunculam creet: quae ubi eum locum impletavit, postea recte oculus operitur. ¹⁵

10. De Eutropio. 3.

Ut superioris autem palpebrae vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit: sic inferioris, quo parum sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vito curationis, interdum etiam senectute. *εντρόπιος* Graeci vocant. si ex mala curatione ²⁵ est, eadem ratio medicinae est, quae supra posita est: plagae tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento ³⁰ id

I. 2. M. F. De Cagliancophthalmo. M. F. P. addunt oculorum. I. 6. F. λαυριαφθαλμος. I. 17. M. F. P. plagam. I. 18. M. F. conjiciendum. I. 20. M. F. P. cites. I. 25. M. F. P. quod. I. 26. M. F. P. quod.

¹ Aeginet. VI. 10. Aëtius Tetr. II. Serm. III. c. 73.

² Vide H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 14.

³ Actuar. M. M. II. 7.

id totum extrinsecus adurendum est; deinde melle inungendum a quarto die, vapore aquae calidae fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

5. 11. *De Staphylomate.*

Haec fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, five ruptis intus membranis aliquibus, five 10 laxatis; ¹ & similis figura ² acino fit. unde id *σαρξίλωνα* Graeci vocant. Curatio duplex est. Altera, ad ipsas radices per medium transfluere acu duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius 15 rius ex inferiore adstringere inter se, quae paulatim secando id excidant. Altera, in summa parte ejus ad lenticulae magnitudinem excidere; deinde spodium aut cadmiam inficcare. Utrolibet autem facto, album ovi 20 lana excipiendum & imponendum; posteaque vapore aquae calidae fovendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

12. *De Clavis oculorum.*

Clavi autem vocantur callosa, in albo 25 oculi tubercula; quibus nomen a figurae similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

30 13. *De Oculorum natura.*

Suffusionis jam alias feci mentionem; 367, 23. quia cum recens incidit, medicamentis quo-

¹ I. 2. M. F. P. at. I. 5. M. F. P. addunt oculi. I. 7. M. F. P. consuerunt. I. 15. M. F. P. interiore. I. 18. M. F. P. excidunt. I. 30. M. F. P. addunt & eorum suffusione.

² H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I, c. 17. Aegin. III. 22. VI. 19. Actuar. M. M. II. 7. Aëtius Tert. II. Serm. III. 34. 35. Aliud procidentia genus observavit Tulpius Obscur. L. 1. cap. 28. 3 Actuar. M. M. II. 7.

quoque saepe discutitur. sed, ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat. quae inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsis oculi natura indicanda est. Cujus cognitio, cum ad 5 plura loca pertineat; tum vel praecipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior a Graecis ~~χρηστίδης~~ vocatur: eaque, qua parte alba est, satis crassa, pupillae loco extenuatur. 10 Huic interior adjuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque plenior. quae ~~χρηστίδης~~ a Graecis nominatur. Hae duae tunicae, cum interio- 15 ra oculi cingant, rursus sub his coëunt; extenuataeque & in unum coactae per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhaerescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus 20 vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus ~~χρηστίδης~~ nominavit. Ea media subsidit; eoque cavo con- 25 tinet quiddam, quod, a vitri similitudine, ~~νιαλοειδής~~ Graeci vocant. Id neque li- quidum, neque aridum est; sed quasi concretus humor. Ex cuius colore pupillae color vel niger est, vel caesius, cum summa tota tunica alba sit. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit. 30 Sub his gutta humoris est, ovi albo similis, a qua videndi facultas proficitur. ~~χρυσαλ-~~
~~λωσιδής~~ a Graecis nominatur.

14. *De*

I. 9. M. F. P. ea. I. 11. M. F. P. inferior. I. 19.
M. F. coque.

14. *De Suffusione.*

Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concrevit humor sub duabus tunicis¹, qua locum vacuum esse proposui; isque paulatim indurescens, interiori potentiae se opponit. Vitii ejus plures species sunt, quaedam sanabiles, quaedam quae curationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si immobilis, colorem vero habet marinae aquae, 10 vel ferri nitentis, a latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes supereft. Si magna est, si nigra pars oculi, amissa naturali figura, in aliam se vertit, si suffusioni color coeruleus est, aut auro similis, si labat, & 15 hac atque illac movetur, vix unquam succurritur. Fere vero pejor est, quo ex graveiore morbo, majoribusve capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea curationi senilis aetas est; quae sine 20 novo vitio, tamen aciem hebetem habet: ac ne puerilis quidem; sed inter has media aetas. Oculus quoque curationi neque exiguum, neque concavus, satis opportunus est. Atque ipsius quoque suffusionis quaedam maturitas est. Expectandum igitur est, donec jam non fluere, sed duritie quadam concrevisse videatur.

Ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet; pridie, ab 30 omnibus abstinere. Post haec in adverso sedili collocandus est loco lucido, lumine adverso, sic ut contra medicus paulo altius fedeat; a posteriore autem parte caput ejus, qui curabitur, minister contineat, & im-

I. 1. M. F. P. om. *De suffusione.* I. 6. M. F. P. *vitiique ejus.* I. 10. M. F. P. *nitenis,* & a. I. 13. M. F. P. om. fe. I. 19. M. F. P. *curationis.* I. 21. M. F. P. at. I. ead. M. F. P. *bucc.* I. 24. M. F. P. om. *quoque.* I. 26. M. F. P. *durities quaedam.*

¹ Hoc non usque adeo veritati consentire putat H. F. ab Aquapend. Oper. Chit. Part. I. c. 16.

mobile id praestet: nam levi motu eripi
acies in perpetuum potest. Quin etiam ip-
se oculus, qui curabitur, immobilior fa-
ciendus est, super alterum lana imposta &
deligata. Curari vero sinister oculus dex-
tra manu, dexter sinistra debet. Tum acus
admovenda est, aut acuta, aut certe non
nimium tenuis, eaque demittenda, sed re-
cta, est per summas duas tunicas medio
loco inter nigrum oculi & angulum tem-
pori propiorem, e regione mediae suffusionis
sic, ne qua vena laedatur. Neque tam-
en timide demittenda est, quia inani lo-
co excipitur. Ad quem cum ventum est,
ne mediocriter quidem peritus falli potest; 15
quia prementi nihil renititur. Ubi eo ven-
tum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem
est, leniterque ibi verti & paulatim
eam deducere infra regionem pupillae de-
bet; ubi deinde eam transfit, vehementius 20
imprimi, ut inferiori parte insidat. Si haes-
tit, curatio expleta est. Si subinde redit,
eadem acu magis concidenda, & in plures
partes dissipanda est: quae singulae & faci-
lius conduntur, & minus late officiunt. 25
Post haec educenda acus recta est, impo-
nendumque est lana molli exceptum ovi al-
bum, & supra, quod inflammationem
coercent, atque ita devinciendum.

Post haec opus est quiete, abstinentia, 30
lenium medicamentorum inunctionibus,
cibo (qui postero die satis mature datur)
primum liquido, ne maxillae laborent;
deinde, inflammatione finita, tali, qualis in
vul-

I. 7. M. F. P. forte. I. 18. M. P. leviterque. I. 20.
M. F. P. transfit.

vulneribus propositus. Quibus , ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. *De Pituita oculorum.*

De pituitae quoque tenuis cursu , qui
5 oculos infestat , quatenus medicamentis
agendum est , jam explicui. Nunc ad ea
veniam , quae curationem ex manu postu-
lant. Animadvertisimus autem quibusdam
nunquam siccescere oculos , sed semper hu-
10 more tenui madere : quae res aspritudinem
continuat , & ex levibus momentis inflam-
mationes & lippitudines excitat , totam
denique vitam hominis infestat. Idque in
quibusdam nulla ope adjuvari potest , in
15 quibusdam sanabile est. Quod primum dis-
crimen nosse oportet , ut alteris succurra-
tur , alteris manus non injiciatur.

Ac primum supervacua curatio est in
his , qui ab infantibus id vitium habent ;
20 quia necessario mansurum est usque mor-
tis diem. Deinde non necessaria etiam in
his , quibus non multa , sed acris pituita est :
siquidem manu nihil adjuvantur ; medica-
mentis , & vietus ratione , quae crassiorem
25 pituitam reddit , ad sanitatem perveniant.
Lata etiam capita vix medicinae patent.
Tum interest , pituitam emitant venae ,
quaes inter calvariam & cutem sunt , an quae
inter membranam cerebri & calvariam :
30 superiores enim per tempora oculos rigant ;
inferiores , per eas membranas , quae ab
oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem
adhiberi remedium his , quae supra os fluunt ;
non potest his , quae ab osse. Ac ne his qui-
dem

I. i. M. F. P. propositus est. Quibus. I. ii. M. F.
P. om. &. I. 16. M. F. P. crimen est nosse. Lead. M.
F. P. alteri. I. 17. M. F. P. alteri. I. 21. M. F. P.
necessario. I. 30. M. F. P. fere. I. 34. M. F. P. sub.

dem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia levata altera parte, nihilo minus altera infestat.

Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lipitudine pituita suspenditur, a supercilii usque ad verticem illini debent: si seci oculi esse cooperunt, appareret per eas venas, quae sub cute sunt, irrigari: si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere: si est tumor, sed levior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venae exercant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Graecia tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est: adeo ut nulla medicinae pars magis per nationes quasque exposita sit.

Reperti in¹ Graecia sunt, qui novem lineis cutem capitis incidenter: duabus in occipitio rectis, una super eas transversa: dein duabus super aures, una inter eas item transversa: tribus denique inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui a vertice recta eas lineas ad tempora deducere: cognitisque, ex motu maxillarum, muscularum initisi, leviter super eos cutem incidenter, diductisque per retusos hamos oris, inferenter linamenta sic, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro cresceret, quae venas, ex quibus ad oculos transiret, adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt a media aure ad medium alteram

I. 11. M. P. humor. I. 19. M. F. P. quoque. I. 23. M. F. P. om. denique. I. 24. M. F. P. capite. I. 25. M. F. P. refe. I. 28. M. F. P. inductisque. I. 29. M. F. P. om. sic. I. 32. M. F. P. quibus humor. ad.

¹ H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurgic. Part. I. c. 4.

teram aurem, deinde a naribus ad verticem; tum ubi lineae committebantur, scalpello inciderunt; & post sanguinem effusum, os ibidem adusserunt. Nihilominus 5 autem & in temporibus, & inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt.

Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quae fere quidem in ejusmodi 10 malo tument: sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est. Tenuibus autem ferramentis, & retusis venae adurendae; donec in oculos pituitae cursus conquiescat. Id enim signum 15 est quasi excaecatorum itinerum, per quae humor ferebatur.

Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditaeque venae sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deligata¹, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venae prodeant, atramento notare eas contra tempora, & inter verticem ac frontem: deinde cervice resoluta, qua notae sunt, venas incidere, & sanguinem mittere: 25 ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide: ne subiecti musculi, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem, vehementer sic, ut squama ab osse recedat.

30 Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus & in superiore

¹ H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. Part. I. c. 3.

I. 3. M. F. P. *sanguine*. I. ead. F. *effuso*. M. P. *fusō*.
I. 6. M. F. P. *calvariam*. I. 12. M. F. P. *que*. I. 13. M. F. P. *oculis*. I. 18. M. F. P. om. *sunt*. I. 29. M. F. P. *ut sic*.

periore capitinis parte legunt. Adusta quo modo curanda sint, jam explicui. Nunc illud adjicio: neque ut crustae decidunt, neque ut ulcus impleatur, adustis venis, esse proponendum; ne vel sanguis erumpat, vel cito 5 pus supprimatur: cum per hoc siccescere eas partes opus sit; per illud exauriri opus non sit. Si quando tamen sanguis erupit, infrianda medicamenta esse, quae sic sanguinem supprimant, ut ne adurant. 10 Quemadmodum autem venae deligendae sint, quidque lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices, dicam,

C A P. VIII.

De Aurium morbis, qui manu &

15

sculpeo curantur.

VERUM ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quae in hac medicinae parte tractentur. So- 20 let tamen evenire vel a prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen ¹ in ea nullum sit, ideoque audiendi usū careat. Quod ubi incidit, specillo ten- 25 tandum est, altene id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. Nam si alte est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet; ne sine effectus spe oriatur disten- 30 tio nervorum, & ex ea mortis periculum sit: hoc facile curatur. Nam qua cavum esse debet, vel medicamentum aliquod impo-

l. 9. M. F. P. infrianda. l. 10. M. F. P. om. ut.

¹ Aeginet. VI. 23.

imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & jam ulcus purum est, injicienda eo pinna est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque id, medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat; quo fit, ut ea remota, postea facultas audiens sit.

10 At ubi aures perforatae sunt, & offendunt, trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leniter ejus orae exulcentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget; tum quod eum locum repleat, & cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in his, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere, quod super est, ad extremum 15 oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curri est, sarcire. quae res cum in labris quoque & naribus fieri possit, 20 eadem autem curationem habet, simul explicantur.

CAP. IX.

*Curta in auribus, labrisque ac naribus,
quomodo sarciri & curari possint.*

25 CURTA igitur in his tribus, ac si qua parte parva sunt, curari possunt: si qua majora sunt, aut non accipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam defor-

man-

I. 4. M. cojicienda. F. P. conjicienda. I. 6. M. F. P. idem. I. 10. M. F. P. aures in vivo puta perforatae. I. 12. M. F. ora. I. 16. M. F. P. &c sic cicatricem. I. 25. M. F. P. etiam. I. 31. M. F. P. paria. I. 32. N. F. recipient.

I Aeginet. III. 24. VI. 25.

mantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jaictura sit; quia minus facile & cibis assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus; sed ex vicino adducitur. quod etsi in levi mutilatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest; in magna, non potest. Neque senile autem 10 corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinae idoneum est: quia nusquam aut celerius cancer occupat, aut difficilis tollitur.

Ratio curationis ejusmodi est: id quod curatum est, in quadratum redigere; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quae citeriorem partem ab ulteriori ex toto diducant; deinde ea, quae 20 sic resolvimus, in unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam transversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur: sic enim fit, ut facilis 25 quod adducitur, sequi possit. quod non vi cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & demissum non multum recedat.

Interdum tamen ab altera parte cutis 30 haud omnino adducta deformem, quem reliquit locum, reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex me-

I. 4. M. P. necessarii. I. 8. M. F. P. om. et si. I. ead. M. F. P. mutilatione. I. 14. M. F. P. om. aut. I. 17. M. F. P. curatum. I. 31. Alii reposuimus. I. 30. M. F. P. autem.

medio naso imisve narium partibus, neque ex angulis laborum quicquam attrahere tentabimus. Utrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quae tamen interdum etiam duobus locis curta esse confuerunt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est: neque enim aut 10 glutinatur, aut acu tuto trajicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberae cutis utrinque coitus puris fieri possit. Tum junctae orae inter se suendae sunt, utrinque cute apprehensa; & qua 15 priores lineae sunt, ea quoque suturae injiciendae sunt. Siccis locis, uti naribus, illita spuma argenti, satis proficit. In interiores vero, lunatasque plagas, linamentum dandum est; ut caro increscens vulnus im- 20 pleat. Summaque cura, quod ita futum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquae calidae, rursusque idem medicamentum 25 injiciendum. quo fere septimo die glutinatum est. Tum suturae eximi, & ulcus ad sanitatem perduci debet.

C A P . X .

De Polypo. 1

380.

POLOYPUM vero, qui in naribus nascitur, praecipue ferro curari jam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto, in modum ² spathae facto, resolvere ab

t. 1. M. P. imis venarum. l. 4. M. F. P. imis si quid aut medio naso aut. l. 6. M. F. P. curata. l. 16. M. F. l. ut in. l. 17. M. P. ulteriores. l. 25. M. F. P. fereque. l. 27. M. debent. l. 30. M. F. P. De polypi curatione per ferrum. 1 Aeginet. VI. 25. H. F. Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 24. 25. 2 De hac consule Rhodium ad Scritbon, Largum, pag. 46.

ab oste oportet: adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur; in qua difficilis curatio est. Ubi abscessus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque nares leniter implenda. Sanguine suppresso, linamento ulcus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illata, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

439, 5.

C A P. XI.

De Ozena.

379.

15

ID autem vitium, quod *Zava* a Graecis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit; cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel subtilem fistulam, vel eodem scriptorium calatum in narem esse conjiciendum, donec sursum ad os perveniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse aerugine & melle: ubi purus est, lycio ad sanitatem perdendum. Vel narem incidendam esse ab imo parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoveri. Tum sui narem debere; & adustum quidem

I. 8. M. F. P. vulnus. I. 23. M. F. sutilem. H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. P. I. c. 26. p. 104. & 106. legit fidilem. I. 24. F. cojiciendum. I. 31. M. F. una.

¹ Hodierni Chirurgi argenteum habent. H. F. ab Aquap. Oper. Chir. P. I. cap. 26.

dem ulcus eadem ratione curari: futuram vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

C A P. XII.

*De Oris vitiis, quae manu & ferro
curantur.*

5

1. *De Dentibus.*

381.

IN ore quoque quaedam manu curantur. Ubi in primis dentes nonnunquam moventur, modo propter radicum imbecilatatem, modo propter gingivarum marcescentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admovere, ut leviter attingat, non ut insidat. Adustrae gingivae melle illinendae, & mulso eluentiae sunt. Ut pura ulceræ esse coeperunt, arida medicamenta infrianda sunt ex his, quae reprimunt.

Si vero dens dolores movet, eximique eum, quia medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo ² resolvatur; tum is concutiendus est. Eademque facienda, donec bene moveatur. nam dens haerens cum summo periculo evellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur ³. Idque etiam majore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosve concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forcipe + dens excipiendus est.

30 At si exesus est ante, id foramen vel ⁴ linnenamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forcipe confringatur.

Recta

*I. 10. M. P. arescentium. I. 16. M. F. P. infricanda. I.
ead. F. iisque. I. 22. M. P. eaque. I. 28. M. F. P. forfice.
I. 30. M. F. P. ac. I. 32. M. F. P. forfice.*

¹ Aegin. III. 26. ² Id saepenumero sufficit teste Simone Paulo Quadr. Botan. p. 151. ³ Imo pars avellitur, quod aliquando ipse vidi. ⁴ Vide figuram apud Rhodium ad Scrib. Largum, p. 94. ⁵ Aeginet. VI. 28.

Recta vero forceps ducendus est, ne inflexis radicibus os rarum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices 5 habent: saepe enim forceps, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivae prehendit & frangit.

Protinus autem, ubi plus sanguinis profluit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirienda est testa, quae recessit, & vulfella protrahenda est: si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossi testa recipiatur. Quod si fractum statim non est, sed intumescit extrinsecus maxilla, ut os hiare non possit, foris imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tum id extraхи convenit. Nonnunquam etiam, eo laeso, fissura fit, quae eradi debet.

Dens autem scaber, qua parte niger est, 25 radendus est, illinerendusque rosae flore contrito, cui gallae quarta pars & altera myrrae sit adjecta, continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, fricatione capitis, cibo non acri utendum est.

At, si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene haerent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimentia,

1. M. F. P. *forfex*. I. ead. M. F. P. *duconda*, I.
2. M. F. P. *earum*. I. 6. M. F. P. *forfex*. I. 13. M. F. *vulfella*. I. 15. F. P. *ossis*. I. ead. M. F. P. *factum*. I. 16. M. F. P. *indurescit*. I. 17. F. P. *is*. M. bis. I. ead. M. F. P. *sed*. I. 23. M. F. P. *fistula*. I. 30. M. F. P. *frictione*.

mentia, ut vinum, in quo malicorium de-
coctum, aut in quod galla candens conjec-
ta sit. Si quando etiam in pueris ante
dens nascitur, quam prior excidat is, qui
5 cadere debuit, circumradendus & evellen-
dus est; is, qui natus est in locum prioris,
quotidie digito adurgendus, donec ad ju-
stam magnitudinem perveniat. Quoties-
cunque dente exempto radix relicta est,
10 protinus ea quoque ad id facta forcipe, quam
^{πλευρας}¹ Graeci vocant, eximenda est.

2. *De Tonsillis induratis.*

383.

Tonsillas autem, quae post inflammatio-
nes induruerunt, [†] *avnaes* autem a Graecis
15 appellantur, cum sub levi tunica sint, oportet
digito circumradere & evellere: si ne-
sic quidem resolvuntur, hamulo excipere,
& scalpello excidere: tum ulcus aceto elue-
re, & illinire vulnus medicamento, quo
20 fanguis supprimitur.

3. *De Uva.*

389.

Uva, si cum inflammatione descendit,
dolorique est, & subrubicundi coloris, praec-
idi sine periculo non potest: solet enim
25 multum sanguinem effundere, itaque me-
lius est iis uti, quae alias proposita sunt. Si
vero inflamatio quidem nulla est, nihil
lominus autem ea ultra justum modum a
pituita diducta est, & tenuis, acuta, alba
30 est, praecidi debet. Itemque, si ima, livida
& crassa; summa, tenuis est. Neque quic-
quam commodius est, quam vulsella ap-
prehendere, sub eaque, quod volumus, ex-
cidere. Neque enim ullum periculum est,

ne

I. 2. M. F. P. quo. I. 3. M. F. P. alter. I. 5. M. F. P.
circum purgandus. I. 10. M. F. P. forifice. I. 11. M. F. P.
^{pietas}. I. 12. M. F. P. om. *De Tonsillis induratis.* I. 14.
* M. F. ^{avnaes}. I. 20. M. F. P. supprimatur. I. 26. M.
P. bis. I. 29. M. F. deducta. I. 32. M. F. P. preben-
dere.

^{IV} 1. Vide Rhodium ad Scrib. Largum. pag. 94.

ne plus minusve praecidatur : cum liceat tantum infra vulsellam relinquere , quantum inutile esse manifestum est ; idque praecidere , quo longior uva est , quam esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt , quae in tonsillis proxime posui.

4. *De Lingua.*

387. Lingua vero quibusdam cum subjecta parte a primo natali die juncta est : qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsellam apprehendenda est , sub eaque membrana incidenda : magna cura habita , ne venae , quae juxta sunt , violentur , & profusione sanguinis noceant. Reliqua curatio vulneris in prioribus positata est. Et plerique quidem , ubi consanuerunt , loquuntur. Ego autem cognovi , qui succisa lingua , cum abunde super dentes eam promeret , non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina , etiam , ubi perpetuum est , quod fieri debet , non tamen perpetuum est id , quod consequi convenit.

5. *De Abscessu sub lingua.* 2

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit ; quod fere consistit in tunica , doloreisque magnos movet. Quod si exiguum est , incidi semel satis est : si majus , summa cutis usque ad tunicam excidenda est ; deinde utrinque orae hamulis excipiendae , & tunica , undique circumdata , liberanda est : magna diligentia per hanc curationem habita , ne qua major vena incidatur.

6. *De*

I. 20. M. F. P. premeret. I. 24. M. P. sequi. I. 33. M. P. omnem.

¹ Aeginet. VI. 29. ² H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 36.

6. De Labris.¹

Labra autem saepe sinduntur, eaque res
habet cum dolore etiam hanc molestiam,
quod sermo prohibetur; qui subinde eas
5 rimas cum dolore diducendo sanguinem
citat. Sed has si in summo sunt, medica-
mentis curare commodius est, quae ad ul-
cera oris fiunt: si vero altius defunderunt,
necessarium est tenui ferramento adurere.
10 quod spathae simile, quasi transcurrere, non
imprimi debet. postea facienda eadem sunt,
quae in naribus adjustis exposita sunt.

C A P . XIII.

De Cervicis vitio.

15 A ^τ in cervice, inter cutem & asperam
arteriam, tumor increvit (^{εργάζονται}
^{λέω}² Graeci vocant) quo, modo ca-
ro hebes, modo humor aliquis, melli aquae-
ve similis, includitur: interdum etiam mi-
20 nutis ossibus pili immisti. Ex quibus que-
quid est, quod tunica continetur, potest
adurentibus medicamentis curari. Quibus
summa cutis cum subjecta tunica exurit.
quo facto, sive humor est, profluit; sive
25 quid densius, digitis educitur: tum ulcus
sub linamentis sanescit. Sed scalpelli cura-
tio brevior est. Medio tumor una linea
inciditur usque ad tunicam: deinde vitio-
sus sinus ab integro corpore digito separa-
30 tur, totusque cum velamento suo eximi-
tur: tum aceto, cui vel saltem vel nitram
aliquis adjecit, eluitur; oraeque una futura
junguntur; caeteraque eadem, quae in aliis
fu-

I. 12. M. F. P. auribus. I. 14. M. F. P. De cervicis
vicio & curatione. I. 23. M. F. P. superjecta. I. ead.
ed. Aldi & Stephani exeditur. Alii exoritur. I. 27. M.
F. P. tumore.

¹ Oribas. de Loc. Affect. IV. 56. ² Aeginet. VI.
38.

futuris, superinjiciuntur: leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. Si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, linamentisque id curandum, & caeteris pus moventibus.

C A P. XIV.

392.

De Umbilici vitiis.¹

SUNT etiam circa umbilicum plura vicia; de quibus, propter raritatem, inter autores parum constat. Verissimile autem, id a quoque praetermissum, quod ipse non cognoverat: a nullo id, quod non viderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecorum prominere. Causae requiruntur? Meges tres has posuit: modo intestinum eo irrumpere, modo omentum, modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adjecit, carnem ibi interdum increscere, eamque modo integrum esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit: sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eo dixit irrumpere. Heron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & ejus, quod simul & omentum & intestinum habuerit.

Quod autem horum sit, his indicis cognoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus, neque mollis est: omni frigore minuitur; non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit: sonat interdum; atque, ubi resupinus est aliquis, relapsio intestino, ipse desidit. Ubi vero

I. 5. M. F. P. est. I. 23. P. Hieron. I. 27. ed. Aldi & Stephani *Quid*. I. 30. M. F. P. frigore comminuitur. I. 33. M. F. P. *delapso*.

¹ Aeginet. VI. 51. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 52.

vero omentum est, caetera similia sunt, tumor mollior, & ab ima parte extenuatus in verticem est; si quis apprehendit, elabitur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrumque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomatose exposui. Humor autem, si premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus reddit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.

Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur, itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tu more effundunt, & vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variae sententiae sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterus, sive intestinum, sive omentum est, relabatur. Si nus vero umbilici, tum vacuus, a quibusdam duabus regulis excipitur; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: a quibusdam ad imum acu trajectatur, duo lina ducente; deinde utriusque lini duobus capitibus diversae partes adstringuntur, (quod in uva quoque oculi fit:) nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adjecerunt quidam, ut antequam vincirent, summum una linea inciderent; quo

431, 15.
434, 26.

I. 2. Aldina una. I. ead. M. F. P. parte latus extenuatus. I. 24. M. P. delebatur. I. 26. M. F. P. exceptus est. I. 28. Ald. id vitium. I. 34. M. F. P. addunt excederentque.

quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent: tum deinde vincirent. Sed abunde est, jubore spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim ejus atramento 5 notare; resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut, si quid relapsum non est, manu cogatur: post haec, umbilicum attrahere, & qua nota atramenti est, lino vehementer adstringere: deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur: atque, ut caetera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam, ubi humor est, 15 optime proficit.

Sed ante quaedam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed a septimo fere anno ad quartum decimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque 25 tuoribus facile subvenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hibernum vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima aestas non aliena est. Praeter haec, abstinere pridie debet. Neque id satis est: sed alvus quoque ei ducenta est; quo facilius omnia quae excesserunt, intra uterum confidant.

C A P.

I. 2. M. F. P. vinxerunt. I. 7. M. F. P. delapsum.
I. 34. M. F. P. alvum.

C A P . X V .

Quomodo Aqua bydropicis emittatur. ¹

A QUAM his , qui hydropici sunt , e^cmitti oportere , alias ² dixi . nunc , quemadmodum id fiat , dicendum . Qui-
dam autem sub umbilico , fere quatuor interpositis ³ digitis a sinistra parte ; quidam , ipso umbilico perforato , id facere consueverunt : quidam , cute primum adusta , deinde
10 interiore abdomen inciso ; quia , quod per ignem divisum est , minus celeriter coit . Ferramentum autem demittitur magna cu-
ra habita , ne qua vena incidatur . Id tale esse
debet , ut fere tertiam digiti partem latitudo
15 mucronis impletat : demittendumque ita est , ut membranam quoque transeat , qua caro ab interiore parte finitur : eo tum plumbea aut aenea fistula injicienda est , vel recurvatis in exteriorum partem labris , vel ea-
20 dem circumcingente quadam remora ; ne tota intus delabi possit . Hujus ea pars , quae intra , paulo longior esse debet , quam quae extra ; ut ultra interiorem membranam procedat . Per hanc effundendus humor est :
25 atque ubi major pars ejus evocata est , claudenda demissio linteolo fistula est ; & in vulnere , si id ustum non est , relinquenda . Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum , donec nullum aquae
30 vestigium appareat . Quidam tamen etiam non usta cute , protinus fistulam recipiunt , & super vulnus spongiam expressam ex aqua frigida , vel ex aceto deligant : deinde po-
stero

1. 5. M. F. dicendum est . 1. 6. M. F. autem qui sub . 1.
8. M. F. P. om. id . 1. ead. M. F. P. confuerunt . 1. 18. M.
F. cojicienda . 1. 19. M. F. P. in media . 1. 20. M. F. P.
circumsurgente . 1. ead. F. om. quadam remora . M. qua-
dam mora . P. quodam nodo . 1. 23. M. F. P. ulteriorem .
1. 25. M. F. P. cludenda . 1. 32. M. F. P. ignorant ex
aqua frigida , vel ex aceto .

1. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. 1. c.
54. 2. Libro III. c. 21. 3. Aeginet. V. 50.

stero die rursus fistulam demittunt (quod recens vulnus paululum diductum patitur) ut, si quid humoris supereft, emittatur: idque bis ita fecisse contenti sunt.

C A P. XVI.

5

*De Ventre i^ctū perforato, & Intestinis vulneratis.*¹

NON NUNQUAM autem venter i^ctū aliquo perforatur; sequiturque, ut intestina evolvantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint; deinde, an his color suis maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse, jam retuli. Latius intestinum sui potest: non quod certa fiducia sit; sed quod dubia spes, certa desperatione sit potior. + interdum enim glutinatur. Tum, si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si vero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus; &, si angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat. Ac, si jam sicciora intestina sunt, perlueda aqua sunt, cui paululum admodum olei fit adjectum. Tum minister oras vulneris leniter diducere manibus suis, vel etiam duobus hannis, membranae interiori injec-
tis,

*I. 2. M. F. P. paulum. I. 6. M. F. P. De intestino-
rum vulneratorum curationibus. I. 30. M. F. P. paulum.
I. 32. M. F. P. leviter.*

¹ H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. I. c. 55.

tis, debet: medicus priora semper intestina,
quae posteriora prolapsa sunt, condere sic,
ut orbium singulorum locum servet. Re-
positis omnibus, leniter homo concutien-
5 dus est. quo fit, ut per se singula intestina in
suas sedes reducantur, & in his confidant.
His conditis, omentum quoque confide-
randum est: ex quo, si quid jam nigri &
emortui est, forfice excidi debet: si quid
10 integrum est, leniter super intestina redu-
ci: futura autem, neque summae cutis, ne-
que interioris membranae per se, satis pro-
ficit; sed utriusque. Et quidem e duobus
linis facienda est, & spissior quam alibi;
15 quia & rumpi facilius motu ventris potest,
& non aequa magnis inflammationibus pars
ea exposita est. Igitur in duas acus fila con-
jicienda, eaeque duabus manibus tenendae:
& prius interiori membranae sutura inji-
20 cienda est sic, ut sinistra manus in dexte-
riore ora, dextra in sinistriore a principio
vulneris orsa, ab interiori parte in exteriori
rem acum immittat. quo fit, ut ab intesti-
niis ea pars semper acuum longe sit, quae
25 acuta; propinqua, quae retusa est. Semel
utraque parte trajecta, permutandae acus in-
terior manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit
in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dex-
tra continuit: iterumque eodem modo per
30 oras immittendae sunt: atque ita tertio
& quarto, deincepsque permutatis inter
manus acubus includenda plaga. Post haec,
eadem fila, eademque acus ad cutem trans-
ferendae, similique ratione ei quoque parti
utra-

I. 6. M. F. P. diducantur. I. 10. M. F. P. leviter. I. ead.
M. F. P. diduci. I. 13. M. F. P. om. e. I. 14. M. F. P.
vincienda. I. ead. M. F. P. om. &. I. 17. M. F. P. duabus.
I. ead. P. acubus. I. 17. P. trajicienda. I. 18. M. F. P. ea-
que. I. ead. M. F. P. tenenda. I. 25. M. F. P. om. acuta
propinqua. I. 33. M. F. P. om. acus.

Ff 3

454 A. CORN. CELSI Lib. VII.
utraque sutura injicienda; semper ab interiore parte acibus venientibus, semper inter manus trajectis. Dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

C A P. XVII.

De Interiore membrana abdominis rupta. ¹⁰

INTERDUM tamen vel ex iectu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod ¹⁵ feminis quoque ex utero saepe evenire consuevit: fitque praecipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecora intumescat. Atque ²⁰ id quoque aliter atque aliter curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immisso sic utrinque devincunt, quemadmodum & in umbilico, & in uva positum est, ut, quicquid super vinculum ²⁵ est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii (quod semper eodem modo servandum esse jam posui) & tum oras futura jungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; queaque integra

^{449, 32.} I. 5. M. F. P. impressam. I. 7. M. F. P. leviter. I. 10. M. F. P. parte. I. 11. M. F. P. addunt & qua ratione curanda sit. I. 21. M. F. P. ab aliis.

¹ H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. cap. 53.

gra est , ea magis obnitatur : tum , qua rup-
ta videbitur , incidenda scalpello duae tu-
nicæ sunt , ut exciso medio , interior mem-
brana utrinque recentem plagam habeat ;
5 quia , quod vetus est , futura non coit . Loco
patefacto , si qua parte membrana non no-
vam plagam , sed veterem habet , tenuis
excidenda habena est , quae tantum oras 467 , 2.
eius exulceret . Caetera , quae ad futuram ,
10 reliquamque curationem pertinent , supra
comprehensa sunt .

2. *De Varicibus ventris.*

Praeter haec evenit , ut in quorundam
ventribus varices sint , quarum quia nulla
15 alia curatio est , quam quae in cruribus esse
consuevit , tum eam partem explanaturus ,
hanc quoque eo differo . 495 , 26.

C A P . XVIII.

De Testiculorum natura , & morbis .

20 **V**ENIO autem ad ea , quae in natura-
libus partibus circa testiculos ori-
solent . quae quo facilius explicem ,
prius ipsius loci natura paucis proponenda
est . Igitur testiculi simile quiddam glan-
25 dulis habent . nam sanguinem non emit-
tunt , & omni sensu carent : dolent autem
in iictibus & inflammationibus tunicarum ,
quibus hi continentur . Dependent vero ab
inguinibus per singulos nervos , quos <sup>se-
per</sup>
30 ^{uas} Graeci nominant . cum quorum
utroque binae descendunt & venae & arteriae .
Haec autem tunica continguntur tenui , ner-
vosa , sine sanguine , alba , quae ^{intervenient}

a

I. 2. Edit. Aldi , Stephani aliaeque , immittendae scalpello
duae lineæ . Caesarius legit i. f. d tunice . I. 8. M. F. P.
ora . I. 9. M. F. P. futuræ . I. 10. M. F. P. reliquam .
Lead . M. F. P. addunt eorum . I. 24. M. F. P. medullis .
I. 27. M. F. P. tunicae . I. 32. M. F. P. hæ .

I H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 71.
F f 4

a Graecis nominatur. Super eam valentior tunica est, quae interiori vehementer ima parte inhaeret. *ἀπτή* Graeci vocant. Multae deinde membranulae venas & arterias, eosque nervos comprehendunt; atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus tenues patulaeque sunt. Haec tenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utriusque, omnibusque interioribus sinus est, qui etiam conspicitur a nobis. *ῥέος* Graeci, scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte mediis tunicis leviter innexus, a superiori tantum circumdatus est.

Sub hoc igitur plura vitia esse confuerunt, quae modo ruptis tunicis; quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumptur, vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quae diducere ab inferioribus partibus intestina debuit. Tum pondere eo devolvitur, aut omentum, aut etiam intestinum: atque ibi reperta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes nisum, subinde nervosas tunicas, & ob id, quod dixi patentes diducit. *ἐντερογόνα* & *ἰνώλοντα* Graeci vocant: apud nos indecorum, sed commune his, henniae nomen est.

Deinde, si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, sive inedia fuit, sive corpus hoc illucve conversum, aut alio quovis modo collocatum: itemque

30

fi

I. 3. M. F. *ἀργεῖν*. I. 7. M. F. P. *leves parvulaeque*,
I. 11. M. F. P. *jam*. I. 13. M. F. P. *innexus est*. I. 15.
M. F. P. *confuerunt*. I. 24. P. at. I. 25. M. F. *paulatim* aut ab. I. ead. M. F. om. in. I. 26. M. F. *missum*,
P. *demissum*. I. 27. M. F. P. *ejus rei patentes*. I. 30. M.
F. *birneae*, I. 34. M. F. P. *aliquo*.

si retentus est spiritus , non magnopere in-
crescit , tactu vero inaequalis est , & mollis ,
& lubricus .

At si intestinum quoque descendit , tu-
mor is sine inflammatione modo minui-
tur , modo increscit ; estque fere sine do-
lore , & , cum conquiescit aliquis aut jacet ,
interdum ex toto desidit , interdum sic
minuitur , ut in scroto exiguae reliquiae
10 maneant : at sub clamore , & satietate , & si
sub aliquo pondere is homo nixus est , cres-
cit : + frigore omni contrahitur , calore dif-
funditur : estque tum scrotum & rotun-
dum , & tactu leve : idque , quod subest , lu-
bricum est ; si pressum est , ad inguen re-
vertitur ; dimissumque , iterum cum quo-
dam quasi murmure devolvitur , & id
quidem in levioribus malis evenit . Non-
nunquam autem stercore accepto vastius
20 tumet , retroque compelli non potest : ad-
fertque tum dolorem & scroto , & inguini-
bus , & abdomini . Nonnunquam stomachus
quoque affectus primum rufam bi-
lem per os reddit , deinde viridem , quibus
25 dam etiam nigram .

Integris vero membranis interdum eam
partem humor distendit . Atque ejus quo-
que species duae sunt . Nam vel inter tu-
nicas is increscit , vel in membranis , quae
30 ibi circa venas & arterias sunt , ubi hae gra-
vatae occalluerunt . Ac ne ei quidem hu-
mori , qui inter tunicas est , una sedes est .
Nam modo inter summam & medium ,
modo inter medium & imam consistit .

Graeci

*I. 4. M. humor. I. 9. M. F. P. dividitur. I. 10. M. F. P.
fi. I. 27. M. F. P. diffinidit.*

Graeci communī nomine, quicquid est,
468, 5. ἡγενιλίῳ appellant: nostri vero, scilicet
nullis discriminibus satis cognitis, hoc quo-
que sub eodem nomine, quo priora, habent.

Signa autem quaedam communia sunt, 5
quaedam propria. Communia, quibus hu-
mor deprehenditur: propria, quibus lo-
cus. Humorem subesse dicimus, si tumor
est, nunquam ex toto se remittens, sed in-
terdum levior, aut propter famem, aut 10
propter fabriculam, maximeque in pueris:
isque mollis est, si non nimius humor sub-
est; at, si is vehementer increvit, renititur
sicut uter repletus & arcte adstrictus: ve-
nae quoque in scroto inflantur; &, si digito 15
premissus, cedit humor, circumfluenque
id, quod non premitur, attollit; & tanquam
in vitro cornuve per scrotum appetat; is-
que, quantum in ipso est, sine dolore est.
Sedes autem ejus sic deprehenditur. Si in-
ter summam mediāque tunicam est, cum 20
digitis duobus premissus, paulatim humor
inter eos revertens subit: scrotum remis-
sus & albidius est; si ducitur, aut nihil, aut
paululum intenditur: testiculus ea parte 25
neque visu, neque tactu sentitur. At, si sub
media tunica est, intentum scrotum magis
se attollit, adeo ut superior coles sub tu-
more delitescat.

Praeter haec aequae integris tunicis ramex 30
intascitur. ἡγενιλίῳ Graeci appellant,
cum venae intumescunt. Hae quandoque
intortae¹, conglomerataeque ad superiorem
partem, vel ipsum scrotum implent, vel
medium

I. 2. M. F. P. vero. I. 3. M. F. haec. I. 8. M. P. locis.
I. ead. M. F. P. dicimus. I. 14. M. P. sic ut. I. 16. M. F.
pressimus. P. pressus. I. 22. M. F. pressimus. P. pressus.
I. 23. M. F. P. ipsius. I. 25. M. F. P. parvulum. I. 32.
M. F. om. cum. I. ead. M. F. P. quoque.

¹ De hac voce vide I, Rhodium de Asia, C. 15.
P. 212.

medianam tunicam, vel imam: interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculum nervumque ejus, increscunt. Ex his eae, quae in ipso scroto sunt, oculis patent: 5 hae vero, quae mediae imaeve tunicae insident, ut magis conditae non aequae quidem cernuntur, sed tamen etiam visu subiectae sunt: praeterquam quod & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo, & id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inaequale est; &, qua parte id est, testiculus magis justo dependet. Cum vero etiam super ipsum testiculum nervumque ejus id malum increvit, ali- 15 quanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, utpote alimento amissio.

Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increscit. *οὐρανοίλων* Graeci vo- 472, 17.

20 cant.

Interdum etiam ex inflammatione tu- met ipse testiculus, ac febres quoque ad- fert; & nisi celeriter ea inflammatio con- quievit, dolor ad inguina atque ilia perve- 25 nit; partesque hae intumescent, & nervus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, si- mulque indurescit.

Super haec, inguen quoque nonnun- 471, 41
quam ramicibus implent. *βελανίλων* appel-
30 lant, ¹

C A P .

I. 4. M. F. ea. I. 25. M. F. P. om. & I. 29. M.
F. P. varices.

¹ H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. 1,
c. 72,

C A P. XIX.

*De Testiculorum curationibus communibus;
& primo de incisione & curatione
Inguinis, vel Scrobi.*

Hⁱs cognitis, de curatione dicendum s^et. In qua quaedam communia omnium sunt, quaedam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quae scalpellum desiderant. nam quae vel sanari non possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ac ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraque curatione homo ante per triduum bibere aquam; pridie abstinere etiam a cibo debet: ipso autem die collocari supinus: deinde, si inguen incidendum est, idque jam pube contegitur, ante radendum est: tum, extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidentum sub imo ventre, qua cuin abdomine tunicae inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quae ipsius scroti est, incidatur, perveniatque ad eam, quae media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistram manus digitus index, ut deductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. + Minister autem, sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas,

I. 12. M. F. om. ac. I. 13. M. F. incident. I. 15. M. F. P. om. per. I. 19. M. F. P. esq. & tum. I. 25. M. P. qua. I. 29. M. F. P. simul.

nulas, quae super medianam tunicam sunt, si
digito diducere non potest, scalpello ab-
scindat: deinde sine eo, ut is delapsus ipius
plagae jungatur, digitoque inde promatur,
5 & super ventrem cum duabus suis tunicis
collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, cir-
cumcidenda sunt. In quibus cum multae
venae discurrant, tenuiores quidem praeci-
di protinus possunt, majores vero ante
10 longiore lino diligandae sunt; ne pericu-
lo sanguinem fundant.

Sin media tunica vexata erit, aut sub ea
malum increverit, excidenda erit sic, ut
alte ad ipsum inguen praecidatur. Infra
15 tamen non tota demenda est: nam quod
ad basin testiculi vehementer cum ima tu-
nica connexum est, excidi sine summo pe-
riculo non potest. itaque ibi relinquendu-
m est.

20 Idem in ima quoque tunica, si laesa est,
faciendum est. Sed non a summa inguinis
plaga, verum infra paululum ea absconden-
da; ne, laesa abdominis membrana, inflam-
mationes moveat. Neque tamen nimium ex
25 ea rursum relinquendum est; ne postea
sinuetur, & sedem eidem malo praefetet,

Purgatus ita testiculus per ipsam pla-
gam cum venis, & arteriis, & nervo suo
leniter demittendus est; videndumque,
30 ne sanguis in scrotum descendat, neve
concretus aliquo loco maneat. Quae ita
fient, si venis vinciendo medicus pro-
spexerit. Lina, quibus capita earum con-
tinebuntur, extra plagam dependere debe-
bunt.

*I. 2. M. F. P. deducere. I. ead. M. F. abscidat. I. 22.
M. F. P. paulum. I. ead. M. F. abscidenda. I. 25. M.
F. P. sursum. I. 19. M. F. P. leviter.*

bunt. quae, pure orto, sine ullo dolore excedent, ipsi autem plagae injicienda duea fibulae sunt; & insuper medicamentum, quo glutinetur.

Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix major & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quae inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida, vel spongia: caetera eadem, quae, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt. At, cum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, & incidendum: si parvulum est, quod nocet, modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquatur; si majus est, etiam amplius, ut paululum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas fecet, quae inter summam mediamque tunicam sunt. At, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubi cunque autem repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubrio love scalPELLi diducta inferiore parte, tunicam

I. 4. M. F. P. glutinentur. I. 20. M. F. P. paulum.
 I. 25. M. F. P. transverfa. I. ead. M. F. P. membrana. I. 31. M. F. P. om. autem. I. 33. M. F. P. manubrio. I. ead. M. F. P. scalpello. I. ead. M. F. P. diductam. I. ead. M. F. P. inferiorem. I. ead. M. F. P. partem. I. ead. M. F. P. tunica.

cam extra collocare ; deinde eam ferramento , quod a similitudine corvum vocant incidere sic , ut intrare duo digiti , index & medius possint : his deinde confectis ; incidenda reliqua pars tunicae , & inter digitos scalpellus immittendus est , eximendumque aut effundendum quicquid est noxiun.

Quamcunque autem tunicam quis violavit , illam quoque debet excidere , ac medium quidem , ut supra dixi , quam altissime ad inguen ; imam autem , paulo infra . Caeterum antequam excidantur , hae quoque vinciri lino summa cura debent ; & ejus lini capita extra plagam relinquenda sunt , sicut in aliis quoque venis , quae id requisiuerint .

Eo facto , testiculus intus reponendus est : oraeque scroti futuris inter se committendae ; neque paucis , ne parum glutinentur , & longior fiat curatio : neque multis , ne inflammationem angeant . Atque hic quoque videndum est , ne quid in scroto sanguinis maneat : tum imponenda glutinantia sunt .

Si quando autem in scrotum sanguis defluxit , aliquidve concretum ex eo decidit , incidi subter id debet ; purgatoque eo spongia , acri acetō madens , circumdari . Deligatum autem vulnus omne , quod ex his causis factum est , si dolor nullus est , quinque primis diebus non est resolvendum ; sed bis die tantum acetō irroranda lana vel spongia imposita ; si dolor est , ter-

I. 2. M. F. P. curvum. I. 4. M. F. P. conjectis. I. 5. M. F. P. excipienda. I. 12. M. F. P. ab. I. cad. M. I. P. inguine. I. 14. M. F. P. summe. I. cad. M. F. P. om. cura. I. 30. M. F. P. diligatus. I. 34. M. F. P. om. imposta.

tia die resolvendum; &, ubi fibulae sunt, haec
incidenda; ubi linamentum, id mutan-
dum est; rosaque & vino madefaciendum
id, quod imponitur. Si inflammatio in-
crescit, adjiciendum prioribus cataplasma
ex lenticula & melle; vel ex malicorio,
quod in austero vino coctum sit; vel ex
his mixtis. Si sub his inflammatio non
conquierit, post diem quintum multa ca-
lida aqua vulnus fovendum, donec scrotum 10
ipsum & extenuetur, & rugosius fiat:
tum imponendum cataplasma ex triticea
farina, cui resina pinea adjecta sit. quae
ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener,
ex melle coquenda sunt. Neque dubium 15
est, quodcumque vitium fuit, si magna in-
flammatio est, quin ea quae pus movent,
imponenda sint.

Quod si pus in ipso scroto ortum est,
paululum id incidi debet, ut exitus detur; 20
linamentumque eatenus imponendum est,
ut foramen tegat. Inflammatione finita,
propter nervos propiore cataplasmate,
dein cerato utendum est. Haec proprie ad
ejusmodi vulnera pertinent. Caetera, & in 25
curatione, & in victu, similia his esse de-
bent, quae in alio quoque vulnerum gene-
re praecepimus.

C A P. X X.

De Intestini in scrotum devoluti curatione * 30

His propositis ad singulas species ve-
niendum est. Ac, si cui parvulo
puero intestinum descendit, ante scal-
pel-

*I. 2. F. immutandum. I. 16. M. F. P. initium. I. 22.
M. F. P. paulum. I. 23. M. F. P. priore. I. 30. M. F.
P. om. in scrotum devoluti.*

* Aeginet. VI. 52. 65.

pellum experienda vinclura est. Fascia ejus rei causa fit, cui uno loco pila asluta est ex panniculis facta, quae ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur: deinde reliqua fasciae pars arte circumdatur, sub quo saepe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicae glutinantur. Rursus, si aetas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adjiciunturque dolores & vomitus (quae ex stercore, per cruditatem eo delapsa, fere accident) scalpelum adhiberi sine pernicie non posse, manifestum est: levandum tantummodo malum; & per alias curationes extrahendum est.

Sanguis mitti ex brachio debet: deinde, si vires patientur, imperanda tridui abstinentia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore suerit perhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post haec, & farina hordeacea cum resina injicienda; & ipse demittendus in solium aquae calidae; cui oleum quoque adjectum sit, dandumque aliquid cibi levis & calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quae supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor revertetur, eadem erunt facienda.

Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est: non quo excludi a scroto non possint (nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quo re-

I. 1. M. F. P. *junctura*. I. 2. M. F. P. *imo*. I. 9. M. F. P. *dolor*. I. 10. M. F. P. & ex. I. ead. M. F. P. *cruditate*. I. 19. M. P. *longissime*. I. 23. M. F. P. *is*. I. ead. M. P. *solum*. I. 25. M. F. P. *lenis*. I. ead. M. F. P. *om*. I. 26. M. F. P. *id deducere*. I. 33. M. F. P. *quo non excludi a scroto*.

Gg

repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo, quem scalpello curari oportet, simulatque ad medianam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi debebit, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberet. Neque enim nisi cum periculo laeditur, quae incidenda est; cum intestinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debet sic, ne ipse laedatur, tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis aetas, & modicum malum recipit.

Sin vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad medianam tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut a sinistro testiculus catenula contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur; sub eaque index 25 digitus sinistram manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit: deinde dextrae manus duo digiti, pollex atque index, venam arteriam & nervum tunicamque eorum a superiore 30 tunica diducunt. quod si aliquae membranulae prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quae excidenda sunt, repositoque testiculo,

I. 9. M. F. P. liberat. I. cad. M. F. P. om. nisi. I.
10. M. F. P. excidenda. I. 12. M. F. P. deducta. I. 13.
F. ne is ipse. M. P. ne bis ipse. I. 17. M. F. P. si. I.
18. M. P. testiculum. I. 22. M. F. P. ministro.

culo, ab ora quoque ejus vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est; quo major plaga sit, & plus creare carnis possit.

5 C A P. XXI.

De Omenti in scrotum prolapsi curatione.

AT si omentum descendit, eodem quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducen-
10 daeque tunicae sunt. Considerandum autem est, majorne ejus modus, an exiguis sit. Nam quod parvulum est, super inguen in uterum vel digito vel adverso specillo repellendum est: si plus est, finere oportet
15 dependere, quantum ex utero prolapsum est; idque adurentibus medicamentis illin-
nere, donec emoriatur & excidat. Quidam hic quoque duo lina acu trahunt, binis-
que singulorum capitibus diversas partes
20 adstringunt. Sub quo aequae, sed tardius emoritur. Adjicitur tamen hic quoque celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis, quae exedunt, nec eridunt. *οντηνα* Graeci vocant. Fuerunt
25 etiam, qui omentum forfice praeciderent. Quod in parvulo non est necessarium: si magis est, potest profusionem sanguinis facere; siquidem omentum quoque venis quibusdam, etiam majoribus, illigatum est.
30 Neque vero, si discilio ventre id, quod prolapsum est, forfice praeciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius avelli non pos-
fit, inde hoc exemplum transferendum est.

Vul-

I. 6. M. F. P. om. in scrotum prolapsi. I. 11. M. F. P. majorne is. I. 13. M. F. P. alvum. I. ead. M. F. P. averso. I. 21. M. F. P. emoriatur. I. 23. M. F. P. quae sic exedunt. I. ead. M. F. P. ne. I. 24. M. F. P. erodont. I. 3c. M. F. P. disuffo. I. 31. M. P. om. *et*.

¶ Aph. VI, 58.

Vulnus autem curari, si reductum omen-
tum est, futura debet: si id amplius fuit,
& extra emortuum est, excisis oris, sicut
supra propositum est.

^{458, 2.} 2. *De Herniae aquosae curatione.* ⁵

Si vero humor intus est, incidendum est:
in pueris quidem, inguen; nisi in his
quoque liquoris ejus major modus prohi-
bet: in viris vero, & ubique multus
humor subest, scrotum. Deinde, si inguen ¹⁰
incisum est, eo protractis tunicis humor
effundi debet: si scrotum, & sub hoc pro-
tinus vitium est, nihil aliud quam humor
est effundendus, abscondendaque membra-
nae sunt, si quae eum continuerunt; deinde ¹⁵
eluendum id ex aqua, quae vel salem adjec-
tum, vel nitrum habeat: si sub media,
imave tunica, totae hae extra scrotum col-
locandae excidendaque sunt.

C A P. XXII.

20

De Ramicis curatione.

^{458, 31.} R AMEX ² autem, si super ipsum scro-
tum est, adurendus est tentibus & a-
cutis ferramentis, quae ipsis venis in-
figantur; cum eo, ne amplius quam has ²⁵
urant; maximeque, ubi inter se implicatae
glomerantur, eo ferrum id admovendum
est; tum super farina ex aqua frigida subac-
^{400, 34.} ta injicienda est; utendumque eo vinculo,
quod idoneum esse ani curationibus posui: ³⁰
tertio die lenticula cum melle imponenda est.
post, ejectis crustis, ulcera melle purganda,
rosa implenda, & ad cicatricem aridis lina-
mentis

*I. 1. M. F. P. reliquum. I. 5. M. F. P. om. De Her-
niae aquosae curatione. I. 11. M. F. protactis. I. 33. M.
F. P. om. &.*

¹ Aeginet. VI. 62. ² Hanc vocem exponit Sal-
masius Epist. 56.

mentis perducenda sunt. Quibus vero super medianam tunicam venae tument, incidentum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venae digito vel manubriolo scalpellii separandae, qua parte vero inhaerent, & ab superiore & ab inferiore parte lino vincienda; tum sub ipsis vinculis praecidenda, reponendusque testiculus est. At, ubi supra tertiam tunicam ramex infedit, 10 medianam excidi necesse est. Deinde, si duae tresve venae tument, & ita pars aliqua obserdetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est: ut ab inguine, & a testiculo deligatae venae praecidantur, isque condatur. Si totum id ramex obseferit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis sic, ut paulatim eas protrahat aequa adducendo, donec is testiculus par alteri fiat; tum fibulae 20 oris sic injicienda, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriore parte oram vulneris perforat: tum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immittitur, per eamque in al- 25 teram oram compellitur. Venae vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam fatis est, duas 30 fibulas esse: Tum venae, quaecunque protractae sunt in ipsum inguen, averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, & purgato vulnere, est; ut una simul & oras & venas cicatrix devinciat. Ubi

I. 3. M. F. P. promovenda. I. 12. M. F. P. ma-
jore. I. 18. M. F. P. om. eas. I. 31. M. F. P. adverso.
I. 32. M. F. P. comprehendi.

Ubi vero inter imam tunicam & ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecora, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est: idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, praecidendum. Post id venae & arteriae ad inguen lino deligandae, & infra vinculum abscindendae sunt.

C A P. XXIII.

De Carne, quae inter tunicas testicularium concrevit, & de Nervo indurato. 15

459, 19. CARO quoque, si quando inter tunicas increvit, nihil dubii est, quin eximenda sit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est.

At, si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim, febres ardentes; & aut virides, aut nigri vomitus: praeter haec, ingens fitis, & linguae aspritudo; fereque a die tertio sputans bilis alvo cum rosione redditur. Atque neque assimi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremae partes frigescunt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur. 30

C A P.

I. 4. M. F. abscidit. I. 17. M. F. P. concrevit.

¶ Aeginet. VI. 63.

C A P. XXIV.

De Ramice inguinis. ¹

UBI vero in ipso inguine ramex est, ^{459, 29}
⁵ si tumor modicus est, semel incidi;
 si major, duabus lineis debet, ut me-
 dium excidatur: deinde, non extracto te-
 sticulo, sicut intestinis quoque prolapsis in-
 terdum fieri docui, colligendae venae, vin-
 ciendaeque; ubi tunicis inhaerebunt, & sub
¹⁰ his nodis praecidendae sunt. Neque quicquam
 novi curatio vulneris ejus requirit.

C A P. XXV.

Ad tegendam Glandem colis, si nuda est. ²

AB his ad ea transeundum est, quae in
¹⁵ cole ipso fiunt. In quo si glans nuda
 est, vultque aliquis eam decoris ³ cau-
 sa tegere, fieri potest: sed expeditius in
 puer, quam in viro; in eo, cui id naturale
 est, quam in eo, qui quarundam gentium
²⁰ more circumcisus est; in eo, cui glans parva
 juxtaque eam cutis spatiösior, brevis ipse
 coles est, quam in quo contraria his sunt.
 Curatio autem eorum, quibus id natural-
 le est, ejusmodi est. Cutis circa glandem
²⁵ prehenditur ⁴ & extenditur, donec illam
 ipsam condat; ibique deligatur: deinde, jux-
 ta pubem, in orbem tergus inciditur, donec
 coles nudetur; magna quea cura cavetur, ne
³⁰ vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt, in-
 clinantur. Eo facto, cutis ad vinculum in-
 clinatur, nudaturque circa pubem velut cir-
 culus; tum super eo linamenta dantur, ut ca-
 ro

¹. 8. M. F. P. *vinciendae* quae. ². 10. M. F. *modis.*³. 21. M. F. P. *vero.* ⁴. 25. M. F. *apprehenditur.* ⁵.⁶. 30. M. F. P. *eoque.*¹ Aeginet. VI. 66. Aëtius Tetrab. IV. Setm. II. 24.² H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 61.³ Aeginet. VI. 53. ⁴ Aeginet. VI. 53.

ro increcat & id impletat, satisque velamenti supra latitudo plaga^e praefitet. Sed, donec cicatrix sit, vinctum esse id debet; in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo, qui circumcisus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia, summo soluto, diduci deorsum usque ad pubem manu potest; neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem: tum multa frigida aqua foveatur; emplastroque circumdatur, quod valenter inflammationem reprimat; proximisque diebus abstinere, donec prope a fame vietus sit, ne forte eam partem satietas excitet. Ubi jam sine inflammatione est, deligari debet a pube usque circulum: super glandem autem adverso emplastro imposito induci. sic enim fit, ut inferior pars glutinetur; superior ita sanescat, ne inhaereat.

2. *Quomodo Glans penis coniecta aperiri possit.*

^{393, 13.} **C**ONTRA, si glans ita coniecta est, ut nudari non possit (quod vitium Graeci *φίμωσις*² appellant) aperienda est. Quod hoc modo fit. Subter a summa ora, ²⁵ cutis inciditur recta linea usque ad frenum; atque ita superius tergus relaxatum, cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritatem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excienda est sic, ut vertex ejus ad frenum; basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta ³⁰ quae

I. 2. M. F. P. *praefitat.* I. 8. M. F. P. *deducit.* I. 12.
M. F. P. *emplastrumque.* I. *cad.* M. F. P. *circa datur.*
I. 12. M. F. P. *valentem.* I. 14. M. F. P. *ut.* I. 15.
M. F. P. *est.*

¹ H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. 1. c. 62.
² Aeginet. VI. 54.

quae ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiſtere: nam ambulatio, atterendo ulcus foridum reddit.

5. *Infibulandi ratio.*¹

† Infibulare quoque adolescentulos interdum valetudinis cauſa quidam conſuerunt: ejusque haec ratio est. Cutis, quae ſuper glandem eſt, extenditur, notaturque utrinque a lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si ſuper glandem notae revertuntur, nimis apprehenſum eſt, & ultra notari debet: ſi glans ab his libera eſt, is locus idoneus fibulae eſt. Tum, qua notae ſunt, cutis acu filum ducente tranſluitur, ejusque fili capita inter ſe deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. Ubi hae confirmatae ſunt, excepto filo fibula inditur, quae ² quo levior, eo melior eſt. Sed hoc quidem ſaepius inter ſupervacua, quam inter neceſſaria eſt.

C A P. XXVI.

*De Urinæ reddendæ difficultate, & curatione.*³

RES vero interdum cogit emoliri manus urinam, cum illa non redditur; aut quia ſenectute iter ejus collapsum eſt, aut quia calculus, vel concretum aquilid ex ſanguine intus ſe oppofuit: ac mediocris quoque inflammatio ſaepe eam redi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, ſed in feminis quoque interdum neceſſarium eſt. Ergo aeneae fistulae fiunt:

1. 10. F. alteribus, l. ead. M. F. P. perforatur. l. 19. M. F. P. exempto. l. ead. M. F. P. additur. l. 20. M. F. P. melior eo levior. l. 23. M. F. P. De calculo curationibusque eorum. l. ead. M. F. P. om. curatione. l. 32. F. abeneae.

1 H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. 1. C. 63. 2 Rhodius de Acia, Cap. 6. pag. 83. 3 Aegin. VI. 59.

fiunt: eaeque, ut omni corpori, ampliori minorique sufficientant, ad mares, tres; ad feminas, due medico habendae sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum; media, duodecim; minima, novem: ex mulieribus major, novem; minor, sex. Incurvas vero esse eas paululum, sed magis viriles oportet, laevesque admodum; ac neque niannis plenas, neque nimis tenues.

Homo tum resupinus eo modo, quo in curatione calculi figuratur, super subsellum aut lectum collocandus est. Medicus autem a dextro latere, sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra vero fistulam demittere in iter urinae debet: atque ubi ad cervicem vesicae ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque, urina redditia, recipere. Femina brevius urinare iter, simul & rectius habet, quod carunculae simile, inter imas horas super naturale positum, non minus saepe auxilio eget, sed aliquanto minus difficultatis exhibet.

^{185.30.} ^{481.22.} † Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. Eum si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema † quam plurimum attrahenda, &, condita glande, lino vinclienda est; deinde a latere recta plaga colliguntur.

²⁵ ³⁰ ³⁵

† Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. Eum si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema † quam plurimum attrahenda, &, condita glande, lino vinclienda est; deinde a latere recta plaga colliguntur.

I. 1. M. F. P. quae. I. 7. M. F. P. paulum. I. 12. M. F. P. ani. I. ead. M. F. subsellum. I. 21. M. F. P. similiter. I. 21. M. F. P. mammulae an mamillae. I. 24. M. F. P. om. sed. I. 29. M. F. P. vellere.

les incidendus, & calculus eximendus est : tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

5 2. *Calculosis quae curatio adhibeatur.*¹

Cum vesicae vero, calculique facta mentio sit ; locus ipse exigere videtur, ut subjiciam, quae curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam 10 festinare, cum praeceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni aetate, neque in omni vitio id experientum est : sed solo vere, in eo corpore, quod jam novem annos, nondum quatuor 15 decim excessit; &, si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina 20 proficiat ; sed quo saepius utique in hoc falso, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. quae simul cum ipsa curatione proponam.

Igitur, ubi ultima experiri statutum est, 25 ante aliquot diebus victu corpus praeparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter haec exercitatione utatur, quo magis calculus ad 30 vesicae cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est ; & tum loco calido curatio adhi-

138, 3.

¹ Aeginet. VI. 60. H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. P. I. c. 59.

adhibenda: quae hoc modo ordinatur.

Homo praevalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum & aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehendit; reductisque ejus cruribus, ipsum quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui curatur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt: quorum & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter, prout consedit, sinistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Praeter haec, etiamnum a lateribus duo valentes objiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt.

Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisitis, sinistram manus duos digitos, indicem & medium, leniter prius unctos oleo, simul in anum ejus demittit; dextraeque digitos super imum abdomen leniter imponit; ne, si utrinque digiti circa calcum vehementer concurrerint, vesicam laedat. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut quam

I. 3. M. F. P. aduersum. I. 11. M. F. P. quo. I.
23. M. V. levare. P. levari. I. 27. P. M. F. circumcisitis, atque sinistra. I. ead. M. F. P. manu. I. ead. M. F. P. duos ejus digitos. I. 28. M. F. P. prius unum, deinde alterum. I. 33. M. F. P. laedant.

quam maxime id tuto fiat. Nam laesa vesica nervorum distensiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaeritur calculus. ubi repertus, minore ne-
5 gocio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indicis suis co-
gnitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut
recessit retro, digiti ad ultimam vesicam
dantur; paulatimque dextra quoque ma-
10 nus ejus ultra translata subsequitur.

Atque, ubi repertus est calculus (qui necesse est in manus incidat) eo curiosius deducitur, quo minor laeviorque est; ne effugiat, id est, ne saepius agitanda vesica 15 sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus ei se opponit; sinistra eum compellit deorsum digitis, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut ne pronus exeat: si
20 planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte pleni-
nior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesset, ex ipsa figura patet; nisi, si laevior altera parte est,
25 ut ea antecedat.

Cum jam eo venit, ut super vesicae cer-
vicem sit, juxta anum incidi cutis + plaga
lunata usque ad cervicem vesicae debet,
cornibus ad coxas spectantibus paululum:
30 deinde ea parte, qua strictior ima plaga
est, etiamnum sub cute, altera transverfa
+ plaga facienda est, qua cervix aperiatur;
donec urinae iter pateat sic, ut plaga paulo
major, quam calculus sit. Nam, qui metu-
fistu-

*I. 4. M. F. P. ibi. I. 6. M. F. cum in hoc. I. 16. M.
F. P. ejus. I. ead. M. F. P. opponitur. I. ead. M. F. P.
P. sinistrae digiti deorsum eum compellit. I. 19. M. F.
P. om. ne. I. 26. M. F. P. ut incidi super. I. 27. M.
F. P. om. sit. I. ead. M. F. P. om. incidi. I. ead. M.
F. P. debet. I. 29. M. F. P. paulum. I. 34. Alii me-
tum.*

fistulae (quam illo loco *σεγραδα* Graeci vocant) parum patefaciunt, cum majore periculo eodem revolvuntur: quia calculus iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit. idque etiam perniciosus est; si figura quoque calculi, vel aspritudo aliquid eo contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & distentio nervorum fieri potest. quae si quis evasit, multo tamen patentiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset, incisa.

† Cum via perfecta est, in conspectum calculus venit: in cujus corpore multum discrimen est. Ideo, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protracti potest. Si major, injiciendus a superiori ei parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusae latitudinis; ab interiori parte laevis, qua corpori jungitur; ab interiori asper, qua caeculum attingit. Isque longior potius esse debet: nam brevior extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut apparatur calculus, & teneatur, quia, si apprehensus est, ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus est, ne, cum adduci uncus cooperit, calculus intus effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamque convulnaret. In qua re, quod periculum esset, jam supra proposui.

Ubi satis teneri calculum patet, eodem pene momento triplex motus adhibendus est: in utrumque latus; deinde extra, sic tamen,

I. 1. Alii *χοεταδα* vel *εειαδα*, ed. optimae *ενηρω* anni 1497. *corbyada*. I. 12. M. F. P. vero. I. 13. M. F. P. nullum. I. 14. M. F. P. ipse. I. 19. M. F. *spesie*. I. cad. M. F. P. *exteriori*. Legendum sane est *exteriori* vel *anteriori*. I. 22. M. F. P. *brevis*. I. 23. M. F. P. om. non. I. 26. M. P. *ideoque*. I. 27. M. P. *minime*.

tamen, ut leniter id fiat, paululumque pri-
mo calculus attrahatur: quo facto, attol-
lendus uncus extremus est, uti intus ma-
gis maneat, faciliusque illum produca-
5 Quod si aliquando a superiore parte calcu-
lus parum commode comprehenditur, a
latere erit apprehendendus. Haec est simpli-
cissima curatio.

Sed varietas rerum quasdam etiamnum
10 animadversiones desiderat. Sunt enim qui-
dam non asperi tantummodo, sed spinosi
quoque calculi, qui per se quidem delapsi
in cervicem, sine ullo periculo eximuntur.
In vesica vero, non tuto vel hi conquirun-
15 tur, vel attrahuntur; quoniam, ubi illam
convulnerarunt, ex distensione nervorum
mortem maturant; multoque magis, si
spina aliqua vesicae inhaeret, eamque, cum
deduceretur, dupliceavit. Colligitur autem
20 eo, quod difficilius urina redditur, in cer-
vice calculum esse; eo, quod cruenta di-
stillat, illum esse spinosum: maximeque
id sub digitis quoque experiendum est,
neque adhibenda manus, nisi id consistit.
25 Ac tum quoque leniter intus digitii ob-
ciendi, ne violenter promovendo convul-
nerent: tum incidendum. Multi hic quo-
que scalpello usi sunt. Meges (quoniam
is infirmior est, potestque in aliqua promi-
30 nentia incidere, incisoque super illam cor-
pore, qua cayum subest, non secare, sed
relinquere, quod iterum incidi necesse sit)
ferramentum fecit rectum, in summa par-
te labrosum, in ima semicirculatum acu-
tum-

I. 1. M. F. P. paulum. I. 19. M. F. P. duceretur.
I. 21. M. F. destillat. I. 24. M. F. P. constituit. I. 33.
M. P. summam. I. ead. M. P. parten. I. 34. P:
izam.

tumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo conseqüebatur, ut semel, quantum satis esset, aperiret. † Quocunque autem modo cervix ea parte secta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet; nulla propter festinationem, vi admota.

3. *Signa calculorum, vel arenosorum, 10
vel mollium.*

At calculus arenosus, & ante manifestus 61, 16. est; quoniam urina, quae redditur, arenosa est: & in ipsa curatione; quoniam inter subjectos digitos neque aequa, sed leniter 15 renititur, & insuper dilabitur. Item molles calculos, & ex pluribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, secum trahens quasdam quasi squamulas. Hos omneis, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet abducere, ne vesicam laedant, neve intus aliquae dissipatae reliquiae maneant, quae postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum ve- 25 nit, vel digitis, vel unco eximendum est.

At, si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut, si quis exiguis supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter invenitur; inventusque 30 celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica laeditur, excitatque inflammations mortiferas; adeo ut quidam non secti, cum diu frustraque per digitos vesica esset agita-

I. 5. M. F. P. cum sequebatur. I. 7. M. F. facta. P. fradla. I. 13. M. F. P. quoniam & urina. I. 15. M. F. P. om. sed. I. 16. M. F. P. dilatatur. I. ead. M. F. P. molliis. I. 17. M. F. P. calculus. I. 18. M. F. P. com- positus. I. 18. M. F. P. indicatur. I. 91. M. F. P. in se attrahens. I. 33. M. F. P. om. non.

tata , decefferint. Quibus accedit etiam , quod exigūs calculus , ad plagam urina postea promovente , excidit.

Si quando autem is major non videtur , 5 nisi rupta cervice , extrahi posse , findendus est. cuius repertor Ammonius , qui ob id αἰθομόν cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitur calculo sic , ut facile eum conclusum quoque teneat , ne is retro revol- 10 vatur : tum ferramentum adhibetur crassi- tudinis modicæ , prima parte tenui , sed re- tusa , quod admotum calculo , & ex altera parte ictum , findat ; magna cura habita , ne 15 aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat , aut calculi fractura ne quid incidat.

4. De Calculis feminarum.

Hae vero curationes in feminis quoque si- 20 miles sunt ; de quibus parum , proprie tamen quedam dicenda sunt. Siquidem in his , ubi parvulus calculus est scalpellus supervacuus est ; quia is urina in cervicem compellitur , quæ & brevior , quam in maribus , & laxior est. Ergo & per se saepe excidit , & si in u- 25 rinae itinere , quod est angustius , inhaeret , eo- den tamen unco sine ulla noxa educitur. At in majoribus calculis necessaria eadem cura- 30 tio est. Sed virginī subjici digitī tanquam masculo , mulieri per naturalia ejus debent. Tum , virginī quidem , suo ima fini- steriore ora ; mulieri vero , inter urinae iter & os pubis , incidentum est sic , ut utroque loco plaga transversa sit. neque terreri con- venit , si plus ex muliebri corpore sanguinis profluvit.

185 , 30
474 , 20.

5. Quæ

-
- I. 6. M. F. P. om. qui. I. 9. M. F. P. concussum.
I. 12. M. F. admodum. I. ead. M. F. P. calculum. I.
13. F. M. P. findit. I. 14. M. F. P. vesicam per ferræ-
mentum. I. 21. M. F. P. urinam. I. ead. M. F. P. non
compellit. I. 23. M. F. P. primo.

I Aëtius Tetrab. IV. Serm. IV. c. 99.

5. Quae curatio calculo evulso habenda sit.

Calculo evulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, finere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atque, ingredi quoque eum paululum, non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus, in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem, ut distentione nervorum pericitatur aliquis, dum vesica ejus agitur; sic alter metus excipit, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, desideris debet in acre acetum, cui aliquantum falsis fit adjectum. sub quo & sanguis fere conquiescit, & adstringitur vesica, ideoque minus inflammat. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & in genibus, & coxis, & super pubem.

Ubi jam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxae paululum excententur: ac super vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto maddens. Deinde, interpositis duabus horis, in folium is aquae calidae resupinus demittendus est sic, ut a genibus ad umbilicum aqua teneat, caetera vestimentis circumdata sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: qui spongia subinde in facie detergendus est.

I. 5. M. F. P. om. paulum. I. 13. M. F. P. excipiatur. I. 20. M. F. P. inquinibus. I. 24. M. F. P. paulum. I. 25. M. F. P. ulcer. I. 34. M. F. quo. I. cad. M. P. facile. I. cad. M. F. detergendum.

est. Finisque ejus fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque \dagger hapsus lanae
 mollis, tepido oleo repletus, qui pubem,
^{210, 6.}
 & coxas, & inguina, & plagam ipsam, con-
 testam eodem ante se linteolo, protegat: if-
 que subinde oleo tepido madefaciendus est;
 ut neque frigus ad vesicam admittat, & ner-
 vos leniter molliat. Quidam cataplasmatis
 10 calefacientibus utuntur. Ea plus pondere
 nocent, atque vesicam urgendo vulnus ir-
 ritant, quam calore proficiunt. Ergo ne
 vinculum quidem ullum necessarium est.

Proximo die, si spiritus difficilius reddi-
 tur, si urina non exit, si locus circa pu-
 bem mature intumuit, scire licet, in vesica
 sanguinem concretum remansisse. Igi-
 tur, demissis eodem modo digitis, leniter
 pertractanda vesica est, & discutienda, si
 20 qua coierunt: quo sit, ut per vulnus po-
 stea procedant. Non alienum etiam est, ori-
 culario clystere acetum nitro mixtum per
 plagam in vesicam compellere. nam sic
 quoque discutiuntur, si qua cruenta coe-
 runt. Eaque facere etiam primo die con-
 venit, si timemus, ne quid intus sit: maxi-
 meque, ubi ambulando id elicere imbe-
 cillitas prohibuit. Caetera eadem facienda
 25 sunt: ut demittatur in solium, ut eodem
 modo panniculus, eodem lana superinji-
 ciatur.

Sed neque saepe, neque tamdiu in aqua
 calida puer habendus, quam adolescens
 est; infirmus, quam valens; levi, quam
 gra-

$\text{L. 11. M. F. P. quae. L. 15. M. F. P. excedit. L. 18.}$
 $\text{M. F. P. leviter. L. 30. M. F. P. eadem.}$

graviore inflammatione adfectus; is, cuius corpus digeritur, quam is, cuius adstricatum est. Inter haec vero, si somnus est, & aequalis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter imus sedet, & mediocris 5 est cum febre modica dolor, scire licet, recte procedere curationem.

At in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur: qua levata, solium supervacuum est. supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinae rodit, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia; &, si purgandum ulcus videbitur, melle liniendum.

^{262, 17.} Id, si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur *cinnamomum* emplastrum. nam & sevum habet ad pus movendum, & mel ad ulcus repurgandum: medullam etiam, maximeque vitulinam; quae in id, ne fistula relinquatur, praecipue 20 proficit. Linamenta vero tum super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At, ubi ulcus purgarum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est.

Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quae praesagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus 30 tumet, si vulnus hiat, si transiliens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quaedam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde responderet, si vehementes dolores

I. 5. M. F. P. sedet sed &. I. ead. M. P. om. sedet.
I. 7. M. producere. I. 8. M. F. P. atque. I. 12. M. F.
P. rodet. I. 14. M. F. P. liniendum. I. 19. M. F. P.
medulla. I. ead. M. F. P. vitalina. I. 20. M. F. P.
quod.

lores sunt, si post diem quintum magnae febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentione nervorum, &, 5 ante nonum diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis, & tempestivis cibis; inter haec, fomentis, & quibus supra scripsimus, oportet.

10

C A P . XXVII.

*De Cancro, qui excisa vesica
nascitur.*

PROXIMUS cancri metus est. Is cognoscitur, si, & per vulnus, & per ipsum colem, fluit sanies mali odoris, cumque ea quaedam a concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculae lanulis similes. praeter haec, si orae vulneris aridae suft, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem canceris tendat. Si ad colem, indurescit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, testiculi que intumescunt: si in ipsam vesicam, 15 ani dolor sequitur, coxae tumescunt, non facile crura extendi possunt; at, si in alterum latus, oculis id expositum est, paresque utrinque easdem notas, sed minores, 25 que intumescunt: si in ipsam vesicam, 1 ani dolor sequitur, coxae tumescunt, non facile crura extendi possunt; at, si in alterum latus, oculis id expositum est, paresque utrinque easdem notas, sed minores, 30 habet.

Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it, super-

I. 8. M. P. F. de. I. 12. M. P. F. addunt & qua curatione uti deceat. I. 16. M. F. co. I. 20. M. F. P. defuit. I. 26. M. F. P. durescunt. I. 32. M. F. P. eadem.

¹ Tulpianus Observat. Lib. IV. Cap. 38.

fupinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus,⁵ aut myrtus; † idemque humor clystere intus adigitur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quae utraque ex vi-
no decocta sint; vel rubus, aut oleae folia, eodem modo decocta; aliave medicamenta,¹⁰ quae ad cohibendos purgandosque cancros proposuimus. ex quibus, si qua erunt ari-
da, per scriptorium calatum inspirabun-
tur.

Ubi stare cooperit cancer, mulso ulcus ¹⁵
eluetur, vitabiturque eo tempore ceratum;
quod, ad recipiendum id malum, corpus
emollit. potius plumbum elotum cum
vino inungetur: super quae idem linteolo
illitum imponetur. Sub quibus perveniri
ad sanitatem potest: cum eo tamen, quod
non ignoremus, orto cancro saepe affici
stomachum, cui cum vesica quoddam
consortium est: exque eo fieri, ut neque
retineatur cibus, neque, si quis retentus,²⁵
concoquatur, neque corpus alatur; ideo-
que ne vulnus quidem aut purgari, aut ali-
possit. quae necessario mortem maturant.

Sed ut his succurri nullo modo potest,
sic a primo tamen die tenenda ratio cura-³⁰
tionis est. In qua quaedam observatio, ad
cibum quoque potionemque pertinens,
necessaria est. Nam cibus inter principia,
non nisi humidus dari debet: ubi ulcus
purga-

I. 7. M. F. P. adjicitur. I. 10. M. F. P. aliaque. I.
15. M. F. P. vulnus.

purgatum est, ex media materia, olera & falsamenta semper aliena sunt. Potione opus est, non immodica. Nam, si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, 5 & vis corporis minuitur: si plus aequo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendum esse, manifestius est, quam ut subinde dicendum sit.

10 Solet vero sub ejusmodi vicetu evenire, ut alvus non reddatur. Haec aqua ducenda est, in qua vel foenum Graecum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus, ubi id rodit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per vulnus exit haec: deinde, eo sanescente, dividitur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod inter 20 dum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit.

Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer erupta 25 cervix est, aut ex cancro multae magnae que carunculae, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum jam ad cicatricem vulnus tendit, extensis jacere feminibus & cruribus oportet; nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt: sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est; & tum demum,

l. 3. M. F. P. modica. l. 10. M. P. venire. l. 15.

M. agendus est. l. 30. M. F. vulnus intendit.

Quod, si antequam vesica purgata est, orae se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt; vulnus digitis vel averso speculo diducendum est; ut torquentibus exitus detur. Hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum demum, quae cicatricem inducant, imponenda sunt, extendendique, ut supra docui, pedes, quam maxime juncti. 10

Quod si fistulae metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est; extensisque cruribus femina talique inter se deliganda sunt, donec, qualis supura est, cicatrix sit. 15

C A P. XXVIII.

Si Naturalia feminarum non admittunt concubitum, quomodo curari
conveniat 1 20

ET hoc quidem commune esse maribus & feminis potest. Proprie vero quae-dam ad feminas pertinent: ut in primis, quod [†] earum naturalia nonnunquam, 25 inter se glutinatis oris, concubitum non admittunt. Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum ² exulceratione in his partibus facta, & per malam curationem his oris sanescendo junctis. Si 30 ex utero est, membrana ori vulvae opposita est: si ex ulcere, caro id replevit.

Opor-

I. 5. M. P. adverso. I. 7. M. F. P. tum. I. 8. M. F. P. descendat. I. 10. M. F. P. vincl. I. 16. F. futura.

¹ Aeginet. VI. 72. Aetius Tetrab. IV. Serm. IV. c. 26. Hipp. de Steril. XIII. 1. Idem de Natur. Mulieb. VI. Joān. Wierus Observ. L. 1. p. 935, ² Hipp. I. de Morb. Mul. T. LXVII.

Oportet autem membranam duabus lineis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literae ¹x, magna cura habita, ne urinae iter violetur: deinde undique eam ⁵ membranam excidere. At, si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere: tum ab ora + vel vulfella vel hamo apprehensam, tanquam habenulam, excidere: & intus implicitum in longitudinem linamen-
10 tum (*λυσίστος* Graeci vocant) in aceto tinc-
tum demittere, supraque succidam lanam
aceto madentem deligare: tertio die solvere,
& vulnus, sicut alia vulnera, curare.
Cumque jam ad sanitatem tendet, plum-
15 beam fistulam medicamento cicatricem
inducente illinere, eamque intus dare: su-
praque idem medicamentum injicere; do-
nec ad cicatricem plaga perveniat.

C A P . XXIX.

20 *Qua ratione partus emortuus
ex utero excutiatur* ²

Ubi concepit autem aliqua, si jam prope matus partus intus emor-
tuus est, neque excidere per se potest,
25 adhibenda curatio est. Quae numerari inter
difficillimas potest. nam & summam pruden-
tiam moderationemque desiderat, & maxi-
mum periculum affert. Sed ante omnia vul-
vae natura mirabilis, cum in multis aliis,
30 tum in hac re quoque facile cognoscitur.

Oportet autem ante omnia ³ resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut femi-

¹ L. 5. M. F. P. Ac. l. 13. M. F. P. ulcus &c. l. ead.
M. F. P. ulcer. l. 20. M. F. P. qua curatione. l. 22.
M. F. P. concipit.

² Chiasmus vocatur ab Aeginet. VI. 51, 65. & ab aliis. H. F. ab Aquapendente Oper. Chir. P. I. c. 83.

² Aeginet. VI. 74. Aëtius Tetrab. IV. Serm. IV. c. 23.

³ Hippocr. I. de Morb. Mul. T. XCIV. 4.

feminibus ejus ipsius ilia comprimantur. quo fit, ut & imus venter in conspectu medici sit, & infans ad os vulvae compellatur; quae, emortuo partu, id comprimit: ex intervallo vero paululum dehiscit. Hac occasione usus medicus, unctae manus indicem digitum primum debet inserere, atque ibi continere, donec iterum os adaperiat, rursusque alterum digitum demittere debet, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cujus rei facilitatem multum confort & magnitudo vulvae, & vis nervorum ejus, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur: cum praesertim intus nonnunquam etiam 15 due manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema corporis; neque dum inflammationem accepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. Nam, si corpus jam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi aegerime potest; sequiturque saepe cum vomitu, & cum tremore, mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitum ejus sentit. nam aut in caput, aut in pedes conversum est, aut in transversum jacet: fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel pes in propinquuo sit.

Medici vero propositum est, ut infantem manu dirigat vel in caput¹, vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius

I. 5. M. F. P. paulum. I. ead. M. F. P. debiscere.
I. 8. F. iterum id os. M. P. iterum ad nos. I. 12. M. F. P. facultatem. . 19. Alii cepisse. I. 31. M. F. P. cum, I. 32. Alii manus.

x Hippocr. I. de Morb. Mul. XCV. 2.

rectius reddit. nam manus in caput, pes in pedes eum convertet. Tum, si caput proximum est, † demitti debet uncus, undique laevis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, 5 vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur: deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. nam, si compressio vulvae ore id tentatum est, non emittente eo, infans abrum-
10 pitur, & unci acumen in ipsum os vulvae delabitur, sequiturque nervorum disten-
tio, & ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere; hiante, le-
niter trahere oportet; & per has occasio-
15 nes paulatim eum educere. Trahere au-
tem dextra manus uncum; sinistra, in-
tus posita, infantem ipsum, simulque diri-
gere eum debet.

Solet etiam evenire, ut is infans ¹ humo-
20 re distendatur; exque eo profluat foedi
odoris fantes. Quod si tale est, indice di-
gito corpus illud forandum est, ut, effuso
humore extenuetur: tum id leniter per ip-
25 sis manus recipiendum est. nam uncus in-
jectus putri corpusculo facile elabitur. in
quo quid periculi sit, supra positum.

Sed in pedes quoque conversus infans
non difficulter extrahitur, namque his ap-
prehensis per ipsas manus commode edaci-
30 tur.

Si vero transversus est, neque dirigi po-
tuit, uncus alae injiciendus, paulatimque
attrahendus est. Sub quo fere cervix repli-
catur, retroque caput ad reliquum corpus
spectat.

I. 25. M. F. P. facile hebeti corpusculo elevabitur. I.
28. M. F. P. quibus. I. 34. M. F. P. ac.

I Aetius Tetrab. IV. Serm. IV. c. 23.

spectat. Remedio est, cervix praecisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit. qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere, majore parte extracta, caput in vacuam vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest.

Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo injecto, valens homo, non imperitus, a sinistro latere ejus debet assistere, & super imum ventrem ejus duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit, ut illud caput ad os vulvae compellatur, idque tum eadem ratione, quae supra posita est, unco extrahi possit.

At, si pes alter juxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid prolapsum est, paulatim absindendum est. Et, si clunes os vulvae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt, conquisitusque pes ejus adducendus. Aliaeque etiamnum difficultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, trandendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet ita, ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas Secundas vocant, quod vellamentum infantis intus fuit: hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a vulva, totumque illud extrahere, &, si quid intus

I. 3. M. F. P. interiorem. I. ead. M. F. P. partem. I.
10. M. P. intereo. I. 15. M. F. P. om. tum. I. 16. M.
F. P. extrahitur. I. 18. M. F. P. protractum. I. 21. M.
F. conquitusque. I. 31. F. ifque.

I. Hippocrat. I. de Morb. XCVI,

intus praeterea concreti sanguinis remanet.
Tum compressis in unum feminibus, illa in
conclavi collocanda est, modicum calo-
rem, sine ullo perflatu, habente. Super
5 imum ventrem ejus imponenda lana suc-
cida, in aceto & rosa tincta. Reliqua cura-
tio talis esse debet, qualis in inflammatio-
nibus, & in his vulneribus, quae in nervosis
locis sunt, adhibetur.

10

C A P . XXX .

De Ani vitiis.

ANI quoque vitia, ubi medicamentis
15 vincuntur, manus auxilium de-
siderant. Ergo, si qua fissā in eo ve-
tustate induruerunt, jamque callum ha-
bent, commodissimum est, ducere alvum;
tum spongiam calidam admovere, ut re-
laxentur illa, & foras prodeant: ubi in con-
spectu sunt, scalpello singula excidere, &
20 ulcera renovare: deinde insponere lina-
mentum molle, & super linteolum illictum
melle; locumque eum molli lana implere,
& ita vincire: altero die, deincepsque caete-
ris, lenibus medicamentis uti; quae ad re-
25 centia eadem vitia necessaria esse, alias pro-
posui: utique per primos dies sorbitionibus
eum sustinere, paulatim deinde cibis adjic-
cere aliiquid, generis tamen ejus, quod eo-
dem loco praeceptum est. Si quando autem
30 ex inflammatione pus in his oritur, ubi
primum id apparuit, incidendum est; ne
anus ipse suppureret. Neque tamen ante pro-
perandum est. nam, si crudum incisum est,
in-

414.

399, 23.

I. 2. M. F. P. om. in. I. 4. M. F. praeflatu. I. 9.
M. F. P. adhibetur. I. 11. M. F. P. addunt & eorum
curatione. I. 14. M. F. P. scissa. I. 20. Alii removere.
I. 23. M. F. P. eum. I. 26. M. F. P. posui: & usi-
gue.

inflammationi multum accedit, & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

2. *De Condylomatis.*¹

400, 14. At tubercula, quae *κερδηλωματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. Alvus ante omnia ducitur. Tum vulsellula tuberculum apprehensum, juxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quae supra post curationem adhibenda esse proposui: tantummodo, si quid increscit, squama aeris coercendum est.

3. *De Haemorrhoidibus.*²

401, 22. Ora etiam venarum, fundentia sanguinem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit, sanies adjicitur, alvus acribus ducitur; quo magis ora promoteantur. eoque fit, ut omnia vasa, quasi capitula conspicua sint. Tum, si capitulum exiguum est, basimque tenuem habet, adstringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur, imponendaque spongia ex aqua calida est, donec id liveat: deinde aut ungue, aut scalpelio, supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur: interdum etiam urinae difficultas. Si id majus est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est, paululumque supra basim incidentum: neque relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit.

1. 1. M. F. P. *inflammationis.* 1. 5. M. F. P. *De condylomatum curatione.* 1. 11. M. F. *sequitur.* 1. 15. M. P. F. *ignorant De haemorrhoidibus.* 1. 18. M. F. P. *acrius.* 1. 19. M. F. P. *oraæ.* 1. *cad.* Alii, Ronfeus *omnes venae.* 1. 20. M. F. P. *vela.* 1. 23. M. F. P. *imponenda.* 1. 24. M. F. P. *om. ex.* 1. 25. M. F. P. *libeat.* 1. 30. M. F. P. *paulumque.*

¹ Aeginet. VI. 80. ² Aeginet. VI. 79.

ducit. Qua incisum est, acus debet immiti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, intimum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique tenerae cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum, ungenda femina, & inguina, & quicquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, & farina hordeacea calida implendus is locus, & sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, coxendices ac femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda, &, si capitula simul non excederunt, digito promovenda: tum lenibus medicamentis, iisdemque, quae alibi posui, ulceram ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias superius exposui.

C A P. XXXI.

25

De Varicibus.

Ab his ad crura proximus transitus est. In quibus orti varices non diffici ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum, quae in capite nocent; & eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quae noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur.

Si

I. 3. M. F. P. imum. I. 10. M. F. P. est. I. 11. M. F. P. locus est. I. 14. M. F. P. cervices. I. 18. M. F. P. om. &. I. 25. M. F. P. De varicum curatione.

¹ Aeginet. VI. 82.

Si recta; Si quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, & velut in orbes quosdam implicantur, pluresve inter se involvuntur, utilius excidere est.

5

Adurendi ratio haec est. Cutis superin-
ciditur: tum, patefacta vena, tenui & retu-
so ferramento candente modice premitur;
vitaturque, ne plagae ipsius orae adurantur:
quas reducere hamulis facile est. Id inter-
positis fere quaternis digitis per totum va-
ricem fit: & tum superponitur medica-
mentum, quo adusta sanantur.

At exciditur hoc modo. Cuite eadem
ratione super venam incisa, hamulo orae 15
excipiuntur; scalpelloque undique a cor-
pore vena diducitur; caviturque, ne inter
haec ipsa laedatur; eique retusus hamulus
subjicitur; interpositoque eodem fere spa-
cio, quod supra positum est, in eadem vena 20
idem fit: quae, quo tendat, facile hamulo
extento cognoscitur.

Ubi jam idem, quacunque varices sunt,
factum est, uno loco adducta per hamu-
lum vena praeciditur: deinde, qua proximi-
mus hamus est, attrahitur & evellitur; ibi-
que rursus absceditur. Ac sic undique va-
rictibus crure liberato, tum plagarum orae
committuntur, & super emplastrum glutini-
nans injicitur.

30

I. 1. M. F. P. recta est. I. 5. M. F. P. eximere. I.
12. M. F. P. superimponitur. I. 26. M. F. P. ibi, I.
27. absceditur.

C A P.

C A P . X X X I I .

*De Digitis cohaerentibus, &
curvatis.*

AT, si digitus vel in utero protinus, vel
5 propter communem exulcerationem
postea cohaerunt, scalpello diducun-
tur: dein separatum uterque non pingui-
emplastro circumdatur: atque ita per se u-
terque sanescit.
10 Si vero fuit ulcus in digito, posteaque
male inducta cicatrix curvum eum red-
didit; primum malagma tentandum est:
dein, si id nihil prodest (quod & in veteri
cicatrice, &, ubi nervi laezi sunt, evenire
15 confuevit) videre oportet, nervine id vi-
tium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non
debet: neque enim sanabile est. Si cutis,
tota cicatrix excidenda est, quae fere cal-
losa efficit, ut extendi digitus non possit.
20 Tum rectus sic ad novam cicatricem per-
ducendus est.

C A P . X X X I I I .

De Gangraena.

GANGRAENAM inter ungues alasque,
25 aut inguina nasci; &, si quando me-
dicamenta vincuntur, membrum pre-
cidi oportere, alio loco mihi dictum est.
Sed id quoque cum periculo summo fit. 304, 23.
nam saepe in ipso opere, vel profusione
30 sanguinis vel animae defectione moriun-
tur. Verum hic quoque nihil interest, an
fatis tutum praesidium sit, quod unicum est.
Igitur

I. 2. M. F. P. *Curatio digitorum cohaerentium.* I. 10.
M. F. P. fit. I. 11. M. F. P. reddit. I. 19. M. F. P.
digitorum. I. ead. M. F. P. patiatur. I. 23. M. F. P.
De gangraenae curatione. I. 32. M. F. P. sisit.

Igitur inter sanam vitiatamque partem
incidenda scalpello caro usque ad os est sic,
ut neque contra ipsum articulum id fiat,
& potius ex sana parte aliquid excidatur,
quam ex aegra relinquatur. Ubi ad os ven-
tum est, reducenda ab eo sana caro, & cir-
ca os subsecanda est, ut ea quoque parte
aliquid ossis nudetur: dein id ferrula pre-
cidendum est, quam proxime sanae carni
etiam inherenti: ac tum frons ossis, quam 10
ferrula exasperavit, laevanda est, supraque
inducenda cutis. quae sub ejusmodi cura-
tione laxa esse debet, ut quam maxime
undique os contegat. Quo cutis inducta
non fuerit, id linamentis erit contegen-
dum, & supra id spongia ex aceto deligan-
da. Caetera postea sic facienda, ut in vul-
neribus, in quibus pus non moveri debet,
praeceptum est.

LIBER OCTAVUS.

20

C A P. I.

*De positu & figura Ossium totius
humani corporis.*

SUPEREST ea pars, quae ad ossa
pertinet. Quae quo facilius accipi 25
possit, prius positus figurasyne
eorum indicabo. Igitur calvaria
incipit ex interiore parte concava,
extripsecus gibba, utrinque
laevis, &, qua cerebri membranam conte-
git, &, qua cute, capillum gignente, con-
te-

*I. 3. M. F. P. os. I. 18. M. F. P. om. non. I. 20.
T. Cornelii Celsi de Medicina liber octavus. P. Artium
Aurelii Cornelii Celsi liber octavus. I. 22. M. F. P. om.
ossum.*

¹ Gracci *metaphysas*, Macrob. *Saturn. lib. 7. Omne-
tum* vocant.