
I. TERRAE ET LAPIDES.

A. PONDEROSAE.

LINN. *Syst. nat. III. p. 79 sq.*

SPATVM PONDEROSVM.

LINN. *Syst. nat. III. p. 81.*

Barytis vitriolata

insigni pondere specifico proxime ad pondus corporum metallicorum accidente (= 4500), fragilitate, textura lamellari, nitore quasi vitreo, indole, et cum aqua, et cum acidis, nisi calore bulliente foueantur, omne connubium renuente, atque per ignis violentiam in puluerem fatigente, qui neque arena addita neque omissa cum aqua in pastam ad aerem indurefcentem subigi potest, facile dignoscendum.

Spatum ponderosum ipsum omni, quantum quidem hactenus constat, in corpus animale efficacia caret, quamuis affinis illi materies, terra ponderosa aerata nativa, sive Witherites, ut iam dudum a B. LEIGH (Natural history of Lancashire,

A Che/hi-

Cheshire etc. Oxford 1700. fol. p. 70. 71.) et numerius a Viris Clarissimis WATTIO iuniori (Memoirs of the literary and philosophical society of Manchester Vol. III. p. 609 sq.) HENRY (ibid. p. 614.) et Coniunctiss. BLVMENBACHIO (*Bergmännisches Journ.* ann. 4. p. 1. p. 434.) veneni animalibus funestissimi crimine notata sit.

Egregia tamen, et modo caute adhibeatur, salutari quam maxime efficacia pollere paratam ex eo Terram ponderosam salitam s. Barytin salitam, siue Muriatam baryticam, recentiora testantur experimenta; ea autem circumspectione in hoc labore opus est, ut feligatur spatum omni metallica, siue arsenici, siue cupri, siue plumbi, quae omnia nocentissimum reddere possent medicamen, siue ferri, aut magnesiae nigrae, quae immutare certe eius vires possent, labo purum; quod quum neque semper ex arbitrio pharmacopoei pendeat, neque semper ex notis externis eluceat, in hoc labore ita procedendum est: Puluis spati tenuissimus cum cinerum clauellatorum depuratorum dupla portione terendo exacte mixtus in catillo hassiaco altero inuerso conctecto igni, quo candeat, per tres vel quatuor horas exponitur, et massa coagulata ex refrigerato catillo exenta et in puluerem contusa iterato et toties cum aqua distillata coquitur, donec haec insipida a coctione redeat.

Spati terra sic a vitrioli acido liberata (eius in locum terra ponderosa aerata nativa, modo para sit, substitui potest,) salis spiritui puro per portio-

portiones ingeritur, donec hic, quamuis calore externo vis eius augeatur, nihil amplius dissoluat, et nullas amplius acidi praedominantis notas ostendat; quo facto per chartam traiectus cum noua terrae ponderosae portione (ratione spati ponderosi primo experimento adhibiti $\frac{1}{20}$), postquam haec igni carenti exposita fuerat, leni calori, et, si quidem hac soluta instillata aere hepatico foeta aqua obscurum, metallici quid adhuc inesse arguens, sedimentum praecepit, cum tertia adhuc portione exponitur, et per filtrum traiectus eo vsque, donec crystallorum rudimenta in superficie appareant, leni calore sensim humore suo orbatus frigori nunc expositus, crystallos dimitit, in charta bibula siccandas, quae si quando tinctu suo ferri particulam adhuc inherentem prodant, aqua denuo solui, solutioni excalefactae noua iterato, donec non amplius soluatur, terrae ponderosae portio iniici, liquor denuo per chartam traicisci, et modo iam memorato, ut in crystallos abeat, tractari debet (C. A. HOFFMANN *chem. Annal.* 1792. I. p. 123. WESTRUMB ibid. p. 390. et *chemisch. Abhandl.* Hannov. 8. I. 1793. p. 215 sqq. BUCHOLTZ *chemisch. Untersuchungen über die vorgeblich giftigen Eigen-schaften des Witherits der Schwererde und der salzsauren Schwererde.* Weimar 1792. 8. p. 55.)

Harum crystallorum acri satis sapore pollentium drachma dimidia vncia una aquae distillatae soluitur, huiusque solutionis guttae infantibus 10-20, aliquando syrupo rubi idaei temperatae, adultis 30-60 aliquoties per diem repetitae exhibentur,

4 I. TERRAE ET LAPIDES.

bentur, aut in guttis a Cel. CRAWFORD denominatis grana 4 binis aquae distillatae vnciis dissoluuntur, eiusque liquoris guttae 50-100. aegris ingeruntur.

Negari tamen non potest, hanc medicinam, quemadmodum sal, quod basin eius constituit, canibus ingestum (WATT iunior l. c. p. 213.) vomitum aluique profluum excitauit, in hominibus quoque tormenta et continuato vsu vomitiones atque alui fluxum caussari, digestionis officinam debilitare, et neruis infensam esse: Quum praeterea per alia atque alia corpora separari iterum possit ab acido terra, tunc, si aërem fixum, quem vocant, attraxerit, facile funesta, cauendum est medico, ne cum aqua fontana, salibus alcalinis, terrestribus, metallicis, cum tartaro stibiato aliisque ex antimonio confectis medicaminibus (I. A. SCHMIDT de baryte muriato. Lips. 1793. 8.) exhibeat, neque ventriculo, nisi per praegressum laxantis remedii usum mundato, ingerat.

His cautelis adhibitis virtutem diaphoreticam, diureticam, refrigerantem, resoluentem, irritantem exercere testes sunt Vir. Clariss. CRAWFORD (medical communicat. London 1790. I. n. 25.), HVFELAND (*Erfahrungen über die Kräfte und den Gebrauch der salzsauren Schwererde in verschiedenen Krankheiten.* Erfurt 1792.) BVCHOLTZ (l. c.) et apud eum ABT, WESTRUMB (l. c. p. 217. 269 sqq.) et apud eum (l. m. c. p. 216. 217.) SCHERF, CONRADI, SCHAEFER, posteriorem eo gradu, ut non modo in morbis spasticis similibusque aliorum

rum morborum symptomatibus euitandus sit eius usus, sed etiam, si hominibus paulo sensibilius praescribatur, guttulis aliquot aquae ex foliis laucocerasi distillatae temperandum suadeant liquorum nonnulli medici. Quamuis igitur in hepatis infarctibus, in rhachitide, ulceribus arthriticis, fungo articulorum, saepius in cancro, phthisi (SCHMIDT l. c.) absque omni fructu adhibitus fuerit ille liquor, mirifice tamen, memoratis cautelis non praetermis, profuit in scrophulis, (BERNIGAV specim. fist. obseruationes quasdam de corticis vlni et terae ponderosae salitae usu medico. Erford. 4. p. 9 - 11. ALTHOF de efficacia terrae ponderosae salitae in praxi obseruata. Goetting. 1794. 4. p. 6 - 8.) strumis (BERNIGAV l. c. p. 9. 12.) scirrhis, cancris, mesenterii (ALTHOF l. m. c. p. 8.) aliarumque glandularum infarctibus atque indurationibus, nisi nimium proiectis (CRAWFORD medic. Commun. l. c. et ap. WATT iun. bergm. Iourn. 1790. 2. p. 224. HVFELAND et BVCHOLZ ll. cc.) WESTRYMB l. c. p. 270 - 272.) SCHMIDT (l. c.), praesertim si humorum circuitus languebat, et vires aegri infractae erant, tanto citius, si partibus affectis extrinsecus quoque applicari poterat liquor, aut ferreorum (CRAWFORD med. communic. l. c.) remediorum usus simul praescribatur; ita etiam in ophthalmia scrophulosa, scirrho testiculorum (v. praeter. alias cl. KAPP ap. BVCHOLZ l. c. p. 60.), tuberculis pulmonum opem praestitisse fertur: egregium pariter expertus est eius solutionis aqua temperatae et faccharo edulcatae usum in ulceribus superficialibus scrophulosis iam per 4 et 6 annos aegros afflignantibus et neque mer-

A 3

curii

6 I. TER. ET LAPIDES. A. PONDEROSAE.

curii ad saliuae vsque fluxum exhibiti vsui, neque decocto lignorum cedentibus, ter per diem, principio 15, postea 30 guttas exhibendo, et per 4 menes pergendo I. CLARCK ap. ANDR. DVNCAN (medic. comm. for the year 1791. Dec. 2. Vol. 6. 1792. 8. n. 3.), exiguum et crebro nullum FERRIAR (medical histories and relections Warrington and Lond. 1792. 8. n. IX. p. 170.) alii inter nostrates medici: In fluore albo, morbis asthmaticis, ipsis interdum exanthematicis incassum tentauit ALTHOF l. c. p. 12. 13. in scrophulis R. HAMILTON on scrophulous affections with remarks on scirrhus, cancer and rachitis. Lond. 1791. 8. Sect. III.

Commendarunt alii hoc medicamen in exanthematicibus chronicis pertinacibus (ALTHOF l.c. p. 9-11, BERNIGAV l. c. p. 9 et apud eum Ill. STARKE ibid.) v. g. tinea, lichenibus, scabie (SCHMIDT l. c.); in ulceribus ac bubonibus aliisque malis venereis experti sunt efficacem ALTHOF (l.c. p. 11.) et apud eum HVBER et VOGEL; alii ad incidentam pituitam, aut pulmones (e. gr. in asthmate pituitoso) aut ventriculum obruentem, et praeente Anglo Medico WILLIS (ap. WATT iun. bergm. Journ. l. c.) Clariſſ. HVFELAND (l. c.) WESTRVMB (l. c. p. 270.) BERNIGAV l. c. p. 11. 12. et KLOHTS medicinifche Bemerkungen über die Wirkſamkeit und den Gebrauch der ſalzſauren Schwererde. Zerbſt 1793. 8.) tanquam potentissimum ad eiiciendas ex intestinorum tubo ascarides instrumentum.

B. TER.