

inde mouerentur, sed animum reciperent, nec timerent ullum periculum. Ita sane animo composito mitius actum fuit de corpore. Quod vero gonorrhœam quidam pro bono habent, si saltim tolerabilis sit, id minus concederim. Ponam bonam esse, ut causam, quatenus natura hunc exitum affectat, & educere ichore seroso præseruatur reliquum corpus a morbis; non bona est ut signum, unde facile corpus degenerat in malum habitum. Dicitis vero præfidiis, non omissis vniuersalibus, malum certo cedit, modo non nimis inueteratum sit. Neutro pacto assequimur finem vnguentis vel oleis, licet promiscue a practicis præscribantur. Tantæ molis est segregare bona a malis in materia medica quoque.

LIB. II. SECT. II. CAP. XIX.

De iugulis,

DE ISCHÆMIS seu sanguinem sistentibus dicturis ipsius sanguinis occurrit necessaria consideratio. Supponimus enim brevibus de motu hoc ad extra:

(1.) Sanguinem torpilis & alveis suis non contentum exitum affectare improportionatum & onerosum. Vide mus id toto die in plethoricis, quod hæmorrhagiam natum, menses immodicos, hæmoptysin ipsam quandoque patiantur. Imo vel ex hoc discere possunt αιμοφόβοι, profundia natura ipsa onerosum sanguinem, adeoque abundare posse eundem. Cum abundant, exundat non raro, licet & alia mala det, non tam patientibus hisce viis.

(2.) Onerosum & improportionatum reddi sanguinem a nimia rarefactione, motu intestino maiori, salibus alcalinis, biliosis inducta. Omne humidum calore diditur, & elasticum, expansum redditur. Hoc ut in statu naturali ita comparatum est, ne fiat profusio, sed venæ ipsæ & pori expandi possint; sic in præternaturali vel non-naturali quoque inde sit extundatio.

Et

Et vel culinario exemplo notum est, calore maiori ollæ limites exuperare aquam simplicem, magis vero salitam, vt quando pisces elixantur; maxime omnium pinguia, oleosa, sulphurea, vt in elixatione olei lini pro vernice parando, in parandis emplastris, in præparatione balsami q̄ris ad oculum patet, quatenus viscedo q̄ris hoc pacto in infinitas bullulas expumescit. Hæc duplex mechanica illustrat egregie ebullitionem sanguinis & effervescationem maiorem, vnde porro ponemus.

(3.) Sanguinem in primis expumescere magis tum salsum, tum biliosum. Salsedinis exemplum occurrit toto die in scorbuticis, in catarahis, tussi ipsa, quæ frequenter hæmorrhagiam, narium habet coniunctam, sputo cruento, vbi & sensibus occurrit salsedo titillans, in mensibus immodicis, vbi erodens acrimonia satis se manifestat sæpe in ipsis genitalibus, in dorso quoque ipso. Biliosæ rarefactionis exempla visuntur in febribus tum primariis, tum comitatis. Frequentissime in febribus fiunt hæmorrhagiæ etiam in non plethoricis, quatenus sanguis & ipse biliosus tum magis expumescit, intenso illo calore, & sal volatile peregrinum iunctum rarefactionem præstans maxime concurrevit. Sic & in variolis, morbilis aliisque idem solenqiter occurrit, imo cum leuamine, quatenus parte spumosa oleosa recrētūtia tunc dempta, reliqua massa archeo redditur magis obsequens, & subiugabilis.

(4.) Adeoque hæmorrhagiam causari modo serum magis, modo sanguinem. Serum enim salsedinis, sanguis biliosi sulphuris vehiculum est magis. Ut ergo utraque sint coniuncta, & ad sensum vñita in corpore, id tamen non obstat, quin modo serum, modo sanguinem peccare magis dicamus, quod vnumquodque recipiat ad receptiuitatis suæ modulum, vnde quoque id patet ex effectu, quatenus natura ipsa seorsim serum, licet non æque sanguinem separet. Sanguis sane non excideret sæpe, nisi sero acriori & fluxiliiori obsecundaret & ipse, nisi fibræ laxiores cohæterent eiusdem culpa; sæpe etiam, si ipse temperaret magis partes oleosas biliosasque, vnde strenuum bilis audit.

(5.) Sanguinem rarefacere magis alcali, obtundere acidum; serum vero ab utroque reddi acrius. In statu febrili & bilioso prius occurrit, in statu extra febrim magis alterum. Hinc non tam tenuis sanguis exstillat, quam spissus quoque cinnabarino florido colore, qualis etiam a V. S. emissus visitur. Hinc scorbuto calido affecti magis etiam hæmorrhagiis tentantur, quam frigido vexati. Ast acidum in subdominio, vel seroso statu etiam in prædominio existens hæmorrhagias causari potest quoque, licet magis inferioribus locis quam superioribus, vtero, inquam, hæmorrhoidibusque, tanquam fixius fal, vt alcalicum magis est volatile. Protrahit tamen hic status magis hæmorrhagiam, quam excitat, exemplo mensium immodicorum.

(6.) Quæcunque ab extra expumescientiam hanc seri & sanguinis promouent, hæmorrhagias parere. Id quod patefit exemplo motus, potus vini, aromatum usus, aeris calidi, astui, iræ, mensium suppressorum &c. vnde facile vi contrariorum patere, potest, quæ hæmorrhagias sedent.

(7.) Sanguinem extra ferri sæpe non tam expumescientia inducta, quam coactum. Duplicita huius rei occurunt exempla, partim frequentiora, partim rariora. *Frequens est hæmorrhagia, generali acceptione aliis quoque fluxibus sanguinis omnibus competens, in hydropicis, vel hypochondriacis quoque, ob communionem particularem & lateralem constanter ex dextra vel sinistra nare stillans, prout hæpar vel lien affectus magis fuerit.* Frequens in aliis quoque, vt mensibus immodiciis, hæmorrhoidibus itidem ab obstructione vasorum mesentericorum oriunda; frequens in gibbosis, non crescentibus, ut par erat, vnde cum non detur sufficiens spatium, sed inter ventientia vasa & vectum humorem impropositio, coactus alibi affectat exitum, idque locis patulis & porosis per se, vel adsuetis quoque effluxioni per naturam.

Rarior est hæmorrhagia coactiva vniuersalis, cuius duo nouimus exempla. Coactiua voco, non tam ob rarefactionem, quo sensu etiam talis in feribus ad mortem usque producta occurrit non raro, frustra exhibitis remedii quibus-

uis

vis, superueniente tandem sudore & frigore extremorum; salua ratione, & tandem ineuitabili morte; quam, vbi sanguis contineri spatiis suis, seu corpore, & poris & vasis nescius vi quadam expellitur, seu ipse difflit & effluit, quasi expulsus. Vniuersalem vero, quod per nares, per aluum, per vrinam id eueniat, imo etiam aliquando per aures & oculos ipsos. Mortuus sic est ante 7. vel 8. circiter annos chiliarcha imperialis, quod ex relationibus publicis tunc innotuit. Mortuus eodem morbi genere nobis adstantibus vir primarius, quod ali bi describimus.

(8.) Læso quoconque grauius vase, nisi restinguatur, omnem sanguinem effluere posse. Est enim quoad hæc cum primis ξύπορα via, unus confluxus, continua cordis pulsatione, inducta, neque quoad huncce perfectum hiatum effluens sanguis obicem sibi ipsi ponere potest, vtì sponte & motu proprio exitum affeetans per vterum, nares.

Hinc facile æstimare erit, quænam sint ἰχαίμα, nempe:
 I. Quæunque sanguinis copiam, ὄγηστον, acrimoniam, tenuitatem ac imperium refranant, sunt ἰχαίμα. Copiam tollunt optime.
 V. S. & huius vicaria præfidia alia. Certum nempe & hoc est in praxi, symptoma hoc, nisi sanguine litemus, tolli feliciter non posse; Frustra utimur astringentibus in hemorrhagiis fortioribus narium, repetitis illis, frustra in sputo & vomitu cruento, mensibus immodicis quoque & similibus citra V. S., quod toto die nos docuit praxis, hac vero adhibita felicissime, depleto statim oneroso illo superfluo, per vnam V. S. re uulforam.

Ὀγηστον cum rarefactione coniunctum tollunt, quæ sulphur obtundunt & sal volatile figunt ac inuertunt, nominatim *acida*, & *aqua*. Notabile est assertum, *acida coagulare*, sanguinem, puta feruefactum ac ebullientem nimis, quem coercent dupli modo eximio, siue sint acida diffusa, seu concentrata, siue *Өlica*, seu *Өfa*, aliaque. Hinc commendant autores *Өli* in sputo cruento ipso, quod cum grano salis

acciendiū, quando scilicet vitio lienis & M. S. symptomā illud magis contingit, habere aliquando locum potest, alias non item, si vitio pulmonis determinato magis eueniat. Hinc in hæmorrhagiis, vitio hepatis calidioris inprimis ortis, Ra viol. cum ~ Oli feliciter sumus vſi. Præstat enim eo easu diffundere eundem, satis actiuū, quam concentrato eodem ventriculum & corpus lædere. Sic eundem in finem faciunt, cum primis in febribus, iulepi diluentes & temperantes; modo aciduli sint, non dulces nimis, dulcia enim in hæmorrhagiis quibuscunque minus locum inueniunt, sed, quod ipsa quoque per mechanicam in spumam & bullulas facile rarefiant, nocent potius. Sic etiam aqua insigniter proficiunt, decoctum hord. cum succ. citr. potionēs, emulsionēs, aliaque huius com-matis.

Acrimoniam temperant, tum eadem ista, quæ diximus iam, tum terrea quoque, constrictiua, lentore & mucilagine, blanda inuiscantia & obtudentia, ex simplicibus corallia, lap. hæmat. sangu. dracon. &c. ex compositis pulu. stypt. croc. & astr. tum Oſa quoque ipsa, modo laxitas fibrarum non obstat, eximie proficia.

Tenuitatem & fluxilitatem cohibent incassantia & adstringentia, nominatim Ra lap. hæmat. antiphthis. corall. & astr. rad. alth. & iam dictus pulu. stypticus polychrestus. Non minus enim tenuitatem ac impetum, ipsamque acrimoniam respicit tum hic, tum opiate, variis formis exhibita, seu sola, seu stypticis maritata. Virgo generosissima a vitiis diætæ patitur diarrhoeam, cum abscessus reatu, egerit feces plurimas & cruentas & fetidas: data Ra & astr. cum corall. dato item per vices puluere styptico anodynō felicissime conualuit. Rusticus cacechymicus a motu fortiori sentit hæmorrhagiam narium insignissimam per 4.6. horas, nulla data interruptione quasi. Noctu petit auxilium, dantur interius eadem medicamenta, feliciter restituitur. Fœmina mensium immoderationem percipit non una vice. Simul ac dosin unam alteramque de puluere styptico cum anod. assu-mit, fluxus cessat. Hæmopticus petit auxilium, propinatur puluis

puluis stypticus, ad supra dictum modum, præter alia, paroxysmus statim retunditur. Verbo, probatissima sunt hæc ipsa remedia, innumeris exemplis confirmata, & nunquam non cum successa usurpata. Quæcumque scilicet lixiuiosum alcalinum rarefactum nimis sanguinem concentrant, congelant, mitigant & figunt, dictam indicationem omnibus modis obsoluunt.

Refrænant vero dictum impetum tum interna, calori simul debita, qui singulis illis motus speciebus velificatur; tum externa eidem fini inseruientia.

Refrænant ligaturæ mediocres, sanguinis impetuosum partim remorantes, partim dolorifico sensu eundem in vias communes ex propriis quasi diuertentes; item cucurbitula sicca in nucha, quatenus & eadem motum seri fluxilioris impedit, & dolore inducto simul archeum diuertit. Vbi enim dolor, ibi sanguis affluit, quo factò non potest non idem alibi exundans reuelli & aliorum deflecti.

Refrænant actu & potentia frigida non vna, oxycratum, fronti, collo, temporibus, nuchæ, scroto adhibitum; aqua frigidissima, nix ipsa quoque. Quæcumque nempe loca sanguinis alterationi & refrigerio magis inseruunt, apta nata potissimum sunt, quibus *læsia* adhibeantur, quæ inter & vertex est. Ut ergo fint, qui frustra bregmati applicari eadem contendunt, quod non exinde ad nares deuoluatur sanguis; attamen ea applicatio secundum ductum vasorum instituitur, & actuali frigiditate actiua fatis & alterans. Imo nec ossium vallum obstat, siquidem refrigerans illa vis fatis ad interiora usque euibrat suum effectum. Methodum hanc curandi inculcat ipse Hippocrates 7. aphor. 37. vbi de vomitu cruento loquitur quidem, ast similiū eadem est ratio. Curatio, inquit, refrigerandi & adstringendi vim habentibus perficitur. Refrigerantia magis debentur viis communibus, poris, ob calorem rafacentem latius sanguinem inuitantibus, tum propriis quoque seu vasis quatenus in medio cursu quasi suo eundem ad moderationis leges sufflaminant sæpe. Hinc & elogio 5. aphor. 23. frigido in his vtendum, unde fluit, aut fluxurus est sanguis,

non quidem eodem loci, sed circa ea loca, vnde influit; habito nempe respectu ad cor, tanquam fontem sanguinis.

Quod si accedat compressio, tanto praesentius frigida haec iuuant. Exemplo sit imperialis, prius aqua frigida alteratus fronti adalligatus, quo pacto tum infantibus, tum aliis etiam adultis feliciter succurrimus.

Refrenant & concentrant omnia actualia frigida. Cum enim motus hic sanguinis sit ad extra, adeoque idem qui caloris a centro ad circumferentiam, nec sine calore, saltim naturali, & vasorum eueniat; cum corpus infinitis spiraculis polleat, ab ambitu maxime alterabile, frigus vero concentret aerem & poros magis patulos; inde motus contrarius inducitur, a circumferentia versus centrum, ab extra intro, & alteratur quoque feruidior sanguinis spuma. Pertinet huc & terror ipse, siue aliis modis incutiatur, seu per aspersionem aqua frigidæ, in nucham vel faciem ex improviso factam, ut tanto praesentius alteret.

Refrenant alia per contactum frigidum, & potentia adstringendi, vel etiam quædam discutiendi, applicata. Cum enim ad obiecta non uno modo se habeat calor noster, sed ex illis effluvia partim ferantur, partim calore hoc nostro excitentur, merito quoque ab his appensis, in manu detentis, vel aliibi corpori extus applicatis, leuamen quoddam sperandum. Quorsum in primis pertinet summa subtilitas effluviorum, quæ in odoratis quidem actu ob copiam admirati, non mensurare possumus, in aliis vero dari, etiam pigris visis, non negandum est. Hinc quæcumque effluviis austerioribus, adstringentibus, terreis, remorantibus archeum vniuersalem afficiunt, & quasi afflant, sunt ischæma. Vniuersalem inquam, nam de particulari partium effundentium sanguinem post dicetur. Sic visitatissimum est eo casu adhibere lapidem haematitem, in vtraque manu, vel sub axilla. Est hic de natura martiali, imo martis purior minera, vnde hoc pacto dupli modo succurrit, frigore actuali primum, in duris metallicis corporibus profundiori & quasi domestico; deinde effluviis austerioribus alterantibus sanguinem. Par ratio

ratio est iaspidis. Sic fluxum sanguinis menstrui (quod & de aliis valet) restrinxit *Langius* retentione peræ seu bursæ pastoris in vna, & iaspidis in altera manu. l. 3. ep. 1. p. 941. Idem adnotauimus de centinodio in fœmina nimias hæmorrhoides paciente, ordinarie & cum successu semper adhibito. Sic & bufo exsiccatus sub axillis detentus certo experimento sedat hæmorrhagias narium alias, tum ob similia effluvia, est enim animal frigidum & terreum, tum quoque quod archeus inde abhorrescentiam quandam contrahat, vnde intro humores magis vocat, & consequenter hæmorrhagia cessare cogitur. Sic *Olum Cyprium* in manu detentum idem præstat. Sic in aulis quibusdam vel gynæcis usitatum est ad menses fistendos, ut ouum ad duritiem coctum sub axillis detineatur. Et quæ alia hunc in finem hinc & inde solent commendari. Radix nigellastræ eadem ex ratione prodest, nisi dicamus eandem sub lingua positam diuertendo quoque & discutiendo agere ob motum.

Cumque de effluvis dixerimus horum, operæ pretium est de iis quædam adhuc addere huc facientia & quidem de pulvere sympathetico, qui hæmorrhagias narium & vulnerum inter alia feliciter quoque sedat. Inuentor huius celebratur a *Digbeo* or. de pulv. sympath. p. 11. Carmelita monachus, qui hoc arcam ex oriente adduxerit, a quo hic modum secretum didicit. Paratur nempe vel ex quoouis *Olo*, exemplo adhibito & puluerisato, vel soluto pro re nata, nam idem præstitisse adseuerat, *Digbeu*, vel quod receptius est, R. *Olum cyprium*, vel nostras quoque, calcinatur calcinatione aerea, expositum solis radiis mense Iulio vel Augusto, donec in puluerem album fatiscat, exuto virore vel cœruleo colore suo, addito pro lubitu, quod nonnullis placet, gummi tragacanthæ pulueris ad partem subdecuplam, seu ad 3x. 3j. imo quidam ana id faciunt.

Experimentum pro hæmorrhagia fistenda, quantum ad nostrum scopum hic facit, illud est, si nempe via sicca stillet sanguis exiens super puluerem illum sympatheticum, vii alter

via

via humida, si linteamen cruore madidum & exiccatum intingatur solutioni huic Oli; exempla videantur apud *Digb. l. c. Studiosus medicinæ hæmorrhagia narium frequenter coripi solitus familiaritate huius pulueris se curabat subinde.* Gestabat illum secum, vel ad manus habebat, stillato in puluerem sanguine cessabat. Vsi sumus eodem cum successu in dysenteria, inspergendo eundem, quod & de \odot valet, fecibus cruentis. Non semper tamen eundem expectationem satiare recte, asserit *Boyleus Tentam. Phys. p. 120.* vbi proprium experimentum adducit, non compescuisse hæmorrhagiam narium in se, licet, in aliis contrarium viderit. Describit & memorat eundem *Beuerouic. quæst. epistol. p. 241.* Edidit & de eo librum *Nicolaus Papinius Parisiis*, quem citat *Ol. Worm. & descriptionem ponit mus. c. 10. p. 25.* Meminit etiam huius, & *Digbzum*, qui eum e Barbaria attulerit primus, eiusque hypothesin de modo agendi celebrat *Borell. app. ad c. 3. obs. 46. p. 276.* Optime etiam de eodem agit *Helm. l. Butler inscr. p. 470. & l. recepta iniecta p. 456.*

Mirum itaque id torfit ingenia, quomodo puluis hic eminus sanet, citra applicationem immediatam. *Quidam id ut superstitionis reiecere;* quod vt *Theologus quidam probaret*, apud *Helmontium*, facta protestatione expressa adhibuit idem, videlicet nihilominus vulnus solito citius sanatum, cruentem quoque statim sedatum. *Digbeus* putat, beneficio lucis (aerea calcinatione magis irradiatae & impressæ) atomos Oli & cruentis coniunctorum expandi in aere, inde vero attrahere easdem vulnera, unde statim dolor mitigetur, & spiritibus balsamicis Oli sanatio fiat. *p. m. 119.* Affinis huic hypothesi *Helmontiana* est, principium actionis sympatheticæ esse facultatem influentiis affinem, agentem per irradiationem in obiectum sibi appropriatum. *Tacemus* quæ integris libris pluribus, a *Strausso collectis*, de cura sympatheticæ fuerint tradita & congregata.

Nos vt dicamus quid sentiendum nobis videatur, supponemus

nemus (1.) Oium austeritate styptica & terrea pollere p̄z aliis omnibus, vel saltim esse inter eadem p̄cipuum.

(2.) Exerere eandem contactu immediato; nil magis e salinorum classe vulnera & vlcera condit & quasi balsamat, quam Oium, in primis album.

(3.) Oium p̄z omnibus aliis sui generis esse transpirabile & diffusuum effluuiorum, quod in alumine impedit spuma visciditas & velut gluten, vnde & igni magis resistit. Hinc & aerem prompte subire patitur, prompte calcinatur in puluerem. Imo p̄paratum hoc modo poros exhibere laxiores ad effluvia.

(4.) Calorem & humorem effluvia Oli magis citare & diffundere; calor quidem diffundendo humidum & poros dilatando, humor vero soluendo id p̄stat.

Hinc cum cruento actu calente mixto effluvia ab humido & calido promota magis exeunt, & ad locum affectum facile perueniunt. Irradiatione leniori & blanda ergo sanguinem serosum concentrant eadem effluvia Oli austriuscula, ut fortiori sternutationem cident; eademque cum sero sanguinis communicata & per solutionem emanatione sua ad locum affectum facile perueniunt. Imo & aerem alterant, qui, cum corruptor sit vulnerum, his effluviis alteratus amicus iisdem magis euadit. Vnde immediatio virtutis huius agentis cum paciente perspici potest. Nec opus est, ut symbolismum seu magnetismum cruris emissi & corruptionem subeuntis cum sanguine viuido reliquo statuamus.

Quod vero non semper idem eveniat æque feliciter, id improportioni agentis & patientis debetur. Si enim impetus exituri sanguinis sit fortior, si vulnus gravius, minus etiam effluvia hæc possunt sufficere. Sufficit, concurriere & hæc effluvia & agere intra sphæram actiuitatis suæ, quod possunt & debent.

Refrænant fluxilitatem hanc & impetum exituri sanguinis agentia, opiala, insigni quoque argumento, quomodo hæc agant.

Sff

Si

Si enim in priori hoc casu dicto verum est, sanguinem affectare exitum motu proprio, salino-sulphureo ὄγασμῳ, quiete & passiue se habentibus fibris & partibus omnibus solidis, citram dolorem, ullam coactuam quoad vasa ipsa continentia emissionem, sequitur necessario, opata agere in partes ipsas fluidas, sistendo h. l. actimoniam, incrassando & motum spiritibus pacatiorem imperando. Faciunt opata hoc tam sibi relecta, quam cum astringentibus & ipsis serum incrassantibus ac moderantibus remixta, ut iam diximus. Imo notauimus post opiatorum & adstringentium usum e venâ sectâ sanguinem hinc minus fluxisse.

2. *Quocunque vasorum pororumque emittentium oscula, quo- cunque modo fissa vel bianita, constringunt & obstruunt, sunt iugosa.* Priori classe dicta magis interiora respiciunt, posteriori hac exteriora magis, quando sanguis hoc pacto necessitate fluxionis continua emititur, licet quoque ipse vitiosus sâpe & data porta facilis effluens obseruetur. Vnde & e V. S. tanto promptius exilit, quo feruidior vel magis turgescens est. Illa adstringunt, hæc obstruunt.

Vtrarumque vero meminimus viarum, communium & propriarum, quod & vulnera partium aliarum adstrictionem, sanguinis indicent, & pori quandoque ipsi, ut exempla talismodi hæmorrhagiarum per diapedesim præbent non solum equi, sponte cruentantes, verum & in homine sudor cruentus, vel sanguis ipse quoque hinc illinc extillans citra manifestum hiatum, qualia exempla recenset Heer, obs. 23. p. 269. vbi nemo ullo sensu deprehendere potuit, vnde v. g. e minimo manus digito sanguinis magna satis copia effluxerat. Quod hoc aliud, quam Διαμήδης est, quibusdam, an detur, in dubium vocata?

Obstruunt emittentia vascula, obturantia, ut compressio actualis. Hoc pacto enim labia vel oscilla continuantur, & obex ponitur, pariete quasi redintegrato, quod per mechanicam valet, facto quotidiano experimento. Facit hoc quorundam

dam mos, qui vénam sectam statim comprimunt, vel lardum imponunt, nec prius emitunt sanguinem, quam animus ad se redierit, velut collectis spiritibus. Faciunt huc ligaturæ quæcunque cum simplices, tum spleniis, vel lineis, vel, ut ita nominemus, metallicis quoque stringentes compositæ, quod vñice valet in curandis vulneribus arteriarum, siue casu, siue ex ~~neg~~ augétoe aperte fuerint.

Obstruunt emplastica & inuiscantia quædam, vti nouimus quendam emplastro viscidioti tepefacto fluido vulneri affuso non raro stitis hæmorrhagiam. Præstant enim hæc futuram quasi sicciam etiam hoc casu.

Obstruunt, quæcunque effluuiis austoris etiam odoretenus constipationem valorum & villorum procurant, vnde fordida quidem medicina est, non incongrua tamen, hæmorrhagiæ narium, si sterlus porcinum iisdem adhibeat, vel asinimum. Imo nouimus quendam hoc ipsum imbibitum bis vel ter cum succo vrticæ interne & externe cum successu adhibuisse. Et Zactus Lusitanus præstantissimum & palmarium vocat sterlus asini, quod exactissime levigatum omni iuri potuique permisit, & tabellas cum saccharo ex eo formauit, desperatumque sic restituit. pr. hist. l. vte. c. 2. n. 4. p. m. 638.

Obstruunt exsiccantia sanguinem. Omne siccum fluido est contrarium, præcipue si terror coniungatur, vnde inter probatissima habetur hæmorrhagiæ narium remedia ferri candardis mediata & remotior applicatio, vt sanguinem exstillantem extipiat, cuius ratio ex dictis claret. — Facillime inter liquida exiccatur sanguis, exiccatus vero cohæret & aggerem sibi ipsi ponit.

Quin omnis sanguis fistit sanguinem, non quidem exicando, sed glutinante sua hac natura, ratione partium γλι-
χεῶν sulphurearum. Hinc in hæmorrhagiis narium, vt alias non attingamus, ipse in exitu concrescit, & concrescendo temoram sibi iniicit, vt subsistere tandem cogatur, neque etiam hinc, dato illo casu, grumescens sanguis statim e naribus exi-

Sff 2 men-

mendus est; quin nec vulnera arteriarum citius religanda, ne denuo cruentare incipient, nondum satis facta obstructione. Sic columba sanguinem reprimere hemorrhagias e membranis cerebri scribit *Tagautius* *inst. chir.* p. 646.

Obstruunt constringentia austera, liquida & sicca. Ex liquidis atramentum, oxycratum, acetum, exemplo venarum, sublingualium, & præ aliis decantatus hodie liquor stypticus, ex O & Olo per ∇ s. & coctionem vnitis consurgens, de quo vid. *Weberus*, licet sint, qui rosis rubris tingi posse eundem velint, inde vero reuera nigrescens euadit, quod inter *Olica* & resinosa perpetuum est. Tacemus adstringentia alia communia, ut vsneam turundis inspersam tenuissime prius puluerisatam maxime commendat *Hildanus* c. 2. obs. 15. p. 91. quorum & terra Iaponica referenda est.

Obstruunt dissociantia seu imbibentia. Quo magis dissociatur humor quicunque, eo minus fluit, sed consistere cogitur, in primis qui in se spissitudinem habet in recessu, simulac ex caloris dominio excidit. Dissociando obstruit fungus puluerulentus, seu crepus lupi vulgo dictus, qui dum minutissimis atomis applicatus dissociat sanguinem, maxime imbibit & fistit eundem, seu in naribus, seu vulneribus quoque, exundet, impositus immediate & illigatus. Cum primis vero hoc spectat pannus xylinus vstus, cum albumine cui exceptus & applicatus, posito desuper crepitu lupi & cum spleniis facta deligatione, quod egregium est arcanum.

Dissociant quoque lanuginosa & mollia alia: vnde pilis leporis ad hemorrhagias ipsarum arteriarum commendantur, & aliis casibus quoque. Sic & linamenta concerpta optime id præstant, tum per se, tum oxycrato imbuta & compressa, quem obseruationem recenset *Tagautius* l.c. Faciunt huc & pulueres astringentes naribus inflati, vel cum turundis potius blande intrusi. Quin & turundæ compositæ tales possunt ex fungo puluerulento, pil. lepor. musco cran. human. pulu. gallar. buson. exicc. sterc. suill. &c. ut alia humida taceamus.

Ob-

Obstruunt crispantia, ut adeo & hæc externa partim adstringant, partim obstruant; adstringant continentis parietes ac vasa, adstringant exiturum sanguinem. Crispantia ergo velut vtrumque id præstare possunt, & vascula firmant, & exiturum sanguinem restringant.

Crispant & ferruminant quasi tum potentialia mitiora cauteria; quem in finem probatissimum habetur colcothar Oli, quod Heer. l. c. quod Heurn. comm. in apb. quod experientia, toto die commendat. Crispant, corrugant & crustam inducent cauteria actualia ignita, summa simul iuncta exsiccandi virtute; quod inter extrema attamen probatissima remedia numerandum est, modo cum prudentia administretur. Fitque id ipsum ferro ignito, quem in finem cauteria varii generis, tenuia quidem, basi tamen aliquanto lata, apud chirurgos in vsu sunt, momentanea actione id præstantia; vnde non item id expectandum est ab actuali igne alio, qualis mox est, seu *coraxia* ex artemisia, neque enim deflagratur, nisi sensim, respectiue, vt somites alii quoque, nec flagrat splendida flamma, vnoque loco collecta.

3. Quæcumque sanguinis motum in ordinem redigunt, & acrimoniam seri scorbuticam alterant, sunt *lycausa*. Certum est, a priori sanguinem saepe in motum extraordinarium citari, quando motus ordinarius non sufficit, vel impeditus est, seu hæmorrhagias fieri ab obstructionibus viscerum. Exemplum communissimum præbet obstructio vasorum vteri. Quas non vias affectat sanguis eo casu, ut exeat? Probare idem possunt hæmorrhoides, quæ quidem ab *cezauo* interno oriuntur, quoque, frequenter vero ab obstructione viscerum. Viscera hæc sunt cumprimis quoque lien, hepar & mesenterium, ubi copiosis vasis decurrit sanguis, vnde si in his motus eiusdem impediatur, hæmorrhagiae varii generis consurgunt, ipsique in foeminis menses immodici, ut non repetamus iam tactos hydropicos, & hypochondriacos, magis manifeste tales, saepe enim latet hæc causa, prudenti *axe* eruenda.

Sff 3

Cer-

Certum est a posteriori, s^ep^e h^amorrhagiam narium a ligaturis auctam, item a frigidis, collo & scapulis aspersis, c^ucubitalis siccis aliisque, remotis vero his omnibus, & datis motum sanguinis ordinarium promouentibus cessasse. Exemplo sit sperniola Crollii, qu^az itidem constat vna ex calidis eundem motum promouentibus & obstrukciones venarum referantibus, vt sanguis intemerato cursu a corde missus vbiunque penetrare queat. Eadem ratio est v^az theriac. Croll. carfunc. aur. cinam. R^az F^ri &c.

Qu^acunque igitur vias referant, & ad pristinum spatium arctatos fines reducunt, licet paulo improptie, omnino h^amorrhagias sedant, pr^acipue si simul sanguinem, vt faciunt, corrigan. Instar omnium sunt martialia, omni huic indicationi satisfacientia, edulcant enim acrimoniam, acetositatem tollunt, consistentiam stabilunt, & in ordinem redigunt sanguinem. Sic & corallia medio loco se habent, & similia, i^{mp}o & ipsa acida suo modo huc faciunt, ob incidendi iuxta & refranandi virtutem.

Pr^axter aperientia vero h^aec & diuretica, ipsaque calida provide remiscenda, etiam motum hunc sanguinis corrugunt, non minus ac acrimoniam seri scorbuticam, ipsa diaforetica temperata, ex ß diaph. bol. armen. & Ali cacheet. & similibus, vitatis volatilioribus, a quibus s^ep^e obseruauimus h^amorrhagias. Fœmina plethorica, ad dolorem capitis sumens Ram bez. Mich. extra ordinem mensium experiebatur fluxum, quod probe notandum in variolis & aliis casibus. Cumque e suis fontibus h^aec nota sint, non opus est, vt ea huc arcessamus latius.

Coronidi^s loco not. 1. Non omnis hemorrhagia seu fluxus sanguinis sistendus est i^{mp}alvus. Non conueniunt in h^amorrhagia critica, nisi restringe, spectator tunc esse medicus debet, sed non otiosus. Critica enim h^amorrhagia est a priori, naturæ intentione, sed symptomatica euadit, a posteri^{ori}, neque enim ipsa moderari \approx que fluxus vel sistere aper- tas

tas vias potest. Non, si minus vrget, vti alias vrgentissimum est symptomata. Non vbi contra- indicans, vel affectus etiam principalis aliis obstat, ipsaque est secundaria, vel timendus est grauior status. Absurdum foret, pleuritico, cui salutare est sanguinem eiici cum tussi, per ischæma velle succurrere. Fœmina vomitu cruento laborans, iam prouectæ ætatis, hau- sto adstringente puluere a chirurgo dato mox moritur, fluxu represso; menses enim illuc affectabant exitum, aperientibus porius, & V. S. iuuandi. Philosophus clarissimus mihi cruento laborans, hoc curato, apoplecticus moritur; id quod in aliis quoque obseruauimus senibus, mixta nempe cruentum excepisse apoplexiam.

2. *Modo topicis, modo internis magis ad hemorrhagias opus est.* Præstat quidem eadem coniungere, moderanda ta- men sunt ita, ne frustra simus. Quandocunque effluit san- guis, illius sphæra intuenda est, vt fistat quidem fluxum, motum tamen naturalem non negligat medicus. Topicis im- mediatis suus locus est, mediata vero, pro æstuante sanguine alterando, applicanda locis magis torosis & patulis. Quan- do non cessat fluxus, consultum sæpe est, vt tota spina dorsi aqua frigidissima perfundatur. Sic & plantis pedum ranam viuam cum successu adalligavit Kozack. l. 2. c. 12. de hemorrha. p. 678.

3. *Topicæ ioxaua roborent, non ledant.* Valet id de actiuis & causticis cumprimis. Acetum ipsum in minoribus quidem valis sublingualibus contrahendis habet locum; quando vero foramina nimis sunt lata, seu magis hiuant, eo non contrahi possunt, tunc myrrha & olibanum aliaque inspersa magis pro- fundit. Corrosiva oolia & xylia absint penitus. ♂ & ♀ prouide applicantur, quorum ultimum omnium est tutissimum.

Hinc non ablato interius ὅργασμον frustra sunt adstringen- tia. Hinc præcipere solent practici sanguinem ex hæmorrhoi- dibus erumpentem etiam largius non esse reprimendum exter- nis stypticis, nisi prius secta vena eius massa diminuta fuerit. Vniuersalia etiam hic valent sæpe præ topicis,

4. In

4. In remorando sanguine circulus eiusdem non turbandus
est. Valet id tum de aliis hactenus dictis, tum in primis quoque de ligaturis extremorum. Hę, partim pro vasorum compressione, partim pro remorando in poris sanguine, conuenire queunt, accedente in primis leui dolore, qui aduocat illum, hoc ad partem ligatam, adeoque reuelliit. Sed si fortius strigantur, circulum omnino turbant, ægrum frustra cruciant, & tantum abest, ut sanguinem sic fistant, ut potius fluxurum magis cieant & hæmorrhagiam augeant. Neque vero selectus coloris hic aliquid facit, quando rubrum sericeum vinculum eligunt, quin potius rubedo magis motum promouet, quam sedat.

**Deo optimo maximo honos
& gloria.**

F. I. N. I. S.

I. N.