

antea in aqua solutis. Denuo filtra et colaturae adde

Acidi tannici 80,0

antea in aqua soluta. Praecipitatum inde exortum in filtro collige et admixtis

Plumbi oxydati 50,0

Carbonis animalis 100,0,

exsiccata, dein

Spiritus V. rectfss. q. s.

massam siccam exhauri. Liquor spirituosus calore balnei aquae ad siccum evaporetur, quod remanet

Chloroformii q. s.

resolvendo. Solutio chloroformica ad evaporationem spontaneam reponatur. Massa neutralis inde remanens, speciei resinosa, odoris proprii et magnae amaritiei servetur. *Ph. Gall.*

Dosis: 0,001—0,002—0,003 ter quaterve per diem unum. *Dosis maxima:* 0,0025, pro die 0,01!! *Dosis subcutanea:* siphunculus $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ liq. 0,05: 10,0 aq.

Duboisinum.

Alkaloides herbae Duboisiae myoporoidis (in Australia indigena), Hyosiamino plane aequalis est. Duboisinum et Hyoscyaminum perfecte congruunt (*Ladenburg*).

Dulcamarinum.

Rp. Stiptum Dulcamarae recens siccatorum et minutim concisorum 1000,0

Spiritus V. rectfss. 6000,0.

Digere per 24 horas et ope preli exprime. Residuo affunde

Spiritus V. rectf. 3000,0

iterumque digere per 24 horas, tum exprime. Liquores sedimentando filtrandoque depurati destillent, donec Spiritus Vini elicitus fuerit. Fluidum aquosum remanens in patinam porcellaneam effunde et tamdiu calefac, interdum agitando, donec partes spirituosae plane avolaverint et pondus fluidi residui circiter Partes 30—40 exaequet, quibus perfecte refrigeratis admisce

Acidi tannici 5,0

vel q. s., antea in Aqua distillata solutum, quamdiu praecipitatum inde efficitur. Praecipitatum collectum et aqua frigida ablutum, adhuc humidum, commisceatur cum

Lithargyri praeparati 30,0

Carbonis puri veget. 10,0

Aquae destillatae 120,0.

Miscela digeratur per diem unum et saepius agitetur, tum calore balnei aquae ad siccum evaporetur. Residuo trito affunde

Spiritus V. rectfss. 100,0.

Digere et filtra. Extractio ope Spiritus hujus saepius repetatur, quamdiu aliquid solvitur. Tincturae mixtae, Spiritu maxima ex parte destillando elicito, leni calore ad siccum evaporentur et residuum conteratur. Efficitur 2,0. Sit pulvis ex albedo flavescens, saporis amari.

Elaeosaccharum.

Aetheroleosaccharum. Oleosaccharatum. *Oelzucker.*

Rp. Sacchari albissimi pulverati 2,0

Olei aetherei cujuslibet *Gutt.* 1.

Misceantur. *Ph. Germanica, Austriaca.*

Ph. Gall. Ol. aeth. 1,0, Sacchari 20,0.

Ph. Suec., Neerland. Ol. aeth. *P.* 1,

Sacch. *P.* 50 vel *gutt.* 2: Sacch. 3,0.

Ph. Dan. 1: 49.

Elaeosaccharum Crotonis Olei.

Rp. Olei Crotonis *Gutt.* 2

Elaeosacchari Cinnamomi 10,0.

M. exacte.

Elaeosaccharum Flavedinis Citri.

Rp. Fructum Citri integrum recentem.

Atteratur ad Sacchari albi frustum idoneum, donec ejus superficies oleo aethereo satis imbuta fuerit, quae cultro abrasa in mortario lapideo tepidifacito in pulverem aequabilem trita servetur in lagenae obturata.

Ph. Gall. Fruct. Citri unus et Sacchari frustum ponderis 10,0.

Pari modo paratur

Elaeosaccharum (Flavedinis) Aurantii.

Elaeosaccharum Vanillae.

Saccharum Vanillae.

Rp. Vanillae minutim conc. 1,0

Sacchari lactis 2,5

Sacchari albi 7,5.

Optime contrita per cribrum trajiciantur et in lagena clausa servantur.

Ph. Germanica: Vanillae P. 1 et Sacchari optimi P. 9. Sit pulvis ex albo griseus.

Elaterina.

Elaterinum. Momordicinum.

$C_{20}H_{25}O_5 - C^{40}H^{20}O^{10} = 348.$

Rp. Extracti Elaterii P. 10

Lithargyri praep. P. 1

Aquae destill. P. 30.

In lagenam immissae digerantur per diem unum et saepius agitentur. Tum loco frigido per aliquod tempus seponere. Sedimentum exortum in filtro collige, aqua frigida bene ablue et admixta Carbonis pulverati vegetabilis Parte una, calore balnei vaporis exsiccata. Residuum pulveratum affundenda et digerendo ope Spiritus Vini alcoholisati et filtrando bene elixivetur. Tincturae obtentae commixtae, Spiritu Vini maxima ex parte destillando elicito, cum Aqua destillata commisceantur. Praecipitatum inde exortum aqua et dein Aethere puro abluatur et iterum calore adjuvante in Spiritu Vini alcoholisati justa quantitate solutum loco tepido seponatur, ut evaporatione spontanea in crystallula abeat. Sint crystallula peramara decoloria, in Spiritu Vini frigidi P. 5, ejusdem fervidi P. 2, non in aqua solubilia.

Drasticum et diureticum (in morbo Brightii), quod in pilulis detur. *Dosis:* 0,003—0,004—0,006! bis terve per diem unum, pro die 0,03!

Elaterium (Anglicum).

Extractum Elaterii Anglicum. Elaterium album.

Sedimentum succi fructuum Momordicae Elaterii L. Fructus ante maturitatem collecti, in longitudinem dissecti leniter exprimantur et succus inde obtentus ac per cribrum setaceum fusus ad sedimentationem reponatur. Liquore claro decanthato, sedimentum in colatorio linteo colligatur et tegulis porosis impositum siccetur. Liquor decanthatus seponendo aliquantulum sedimenti amplius demittit, quod eodem modo colligatur ac siccetur.

Sit massa levis, e subviridi grisea, saporis acris atque amari, in fractura tenerius granulata, cum Acidis non effervescens, plerumque in placentis paulum curvatis, Cfm. duo crassis. Drasticum vehemens. *Dosis:* 0,005—0,01—0,015. *Dosis maxima* 0,1, pro die 0,3 (obstructio alvi, hydrops, apoplexia, mania). Personis infirmis ne detur.

Elaterium nigrum.

Succus inspissatus fructuum ante maturitatem collectorum. Sit spissitudine extracti pultiformis, coloris fuscii. *Dosis maxima* 0,1, pro die 0,3!!

Elaylum chloratum.

Elayle chlorata. Chloruretum Elayli. Aethylenum chloratum. Oleum Chemieorum Hollandicorum. Liquor Hollandicus.

Aether anaestheticus Arani. Dutch liquid.

$CH_2Cl \cdot CH_2Cl - C^4H^1Cl^2 = 99.$

Rp. Acidi sulfurici conc. Angl. P. 12.

Caute admisce

Spiritus Vini rectifss. P. 3.

Miscelam hanc acidam immitte cum arenae elotae et siccatae ea quantitate, ut massa pultiformis exhibeatur, in cucurbitam vitream ad partem dimidiam replendam. Cucurbita in balneo arenae sit collocata et ope epistomii perforati tubo vitreo curvato ita instructa, ut hic tubus cucurbitam cum lagena, quae liquorem Kali caustici dilutum continet, jungat. Haec lagena cum altera lagena Acidum sulfuricum concentratum continente eadem ratione sit conjuncta. Gas, quod evoluitur per liquores in illis lagenis perducatur, tum in

Liquoris Stibii chlorati concentrati P. 20

gasi Chlori introducto saturatas et inter operationem gase Chlori saturandas introduceatur.

Excipulum, quod liquorem Stibii chlorati continet, iterum aequali modo cum lagena parva bitubulata, ut lege artis opereris, conjungere potes. Haec lagena parva contineat parvam quantitatem

Liquoris Stibii chlorati

et sit instructa tubo vitreo aperto.

Itaque apparatus totus constat e

I. cucurbita cum mixtura e Spiritu et Acido sulfurico facta,

II. lagena cum liquore alkalino,

III. lagena cum Acido sulfurico,

IV. excipulo cum Liquore Stibii chlorati, in quem gas elaylicum et gas Chlori una inducuntur,

V. lagena ultima,

quae omnia vasa ratione apparatus Woulfiani conjuncta sunt. Optime operaberis, si vasa I, III, IV tubis securitatis muniveris.

Excipulum et lagenas lavatorias bene refrigeres.

Juncturis omnibus luto et vesica humectata bene clausis, calore sensim aucto primum gasis elaylici, paulo post gasis Chlori evolutio efficiatur, quamdiu gasa evoluta Liquore Stibii absorbentur. Cave ne Gas per juncturas perrumpat, neve admoveas flammam.

Liquor Stibii chlorati gasis illis plane saturatus tum destillationi e balneo vaporis subjiciatur, quamdiu fluidum aqua gravius prodit, quod eodem modo quo Chloroformium ab aqua, acido etc. adhaerente liberetur. Servetur in lagenis vitreis obturatis a luce remotis.

Sit liquor limpidus, coloris expers, odoris saporisque grati dulcioris, ab acido et aqua plane liber, calore 35° C. ebulliens. P. spec. = 1,26 - 1,27.

Usus: uti Chloroformium.

Ne permutetur Aethylideno chlorato!

Electuarium anthelminthicum

(Ph. Bad.).

- Rp. Radicis Filicis maris
Radicis Valerianae
Florum Cinae
Kali sulfurici aa 2,5
Aquae destill. 10,0
Mellis 20,0.

Misce pulveres cum aqua et postremo cum melle. Paretur, quoties usus poscit.

Electuarium anthelminthicum

Hufelandi Ph. paup.

- Rp. Radicis Valerianae 3,0
Radicis Jalapae 2,0
Florum Cinae 8,0
Kali tartarici 4,0.

Pulveratis commixtisque admisce Oxymellis scillitici 12,0
Syrupi communis q. s. (20,0),
ut fiat electuarium.

Electuarium anthelminthicum

Sellii.

- Rp. Florum Cinae 7,5

Ferri sulfurici cryst.

Extracti Chinae aa 2,0.

Pulveratis admisce

Syrupi Cinnamomi q. s.,

ut fiat electuarium. Ter de die cochlear thearium.

Elect. anth. Rosensteini.

- Rp. Flor. Cinae pulv. 1,0

Ferri sulfurici 0,2

Tuber. Jalapae pulv. 1,2

Mellis despumati 2,5.

Misce. Dosis una, quae post dies duos, si opus fuerit, denuo adhibeatur. Infantibus dosis triens vel dimidia.

Elect. anth. Störkii.

Elect. Seminis Cinae comp.

- Rp. Florum Cinae P. 4

Radicis Valerianae

Radicis Jalapae aa P. 1

Kali sulfurici P. 2.

Pulveratis admisce

Oxymellis scillitici P. 20.

Signa: ter de die cochlear thearium.

Electuarium anticachecticum Wardii.

Confectio s. Electuarium Piperis.
Wards Paste.

- Rp. Piperis nigri
Radicis Helenii aa P. 1
Fructuum Foeniculi P. 3
Sacchari albi P. 2
Mellis depur. P. 20 vel q. s.
M. l. a. ut fiat electuarium.

- Rp. Piperis nigri 10,0

Fructuum Carvi 15,0.

Subtillissime pulverata misce cum

Mellis depurati 75,0.

Ph. Brit.

Electuarium antifebrile.Electuarium febrifugum. *Fieberlatwerge.*

- Rp. Corticis Chinae reg. 10,0
 Conchinini tannici 5,0
 Magnesia subcarbonica 0,5
 Pulveris aromatici 3,0
 Ammonii muriatici 1,0
 Succı Sambuci insp. 15,0
 Syrupi communis 40,0.

M. f. elect.

Dosis: quater vel quinquies per diem cochlear parvum vel thearium.

Elect. febrifugum infantum.

- Rp. Conchinini tannici 5,0
 Magnes. subcarbon. 0,5
 Elaeosacch. Citri 2,0
 Rad. Liquiritiae pulv. 1,0
 — Rheı pulv. 2,0
 Sacchari albi pulv. 15,0
 Syrupi Sacchari 40,0.

M. *Dosis:* Infanti parvo cochlear parvum ter quaterve per diem, infanto majori cochlearia parva duo ter quaterve per diem (febris intermittens).

Electuarium antinephriticum.

- Rp. Terebinthinae laricinae 5,0
 Olei Amygdalar. 50,0
 Calcariae carb. praec. 20,0
 Succı Juniperi inspissati 120,0.

Misce exactissime. *Dosis:* quater et saepius per diem cochlear parvum (in nephritide chronica).

Electuarium aperiens.

- Rp. Foliorum Sennae pulv. 5,0
 Tartari depurati 2,5
 Pulpae Tamarind. 10,0
 Syrupi Mannae 20,0.
 Terendo commisceantur. Aperitivum.

Electuarium aromaticum elegans.

s. stomachicum.

- Rp. Pulveris aromatici
 Rhizomatis Zingiberis
 Herbae Salviae pulv.

Elaeosacch. Menth. pip.

Ossae Sepiae pp. aa \widehat{P} .

Mellis depurati q. s.

M. f. electuarium. Tonicum, egersimon.

Electuarium aromaticum

Ph. Austriacae.

- Rp. Fol. Menthae pip.
 — Salviae aa 10,0
 Rad. Angelicae
 — Zingiberis aa 2,0
 Cort. Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Sem. Myristicae aa 1,0.

In pulverem redactis admisce Mellis depurati q. s., ut calore balnei aquae l. a. fiat electuarium. Tonicum, egersimon.

Electuarium aromaticum**Raleighi**

Confectio aromatica s. Raleighiana s. cardiaca *Ph. Lond.*

- Rp. Cassiae cinnamom.
 Nucum moschat. aa 2,0
 Caryophyllorum 1,0
 Cardamomi 0,5
 Croci 2,0
 Cretae praep. 15,0
 Sacchari 25,0.

Pulverata commisceantur cum Aquae calidae q. s., ut fiat electuarium.

Electuarium balsamicum**Bodartii.**

Electuarium antigonorrhoeicum. *Opiat balsamique de Bodart.*

- Rp. Olei Amygdalarum
 Cerae flavae aa 30,0.
 Calore balnei aquae colliguatis inter agitationem admisce mixturam, quae conterendo leni calore effecta est ex
 Aluminis subt. pulv. 3,0
 Cubearum pulv. 10,0
 Balsami Copaivae 70,0
 Terebinthinae Venetae 10,0
 Balsami Peruviani 5,0
 Olei Anisi 2,0.

Tum agita, donec massa mixta refrige-

rata sit. — *Dosis*: Quotidie ter quaterve quantitas ad modum nucis avelanae, in azymum involuta, porrigatur contra affectiones catarrhales blennorrhoeicas membranarum mucosarum, praecipue contra catarrhum chronicum, cystitidem chronicam, leucorrhoeam.

Electuarium adstringens Vogtii.

Rp. Balsami Copaivae 15,0
Vitellum ovi unius
Cubebae pulv. 15,0
Conservae Rosae 15,0.

Misce.

Electuarium e Carne.

Marmelade de viande.
Conserve de Damas.

Rp. Carnis taurinae 100,0.
Concisa et contundendo in pulvem teneram redacta misceantur cum
Salis culinaris 2,0
Tragacanthae pulv. 1,0
Aquae destill. fervid. 50,0.
Misce, ut fiat puls mollior.

Electuarium Catechu (compositum).

Diascordium Fracastorii. Elect. Catechu *Ph. Neerl.* Elect. Japonicum.

Rp. Catechu pulv. 20,0
Cassiae cinnamom. pulv. 2,5
Nucis moschat. pulv. 2,0
Opii pulv. 0,5
Syrupi s. Mellis Rosae 75,0.

M. f. electuarium. *Ph. Belg.*

Dos.: 5,0—10,0—15,0 bis terve per diem (diarrhoea atonica).

Ph. Neerl. Catechu 21, Kino 16, Cinn. Cass., Nuc. mosch. ana 5, Opii 1. Pulverata misce c. Syrupi simpl. 144.

Electuarium catholicum.

Electuarium Rhei compositum. Catholicum duplicatum cum Rhero.

Rp. Radicis Liquiritiae
Radicis Rhei
Foliorum Sennae aa 5,0
Sacchari albi 40,0
Seminum Foeniculi 2,5.
Subtilissime pulveratis admisce
Pulpae Tamarind. 10,0
Syrupi Sacchari q. s.,

ut fiat electuarium, quod calore balnei aquae calefactum, tum refrigeratum et agitatum asserves.

Electuarium Copaivae compositum.

Opiatum cum Copahu compositum.
Opiat de Copahu composé.

Rp. Balsami Copaivae 100,0
Cubebae pulv. 150,0
Catechu pulv. 50,0
Olei Menth. pip. 3,0.

Balsamo cum Catechu bene mixto terendo addantur Cubebae et oleum aethereum, ut fiat electuarium. *Ph. Gall.*

Electuarium Croci compositum.

Electuaire de Safran composé. Confection d'Hyacinthe.

Rp. Terrae sigillatae praep.
Lapidum Cancrorum praep.
aa 8,0

Corticis Cinnamomi 3,0
Herbae Origani Cretici
Ligni Santali citrini
Ligni Santali rubri
Myrrhae aa 1,0.

Misceantur et in pulverem subtilissimum redigantur. Tum recipe

Mellis albi 24,0 (25,0)
Syrupi simplicis 48,0 (50,0).

Leni calore commixtis et paululum refrigeratis adde

Croci pulverati 1,0.

Macera per horas duodecim, tum admisce pulverem antea compositum.

Ph. Gall. Loco syrui simplicis Syrupus Dianthi Caryophylli rubri petalorum adhibetur.

Electuarium dentifricium.

Electuarium gingivale. *Zahnlutwerge.*

Rp. Lapidis Pumicis 10,0
Tartari depurati 20,0
Concharum 50,0
Myrrhae
Radicis Iridis Florent.
Aluminis usti
Coccionellae aa 5,0.

Subtilissime pulverata commisce cum
 Olei Caryophyllor. 0,5
 Mellis despumati 100,0
 Glycerinae q. s.
 Fiat l. a. elect.

Elect. dentifricium *Ph. Gall.*
Opiat dentifrice.

Rp. Kali bitartarici
 Sacchari lactis \widehat{aa} 50,0
 Carmini rubri 0,1
 Olei Menth. pip. 0,25.
 Conterendo in pulverem subtilissi-
 mum redacta commisce cum
 Mellis albi 75,0
 Glycerinae 25,0.
Ph. Gall.

Electuarium dentifri- cium roborans.

Rp. Corticis Chinae fusci 25,0
 Myrrhae 5,0
 Sanguinis Draconis 2,5
 Cassiae cinnamom. 2,0.
 Subtilissime pulveratis admisce
 Olei Citri cort.
 Olei Cassiae cinnam.
 Olei Caryophyllor. \widehat{aa} *Gutt.* 5
 Spiritus V. rectfss. 5,0
 Mellis rosati 50,0
 Glycerinae q. s.,
 ut fiat electuarium. Mane utatur.

Electuarium Diaphaenix.

Diaphaenix.

Rp. Amygdalarum dulc. deglu-
 ptarum *P.* 112.
 Ope Mucilaginis Gummi Arabici q. s.
 contundendo praeparatae commiscean-
 tur cum miscela pulvereae parata e
 Radicis Zingiberis
 Piperis nigri
 Cassiae cinnam.
 Seminis Foeniculi
 Macidis \widehat{aa} *P.* 8
 Radicis Jalapae *P.* 90
 Scammonii *P.* 50
 Sacchari *P.* 500 et

Mellis depurati *P.* 1000 vel q. s.,
 ut fiat electuarium.
 Purgativum. *Dosis:* 5,0—10,0—15,0.

Electuarium Diascor- dium.

Electuarium Scordii. Elect. adstringens
 opiatum. Diascordium.

Rp. Radicis Tormentillae
 Corticis Cassiae cinnamom.
 Conchinini tannici
 Florum Rosae
 Boli Armenae \widehat{aa} 20,0
 Opii puri 2,0
 Radicis Zingiberis
 Catechu \widehat{aa} 5,0.
 Subtilissime pulveratis admisce
 Mellis rosati q. s.,
 ut massa electuarii tota exaequet Par-
 tes 400,0.

Dosis: in diarrhoeis catarrhalibus 4,0
 —6,0—10,0 ter quaterve per diem unum.

Rp. Herbae Scordii *P.* 60
 Florum Rosae rubrae
 Rhizomatis Bistortae
 Radicis Gentianae
 Radicis Tormentillae
 Herbae Origani Cretici
 Seminis Berberidis
 Benzoës in lacrimis
 Galbani
 Gummi Arabici \widehat{aa} *P.* 20
 Rhizomatis Zingiberis
 Piperis longi \widehat{aa} *P.* 10
 Corticis Cinnam. Ceyl. *P.* 40
 Boli Armenae *P.* 80
 Extracti Opii *P.* 10
 Melliti rosati *P.* 1300
 Vini Malacensis *P.* 200.

Mellito rosato ad *P.* 100 remanentes
 evaporando redacto et adhuc calido
 primo Extractum Opii in Vino solutum
 addatur, dein ceterae species subtilis-
 sime pulveratae sensim admisceantur.
 Grammata singula contineant Milli-
 grammata 6 Extracti Opii. *Ph. Gall.*

Electuarium contra haemoptoën.

Rp. Kali nitrici 10,0

Boli Armenae 2,5
 Conservae Rosae 10,0
 Syrupi simpl. q. s.
 M. l. a., ut f. elect.

**Electuarium Hospitii
 Chelseani.**

Electuarium antirheumaticum. *Chelsea
 pensioner's electuary.*

Rp. Resinae Guajaci 0,5
 Radicis Rhei 1,0
 Tartari depurati 3,0
 Florum Sulfuris 6,0
 Nucis moschat. 0,5
 Mellis 50,0.

M. f. l. a. electuarium.

**Electuarium lenitivium
 Wintheri.**

Rp. Syrupi mannati 100,0
 Acidi citric. cryst. 2,0
 Pulpae Tamarindorum 33,0
 Foliorum Sennae pulv.
 Tartari depur. aa 15,0.

M.

**Electuarium mundi-
 ficans.**

Elect. Sarsaparillae comp. Elect. mun-
 dificans Werlhofii. *Blutreinigende
 Latwerge.*

Rp. Radicis Sarsaparill. 30,0
 Ligni Guajaci 10,0
 Foliorum Sennae 5,0
 Radicis Rhei 2,5
 Corticis Sassafras
 Seminis Anisi aa 1,25.
 Pulverata misce cum
 Mellis despumati 100,0.

**Electuarium mundificans
 Himlyi.**

Rp. Radicis Imperatoriae
 Ligni Guajaci
 Foliorum Sennae aa 2,0
 Baccarum Juniperi
 Corticis Ligni Sassafras
 Radicis Jalapae
 Radicis Enulae aa 1,0
 Seminis Anisi 0,5.

Pulverata commisce cum
 Mellis depurati 36,0.

Dosis: Quotidie ter cochlear minus.

**Electuarium Myrrhae
 compositum.**

Elect. odonticum roborans.

Rp. Myrrhae
 Sanguinis Draconis
 Catechu aa 3,5
 Saponis Hispanici
 Caryophyllorum
 Mellis aa 10,0
 Spiritus V. rectf. q. s.
 M. f. l. a. electuarium.

**Electuarium Neapoli-
 tanum.**

Rp. Calomelanos 5,0
 Radicis Jalapae
 Radicis Rhei
 Foliorum Sennae aa 10,0
 Scammonii 2,0
 Resinae Guajaci
 Radicis Sarsaparillae
 Radicis Chinae aa 20,0
 Mellis rosati q. s.
 M., ut fiat electuarium. (Ex tempore.)

Opiat de Guerrero.

Rp. Radicis Sarsaparillae 25,0
 Radicis Jalapae 12,5
 Foliorum Sennae
 Resinae Guajaci aa 6,0
 Scammonii 9,0
 Caryophyllorum 1,5
 Mellis q. s.
 M., ut fiat electuarium.

Electuarium Opii.

Confectio Opii.

Rp. Pulveris aromatici P. 15
 Mellis depurati P. 30
 Opii pulverati P. 1.
 Miscé.
Dosis: 1,5—2,0—4,0. *Dos. maxima*:
 5,0, pro die 20,0. (Diarrhoea.)
Ph. Brit. Pulv. Opii comp. 10,0,
 Syrupi Sacch. 30,0.

Electuarium Scammonii.

Confectio Scammonii.

- Rp. Scammonii 10,0
 Olei Caryophyllorum 0,25
 Radicis Zingiberis 5,0
 Olei Carvi 0,5
 Syrupi Sacchari 10,0
 Mellis despumati 5,0.
 M. f. electuarium. (*Ph. Brit.*)
 Dosis drastica 0,6—1,0—2,0!!

Electuarium e Senna

s. lenitivium.

(Confectio Sennae.)

- Rp. Foliorum Sennae 100,0.
 Mixtis adde
 Syrupi simplicis 400,0
 Pulpae Tamarind. dep. 500,0.
 Calore balnei vaporis fiat electuarium spissum, quod loco frigido et sicco servetur. *Ph. Germanica.*
 Dosis: 3,0—6,0—10,0.
 Rp. Pulpae Prunorum 200,0
 — Tamarind. depurat.
 Roob Sambuci aa 100,0
 Fol. Sennae pulv.
 Kalii hydrotartarici aa 50,0
 Mellis depurati q. s.
 Fiat calore balnei aquae electuarium. Loco frigido et sicco serva. *Ph. Austr.*
Ph. Brit. Fol. Senn. 7, Sem. Coriandri 3, Caricar., Pulp. Cass. ana 9, Prunorum 6, Extr. Liquirit. 1, Sacch. 30, Aquae 75.

Electuarium e Senna

ad usum mercatorium.

- Rp. Fol. Sennae Alex. subt. pulv. 100,0
 Pulpae Tamarind. 500,0
 Glycerinae purae
 Sacchari amylacei aa 100,0
 Syrupi Sacchari q. s.
 M. f. electuarium.

Electuarium sinapinum.Mostardum. *Moutarde. Mostrich.*

- Rp. Seminum Erucae P. 80
 [1] Seminum Sinapis P. 100
 Fructus Amomi P. 10

Cassiae cinnam. P. 2

Caryophyllorum P. 1

Salis culinaris P. 20

Sacchari albi P. 100.

Subtiliter pulveratis admisce

Farinae secalinae P. 60

Glycerinae P. 100

Aceti Vini q. s.,

ut fiat electuarium molle.

Rp. Seminum Erucae

[2] Seminum Sinapis

Sacchari albi

Farinae secalinae

Glycerinae aa P. 5

Salis culinaris P. 1

Aceti Vini q. s.

M. ut f. electuarium molle.

Electuarium stomachicum (Helvetii).*Opiat aphrodisiaque.*

- Rp. Tincturae Zingiberis P. 100
 — Caryophyll. P. 40
 — aromaticae P. 50
 — Cinnamomi P. 60
 Olei Citri P. 1
 — Cinnamomi P. 3
 Syrupi Sacchari P. 500.

Mixtae agitataeque leniore calore ad P. 500 remanentes evaporentur, quibus admisceantur

Extracti Cascarillae

— Cort. Aurantii aa P. 10

Electuarii Theriacae P. 100.

Dosis: Quotidie ter cochlear theaurium.

Electuarium Sulfuris.Confectio Sulfuris *Ph. Brit.*

- Rp. Sulfuris sublimati 40,0
 Kali bitartarici 10,0
 Syrupi Cort. Aurantii 40,0
 Tragacanthae pulv. 0,4.
 M. Dosis: 3,0—6,0—9,0 bis per diem (leniens haemorrhoidariorum).

Electuarium Tamarindorum

Fulleri.

- Rp. Pulpae Tamarindorum

Sacchari pulv. \widehat{aa} P. 15
 Foliorum Sennae pulv. P. 5
 Tartari depurati P. 1
 Mannae P. 25
 Aquae fervidae P. 50.

Manna in aqua solvatur et liquor coletur, tum ceterae partes admisceantur, ut calore leni electuarium fiat.

Electuarium Terebinthinae.

Confectio Terebinthinae *Ph. Brit.*

Rp. Olei Terebinthinae P. 10
 Radicis Liquirit. pulv. P. 12
 Mellis despumati P. 24.

M. f. elect. (*Ph. Brit.*)

Dosis: 3,0—4,0—8,0 bis terve de die (cystitis, hydrops, haemoptoë, gonorrhoea).

Electuarium Theriaca.

Theriacum. Elect. anodynum. Elect. aromaticum c. Opio. Elect. opiatum.

Rp. Opii puri P. 1
 Radicis Angelicae P. 5
 — Serpentar. Virg. P. 4
 — Valerianae
 — Scillae
 — Zedoariae, \widehat{aa} P. 2

Cassiae cinnam. P. 10

Cardamomi minoris

Myrrhae

Ferri sulfurici cryst.

Caryophyllorum \widehat{aa} P. 1.

Subtiliter pulveratae misce cum

Glycerinae P. 20

Syrupi Sacchari

Mellis depurati \widehat{aa} P. 25.

Nota. Partes 100 continent P. 1 Opii.

Theriaca, *Treacle*, (*Ph. Brit.*) ab Anglis Syrupus communis nominatur, Theriaca Anglorum cum Electuario Theriaca ne commutetur.

Electuarium Tronchini.

Marmelade de Tronchin.

Rp. Mannae electae
 Syrupi Violarum
 Olei Amygdal. dulc. \widehat{aa} P. 30
 Pulpae Cassiae P. 8

Aquae Naphae P. 5.

M. l. a. Quaque hora cochlear minus contra affectiones catharrhales.

Electuarium Zanetti.

Marmelade de Zanetti.

Rp. Mannae canellat. 12,5
 Syrupi Althaeae 10,0
 Pulpae Cassiae 6,0
 Olei Amygdalar. 6,0
 Butyri Cacao 3,0
 Stibii sulfurati rubei 0,05
 Aquae Flor. Aurant. 3,0.
 M., ut fiat elect. Anticatarrhale.

Elixir Acidi salicylici.

Salicylelixir.

Rp. Acidi salicylici 10,0
 Kalii citrici 20,0
 Glycerinae purae 40,0
 Olei Aurantii corticis 0,3
 Spiritus Vini
 Aquae destillatae \widehat{aa} 15,0.

Macerando agitandoque solutio efficiatur, tum filtratur. Partes decem contineant partem unam Acidi salicylici.

Elixir acidum.

Elixir acidum Halleri. Elixir acidum Dippelii. Acidum Halleri. Aqua Rabelii. Mixture sulfurica acida. Acidum sulfuricum alcoholisatum. Sulfas aethylicus acidus cum Alcoholo *Ph. Neerl.* Liquor acidus Halleri. *Haller'sches Sauer.*

Rp. Spiritus Vini rectfss. P. 3.

Paullatim instilla

Acidi sulfurici rectf. P. 1.

Serva in vase epistomio vitreo munito. Pond. spec. 0,998—1002.

Dosis: 0,2—0,5—1,0 cum aq. saccharat. *Ph. Gall.* praecipit, ut ad 100,0 mixture 1,0 florum vel petalorum Rhoeados addatur, per dies quatuor maceatur, tum filtratur.

Elixir acidum rubrum.

Tinctura antiscorbutica rubra.

Rp. Spiritus Vini rectfss. P. 60
 Acidi sulfurici rectf. P. 15
 Coccionellarum pulv. P. 1.
 Misc. digere et filtra.

Elixir adjuvans.*Kraftelixir.*

- Rp. Corticis Aurantii 50,0
 Corticis Pruni Virginianae
 (Cerasi serotinae) 100,0
 Radicis Liquiritiae 200,0
 Fructus Coriandri
 Fructus Carvi \widehat{aa} 25,0
 Spiritus Vini 1500,0
 Aquae destillatae 1000,0
 Syrupi Sacchari 2000,0.

Digere et colaturam exprimendo collectam filtra. *Nat. Form.*

Elixir ad longam Vitam.

Tinctura Aloës composita. Elixir amarum Hjaeneri. Elixir sacrum. Elixir Suecicum. Elixir Jernitzii. Guttae Jenenses.

- Rp. Aloës P. 5
 Myrrhae
 Radicis Rhei
 — Gentianae
 Rhizomatis Zedoariae
 — Galangae
 Boleti Laricis
 Croci \widehat{aa} P. 1
 Electuarii Theriacae P. 2
 Sacchari albi P. 20.
 Concisis et contusis affunde
 Spiritus V. rectfss. P. 100
 Aquae destill. P. 50.
 Digere etc. *Dos.*: Cochlear thearium dimidium vel unum pl. p. d.

Tinctura Aloës composita
Ph. Germanicae.

Loco Elixirii ad longam vitam.

- Rp. Aloës P. 9
 Radicis Gentianae
 Radicis Rhei
 Rhizomatis Zedoariae
 Croci
 Fungi Laricis \widehat{aa} P. 1
 Spiritus Vini rectf. P. 200.
 Digerendo fiat tinctura.
Ph. Gall. Receptum idem, nisi quod Aloës P. 8 et Spiritus (60%) P. 400 sumendae sint.
Elixir Audin-Rouvière paretur solvendo Extracti Absinthii 1,0 in Aquae

10,0, quae solutio cum Elixirii ad longam vitam 30,0 commisceatur, tum filtratur.

Elixir aloëtico-febrifugum Recamieri.

- Rp. Aloës
 Myrrhae grosse pulv. \widehat{aa} 1,0
 Aquae destillatae
 Spiritus V. rectf. \widehat{aa} 45,0.
 Digere per diem unum, tum filtra.
 Tincturae limpidae adde
 Chinini sulfurici 3,0
 Acidi sulfurici diluti 2,0
 Tincturae Opii crocatae 1,0
 et misce.

Elixir amarum.*Bitterelixir.*

- Rp. Extracti Absinthii 10,0
 Elaeosacch. Menth. pip. 5,0.
 Solve in
 Aquae destill. 20,0
 Glycerinae 5,0.
 Tum admisce
 Tinct. aromaticae
 Tinct. amarae \widehat{aa} 5,0.
 Sit liquor paulum turbidus. Stomachicum. *Dosis*: Gutt. 30—60.

Elixir Americanum.*Elixir américain de Courcelles.*

- Rp. Radicis Helenii P. 80
 Foliorum Aurant. P. 40
 Florum Sambuci P. 30
 Florum Tiliae P. 20
 Baccarum Juniperi
 Herbae Rorismarini
 Opii \widehat{aa} P. 15
 Radicis Asari P. 10
 Spiritus V. rectfss. P. 1200
 Aquae P. 600.
 Maceratione f. l. a. elixirium. *Dos.*: cochlear parvum ter quaterve per diem (diarrhoea, spasma).

Elixir ammoniato-opiatum.

- Pp. Elixirii e Succo Liquiritiae 100,0
 Tincturae Opii crocatae 2,5.

M. Gramma unum mixtionis continet solubile ex Opii Grm. 0,0025.

Dos.: 3,0—6,0—10,0 bis terve per diem (tussis convulsiva, hypochondriaca, spastica).

Elixir Ammonii bromati.

Elixir Ammonii Bromidi.

Rp. Ammonii bromati 25,0

Acidi citrici 1,5

Elixiris adjuvantis 225,0.

Macerando agitandoque solutio efficitur. *Nat. Form.*

Elixir antapoplecticum Jacobinorum.

Rp. Tincturae amarae

— aromaticae \widehat{aa} P. 500

— Angelicae

— Aloës \widehat{aa} P. 20

Succi Liquiritiae

Aquae Rosae \widehat{aa} P. 10

— Cinnamomi P. 200

Olei bacc. Juniperi

— Anisi \widehat{aa} P. 2.

Misce, sepone, filtra.

Elixir antarthriticum.

Pp. Extracti Trifolii 5,0.

Solutis in

Aquae destill. 5,0

addantur

Tincturae amarae 30,0

Elixiris acidi Halleri

Aquae destill. \widehat{aa} 5,0

antea commixta.

Dosis: Guttae 30—60 saepius per diem unum.

Elixir antarthriticum Caraïbacorum.

Ratafia des Caraïbes. Tinctura Emerigonis.

Rp. Spiritus Sacchari Indici P. 15

Tincturae Guajaci ligni P. 1.

M.

Elixir antarthriticum Herlikoferi.

Rp. Tincturae Colchici seminis

Spiritus Vini rectific. \widehat{aa} 10,0.

M. *Dosis*: Guttae 15—25—35 ter quaterve per diem unum.

Elixir antasthmaticum Aaskowii.

Essentia s. Tinctura Digitalis composita s. rubra. *Aaskov's Draaber.*

Rp. Foliorum Digitalis P. 5

Radice Liquiritiae P. 10

Ligni Santali rubri P. 1

Spiritus V. rectif.

Aquae Foeniculi \widehat{aa} P. 25.

Digere et filtra. *Dosis*: Guttae

15—20—25 ter quaterve per diem unum.

Ph. Dan. Fol. Digit. 2, Rd. Liquir.

4, Ligni Sant. rubr. 1, Sp. V. rectif.,

Aq. Foenic. \widehat{aa} 10.

Elixir antasthmaticum Aubréci.

Rp. Radicis Senegae 10,0

Aquae destill. 350,0.

Ebulliant per aliquot momenta horae.

In colaturae 300,0 solvantur

Kalii jodati 30,0

Extracti Opii 1,5.

Tum admisce

Syrupi Sacchari 500,0

Spiritus V. rectif. 150,0

Tincturae Coccionellae q. s.,

ut mixtura colorem e rubro violaceum

induat. Mixtura dividatur in sex partes

aequales. Pars una cedatur.

Dosis: Primo cochlear dimidium, postea cochlear unum ter per diem cum massae cacaotinae aliquantulo sumatur.

Elixir antasthmaticum Boerhavii.

Rp. Radicis Enulae

— Calami \widehat{aa} 10,0

— Irid. Florent. 3,0

— Asari 2,0

Seminis Anisi vulg. 3,0

Succi Liquiritiae 8,0

Camphorae 0,3

Spiritus Vini rectific. 300,0.

Macera per hebdomadem unam, saepius agita et exprimendo cola. Colatura filtretur.

Elixir antasthmaticum Lemorti.

Rp. Tincturae Opii benzoicae 80,0

Kali carbonici 2,5

Succi Liquirit. dep. 5,0
Syrupi simplicis 10,0.
Misce, agita, filtra.

**Elixir anticatarrhale
Hufelandi.**

Rp. Extracti Cardui bened. 6,0
Extracti Dulcamarae 2,0.

Solve in
Aquae Foeniculi 50,0
Aquae Amygdal. amar. conc.
6,0.

M. D. S. Quater quoque die guttae 60.

Elixir antiscrophulosum.
Tinctura Gentianae ammoniacalis.

Rp. Extracti Gentianae 5,0
Ammonii carbonici triti 1,0
Spiritus V. rectf. 100,0
Aquae 25,0.

Macera per diem unum, saepius agita
et filtra. *Dosis*: 4,0—5,0.

**Elixir antiscrophulosum
Perylhei.**

Tinctura Gentianae alkalina *Ph. Gall.*

Paretur eodem modo quo Elixir antecedens, nisi quod loco Ammonii carbonici Natrum carbonicum crystallisatum sumatur. *Dos.*: Cochlear parvum unum vel duo ter per diem.

Ph. Gall. Rd. Gentian. pulv. 10,0
Natri carbonici 3,0, Spiritus v. (60%)
300,0. Macera, exprime et filtra.

**Elixir aperitivum
Clauderi.**

Rp. Aloës
Myrrhae aa 10,0
Crocii 5,0
Kali carbonici 20,0.

Incisa et pulverata digerantur per
aliquot dies in

Aquae Sambuci 150,0
Spiritus V. rectfss. 20,0.

Tum seponere loco frigido et filtra.

Dos.: 2,0—4,0—6,0 bis terve per diem.

**Elixir aperitivum
Ph. paup. (s. Hufelandi).**

Rp. Aloës
Myrrhae pulveratae
Resinae Guajaci aa 5,0.

Hager.

Grosso modo pulveratis adde
Radiciis Rhei conc. 5,0
Crocii conc. 2,5
Kali carbonici
Ammonii muriatici aa 10,0
Spiritus Cochleariae 60,0
Aquae destill. 180,0.
Macera per aliquot dies, saepius
agita, tum cola.

Elixir aromaticum.
Alkermes liquidum Italarum.
Elixir kermesinum.

Rp. Cassiae cinnamomeae 10,0
[¹] Macidis 5,0
Caryophyllorum aromat. 2,5
Seminiis Myristicae 1,5.
Contusa superfundantur
Spiritus Vini rectfss. 1500,0
Aquae communis 2000,0.
Digerere per aliquot dies, tum destil-
lando elice 2000,0, quibus admisce
Aquae Rosae 1000,0
Syrupi Sacchari 1500,0
Tincturae Coccionell. 50,0.

Elixir aromatic. (Americanum).

Rp. Spiritus aromatici (Ameri-
[²] cani) 10,0
Syrupi Sacchari 15,0
Glycerinae purae
Aquae destillatae aa 7,5.
Misce et filtra, si mixtio turbida est.

Elixir Aurantii
Ph. U. St.

Elixir simplex. *Simple Elixir.*

Rp. Olei Aurant. cort. 1,0
Sacchari albi 100,0
Spiritus V. rectfss. 66,0
Aquae destill. 133,0.

Misce et solve l. a. Saccharum cum
Aqua dest. coquendo in syrupum tra-
ducatur. Mixturae pondus grammata
trecenta expleat.

**Elixir Aurantii com-
positum.**

Vinum Aurantium compositum. Vi-
num amarum. Elixir stomachicum.
Elixir viscerale Hoffmanni.

Rp. Flavedinis Cort. Aurant. 50,0

Cassiae cinnam. 10,0
 Kali carbonici 2,5
 Vini Hispanici 250,0.
 Mixtas macera per 8 dies. In colatura expressae 230,0 solve
 Extracti Gentianae
 — Absinthii
 — Trifolii fibr.
 — Cascarill. aa 5,0,
 dein sepone et filtra. *Ph. Germanica.*

Elixir Aurantii venale.

Elixir viscerale (s. temperatum s. balsamicum) Hoffmanni. Elixir stomachicum Viennense. *Vin amer alcoolisé.*

Rp. Tincturae Aurantii pomorum immaturorum
 Tincturae Cinnamom. aa 10,0
 Spiritus aetherei 5,0
 Spiritus V. rectf. 80,0
 Aquae Cinnam. vinosae 40,0
 Olei Citri cort.
 Olei Aurant. cort. aa 0,4.
 Mixtis adde miscelam paratam e
 Kali carbonici 2,5
 Extracti Absinthii
 Extracti Trifolii aa 5,0
 Aquae destill. 30,0.
 Macera, saepius agita, tum filtra.

Elixir balsamicum Werlhofii.

Pp. Corticis Chinae fusci
 Corticis Aurantii aa 50,0
 Myrrhae 10,0
 Croci 5,0
 Kali carbonici 15,0
 Vini Hispanici 600,0.
 Macera per aliquot dies. In colatura solve
 Extracti Gentianae
 — Cardui ben. aa 10,0.
 Post sedimentationem filtra.

Elixir Bismuthi.

Rp. Bismutho-Ammonii citrici 20,0.
 Solve in
 Aquae destillatae fervidae 40,0.

Tum sepone loco frigido per horam unam, deinde liquorem limpido decantha et sedimento sensim immisce

Liquoris Ammonii caustici (10%) q. s.,

donec solutio effecta fuerit. Hanc solutionem commisce cum liquore decanthato, tum adde

Elixiris aromatici (Americani) q. s.,

ut mixturae totae pondus 600,0 g expleat. Partes tricenaе contineant partem unam salis Bismuthi compositi.

Elixir carminativum Dalbyi.

Rp. Tincturae Opii simpl. 20,0
 — Asae foet. 10,0
 — Castor. Canad. 30,0
 Olei Carvi 5,0
 Olei Menth. pip. 10,0
 Magnesiae ustae 5,0
 Spiritus Vini rectfss. 100,0
 Syrupi Sacchari 150,0.
 Misce, sepone, decantha.

Mixtura carminativa.

Dalby's Carminative (Americ.).

Fp. Olei Menthae piperitae
 — Foeniculi
 — Carvi aa 0,2
 Magnesii subcarbonici 25,0
 Kali carbonici 1,5
 Syrupi Sacchari 100,0.
 Conterendo mixtis adde
 Aquae destillatae 364,0
 Tincturae Opii simplicis 12,5.
 Mixturae grammata dena (10) contineant 0,025 g Opii. Haec mixtura tantummodo ad usum paratur.

Elixir Cascarae Sagradae.

Rp. Extracti Cascarae Sagradae fluidi 20,0.

Solve in

Syrupi Sacchari 15,0

Aquae Cinnamomi 5,0

Spiritus Vini 2,5

Tinct. Aurant. cort. 5,0.

Dosis: 1,0—2,5—5,0 bis terve per diem (obstructio alvi habitualis).

Elixir catharticum compositum.

Rp. Extracti fluidi Sennae 60,0
 Extracti fluidi Podophylli 30,0
 Extracti fluidi Leptandrae
 Extracti fluidi Jalapae $\widehat{a}a$ 20,0
 Tartari natronati 60,0
 Natri bicarbonici 7,5
 Elixiris Taraxaci compositi 125,0
 Elixiris Glycyrrhizae 180,0.
 Misce fortiter agitando. *Dosis*: pro adulto 6,0—8,0 g. *Nat. Form.*

Elixir Chinae bismuthoferratum.

Elixir Cinchonae, Ferri et Bismuthi.
Elixir of Calisaya, Iron and Bismuth.
 Rp. Bismutho-Ammonii citrici 15,0.
 Solve in
 Aquae dest. fervidae 30,0,
 tum admisce
 Elixiris Chinae ferrati 955,0.
 Post aliquot dies per filtrum funde.

Elixir Chinae bismuthoferratum cum Strychnino.

Elixir Cinchonae, Ferri, Bismuthi et Strychninae.
 Rp. Bismutho-Ammonii citrici 15,0
 Strychnini sulfurici 0,15.
 Solve in
 Aquae dest. fervidae 30,0,
 tum adde
 Elixiris Chinae ferrati 955,0.
 Rp. Strychnini sulfurici 0,015.
 Solve agitando in
 Elixiris Chinae bismuthoferrati 100,0.
 Grammata decem contineant 0,0015 g Strychni sulfurici. *Nat. Form.*

Elixir Chinae detannatum.

Elixir Cinchonae detannatum. *Detannated Elixir of Calisaya.*
 Rp. Tincturae Chinae detannatae 10,0
 Spiritus aromatici Americani 8,0

Syrupi Sacchari 22,0.
 Misce. *Nat. Form.*

Elixir Chinae ferratopepsinatam.

Elixir of Calisaya, Iron and Pepsin.
 Rp. Pepsini concentrati 10,0
 Acidi hydrochlorici (25%) 15,0
 Glycerinae optimae
 Syrupi Sacchari
 Aquae destillatae $\widehat{a}a$ 60,0
 Elixiris Chinae ferrati 800,0.
 Mixta seponere interdum agitando per dies tres, tum per chartam bibulam filtra. *Nat. Form.*

Elixir Chinae ferratum.

Elixir Cinchonae et Ferri. *Elixir of Calisaya and Iron. Ferrated Elixir of Calisaya.*
 Rp. Ferri pyrophosphorici oxydati 15,0
 Ammonii citrici 10,0
 Glycerinae dilutae 30,0
 Elixiris Chinae detannati 450,0.

Seponere per quinque dies, saepius agitando, tum cola. *Nat. Form.*

Elixir Chinae ferratum cum Strychnino.

Elixir of Calisaya, Iron and Strychnine.
 Rp. Strychnini sulfurici 0,15.
 Solve in
 Elixiris Chinae ferrati 1000,0.
 Grammata decem contineant 0,0015 g Strychnini sulfurici. *Nat. Form.*

Elixir Chinini compositum.

Elixir Quininae compositum.
Compound Elixir of Quinine.
 Rp. Chinini sulfurici
 Conchinini sulfurici $\widehat{a}a$ 1,0.
 Solve agitando in
 Elix. aromatici Americ. 500,0.

Elixir Chinini ferratum.

Elixir Quininae et Phosphatum compositum *Nat. Form.*
 Rp. Chinini sulfurici 2,5
 15*

Ferri phosphorici oxydati 10,0
 Kalii citrici 11,0
 Syrupi Sacchari
 Glycerinae $\widehat{a}a$ 25,0
 Acidi citrici 1,5
 Elix. aromatici Americ. 525,0.
 Solve et misce.

Elixir Chloroformii compositum.

Rp. Chloroformii
 Tincturae Opii
 Spiritus camphorati
 — Ammonii aromatici
 — Vini $\widehat{a}a$ 20,0
 Olei Cassiae cinnamomeae 0,5.
 Misce. *Nat. Form.*

Elixir Cocae.

Elixir Foliorum Erythroxyli Cocae
Lamarckii.

Rp. Foliorum Cocae conc. P. 12
 Spiritus Vini rectif. P. 70.
 Digere per diem unum et exprimendo
 cola. Residuo ex expressione affunde
 Aquae communis P. 30.
 Coctione peracta, cola exprimendo.
 In colatura solve
 Sacchari albi P. 30,
 tum tincturam antea obtentam com-
 misce cum hoc syrupo. Partes 10 elix-
 iris continent solubile e P. 1 Foliorum
 Cocae.

Elixir Coffeini.

Elixir Coffeinae.

Rp. Coffeini 10,0
 Acidi hydrobromici diluti
 ($\frac{1}{10}$) 2,5
 Syrupi Coffeae 150,0
 Elix. aromatici Americ. 440,0.
 Misce et solve. Partes sexagenae
 contineant partem unam Coffeini.

Elixir Curassao.

Curacao Cordial.

Curacao. Rataffia Curassao Hollandica.
 Rp. Radicis Iridis Florentinae
 [1] pulveratae 2,0
 Acidi citrici 3,3
 Spiritus Curassao 10,0

Spiritus Vini (94%) 125,0
 Syrupi Sacchari 250,0
 Aquae destillatae 210,0.
 Mixta sepone per aliquot dies, in-
 terdum agitando, tum filtra.

Rp. Tincturae Aurantii corticis
 [2] Tincturae Aurantii promorum
 immaturorum $\widehat{a}a$ 100,0
 Olei Aurantii corticis 2,5
 Olei Aurantii florum 1,0
 Spiritus Vini
 Aquae destillatae
 Syrupi Sacchari $\widehat{a}a$ 1000,0.
 Misce, sepone etc.

Elixir dentifricium.

Rp. Olei Cinnam. Caylan. 1,0
 — Anisi stellati
 — Caryophyll. $\widehat{a}a$ 2,0
 — Menthae pip.
 Tinct. Benzoës $\widehat{a}a$ 8,0
 — Coccionell. 20,0
 — Guajaci ligni
 — Pyrethri $\widehat{a}a$ 8,0
 Spiritus Vini (80%) 1000,0.
 Mixta post aliquot tempus filtrentur.
Ph. Gall.

Elixir dentifricium Heideri.

Rp. Spiritus Melissa 50,0
 Tincturae Myrrhae
 Tincturae Chinae $\widehat{a}a$ 1,0
 Olei Menth. pip. 0,16.
 Misce.

Elixir Eriodictyi aromaticum.

Aromatic Elixir of Yerba Santa.
 Elixir corrigens.

Rp. Extracti fluidi foliorum Eriodictyi Californici 60,0
 Elixiris Taraxaci compositi 440,0
 Magnesia carbonicae 10,0
 Syrupi Sacchari 500,0.
 Misce, sepone per aliquot dies, in-
 terdum agitando, tum decantha.

Elixir Erythroxyli.*Elixir Cocae. Cocaelixir.*

- Rp. Extracti fluidi Erythroxyli
Cocae foliorum 120,0
Tincturae Vanillae 20,0
Elix. aromatici Americ. 680,0
Spiritus Vini 60,0
Syrupi Sacchari 120,0.

Misce, sepone, interdum agitando,
tum filtra.

Elixir Erythroxyli guaranatum.*Elixir of Coca and Guarana.*

- Rp. Extracti fluidi Erythroxyli
Extracti fluidi Guaranae aa
100,0
Elixiris Taraxaci compositi
600,0.

Misce. *Nat. Form.*

Elixir Eucalypti.

- Rp. Extracti fluidi Eucalypti glo-
bosi foliorum
Spiritus Vini aa 50,0
Elixiris Taraxaci compositi
Syrupi Coffeae aa 100,0.

Misce.

Elixir Evonymi.*Elixir Euonymi. Elixir of Wahoo.*

- Rp. Extracti fluidi Evonymi cor-
ticis 80,0
Syrupi Coffeae 70,0
Elixiris Taraxaci compositi
350,0.

Misce. *Nat. Form.*

Elixir Ferri lactici.*Elixir of Lactate of Iron.*

- Rp. Ferri lactici triti 7,5
Kalii citrici 15,0.
Solve in
Elix. aromatici Americ. 480,0.

Elixir Ferri phosphorici.*Elixir Phosphatis ferrici.*

- Rp. Ferri phosphorici oxydati 15,0
Aquae fervidae 50,0.
Solutione peracta admisce
Elix. aromatici Americ. 440,0.

Elixir foetidum Fuldii.*Tinctura Castorei Thebaica.*

- Rp. Castorei 20,0
Asae foetid. 10,0
Liquoris Ammonii caustici
Opii pulv. aa 5,0
Spiritus V. rectif. 150,0.
Digere et filtra.

Elixir Frangulae.*Elixir of Buckthorn.*

- Rp. Extracti Frangulae liquidi
120,0
Spiritus Vini 30,0
Elixiris Taraxaci compositi
120,0
Elix. aromatici Americ. 230,0.
Misc.

Elixir Gari.*Liquor Gari. Elixir de Garus.*

- Rp. Spiritus Gari 45,0
Syrupi Flor. Aurant. 50,0
Tincturae Croci 2,5
Tincturae Vanillae *Gutt.* 5.
Misc.

Elixir Gentianae.

- Rp. Extracti Gentianae 5,0
Spiritus aromatici Ameri-
cani 10,0
Tincturae Vanillae 8,0
Syrupi Sacchari 30,0
Elix. aromatici Americ. 447,0.
Misc.

**Elixir Gentianae fer-
ratum.***Ferrated Elixir of Gentiam.*

- Rp. Ferri phosphorici oxydati 8,0.
Solve in
Aquae fervidae 22,0.
Tum adde
Elixiris Gentianae 470,0.

Elixir Glycyrrhizae.*Elixir Liquiritiae (Americanum).*

- Rp. Succi Liquiritiae depurati 30,0
Solve in mixtura parata e
Liquoris Ammonii caustici 2,0
Aquae destillatae calidae 20,0.

Tum admisce

Elix. aromatici Americ. 450,0.
Ammonii odor ne praevaleat.

**Elixir Glycyrrhizae
aromaticum.**

Elixir Liquiritiae aromaticum.

Rp. Extracti fluidi Liquiritiae 60,0
Olei Caryophyllorum 0,4
Olei Cinnamomi Caylanici 0,4
Olei Myristicae volatilis 0,3
Olei Foeniculi 0,8
Elix. aromatici Americ. 440,0.
Misc. conquassando, sepone per aliquot dies interdum agitando, tum filtra.

Elixir Goddardi.

Elixir Valerianatis ammonici.

Rp. Acidi valerianici 3,0
Aqua destill. 40,0
Ammonii carbonici
quantum ad neutralisationem acidi sufficit. Tum addantur

Spiritus Vini rectfss. 35,0
Syrupi Sacchari 50,0
Olei Amygdalar. amar. aeth.
Gutt. 1

Olei Aurantii cort. *Gutt.* 2.
Aqua Cerasorum 30,0
Tinct. Ligni Santali rubri 12,0
— Aurantii cort. 3,0
— Sacchari adusti 2,0.

Sepone ad sedimentationem et filtra.

Elixir Grindeliae.

Rp. Extracti fluidi Grindeliae 30,0
Spiritus aromatici Americani 60,0
Elixiris Taraxaci compositi 410,0.

Misce.

Elixir Guaranae.

Rp. Pastae Guaranae pulveratae 120,0
Magnesiae ustae levis 15,0
Olei Cinnamomi *Gutt.* 6
Syrupi Sacchari 75,0
Spiritus Vini q. s.,
ut colaturae modo deturbatorio col-

lectae pondus grammata 500,0 expleat. Syrupus et Oleum liquori ex percolatorio defluenti addantur. Pastae pulveratae ante actum deturbatorium arenae albae 250,0 addenda sunt. (Stimulans, adstringens). *Dos.* 2,0—3,0—5,0 (hemisrania, diarrhoea, dysenteria).

**Elixir contra haemorrhagiam postpueralem
Godefroyi.**

Rp. Extracti Secalis cornuti 4,0
Syrupi Cort. Aurant. 25,0
Aqua Melissae
Spiritus Melissae \widehat{a} 100,0.
M. Detur quaque hora cochlear.

**Elixir haemorrhoidale
Daubitzii.**

Rp. Elixiris ad long. Vitam 50,0
Tincturae aromaticae 5,0
Tincturae Frangulae cort. 10,0
Spiritus Aetheris acet. 1,0
Aqua Anisi 60,0
Syrupi Sacchari 30,0.
M., sepone per aliquot dies et filtra.

**Elixir herbarum
Lampei.**

(Boonecamp of Maagbitter.)

Rp. Pomorum Aurant. immat. 30,0
Rhizomatis Calami 10,0
Radiciis Gentianae
Corticis Cascarillae \widehat{a} 8,0
Rhizomatis Curcumae 4,0
Radiciis Rhei 2,0
Olei Anisi stell. 1,0
Spiritus Vini rectfss. 200,0
Aqua communis 330,0
Sacchari albi 100,0
Tincturae Sacch. tosti q. s.
Digere per tres dies vase clauso, saepius agita, tum exprime et filtra. Sit coloris e flavo fusci.

Elixir Humuli

Elixir Lupuli strobilorum. *Hopsenelixir.*
Elixir of Hops.
Rp. Extracti fluidi Lupuli strobilorum 60,0
Magnesiae subcarbonicae 7,5.

Mixtis adde

Tincturae Vanillae 15,0

Elix. aromatici Americ. 365,0

Elixiris Taraxaci compositi
60,0.

Sepone per tres dies, interdum agitando, tum filtra. *Nat. Form.*

Elixir Hypophosphitum.

Elixir of Hypophosphites Nat. Form.

Rp. Calcii hypophosphorosi 25,0

Kalii hypophosphorosi

Natrii hypophosphoros. aa 10,0

Acidi citrici 2,5.

Solve leni calore in

Aquae destillatae 100,0

Glycerinae 30,0.

Tum admisce

Spiritus Cardamomi compositi 20,0

Elix. aromatici Americ. 313,0.

Mixtionem filtra, si turbida est.

Elixir Hypophosphitum ferratum.

Elixir of Hypophosphites with Iron.

Rp. Calcii hypophosphorosi 15,0

Natrii hypophosphorosi 10,0

Kalii hypophosphorosi 5,0

Ferri sulfurici crystallisati 7,5

Acidi citrici 2,5.

Solve in

Aquae destillatae

Syrupi Sacchari aa 150,0.

Tum admisce

Elix. aromatici Americ. 262,0.

Grammata centena 2,5g Calcii hypophosphorosi contineant. Post aliquot dies liquor agitatus filtretur.

Elixir Jaborandi.

Elixir Pilocarp.

Rp. Extracti fluidi Jaborandi 40,0

Tincturae Vanillae 20,0

Syrupi Coffeae 120,0

Elixiris Taraxaci compositi
420,0.

Misce, sepone per duos dies, tum filtra.

Elixir jalapinum citronatum.

Citronensäftchen Alsaticorum.

Rp. Resinae Jalapae 10,0.

Solve digerendo

Spiritus Vini rectfss. 150,0

Aquae destill. 60,0.

Liquori admisce

Syrupi communis Indici 80,0

Olei Citri *Gutt.* 12.

Dosis: pro adulto Gm. 15,0, continentia 0,5 Resinae Jalapae.

Elixir Kalii bromati.

Elixir Potassii Bromidi.

Rp. Kalii bromati 100,0

Acidi citrici 2,5

Elixiris adjuvantis 500,0.

Solve et misce. *Nat. Form.*

Elixir Lithii bromati.

Elixir of Bromide of Lithium.

Rp. Lithii bromati 40,0

Acidi citrici 2,0

Elixiris adjuvantis 458,0.

Misce, solve et filtra. *Nat. Form.*

Elixir Lithii citrici.

Elixir of Citrate of Lithium.

Rp. Lithii citrici 40,0

Elixiris adjuvantis 460,0.

Solve et filtra. *Nat. Form.*

Elixir Lithii salicylici.

Elixir of Salicylate of Lithium.

Rp. Lithii salicylici 40,0

Elixiris adjuvantis 460,0.

Solve et filtra. *Nat. Form.*

Elixir Malti ferrati.

Eisenmalzelixir.

Rp. Extracti Malti liq. 120,0

Ferri phosphorici 7,5.

Solve calore leni in

Aquae destillatae 15,0.

Tum admisce

Elix. aromatici Americ. 360,0.

Post aliquot dies filtra. Centena grammata contineant 1,5g Ferri phosphorici.

Elixir miraculosum.*Elixir merveilleux.*

- Rp. Radicis Gentianae
 Radicis Helenii
 Fructus Anisi
 Fructus Coriandri
 Fructus Petroselini
 Corticis Aurantii fruct.
 Extracti Taraxaci $\widehat{a}a$ 10,0
 Mannae optima \widehat{e} 80,0.
 Concisa et contusa superfundantur
 Aquae fervidae 450,0
 Spiritus Vini rectfss. 800,0.
 Digere et filtra.

Elixir Natrii bromati.

Elixir Sodii Bromidi.

Paretur aequali modo quo Elixir Kalii bromati e Natrio bromato.

Elixir Natrii**hypophosphorosi.**

Elixir Sodii Hypophosphitis.

- Rp. Natrii hypophosphorosi 20,0
 Acidi citrici 2,5
 Elix. aromatici Americ. 578,0.
 Miscet et solve.

Elixir Natrii salicylici.

Elixir Sodii Salicylatis.

- Rp. Natrii salicylici 50,0.
 Solve inter agitationem in
 Elix. aromatici Americ. 550,0.

Elixir pectorale Ph. paup.
s. Hufelandi.

- Rp. Croci 3,75
 Benzoës
 Myrrhae
 Gummi-resin. Ammoniaci
 Fructus Anisi
 Succis Liquir. dep. $\widehat{a}a$ 5,0
 Radicis Helenii
 Rhizomatis Iridis Florentin.
 Bulbi Scillae $\widehat{a}a$ 10,0
 Spiritus Vini rectf. 120,0.

Macera per hebdomadam unam, saepius agitando, tum filtra. Sit limpidum.

Elixir pectorale Wedellii.

Tinctura pectoralis Wedel.

- Rp. Bulbi Scillae

Radicis Enulae
 Succis Liquiritiae $\widehat{a}a$ 10,0
 Fructus Anisi
 Benzoës
 Gummi-resin. Ammoniaci
 Myrrhae $\widehat{a}a$ 5,0
 Croci 2,5.

Contusa et concisa digere per aliquot dies in

Spiritus V. rectf. 200,0,
saepius agita, denique filtra.**Elixir Pepsini.**

- Rp. Pepsini concentrati 10,0
 Acidi hydrochlorici (25%) 6,0
 Glycerinae 75,0
 Elixiris Taraxaci compositi 40,0
 Spiritus Vini 120,0
 Sacchari albi 200,0
 Aquae destillatae 250,0.

Mixta seponere per aliquot dies, interdum agitando, tum filtra. *Dosis:* 8–12 g. (*Nat. Formul.*)*Ph. Gall.* Pepsini offic. 50,0 aut Pepsini concentrati 20,0, Aq. dest. 450,0, Spiritus Vini (80%) 150,0, Syrupi Sacchari 400,0, Ol. Menth. pip. vel Olei aromatici q. s.**Elixir Pepsini compositum.**

- Rp. Vini Pepsini 50,0
 Syrupi cort. Aurant. 50,0
 Tincturae Rhei vinos. 10,0
 Tincturae aromaticae 3,0
 Tincturae amarae 5,0
 Vini Hispanici 50,0.

Miscet. Ante et post coenam cochlear unum. Eupesiam maturans.

Elixir Pepsini ferratum.

- Rp. Ferri sesquichlorati crystallisati 5,0
 Natrii citrici 10,0
 Elixiris Pepsini 485,0.
 Solve et miscet. (*Nat. Formul.*)

Elixir Phosphori.

- Rp. Spiritus phosphorati concentrati 10,0

Olei Anisi stell. 0,1
 Elixiris aromatici Americ.
 Glycerinae aa 30,0.
 Misce. *Dosis*: 1,0—1,5—2,0.

Elixir Picis compositum.

Compound Elixir of Tar.

Rp. Syrupi Pruni Virginianae
 (serotinae)
 Syrupi Balsami Tolutani aa
 100,0
 Morphini sulfurici 0,16
 Alcoholis methyllici 25,0
 Vini Picis liquidae 325,0.

Mixta per diem unum sepone, tum
 filtra. *Dos.*: 3,0—4,0—6,0 quater quin-
 quies per diem (dyspepsia, catarrhus
 bronchialis, phthisis). *Nat. Form.*

**Elixir polychrestum
Hallense.**

Rp. Extracti Rhei comp. P. 1.
 Solve in
 Mixturae simplicis P. 6.

Elixir Proprietatis.

Tinctura Aloës cum Myrrha. Tinctura
 aloëtica. Elixir Proprietatis dulces s.
 sine Acido. Elixir aperitivum.

Rp. Tincturae Aloës
 — Myrrhae aa 40,0
 — Croci 20,0.

Misceantur, quoties usus poscit. (Pur-
 gans, stomachicum, emmenagogum).
Dos.: 2,0—4,0.

Ph. U. St. Tinct. Aloës et Myrrhae
 parat. ex Aloës et Myrrh. ana 10,0,
 Spir. V. rectfss. q. s., ut 100,0 expl.

**Elixir Proprietatis
Paracelsi.**

Elixir Proprietatis cum Acido. Tin-
 ctura aloëtica acida.

Rp. Elixirii Proprietatis 10,0
 Acidi sulfurici diluti 0,8.

Misceantur ex tempore.

Ph. Germanica. Aloës, Myrrh. aa 2,
 Croci 1. Spirit. V. rectfss. 24, Acidi sulf.
 diluti 2. Macera p. 8 dies, tum filtra.
 Stomachicum, purgans, emmenagogum.
Dos. 2,0—4,0 bis terve per diem.

**Elixir Proprietatis cum
Rheo.**

Tinctura aloëtica rhabarbarina.

Rp. Elixiris Proprietatis 15,0
 Tincturae Rhei vinos. 5,0.
 Misc. Stomachicum, emmenagogum.
Dosis: 2,5—5,0 bis terve de die.

Elixir purgativum Daffyi.

Rp. Foliorum Sennae
 Tuberis Jalapae aa P. 20
 Corticis Frangulae P. 30
 Seminis Coriandri
 Seminis Carvi
 Seminis Anisi
 Radicis Liquirit. aa P. 10
 Radicis Galangae P. 5
 Sacchari albi P. 30
 Spiritus V. rectfss. P. 300
 Aquae commun. P. 100.
 Digere et filtra. *Dos.*: Cochlear. 1—2.

**Elixir purgativum
Radcliffei.**

Rp. Aloës P. 20
 Radicis Rhei P. 10
 Cassiae cinnamomeae
 Radicis Zingiberis
 Radicis Zedoariae aa P. 5
 Coccionellarum P. 3
 Syrupi Spinae cervinae P. 100
 Spiritus Vini rectfss.
 Aquae communis aa P. 150.
 Macera per aliquot dies et filtra.

Elixir Raulini.

Elixir de Raulin.

Rp. Elixiris Aurantii comp.
 Tincturae Rhei aquosae
 Elixiris longae Vitae aa P.
 Misce et filtra.

**Elixir Rhamni
Prushianae.**

Elixir Cascarae Sagradae.

Rp. Extracti fluidi Rhamni Pru-
 shianae
 Elixiris Glycyrrhizae aa 150,0

Elixiris Taraxaci compositi
300,0.

Misce. *Nat. Form.*

Elixir Rhamni Prushianae compositum.

Elixir Cascarae Sagradae compositum.

Elixir laxativum. Elixir purgans.
Laxative Elixir.

Rp. Extracti fluidi Rhamni Prushianae 75,0

Extracti fluidi Sennae 45,0

Extracti fluidi Juglandis cinereae corticis radices 40,0

Extracti fluidi Liquiritiae
Tincturae Cardamomi compositae aa 20,0

Spiritus aromatici Americani 75,0

Syrupi Sacchari 225,0

Aquae destillatae 100,0.

Misce. *Dosis:* pro adulto 4,0—8,0 g.

Elixir Rhei.

Rp. Tincturae Rhei vinosae 300,0

Glycerinae

Syrupi Sacchari aa 80,0

Spiritus Vini 40,0

Aquae Cinnamomi 100,0.

Misce.

Elixir Saccharinae.

Rp. Saccharinae 50,0

Natrii bicarbonici 25,0

Spirit. Vini rectif. 200,0

Aquae destill. 725,0.

Misce et solve.

Dosis: 1,0—2,0—3,0.

Elixir Stillingiae compositum.

Rp. Extracti fluidi Stillingiae compositi 100,0

Elix. aromatici Americ. 300,0.

Misce. *Nat. Form.*

Elixir Stoughtoni.

Tinctura Absinthii composita *Ph. Gall.*

Elixir stomachicum Stoughtoni. *Stoughton's Magenelixir. Menschenfreund.*

Rp. Herbae Absinthii

Corticis Aurantiorum

Radiciis Gentianae aa P. 25

— Rhei P. 10

Corticis Cascariillae

Aloës aa P. 5

Spiritus V. rect. P. 500

Aquae q. s.,

ut fiant post macerationem colaturae filtratae P. 1000.

Stoughton's

Magenelixir

genannt

„MENSCHENFREUND“

einzig und allein nach der Originalvorschrift des Erfinders († 1646) fabrizirt.

Unter allen Kompositionen zur Stärkung des Magens, zur Beförderung und Wiederherstellung der Verdauung hat sich das Magenelixir des Professors Stoughton aus Leyden einen so grossen und wohlverdienten Ruf erworben, dass man demselben den Namen „Menschenfreund“ beilegte und ihn vor allen sogenannten Magenbittern den Vorzug gab.

Es hat sich als probat bewährt gegen viele, selbst hartnäckige Leiden, welche von Schwächen des Magens und der Verdauungsorgane herrühren, zur Stärkung des Magens, zur Beförderung und Wiederherstellung des Appetits, zur Vertilgung von Würmern, gegen manche Arten von Hämorrhoiden, sowie zur Reinigung des Blutes, Absonderung des Schleimes, Stärkung des Unterleibes und somit zur Hebung vieler aus Schwäche des Unterleibes entstehenden Krankheiten und zur Beförderung eines sanften und regelmässigen Stuhlgangs. Als Schutzmittel gegen klimatische Veränderungen darf dies Elixir auch allen Seereisenden, besonders den Auswanderern, empfohlen werden, sowie auch gegen ansteckende Krankheiten, und hat sich als solches ganz vorzüglich gegen die Cholera und in der Zeit der Cholera häufig bewährt.

Das Stoughtonsche Magenelixir wird in obengenannten Fällen am wirksamsten angewandt, wenn man täglich drei- oder viermal ein bis zwei Esslöffel davon ohne alle Beimischung nimmt, Morgens nüchtern, ein oder zwei Stunden vor dem Mittagessen und gleich vor dem Schlafengehen. Man muss aber bei diesem Gebrauche sich selbst beobachten, um die Dosis zu verstärken oder zu verringern.

Giesst man einige Tropfen von diesem Elixir in Wein, Rum, Cognac, Branntwein, so macht man diese Spirituosen zum angenehmsten und stärksten Liqueur und ist für diejenigen, welche des Morgens oder vor dem Schlafengehen einen Liqueur zu trinken gewöhnt sind, als Gesundheitsliqueur ganz besonders zu empfehlen. (Errata varia!)

Elixir Strychnini valerianici.

Rp. Strychnini valerianici 0,12
Acidi acetici 0,5
Tincturae Vanillae
Tincturae Persionis compositae aa 10,0
Elix. aromatici Americ. 580,0.
Miscet et solve.

Elixir e Succo Liquiritiae.

Elixir pectorale. Elixir pectorale Reg. Daniae. Elixir Ringelmannii.

Rp. Succi Liquirit. depur. P. 2.
Solve in
Aquae Foeniculi P. 6.
Tum admisce
Liquoris Ammonii anisati P. 2.
Elixir sit turbidum. Bene agitatum dispensetur. *Ph. Germanica.*

Elixir Taraxaci compositum.

Rp. Corticis Pruni Virginianae
— fructus Citri aa 40,0
— Cinnamomi
Cardamomi minoris aa 10,0
Caryophyllorum 5,0
Fructus Carvi 15,0
Radice Liquiritiae 120,0
— Serpentariae 10,0.
Contusis concisis adde
Extracti Taraxaci 30,0.
Tum affunde
Spiritus Vini 250,0
Syrupi Sacchari 1000,0
Aquae destillatae 300,0.
Digere per dies duos, tum exprimendo cola. Colatura per aliquot dies seposita filtretur. *Nat. Form.*

Elixir Turnerae.

Elixir of Damiana.

Rp. Extracti fluidi Turnerae microphyllae foliorum 100,0
Magnesiae subcarbonicae 20,0
Spiritus Vini 160,0
Glycerinae 40,0
Elix. aromatici Americ. 340,0.
Mixta macera, saepius agitando, tum filtra. *Nat. Form.*

Elixir uterinum Crollii.

Tinctura uterina Croll.

Rp. Castorei Canadensis 60,0
Extr. Artemisiae 30,0
Crocii 15,0
Kalii carbonici 3,5
Olei Angelicae
— Carvi
— Anisi ana 2,0
Spiritus V. rectif. 725,0.
Macera per dies octo, tum exprimendo cola et post dies duos filtra.

Elixir Viburni Opuli compositum.

Rp. Extracti fluidi Viburni Opuli corticis 40,0
Extracti fluidi Trillii rhizomatis 80,0
Extracti fluidi Aletridis (farinosae) 40,0
Elixiris Taraxaci compositi 352,0.
Miscet.

Elixir Viburni prunifolii.

Elixir of Black Haw.

Rp. Extracti fluidi Viburni prunifolii corticis 60,0
Tincturae Cardamomi compositae 30,0
Elix. aromatici Americ. 390,0.
Miscet.

Elixir viscerale

Kleinii.

Rp. Tincturae Aurant. cort. 20,0

[¹] Liquoris Kali acetici
Syrupi Sacchari \widehat{aa} 10,0.
Mixtis adde liquorem paratum ex
Extracti Cardui bened. 5,0
— Centaurei minoris
— Cascarillae \widehat{aa} 2,0
— Myrrhae 1,0
Aquaе destillatae
Vini Hispanici \widehat{aa} 60,0.
Sepone per aliquot horas et filtra.

Rp. Corticis Fruct. Aurant. expul-
pati P. 8
[²] Myrrhae pulv. P. 1
Vini Xerensis P. 80
Extracti Cardui bened. P. 3
— Cascarillae P. 1
Kali acetici P. 2.

Paretur e cortice Aurantii conciso,
Myrrha et Vino l. a. tinctura, in aqua
solvantur extracta et Kali acetieum.
Postquam subsederint, filtra. *Schachtii*
suppl. Ph. Bor.

Elixir viscerale

Ph. paup.

Rp. Extracti Absinthii
— Gentianae
— Centaurei minoris
— Trifolii
Tincturae aromat. \widehat{aa} 10,0
Aquaе aromat. 160,0
Aquaе destill. 20,0.
M. et solve.

Elixir viscerale

Rosensteinii.

Rp. Tincturae cort. Aurantii 10,0
Tincturae Rhei aquos. 30,0
Liquoris Kali acetici 10,0
Aquaе Chamomillae
Vini Gallici \widehat{aa} 60,0
Extracti Gentianae 5,0.
Misce, solve, filtra.

Elixir Vitae

Matthioli.

Rp. Aquaе aromaticae
Aquaе Cinnamomi vinosae
 \widehat{aa} 50,0
Elaeosacchari Macidis
— Foeniculi
— Anisi stellati
— Menth. pip. \widehat{aa} 3,0
Tincturae Cinnamomi
— aromaticae \widehat{aa} 10,0.
Misce, solve, filtra.

Elixir Zinci valerianici.

Rp. Zinci valerianici 10,0
Liquoris Ammonii citrici for-
tioris 60,0
Spiritus Vini 75,0
Olei Amygdalarum amararum
aeth. *Guttas* 2
Tincturae Persionis compo-
sitaе 10,0
Elix. aromatici Americ. 445,0.
Misce, saepius agitando, tum filtra.

Emaculatio.

Praecepta emaculandi.

I.

Maculae rubrae rubidaeque in telis
nigris, fuscis, violaceis, purpureis et
similiter coloratis ab acidis oriuntur.

Maculae hujusemodi ope alkali
(Liquoris Ammonii caustici) delentur.

Nota: Colores Indigo et Coerulei
Berolinensis acidis plerumque non mu-
tantur.

II.

Colores flavi et citrini ex acidis pal-
lent. Maculae hoc modo ortae ope al-

kalium dilutorum (Liquoris Ammonii
caust. diluti) delentur.

Nota: Color Orleanae acidis in pig-
mentum aurantiaecum mutatur.

III.

Alkalia pigmentum Ligni Campe-
chiani et Brasiliiani, atque pigmentum
coccineum (*Scharlach*) in violaceum,
pigmentum viride in flavum, flavum
in fuscum, Orleanae pigmentum autem
in puniceum (*hochroth*) mutant.

Maculae alkalinae acidis volatilibus

(Aceto destillato, Acido hydrochlorico valde diluto) delentur.

IV.

Sudor plerumque uti alkalia, interdum etiam uti acida, colores mutat. Saepius maculae a sudore profectae solutione aquosa Stanni chlorati dilutiore optime exstinguuntur.

V.

Maculae ab urina profectae vel Aceto destillato, vel Succo Citri, vel Acido tartarico soluto, vel Spiritu Vini rectificato delentur.

VI.

Maculae a succo fructuum, vino rubro etc. profectae in telis linteis albis, primum solutione Acidi tartarici concentrata humectentur, tum liquore Kali (vel Natri) hypochlorosi (*Eau de Javelle*) superfundantur. Si vis, maculam Natro subsulfuroso soluto humecta, tum Acidum tartaricum pulveratum infricando tracta. Hae maculae in telis coloratis ope Liquoris Ammonii caustici valde diluti interdum exstinguuntur.

Maculae e succo putaminum viridium nucum Juglandium effectae tractentur primum solutione Vitrioli Martis, tum Oxalio, denique Calcaria hypochlorosa humificata.

VII.

Maculae tannomelanicae (*Loheflecke*), e tannino doliorum e ligno quercino confectorum exortae, in linteo maceratione in Acido tartarico soluto (1 Acid., 20 Aq.) delentur. Singulae maculae illo liquore acido saepius humectatae radiis solis opponendae sunt.

VIII.

Maculae e fuligine exortae (*Russflecke*) in linteo Acido tartarico, soluto in Spiritu Vini rectificato, delentur.

IX.

Maculae ferrugineae (*Rost- und Eisenflecke*) in telis albis Oxalio aut Acido hydrochlorico diluto, optime vero solutione Stanni chlorati delentur. Oxalium efficacius est, si telam madidam laminae stannae calefactae intendis et Oxalio pulverato fricas. Item macula Oxalio pulverato conspersa et madefacta, si pars affecta fricatur et premitur ferro polito (velut clave) vel inspergitur stanno pulvere, facilius de-

letur. Tela Stanno chlorato tractata statim in aqua eluatur, ne dilaceretur.

Linteum maculis ferrugineis copiosis inspersum hoc modo tractatur: Solve Acidi oxalici P. 10 in Aquae pluvialis P. 100 ad 150. Admixtis Acidi hydrochlorici puri P. 10, immitte Stanni granulati s. limati circiter P. 6 et conquassa. Huic liquori linteum per horae partem octavam immerge, tum aquae magna copia elue.

Acido citrico soluto vel succo Citri illae maculae etiam saepe delendae sunt.

Maculae ejus generis vetustissimae, si hoc modo non tolluntur, solutione Kalii vel Ammonii hydrosulfurati humectentur et post horam dimidiam Acido hydrochlorico diluto eluantur, quae operationes repetantur. Si ne tum quidem tolluntur, macera telam linteam in Aquae partibus 500, quae Kalii ferrocyanati flavi partes 5, et Acidi sulfurici conc. partem unam continent. Tela elota tum in Liquore Kali caustici fortius diluto maceretur denique aqua eluatur.

Maculae e Nigramento gallaceo ope Oxalii delentur. Maculae e Nigramento alizarinico (Indicum continente) in charta primum Aqua Chlori, tum Acido hydrochlorico puro diluto, in linteo autem primum Calcaria hypochlorosa humectata et deinde Acido hydrochlorico valde diluto tractandae sunt.

Maculae e Mangani salibus exortae Acido hydrochlorico diluto delentur.

Sel essentiel de citron

ad delendas maculas ferrugineas.

Rp. Tartari depurati 10,0

Oxalii 20,0.

M. f. pulvis. Hic pulvis saepe Oleo Citri odorifer factus est. Loco Tartari Acidum citricum sumere potes.

Encrivore

ad delendas maculas e nigramento in charta.

Rp. Acidi oxalici P. 3. Solve in Aquae destillatae P. 15 et Spiritus Vini rectf. P. 10.

X.

Maculae ex oleis, cibo pinguiore et pigmentis oleosis in telis laneis ope chartae bibulae Oleo Terebinthinae vel Benzina imbutae fricando, aut Bolo alba (Argilla), atque Magnesia carbo-

nica tractantur. Maculae vel e pinguedine solida vel vetustae addendo Oleum Ricini et calefaciendo antea molliendae sunt.

Maculae oleosae vel pingues in telis bombycinis et teneris ope Benzinae vel Boli albae leni calore tolluntur.

Texta tenera, praecipue bombycina, unguinosis paullum imbuta plerumque liquore aquoso e Cortice Quillajae infusione parato facilius mundare potes.

Nota. Magnesia benzinata vel Bolus alba v. Magnesia alba mixta cum Aquae quantitate sufficiente in pulvere molliorem redacta super maculas extendatur; tum seponendo (loco tepido) exsiccata auferatur ope scopulae setosae. Idem, si opus est, repetatur.

Altera ratio maculas pingues ex telis bombycinis delendi est haec: Maculam margine lato e solutione Gummi Arabici (10 Aq., 1 Gummi) ope penicilli circumscribe. Margine gummoso exsiccato, maculam ope spongiae Aethere puro vel Benzina imbutae absterge.

XI.

Maculae e substantiis variis, partim unguinosis, partim resinosis (velut Pice, Axungia curruli, Cereamento) optime ope Globulorum emaculatoriorum vel Aquae Coloniensis vel infuso aquoso Corticis Quillajae eluendo auferuntur. Ceterum maculam vitello ovi oblinas, eoque siccato, aquae luas. Haec opera saepius repetatur.

Mixtiones sequentes ad auferendas maculas hujusmodi commendandae sunt:

Rp. Olei Terebinthinae rectf.

[¹] Aetheris (vel Aetheris Petrolei) aa P.

M.

Pp. Olei Terebinthinae

[²] Aetheris

Spiritus V. alcohol.

Liquoris Ammonii caustici spirit. aa P.

M.

Aqua emaculatoria.

Fleckwasser.

Rp. Benzinae 100,0

Spiritus Vini absoluti 25,0

Aetheris 10,0

Liquoris Ammonii caust. spirituosus 5,0.

Misce. Sine lumine adhibeatur!

Aqua emaculatoria

Broenneri.

Mineralgeist. Brönner's Fleckwasser.

Rp. Benzinae optima q. v.

Detur ad lagenam.

Gebrauchs-Anweisung.

Man kann damit die am häufigsten vorkommenden Flecken leicht ausmachen, nämlich die von fetten Speisen, Oel, Butter, Talg, Stearin, Wachs, Siegellack, Harz, Theer, Pech, Wagenschmiere, Oelfarbe, Pomade, Schmutz des Kopfes oder der Hände etc. Die Flecken mögen nun in Möbel- oder Kleiderstoffen, seidenen Bändern, Sammet, Handschuhen etc. oder auf Tapeten, Kupferstichen, Zeichnungen, Büchern, den werthvollsten Papieren überhaupt, oder auf polirten Möbeln, Kämmen, Leder etc. vorkommen.

Bei polirten Möbeln angewendet, stellt es den früheren alten Glanz wieder her.

Ausserdem besitzt dies Wasser die Eigenschaft, dass es Insekten, wie z. B. Wanzen, Motten, Flöhe, Schwaben etc., durch Bestreichen der betreffenden Gegenstände, tödtet.

Man legt das befechtete Zeug auf eine saubere Unterlage von mehrfach zusammengelegtem Fliesspapier oder Leinen, befeuchtet den Fleck mit Fleckwasser und wischt ihn mit einem sauberen Lappchen bis zum Trockenwerden ab, wobei die Befeuchtung des Fleckens und die Erneuerung des Lappchens so lange wiederholt wird, bis ein frisches Lappchen keinen Schmutz mehr annimmt. Um Schmutzränder zu vermeiden, wischt man von der Mitte des Fleckens nach allen Seiten hinaus. Je mehr man die Unterlage wechselt, desto mehr nimmt sie den aufgelösten Schmutz an. Bei Gegenständen, die man ohne Unterlage entflecket, z. B. bei Teppichen von Spieltischen, Billards, bei Zeugen von Sesseln, Divans etc. muss man öfter frische Putzlappchen nehmen.

Die damit gereinigten polirten Möbel sind, um Glanz zu bekommen, bis zur Trockene abzureiben.

Um schmutzige Glacé-Handschuhe (weisse sowohl als farbige und selbst dänische) zu reinigen, legt man ein oder

mehrere Paare in eine Obertasse oder in ein Kumpchen und giesst so viel Fleckwasser darüber, dass sie damit bedeckt sind; drückt nun die Handschuhe im Fleckwasser öfter zusammen, nimmt einen heraus, drückt ihn aus, legt ihn auf Fliesspapier oder ein sauberes Handtuch und wischt ihn mit einem andern Handtuch oder sauberen Lappen ab, wobei aber der Handschuh auch anders gefaltet werden muss, damit der an den Umrissen befindliche Schmutz ebenfalls weggeschwemmt werden kann. Wenn der Handschuh so viel als möglich trocken gewischt ist, hängt man ihn zum völligen Austrocknen zehn Minuten an die Luft oder an einen warmen Ort. Nachdem man mit den übrigen Handschuhen ebenso verfahren, hebt man das gebrauchte Fleckwasser für eine neue Reinigung auf, behandelt darin beschmutzte Handschuhe ebenso und drückt sie alsdann in frischem Fleckwasser nochmals aus, wenn die Handschuhe in dem gebrauchten Fleckwasser nicht ganz sauber werden sollten.

Kleine Gegenstände, wie Bänder und dergleichen, reinigt man am besten auf dieselbe Weise durch Eintauchen in Fleckwasser.

Das Fleckwasser ist wohl verkorkt aufzubewahren, und, weil leicht entzündlich, von brennendem Licht fern zu halten!

Magnesia benzinata.

Benzolmagnesia.

Rp. Magnesiae ustae q. v.

Benzinae optima q. s.

M., ut fiat massa pulviformis mollior, quae in ollis vitreis optime obturatis servetur.

Massa super maculas extendatur et post diem unum auferatur.

XII.

Maculae e situ (*Stock- und Moderflecke*) in linteo et tela alba vel Calcaria hypochlorosa soluta filtrata (1 et 100 Äq.) vel solutione Stanni chlorati diluta auferuntur. Saepius praestat, telam in lacte ebutyrato et peracescente macerare et postea saponis ope eluere. Maculae hujus modi in tela sericea et in cottoneo dispuncto (*Pique*) optime Liquore Ammonii caustico diluto delentur. Maculae e situ in charta Calcaria hypochlorosa soluta filtrata, dein Acido tartarico soluto vel Acido hydrochlorico valde diluto, postremo aqua eluendae sunt.

XIII.

Maculae e Cera et Acido stearinico ope Spiritus Vini alcoholisati aut Chloroformii aut Benzinae tolluntur. Confer X.

XIV.

Maculae ab Argento soluto perfectae delentur solutione Kalii cyanati, Ferri sesquichlorati, aut fricando pulve e Calcaria hypochlorosa parata et tum eluendo ope Liquoris Ammonii caustici, aut solutionis aquosae Salis Alembrothii.

Maculae ab Argento soluto facillime hac ratione delentur: Recipe Kalii cyanati P. 10. Solve in Aquae destillatae P. 120. Ante operationem, quae loco umbroso efficienda est, liquoris hujus guttas 8 commisce cum Tincturae Jodi gutta 1. Nonnullis guttis mixturae macula humectata fricatur, tum aqua pura eluitur. Cave ne manus vulneratae sint.

Macula ab Argento soluto, vel in telis vel in cute, humectetur Ferro sesquichlorato soluto, et horae circiter parte decima praeterlapsa primum aqua pura, dein Acido oxalico soluto abluatur.

Liquor venalis ad maculas argenteas extinguendas constat ex

Ammonii muriatici 2,0

Liquoris Ammonii caust. 10,0

Tincturae Jodi 1,0.

XV.

Maculae pigmentis anilineis effectae primum liquore Ammonii caust., dein liquore Natri caustici dilutiore, tum post elutionem ope Acidi oxalici vel citrici delentur.

Globuli emaculatorii.

Fleckkugeln.

Rp. Saponis optimi sebacini P. 15.

Solve digerendo in

Spiritus V. rectfss.

Spiritus V. rectf. aa P. 30.

Solutioni l. a. admisce

Vitelli Ovi P. 5

Olei Terebinthinae P. 15

Boli albae, per cribrum trajectae, q. s.,

ut fiat massa densa, ex qua globuli formentur. Globuli aëri expositi paulum tantum siccandi sunt.

Sapo biliosus. *Gallseife*.
 Rp. Saponis pulverati P. 20 vel q. s.
 Fellis Tauri P. 10
 Terebinthinae Venetae P. 1.
 M. l. a., ut fiat massa, ex qua globuli formentur.

Liquor emaculatorius.
Fleckwasser für zarte Gewebe.

Rp. Radicis Saponariae conc. P. 2
 (vel Cort. Quillajae P. 1^{1/2})
 Aquae P. 10.

Post lenem ebullitionem per horae quadrantem cola. Colaturae P. 6 admisce
 Liquoris Ammonii caustici alcoholisati P. 1.

Usus. Ope spongiae hoc liquore imbutae maculas terendo et aquam suggerendo elue.

Sapo purgatorius ad telas tinctas.

Rp. Fellis taurini P. 120
 Saponis sebacini P. 20.
 Mixtae evaporent, donec portiuncula refrigerata rigescat. Tum admisce
 Mellis depurati
 Sacchari albi aa P. 2
 Terebinthinae Venet. P. 1
 Liquoris Ammonii caust. P. 2.

Sapo purgatorius ad chirothecas e pelle caprina confectas.

Gantēin. Saponin. Handschuhseife.

Rp. Saponis Hispanici sicci conc. P. 50.

Solve digerendo et agitando in
 Aquae destill. P. 15.

Solutioni fere refrigeratae admisce
 Liquoris Natri hypochlorosi P. 15

Liquoris Ammonii caust. P. 2,
 ut fiat massa.

Usus. Hic sapo chirothecis ope paniculi lancei tenuioris (flanellae) tamdiu infricetur, donec purgatae sint.

Saponine conservatrice.

Rp. Saponis medicati pulv. P. 1
 Spiritus V. rectfss. P. 10.

Mixtas digere. Solutio leni calore filtrata in vitra effundatur et seponatur, ut congelet. Usus idem est, qui Saponis purgatorii.

Tinctura emaculatoria.

Fleckenessenz.

Rp. Radicis Saponariae (vel Corticis Quillajae) P. 5
 Aquae P. 25.

Post digestionem leniter coque per horae quadrantem. Liquor expressus evaporet, donec P. 10 supersint, quibus refrigeratis adde

Liquoris Ammonii caustici spirituosi P. 5

Spiritus V. rectfss. P. 3.

Mixtio decanthata aut filtrata in lagenis obturatis asservetur.

Sal purgatorium liquidum ad telam laneam, cocco tinctam, purgandam.

Reinigungs- und Schönungssalz für rothe Wollenzeuge.

Rp. Oxalii 30,0
 Natri carb. cryst. 15,0
 Kali carb. dep. 5,0
 Aquae destill. 1000,0
 Coccionellae contus. 5,0.
 Macera et solve, tum filtra.

Finis notarum de emaculatione.

Emetinum.

Cephaëlinum. Emetinum purum.
 Rp. Extracti Ipecacuanhae rad. spirituosus P. 2.

Solve in

Aquae frigidioris (1—5°) P. 20.
 Solutioni filtratae admisce

Magnesiae ustae P. 2,
 tum in balneo vaporis ad siccum evaporata. Residuum in pulverem subtiliorem redactum commisce cum

Aquae frigidioris P. 15—20.
 Agitatione peracta, miscelam in filtrumingere, ut aqua defluat, quae rejiciatur. Residuum, quod filtrum con-

finet denno leni calore exsiccetur, dein superaffundantur

Spiritus Vini alcoh. *P.* 15.

Calefac usque ad lenem ebullitionem, filtra et residuum tandiu Spiritu abluo, quamdiu aliquid solvitur.

Tincturae collectae, spiritu destillando e balneo aquae maxima ex parte elicit, evaporent, residuum autem solvatur in miscelae quantitate sufficiente, paratae ex

Acidi sulfurici diluti *P.* 2

Aquae destill. *P.* 20.

Solutioni admisce

Acidi tannici aqua soluti

eam quantitatem, quamdiu praecipitatum inde producit. Praecipitatum in filtro collectum commisceatur cum

Plumbi oxydati *P.* 6

et post macerationem per diem unum calore balnei aquae ad siccum redigatur, tum in pulverem reductum Spiritu Vini rectificato exhauriatur. Tincturae hoc modo collectae, Spiritu destillando elicit, addantur

Acidi sulfurici *P.* 2

Aquae destill. *P.* 10

Carbonis animal. depur. q. s.

Tum macera loco tepido per diem unum, Liquori filtrato limpido dein instilla tandiu

Liquorem Ammonii caust., quamdiu praecipitatum efficitur, quod tandem, calorem evitando, siccetur. Si praecipitatum coloris non satis expers invenis, solvendo in Acido sulfurico dilutiore, tractando cum carbone animali, praecipitandoque depuretur. *P.* 200 Extracti Ipecacuanhae spirituosi praebent circiter *P.* 3 Emetini. Sit pulvis albus vel albidus amorphus, in aquae circiter partibus mille solubilis, in Spiritu facile solubilis.

Dosis: 0,005—0,007—0,01 ad emesin efficiendam, mixta cum dupla quantitate Acidi tartarici. *Dos.:* 0,001—0,002 pluries per diem vi expectorante et antipyretica.

Emetinum coloratum.

Emetinum impurum.

Rp. Extracti Ipecacuanhae 100,0

Natri carbonici cryst. 7,5

Aquae destill. 80,0.

Solutione peracta, liquor

Hager.

Aethere aethylico

bis excutiatur. Liquorem aethereum defusum destillando ab aethere ex parte liberatum leni calore evapora. Massam residuum in pulverem redige et serva. *Dosis emetica:* 0,15 in duas vel tres partes divisa.

Emplastra tenaciora et valde adhaesiva.

Stark-klebende Pflaster.

Si vis quidquam emplastrum tenacius et valde adhaesivum efficere, adde copiam minorem

Massae emplasticae

vel Colleplastrum concentrati. Conf. sub titulo: Massa emplastica.

Emplastrum adhaesivum.

Rp. Olei Olivarum communis 1000,0

Aquae communis 50,0.

In lebetem cupreum amplum, ad tertiam partem replendum immissa leni igne calefac, tum inter perpetuam agitationem paulatim adjice

Lithargyri praeparati, per cri-

brum trajecti, a Minio et

Plumbo metallico, quantum fieri potest, liberi 500,0.

Coque leni igne, agitatione continuata, et pauxillum

Aquae fervidae

subinde instilla, si spuma massae ebullientis collabitur, donec portiuncula exempta refrigerata justam emplastri consistentiam exhibeat. Tum sensim affunde liquorem colatum, adhuc calidum, solvendo paratum e

Salis culinaris 50,0 et

Aquae communis 800,0.

Coctio et agitatio per horam dimidiam continetur, tum massa seponatur, ut refrigeret. Massa refrigerata exemta, lixivio salino rejecto, cum

Aquae fervidae

volumine aequali inter agitationem per horae quadrantem coquatur et ad refrigerationem seponatur. Postea massae, liquore aquoso rejecto, in lebetem remissae addantur

Massae emplasticae perchatae 100,0

Resinae Pini flavidae 160,0.

Liquatione peracta inter agitationem

calefac, donec humor ex parte evaporando fugatus fuerit. Postremo massa adhuc fluida in vasa e lamina ferrea stannata confecta infundatur et ad usum servetur.

Emplastrum adhaesivum optimum.

Rp. Empl. Plumbi simpl. 1000,0.

Liquata coque, donec aqua adhaerens evaporata fuerit. Deinde adde

Cerae flavae 50,0.

Colliquatione peracta adde mixturam liquatam, paratam e

Resinae Dammarae

Colophonii aa 100,0

Massae emplasticae perchatae 120,0—200,0.

Massa emplastica in pyxides e lamina stannata effectas infusa servetur.

Ph. Germ. Empl. Plumbi 100, Cerae, Dammarae, Coloph. ana 10, Terebinth. 1.

Emplastrum adhaesivum Anglicum.

Emplastrum Anglicum. Empl. Ichthyocollae. Taffetas Anglicum s. adhaesivum. Sericum Anglicum. Sericum adhaesivum. *Isinglas Plaster. Court Plaster.*

Rp. Ichthyocollae minutim concisae 30,0

Aquae destill. fervidae 360,0.

Digerendo fiat solutio et sint colaturae 360,0, quae in duas partes aequales dividantur. Parte altera liquoris ope penicilli tela bombycina, Taffet dicta, supra jugum extensa saepius obducatur. Tela bombycina sit circiter 100 centimetros longa et 45—50 centimetros lata. Quod inductum fuerit, siccetur.

Pars altera liquoris commisceatur cum Spiritus V. rectfss. 120,0

Glycerinae 5,0,

qua mixtura tela eodem modo iterum illinatur.

Postremum tela, dorso mixtura parata e

Tincturae Benzoës P. 5 et

Balsami Peruviani P. 1

bis illinito, bene siccetur, inter laminas ferreas albas premendo laevigetur et loco siccato servetur.

Sit rigidum, madefactum cuti tenaciter adhaerens (*Ph. Germanica*).

Si vis emplastrum efficere, quod aquam non recipiat, in se nec conglutinet, loco Tincturae Benzoës sume liquorem hunc:

Rp. Laccae in tabulis 20,0

[²] Benzoës 4,0

Terebinthinae Venetae

Balsami Peruviani

Cerae albae

Massiches aa 2,0

Spiritus Vini absoluti 160,0.

Digere per diem unum et saepius agita, dein seponere loco frigido et filtra.

Emplastrum adhaesivum extensum.

Sparadrapum adhaesivum.

Rp. Massae emplasticae perchatae

Resinae Dammarae

Resinae Pini aa 30,0

Empl. Plumbi simpl. 100,0

Empl. Cerussae 60,0.

Liquatis et semirefrigeratis instilla inter agitationem

Olei Terebinth. opt. 25,0.

Mixtionem puram calidam super pannum linteum s. gossypinum (*Shirting*) parcius extende, tum per aliquot dies loco frigido aëri exponere. Sit valde agglutinans. Emplastrum Plumbi et Cerussae ab aqua sint liberata.

Emplastrum adhaesivum extensum Bienerti.

Rp. Resin. Dammar. pulv. P. 18

Empl. Plumbi simpl. P. 25

Olei Ricini P. 2

Terebinthinae communis P. 1.

Liquando coquendoque fiat massa homogena, cui addantur

Emplastri Cerussae P. 12.

Massa l. a. super textile gossypinum tenue parcius extendatur.

Sparadrapum vetustum et non amplius satis agglutinans atterendo Oleo Terebinthinae vel Benzina reparatur.

Emplastrum adhaesivum extensum Kraftii.

Rp. Resin. Dammarae P. 60

Olei Oliv. Provinc. P. 18

Terebinthinae laricin. P. 5.

Liquando mixtae colentur et super textile gossypinum extendantur.

Emplastrum adhaesivum fuscum s. Bavaricum.

Emplastrum Leodinense. Emplastrum domus misericordiae. *Emplâtre de Bavière. Lütticher Pflaster.*

Rp. Minii praeparati, per cribrum trajecti 336,0

Sebi taurini 52,0

Olei Olivarum 410,0.

Inter agitationem calore ignis aperti coquantur, donec miscela colorem subfuscum induere inceperit et emplastri ductilis consistentiam acquisiverit. Tum ab igne remove et adde

Cerae flavae 38,0

Resinae Pini depuratae 52,0

Terebinthinae Venetae 112,0.

Emplastrum adhaesivum in magdaleonibus.

Emplastrum resinosum s. adhaesivum flavum.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. P. 25

Cerae flavae

Resinae Pini aa P. 5.

Colliquatis admisce

Terebinthinae Venetae P. 3.

Massa malaxando in magdalides redigatur.

Emplastrum adhaesivum nigrum.

Emplastrum picum nigrum. Emplastrum adhaesivum Edinburgense.

Schwarzes Pechpflaster

Rp. Emplastri Plumbi simpl. P. 6

Resinae Pini Burg. P. 2

Picis navalis P. 1.

Colliquatae et mixtae in magdaleones redigantur. Emplastrum hoc super linteam extensum tantum calefactum se agglutinat. Si emplastrum temperatura media agglutinans habere vis, misce liquando aa Partes tres illarum ambarum specierum resinalium.

Emplastr. adhaesiv. Edinburgense *Ph. Germanicae vet.*

Paretur modo quo Emplastrum adhaesivum Pharmacopoeae ejusdem, nisi quod Emplastri Plumbi 600,0 cum

Picis navalis 90,0
colliquentur. Est valde agglutinans.

Emplastrum adhaesivum odoratum.

Rp. Cerae flavae 45,0

Colophonii 40,0

Elemi 25,0.

Liquatis, colatis et semirefrigeratis admisce

Olei Bergamottae 3,0

— Caryophyllorum

— Citri aa 2,0

— Balsami Peruviani 4,0,

ut fiat emplastrum, ex quo formentur magdaleones, in charta cerata servandi.

Emplastrum adhaesivum pellucidum.

Rp. Resinae Dammarae P. 10

Terebinthinae Venetae P. 5.

Colliquando mixtis adde

Cerae albae P. 4

Olei Ricini P. 10

Terebinthinae Venet. P. 4.

Miscela loco calido ad sedimentationem reponatur.

Emplastrum adhaesivum Pettenkoferi.

Rp. Saponis calcarei 40,0

Terebinthinae coctae 20,0

Sebi ovilli 5,0.

Liquando commisceantur.

Emplastrum adhaesivum rubrum.

Emplâtre de Canet.

Rp. Emplastri Plumbi comp.

Emplastri Plumbi spl. aa 100,0

Resinae Pini 50,0

Terebinthinae communis

Lapidis Haematitae praep.

aa 10,0.

M. l. a.

Emplastrum adhaesivum Wireburgicum.

Emplastrum adhaesivum Herbipolitanum. *Würzburger Heftpflaster.*

Rp. Resinae Pini Burg. 25,0

16*

Terebinthinae commun. 10,0
 Emplastri Plumbi simpl. 50,0.
 Liquatis admisce
 Boli Armenae praep.
 Lapidis Haematitae praepa-
 rati aa 5,0.

Emplastrum adstringens.

Empl. resinosum rubrum.

Rp. Empl. Plumbi spl. P. 7
 Olibani (Thuris) P. 2
 Sanguis Draconis P. 1.
 Liquando misce. *Ph. Neerl.*: 8—2—1.

Emplastrum Ammoniaci.

Rp. Resinae Pini
 Cerae flavae aa 100,0.
 Colliquatis et subrefrigeratis admisce
 Ammoniaci depur. 150,0
 Galbani depurati 50,0

in
 Terebinthinae communis 100,0
 calore balnei vaporis soluta. Fiat em-
 plastrum subviride, in magdaleones re-
 digendum. *Ph. Germanica.* (Excitans,
 maturans, discutiens.)

Simili modo parentur:

Empl. Asae foetidae.
— **Galbani.****Emplastrum Ammoniaci
cum Hydrargyro.**

Rp. Olei Olivarum P. 7
 Sulfuris sublimati P. 1.
 In patinam porcellaneam immissas
 inter agitandum calefac, Sulfur pau-
 latim addendo, donec massa fluida ho-
 mogenea effecta fuerit. Tum immisce l. a.

Hydrargyri P. 164,
 ut globuli metallici non amplius conspi-
 ciendi sint. Dein adde

Ammoniaci P. 656
 antea calore balnei vaporis liquatas.
Ph. Brit. (Tumores, bubones venerei).

**Emplastrum Ammoniaci
cum Scilla.**

Empl. ammoniaco-scilliticum *Ever.*

Rp. Ammoniaci depur. 40,0.
 Contritris admisce leni calore

[1] Extracti Scillae 5,0
 antea

Aceti concentrati 10,0
 soluta. Irritans, resolvens, derivato-
 rium (tumores, articulatio tumens, in
 morbo pulmonum).

Massa emplastica
Ever.

Rp. Ammoniaci 100,0

[2] Aceti Scillae 50,0.

Mixta leni calore conterantur, ut
 massa aequabilis efficiatur. *Usus:* In
 rheumate.

Ph. Suec. Gum.-R. Ammoniac. pulv.
 P. 1, Acet. Scillae P. 2.

**Emplastrum amonia-
tum Kirklandi.**

Emplastrum volatile. Emplastrum Sa-
 lis ammoniaci.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 40,0.

Liquefactis admisce

Saponis pulverati 20,0.

Mixtioni semirefrigeratae adde

Ammonii muriatici sub. pul-
 verati 5,0.

Contra tumores albos, indurationes
 subcutaneas et affectiones rheumaticas
 laudatur. Singulis diebus emplastrum
 novum applicetur.

**Emplastrum antarthri-
ticum**

(Benningseii).

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 65,0

Cerae flavae 10,0.

Leni calore colliquatis admisce

Saponis Hispan. pulv. 5,0,

dein

Camphorae 2,5

antea in paulo Olei Olivarum soluta, et
 Castorei Canadensis pulve-
 rati 0,75.

Effunde in cistam papyraceam, oleo
 parce imbutam. Sit emplastrum e fu-
 scescente flavum.

**Emplastrum antarthri-
ticum**

Helgolandicum.

Empl. Calcariae piceum. *Helgolander*
Gichtpflaster.

Rp. Calcariae stibiato-sulfuratae,
 subtiliter tritae

Cerae flavae $\widehat{a}a$ 30,0

Picis navalis 100,0

— liquidae 50,0.

Liquando mixta super corium extendantur.

Emplastrum anticatholicum.

Rp. Emplastri Galbani croc. 50,0

Terebinthinae communis

Asae foet. pulv. $\widehat{a}a$ 10,0.

Calore balnei vaporis liquando mixta commisceantur cum

Olei animalis destill.

— Menthae piperit.

— Caryophyllor. $\widehat{a}a$ 1,25.

Emplastrum antimoniatum

Kranichfeldii.

Rp. Cerae flavae 4,0

Resinae Pini 3,0

Terebinthinae 1,0.

Liquatis et semirefrigeratis admisce

Tartari stibiati subt. pulv. 2,0.

Massa in magdalia redigatur.

Emplastrum antispasmodicum.

Empl. contra nauseam s. morbum nauticum. *Plaster geg. Seekrankheit.*

Rp. Emplastri Galbani crocati 40,0

Cerae flavae 5,0

Terebinthinae Venetae 2,0.

Colliquatis semirefrigeratisque admisce miscelam pulveream paratam ex

Opii 2,5

Ammonii carbonici 2,0

Camphorae 2,5

Olei Cajaputi 1,0.

Emplastrum praecordii applicatur.

Emplastrum Arnicae.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 35,0

— Plumbi comp. 5,0

Tincturae Arnicae 40,0.

Leni calore colliquata et agitata evapora ad justam emplastri consistentiam.

Ph. U. St. Extr. rad. Arnicae 50,0 et Empl. Resinae s. adhaes. 100,0. M.

Emplastrum Arnicae

homoeopathicum.

Sparadrapum Arnicae.

Paretur aequali modo quo Emplastrum adhaesivum Anglicum, nisi quod loco Spiritus Vini rectfss. sumantur

Tincturae Arnicae e floribus recentibus paratae 120,0.

Emplastrum aromaticum.

Empl. stomachicum s. de Labdano.

Magenplaster. Keuchhustempflaster.

Rp. Cerae flavae 40,0

Sebi taurini 30,0

Terebinthinae communis 7,5.

Liquatis et semirefrigeratis admisce

Olibani pulv. 20,0

Benzoës pulv.

Olei Nucistae $\widehat{a}a$ 10,0

— Menthae piperitae

— Caryophyll. $\widehat{a}a$ 1,25.

Ad magdaleones malaxatam massam serva in charta paraffinata. Praecordiis imponendum (stomachum corroborans, pertussim leniens).

Ph. Germanica simile praeceptum dat, nisi quod Terebinth. 10,0 et Olei Nucistae 7,5 sumantur.

Emplastrum balsamicum

Schiffhausii.

Rp. Emplastri saponati 40,0

[¹] Emplastri fusci 20,0.

In liquatis digerendo solve

Camphorae tritae 2,5.

(Tum adde, si praescribitur,

Castorei subt. pulv. 1,25).

Massa in scatulas ligneas vel e lamina alba ferrea confectas infundatur et seponatur, ut refrigeret.

Rp. Olei Olivarum 60

[²] Cerussae (plumbeae)

Minii praep. $\widehat{a}a$ 20,0.

Leni igne inter agitationem coquantur, donec portiuncula refrigerata consistentiam emplastri praebat. Tum admisce agitando

Saponis Hispanici pulv. 20,0

Camphorae tritae 5,0.

Post digestionem per aliquot partes sexagesimas horae, si poscitur, adde

Castorei pulv. 2,5.

Emplastrum bene mixtum, adhuc fluidum in cistas vel scatulas infunde.

Emplastrum basilicum.

Königspflaster.

Rp. Ceræ flavæ 20,0
Colophonii
Picis navalis $\widehat{a}a$ 25,0
Olei Olivarum 7,5.

Fiat emplastrum et infundatur in capsulas.

Emplastrum Belladonnae.

Rp. Ceræ flavæ 100,0
Terebinthinae Venetae
Colophonii $\widehat{a}a$ 12,5
Olei Olivarum 25,0.

Liqua et per horæ quadrantem inter perpetuam agitationem calefac, ut humiditas adhaerens abeat. Tum usque ad circiter 80° C. refrigeratis admisce

Herbae Belladonnae subt. pulv. siccae 50,0.

Fiat emplastrum cum Oleo Olivarum malaxandum, ex quo magdaleones formentur (Anecticum, anodynum).

Ph. Germanica. Ceræ flav. 4, Terebinth., Ol. Oliv. $\widehat{a}a$ 1, Fol. Belladonn. 2.

Eodem modo parentur:

Emplastrum Aconiti.

— **Betonicae.**

— **Conii.**

— **Hyoscyami.**

— **Meliloti.**

— **Stramonii.**

Emplastrum Calaminae.

s. Lapidis calaminaris.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 25,0
Ceræ flavæ 10,0
Terebinthinae
Sebi taurini $\widehat{a}a$ 2,5
Lapidis calamin. pp. 25,0.

M. l. a. Magdalides formentur.

Emplastrum calefaciens.

Warm Plaster. Warming Plaster.

Rp. Emplastri Cantharidum 5,0
Olei Nucistae 5,0

Cerati Resinae Pini 100,0.
Liquando mixta colentur.

Emplastrum cantharidatum.

Bandplaster (Berolinensium).

Rp. Mastiches pulveratae
[¹] Ceræ flavæ $\widehat{a}a$ 50,0
Terebinthinae 36,0
Resinae Pini 24,0
Sebi taurini 12,0
Cantharidum subt. pulv. 18,0
Euphorbii pulv. 6,0.

Leni calore fiat massa aequabilis, quae super telam sericeam nigram latitudine 1,5 centimetrorum extendatur (Praeceptum primitivum Berolinense).

Rp. Sandaracae pulv. 12,0
[²] Terebinthinae Venet. 10,0

Ceræ flavæ 15,0

Resinae Pini 6,0

Sebi ovilli 3,5

Euphorbii pulverati

Cantharidum subst. pulv. $\widehat{a}a$ 5,0.

M. l. a. ut fiat emplastrum, quod, ut supra notatum est, extendatur.

Emplastrum Cantharidum colatum.

Rp. Cantharidum pulv.

Colophonii $\widehat{a}a$ 40,0

Ceræ flavæ 25,0

Sebi taurini 10,0.

Calore balnei arenae per tres horas digere. Tum adde

Terebinthinae (Venet.) 5,0.

Dein ope preli exprime et massam liquidam, adhuc calidam, in capsulas infunde.

Emplastrum Cantharidum

(ordinarium).

Empl. epispasticum s. vesicatorium s. Lyttae.

Rp. Ceræ flavæ

Colophonii $\widehat{a}a$ 200,0

Sebi taurini 100,0.

Liquata leni calore inter agitandum calefac, donec partes aquosae forsitan minores consumtae sint. Tum adde

Terebinthinae Venetae 50,0.

Calore miscelae ad 90—70° C. minuto, admisce agitando

Cantharidum 185,0

quae Cantharides pulverisatae antea calore 25—30° R. exsiccatae sunt, tum massa mixta stet calore balnei aquae per horam unam, dein saepius agitata per diem dimidium loco frigido seponatur, ut fiat emplastrum, olei Olivarum ope in magdaleones malaxandum. Irritans, rubefaciens (post horas 2—3), vesicans, epispasticum (post horas 6—8).

Ph. Germanica Canth. 2, Ol. Oliv. 1, Ceræ 4, Terebinth. comm. 1.

Emplastrum Cantharidum Ferrari

(perpetuum).

Emplastrum vesicans Mediolanense. *Mouches de Milan. Reizendes Bandpflaster. Zahnpflaster.*

Rp. Colophonii 70,0

Terebinthinae 50,0

Ceræ flavæ 30,0

Sebi taurini 3,0.

Liquatis admisce

Cantharidum subt. pulv. 30,0

Euphorbii subt. pulv. 10,0

Styracis liquidi 15,0.

Postremum admisce

Olei Lavandulae

Olei Thymi \widehat{aa} 1,0.

Mixta in ollam porcellaneam infundantur.

Hoc emplastrum plerumque vesicas excitat.

Usus. Hoc emplastrum leni calore liquatum postulantibus supra taffetas nigrum linatur, quod per aliquot dies loco frigido expositum in pannulos longitudinis 3 cm et latitudinis 1,6 cm dissecetur. Emplastrum parti, quae dolet, vel processui mastoideo applicetur, ut ibi per aliquot dies vim epispasticam exerceat.

Ad effectiorem emplastrum, quod vesicas non excitat, sed cutem tantum irritat, quantitas Cantharidum diminuat.

Ph. Gall. Picis albae, Ceræ flavæ, Canth. pulv. ana 50,0. Terebinth. 10,0, Olei Lavandul., Ol. Thymi ana 1,0.

Emplastrum Cantharidum Luebeckii.

Rp. Colophonii

Resinae Pini \widehat{aa} 50,0.

Liquatis admisce

Styracis liquidi

Cantharidum pulv. \widehat{aa} 25,0.

Emplastrum Cantharidum Parisiense.

Rp. Tincturae Cantharidum 40,0

Resinae Pini 20,0

Olei Lini inspissati 10,0

Balsami Peruv. 5,0.

Misce calefaciendo, liquando, agitando.

Emplastrum Cantharidum perpetuum.

Emplastrum vesicatorium Janini. Empl. Janini. Empl. Jaegeri. Empl. Cantharidum cum Euphorbio *Ph. Fenn.* Emplastrum Euphorbii.

Rp. Colophonii 70,0

[¹] Ceræ flavæ 50,0

Terebinthinae 35,0

Sebi taurini 20,0.

Liquatis admisce

Cantharidum subt. pulv. 20,0

Euphorbii subt. pulv. 5,0.

Ph. Germanica.

Rp. Terebinthinae Venetae

[²] Mastiches pulv. \widehat{aa} P. 6.

Leni calore liquatis admisce pulverem subtilissimum e

Cantharidum P. 2

Euphorbii P. 1

paratum. Massa calida in laminam albam ferream effunde. *Ph. Bor., Austr.*

Vis mitior quam Empl. Canth. ord., sed magis perdurans. *Usus:* Ad anadromen doloris dentis, contra phlegmones, lippitudines, hemieraniam. Empl. secundum aurem vel auriculum imponitur. Epispasticum, derivatorium.

Emplastrum Capsici.

Capsicum Plaster.

Tela musselina, oblita Emplastro adhaesivo ad manum teneatur. Pars telae huic desecta, quae loco emplatri insumenda est, ope penicilli parvi

(ad dentes) Oleoresina Capsici perungatur. 10 ccm empl. contin. 0,25 Oleoresinae. *Ph. U. St.*

Emplastrum Ceræe.

Empl. Ceræe terebinthinatum.

Rp. Ceræe flavæ *P.* 50
Sebi taurini *P.* 20
Terebinthinæ *P.* 10
Resinæ Pini flav. *P.* 25
Olei Olivæ communis *P.* 5.
Colligatæ colentur et in capsulas chartaceas infundantur. Emolliens.

Emplastrum Cerati Saponis.

Soap Cerate Plaster.

Rp. Plumbi oxydati pulv. *P.* 60
Aceti conc. (10%) *P.* 652.
Inter agitationem coquantur, donec Acidum cum Oxydo conjunctum fuerit. Tum adde
Saponis natrico-oleïnici pulv. *P.* 40

et denuo coque, ut humidum maxima ex parte evaporetur. Dein adde

Ceræe flavæ *P.* 50 et
Olei Olivarum *P.* 73

antea colligatas. Inter agitationem omne humidum evaporetur, ut fiat emplastrum justæ consistentiæ. *Ph. Belg.* Resolvens, stimulans.

Emplastrum ceroneum.

Céroène. Emplâtre céroène.

Rp. Resinæ Pini 400,0
Picis naval. nigrae
Ceræe flavæ \widehat{aa} 100,0
Sebi ovilli 50,0
Boli Armenæ præp. 100,0
Myrrhæ subt. pulv.
Olibani subt. pulv.
Minii \widehat{aa} 20,0.

M. l. a. Fiat emplastrum. *Ph. Gall.*
Us. Contra dolores pressu vel percussione effectos.

Céroène des Miramionnes.

Rp. Olei Olivarum
Resinæ Pini \widehat{aa} 60,0
Ceræe flavæ 30,0
Lithargyri præparati

Cerussæ subt. pulv. \widehat{aa} 5,0.
Colliquando agitandoque fiat emplastrum.

Emplastrum Cerussæ.

Empl. album coctum.

Rp. Lithargyri subt. pulv. 200,0
[¹] Olei Olivarum 500,0.

Coque in lebetæ cupreo inter agitationem continuam instillando interdum aquam calidam, donec Lithargyrum solutum fuerit. Tum adde

Cerussæ subt. pulv. 360,0
et coque, aquam calidam, ne humor deficiat, modice instillando, ut fiat emplastrum, quod refrigeratum in magdalia convolvatur. Sit album.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 1000,0

[²] Olei Olivarum 150,0

Cerussæ pulv. 570,0

Aquæ destill. 25,0.

In ahenum cupreum immissa inter agitationem continuam, instillando subinde modicam aquæ destill. calidæ quantitatem, ne humor deficiat, ad justam emplastri spissitudinem coquantur. Malaxando, aquæ ope, magdaleones formes. Defensivum exsicicans, leviter adstringens, mitigans. (*Ph. Germ.*)

Emplastrum Cetacci.

Empl. Spermatis Ceti. Empl. emolliens.

Rp. Paraffinæ albissimæ

Sebi taurini \widehat{aa} 30,0

Emplastri Plumbi simpl.

Cetacci \widehat{aa} 20,0.

Leni calore liquando mixta in cistulas infundantur. Emolliens.

Emplastrum Chinini.

Rp. Chinini sulfurici bas. *P.* 3

Emplastri de Vigo c. Merc.

P. 50.

Misce l. a. Roborans, antineuralgicum. Saepius ad usum in forma epithematis supra regionem splenicam (splenoncus, splenemphraxis, splenalgia post febrem rebellem).

Emplastrum ad clavos pedum (Richteri).

Hühneraugenpflaster.

Rp. Galbani pulv. 50,0.

In aceto solutis et ad consistentiam spissam usque evaporatis admisce leni calore

Picis navalis 25,0

Emplastri Plumbi simpl. 12,5.

Postremo adde

Ammonii muriat. pulv.

Aeruginis pulv. $\widehat{a}a$ 2,0.

Fiat l. a. emplastrum.

Empl. ad clavos ped. Baudotii.

Rp. Ceræ flavæ 30,0

Ceratae Resinae Pini

Galbani pulv. $\widehat{a}a$ 20,0.

Calore balnei vaporis liquando mixtis adde

Cupri acetici sub. pulv. 15,0

Olei Terebinthinae 2,5

Kreosoti 5,0.

Taffetas de Delacroix.

Rp. Resinae Pini 100,0

Elemi 25,0

Terebinthinae

Olei Lauri bacc.

Ceræ flavæ

Aeruginis sub. pulv. $\widehat{a}a$ 12,5.

Misce l. a. Particulæ quadratæ parvæ texti sericei viridis massa oblinuntur.

Empl. ad clavos ped. Keilholzii.

Rp. Emplastri ad clavos ped. 100,0

Cantharidum sub. pulv. 1,5.

M. l. a.

Empl. ad clavos ped. Grimmertæ.

Rp. Aeruginis pulv. 25,0

Emplastri Galbani croc. 50,0

Ceræ flavæ

Terebinthinae $\widehat{a}a$ 10,0.

M. l. a. Signa:

Das Pflaster wird zwischen den Fingern erweicht, auf die kranke Stelle gedrückt und dann mit einem feinen leinenen Lappchen, aber nur dünn umwickelt, doch darf zuvor das Hühnerauge nicht beschnitten und das Pflaster nicht geschmiert werden. — Acht Tage bleibt es unberührt darauf liegen, alsdann wird es abgenommen, der Fuss 5–6 Minuten in warmes Wasser gesetzt, dann getrock-

net und mit einem scharfen Federmesser die nun erweichte und abgestorbene Haut da, wo dieselbe in Verbindung mit der gesunden stand, im halben Umkreis eingeschnitten und die Häute und der Dorn abgezogen; zeigt sich irgend noch ein weisses Häutchen in ringförmiger Gestalt bei der Stelle, wo der Punkt des Hühnerauges war, so muss auch dieses herausgelöst werden, bis man auf gesundes rotes Fleisch stösst.

Nachdem wird die wunde Stelle zum Schutz einige Tage lang umwickelt. Binnen 3 bis 4 Wochen bildet sich abermals eine harte Haut, welche jedoch nicht geschnitten werden darf, sondern sich nach einem warmen Fussbade ablöst.

Emplastrum Collodii.

Collodpflaster.

Rp. Telam sericam.

Collodio paululo elastico illine. Ad usum hoc emplastrum mixtura Spiritus vini (2) cum Aethere (1) madefactum imponitur.

Emplastrum Conii

Ph. Austriacæ.

Rp. Adipis suilli 25,0

Ceræ flavæ 50,0

Terebinthinae comm. 5,0.

Colliquatis inter agitationem admisce Herbae Conii pulv. 20,0, ut fiat emplastrum, quod ope Olei mineralis in magdalides redigatur.

Vis anodyna, resolvens, discutiens (indurationes glandularum, cirrhus, rheuma).

Ph. Gall. Resin. Burgund. 94, Picis alb. 44, Ceræ flav. 64, Ol. Conii coct. 13, Fol. Conii recentium 200, Gummi Ammoniaci dep. 50. — Folia recentia contusa cum massa liquata, colliquata parata ex Res. Burg., Pice et Cera, inter agitationem calefac, donec pars aquosa exhalata fuerit, tum exprime etc.

Ph. Fenn. Resinae Pini flav. 10,0, Ceræ flav. 50,0, Empl. plumb. 250,0. Extracti Conii 40,0.

Eodem modo paratur:

Emplastrum Hyoscyami

Ph. Fennicæ,

nisi quod loco Extracti Conii sumatur Extractum Hyoscyami. Anodynum.

Emplastrum Conii ammoniacatum.

Empl. Conii cum Ammoniaco.

Rp. Ammoniacy pulverati
Aceti Scillae \widehat{aa} 20,0.

Mixtis et leni calore evaporando in massam pultiformem tenacem redactis admisce

Emplastri Conii 90,0.

Magdalides formentur. Sit emplastrum molliuseculum, paulum tenax. *Ph. Germ.**Vis eadem Empl. Conii, simul paulum irritans, derivatoria (articulationes tumentes, tumores, morbi pulmonum).***Emplastrum consolidans**
(Schmuckeri).

Empl. griseum. Empl. de Lapide calaminari. Empl. Diapompholigos.

Rp. Emplastri Cerussae 60,0
Emplastri Plumbi 100,0
Olei Olivar. Prov. 7,5.

Leni calore emollitis admisce

Lapidis Calaminaris praep.
15,0

Olibani pulverati

Mastiches pulv. \widehat{aa} 2,5.Fiat emplastrum, ad magdaleones malaxandum. *Vis adhaerens, digerens, defendens.**Ph. Bor. suppl. Schachtii.* Empl. Plumbi, Empl. Cerussae \widehat{aa} 24, Lap. Calamin., Olibani, Mastiches \widehat{aa} 1.**Emplastrum Cumini.**Rp. Cerati Resin. Pini 50,0
Cerae flavae 10,0

Seminum Cumini pulv. 10,0.

Liquando mixtis et semirefrigeratis adde

Olei Cumini 2,5

et agita, donec refrixerint.

Simili modo paretur:

Emplastrum Carvi.**Emplastrum defensivum caeruleum.**

Emplastri Oxydi cobaltici.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 70,0
Unguenti plumbici 15,0

Smalti (s. Oxydi cobaltici cum terra silicea) 30,0.

M. l. a. et in magdaleones redige.

Emplastrum defensivum rubrum.

Empl. Cerussae rubrum.

Rp. Sebi taurini
Cerae flavae \widehat{aa} 25,0
Cetacei 2,5.

Leni calore liquatis admisce

Cerussae plumbicae 25,0

Minii praeparati 12,5

conterendo antea optime mixta. Dein adde

Camphorae 3,0

soluta in

Olei Olivarum 12,5.

Agitando refrigerandoque fiat emplastrum, in magdalia malaxando formandum (*Suppl. Ph. Bor. Schachtii*).**Emplastrum Diapalmae.**Rp. Emplastri Plumbi simpl. 80,0
Cerae albae 5,0.

Liquatis admisce

Zinci sulfurici 2,5

antea soluta in

Aquae destill. 5,0.

Inter agitationem humiditas evaporatur. Massa in magdaleones malaxando redigatur. *Ph. Gall.***Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.**Rp. Cerae flavae 60,0
ColophoniiEmpl. Plumbi simpl. \widehat{aa} 20,0.

Liquatis, colatis et semirefrigeratis adde

Terebinthinae 30,0

Ammoniacy 10,0

Galbani 5,0

antea leni igne colliguata. Massae fere refrigeratae admisce

Myrrhae 20,0

Succini

Olibani

Mastiches \widehat{aa} 5,0

antea omnia subtilissime pulverata. Fiat emplastrum consistentiae durioris, ex qua magdalia formentur.

Emplastrum divinum.*Peau divine.*Rp. Cerati Resinae Pini P. 2
Resinae Pini P. 1.

Liquando mixtas supra corium extendende.

Emplastrum domesticum

Pastoris Christi.

Rp. Emplastri fusci camphorati
100,0.

Liquatis admisce inter agitationem

Balsami Peruv. 2,0.

Effunde in scutulas ligneas.

Emplastrum durum

Richteri.

Rp. Lapidis Calamin. pp. 30,0

Lithargyri praep.

Cerussae

Zinci oxydati aa 10,0

Plumbi acetici 15,0.

Subtilissime pulverata et mixta leni calore commisceantur cum

Emplastri Plumbi simpl. 100,0.

Massa in cistas ita infundatur, ut placentam circiter centimetra 2,5 crassam praebeat.

Emplastrum Euphorbii.

Empl. ischiadicum.

Rp. Cerati Resinae Pini 100,0

Euphorbii pulv. 3,0.

Leni calore mixtio efficiatur. Massa in capsulas ferreas stanno obductas infundatur. (Neuralgia, ischias).

Emplastrum Extracti**Conii Ph. Gall.**Emplastrum Extracti Cicutae Ph. Gall.
Emplâtre d'Extrait de Ciguë.

Rp. Extracti Conii seminum spirituosi P. 9

Elemi purificati P. 1

Empl. Plumbi comp. P. 2.

Elemi et Emplastro colliquatis addatur Extractum spissitudinis densioris, tum in mortario porcellaneo massa mixta fortiter agitetur, ut fiat massa aequabilis, quae in capsulas e lamina alba confectas, oleo minerali infricatas ingeratur. (Hoc emplastrum ab emplastro Conii maculati, conf. pag. 249, valde differt.)

Eodem modo parentur:

Emplastra cum Extractis*(Emplâtres d'Extraits)*— **Belladonnae seminum** (de Belladone).— **Digitalis spirit.** (de Digitali).— **Opii.**— **Stramonii seminum** (de Stramoine).

etc.

Emplastrum Ferri.*Iron Plaster.* Empl. martiatum.

Rp. Ferri hydrati fusci

Terebinthinae Canadensis

Resinae Pini ana 10,0

Emplastri Plumbi 70,0.

Misce l. a. calore modico. (Ph. U. St.)

Emplastrum Ferri jodati.

Rp. Cerati Resinae Pini 50,0.

In catino ferreo liquefactis admisce

Ferri subt. pulverati 2,5.

Post agitationem sensim instilla

Jodi 2,0

soluta in

Spiritus V. rectifs. 15,0.

Calore leni adjuvante agita ope spatulae ferreae, donec Spiritus Vini maxima ex parte consumptus fuerit. Tum effunde in ollam porcellaneam et agita, ut emplastrum refrigeret.

Emplastrum foetidum.

Empl. antihystericum. Empl. resolvens

Schmuckeri. Empl. Asae foetidae.

Empl. Asae foetidae comp.

Rp. Cerae flavae

Resinae Pini aa 40,0.

Liquatis, colatis semirefrigeratisque admisce

Asae foetid. pulv. 60,0

Ammoniaci pulv. 20,0

antea in balneo vaporis soluta in

Terebinthinae 40,0.

*Ph. Germanica.***Emplastrum ad Fonticulos.***Fontanellyplaster.*

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 360,0

Resinae Pini 30,0

Sebi taurini 10,0.

Leni calore liquando misceantur.

Ut vis adhaerens emplastri firmetur,
Massae emplasticae perchatae 30,0—
50,0 admisce.

Cf. Apparatus ad Funiculos; pag. 52.

Emplastrum Fouquetii.*Emplâtre de Fouquet.*

Rp. Emplastri Plumbi simpl.

Cerae flavae

Lithargyri praep. aa P.

M. l. a.

Emplastrum Fuliginis

Bernhardi.

Rp. Resinae Pini q. v.

Liquefactae admisce

Fuliginis splendentis subt.
pulv.,quantum suscipi potest. (Arthritis chronica,
tinea capitis, ulcera phagedaenica.)**Emplastrum fuscum.**Empl. Matris. Empl. Matris fuscum
Ph. Sax., Bad., Bav. etc. Empl. Triapharmacum. *Schwarzes Mutterpflaster.*

Rp. Minii subt. pulv. 5,0

Olei Olivarum 100,0.

Coque in lebetes cupreo inter continuam
agitationem, donec colorem e
nigro fuscum induerint. Tum adde

Cerae flavae 25,0

Picis nigrae 10,0.

Mixture peracta infunde in capsulas
chartaceas. Agglutinans, defensivum.**Emplastrum fuscum
camphoratum**

s. universale s. Minii (adustum).

Empl. Minii s. plumbicum camphoratum. *Emplâtre de Minium camphré.*
Empl. Matris *Ph. Hann.* Empl. Matris
fuscum *Ph. Hass.* Empl. fuscum *Ph. Bav.* Empl. nigrum s. Noricum *Ph. Bav., Wrth. Nürnberger, Wiener, Züllichauer, Hamburger, Hallisches Waisenhaus-Pflaster, (Legrand'sches) Mutterpflaster, Universalpflaster, Chocoladenpfl., Altschadenpfl., Karmeliterpfl.*

Rp. Olei Olivarum 800,0

Minii subt. pulv. 400,0.

Inter perpetuam agitationem coquantur,
donec miscela colorem e nigro fuscum
acceperit. Tum adde

Cerae flavae 200,0

Picis nigrae 150,0.

Massam liquatam commisce cum

Camphorae tritae 15,0.

Effunde in capsulas e lamina alba confectas
et paululum humectatas. *Vis:*
paulum irritans, discutiens, maturans.*Ph. Germ.* picem omittit et Camph. 13,3,
solut. in Ol. Oliv. 13,3, praecipit.Saepe dispensatur Emplastrum fuscum,
non admixta Pice nigra, in scutulis
ligneis minoribus (capac. 8—15 Grm.)
cum signaturis his:*Schäffers**Haupt-Wund-Brand-
Frost- und Heilpflaster.***Heil- und Wund-Pflaster**Dieses kommt von Sr. Rom. Kais. Majestät
privilegiert und neuerdings mit Genehmigung
eines hohen Königl. Preuss. Ministeriums
zum Debit verstaatete köstliche
des Michael Lauer corn. Wundarzt in Nürnberg
ist recht- und ebemässig übergegangen auf die
Jungfrau Thecla Brenner in Erfurt
und nur von dieser anerkannt zu haben.
Preis: 2 Sgr.

Emplastrum fuscum (Theclae)

*Ph. Gall.**Emplatre brun. Onguent de la mère Thècle.
(Rosenbalsam. Poitrinage de Rose.)*

Rp. Olei Olivarum 100,0

Adipis suilli

Butyri insulsi

Sebi taurini

Cerae flavae

Lithargyri praep. aa 50,0.

Coquantur inter perpetuam agitationem, donec miscela colorem saturate fuscum acceperit. Tum adde

Picis nigrae 10,0.

Vis: exsiccans, incitans.

Emplastrum Galbani crocatum.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 120,0
Cerae flavae 40,0.

Colligatis et semirefrigeratis admisce

Galbani depurati 120,0
antea in

Terebinthinae comm. 30,0
calore balnei vaporis soluta. Tum adde
Croci pulv. 5,0.

Massa in magdaleones redigatur. *Ph. Germanica.* Vis: resolvens, discutiens.
Ph. Neerl. Empl. Plumbi 120, Galb. dep. 120, Cerae 100, Tereb. 40, Croci 15.

Emplastrum Galbani rubrum.

Emplastrum oxycroceum *Ph. Hb.*

Rp. Cerae flavae
Colophonii aa 160,0.

Liquatis admisce
Orleanae 5,0

antea cum Spiritus Vini rectificatissimi sufficiente quantitate contrita, et adde

Galbani depurati
Terebinthinae aa 40,0
leni calore antea probe mixta. Irritans, derivans.

Emplastrum gallicum.

Franzosenpflaster.

Rp. Emplastri Plumbi comp.
— Hydrargyri

Olei Lini sulfurati aa P.
M. l. a.

Emplastrum glutinans

s. agglutinativum *Ph. Gall.*

Emplâtre d'André de la Croix.

Rp. Picis albae 80,0
Elemi 20,0

Terebinthinae communis

Olei laurini aa 10,0.
Liquata, tum colata in ollam effunde.

Emplastrum glutinativum

Clinici chirurg. Berolinensis.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. P. 2
Resinae Pini P. 1.

Liquando misceantur.

Emplastrum jodato-saponatum

(Richter).)

Rp. Jodi 1,0
Olei Olivae 1,5.

Contritris immisce

Empl. saponati 50,0
antea leni calore semiliquata. Pretii melioris est:

Emplastrum jodatum.

Rp. Kalii jodati 2,0
Jodi 1,0.

Contritae malaxando commisceantur cum

Emplastri saponati 120,0
quae antea leni calore emollita sunt.

Emplastrum Hamburgense.

Rp. Emplastri fusi comphorati cum Pice nigra parati 400,0
Succini praep. 10,0.

Misce. Dispensatur forma magdaleonum ponderis 15 Grammat. ($\frac{1}{2}$ Unz.), 7,5 centimetr. longitudinis, qui in chartam ceratam involuti et signatura hac muniti sunt:

Universal-Heil- und Fluss-Pflaster, mit welchem nächst Gott viel Menschen zu ihrer Gesundheit gebracht, welche bis 6- und 8-jährige Schäden und unerträgliche Schmerzen erlitten. Die Kraft und Wirkung desselbigen ist alhier zum Theile verzeichnet, wie folgt:

Erstens ist dieses Pflaster zu gebrauchen vor Engrüstigkeit und kurzem Odem, Brust- und Lungen-Geschwüre, auf Leder gestrichen, auf die Brust gelegt: so man es aber allda nicht leiden kann, muss solches zwischen die Schultern gelegt werden.

Zweitens dient es vor Reissen im Rücken und Gliedern, es sei in der Achsel, Röhre, Bein, Ellenbogen oder Gelenke, so der

Schmerz gleich viele Jahre gedauert, so benimmt es den Schmerz in kurzer Zeit, und ist probat gefunden worden; jedoch muss die Schmerzstelle mit dem auf Leder gestrichenen Pflaster recht bedeckt werden.

Drittens so ein Mensch Blut auswirft, er sei gestossen, geschlagen, gefallen oder gequetscht, ist dieses Pflaster ein herrliches Mittel, wenn es gleichfalls auf Leder gestrichen, und der Schmerz damit bedeckt wird, so hilft in wenigen Tagen, jedoch soll dieses Pflaster alle Tage frisch überstrichen und übergelegt werden, auch alle zwölf Stunden, und kann immer dasselbe Leder bleiben.

Viertens kann dieses Pflaster für Kopfschmerzen, auf Taffent oder Leder dünne gestrichen, über die Stirne oder auf die Schläfe gelegt werden; auch für Zahnschmerzen ist dasselbige ein trefflich Mittel, nur muss man solches Pflaster an den Backen, an welcher Seite der Schmerz ist, legen, und denselben wohl bedecken, da es denn die Schmerzen zur Stunde benimmt.

Fünftens alle offene Schäden, Geschwüre, Salzfüsse und dergleichen, das Panaritium oder Ahl am Finger, gleich im Anfange daraufgelegt, lindert die Schmerzen in kurzer Zeit. Man braucht auch keinen Wund-Balsam oder Digestiva, Oele und dergleichen, sondern heilet, ohne was anderes dabei zu gebrauchen, aus dem Grund.

Sechstens in allen Entzündungen, als der Rose, rothe hitzige Augen, im Brand, ist es das herrlichste Mittel; frische Wunden heilet es in sechs Tagen; für Hühneraugen oder Leichdornen ist es ein bewährtes Mittel, wie auch für verfrorne Glieder.

Siebentes in Tumoribus, und scirrösen Geschwulsten, sie mögen Namen haben wie sie wollen, als insonderheit die Stockung der Milch bei säugenden Frauen, es zertheilet sie sogleich, ohne etwas anderes dabei zu gebrauchen, wenn die Brust auch schon durchgebrochen, so heilet es wieder.

Achtens bei Krebs oder Fisteln, wie auch in Bubonibus und veneria Testiculi, Tophi, und dergleichen, es resolvirt sie sogleich, oder bringt sie in Suppuration. Man muss nur das Pflaster alle Tage frisch überstreichen, so kurirt es obenerwähnte Umstände aus dem Grund. Für diese Wohlthat sind wir dem Schöpfer den billigsten Dank schuldig.

Dieses ist zu bekommen bei Johann Nicolaus Lohmann Nachfolger, Franz Johann Heinrich Maack, Tabaksfabrikant, wohnhaft in der Breitenstrasse Nr. 36, im Mecklenburger Wappen, in Hamburg.

Emplastrum Hydrargyri.

Empl. mercuriale.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 280,0
Cerae flavae 50,0
Resinae Pini Burg. 20,0
Terebinthinae 10,0.

Liquentur leni calore, dein ab igne

remotis admisceantur
Hydrargyri 100,0

quae antea cum

Lanolinae hydratae 50,0

in mortario ferreo vel porcellaneo conteruntur ad plenam hydrargyri extinctionem. Tum agita, donec fere refrigescant. Emplastrum aquae ope in magdaleones malaxetur. *Vis.*: resolvens, alterans (indurationes, exostoses, bubones, morbi hepatis chronici etc.).

Nota: Praeparatio hujus emplastri una cum praeparatione Unguenti Hydrargyri cinerei facilius efficitur.

Ph. Germanica. Hydrarg. 10, Terebinthinae 5. Post extinctionem Hydrargyri admisce Empl. Plumbi 30, Cerae flavae 5. Oculo nudo globuli hydrargyri conspici sint nulli.

Ph. Brit. Hydrarg. 164, Ol. Olivae 7, Sulf. sublimati 1, Empl. Plumbi spl. 328.

Emplastrum Hyoscyami.

Rp. Cerae flavae P. 10

Colophonii

Olei Olivae aa P. 5

Herbae Hyoscyami pulv. P. 10.

M. l. a. Cera, Colophonium et Oleum Olivae colliquefactis et semirefrigeratis paulatim pulvis herbae admisceatur. Agitetur donec massa refrixerit. Fiant magdalides oleo minerali puri paululo illinatae, charta paraffinata involvendae. *Ph. Bad. Vis.*: resolvens, discutiens, leniter narcotica.

Emplastrum ichthyolatum.

Rp. Resinae Dammaris
Sebi benzoïnati
Cerae flavae aa 20,0

Resin. elastic. 8,0

Lanolinae 12,0

Ichthyoli (Natrii ichthyolati)
20,0.

Mixtio eo modo, qui in praecepto ad parationem massae emplasticae notatus est, paretur. Resina elast. cum Lanolina primo colliquetur.

Emplastrum Jodoformii.

Rp. Jodoformii 12,0

Lanolinae anhydricae 15,0.

Conterendo mixta commisce cum

Emplastri adhaesivi

Empl. Plumbi aa 35,0

leni calore colliquis. *Usus:* Adenophyma, bubo, epididymitis, pleuritis exsudativa, pernioles percurantur.

Emplastrum Jodoformii fortius (Pape et Fischer).

Rp. Jodoformii 10,0

Empl. adhaesivi

Empl. Plumbi aa 20,0.

M. f. empl. *Usus:* Conf. Empl. Jodoformii.

Emplastrum Jodoformii mitius (Pape et Fischer).

Rp. Jodoformii 5,0

Empl. adhaesivi

Empl. Plumbi aa 30,0.

M. f. empl. *Usus:* Ulcera, pernioles percurantur.

Emplastrum irritans

(Ph. Hann.).

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 60,0.

Coquantur inter agitationem, donec colorem fuscum acceperint. Tum admisce liquando

Colophonii

Cerae flavae aa 15,0

Picis navalis 20,0

Terebinthinae 5,0.

Semirefrigeratis admisce

Camphorae 1,0

leni calore solutum in

Olei laurini unguinosi 4,0.

Massa malaxando in aqua ad magdaldes redigatur.

Emplastrum Kalii jodati.*Plaster of Jodide of Potassium.*

Rp. Kalii jodati 10,0

Olibani pulv. 60,0

Cerae 8,0

Olei Olivarum 1,25.

Olibanum et Cera liquentur, dein addatur Kalium jodatum in pulverem reductum, postremo Oleum Olivarum. Diligenter agitando fiat emplastrum.

Emplastrum Klepperbeinii (stomachale).

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 200,0

Cerae citrinae 40,0

Resinae Pini 20,0

Terebinthinae comm. 10,0.

Leni calore liquatis et paululum refrigeratis agitando admisce

Miscelae oleosae 10,0

(infra notatae).

Infunde massam in pyxides rotundas, e lamina alba confectas (capacitatis circiter 26 Grammat., altitudinis 4 Centimetr.), operculo claudendas. Operculo, antea lacca copalina illinito, ope Mucilaginis Gummi Arab. signaturam hanc:

*Klep-
perbeinisches
Magen- und Ner-
ven-stärkendes
Pflaster*

agglutina.

Miscela oleosa.

Rp. Camphorae 10,0

Petrolei Italici 20,0

Olei Calami

— Lavandulae

— Menth. piperitae

— Absinthii aa 2,5

— Rorismarini

— Caryophyllorum

— Aurant. cort. aa 5,0.

M.

Emplastrum Lorraini.

Rp. Cerae flavae 20,0

Olei Olivarum

Colophonii aa 10,0

Sebi taurini
Terebinthinae aa 5,0.
M. liquando.

Emplastrum ad Lupiam.*Gliedschwammplaster.*

Rp. Cerati Aeruginis 90,0.
Liquatis admisce

Gallarum subt. pulv. 10,0.

Emplastrum malacticum.

Empl. frigidum. Empl. Foeni Graeci
compositum.

Rp. Ceræ flavæ 120,0

Sebi taurini
Resinae Pini aa 40,0.

Liquata commisceantur cum
Terebinthinae communis 50,0

Ammoniaci
Galbani aa 20,0

antea leni calore colliquantur. His com-
mixtis adde

Sem. Feni Graeci sbt. pulv.

Sem. Lini sbt. pulv. aa 30,0

Rad. Curcumæ sbt. pulv. 20,0.

M. *Ph. Hamb.*

Rp. Ceræ flavæ 60,0

Terebinthinae communis 42,5
Colophonii 90,0.

Liquatis et colatis adde

Emplastri Plumbi simpl. 160,0.

Liquando mixtione peracta, massae
paulum refrigeratae admisce pulverem
miscendo paratum e

Myrrhae

Olibani aa 5,0

Radici Curcumæ 12,5

Radici Althæae

Florum Chamomillæ

Florum Sambuci

Seminis Foeniculi aa 5,0

Fabarum albarum 2,5.

Massa in magdaleones pedales ponde-
ris grammatum 30,0 redigatur. (*Prae-
ceptum a Wollwebero datum.*) Malacti-
cum, maturans.

Emplastrum Manus Dei.*Gottes-Hand-Plaster.*

Rp. Emplastri Plumbi comp. 190,0
Cerati Aeruginis 10,0.

Leni calore mollita commisceantur.
Rp. Emplastri Plumbi spl. 180,0.

Liquefactis adde

Aeruginis pulv. 5,0.

Lege artis coquantur, donec ex rubro
subnigrum colorem accipiat massa, in
qua leni igne liquefiant

Ceræ flavæ 40,0.

Tum agitando immisceantur

Galbani pulverati

Ammoniaci pulverati

Olibani pulv. aa 5,0

Mastiches pulveratae

Myrrhæ pulv. aa 1,25.

Malaxandofiant magdalides. *Ph. Dan.*

Emplastrum martiale.

Empl. ferratum. Empl. Martis ex
Sebo. *Eisenplaster. Stahlplaster.*

Rp. Saponis natrici sebacini ex-
siccati P. 10

(vel Saponis adhuc humidi quantitatem
accommodatam).

Solve in

Aquæ dest. fervidae P. 100.

Solutioni adhuc tepidae instilla agi-
tando

Liquoris Ferri sesquichlorati

P. 10 vel q. s.,

quandiu praecipitatum inde producitur,
quod sub aqua frigida destillata depa-
tur, dein agitando in balneo vaporis
ab humore liberetur. Fiant magda-
leones, Effic. P. 7. (*Ph. Wrthb.*)

Empl. cum Oxydo ferrico. Empl. Canetii.
Emplâtre ou Onguent de Canet.

Rp. Emplastri Plumbi simpl.

[²] — — compos.

Ceræ flavæ aa 10,0.

Liquatis admisce

Colcotharis rubri 10,0

antea cum

Olei Olivarum 10,0

optime contrita. Dein agita, donec
massa refrixerit. (*Ph. Gall.*) *Us.:* Ad
ulcera atonica integenda.

Emplastrum Ferri *Ph. Brit.*

Empl. Thuris s. roborans. *Steel Plaster.*

Rp. Emplastri Plumbi spl. 80,0

[³] Resinae Pini 20,0

Ferri oxydati fuscii 10,0.

M. l. a. Conf. Empl. Ferri, p. 251.

Emplastrum Martis cum Galbano.

Rp. Emplastri martialis 50,0
Mastiches pulveratae 15,0
Galbani dep. 3,0.
Liquando agitandoque commisceantur.

Emplastrum Matris album.

Empl. Lithargyri molle *Ph. Germ.*
Weisses Mutterpflaster.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 60,0
Adipis suilli 40,0
Sebi taurini
Cerae flavae $\widehat{a}a$ 20,0.
Liquando mixta in tabulas effundantur. *Ph. Sax.* Emolliens, defendens.

Emplastrum Matris Sieboldi.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 60,0
Cerae flavae
Sebi taurini $\widehat{a}a$ 22,5.
Coquantur inter agitationem, donec colorem fuscum adipiscantur. Infunde in cistas e lamina alba confectas.

Emplastrum Meliloti.

Paretur aequali modo quo Emplastrum Belladonnae vel Empl. Conii *Vis.*: emolliens, discutiens.
Ph. Austr. Colophon. 20, Cerae flav. 40, Ol. Oliv. 20. — Ammoniaci 5 et Tereb. Venet. 12,5. — *Hb. Melilot.* 30, *Hb. Absinth.*, Flor. Chamomill. vulg., Fruct. Lauri ana 2.

Emplastrum Meliloti colatum.

Rp. Resinae Pini Burg. 30,0
Sebi taurini
Cerae flavae $\widehat{a}a$ 20,0
Florum Meliloti citrini 4,0
Pulveris tinctorii viridis 0,66.
Leni calore digerantur per aliquot horas, dein colentur et post refrigerationem in magdalides redigantur. Emolliens, digerens, resolvens.

Emplastrum Meliloti compositum.

Rp. Emplastri Meliloti 60,0

Hager.

Sebi taurini
Terebinthinae
Cerae flavae $\widehat{a}a$ 2,5.
Liquatis admisce
Florum Chamomillae
Radicis Iridis Florentin.
Radicis Althaeae $\widehat{a}a$ 3,75
Crocii 1,25
antea in pulverem subtilem redacta.
Post lenem digestionem e refrigerata massa magdalides formentur.

Emplastrum Minii camphoratum

Ph. Dan.

Empl. de Nuremberg *Ph. Gall.* Empl. Minaceo-camphoratum *Ph. Gall.*
Empl. Kjöngii.

Rp. Olei Olivarum 70,0
Minii praep. 40,0.
Coquantur, donec colorem fuscum accipiant, et refrigeratis addantur
Camphorae 5,0
Olei Petrae 1,25

antea subacta. Irritans, maturans.
Ph. Gall. Empl. Plumbi spl. 60,0, Cerae flav. 30,0, Ol. Oliv. 10,0, Minii pp. 15,0, Camphorae 1,2. Magdalides vel in forma tabulae.

Emplastrum Minii rubrum.

Rp. Sebi taurini 50,0
Cerae flavae 60,0
Olei Olivae 20,0
Terebinthinae Venet. 10,0.
Liquatis semirefrigeratis admisce
Minii praep. 50,0
Camphorae 2,0

cum
Olei Olivae 20,0

contrita.
Bene mixta, fere refrigerata in magdaleones malaxentur. Irritans, maturans.

Emplastrum miraculosum

Rademacheri et Waltheri.
Rp. Emplastri fusci camphorati
190,0

Aluminis usti subt. pulv. 1,0

Succini praep. 3,0.

Liquata et mixta in capsulas effunde.
Usus. Ad decubitus, abscessus varios suppurantes, ulcera maligna.

Emplastrum narcoticum.

Rp. Extracti Hyoscyami

— Belladonnae

— Conii $\widehat{a}a$ 3,0

Solutionis Gelatinae concentratae 90,0.

Leni calore mixta ope penicilli in telam expansam bombycinam nigram saepius deinceps transferantur atque expandantur. Telam siccitam loco siccio in theca e lamina ferrea alba confecta serva

Effectus et Vis: resolvens, sedans, suppurationem leniter excitans.

Emplastrum narcoticum commune.

Rp. Emplastri Belladonnae

— Conii

— Hyoscyami $\widehat{a}a$ P.

M. *Vis:* resolvens, sedans.

Emplastrum Olei Crotonis.

Rp. Emplastri Plumbi comp. 8,5
Olei Crotonis 1,5.

Leni calore misceantur. Valde irritans.

Emplastrum opiatum.

Empl. cephalicum s. Opii.

Rp. Terebinthinae comm. 75,0

Cerae flavae 25,0

Elemi 40,0.

Calore balnei vaporis liquatis colatisque admisce

Olibani pulv. 40,0

Benzoës pulv. 20,0

Opii pulverati 10,0

Balsami Peruviani 5,0.

Fiat emplastrum, quod in cistam e lamina ferrea confectam infundatur.

Vis anetica, dolores sedans.

Ph. Brit. Opii pulv. 1,0, Emplastri resinosi 9,0. M.

Emplastrum oxycroceum.

Empl. Galbani rubrum. *Safranplaster.*

Rp. Cerae flavae 50,0

Colophonii 100,0.

Colliquatis et colatis adde

Ammoniaci pulv.

Galbani pulv. $\widehat{a}a$ 25,0

antea calore balnei vaporis in

Terebinthinae Venet. 25,0

soluta. Postremum immisce pulverem subtiliorem e

Croci Spiritu irrorati 15,0

Mastiches

Olibani $\widehat{a}a$ 30,0

commixtum, ut fiat emplastrum e rubro fuscum, quod in magdaleones redigatur.

Ph. Austriaca.

Discutiens, dissolvens, leviter irritans, roborans, maturans.

Emplastrum oxycroceum venale.

Empl. Herniariae. Empl. ad Hernias. *Ochsenkreuzplaster.*

(*Ad us. mercat.*)

Rp. Resinae Pini 200,0

[¹] Cerae flavae 65,0

Sebi taurini 40,0.

Liquatis admisce

Capitis mortui praep. 10,0

Boli Armenae pulv. 20,0.

Fiat emplastrum, aquae ope in magdaleones malaxandum. Praescriptio haec commendatur.

Rp. Resinae Pini 240,0

[²] Cerae flavae 160,0

Colophonii 80,0

Sebi ovilli 40,0.

Liquatis paulatim admisce inter agitationem.

Orleanae 20,0

antea cum

Spiritus V. rectifss. 40,0

optime contrita.

Haec mixtio post aliquod tempus pallescit.

Emplastrum contra Perniones (Rustii).

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 20,0.

Leni calore liquatis immisce

Balsami Peruviani 5,0 et
Camphorae tritae 1,25,
quae antea in Olei Olivarum paulo
soluta sunt. Mixtione peracta adde
Opii sub. pulv. 1,25.

Emplastrum phenylatum.

Empl. Acidi carbolici.

Rp. Cerae flavae

Resinae Pini aa 10,0.

Liquando mixtis et semirefrigeratis
adde

Acidi carbolici cryst. 2,0.

Mixtione conterendo peracta affunde
Emplatri Plumbi simpl. 10,0
antea liquata.

**Emplastrum Picis
Canadensis.**

Hemlock Pitch Plaster.

Rp. Resinae Canadensis 90,0

Cerae flavae 10,0.

Misce calore modico. *Ph. U. St.*

**Emplastrum Picis
irritans.**

Empl. piceum irritans. Empl. Picis
fortius.

Rp. Emplatri Picis simpl. 20,0

Euphorbii pulv. 2,0.

M. l. a. (*Ph. Wrth.*)

**Emplastrum Picis
liquidae.**

Pech- oder Theerpflaster.

Rp. Picis liquidae 40,0

Cerae flavae 20,0

Resinae Pini 2,5.

Liquentur leni calore, ut fiat em-
plastrum, quod semirefrigeratum hieme
in capsulas e lamina alba confectas
et antea charta humectata extersas,
aestate in capsulas e charta glutinata
confectas aut in ollam effundatur. (*Suppl.*
Ph. Bor. Schachtii.) Leviter irritans,
rube faciens.

**Emplastrum Picis liqui-
dae compositum.**

Compound Tar Plaster.

Rp. Resinae Pini 50,0

Picis liquidae 40,0

Radicis Podophylli pulv.

Radicis Phytolaccae (decan-
drae) pulveratae

Rhizomatis Sanguinariae (Ca-
nadensis) pulverati aa 10,0.

Leni calore liquando commixta in
cylindros forma, qui in scatula me-
tallica servandi sunt.

Gichtpflaster. Rheumapflaster.

Rp. Resinae Benzoës depuratae
20,0

Resinae Pini 30,0

Picis liquidae 50,0

Lanolinae anhydrae 10,0

Cerae flavae 60,0.

Leni calore colliquatis admiscee

Olei Citri

Olei Bergamottae

Olei Lavandulae

Olei Rorismarini aa 3,0.

In scatulas metallicas effunde. In
Germania adhibetur.

**Emplastrum Picis s.
piceum.**

Empl. picatum *Ph. Gall.* Empl. Bur-
gundicum. Empl. Picis simplex. Empl.
Picis Burgundicae.

Rp. Resinae Pini Burgund. P. 3
Cerae flavae P. 1.

Leni calore liquentur et in cistulas
papyraceas vel e lamina ferrea con-
fectas infundantur. *Ph. Gall.*

Nota: Conf. Ceratum Resinae Pini.

Ph. Brit. Resin. Burg. 26,0, Olibani
13,0, Resinae Pini, Cerae flav. ana 4,5,
Olei Nucistae 1,0, Olei Oliv. 2,0
Aquae 2,0.

Ph. Neerland. Colophon. 9, Picis
solidae 14, Cera 10.

Emplastrum Pissieri.

Krebspflaster.

Rp. Olei Lini 100,0

Minii sub. pulv.

Cerussae aa 25,0.

Inter agitationem coque, donec em-
plastrum effectum sit, tum l. a. admiscee

Cerae flavae 25,0

Terebinthinae 100,0

Opii pulv. 5,0.

Emplastrum Plumbi compositum.

Empl. Lithargyri comp. Empl. Diachyli compos. Empl. gummosum s. gummi-resinosum. Empl. Galbani *Ph. Brit.* Empl. Galbani compositum. Empl. ammoniaco-galbanicum *Ph. Fenn. Zug-plaster. Gummipflaster.*

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 250,0
Cerae flavae 30,0.

Liquatis admisce
Ammoniaci depurati
Galbani dep. aa 20,0

digerendo agitandoque soluta calore balnei vaporis in

Terebinthinae commun. 20,0.

Fiat emplastrum, quod in magdaleones redigatur. (*Ph. Germanica.*)

Vis adhaerens, defendens, digerens, maturans (abscessus, furunculi, vulnera).

(*Ad usum mercat.*)

Rp. Emplastri Plumbi simpl.
1000,0

Cerae flavae 125,0
Resinae Pini 60,0
Sebi taurini 22,5.

Liquatis et quodammodo refrigeratis inter agitationem admisce

Ammoniaci dep. 20,0
Galbani dep. 80,0
Terebinthinae comm. 120,0
Aquaе 60,0

antea digerendo per aliquot horas calore balnei vaporis et agitando optime mixta, atque calida, dein

Ochrae fusc. praep., subtilissime contritae 30,0 vel 40,0.

Fiat emplastrum, in magdalides, aquae ope, malaxandum.

Nota: Hieme adde Sebi taurini 80,0.

Emplastrum Plumbi jodati.

Empl. Plumbi Jodidi *Ph. Brit.*

Rp. Plumbi jodati 10,0
Empl. Plumbi spl. 80,0
Resinae Pini 10,0.

Misce l. a. *Ph. Brit.* (*Us. Bubones, oscheophyma, adenophyma.*)

Emplastrum Plumbi simplex.

Empl. Lithargyri s. Diachylon simplex. Empl. simplex. *Bleipflaster.*

Lead Plaster.

Rp. Olei Olivarum
Adipis suilli aa 600,0
Aquaе destill. 30,0.

In ahenum cupreum amplum, ad tertiam partem replendum, immissa leni igne calefac usque ad calorem 100° C. aequantem vel donec crepitare incipiant. Tum adde

Lithargyri praep., nuper per cribrum trajecti, a Minio et Plumbo metallico, quantum fieri potest, liberi 600,0.

Coque leni igne inter perpetuam agitationem et pauxillum

Aquaе calidae

subinde (si spuma massae ebullientis collabatur) instillando, ad justam emplastri consistentiam. Malaxa aquae ope in magdaleones. (*Ph. Germanica.*)

Emplastrum Raparum

(fuscum s. universale).

Universalpflaster.

Rp. Olei Olivarum 100,0
Minii subt. pulv. 84,0
Aquaе 25,0.

Inter agitationem coque, donec colorem subfuscum adepta fuerint.

Tum adde

Resinae Pini
Cerae flavae aa 30,0
Terebinthinae Venetae 15,0.

Mixtioni liquando peractae immisce

Camphorae 6,0

Saponis Hispanici pulv. 25,0.

Massa in cistas vel scatulas fundatur.

Emplastrum Resinae

Ph. Brit.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 40,0
Resinae Pini 5,0.

Liquatis admisce

Saponis stearinici pulv. 2,5.

Emplastrum resinosum

s. agglutinans.

Rp. Resinae Piai 25,0

Elemi 5,0

Terebinthinae Venetae

Olei Olivarum aa 3,0

Cerae flavae 2,5.

Liquefacta colentur et in scutulas ligneas fundantur.

Ph. Neerl. (Empl. adhaesivum). Empl. Plumbi 35, Coloph. 6, Terebinth. 1.**Emplastrum resolvens.***Emplâtre résolutif; Emplâtre des quatre fondants.*

Rp. Emplastri saponati

— Conii

— Plumbi compositi

— Hydrargyri aa *P.*Leni calore liquatae agitando misceantur. *Ph. Gall.***Emplastrum resolvens camphoratum.**

Rp. Emplastri Plumbi comp.

— Meliloti aa 25,0.

Leni calore colliquis et ad 45—50° C. refrigeratis addantur

Camphorae tritae 1,25.

Bene commixta massa in papyraceas capsulas infundatur.

Emplastrum ad Rupturas nigrum.

Emplastrum oxycroceum nigrum.

(Ad us. mercat.)

Rp. Resinae Pini 200,0

Cerae flavae 100,0

Picis nigrae 50,0

Sebi taurini 30,0.

Colliquis admisce

Eboris usti opt. praep. 20,0.

Fiat emplastrum aquae ope in magdaleones malaxandum.

Emplastrum ad Rupturas rubrum.

Empl. ad Rupturas.

Rp. Cerae flavae 25,0

Resinae Pini 15,0

Sebi taurini 10,0

Terebinthinae comm. 10,0.

Colliquis immisce

Boli rubrae laevigatae 10,0.

Semirefrigerata in magdaleones redige.

Emplastrum saponatum

s. saponaceum.

Empl. Hjaerteri. Empl. Barbetti. Empl. Pumbi saponatum.

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 120,0

Cerae flavae 20,0.

Calore balnei vaporis colliquis inter agitationem admisce

Saponis Hispan. pulv. 10,0

Camphorae Olei Olivar. paulillo (8,0) solutae 2,0.

Fiat emplastrum tenax, albidum, non lubricum. Fiant magdaleones. *Ph. Austr. Vis.:* resolvens, emolliens.*Ph. Gall.* Camphoram omittit.*Ph. Brit.* Sapon. 60, Empl. Plumbi 360, Resin. Pini 10.

Hoc emplastrum propter Camphoram admixtam interdum nominatur:

Emplastrum camphoratum

s. Empl. saponatum camphoratum.

Emplastrum Hjaerteri *Ph. Fenn., Succ.*

Empl. saponaceo-plumbicum.

Rp. Saponis Hispanici pulv. 21,0
Olei Olivarum 90,0.

Mixtis adde

Cerussae plumbicae 18,0

Minii praeparati 36,0.

Quando supra ignem coctione soluta fuerint ac massa colorem castaneum duxerit, huic demum admisceantur

Terebinthinae Venet. 3,0.

In magdalides crassiores supra tabulam oleo Olivar. unctam formatur emplastrum. *Ph. Suecica.* Vis paulum irritans, resolvens (tumores, arthritis, rheuma, morbus pulmonum, viscerum abdominalium).**Emplastrum Saponis fuscum.**Emplastrum Cerati Saponis. *Ph. Brit.*

Rp. Saponis pulv. 10,0

Cerae flavae 12,5

Ol. Olivar. 20,0

Plumbi oxydati 15,0

Aceti crudi 160,0.

Primum plumbum oxydatum cum aceto coquatur inter agitationem, postea sapo addatur et evaporatio peragatur, deinde addantur cera, oleum etc. *Ph. Brit.*

Emplastrum Schiffhauseni.

Rp. Olei Olivae *P.* 40

Cerussae plumbicae

Minii pulv. aa *P.* 13.

Coque, donec massa colorem fuscum adeptam fuerit. Tum admisce

Saponis Veneti pulv. *P.* 10

Camphorae tritae *P.* 3.

(In rheumate, neuralgia adhibetur.)

Emplastrum sticticum.

Emplastrum stypticum.

Rp. Ceræ flavæ

Resinae Pini

Picis nigrae aa 100,0

Sebi taurini 25,0.

Colliquata in magdaleones redigantur. (*Ph. Dan.*)

Emplastrum sticticum

Crollii.

(Empl. defensivum rubrum *Ph. Dan.* 1840.)

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 360,0

Ceræ flavæ 20,0.

Colliquatis admisce

Terebinthinae Venetae

Olibani pulv. aa 20,0

Colcotharis Vitriolipraep. 30,0.

Fiant magdaleones.

Emplastrum stomachale

Berolinense.

Rp. Emplastri Plumbi simpl.

— Cerussae

Ceræ flavæ aa 40,0

Olei Rorismarini 5,0

— Menthae crisp. 3,0.

M. l. a. Fiant magdaleones.

Emplastrum sulfuratum.

Empl. Diasulfuris Rulandi. Empl. nigrum Bechholzii.

Rp. Resinae Pini 25,0

Asphalti subt. pulv.

Galbani dep. pulv.

Aquae aa 10,0.

Inter agitationem calore balnei vaporis liquando mixtis adde

Olei Lini sulfurati 20,0

Camphorae tritae 2,5

antea cum

Olei Terebinthinae 10,0

contrita. Agita, ut fiat massa aequalis, quam in ollam effundas et in ea asserves.

In *Schachtii suppl. Ph. Bor.* notatum:

Rp. Colophonii 45,0.

Liquatis et semirefrigeratis admisce

Myrrhae pulv.

Asphalti pulv. aa 10,0.

Tum adde

Ammoniaci depurati

Galbani depurati

Sagapeni dep. aa 10,0

in

Terebinthinae comm. 15,0

calore balnei vaporis soluta. Tum inter agitationem admisce

Olei Lini sulfurati

Olei Terebinthinae sulfurati

aa 20,0

et sub finem

Camphorae in Olei Olivar.

pauxillo solutae 3,75.

Fiat emplastrum nigrum, molle.

Emplastrum Tartari stibiati.

Empl. stibiatum.

Rp. Cerati Resinae Pini 8,5

Tartari stibiati subtilissime pulv. 1,5.

M. Paretur, quoties usus poscit. (Irritans, rubefaciens, pustulans.)

Formula magistralis Berolin.

Rp. Emplastri Plumbi comp. 60,0

Tartari stibiati subtilissime pulv. 15,0.

M.

Emplastrum contra tineam.

Empl. contra favum. *Grindpflaster*

Rp. Resinae Pini Burg. 160,0

Olei Olivarum 15,0.

Colliquatis immisce

Farinae triticeae 45,0.

Effunde in cistulas papyraceas et massam refrigeratam in taleolas dissecas. Sit coloris subfusi. (*Suppl. Ph. Bor. Schachtii.*)

Emplastrum de Tribus.

Rp. Emplastri mercurialis

— Conii

— Meliloti aa P.

M. l. a.

Emplastrum contra

Tussim

convulsivam.

Keuchhustemplaster.

Rp. Resinae Pini 120,0

Cerae flavae 65,0

Picis nigrae 15,0

Sebi taurini 5,0.

Liquatis adde

Opii pulverati 10,0.

Semirefrigeratis admiscee mixtionem e

Camphorae

Olei Caryophyllorum

— Menthae piperitae

— Thymi

— Rorismarini

— Cassiae cinnam. aa 1,0

paratam.

Usus. Tenuiter supra linteum, forma palmae minoris, extensum scrobiculo cordis (anticardio) applicatur. Septimo quoque die emplastrum recens paratum adhibetur; curatio medicamentis laxativis subinde sumendis adjuvatur.

Emplastrum contra Tussim Gölisii.

Rp. Gummi Arab. 9,0, Theriac., Rad. Beladonn., Tinct. Opii croc. aa 2,0, Mellis q. s.

M. f. massa, quae supra linteum extensa praecordii applicatur.

Emplastrum universale

Styriae.

Hofrathplaster.

Rp. Cerae flavae 35,0

Butyri recentis

Terebinth. Venetae aa 30,0.

Colliquatis immisce

Myrrhae pulv.

Aluminis usti aa 5,0

antea conterendo mixta. Postremo adde

Camphorae tritae 4,0

Croci pulverati 0,3.

Semirefrigerata infunde in capsulas e lamina alba confectas etc. Si hoc emplastrum ad manum non habeas, empl. fuscum camphoratum dispensa (ad usum mercatorium).

Emplastrum vermifugum.

Wurmpflaster.

Rp. Cerae flavae 100,0

Resinae Pini

Terebinthinae aa 25,0.

Liquatis admiscee

Herbae Sabinae

Radicis Asari aa 15,0

antea in pulverem subtilem redacta. Dein adde agitando liquorem commiscendo solvendoque leni calore paratum ex

Aloës pulveratae 20,0

Extracti Colocynthidis 10,0

Olei Absinthii aeth. 2,0

Spiritus V. alcoholisati 20,0.

Digere, donec Spiritus ex parte vaporatione consumptus fuerit. Massa agitata in scatulas e ferro stannato confectas immittatur.

Emplastrum supra linteum extensum abdomini applicetur.

Emplastrum vesicatorium

Drouoti.

Empl. (s. Taffetas s. Sericum) vesicatorium s. epispasticum Americanum *Ph. Hamb.* Empl. Mezerei cantharidatum. Taffetas vesicans. Empl. Drouoti.

Rp. Cantharidum pulv. 30,0

[¹] Carboni sulfurati 60,0.

Post macerationem in vas deturbatorium immissa

Carboni sulfurati 120,0

affundendo eluantur, tum massa, quam vas deturbatorium continet, supra orbem porcellaneum extensum, calore non adhibito, siccetur. Quo facto his Cantharidibus pulveratis affunde

Aetheris acetici 90,0.

Macera per dies octo, exprime et liquorem filtra. Pulveri residuo post expressionem superfunde tincturam, leni digestionem paratam e

Corticis Mezerei minutim conc. 10,0

Aetheris acetici 40,0.

Macera denuo per tres dies, tum fortiter exprimendo cola. Colatura filtrata cum priore tinctura e Cantharidibus ope Aetheris acetici effecta misceatur. In mixtura sic obtenta solve

Sandaracae 3,0

Mastiche 5,0

Terebinthinae Venet. 0,5

Balsami Copaivae 0,3.

Hac solutione penicilli ope iterum iterumque aequaliter illinatur

Tela bombycina nigra (*Taf-fent*),

quae antea solutione colata, parata ex Ichthyocollae 18,0

Aquae 180,0

Spiritus V. rectfss. 40,0

ope penicilli ter oblita, dein siccata est. Ad obducendam

Telam bombycinam centimetrorum quadrat. circiter 3000

sufficiat

Solutionis epispasticae tantum, quantum ex Cantharidum 30,0 Grammatis paratum est.

Signa: Ante applicationem latus niti-dum emplastri Spiritu Vini humectetur.

Rp. Cantharidum grosso modo [2] pulverat. 30,0

Corticis Mezerei concisi et contusi 10,0

Aetheris acetici 100,0.

Macera saepius agitando per octo dies et exprime. In liquore filtrato solve

Sandaracae 4,0

Elemi

Colophonii aa 2,0.

Haec solutio penicilli ope telae bombycinae magnitudine trium millium centimetrorum quadratorum expansae illinatur, quae antea solutione e

Collae piscium 20,0

Aquae destillatae 200,0

Spiritus 50,0

parata obducta est. (*Ph. Germanica.*)

Usus: Plerumque lamella haec pone auriculam agglutinatur (dolor dentium, cephalalgia).

Emplastrum de Vigo cum Mercurio.

Empl. cum Hydrargyro *Ph. Gall. Em-plâtre mercuriel Ph. Gall.*

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 200,0

Cerae flavae

Resinae albae aa 10,0

Ammoniaci subt. pulv.

Olibani subt. pulv.

Myrrhae sbt. pulv. aa 4,0.

Leni calore liquatis, mixtis et semirefrigeratis admisce

Croci subt. pulv. 2,0.

Dein adde

Hydrargyri vivi 60,0

antea diligenti agitatione cum

Terebinthinae larinicae 10,0

Styracis liquidi 30,0

Olei Lavandulae 1,0

extincta. Agita, dum mixtio refrigerat, et emplastrum malaxando in magdaleones redige.

Ex tempore.

Rp. Emplastri Hydrargyri 30,0

— Plumbi comp.

— oxycroci

Cerae flavae

Styracis liquidi aa 2,5

Olei Lavandulae *Gutt.* 5.

Liquando agitandoque in lebete ferreo misceantur.

Emplastrum de Vigo sine Mercurio.

Loco Empl. ranarum Vigonis.

Rp. Emplastri Plumbi comp. 60,0

Emplastri Conii 10,0

Olei laurini unguinosi

Cerae flavae aa 5,0.

Colliquatis admisce

Radicis Helleb. viridis

Olibani

Sandaracae

Myrrhae aa 2,0

Camphorae 0,25
 antea in pulverem subtilem commixta.
 Dein adde
 Styracis liquidi 1,0.

Emplastrum volatile.

Empl. Kirklandii. *Emplâtre volatil ou fondant.*

Rp. Emplastri Plumbi simpl. 20,0
 Resinae Pini
 Ceræ flavæ aa 5,0.
 Liquatis et semirefrigeratis admiscee
 Saponis Hispan. pulv. 10,0
 Ammonii muriatici sub-
 verati 3,0.

Usus: contra humores albos, indurationes.

Emplastrum vulnerarium Listeri.

Rp. Emplastri phenylati q. v.
Usus: Hoc emplastrum vulnere, quod tela bombycina Aqua phenylata madefacta obtectum est, superimponitur.

Emplastrum Zinci.

Rp. Cerussae zincicae (Zinci oxydati venalis) 10,0
 Olei Olivar. Prov. 15,0.
 Conterendo exacte mixtis adde
 Olei Olivar. Prov. 25,0
 Acidi stearinici 40,0
 Ceræ flavæ 10,0.

Inter agitationem calefiant, donec in massam aequabilem coierint. Dein sensim instilla inter agitationem

Aquae destill. 5,0.

Malaxando fiat emplastrum, in magdalides formandum.

Rp. Saponis oleïnici q. v.
 Solve in

Aquae communis calidae
 quantitate 10plici. Solutioni instilla
 tandem liquorem paratum ex

Zinci sulfurici P. 1

Aquae communis P. 10

quamdiu praecipitatum exoritur, quod aqua bene ablutum et calore leni ab humiditate liberatum loco Emplastri Plumbi simplicis ad Emplastrum Plumbi compositum parandum adhibeatur.

Emulsio Ammoniaci,

Asae foetidae, Guajaci etc.
 Emulsio Gummi-resinae alicujus. Lac Ammoniaci, Asae foet. etc. Emulsio ammoniacalis.

Rp. Gummi-resinae 10,0
 Gummi Arabici 5,0.

In mortario lapideo mixtis inter tendum paulatim adde

Aquae destill. calidae 100,0.

Fiat emulsio, quae post horam dimidiam decanthata dispensetur. Paretur, quoties usus poscit.

Emulsio Amygdalarum.

Emulsio amygdalina s. simplex s. communis. Mixtura Amygdalae *Ph. Brit.*

Rp. Amygdalarum dulcium ex-corticatarum 10,0

Aquae communis q. s.,

ut sint colaturae 100,0.

Fiat l. a. emulsio. Paretur, quoties usus poscit. *Ph. Germanica.*

Ph. Austr. Amygd. dulc. decort. 25,0,
 Sacchari 15,0, Colaturae 250,0.

Ph. U. St. Amygd. 6, G. Arab. 1,
 Sacch. 3, Aq. 100.

Ph. Gall. Amygd., Sacch. aa 50,0,
 Aquae 1000,0.

Eodem modo parentur:

Emulsio Cannabis sem.

- Cucurbitae sem.
- Melonum sem.
- Papaveris sem.
- Pistaciae sem.

Emulsio Amygdalarum composita.

Rp. Amygdalarum dulcium 20,0
 Seminis Hyoseyami 5,0.

Fiat cum

Aquae Amygdal. dilut. 320,0

l. a. emulsio. Colaturae adde

Sacchari albi 30,0

Magnesiae ustae 5,0.

Paretur, quoties usus poscit. *Ph. Germanica.* *Dos:* Cochlear thearium singulis horis vel cochlearia thearia duo (catarrhus, asthma, phlegmone).

Emulsio antidiarrhoica

Van-Swieten.

Rp. Concharum praeparat. 4,0

Farinae Hordei sem. 2,0
 Extracti Opii 0,15
 Aquae destill. 90,0
 Elaeosacchari Citri 8,0
 Syrupi simplicis 10,0.

M. l. a. S. Cochlear bihorio.

Emulsio antiphlogistica
 contra gonorrhoeam.

*Emulsion gegen Tripper im Entzündungs-
 stadium. Emulsio papaverina.*

Rp. Emulsionis Sem. Papaveris
 150,0

Natri nitrici 15,0

Syrupi emulsivi 10,0.

Solve et misce. S. altera quaque
 hora cochlear unum.

Rp. Emuls. Olei Papaveris 200,0

Natri nitrici

Kali sulfurici aa 10,0

Syrupi Sacchari 25,0.

Solve et misce. S. Altera quaque
 hora cochlear unum.

Emulsio Balsami
Tolutani.

Rp. Balsami Tolutani 2,0

Spiritus Vini (90 %) 0

Tinct. Quillajae aa 10,0

Aq. dest. calidae 78,0.

Balsamum in spiritu solutum cum
 Tinctura commiscetur, tum cum aqua,
 hanc paulatim addendo, conquassatur.
Ph. Gall.

Eodem modo parentur:

Emulsio Balsami Copa-
ivae *Ph. Gall.*

— **Olei Juniperi empy-**
reumatici *Ph. Gall.*

— **Picis liquidae** *Ph. Gall.*

Emulsio camphorata.

Rp. Camphorae tritae 1,0

Gummi Arabici 5,0

Spiritus V. rectifss. *Gutt.* 25.

Conterendo mixtis addantur

Sacchari albi pulv. 25,0,

dein paulatim immisceantur

Emulsionis Amygdalar. 250,0.

Dos.: Bihorio cochlear (sedativum

in mania, delirio tremente, satyriasi,
 nymphomania, chorea).

Ph. Fenn. Camph. 1,0, Spirit. 2,0,
 Gummi Arab. 7,0, Emuls. Amygdal.
 240,0.

Emulsio communis

Ph. milit. Bor.

Rp. Amygdalarum dulcium (vel
 Sem. Cannabis) 20,0

Aquae communis 250,0

Sacchari albi 10,0.

Fiat l. a. emulsio.

Emulsio Guajaci s. gua-
jacina.

Mixtura antarthritica Bergeri.

Rp. Resinae Guajaci pulv. 10,0

Gummi Arabici 5,0

Sacchari albi pulv. 15,0

Aquae Menth. pip. 150,0.

Misce l. a., ut fiat emulsio.

Emulsio gummosa.

Emulsio Amygdal. gummosa. Emulsio
 Arabica. Mixtura Amygdalae.

Rp. Emulsionis Amygdal. 90,0

Mucilaginis Gummi Arab. 10,0.

Misce. Paretur, quoties usus poscit.

Ph. Brit. Pulv. Amygdalae compositi
 10,0, Aquae destill. 80,0. Terendo
 in emulsionem redaeta per pannum
 musselineum cola.

Emulsio hydrocyanica.

(*Ph. Succ., Fenn.*)

Rp. Amygdalini 1,3.

Affunde

Emulsionis Amygdal. 100,0.

Macera per horam unam.

Nota. Continet 1 HCy in 1500 liquoris.

Emulsio laxativa
Viennensis.

Rp. Emulsionis Amygdal. 120,0

Mannae electae 40,0

Aquae Cinnamomi 5,0.

Solve et misce l. a.

Emulsio Moschi

Ph. Fenn.

Rp. Moschi pulv. 1,0

Sacchari pulv.

Gummi Arab. \widehat{aa} 3,0.

Aque Rosae 100,0.

Conterendo fiat emulsio.

Emulsio Olei Morrhuæ cum Phosphatibus.Emulsio Olei Jecoris Aselli phosphaticata. *Emulsion of Cod-Liver Oil with Phosphates.*Rp. Olei Jecoris Aselli 250,0
Mucilaginis Carrageenicae 100,0

Mucilaginis Acaciae

Glycerinae ana 50,0.

Misce, ut fiat emulsio, quam commisce cum solutione parata et

Calcii phosphorici

Natrii phosphorici \widehat{aa} 10,0

Aque destillatae calidae 30,0.

Tum adde

Odoramenti et Saporamenti alicujus *Gutt.* 10

solutas agitando in

Spiritus Vini 30,0

Syrupi Balsami Tolutani 50,0.

Emulsio bene agitata sumatur.

Emulsio Olei Morrhuæ lactico-phosphaticata.

Emulsio Jecoris Aselli cum Lactico-phosphate.

Rp. Olei Jecoris Aselli 250,0
Mucilaginis Carrageenicae 100,0

Mucilaginis Acaciae

Glycerinae \widehat{aa} 50,0.

Misce, ut fiat emulsio, quam commisce cum

Calcii lactici 15,0

Calcii phosphorici 7,5

Acidi phosphorici (20%) 10,0

solutis in

Aque destillatae 30,0.

Postremum admisce mixtionem paratum ex

Odoramenti et Saporamenti alicujus *Gutt.* 10

Spiritus Vini 30,0

Syrupi Balsami Tolutani 50,0.

Emulsio bene agitata sumatur.

Emulsio Olei Morrhuæ maltata.

Emulsio Olei Jecoris Aselli cum Extracto Malti.

Rp. Olei Jecoris Aselli 250,0
Mucilaginis Dextrinae 100,0.

In lagenam ingesta fortiter agita, ut in massam emulsivam transeant, tum admisce

Extracti Malti 200,0,

deinde

Odoramenti et Saporamenti alicujus *Gutt.* 10

solutas in

Spiritus Vini 5,0 (ad 15,0).

Emulsio oleosa.Rp. Olei Amygdalar. *P.* 2Gummi Arabici *P.* 1Aque destill. *P.* 17.Fiat l. a. Emulsio. Paretur quoties usus poscit. *Ph. Germanica.*

Sumantur ad parationem emulsionis Grammatum:

10,0 50,0 60,0 100,0 120,0 150,0 180,0

Ol. 1,0 5,0 6,0 10,0 12,0 15,0 18,0

Gm. 0,5 2,5 3,0 5,0 6,0 7,5 9,0

Aq. 8,5 42,5 51,0 85,0 102,0 127,5 153,0

Ph. Austriaca. Ol. Amygd. 10,0, Gm.

Arab. 5,0, Syr. Sacch. 10,0, Aq. 175,0.

Ph. Fenn. Ol. Amygd. 2, Syr. Amygd.

1, Gummi Arab. 1, Aq. 6.

*Form. magistr. Berolinens. in usum**paup.* Ol. Papav. 16,0, Gummi Arab.

8,0, Syr. Sacch. 16,0, Aq. 160,0.

*Ph. milit. Boruss.*Rp. Olei Olivar. Prov. *P.* 2Gummi Arabici *P.* 1Aque communis *P.* 16Sacchari albi *P.* 1.

Fiat l. a. emulsio. Portio plerumque aestimatur aequalis Grammat. 300, igitur emulge: Ol. 30,0, Gm. Arab. 15,0,

Aq. 240,0 et Sacch. 15,0.

Signa. Detur cochlear unum ad

duo secunda vel tertia quaque hora.

Emulsio oleosa concentrata duplex.*(Ad recepturam.)*Rp. Olei Amygdalar. 50,0
Gummi Arab. pulv. 25,0

Aquae destill. 37,5.

Misce l. a., ut fiat emulsio. Dein adde

Aquae destill. 137,5.

Serva in lagenis obturatis loco frigido, tempore aestatis ne ultra quinque dies. Liquor 250,0 expleat.

Emulsio Papaveris

vel communis Formul. magistr. Berol. in usum pauperum.

Rp. Seminis Papaveris 15,0

Aquae q. s.

Syrupi Sacchari 15,0.

Fiat emulsio, quae aequet 150,0.

Emulsio ad Papillas

mammillarum sauciarum.

Balsamum mammillare album. *Weisser Brustwarzenbalsam.*

Rp. Olei Amygdalar. 120,0

Gummi Arab. 60,0

Aquae dest. 90,0.

Misceantur l. a., ut fiat emulsio, cui adjicias

Balsami Peruv. 60,0

Gummi Arab. 30,0

Aquae destill. 45,0.

Tum statim bene agitentur, ut in emulsionem coeant. Dein admisce paulatim atque agitando

Aquae Rosae 200,0

Glycerini 100,0

Spiritus V. rectif. 60,0.

Serva in lagenis loco frigido. Emulsio agitata dispensetur.

Emulsio phosphorata.

Potio phosphorata.

Rp. Olei phosphorati 2,0,
quae continent 0,02 Phosphori soluti,

Gummi Arabici 10,0

Aquae destillatae 15,0.

Conterendo fiat massa emulsiva, cui addantur

Aquae Menth. pip. 123,0

Syrupi Sacchari 50,0.

(Emulsionis Grammata 100 contineant 0,05 Grammatis Phosphori.) *Dos.* Cochlear thearium bis terve per diem (scrophulosi, phthisis) infantibus. *Dosis* pro adulto phthisico: cochlear dimidium secunda vel tertia quaque hora. Coch-

lear dimidium continet circiter 0,0008 Grammatis Phosphori.

Emulsio Picis liquidae

(Jeanneli).

Rp. Picis liquidae

Natri carbonici cryst. pulv.

aa 10,0.

Conterendo intime mixta paulatim addendo

Aquae destil. 1000,0

et terendo diluantur. Liquor in lagenam ingestus fortiter conquassetur, tum per horas aliquot sepositus filtretur. *Dos.:* Singulis horis cochlear (catarrhus bronchialis, cystocatarrhus, gastritis).

Emulsio Picis liquidae mineralis.

Emulsio de Coaltar *Ph. Gall.*

Rp. Tincturae Quillayae coalta-
reatae P. 1

Aquae destill. P. 4.

Misce. Quantitas aquae a medico saepe determinatur.

Emulsio purgativa jalapinata.

Emulsion purgative avec la résine de Jalap.

Rp. Resinae Jalapae 0,5

Sacchari albi 5,0.

Conterendo mixta cum

Vitello ovi unius

commisce, tum adde

Sacchari albi 25,0

Aquae destill. 120,0

Aquae Aurantii flor. 10,0.

Fiat emulsio. Ex tempore paretur.

Dosis: Uno impetu sumatur (*Ph. Gall.*).

Emulsio salina

Ph. Fennicae.

Rp. Kalii tartarici 3,0

Emulsionis Amygdalar. 85,0

Syrupi Sacchari 12,0.

Misce.

Emulsio taenifuga.

Rp. Corticis Granati rad. 60,0

Aquae communis 600,0.

Macerentur per noctem unam, tum

ebulliant, ut colaturae sint 300,0. Colatura cum

Olei Ricini 30,0

Gummi Arabici 15,0

ad emulsionem conteratur.

Usus. Pridie vesperi harengam acetatam cum bulborum cepae majore copia edas, mane ad horam octavam partem dimidiam emulsionis, tum hora una praeterlapsa alteram partem emulsionis sumas.

Emulsio taenifuga

Radius.

Rp. Olei Terebinthinae 20,0

Gummi Arabici 7,5

Aquae Chamomill. 175,0

Aetheris 7,5.

Misce, ut fiat emulsio. S. Agitatione peracta, mane et vespere cochlearia tria sumantur.

Emulsio terebinthinata.

Terpentinölemulsion (Ph. milit. Fenn.)

Rp. Olei Terebinthin. 5,0

Vitellum ovi unius (v. 20,0)

Syrupi Sacchari 25,0

Aquae dest. 100,0.

M. f. emulsio. (Neuralgia, cystitis.)

Emulsiones.

Emulsio ex semine in genere conficiatur ex

Seminis P. 1

Aquae destill. q. s.

ad colaturam partium decem (10).

Emulsio ex oleo pingui paretur ex

Olei P. 10

Gummi Arab. P. 5

Aquae destill. q. s.,

ut pondus emulsionis partes centum (100) expleat (*Ph. Germ.*) vel partes ducentae (200) expleat (*Ph. Austr.*)

Enema Aloës.

Clyisma s. clyster Aloës.

Rp. Aloës 2,5

[¹] Kali carbonici 1,0

Conterendo mixta solve in

Mucilaginis Amyli 300,0.

Ph. Brit.

Rp. Aloës 1,0.

Solve in

[²] Glycerinae 5,0

Aquae 120,0.

Tum admisce

Farinae Hordei 10,0.

S. Enema contra ascarides, oxyures etc.

Enema amylaceum.

Lavement à l'amidon.

Rp. Amyli 15,0

Aquae frigidae 100,0.

Mixtis inter agitationem adde

Aquae ebullientis 400,0.

Ph. Gall.

Enema analepticum

Jeannel.

Stärkendes Klystier.

Rp. Salep pulv. 1,5

Aquae destill. fervidae 25,0.

In mucilaginem redactis admisce

Extracti Carnis 5,0

Vitellum ovis unius

commixta cum

Aquae destill. 100,0

Vini rubri 30,0—50,0.

Loco Extracti carnis et aquae etiam decoctum carnis adhibere potes.

Enema anodynum

Jannel.

Rp. Decocti Althaeae radices

Aquae destillat. aa 100,0

Tinct. Opii crocat. *Gutt.* 5—20.

Misce. *Us.* Colica nervosa, dysmenorrhoea colica uterina, diarrhoea etc.

Enema anthelminticum

(Kempster).

Rp. Acidi carbolicus 0,015.

Solve in

Aquae destill. 125,0.

D. S. Enema unum (contra ascarides).

Enema Asae foetidae.

Enema foetidum. Enema antispasmodicum.

Rp. Asae foetidae dep. 3,0 (—5,0)

Vitellum ovi unius

Decocti Althaeae rad.

Aquae Chamomillae aa 125,0.

Misce l. a., ut fiat emulsio. Haec quantitas enematis duobus vel tribus

per diem sufficit. *Vis antispasmodica* (colica hysterica, dysmenorrhoea, neuralgia hysterica).

Ph. Brit. Asae foet. 2,0 et Aq. dest. 120,0. Conterendo fiat emulsio.

Enema Asae foetidae compositum.

Enema antispasmodicum (Mialhe).

Rp. Asae foetidae 1,0

Vitellum ovi unius

Kali carbonici cryst. 0,5

Infusi Valerianae rad.

Aquae Valerianae aa 100,0.

M. f. emulsio. Hac copia emulsionis enematis duabus vel enemati uno sufficit. *Vis ei enematis antehac notati aequalis est.*

Enema commune.

Rp. Crimnorum Avenae (Avenae decorticatae) 5,0

Aquae destillatae 500,0.

Coquantur ad colaturam 300,0, in quibus solvantur

Salis culinaris 10,0.

Tum conquassando admisce

Olei Olivarum 15,0.

Enema laxativum.

Lavement laxative.

Rp. Melliti Mercurialis 100,0

Aquae 400,0.

Misce. *Ph. Gall.*

Enema laxativum lenius.

Mildes Laxirklystier.

Rp. Glycerinae purae 1,5 (—2,0 —3,0)

Aquae destill. 1,0 (—1,5—2,0).

Misce. Quantitas prima sufficit infanti parvo, si opus fuerit, volumine aquae triplice diluta. Quant. secunda infantibus majoribus et tertia adultis sufficiunt. Liquor antea ad 40° C. calefaciendus est.

Enema Magnesia sulfuricae.

Rp. Magnesia sulfuricae 30,0

Mucilaginis Amyli 450,0

Olei Olivarum 28,0.

M. et solve. *Ph. Brit.*

Enema Nicotianae.

Enema Tabaci.

Rp. Foliorum Nicotianae 1,0

Aquae destill. fervid. 300,0.

Seponae per horae quadrantem et cola.

Enema Opii.

Rp. Amyli 10,0

[¹] Aquae frigidae 25,0.

Mixtis adde

Aquae destill. fervidae 250,0.

Quum in unum coierint, addatur

Tincturae Opii 0,5.

Rp. Tinct. Opii simpl. (10%) 1,0

[²] Mucilaginis Amyli 60,0.

Misce. *Ph. Brit.*

Enema purgativum.

Lavement purgatif Ph. Gall.

Rp. Fol. Sennae 15,0

Aquae ebullientis 500,0.

Mixta per horam dimidiam seposita cola. In colatura solve

Natri sulfurici 15,0.

Enema Terebinthinae

(Soubeiran).

Rp. Olei Terebinthinae 15,0 (—30,0)

[¹] Vitellum ovi unius.

Conterendo mixta diluantur

Mucilaginis Amyli 300,0.

Rp. Olei Terebinth. 28,0

[¹] Mucilag. Amyli 450,0.

Misce. *Ph. Brit.*

Usus: Contra ascarides, lumbricos, neuralgias.

Epithema ad contusiones.

Quetschungswasser.

Umschlag für Quetschungen.

Rp. Ammonii chlorati 15,0

Aquae 300,0

Aceti 150,0.

Solve et misce. Panni lintei compressi liquore humefaciantur, quibus partes corporis contusas amplectuntur.

Ergotinum.

Omnia Ergotina, quae adhuc in mercaturaveniunt, postulatibus medicorum non conveniunt, quam ob rem Secale cornutum semper praefendum

est. *Dosis*: Secalis cornuti: 0,3—0,5—1,0 bis terve per diem (in morbis chronicis, haemorrhagia uterina, haemoptoe, purpura, cystoparalysi).

Ergotininum (*Tamret*) vel Ergotininum citricum solutum (*Gehe*) a nonnullis medicis non laudatur.

Si medicus Ergotinum praecipit extractum Secalis cornuti (conf. idem) dispensetur.

Paratio Ergotini et Cornutini, in *pharmaceutischer Post*, 1888, *Wien*, pag. 343, notata est.

Esca vulpium.

Fuchs-Witterung.

Rp. Camphorae 4,0
Asae foetidae aa 8,0
Zibethi 1,0
Rhizomatis Iridis Florent.
Radiciis Valerianae aa 12,0
Seminis Foeniculi 100,0
Olei Anisi 1,0.

M. f. pulvis.

Rp. Olei Oliv. Prov. 50,0
Tincturae Moschi 5,0.
M. Pulvis et liquor simul dentur.

Eseridinum,

alcaloïdes fabae Calabaricae, Eserino s. Physostigmino ne confundatur. Eseridinum cum quoque acido diluto mixtum calore in Physostigminum venosum transit. Eseridinum anno 1890 inventum est. Modus parandi incognitus.

Essentia Ananas.

Ananasessenz.

Rp. Aetheris butyrici P. 10
Spiritus V. rectif. P. 100
Essentiae Citri cort. rec.
Essentiae Aurant. cort. rec.
aa P. 1.

M.

Nota. Ad parationem potionum saccharo commiscendo cum hac essentia quantitates parvae Acidi citrici addantur.

Essentia Anisi.

Essence of Anise Ph. Brit.

Rp. Olei Anisi 2,0
Spiritus Vini (90%) 8,0.
Misc. *Dos.*: Gutt. 15—30.

Eodem modo paretur:

Essentia Menthae piperitac. *Essence of Peppermint Ph. Brit.*

Essentia antiphthisica
(Retschy).

Rp. Extracti antiphthisici 5,0
Aq. Lauro-Cerasi 20,0.

Solve et misce. S. Ter per diem guttae 30—50 (sudor colliquativus, diarrhoea mucosa).

Essentia Aurantiorum corticis recentis.

Rp. Corticis Aurantiorum recentis concisi P. 1.

Affunde

Spiritus Vini alcoholisati P. 5.
Macera per dies tres, exprime et filtra.
Eodem modo paretur

Essentia Citri corticis recentis.

Essentia Chinae

Battleyi.

Liquor antineuralgicus Battley.

Rp. Corticis Chinae reg. pulv. 100,0

Sacchari albi

Glycerini aa 15,0

Spiritus Vini rectfss. 100,0

Aquae fervidae 800,0.

Digere per aliquot dies, tum exprime. Liquorem expressum sepone per aliquot dies, dein filtra. Colatura evaporando ad 45,0 redacta commisceatur cum Spiritus Vini rectf. 5,0

et servetur. (*Arcanum.*) *Dosis*: Guttae 10—40 ter quaterve per diem unum.

Essentia Cydoniorum.

Aether pelargonicus dilutus. *Quittenessenz, Cognacessenz.*

Rp. Olei Rutae P. 3
Acidi nitrici (pond. sp. 1,185) P. 1

Aquae destill. P. 4.

Conquassando optime mixtae in ecurbitam vitream ingerantur et ad ebullitionem calefiant. Tum sepone per heb-

domadem, primum saepius agitando. Post hoc tempus stratum aquosum inferius l. a. separa et, leniter calefaciendo maxima parte Acidi nitrici adhaerentis evaporata, cum

Spiritus V. alcohol. P. 10
commisce. Sepone loco tepido (20—30° C.) per 4 hebdomades, tum destillando elice P. 11—12.

Essentia depuratoria

Lemoine.

Essentia horologii. *Essence Lemoine.*
Uhrenessenz.

Rp. Benzoli lithanthracini puri
100,0

Olei Bergamottae

Olei Naphae aa *Gutt.* 3.

Misce. *Usus*: Ad depurationem machinarum horariarum.

Essentia Fragorum.

Erdbeeressenz.

Rp. Essentiae pyreo-aetherae P. 1

— Iridis Florentinae P. 3.

M.

Essentia fumalis.

Tinctura fumalis. *Räucheressenz. Räucherbalsam.*

Bp. Tincturae Benzoës 40,0

[¹] Olei Bergamottae

Balsami Peruv. aa 10,0

Styracis liquidi

Olei Citri corticis

— Caryophyll. aa 5,0

— Neroli 3,0

— Lavandulae

— Cassiae cinn. aa 1,0

Moschi 0,06

Spiritus V. rectfss. 50,0.

Mixta stent per aliquot dies, tum filtrentur.

Usus: Laminis ferreis calefactis infunditur vel parva copia in cuniculum fornacalem calidum injicitur.

Rp. Balsami Peruviani 20,0

[²] Tincturae Benzoës 80,0

Aquae Coloniensis 120,0

Acidi acetici conc. 5,0

Tincturae Moschi 0,5.

M.

Rp. Corticis Cascarillae

[³] Seminis Amomi

Olibani aa 40,0

Benzoës 120,0

Styracis liquidi

Nucum moschat. aa 60,0.

Contusis affunde

Spiritus V. rectfss. 2500,0.

Digere per biduum, tum exprimendo cola. Colaturae admisce

Olei Caryophyllorum

— Cassiae cinnamomeae

— Bergamottae

— Citri corticis

— Lavandulae

Balsami Tolutani

Balsami Peruviani aa 10,0.

Moschi 0,05.

Sepone per aliquot dies et saepius agita, tum filtra.

Essentia Iridis Florentinae.

Rp. Radicis Iridis Florentinae optima
concisae P. 1

Spiritus Vini rectfss. P. 6.

Immitte in vas destillatorium et elice calore balnei vaporis P. 5, quae superfundas

Radicis Irid. Flor. concis. P. 1.

Macera per aliquot dies, exprime et filtra.

Essentia ad Limonadam.

Limonadenessenz.

Rp. Acidi citrici 10,0

Sacchari albi 150,0

Essent. Citri cort. recentis 2,5

Aquae Naphae 25,0

Aquae destillatae 100,0

Spiritus Vini rectfss. 25,0.

L. a. e Saccharo syrupus efficiatur, cui substantiae aliae addantur. Si opus est, liquor filtretur.

Essentia Malorum Gallicorum.

Renettenessenz.

Rp. Essentiae piro-aeth. P. 20

Aetheris valerian. P. 1—2.

M.

Essentia pireo-aetherea.Oleum Pirorum. *Pear-oil. Birnenöl.*
*Birnenessenz.*Rp. Amyloxydi acetici *P.* 30
Aetheris acetici *P.* 3
Spiritus V. rectif. *P.* 167.

M.

Nota. Ad parationem potionum saccharo commiscendo cum hac essentia, quantitates parvae Acidi citrici addantur.**Essentia pomata-aetherea.**Oleum Pomorum. *Apple-oil. Aepfelöl.*
*Aepflessenz.*Rp. Amyloxydi valerianici *P.* 1
Spiritus V. rectif. *P.* 7.

M.

Nota. Cf. notam sub Essent. pireo-aetherea.**Essentia Prunorum Brigantiacorum.***Reineclaudenessenz.*Rp. Essentiae pireo-aeth. *P.* 300
Aquae Amygdalarum amar.
concentratae *P.* 20
Olei Bergamottae *P.* 1.

Mixtae stent per aliquot dies, dein filtrantur.

Essentia Ribium rubrorum.Rp. Essentiae Rubi Idaei *P.* 200
— pireo-aeth. *P.* 100
— cort. Citri rec. *P.* 5.

Misc.

Essentia Rubi Idaei.*Himbeeressenz.*Rp. Essentiae Irid. Flor. *P.* 25
Aquae Rubi Id. decupl. *P.* 100
Essentiae Ananas *P.* 5.

Misc.

Essentia Sarsaparillae

(v. Arnim).

*Sassaparilleessenz.*Rp. Rad. Sarsaparillae 100,0
Aquae destill. 1800,0.

Coque per horam dimidiam, tum post horas duas exprimendo cola. Colaturam

Hager.

deinde per chartam filtratam evapora usque ad 90,0, quibus

Spiritus Vini Gallici 10,0

admisce. *Dosis:* Bis quaterve per diem cochlear repletum commixtum cum infuso Theae St. Germain vel fol. Sennae. Cochlear repletum solubile radice Sar-sap. 15,0 continet.**Eucalyptolum.**Eucalyptolum $C_{20}H_{18}O_2$.

Rp. Olei Eucalypti globuli q. v.

[¹] Destillationi refractae subijce et liquorem calore inter 169 et 180° C. transitum in balneum glaciale impone, cujus temperatura — 5° ad — 10° (frigoris) applicat. Post horam unam congelatio finita est. Tum partem liquidam ab massa congelata defunde. Haec massa congelata Eucalyptolum repraesentat et calore 1° C. liquescit. Sit liquor limpidus odoris camphorei menthalis, pd. sp. 0,940. Servetur in lagenis parvis, plane repletis et dense obturatis, loco a luce remoto. *Dosis:* 0,2—0,3—0,4 quater quinquiesve per diem (catarrhus, inflammationes in thorace, asthma, blennorrhoea, bronchitis etc.). Ad inhalationes praecipue adhibetur. Desinficiens et anodinum ad vulnera (1,0:5,0 adip. vel olei pinguis).

Rp. Olei Eucalypti q. v.

In balneum refrigeratorium (—10°) impone et

[²] Acidum hydrochloricum gasiforme

tamdiu induc, donec pars olei dimidia in massam crystallinam transierit. Hanc massam, liquorem defundendo, separa et in aquam fervidam ingerendo liquatam agita, tum decantha et denuo cum aqua fervida conquassa, ut ab acido hydrochlorico liberetur. Deinde destillationi subijce et partem calore 170—180° C. transeuntem collige. Pd. sp. 0,930—0,940.

Eulyptolum.Antiseptolum. *Eulyptol (Schmeltz).*

Rp. Acidi salicylici 60,0

Acidi carbolici cryst. 10,0.

Conterendo mixtis adde

Olei Eucalypti 10,0

et denuo contere, ut fiat massa aequalis. Massa in Spiritu, Aethere, Chloro-

formio solubilis, in aqua insolubilis. In miscela spiritus et glycerinae ^{aa} solubilis, etiam in liquore Ammonii caustici et liquoribus alcalium causticorum. Antifermentivum et antisepticum. *Dos. intern.*: 1,0—1,5—2,0 bi—trihorio (antiphlogisticum, arthritis rheumatica). In curatione vulnere Jodoformio, Sublimato corrosivo, Phenolo hoc Eulyptolum praefertur.

Evonymina.

Evonyminum. Euonyminum.

Paretur e cortice Evonymi atropurpurei (Americani) *Jacquin*.

Tinctura spirituosa concentrata corticis cum aqua miscetur. Praecipitatum inde exortum siccatum in pulverem, tendo in mortario porcellaneo, redigitur.

Evonyminum fuscum
e cortice radices,

Evonyminum viride

e cortice ramorum comparantur. Constant ex oleo aethereo et resina. Antihypocica, purgativa. In morbis hepaticis saepius adhibentur. *Dosis*: 0,1—0,2—0,4 cum extracto Belladonnae vel Hyoscyami combinata. Vis valde purgativa. *Dos. maxima*: 0,5, pro die 1,0!

Explementum metallicum ad Dentes.

Rp. Cadmii *P. 1*

Hydrargyri *P. 3.*

In vase clauso calore modico liquentur.

Extractum Absinthii.

Rp. Herbae Absinthii siccatae et concisae *P. 2*

Spiritus Vini rectfss. *P. 2*

Aquae communis *P. 8*

superfusae per viginti quatuor horas digerantur, tum exprimantur. Residuum, denuo affusis

Spiritus Vini rectfss. *P. 1*

Aquae communis *P. 4*

eadem ratione tractetur. Liquores commixti et filtrati ad extractum spissius (grad. II) redigantur.

Extractio modo deturbatoria semper praeferenda est. Post macerationem per dies duos ad modum deturbatorium progrediatur.

Sit extractum fuscum, in aqua turbide solubile. *Ph. Germanica.*

Eodem modo parentur:

Extractum Chamomillae florum.

— **Millefolii** Achilleae
herb. floresc. sicc.

Extractum Aconiti Herbae.

Extractum Aconiti herbae alcoholicum.

Rp. Herbae Aconiti recentis (florescentis) *P. 20.*

Concisae et aquae *P. 1* conspersae in mortario lapideo contundantur et ope preli fortiter exprimantur, quae operatio, additis

Aquae *P. 3*

repetatur. Liquores mixti et colati in balneo vaporis temperaturae ad 80° Cels. therm. usque inter perpetuam agitationem ad

Partes 2 remanentes

evaporent, quibus refrigeratis admisce

Spiritus V. rectfss. *P. 2.*

Seponere tum per 24 horas et interdum agita.

Dein mixturam in filtrum linteum immitte et, liquore separato, residuum fortiter exprime, quod cum

Spiritus V. rectf. *P. 1*

mixtum per horam digere, tum exprime.

E liquoribus commixtis filtratisque destillando (in congestiore vaporario) Spiritu Vini elicto, liquor residuus, leni calore balnei vaporis ad extracti spissioris densitatem (tertii gradus) inter continuatam agitationem redigatur. *Vis*: neurotica, antineuralgica. *Dos. maxima*: 0,2, pro die 1,0!!

Hoc extractum herbae Aconiti et Extractum Aconiti vel tuberum Aconiti valde differunt. Ne commutentur!

Eadem ratione parentur:

Extractum Apii Petrose- lini ex hb. florescente.

— **Asparagi** offic. turionum.
Grad. II. consist.

— **Belladonnae** foliorum
et ramulorum florecentium.
Dosis: 0,01—0,02—0,04. *Dos. maxima*: 0,05, pro die 0,2!!

Extractum Calendulae offic. ex herba florescente.

- **Chelidonii** ex herba florescente.
- **Colchici** autumnalis e bulbo recenti. *Dos.*: 0,05—0,1—0,2 plur. p. diem.
- **Conii (maculati)** e foliis et ramulis florescent. *Dos. max.*: 0,2, pro die 0,6!!
- **Convallariae** majalis flor. et herb. rec.
- **Digitalis** e foliis et ramulis florescentibus. *Dos. max.*: 0,2, pro die 1,0!!
- **Gratiolae** herbae. *Dosis magna* purgativa: 1,0.
- **Hyoseyami** Scopoliae (Scopolinae atropoidis) herbae florescentis.
- **Hyoseyami nigri** e foliis recentibus et ramulis florescentibus. Antipyreticum. *Dosis*: 0,02—0,05—0,15. *Dos. maxima*: 0,2, pro die 1,0!! (*Ph. Austr.* pro die 0,5!!).
- **Lactucae (virosae)** ex herba florescente. *Dos. max.*: 0,6, pro die 2,5!!
- **Pulsatillae** (Anemones pratensis et Pulsatillae Linn.) ex hb. florescente. *Dos. max.*: 0,2, pro die 1,0!!
- **Stramonii** ex hb. foliis et ramulis florescentibus. *Dos. max.*: 0,1, pro die 0,4!!
- **Taxi baccatae** ex hb.
- **Toxicodendri** Rhois ex herbae. *Dos.*: 0,01—0,02—0,03 plur. p. diem (paraplegia).

Extractum Aconiti (tuberum).

Extr. Aconiti.

Rp. Tuberum Aconiti (Napelli) P. 2.

Grosso modo pulveratis affunde

Spiritus Vini rectif. P. 3.

Macera per duos dies in vase clauso, saepius agitando, tum massam in apparatus depulsorium transgestam paululum comprime et affundendo

Spiritus Vini rectif.

extrahe. Colatur afiltrata, Spiritu destillando ex parte elcito, evaporando ad extractum spissum redigatur. Antineuralgicum. *Dosis*: 0,005—0,01—0,02. *Dos. maxima*: 0,03, pro die 0,12!!

Extractum Aconiti siccum.

Confer Extractum siccum narcoticum.

Extractum Aloës Acido sulfurico correctum.

Rp. Extracti Aloës P. 40.

Solve in

Aquae destill. P. 120.

Solutis guttatim admisce

Acidi sulfurici conc. puri P. 5.

Mixtum tum evaporando leni calore et exsiccando ad quarti (IV) gradus extracti consistentiam redige. Serva in vitris bene obturatis. *Dosis purgans*: 0,05—0,2 et *Dos. drastica*: 0,5—1,0.

Extractum Aloës alcoholicum.

Aloë depurata.

Rp. Aloës lucid. contusae q. v.

Solve Spiritus Vini rectificati quantitate sufficiente, tum filtra et liquorem in vase porcellaneo ad siccum evapora. *Ph. Belg.*

Eodem modo paretur:

Extractum Catechu s.

Catechu depuratum. (*Ph. Gall.*)

Extractum Aloës

(aquosum).

Rp. Aloës lucidae P. 1.

In pulverem redactae affunde

Aquae dest. fervidae P. 5.

Macera per 48 horas et saepius agita, tum liquor decanthatus coletur et in patina porcellanea calore balnei vaporis evaporando et optime exsiccando ad IV gradus consistentiam redigatur.

Extractum praebet cum aqua solutionem subturbidam. Stomachicum, drasticum. *Dosis stomachalis*: 0,01—0,02—0,03. *Dos. drast.*: 0,5—1,0.

Eodem modo paretur:

Extractum Myrrhae.

Extractum amaricans.

- Rp. Extracti Trifolii
 — Rhei
 — Centaurei min.
 — Cardui bened.
 — Millefolii aa *P.* — *M.*

Extractum amarum.

Rp. Extract. Absinth., Gentian., Trifolii aa *P.* — Misc.

Extractum Anthemidis

Ph. Brit.

Extr. Chamomillae *Ph. Brit.*

- Rp. Florum Anthemidis 400,0
 Aquae destill. 5000,0.

Coquendo ad volumen dimidium redacta exprimendo cola, tum filtra. Liquorem filtratum evaporando ad spissitudinem extracti densioris redactum commisce leni calore cum

Olei Anthemidis aeth. 1,0.

Ph. Brit.

Extractum Arnicae Radicis.

- Rp. Radicis Arnicae siccatae *P.* 1.

Concisae affunde

Spiritus Vini rectfss.

Aquae destill. aa *P.* 2

vel quantum hujus mixturae opus sit, ut perfecte immergatur. Digere per triduum et interdum agita. Tum ope preli exprime. Residuum, denuo affusis

Spiritus V. rectfss.

Aquae destill. aa *P.* 1,

per horas viginti quatuor macera. Colaturae commixtae colando filtrandoque depuratae, destillatione ex balneo aqua a Spiritu ex parte separatae, adhuc calidae per pannum laxum colatae, evaporando in balneo aquae inter agitationem ad spissitudinem (II *gradus*) extracti redigantur. Si inter evaporationem partes resinosaes discedunt, Spiritus vini paululum addendum est.

Extractio modo deturbatorio semper praefenda est. Post maccrationem per dies duos ad modum deturbatorium progrediatur, affundendo Spiritum Vini (90%) dilutum aequali volumine Aquae destillatae.

Eadem ratione parentur:

Extractum Agarici albi;

Grad. IV. consistent.

- **Apocyni** cannabini e radice.
- **Arnicae** florum.
- **Astragali** exscapirad.
- **Aurantiorum** cort.
- **Aurantii pomor.** immaturorum.
- **Belae** (fructus non plane maturi siccati Aegles marmeli).
- **Brayerae** anthelminthicae s. **Kouso** (*Ph. Fenn.* Extractio Spirit. V. rectfss. efficiatur). Anthelminticum.
- **Bucco** folior. (Barosmae crenatae). *Dos.*: 0,3—0,6 ter p. d. (cystocatarrhus, enuresis).
- **Caincae** radicis (Serpentariae Brasiliensis).
- **Calami** (aromat.) rhiz. *Ph. Germ.* Menstr. Spirit. p. 10, Aq. 15. Mixt. Maccratio p. dies 4 et diem 1.
- **Capitum Papaveris** immaturorum, exemptis seminibus. *Ph. Bri.* *Dosis*: 0,1—0,3 ter quaterve p. d.
- **Capsici annui.** *Dos.*: 0,03 - 0,1.
- **Cascarae Sagadrae** cort. *Dos.*: 1,5—2,5—4,0.
- **Catechue** pulvere grosso.
- **Chimophilae umbellatae** ex herb. rec. siccata.
- **Cocae**, fol. Erythroxyli Cocae. Anthelminticum.
- **Coffeae** e fabis immutatis et grosse pulv. (*Dos.*: 0,1—0,25—0,5 loco Coffeini.)
- **Colombo** s. **Calumbae** rad. Grad. IV. consist.
- **Conii macul. Seminis.**
- **Corticis adstringentis** Brasiliensis s. **Corticis Barbatimao.**
- **Croci.** *Dos.*: 0,1—0,2—0,4.

Extractum Fuci vesiculosi.

- **Gelsemii** (sempervirentis) rhiz. et rad.
- **Granati** rad. corticis.
- **Guajaci** e ligno.
- **Hamamelis** Virginicae cort. Hoc extractum *Hazolina* nominatur.
- **Hamamelis** (Virg.) fol.
- **Helenii** (Inulae) e rad.
- **Hellebori nigri** rad.
- **Hellebori viridis** rad.
- **Levistici** (Ligustici) e radice.
- **Liriodendri** Tulipiferae (Magnoliaceae) e cort.
- **Lobeliae** inflatae ex hb. *Dos.*: 0,05—0,2.
- **Matico**, fol. Piperis angustifolii.
- **Menyanthis** i. q. Extr. Trifolii.
- **Nicotianae** rusticae vel Tabaci foliorum. *Dosis*: 0,05—0,1 bis terve per diem. In clysmate 0,1. In unguine 1,0: 5,0—10,0 ungt. Contra alopeciam 1,0: 10,0 medullae.
- **Oleae** Europaeae foliorum. *Dos.*: 0,1—0,3 plur. p. diem (neuralgia intermittens).
- **Osmundae** regalis sive
- **Filicis floridae** e radice. *Dos.*: 5,0—10,0 pro die (scrophulosis, helminthiasis, herniae).
- **Papaveris** capitum. Conf. supra: Extr. Capit. Pap.
- **Pastae Guaranae.**
- **Pimpinellae** radicis.
- **Pini** turionum.
- **Pyrolae umbellatae** ex herba rec. siccata.
- **Rhamni Purshiani** (Cascarae Sagadrae) cort.
- **Rhei** (spirituos.), *Ph. Germ.* praecipit menstr. e Spirit. p. 2 et aq. p. 3. Grad. IV. consist.
- **Rutae** graveol. ex herb.

- Extractum Sabadillae** seminis. *Dos.*: 0,01—0,02 ter quaterve p. diem (neuralgia).
- **Sabinae** Juniperi herb. *Dos.*: 0,05—0,1—0,2. *Dos. maxima*: 0,2, pro die 1,0!!
- **Salviae** foliorum.
- **Sarsaparillae** radicis.
- **Senegae** radicis. Grad. IV. consist.
- **Simarubae** corticis.
- **Tanaceti** vulg. ex herba florente.
- **Taxi baccatae** e sem.
- **Turionum Pini** silvestris. Ad balneum 25,0—50,0.
- **Valerianae**, Grad. III. vel II. consist.
- **Violae tricoloris** herbae florescentis.

Extractum Artemisiae.

Rp. Radicis Artemisiae vulgaris diligenter siccatae et grosse pulveratae P. 1.

Affunde

Spiritus V. rectfss. P. 5.

Digere per tres dies, tum in apparatus deturbatorium transgestae affundendo

Spiritus V. rectfss. q. s.

extrahantur. Colaturam filtratam calore balnei vaporis, Spiritu destillando (ope congestoris vaporarii) elicitio, ad spissitudinem mellis vel extracti tenuioris redige. Eff. 9 ad 10 pCt. Antiepilepticum, choream sedans. *Dos.*: 0,2—0,5 pluries per diem.

Eadem ratione parentur:

- Extractum Cannabis Indicae** (III. const.). Sedativum, antispasmodicum. *Dos. max.*: 0,1, pro die 0,4!! (0,3 *Ph. Austr.*)
- **Mezeri** e cort. minutim conciso (spissitudinis mellis *Ph. Germ.*). Externum. In unguine 1,0: 10,0 Lanolinae.
- **Petroselini** e fructibus recentibus Apii Petroselini (Grad. I. consist.).
- **Piperis nigri.**

Extractum Cantharidum acetosum.

Rp. Cantharidum grosso modo pulv. *P.* 2.

Affunde

Spiritus *V.* alcohol. *P.* 12

Aceti concentrati *P.* 1.

Digere per 24 horas et exprimendo cola. Fluidum in lebetem porcellaneum immisum inter agitationem atque leni calore ad extracti secundi (II) gradus consistentiam evaporetur. *Usus:* Stratum tenue chartae illitum et epidermidi impositum post horam vesicam efficit.

Extractum Cantharidum (aethereum).

Rp. Aetheris cantharidati q. v.

Lenissimo calore ad spissitudinem mellaginis evaporetur.

Extractum Cardui benedicti.

Rp. Herbae Cardui benedicti siccatæ et concisæ *P.* 1.

Commisce cum

Aquæ destill. bullientis *P.* 6 vel quant. sufficit, ut mixtio pulvem fluidiorem referat. Sepone per horas decem, tum ope preli exprimendo liquorem separa. Residuo iterum

Aquæ destill. bullientis (*P.* 4) quantitatem minorem quam antea affunde. Macera denuo per horas quinque et ope preli exprime. Liquores obtenti commixti, sedimentando, decanthando colandoque depurati inter assiduum agitationem ad volumen dimidium evaporando redigantur. Tum sepone loco frigido per 36 horas. Postremo fluidum a sedimento defusum in vase porcellaneo vel stanneo calore balnei vaporis inter continuatam agitationem ope spatulae lignæ ad secundi (II) gradus extractorum consistentiam evaporetur. *Effic.* 22—25pCt.

Eadem ratione parentur:

Extractum Bardanae e radice sicca.

— **Betulae** fol. sicc.

— **Buxi** radice siccae.

Extractum Carlinae s. Cardopatiæ radiceis.

— **Centaurei minoris** ex herba siccatæ.

— **Cichorii** e radice et foliis siccis.

— **Chinae** *Ph. Austr.*, e cortice Cinchonæ succirubrae.

— **Dulcamarae** e stipitibus sicc. *Dos.:* 0,5—1,0 pl. p. diem.

— **Frangulae** Rhamni e cortice (ante annos tres collecto). Gradus IV. consist.

— **Fumariae** ex herba florescente sicca.

— **Marrubii** albi ex herba florescente sicca.

— **Paireirae** bravæ e radice sicca.

— **Polygalae** amaræ et amarella ex herba florescente sicca.

— **Rhamni** Frangulae e cort. vetulo. Grad. IV. consist.

— **Rhei** rad. mundati. Grad. IV. consist.

— **Rubiae** tinctoriae e radice sicca.

— **Saponariae** e radice.

— **Sennae** foliorum.

— **Taraxaci** ex hb. et rad. sicca. *Ph. Germ.* praecipit aq. frigid. et macerationes per horas 48 et 24 permanentes.

— **Trifolii** ex herba sicca.

— **Uvae Ursi** (Arbuti) foliorum. Grad. IV. consist.

— **Verbenae** officinalis ex herba floresc. Grad. IV. consist.

Extractum Carnis.

Rp. Carnis muscularis bovinae recentis, a pinguedine accurate liberatae et in frustula dissectae *P.* 100.

In mortario lapideo per horam dimidiam contendantur, ut fiat puls tenerior, cui admisceantur

Aquæ dest. frigidæ *P.* 400.

Per horas duas maceratae et inter-

dum agitatae preli ope exprimantur. Massae residuae carnae affunde

Aquae dest. tepidae P. 200 et denuo per horas duas sepone, interdum agitando. Colaturae exprimendo obtentae commixtaeque calore balnei vaporis calefiant, donec albumen, quod continent, coactum fuerit. Albumine coacto colando statim separato, liquor loco frigido seponatur, ut pinguedo adhaerens rigescat, quae colando separanda est.

Liquor ab albumine pinguedineque liberatus denuo in balneo vaporis per horas duas calefiat. Si post hoc tempus portiuncula liquoris agitati in cylindrum probatorium infusa floecos demittit, iterum colatura efficiatur. Denique liquor limpidus calore balnei vaporis (vel in vacuo) ad extracti spissitudinem redigatur et post refrigerationem in ollis vitreis obturatis loco frigido servetur. Eff. P. 4 circiter.

Quantum fieri potest vasa et spatula metallica in paratione ne adhibeantur.

Extractum Carnis Australe (*Tooth*) vel Liebigii semper praefendum est.

Extractum Cascarillae.

Rp. Corticis Cascarillae minutim contusi P. 1.

Affunde

Aquae bullientis P. 5.

Stent loco calido per horas 24, tum preli ope exprime. Residuo iterum affunde

Aquae bullientis P. 5,

digere per diem unum et exprime.

Liquores commixti, subsidendo decanthandoque depurati inter agitationem evaporando (calore 65–75° C. et paulum Spiritus interdum addendo) ad extracti tertii (III) gradus consistentiam redigantur. Eff. 16–20 pCt. (*Ph. Germ.*) Tonicum. *Dosis*: 0,25–0,5–1,0 quater quinquesve per diem.

Eadem ratione parentur:

Extractum Angusturae
corticis. Tonicum.

— **Bistortae** Polygoni e radice. Grad. IV. consist.

— **Geoffroyae** corticis.

— **Hippocastani** Aesculi corticis. Grad. IV. consist.

Extractum Pini silvestris

fol. s. Lanae Pini sylvestris.

Us.: Ad balneum 100,0–400,0.

— **Quercus** corticis. Grad. IV. consist. Adstringens.

— **Salicis** purpur., pentandr. vel fragilis corticis. Grad. IV. consist. Adstringens.

— **Saponariae** Grad. II. consist. Antidyscrasicum.

— **Sarsaparillae** radiceis aquosum.

— **Strychni sem. aquos.** sicc. i. q. Nuc. vomie. aquos. *Dos.*: 0,05–0,1–0,2 bisterve per diem. *Dos. maxima*: 0,2 pro die 0,6!! Grad. cons. IV.

— **Tormentillae** Potentillae rad. Grad. IV. consist. Adstringens, tonicum.

Extractum Chenopodii Vulvariae.

Rp. Herbae Chenopodii Vulvariae recens siccatae q. v.

Affunde miscelae, paratae e

Spiritus V. rectf. P. 3 et

Aquae P. 1

quantum sufficit, ut herba fluido plane contegatur. Digere per 24 horas et exprimendo cola. Residuo affunde iterum minorem quantitatem miscelae notatae, digere et exprime. Liquores commixtos et filtratos, Spiritu Vini blanda destillatione e balneo vaporis separato, inter agitationem calore balnei vaporis ad secundi gradus extracti consistentiam redige.

Extractio modo deturbatorio praefenda est. Massa digesta in vas deturbatorium transgesta affundendo Spiritum vini dilutum (68%) extrahatur etc. *Dos.*: 0,03–0,05 ter quaterve per diem (amenorrhoea, nymphomania).

Eadem ratione parentur:

Extractum Chiraytae Gentianae e stipitibus. Amarum tonicum, anticachecticum. *Dos.*: 0,05–0,1–0,15 pluries p. d.

— **Lupuli** strobil. *Dosis*: 0,5–1,5.

— **Narcissi** Pseudonarcissi florum. Vomitivum. *Dos.*: 0,1.

Extractum Spartii scoparii ex herba florente. *Dos.*: 0,1—0,2—0,3 pl. p. d. (morbus Brighthii).

— **Sumbuli** e rad. minut. concisa. Excitans. *Dos.*: 0,1—0,2—0,3 pl. p. diem (chorea, delirium tremens, typhus, cystocatarhus).

Extractum Chinae.

Extr. Chinae spirituosum *Ph. Germ.*
Extr. Cinchonae.

Rp. Corticis Chinae succirubri
grosso modo pulv. *P.* 1.

Superfusam

Spiritus Vini rectf. *P.* 5

digere per horas viginti quatuor interdum agitando et exprime. Residuo affunde

Spiritus Vini rectf. *P.* 5.

Post digestionem per horas viginti quatuor iteratam et expressionem paretur e liquoribus commixtis et filtratis extractum siccum. (*Ph. Germ.*)

Sit fuscum; in aqua solutionem turbidam praebens. Tonicum. *Dos.*: 0,5—1,0—1,5 pl. p. d.

Ph. U. St. Cort. Chin. reg. 10. Menstr. mixtio est e Spiritu 30 et Aq. 10. Extracti partibus centenis Glycerinae p. quinque (5) admisce. Grad. III.

Extractum Chinae frigide paratum.

Extr. Chinae aquosum *Ph. Germ.*

Rp. Corticis Chinae succirubri
grosse pulv. *P.* 100.

Affunde

Aquae destillatae *P.* 600.

Macera per biduum et exprimendo cola. Residuo iterum affunde

Aquae destillatae *P.* 300.

Macera ut antea et exprime. Liqueores commixti et a sedimento decanthati evaporentur, ut fere partes ducentae remaneant, quae refrigeratae et filtratae evaporentur ad syrupi spissioris densitatem. Sit in aqua paulum turbide solubile. Effic. 16 %.

Extractum Cinae aeth.

Oleo-Resina Cinae. Extr. Santonici.

Rp. Florum Cinae pulv. *P.* 2.

Affunde

[¹] Spiritus Vini rectfss.

Aetheris aa *P.* 3.

Macera in vase clauso per dies tres vel quatuor et subinde agita. Tum liquorem decantha et residuum preliope exprime. Residuo denuo affunde

Spiritus Vini rectfss.

Aetheris aa *P.* 2

macera et fac ut antea.

Liquores commixti, per gossypium colati aut filtrati, Aethere cauta destillatione usque ad quartam partem remanentem elicit, loco tepido ad extracti tenuioris (primi gradus) consistentiam redigantur. Asserva in lagenis vitreis. Si extractum post aliquod tempus spissescit, addendo Spiritus Vini et Aetheris aliquantum consistentia restituitur. (*Ph. Germanica.*) Anthelminthicum. *Dos.*: 0,3—0,5—1,0 mane sumenda.

Rp. Florum Cinae pulveratorum
[²] *P.* 1.

In vas deturbatorium immissae paulatim affunde mixturae ex

Aetheris et

Spiritus Vini rectfss. aa *P.*

paratae tantum, ut flores pulverati sint permadefacti. Vase clauso macera per diem unum, dein affunde mixturam ex

Aetheris et

Spiritus Vini rectfss. aa *P.*

paratum, quamdiu liquor ex vase defluens satis colore imbutus exhibetur. Colaturas mixtas modo antea notato in grad. I extracti consist. redige.

Eodem modo parentur:

Extractum Cubearum s.

Oleo-resina Cubebae

s. **Cubebina.** *Dos.*: 0,5—1,0—2,0 pluries p. diem (gonorrhoea).

— **aeth. Zingiberis.**

Extractum Coffeae fluidum

Kaffee-Extract. Caffee-Essenz.

Rp. Fabar. Coffeae recenter tostatarum 1000,0.

In pulverem grossum redacta et in

percolatorium vel depulsorium imprimendo ingesta superfunde

Spiritus Vini rectf. 500,0.

Percolatorium obiectum seponere per diem unum, tum affunde

Aquae dest. fervidae 500,0, in quibus soluta sunt

Natri bicarbonici 10,0.

Post diem dimidium affunde

Aquae destillatae q. s.,

ut colatura grammata 950,0 expleat, quae in vase clauso seponatur. Tum aquam fervidam affundendo denuo colaturam collige, quae sit ponderis grammatum 1000,0 ad 1200,0. Haec colatura evaporando calore modico ad centim. cub. v. grammata quinquaginta (50,0) remanentia redacta miscetur cum colatura antea seposita, ut mixtura litram unam expleat. *Dos.*: 10,0—15,0.

Extractum Colchici acidum e Bulbo.

Extract. Colchici aceticum.

Rp. Bulborum Colchici recent. P. 10.

Contusis affunde

Aceti concentrati P. 1

Spiritus V. rectfss.

Aquae fervidae aa P. 4.

Digere loco tepido per 36 horas et interdum agita. Colatura expressa, sedimentando decanthandoque depurata, balnei vaporis calore ad secundi (II) gradus extractorum consistentiam evaporetur. *Dos.*: 0,1—0,2—0,4 pluries per diem (arthritis, amenorrhoea).

Extractum Colchici acidum e Seminibus.

Rp. Seminibus Colchici grosse pulv. P. 10

Aceti concentrati P. 3

Aquae

Spiritus V. rectfss. aa P. 10.

Digere loco tepido per triduum, saepius agita et ope preli exprime. Residuo affunde

Aceti destillati P. 10, macera et exprime. Colaturae commixtae filtratae calore balnei vaporis ad secundi (II) gradus extractorum consistentiam evaporentur. *Dos.*: 0,05—0,1

—0,2 pluries per diem (arthritis, amenorrhoea).

Extractum Colocynthis.

Rp. Fructus Colocynthis a seminibus liberati et grosso modo concisi P. 2.

Superfusas

Spiritus Vini rectf. P. 15

digere loco tepido per aliquot dies, interdum agitando, tum fortiter exprime. Residuo affunde

Spiritus Vini rectf.

Aquae communis aa P. 5.

Digere per viginti quatuor horas, saepius agitando, et exprime.

Liquores obtenti et commixti post sedimentationem decanthentur, colentur et in extractum siccum (Grad. IV.) redigantur. Sit pulvis e flavo fuscus; in aqua turbide solubilis. *Ph. Germanica* praecipit primo macerationem per dies sex, deinde per dies tres.

Dosis: 0,005—0,01. Purgans. *Dosis maxima*: 0,05, pro die 0,2.

Extractum Colocynthis compositum.

Rp. Extracti Colocynthis siccii P. 3

Aloës pulv. P. 10

Resinae Scammoniae P. 8

Extracti Rhei siccii P. 5.

M., f. pulvis, qui Spiritu Vini rectificato aspersus leni calore siccetur et contritus in lagenis obturatis servetur. (*Ph. Germanica*.) *Dosis*: 0,025—0,05—0,1.

Ph. Fem. Extr. Colocynth. 3,0. Solutis in Spiritu dil. q. s. adde Caryophyll. 1,0, Resin. Jalap. 8,0, Aloës 16,0. Deinde evapora ad siccum et in pulverem redige.

Ph. Brit. Pulpae Colocynth. 60,0, Extr. Aloës Socotr. 120,0, Resin. Scammonii 40,0, Sapon. pulv. 30,0, Sem. Cardamom. 10,0, Spirit. dil. (0,920) 5000,0. Extracto spissitudinis pilularis addatur semen Cardamomi subtilissime pulveratum.

Extractum Convallariae.

Extrait de muguet.

Rp. Stipit. et flor. Convallariae majalis recens collect., tum siccatorum P. 3

Fol. et rad. Convallariae P. 1.

Concisus affunde

Aquae calidae P. 25.

Macera per horas duodecim, tum exprime et denno aquam affunde, se pone per horas duodecim et exprime. Liquores commixtos evaporando in extractum molle sive semifluidum redige, quod in aquae parva quantitate solutum filtra, tum iterum calore balnei aquae in extractum spissius (III) evaporando redige. *Ph. Gall.* Vis eam Digitalis adaequat. *Dos.*: 0,05—0,1—0,2 pl. p. diem.

Extractum Cotyledonis umbilici.

Rp. Succis recentis herbae Cotyledonis umbilici (Crassulaceae) florentis P. 20.

In balneo vaporis inter agitationem ad

Partes 5 remanentes

evaporentur, quibus affunde

Spiritus V. rectifss. P. 2.

Se pone per aliquot dies, saepe agita, tum cola cum expressione et filtra. Liquorem calore leni ad extracti secundi (II) gradus consistentiam redige. *Dos.*: 0,5—1,0 pluries p. d. (epilepsia).

Extractum Cynarae Scolymi

vel Cardunculi.

Rp. Succis recentis florum, foliorum et radicum Cynarae Scolymi aut Cynarae Cardunculi Linn.* q. v.

Calore balnei vaporis calefiat, donec albumen solutum coactum fuerit, tum liquor colando depuratus in balneo vaporis inter agitationem ad extracti tertii gradus consistentiam evaporetur.

Extractum Elaterii.

Elaterium.

Rp. Fructuum Elaterii (Momordicaceae) maturor. q. v.

Contusorum succus exprimatur et per cribrum setaceum tenuissimum coletur. Liquidum tunc leni calore et denique in balneo vaporis evaporando ad consistentiam extracti tertii gradus redi-

*) *Artischockenblumenköpfe u. Wurzeln.*

gatur. Sit e viridi fuscum, cum aqua solutionem turbidam praebens, saporis amarissimi. Excitans: *Dos.* 0,003—0,015. Purgans: *Dos.* 0,015—0,06.

Extractum Ferri pomatum.

Extractum Ferri s. Martis. Extractum Malatis Ferri.

Rp. Pomorum (Pyri Mali) acidulorum P. 100.

In pulvem contundendo redactis admisce

Stramenti concisi depurati quantum sufficit, tum exprime. Liquorem expressum subsidendo colandoque depuratum, admixtis

Ferri pulverati P. 3,

calore balnei vaporis tam diu digere, interdum agitando, quamdiu ferrum solvitur et Hydrogenium gasiforme evoluitur. Dein affunde liquori refrigerato

Aquae communis q. s., ut pondus mixturae exaequet

Partes 100.

Se pone per dies tres et filtra. Liquor filtratus ad extracti spissitudinem (Grad. II. consist.) calore balnei evaporatur. Extracti P. 100 contineant 7 ad 8 P. Ferri soluti. (*Ph. Germanica.*)

Extractum Filicis.

Extr. Filicis liquidum *Ph. Brit.* Oleoresina Filicis s. Aspidii.

Rp. Rhizomatis Filicis recens siccati et pulv. P. 1.

Superfusam

Aetheris P. 3

macera per triduum. Liquore defuso denuo affunde

Aetheris P. 2.

Post macerationem exprime. E tincturis commixtis et decanthatis extractum tenuius (grad. I), ab aethere plane liberum paratur.

Sit subviride, in aqua non solubile! *Ph. Germanica, Austr., Ph. Brit.* *Dos.*: 0,5—1,0—2,0 in part. duas divisa sumenda (contra taeniam). Ante dispensationem extractum semper agitandum!

Nota: Hoc extractum modo deturbatorio parare licet.

Eodem modo paretur:

Oleo-resina vel **Extract.**

(aethereum).

— **Capsiei** (fructus).

— **Lupulini.** *Dos.:* 0,05
— 0,1. Stomachic., tonicum.

Extractum fluidum.

Fluid Extract. Flüssiges Extract.

Extracta fluida eo modo paranda sunt, ut partes centenas substantiae medicinalis siccae (herbae, radices, fructus etc.) praebent partes centenas Extracti fluidi. Ne haec extracta corrumpantur, contineant in centenis partibus partes 10 ad 30 Spiritus Vini. Modus extractionis cum illo parationis Extracti Arnicae (Pag. 276 notato) plerumque convenit. Exempli gratia:

Extractum Hyoscyami fluidum.

Rp. Herbae Hyoscyami P. 20.

Grosso modo pulveratas et quantitate sufficiente mixturae, paratae miscendo e Spiritus V. rectifss. P. 2 et Aquae 1, humectatas in vas deturbatorium (percolatorium) immitte. Post diem unum affunde tantum Spiritus diluti antea notati, quantum ad P. 15 colaturae (I) sufficit, quas seponere. Dein denuo ille Spiritus dilutus (0,893 pd. sp.) affundatur, donec Partes 40—50 percolatae fuerint, vel herba Hyoscyami satis exhausta sit. Haec colatura ulterior (II) evaporando ad P. 5 remanentes reducta commisceatur cum colatura prius obtenta, quae P. 15 explet. Hac ratione liquor obtinetur, cujus partes singulae continent partes medicamentosas partis unius herbae Hyoscyami siccae, vel herbae Hyoscyami siccae P. 20 praebent P. 20 Extracti fluidi.

Ad apparationem Extractorum fluidorum corpora medicamentaria grossiuscule pulverata percolando, menstrua varia affundendo, extrahantur (*Ph. U. St.*). Series menstruorum est:

Menstruum

I (primum) est Spiritus Vini 90
bis 93 %.

II (secundum) est mixtio parata e
Spiritus Vini et
Aquae destillatae aa.

Haec mixtio a *Ph. U. St.* A1-

cohol dilutum, *diluted Alcohol*, nominatur.

III (tertium) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 2 et
Aquae destillat. P. 1.

IV (quartum) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 3 et
Aquae destillat. P. 1.

V (quintum) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 1 et
Aquae destillat. P. 3.

VI (sextum) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 2 et
Aquae destillat. P. 3.

VII (septimum) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 3 et
Aquae destillat. P. 2.

VIII (octavum) est
Aqua destillata.

IX (nonum) est mixtio parata e
Spiritus Vini et

Aquae destillatae aa part.,
Glycerinae ea quantitate,
ut grammata centena (100) Extracti
fluidi contineant grammata vi-
ginti (20) Glycerinae.

X (decimum) est mixtio parata e
Spiritus Vini P. 2

Aquae destillatae P. 1 et
Glycerinae ea quantitate,
ut grammata centena (100) Extracti
fluidi contineant grammata vi-
vinti (20) Glycerinae.

XI (undecimum) est mixtio e
Spiritus Vini (90—93%) et
Glycerinae ea quantitate,

ut grammata centena Extracti
fluidi contineant viginti (20) Gly-
cerinae contineant.

XII (duodecimum) est
Spiritus Vini et

Glycerinae ea quantitas,
ut gr. centena Extracti fluidi gr. tri-
ginta (30) Glycerinae contineant.

XIII (tertium decimum) est mixtio pa-
rata e

Spiritus Vini P. 1

Aquae destillatae P. 2 et

Glycerinae ea quantitate,
ut grammata centena (100) Extracti
fluidi gramm. viginti (20) Glyce-
rinae contineant.

Menstruo interdum paullulum aliqujus Acidi vegetabilis vel mineralis addendum est, semper eo modo, ut centenae (100) partes Extracti quantitatem protinus notatam contineant:

Extractum fluidum Aconiti tuberis. Menstr. I et Acidi tartarici p. 1.

- **Adonidis** (vernalis) rad. Menstr. I.
- **Aletridis** (farinosae) rhiz. Menstr. II.
- **Angelicae** rd. Mnstr. VII.
- **Apii** (graveolentis) fruct. Menstr. III.
- **Apocini** (cannabini) rad. Menstr. III.
- **Araliae** (racemosae) rad. Menstr. III.
- **Arnicae flor.** Mnstr. II.
- **Arnicae rad.** Mnstr. II.
- **aromaticum** (pulveris aromatici Americ.) Menstr. I.
- **Asclepiadis** (tuberosae) rad. Menstr. II.
- **Aspidospermatis** s. **Quebracho** cort. Menstr. X.
- **Aurantii** corticis amari. Menstr. III.
- **Belladonnae** rad. Menstr. III (*Ph. Un. St. Amer.* Menstr. I).
- **Berberidis** (vulgaris) e cortice radicis. Menstr. VII.
- **Boldi** (fol. Peumi Boldi) Menstr. III.
- **Brayerae** (anthelminticae) s. **Kusso**, s. **Koso**, panicularum feminearum s. florum. Menstr. I.
- **Buchu** (Barosmae betulinae, crenulatae, serratifoliae) fol. Menstr. III.
- **Buchu compositum** (parand. e Fol. Buchu 62,5; Cubebae., Bacc. Junip., Fol. Uvae Ursi aa 12,5). Menstr. III.
- **Calami** rad. Menstr. I.
- **Calendulae** flor. Mnstr. III.
- **Calumbae** s. **Columbo** rad. Menstr. II.

Extract. fluid. Camelliae s.

- Theae** Chinensis. Primum menstr. X, ultimum V.
- **Cannabis Ind.** Mnstr. I.
- **Capsici** fruct. Menstr. I.
- **Cascarae sagadae** cort. Menstr. II.
- **Castaneae** (vescae) fol. Menstr. V.
- **Caulophylli** (thalictroidis) rhizom. Menstr. IV.
- **Chimaphilae** (s. Chimophilae umbellatae) herb. Menstr. IX.
- **Chiratae** (Ophelia Chirata Grieseb.) rad. Mnstr. IX.
- **Cimicifugae** (racemosae) rhizom. Menstr. I.
- **Cinchonae** s. **Chinae** cort. Menstr. IX. *Ph. Brit.* Cort. Cinch. succirubr. 100,0. Menstruo Acidi hydrochlorici (32%) 3,0 addantur.
- **Coccae** (fol.) Menstr. III.
- **Coffeae viridis** (sem.) Menstr. IX et V.
- **Colchici** (aut bulb., aut sem.) Menstr. III.
- **Condurango** cort. *Ph. Germ.* Menstr. X. Anticarcinomaticum. *Dos.:* Cochlearia thearia duo vel tria ter quaterve per diem.
- **Conii** (fruct. 100,0), Acid. hydrochlorici (10%) 3,0 colaturae II ante evap. adde. Menstr. II.
- **Convallariae florum.** Menstr. II.
- **Convallariae radicis** Menstr. VII.
- **Coptis** (trifoliae) rhiz. et radicul. Menstr. II.
- **Cornus** (floridae) cort. radicis. Menstr. IX.
- **Cornus circinatae** cort. Menstr. II.
- **Corydalis** (tuberum Dientrae Canad.) Menstr. IV.
- **Coto** s. **Cotonis** cort. Menstr. I et IV ana mixt.
- **Cubebae.** Menstr. I.

Extract. fluid. Cypripedii(pubescentis) rhiz. et radicul.
Menstr. I.

- **Digitalis** fol. Menstr. IV et III.
- **Dulcamarae** stip. Menstr. II.
- **Ergoti** s. **Ergotae** s. **Secalis cornuti** (100,0 et Acidi hydrochlorici (10%) 6,0 colaturae II ante evaporat. addenda. Menstr. VI et VIII ana *Ph. Germ.*, *Ph. U. St.*
- **Ergotae** *Ph. Brit.* 11 p. Extr. aquosi e part. 16 Erg. misce cum Spir. p. 6, sepone, filtra. Sint partes 16 Extr. fluidi.
- **Eriodictyi** (Californici) fol. Menstr. IV.
- **Erythroxyli** s. **Cocae** fol. Menstr. II.
- **Eucalypti** (globuli) fol. Menstr. I.
- **Eupatorii** (perfoliati) fol. et flor. Menstr. II.
- **Francisceae** uniflorae rad. Menstr. III.
- **Frangulae** cort. Menstr. V. *Ph. Germ.* Spir. 3 et Aq. 7.
- **Fuci** (vesiculosi) thalli. Menstr. IV.
- **Gelsemii** (sempervirentis) rhiz. et rad. Menstr. I. *Dos.*: 0,1—0,2—0,4! pluries p. d. (neuralgia). Toxicum:
- **Gentianae** rad. Menstr. II.
- **Geranii** (maculati). rhiz. Menstr. IX.
- **Glycyrrhizae** s. **Liquiritiae** rad. Liquor Ammonii caust. 3,0, mixt. c. 97,0 menstrui VI.
- **Grindeliae** (robustae) fol. cum florib. Menstr. IV. *Dos.*: 0,1—0,2 plur. p. diem (asthma, tussis convulsiva, catarrhus bronchialis).
- **Guaranae** (pastae e Paulinia sorbili). Menstr. IV.

Extract. fluid. Hamamelidis

(Virginicae) fol. Menstr. II et V ana.

- **Helianthemi** (Canadensis) herb. Menstr. II.
- **Humuli** s. **Lupuli** strob. Menstr. III et VII ana.
- **Hydrangeae** (arbore-scentis) rad. Menstr. VII.
- **Hydrastis** (Canadensis) rhiz. et rad. Menstr. IX. (*Ph. U. St.* Menstr. IV). (*Ph. Austr.* Menstr. IV. P. 100 radiceis praebant Extr. fl. P. 150.) (*Ph. Germ.* Spir. 7 et Aq. 3 commixt.) *Dos.*: 3,0—5,0 pl. p. d. (cathartica, antiphlogistica).
- **Jalapae** tub. Menstr. I.
- **Ipecacuanhae**. Menstr. prim. I, tum IV.
- **Iridis** (versicoloris) rhiz. Menstr. IV.
- **Juglandis** (cinereae) corticis rad. Menstr. II.
- **Juniperi** (communis) fruct. Menstr. II.
- **Kavae** (rad. Piperis methystici). Menstr. VII.
- **Krameriae** s. **Ratanhae** rad. Menstr. IX.
- **Lactucarii**. Menstr. primore constat ex Aetheris aethylici 100,0; menstruum sequens est Spiritus Vini, menstruum ultimum No. III.
- **Lappae** (officinalis Albionii) rad. Menstr. II.
- **Leptandrae** (Virginicae) rhiz. Menstr. IX.
- **Lobeliae** fol. Menstr. II.
- **Lupulini** (Humuli Lupuli glandul.). Menstr. I.
- **Manacae** fluid. i. q. Extr. Francisceae fluidum.
- **Matico** (Artanthe elongata Miquel) fol. Menstr. X.
- **Menyanthis** s. **Trifolii** fol. Menstr. V.
- **Mezerei**. Menstr. I.

Extractum fluid. Pareirae

rad. (Chondodendron tomentosum). Menstr. IX

— **Pareirae** rad. (*Ph. Brit.*).

Menstr. II.

— **Petroselini radiceis**

Petroselinum sativum). Menstr. II.

— **Phytolaccae** (decan-drae) rad. Menstr. III.— **Pilocarpi** (pennatifolii) foliol. Menstr. II.— **Podophylli** (peltati) rhiz. Menstr. IV.— **Pruni Virginianae** cort. Menstr. IX.— **Quassiae** ligni. Menstr. II.— **Quebracho** cort. Menstr. IV.— **Quillajae** (Saponariae) cort. Menstr. II.— **Rhamni i. q. Frangul.**— **Rhamni Purshianae** cort. Menstr. II.— **Rhois glabrae** fruct. Menstr. IX.— **Rosae Gallicae** petal. Menstr. IX.— **Rubi** (Canadensis, trivialis, villosi) cort. radiceis. Menstr. IX.— **Rumicis** (crispi) rad. Menstr. II.— **Sabinae** (Juniperus Sabina) summitatum. Menstr. I.— **Salicis nigrae** herb. Menstr. III.— **Sanguinariae** (Canadensis) rhiz. Menstr. I.— **Sarsaparillae** rad. Menstr. XIII.— **Scillae** bulb. Menstr. I.— **Scoparii** (Sarothamnus Scoparius) summitat. Menstr. III.— **Scutellariae** (lateriflorae). Menstr. VI.— **Senegae** rad. (100,0. — Menstr. III et Liq. Ammon. caust. 2,0—3,0) colat. II. add.**Extractum fluid. Sennae**

fol. Menstr. VI.

— **Sennae deodoratum.**

Fol. Sennae pulv. Spiritu absoluto exhauriantur, et haec colatura rejiciatur. Deinde folia menstruo sexto (VI) percolatione extrahantur.

— **Serpentariae** rhiz. Menstr. IV.— **Spigeliae** (Marilandicae) rhiz. Menstr. II.— **Sterculiae** (acuminatae) s. **Colae.** Menstr. XIII, dein IV.— **Stillingiae** (sylvaticae) rad. Menstr. II.— **Stramonii** s. **Daturae** sem. Menstr. IV.— **Strychni** s. **Nucis vomicae.** Menstruum est Spiritus Vini pd. spec. 0,870.— **Taraxaci** rad. Menstr. VI.— **Trillii** (erecti) rhizom. Menstr. VII.— **Triticici** (repentis) rhiz. (100,0). Colaturam Aqua fervida collectam evapora ad 80,0 remanentia, quae commixta cum Spiritu Vini 22,0 seponere per horas 60, tum filtra. Liquor filtratus 100,0 expleat.— **Turnerae** (myerophyllae) herb. Menstr. III.— **Urticae** (dioicae) rad. Menstr. II.— **Uvae ursi** s. **Arctostaphyli** fol. Menstr. IX.— **Valerianae** rad. Menstr. III.— **Veratri viridis** rhizom. Menstr. I. *Dos.*: Gutt. 2—5 ter quaterve per diem.— **Verbasci** (Thapsi) fol. et flor. Menstr. II.— **Verbenae** (hastatae) rad. Menstr. II.— **Viburni** (prunifolii) cort. Menstr. III.— **Viburni Opuli** cort. Menstr. III.

Extract. fluid. Xanthoxyli

(fraxinei) cort. Menstr. I.

— **Zeae** (Maydis) stigmatum.
Menstr. II.— **Zingiberis**. Menstr. I.**Extractum fluidum Rhei aromaticum.**

Rp. Radicis Rhei 65,0

Corticis Cassiae cinnamomeae

Caryophyllorum aa 15,0

Seminis Myristicae 5,0.

In pulveres redacta menstruo secundo (e Spiritus Vini et Aquae ana partibus composito) percolationis ope extrahe, grammata triginta, primo defluentia seponendo. Colaturam succedentem evaporando ad grammata septuaginta redactam commisce cum illis grammatis triginta sepositis colaturae primo collectae.

Extractum fluidum Stillingiae compositum.

Rp. Radicis Stillingiae (silvaticae)

Radicis Corydalidis (Aristolochiae rotundae cavae) aa 200,0

Radicis Iridis Florentinae

Florum Sambuci

Foliorum Chimaphilae (umbellatae) aa 100,0

Fructus Coriandri

Corticis Xanthoxyli aa 50,0.

Grosso modo pulverata primum mixtura, parata ex

Spiritus Vini 200,0

Glycerinae

Aquae destillatae aa 100,0,
percolando extrahe, deinde

Spiritus Vini diluti (60%) quantitate sufficiente denuo extrahe. Colaturae mixtae 200,0 g. reserva, partem alteram verum evapora calore balnei aquae, donec 600,0 g. remanserint, quae cum illis grammatis 200,0 commisce. Quantitas extracti fluidi praebat aequipondium vegetabilium ad extractiones exhibitorum. Serva extractum in vitris oclusis loco umbrato. *Dos.*: 1,0—2,0—4,0 bis terve per diem (tonicum, diureticum).

Extractum Frangulae compositum.

Extractum Rhanni comp.

Paretur eodem modo quo Extractum Rhei compositum, nisi quod loco Extracti Rhei sumatur Extractum Frangulae.

Extractum Fuliginis splendentis.

Paretur e Fuligine splendente cruda eodem modo quo Extractum Aloës. *Dos.*: 0,2—0,3—0,5 pluries per diem. Ad enema (contra ascarides) 2,0 vel 4,0:150—200 aquae, in unguine 2,0—3,0:10,0 Lanolinae (dermatose, exanthemata).

Extractum Furfuris triticei.*Weizenkleienextract. Wheat phosphates.*

Rp. Furfuris triticei P. 100.

Superfusae

Aquae fervidae P. 400

stent per horam unam, tum exprimendo colentur. Liquor colatus statim evaporando calore balnei vaporis ad partes remanentes 25 redigatur, tum cum

Spiritus Vini rectifss. P. 15

commixtus per diem unum loco frigido seponatur, dein filtratur. Liquor filtratus, Spiritu Vini maxima ex parte destillando elcito, ad extracti spissitudinem tenuiorem redigatur, tum P. 100 extracti leni calore commisce cum

Sacchari pulv. P. 50

Glycerini P. 25

Natrii chlorati P. 3

Kali bicarbonici pulv. P. 1.

Serva in vasis porcellaneis clausis.

Extractum Garcinia Mangostanae.

Extr. antidyentericum.

E cortice fructus Garcinia Mangostanae, Mangostinam (C₂₀H₂₂O₅) continente, ope Spiritus vini diluti uti Extr. Aurantiorum corticis paratur (in pharmacia G. Gruppe in Manilla).

Extractum Gentianae.

Rp. Radicis Gentianae concis. P. 1.

Superfusam

Aquae destill. frigidae P. 5

macera per horas quadraginta octo et exprime. Residuo affunde

Aquae destill. frigidae *P.* 5, tum macera per duodecim horas et exprime. E liquoribus commixtis, post sedimentationem colatis extractum spissius paretur. Sit e rubro fuscum, in aqua limpide solubile. *Ph. Germanica.*

Eodem modo paretur:

Extractum Glycyrrhizae
s. **Liquiritiae** mundatae.

Extractum Gossypii
corticis radices.

Extractum Gossypii fluidum. *Liquid extract of Cotton root bark.*

Rp. Cort. rad. Gossypii herbacei recent. 100,0

Spiritus V. diluti (45%) q. s.

Contundendo fiat puls, quae cum

Spiritus V. diluti 200,0

Glycerinae 30,0

commixta, vase clauso, per dies duos seponatur, tum in vas deturbatorium ingesta affundendo

Spiritus V. diluti

extrahatur, donec colaturae totius pondus 400,0 expleat, quae post filtrationem calore 55° C. non superante usque ad 80,0 gr. remanentia evaporetur et commisceatur cum

Spiritus V. rectfss. 20,0,

ut pondus massae totius 100,0 gr. expleat.

Emmenagogum, abortivum, extractum Secalis cornuti compensans. *Dos.*: 1,0—2,0 ter quaterve per diem.

Extractum Graminis.

Rp. Rhizomatis Graminis incisi *P.* 1

Aquae communis fervidae *P.* 6.

Digere per horas sex, tum cola. Colatura statim evaporetur ad syrupi spissitudinem.

Haec massa iterum in copia quadruplice Aquae destillatae frigidae solvatur, filtratur et ad extractum spissius (Grad. III) evaporetur.

Sit e rubro fuscum, in aqua limpide solubile (*Ph. Germanica*).

Extractum Graminis
liquidum.

Mellago Graminis.

Rp. Extracti Graminis 7,0.

Solve in

Aquae destillatae 3,0.

Eodem modo paretur:

Extractum Taraxaci li-
quidum s. Mellago Taraxaci.

Extractum Haematoxyli.
Extractum Ligni Campechiani.

Rp. Ligni Campechiani raspati *P.* 1
Aquae destill. *P.* 8.

Coque ad dimidium, cola et repete coctionem ligni cum

Aquae destill. *P.* 6.

Cola et exprime. E liquoribus commixtis et decanthatis paretur extractum siccum (Grad. IV). Sit pulvis e rubro fuscus, in aqua turbide solubilis. *Dos.*: 0,5—1,0—2,0 pluries per diem (diarrhoea).

Eodem modo paretur:

Extractum Quassiae ligni.

Extractum Hellebori
Bacheri.

Rp. Extracti Helleb. nigri et Kali carbonici aa *P.*

Exacte misceantur. *Dos.*: 0,05—0,1—0,2 pluries per diem (hydrops, amenorrhoea). *Dos. max.* 0,2, pro die 1,0.

Extractum Hyoseyami
Seminis.

Rp. Seminis Hyoseyami grossiuscule pulv. et expressione frigida ab oleo liberati *P.* 1.

Affunde

Spiritus V. rectf. *P.* 3.

Digere leni calore per 24 horas, tum exprimendo cola. Residuo affunde

Spiritus V. rectf. *P.* 2

digere et exprime. Liquores commixtos filtra et, Spiritu Vini destillando elcito, ad spissitudinem extracti mollioris calore balnei vaporis et inter agitationem redige. Extractum sic obtentum in

Aquae destill. quadruplo

solvatur et solutio per chartam bibulam humectatam pereolata, resina rejecta, calore balnei vaporis denuo ad extracti secundi gradus consistentiam redigatur. Eff. 2 pCt. Extractio modo deturbatorio praeferenda est. *Ph. Britica* oleum pingue e semine Aethere

extrahit. *Dosis*: eam extr. Hyoscyami herbae aequat. Antiphlogisticum.

Pari modo paratur:

Extractum Belladonnae seminis.

— **Stramonii** (*Ph. Brit.*)

seminis aq. humectati et macerando in Aethere ab oleo pingui liberati. Menstr. Spir. dil. p. sp. 0,920. Consist. gradus III. *Dosis*: 0,01—0,03—0,06 ter quaterve per diem. *Dos. max.*: 0,06, pro die 0,25.

Extractum Jaborandi.

Extractum Pilocarp.

Rp. Fol. Jaborandi (Policarpi pentanatifolii) grosse pulv. q. v.

Commixtum cum

Spiritus vini (57 v. o/o) q. s. macera per dies duos, tum modo deturbatorio primum Spiritu vini, deinde aqua destillata extrahe. Liqueores commixtos usque ad spissitudinem extracti (Grad. II.) evaporata. Diaphoreticum, sialagogum. *Dosis*: 0,1—0,3—0,5. *Ph. Brit.*

Extractum Jalapae

Ph. Brit.

Rp. Tuberum Jalapae P. 1.

Grosso modo pulveratae affunde

Spiritus V. rectfss. P. 5.

Digere per aliquot dies, tum exprimendo cola. Colaturam, Spiritu Vini destillanda elicito, ad extracti spissitudinem redige.

Tuberibus post expressionem remanentibus denuo pulveratis affunde

Aquae destill. P. 10,

tum macera et exprime. Colaturam filtratam ad extracti spissitudinem evaporando redige. Quo facto extractum hoc aquosum commisce cum illo extracto ope Spiritu Vini effecto et mixta inter agitationem ad extracti densioris spissitudinem (Grad. III. consist.) evaporata. *Dosis*: 0,3—0,6—1,0.

Extractum Ipecacuanhae.

Emetinum impurum s. coloratum.

Rp. Radicis Ipecacuanhae grosso modo pulv. P. 1.

Affunde

Spiritus V. rectfss. P. 3.

Hager.

Macera per tres dies, interdum agitata, tum exprimendo cola. Residuo affundo iterum

Spiritus V. rectfss. P. 2.

Macera et exprime ut antea. Liqueores commixti filtrati, Spiritu Vini maxima ex parte destillando elicito, leni calore ad extracti spissitudinem evaporantur. Extractum obtentum solve in

Aquae destill. P. 4.

Solutio filtrata calore balnei vaporis inspissetur et siccando ad extracti sicci (quarti gradus) consistentiam redigatur. Serva in lagenulis bene obturatis. Sit pulvis luteus, solutionem in aqua limpida praebens.

Dosis: 0,01—0,02—0,03 ter quaterve per diem (catarrhus, pertussis). *Dos. emetica* 0,1—0,2—0,3.

Extractum Juglandis Foliorum.

Paretur e foliis Juglandis regiae recentibus, mense Julio collectis, uti Extractum Arnicae. *Dosis*: 0,3—0,6—1,0 pl. p. d. (Antiscrophulosum).

Extractum Juglandis Nucum.

Rp. Nucum Juglandis regiae nondum maturarum, aut Putaminum viridium recentium nucum q. v.

In mortario lapideo, addendo aliquantum aquae, contundantur, tum exprimantur. Succum colatum inter agitationem calore balnei vaporis evaporando ad extracti secundi gradus spissitudinem redige. Eff. 6—7 pCt.

Dos. ut antea. (Antiscrophulosum.)

Extractum Lactucarii.

Rp. Lactucarii venalis P. 1.

Ad pulverem grossum contritam superfunde

Spiritus V. rectf. P. 4.

Digere per aliquot dies et saepius agita. Liqueorem refrigeratum filtra et calore balnei vaporis ad siccitatem redige. (*Ph. Belg.*) *Dos. max.* 0,2.

Extractum liquidum Sarsaparillae compositum.

Compound fluidextract of Sarsaparilla.

Rp. Radicis Sarsaparillae 75,0

Radicis Liquiritiae 12,0
Corticis Sassafras radicis 10,0
— Mezerei 3,0.

Pulverata et commixta misce cum

Glycerinae 20,0
Spiritus Vini 30,0
Aquae destillatae 50,0.

Post diem unum hanc massam affundendo mixturam paratam ex

Aquae destillatae *P.* 2

Spiritus Vini *P.* 1

percolatione extrahe, colaturae primo defluentis grammata quadraginta (40) seponendo. Colaturam succedentem, evaporando ad grammata sexaginta (60) redactam commisce cum illis 40 grammatis colaturae sepositae, ut pondus totum mixturae grammata centum (100) compleat. (*Ph. U. St. Americ.*)

Extractum Liquiritiae (rectificatum).

Extr. Glycyrrhizae modificatum s. ammoniatum.

Rp. Rad. Liquirit. gr. modo pulv. 100,0.

Primo hunc pulverem macerando per diem unum, tum percolando (modo deturbatorio), affundendo liquorem paratum e

Liquoris Ammonii caustici
(10%) 15,0

Aquae destill. 300,0,
postremum affundendo

Aquae destill. q. s.

extrahe et liquorem percolatum evaporando ad volumen dimidium redactum per dies duos sepone, ut sedimentet. Liquorem tum decanthatum et filtratum evaporando ad extracti spissitudinem II redige. *Ph. U. St.*

Extractum Liquiritiae solutum.

Extract. Glycyrrhizae solutum. Liqueur
Extr. Liquiritiae. Solutio Extr. Liquirit.

Rp. Extracti Liquiritiae 50.

Leni calore solve in

Glycerinae 30,0

Aquae destill. 55,0.

Tum admisce

Spiritus Vini 15,0.

Pondus mixturae compleat 150,0 g.

Extractum Lobeliae siccum.

Lobelina. Lobelinum (resinoïdes).
Lobelin (harziges).

Rp. Herbae Lobeliae concis. q. v.
Superfunde

Spirit. Vini (90%) q. s.

Post diem unum in vas deturbatorium ingere et extrahe affundendo

Spiritus Vini q. s.

Colatura leni calore evaporetur et siccetur, tum massa in pulverem contrita in lagenis dense obturatis servetur. Emeticum. *Dos.*: 0,03—0,06. Anodinum ad ulcera. Contra spasmus oris uteri (ope clysmi).

Extractum Malti.

Malzextrakt.

Rp. Malti hordeacei contusi

Aquae frigidae aa *P.* 1.

Mixtae stent per horas tres, tum, admixtis

Aquae frigidae *P.* 4,

calore 65° non superante per horam unam digestae usque ad ebullitionem calefiant et statim exprimendo colentur. Colatura limpida inter assiduum agitationem quam celerrime evaporetur et in extractum spissum redigatur.

Sit e flavo fuscum, saporis grati dulcis. Loco frigidus servetur. *Ph. Germanica.* *Dos.*: 1,0—2,0 plur. p. diem.

Extractum Malti

cum Calcio hypophosphoroso.

Extr. Malti cum Calcaria hypophosphorosa.

Rp. Calcii hypophosphorosi

Glycerinae aa 20,0.

In pulvem tenerrimam conterendo redacta misce cum

Extracti Malti tepefacti 960,0,
ut centenaes partes contineant part. duas salis calcici (2%).

Aequali modo parentur:

Extractum Malti c. Calc.
lactico-phosphorico (2%).

— Malti c. Chinino ferrocitrico (2%).

— Malti c. Chinino sulfurico (0,5%).

Extractum Malti c. Chinino tannico (2%).

- Malti c. Conchinino tannico. (2%) (Mixture addatur Magnesium subcarbonici 0,5%).
- Malti cum Ferro jodato (2%).
- Malti cum Ferro lactico-phosphorico (2%).
- Malti c. Ferro-Ammonio pyrophosphorico-citrico (2%) sive Extr. Malti c. Ferro pyrophosphorico c. Ammonio citrico sive Extr. ferratum (conf. idem).
- Malti c. Ferro pyrophosphorico, Ammonio citrico et Calcio lactico-phosphorico (horum salium trium ana 2 part. in centenis partibus).
- Malti c. Kalio fluorato et Calcio lactico-phosphorico (aa 2%).
- Malti cum Lupulino (2%).
- Malti cum Pepsino (2%).

Extractum Malti ferratum.*Eisenhaltiges Malzextrakt.*

Rp. Extracti Malti P. 94.

Commisce cum

Ferri pyrophosphorici cum Ammonio citrico P. 2

solutis in

Glycerinae purae

Aqua destillatae aa P. 2.

Sit saporis dulcis, paululum ferruginei. *Dos.*: 2,0—3,0 pluries p. diem.**Extractum Malti jodatum.**

Rp. Kalii jodati 1,0

Extracti Malti 1000,0.

Misce. Ex tempore.

Extractum Malti siccum.

Ex Extracto Malti calore balnei aquae evaporando paratur.

Extractum Martis.

Extractum Ferri tartarici.

Rp. Tincturae Tartari ferrati q. s.

Inter agitationem ad extracti secundi

(II) gradus consistentiam evaporando inspissetur.

Extractum Maydis stigmatum.

Extractum Stigmatum Zeae Maydis.

Rp. Stigmata Zeae Maydis.

In aëre calore 16—18° C. siccata, tum minutim concisa in vas deturbatorium s. percolatorium paululum imprimendoingere. Deinde affunde volumen aequale

Spiritus V. diluti (30%),

miscendo parati e Spiritus rectfss. P. 1 et Aquae destillatae P. 2. Macera per diem unum, tum affundendo Spiritum dilutum (30%) modo deturbatorio perage, donec liquor defluens fere decolor appareat. Colatura, spiritu maxime ex parte destillando, calore 60° C. ne superante, separato, leni calore ad spissitudinem extracti densioris evaporatur. Diureticum modicum. Medicamen cystitidem, nephritidem sabulosam, nephrolithiasin, hydropem sanans, uti dicitur. *Dosis* per diem 2,0—3,0—5,0.**Extractum Mezerei.**

Extractum Mezerei spirituosum. Extractum Gnidii. Loco Extr. Mezerei aetherei.

Rp. Corticis Mezerei P. 1.

Minutim concisae affunde

Spiritus Vini rectfss. P. 4.

Digere per aliquot dies interdum agitando, tum fortiter exprime.

Residuum, affusis

Spiritus V. rectfss. P. 3,

eodem modo tracta.

Colaturas commixtas filtratasque, Spiritu Vini maxima ex parte destillando elcito, ad densitatem mellis evaporando redige. Sit extractum subviride, in aqua non solubile. Effic. 12 pCt. (*Ph. Germanica.*) Rubefaciens. In unguine 1,0 : 10,0 adipis.*Ph. Brit.* Extractum Mezerei corticis spiritu paratum cum Aethere miscitur et liquor decanthatus in extractum mollis transducitur.**Extractum Myrtillorum Baccarum.**

Rp. Baccarum Myrtillorum recent. maturarum q. v.

Baccae optime contritae per quatuor

19*

dies loco tepido seponantur, tum exprimantur. Succus colatus dein ad extracti tertii gradus spissitudinem inter agitationem fac evaporet.

Extractum Nicotianae Rademacheri.

Rp. Foliorum Nicotianae rusticae (aut Nicotianae Tabaci) recent. q. v.

Folia concisa et in mortario lapideo contusa conspergantur aquae copia parva et exprimantur. Succus colatus calore balnei vaporis inter agitationem continuatam ad extracti tertii gradus consistentiam evaporetur. *Dos.*: 0,2—0,5 pro die! *Dos.*: in clysmate 0,05—0,1 (ileus, hernia incarcerata).

Extractum Opii.

Extractum Opii gummosum s. aquosum. Extractum Meconii s. thebaicum. Opium depuratum.

Rp. Opii Smyrnaici P. 2.

In frustula tenuiora conciso affunde
Aquae dest. frigid. P. 10.

Macera per 36 horas loco frigido et saepius agita, tum ope preli exprime et cola. Residuum, affusis

Aquae dest. frigid. P. 5,

denuo macera per 24 horas, tum exprime et cola. Liquores commixti subsidendo filtrandoque depurati calore balnei vaporis (60 ad 70° C.) inter continuatam agitationem ad extracti densioris spissitudinem redigantur, calore leni hypocausti perfecte exsiccantur, et massa sicca pulverata in lagenis obturatis caute asservetur. Effic. circiter 50%. Aqua turbide solvatur. *Dosis*: 0,005—0,01—0,05—0,1. *Dos. max.* 0,15, pro die 0,5!! *Ph. German.*

Ph. Austr. Dos. max.: 0,1, pro die 0,4!!

Ph. Brit. Opii 100,0 aqua destillata macerando extrahantur et liquor evaporando ad 50,0 redigatur, ut centenae partes extracti p. viginti Morphini contineant.

Extractum Opii liquidum

Ph. Brit.

Liquid extract of Opium.

Rp. Extracti Opii (*Ph. Brit.*) P. 1.

Macerando per horam solve in

Aquae destill. P. 16.

Liquori deinde admisce

Spiritus Vini rectfss. P. 4, ut pondus mixtionis expleat P. 20 volumine dimensas, tum filtra. Centenae partes contineant partem unam Morphini. *Dosis*: gutt. 10—20—40.

Extractum Opii sine Narcotino.

Rp. Extracto Opii subt. pulv. P. 1.
Affunde

[1] Aetheris P. 10.

Macera per diem unum et saepius agita. Aethere defuso, extractum leni calore sicca et serva.

Rp. Extracti Opii P. 3.

Solve macerando in

[2] Aquae frigidae P. 2.

Deinde affunde

Aetheris P. 4.

Sepone per biduum et saepius fortiter agita. Dein Aethere defuso, novam quantitatem

Aetheris

affunde, macera et saepius fortiter agita. Extractio et conquassatio cum Aethere eodem modo toties repetatur, quoties Aether aliquid solvit. Denique residuum evaporando leni calore exsiccetur et servetur. *Dos.*: 0,005—0,01—0,05. *Dos. max.* 0,06, pro die 0,4.

Extractum Phellandrii Seminis.

Rp. Fructuum Phellandrii aquatici contus. P. 120.

Coquantur in vesica destillatoria cum

Aquae communis P. 1200

et destillando eliciantur P. 500 vel quantum opus erit ad oleum aethereum expellendum. Hoc separato, fluidum in vesica remanens, exprimendo colatum evaporetur ad extracti tenuis consistentiam, et digeratur semen residuum per 12 horas cum

Spiritus V. rectfss. P. 250.

Fluidum hoc exprimendo colatum ad separandum Spiritum Vini tunc destillationi usque ad quartae partis remanentiam subjiciatur et hoc modo inspissatum cum extracto aquoso prius obtento commixtum evaporatione balnei vaporis ope ad extracti secundi (II) gradus consistentiam redigatur, cui refrigerato denique admiscenda erit

Olei aetheri prius obtenti *P. 1* in pauxillo Spiritus Vini rectfss. soluta. Serva in vase bene clauso.

Nota. Pars 1 hujus extracti partibus 4 Fructus Phellandrii pulverati respondet.

Extractum Physostigmati- tis Seminis.

Extractum Calabar s. Fabae
Calabaricae.

Rp. Seminis Physostigmati ve-
[¹] nosenosi (Fabarum Calabaricarum) *P. 100.*

Subtiliter pulveratis affunde
Spiritus Vini rectfss. *P. 250*
Aqua destillatae *P. 190*
Aceti concentrati *P. 10.*

Digere interdum agitando, vase clauso, per biduum, tum cola exprimendo. Residuo affunde

Spiritus V. rectfss. *P. 100*
Aqua destillatae *P. 75*
Aceti concentrati *P. 5.*

Post digestionem per biduum fortiter exprime. Colaturae commixtae, sedimentando filtrandoque depuratae et balnei aquae calore ad voluminis trientem usque redactae per diem unum loco frigido seponantur et denuo filtrantur. Liquor filtratus, admixtis

Dextrinae depuratae pulv. *P. 6,* leni calore ad syrupi spissitudinem reductus laminis vitreis illinatur, lenissimo calore siccetur et radendo collectus servetur. Sint lamellulae e fusco flavidae, paulum diaphanae. Pars una extracti continet substantias solubiles e partibus quinque Seminum Physostigmati.

Rp. Fabae Calabaricae grosso
[²] modo pulv. *P. 1.*
Superfusam

Spiritus V. rectf. *P. 5*
digere per horas viginti quatuor et exprimendo cola. Residuo denuo affunde
Spiritus V. rectf. *P. 3*

et fac ut antea. Colaturas commixtas et filtratas in vase porcellaneo calore balnei vaporis inter agitationem assiduam ad extracti spissioris densitatem redige. *Ph. Germanica, Neerlandica.* *Dos.:* 0,005—0,01—0,02 bis terve per

diem (neuralgia, epilepsia, chorea, tetanus etc., antidotum Belladonnae, Strychnini). *Dos. maxima* 0,02, pro die 0,06!!

Ph. Gall. praecipit digestionem, deinde extractionem modo deturbatorio. 100,0 seminum praebent 2,5 ad 3,0 extracti.

Ph. Brit. Spiritus (90%) loco menstrui adhibetur. Grad. consistentiae II.

Extractum Phytolaccae decandrae.

E radice grosso modo pulverata paratur eo modo quo Extractum Rhamni Frangulae. *Ph. Brit.* In dosi minore (0,05—0,1—0,25 pl. p. d.) alterans, in dosi majore (0,5—1,0—2,0) emetico-catharticum.

Extractum Pini mari- timae Corticis.

Paratur e Cortice sicco Pini maritimae uti Extractum Arnicae. Ad extracti quartum gradum consistentiae evaporando et siccando redigatur.

Extractum Ratanhiaie.

Extractum Krameriae.

Rp. Radicis Ratanhiaie cortice cras-
siore praeditae *P. 1.*

Grosso modo pulveratae superfunde
Aqua frigidae *P. 4.*

Sepone per 36 horas et saepe agita, tum exprimendo cola. Residuum, affusis

Aqua frigidae *P. 3,*

iterum sepone per diem unum et exprime.

Colaturae commixtae, decanthando colandoque depuratae in vase porcellaneo, inter agitandum ope bacilli vitrei calore balnei vaporis evaporentur atque in extractum siccum (Grad IV, extr. consist.) redigantur. Sit pulvis splendens, in aqua turbide solubilis. *Effic. 12—15 pCt (Ph. Germanica, Brit.).*

Aequali modo parentur:

Extractum Cassiae e pulpa
Cassiae.

— **Monesiae** e cortice Chrysophylli glycyphloeii. *Dos.:* 1,0—4,0 per diem (in morbis pectoris et stomachi).

Extractum Rhamni Frangulae *Ph. Brit.*Extr. Frangulae *Ph. Brit.*

Rp. Corticis Rhamni Frangulae
grosse pulv. 1000,0
Spiritus diluti (57% vol.)
2500,0.

Commixta per dies duos macera, tum in vas deturbatorium immitte. Liquore spirituoso defluxo, affunde aquae destillatae q. s., ut colatura tota 5000,0 compleat. Hanc colaturam calore balnei aquae evapora usque ad spissitudinem extracti spissioris. *Ph. Brit.*

Aequali modo paretur:

Extractum Rhei *Ph. Brit.*
Grad. consist. III.**Extractum Rhei alcalinum.**

Rp. Tincturae Rhei aquosae q. v.
Calore balnei vaporis ad extracti gradus secundi (II) consistentiam evaporetur.

Extractum Rhei compositum.

Massa pilularum Rhei comp. Extractum panchymagogum s. catholicum.

Rp. Extracti Rhei sicci *P. 6*
— Aloës *P. 2*

Resinae Jalapae *P. 1*Saponis medicati *P. 4.*

Pulveratas intime mise. Pulverem in lagenis bene obturatis asserves. (*Ph. Germanica.*) *Dos.*: 0,25—1,0 (in constipatione habituali).

Extractum Scillae.

Rp. Bulbi Scillae grosso modo
pulv. *P. 1*

Spiritus Vini rectif. *P. 4.*

Macera per dies quatuor, tum cola et exprime. E liquore decanthato et filtrato paretur extractum spissius (grad. III).

Sit et flavido fuscum, in aqua sublimipide solubile. *Ph. German., Austr.*
Dosis: 0,025—0,05—0,1. *Dos. max.*
0,2, pro die 1,0 (hydrops).

Extractum Secalis cornuti.

Ergotinum. Ergotina. Extractum haemostaticum.

Rp. Secalis cornuti *P. 10.*

[¹] Grosso modo pulveratis affunde
Aquae destill. *P. 30.*

Macera per diem unum loco frigido, tum cola. Maceratio residui, aquae eadem quantitate affusa, repetatur. Colaturae commixtae calore balnei vaporis quam celerrime evaporando ad syrupi spissitudinem (ad *P. 5*) redactae et refrigeratae commisceantur cum

Spiritus Vini rectif. *P. 10*

et saepius conquassentur. Post dies tres liquor filtratur et calore balnei vaporis in extractum spissius redigatur.

Rp. Secalis cornuti 100,0.

[²] Grosso modo pulverata in apparatus depulsoriumingere, tum affunde

Aquae destill. 200,0.

Macera per horas duodecim, deinde liquidum ex apparatu defluxum calore balnei aquae calefaciendo coagula. Residuo in apparatu sensim affunde

Aquae destill. 350,0

et colaturam modico calore evaporando ad syrupi spissitudinem redige, tum admisce liquidum illud post macerationem collectum, quod interim ab eugulo enato filtratione liberatum est. Huic liquori mixto admisce

Spiritus Vini (90%)

quantitatem triplam. Sepone per horas triginta sex, saepius agitando, tum sedimento deposito filtra et liquorem filtrando collectum calore modico in extractum spissum (consist. II) evaporando redige. Haemostaticum.

Solutio extracti hujus ad injectionem hypodermaticam definita semper post filtrationem dispensetur. (*Ph. Austr.*)

Dosis: 0,2—0,3—0,5; subcutanea 0,05—0,1—0,3; in clysmate 1,0—2,0: 100,0 aq.; in supposito 0,25—0,5. In Franco-Gallia medici dosin ad 2,0 progressam saepe praecipiant. (Haemorrhoea, metorrhagia, metritis chronica, aneurisma, diabetes insipidus, paralysis vesicae etc.).

Extractum Secalis cornuti dialysatum.

Rp. Extracti Secalis cornuti (ex

praecepto antea notata parati *P.* 10.

Solutae in

Aquae destill. 40,0

et in apparatus dialysatorum infusae tamdiu seponere, donec actus dialyticus cesset. Liquorem diffusum calore modico evaporando in extractum spissum redige.

Extractum Secalis cornuti fluidum.

Extractum Ergotae liquidum *Ph. Brit.*

Rp. Secalis cornuti grosso modo pulverati 100,0.

In vas deturbatorium immissis sensim affunde mixturam paratam ex

Spiritus Vini *P.* 2 et

Aquae destill. *P.* 8,

ut pulvis permadefactus et paulum impressus liquore instratus sit. Macera per diem, tum, epistomio vasis deturbatorii aperto, menstruum sensim affunde, donec grmm. 85,0 percolata fuerint, quae reserva. Dein menstruum tamdiu sensim affunde, quamdiu liquor subfuscus vel e fusco flavus defluit. Hanc colaturam secundam commisce cum

Acidi hydrochlorici (25%) 2,4, antea diluta addendo

Aquae destill. 3,6,

tum filtra et evaporando ad grmm. 15,0 remanentia redige, quae cum illis grmm. 85,0 colaturae primae commixta grmm. centum (100,0) extracti fluidi praebent. Serva in lagenis obturatis, a luce remotis. *Dos.* emmenagoga 0,2—0,3 ter quaterve per diem; uteri contractiones parturientis excitans 0,5—1,0 quadrante horae. *Dos. maxima:* 1,0, pro die 5,0.

Extractum siccum (narcoticum).

Rp. Sacchari Lactis pulv. *P.* 10.

In patinam porcellaneam planam immissis et calore balnei aquae calefactis admisce

Extracti (narcotici) *P.* 10.

Massa extensa loco calido (40 ad 50° C. therm.) siccetur, tum collecta et in pulverem contrita cum

Sacchari Lactis pulv.

ea quantitate commisceatur, ut

Partes 20

expleantur. (*Ph. Austr.*)

Signa: Extractum NN. Sumatur duplum. *Us.* Pulveris medic. admiscitur.

Ph. Dan., Fenn., Germ., Suec. praecipiant loco Sacchari Lactis radicem Liquiritiae pulveratam, et

Ph. Hungaric., Russ. Dextrinam.

Eodem modo parentur:

Extractum Aconiti sicc.

— **Belladonnae** sicc.

— **Conii** mac. sic.

— **Digitalis** sicc.

— **Gratiolae** sicc.

— **Hyoseyami** sicc.

— **Lactucae virosae** sicc.

— **Pulsatillae** sicc.

— **Secalis cornuti** sicc.

— **Stramonii** sicc.

Extractum Solani Lycopersici.

Paretur e fructibus recentibus contusis Lycopersici esculenti eadem ratione, qua Extractum Arnicae.

Extractum solutum.

Solutio Extracti narcotici alicujus.

(*Ad recepturam.*)

Rp. Extracti alicujus *P.* 10.

Solve in

Glycerinae *P.* 10

Aquae destill. *P.* 20.

Tum admisce

Spiritus V. rectfss. *P.* 7

antea cum

Aquae destill. *P.* 3

commixtas. Serva loco frigido in lagenis vitreis obturatis.

Signa. Extractum NN. Sumatur quintuplum. Ante dispensationem agitandum!

Ph. German. Extracti 10 solve in Aquae 6, Spiritus vini 1 et Glycerinae 3. *Signa:* Sumatur duplum.

Extractum Strychni (seminis).

Extractum Nucis vomicae spirituosum.

Extractum Strychni spirituosum. Extractum Strychni s. Nucum vomicarum

Ph. Helv., Norv., Austr., Dan., Brit.

Rp. Seminis Strychni grosso modo pulv. *P.* 2

Spiritus Vini rectif. P. 4.

Digere per diem, interdum agitando, calore 40° C. non superante, dein cola cum expressione. Residuum, affusus

Spiritus Vini rectif. P. 3,

eodem modo tracta.

Colaturae commixtae filtrataeque calore balnei vaporis evaporentur, et tum exsiccentur. Massa contrita in lagenulis optime clausis caute servetur. Efficuntur 6–7 pCt. (*Ph. German., Brit.*)

Dosis: 0,01–0,03–0,04 ter quaterve per diem. *Dos. maxima:* 0,05, pro die 0,15!!

Extractum sudoriferum Smithii.

Rp. Radicis Sarsaparill. P. 2

— Liquiritiae

Ligni Guajacii

— Sassafra

Florum Cinae aa P. 1.

Contusae et mixtae eodem modo tractentur, qui ad parandum Extractum Arnicae praeceptus est.

Extractum Vitis Pampinorum.

Paretur e pampinis cum foliis Vitis viniferae recentibus eodem modo quo Extractum Aconiti herbae. *Dos.:* 4,0–12,0 pro die (epilepsia). Externe: contra lentigines.

Extractum Vitis Pampinorum solutum.

Essentia Extract. Vitis Pamp.

Weinrankeneextrakt zu Waschungen gegen Sommersprossen.

Rp. Extracti Vitis Pamp. P. 1

Aquae Rosae P. 8

Aquae Rubi Idaei P. 2

Spiritus V. rectifss. P. 1.

M. et filtra. (Contra lentigines.)

Farina Amygdalarum.

Mandellkleie.

Rp. Amygdalarum amararum ex-
[1] cort. P. 100.

Concisae et lenissimo calore siccatae pulverentur. Tum adde

Farinae Triticii

— Oryzae

Radici Iridis Flor. aa P. 50

Natri carbonici sicci

Boracis pulv. aa P. 5

Mixturae odoriferae moschatae P. 4.

Misce, fiat pulvis.

Rp. Amygdalarum amararum ex-
[2] corticarum

Radici Iridis Florent.

Talci Veneti subt. pulv. aa
P. 50

Saponis optimi P. 15

Benzoës subt. pulv.

Boracis aa P. 5

Mixturae odoriferae P. 3.

M. f. pulvis.

Farina cacaotina.

Kontentmehl. Poudre Content.

Rp. Sacchari albi 500,0

Seminis Oryzae 1000,0

Massae Cacao 750,0

Cassiae cinnamom. 25,0

Caryophyllorum 10,0

Cardamomi 5,0

Balsami Peruviani 4,0.

M. Fiat pulv. subtilissimus.

Farina cacaotino-quercina.

Eichel-Cacao (Michaëlis).

Rp. Massae Cacao purae P. 10

Pulveris Cacao ab oleo liberati P. 20

Glandium Quercus a testa liberatarum et modice tostatarum P. 35

Sacchari albi siccati P. 30

Farinae hordei modice tostatae P. 5

Cineris Ossium siccati P. 2.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus et perfecte siccus, qui inter parationem cum cura accessui insectorum muscarumque prohibeatur. Hic pulvis in pyxidibus e lamina stannata confectis