

minis dauci potui data. Sed & cōnuulsis & contra vuluæ vitia prodest. At herba ipsa si sit aluum, ac menses ciet, tumorēsque imposita mitigat.

De Onobrychide. CAP. CLXX.

ONOBRYCHIS folia habet lentis, ferè longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem exiguum. Nascitur in humentibus & incultis locis. Herba si trita illinatur, panos discutiēdi vim habet. Cum vino autem pota, stranguriæ medetur, & invicta ex oleo sudores mouet.

De Hyperico. CAP. CLXXI.

HYPERICVM alijs androſæmon, alijs co-
rion appellant: sunt qui & chamæpi-
tyn, quoniam ſemen odore pineam resinam
imitatur. Frutex eſt furculaceus, dodrantalis,
rubescens, foliis rutæ flore verò luteo, violæ
albæ simili, qui quidem digitis tritus san-
guineum ſuccum remittit: qua ex cauſa e-
tiam androſæmon appellatum eſt: calyculis
ſubhirsutis, in rotundo oblongis, hordei
magnitudine, in quibus ſemen nigrum &
resinofluidum odoris. Gignitur locis cultis & asper-
ris. Vrinam eit, ſubditumque menses trahit:
ex vino autem bibitum, tertianis quartanis
que liberat. Medetur & ſemen ifchiadicis,
quadragesima diebus haufitum. Sed & foliis
cum ſemine impositis ambuſta ſanauntur.

Bb. ij.

De Ascyra. CAP. CLXXII.

Ascyron sive Ascyroïdes , aliis androsæmon, etiam hyperici genus est, magnitudine distans : siquidem ramos habet maiores , ac fruticosius est : foliis interim tenuibus, puniceo colore rubentibus : flores luteos profert, & fructum hyperico similem ac resinosis odoris : cuius attritu digiti veluti cruentantur: qua de causa androsæmon (quasi humatum sanguinem dixeris) vocavere. Est & huius fructus ad ischiadicos efficax potus in hydromelitis heminis duabus. Nam biliosa recrementa plurima alio detrahit. Sed dari frequenter oportet, donec sanitati restituti fuerint. Illinitur & ambustis efficaciter.

De Androsæmo. CAP. CLXXIII.

Androsæmon , quod alij Dionysiada , alij etiam ascyron appellant , ab hyperio & ascyro differt: frutex verò est ramalis gracilis, surculosus, virgultis puniceo colore rubentibus , foliis triplo quadruplove maioribus quam sint rutæ folia, quæque trita vino-
so succo manant. Habet autem alas in cacumine complures , utrinque expansas pinnatasque : circa quas flosculi pusilli lutei , & in calyculis semen papaveris nigri , veluti punctis notulisse distinctum. Huius coma contrita, resinorum odorem reddit. Sed & semen tritum drachmis duabus potum, excrementa
biliosa

bilioſa trahit. Prodeſt verò maximè iſchia-
dicis: verùm à purgatione aquam insuper
ſorbere oportet. Cæterùm illita herba, me-
detur ambuſtis, & ſanguinem cohibet.

De Coris. CAP. CLXXXIV.

CORIS, quod aliqui etiam hypericum
appellant, frutex est folio ericæ, sed mi-
nore, pinguiore & rubente, dodrantalis, ori-
gratus, acris & odoratus. Huius ſemen po-
tum, vrinas mensēſque ciet. Eſt & auxilio
ex vino potum à phalangio demorsis, iſ-
chiadicis & opifhotonicis: itēmque rigoribus,
addito pipere. Sed & eo vtiliter opifhoto-
tonici cum oleo perunguntur. [Radix in vi-
no decocta potaque, resolutis egregiè opi-
tulari creditur: ſed laborantem inter potan-
dum bene circumquaque operiri decet: fi-
quidem corpoſe toto iudorem ciet, qua ex
re agilitas priftina recuperatur.]

De Chamœpityſeu abiga.

CAP. CLXXXV.

CHAMÆPITYS, quam qui Pontum
incolunt holocyron, Athenienses Io-
niam, EVboici sideritin vocant, herba eſt
qua humi ſerpit, incurva ſamilis, foliis ſem-
peruiui minoris: at multò tenuioribus pin-
guioribꝫque & hirsutis, circa ramulos den-
tis, odore iuveni: floribus tenuibus, luteis, vel
candidis: radice cichorij. Huius folia ſepen-

Bb. iii.

diebus in vino pota , regio morbo meden-
tur : & quadraginta diebus ex hydromelite,
ischiadem sanant. Dantur & hepaticis & v-
rinæ difficultate laborantibus, ac peculiari-
ter nephriticis : torminosis etiam prosunt.
Utuntur & ea herba Heraclæ Ponticæ in-
colæ, velut antidoto contra aconitum, de-
coctum ipsius propinantes. Porrò ad ante-
dicta quoque vitia cum polenta iure deco-
cti subiecta imponitur. Contrita verò cum
ficubus & pilularum instar exhibita , aluum
emollit. At excepta melle cum æris squama
& resina , etiam purgat. Extrahit & quæ in
vtero morantur , cum melle subdita in pes-
so. Mammarum quoque duritias discutit,
vulneraque glutinat. Herpetas denique illi-
ta cum melle cohibet.

De altera Chamæpitys.

C A P . C L X X V I .

Est & altera Chamæpitys , ramis cubitali-
bus,in anchoræ speciem incuruatis, gracili-
bus:coma supradictæ , flore candido , ac se-
mine nigro. Sed & hæc pīnum redolet. Ad-
ditur & tertia, quæ mascula nominatur. Est
autem herbula lœuis , foliolis tenuibus , al-
bis,pilosis:caule scabro,candido:pusillis flo-
ribus luteis , ac minuto semine iuxta alas.
Resipit & hæc pinū. Vtraq; porrò vim ante-
dictæ simile obtinet,at nō perinde efficacē.

Libri tertij finis.