

**MATERIA
CHIRURGICA.**

MATERIA
CHIRURGICA



MATERIÆ CHIRURGICÆ PRIMA CLASSIS. REPERCUTIENTIA.



E xterioris applicata Remedia, humores vel in vasis contentos, vel extra vasa effusos repellentia etiam ulteriore impellendorum decubitum in parte adacta solidorum in fluida actione, impudentia, REPERCUTIENTIA proprie dicuntur, licet quæ posterius efficiant, DEFENSIVA Chirurgis strictius vocentur.

INDICANTUR. I. In periodico in partem blan-
dotum humorum decubitu, prophylaxios scopo. Sic gelu vitiatis partibus naturius nix applicatur: Continuus in oculos humorum affluxus ut impediatur, ocu- li aqua singulis diebus prudenter foventur, ALARY dans la question proposée de l'Acad Royale de Chirur-
gie pour le prix de 1740. determiner les différentes
espèces des Remedes repercussifs &c.

II. In

II. In doloribus, extensionibus aponeuroseos, ligamentorum, nervorum, tendinum distensionibus. Dolor dentium frigida quandoque tollitur, frigida saepe distortum membrum restituitur. IDEM.

III. In aneurismate vero, varice, applicata glacies saepe auxilio fuit.

IV. In prolapsu ani, uteri, post reductionem.

V. In vulneribus recentibus, ut inflammatio, fluxio, tumor, prævertantur; quam in rem ipsa continui solutio aqua aluminosa saepe irroratur, etiam vicinæ partes repercutientibus inuniuntur, IDEM.

VI. In inflammationibus recentibus, ut in phlegmone, apostemate, ophthalmia, odontalgia, angina, carbunculis, ambustione, *Cl. KULBEL. in eiusdem Quæstionis propositæ Resolutione.*

VII. In suppurationibus cancri, ægylopis, haemorrhoidum cæcarum impediendis, IDEM. Suppuratio tamen in cancro externo, cicta tentato, impedienda non est, quæ in interno cavenda.

VIII. In nimio humorum effluxu, ut in haemorrhagiis, ulceribus continuo plorantibus.

CONTRAINDICANTUR vero **I.** In humorum acrum, malignorum decubitu, in tumore, vulnera, ulcere malignis, in carbone, bube, tam pestilentiali quam venereo, scabie, erysipelate, podagra, intertrigine.

II. In decubitu critico.

III. In

III. In plethoricis, cacochyminicis.

IV. In rheumaticis, arthriticis, podagricis doloribus, tum aliis vehementioribus QUESNAY. de la suppuration.

V. In omni inflammatione obsfirmata ut etiam in idiopathica; si aliquid præcedentium vetat, KULBEL. in inflammatione maligna, QUESNAY, tum glandulosa, IDEM.

VI. In evacuatione nimia sanguinis, naturali, vel naturæ solemini, ALARY.

Sunt vero repercutientia ex multiplici, ratione qualitatis, materie deprompta, hæc refrigerando, illa adstringendo, tum & nonnulla anodino effectu, repellunt, unde classis horum triplex.

I. REFRIGERANTIA.

EX REGNO AQUEO.

Aqua simplex frigida.

Nix.

Glacies.

EX REGNO VEGETABILI.

Acetofa.

Al sine.

Ana.

Anagallis.

Endivia.

Fabaria.

Lactuca.

Lens palustris.

Nymphaea.

Portulaca.

Pomorum pulpa.

Sempervivum maius.

minus.

Sem. IV. frigidorum maior. } Pultes.

minor. } Emulsiones.

EX REGNO ANIMALI.

Albumen ovi.

Lac.

Lactis tremor.

Serum.

Sperma Ranarum.

Succus Cancrorum.

EX REGNO MINERALL

Nitrum.

Sal ammoniacum.

Plumbum.

} Soluta.

OFFI-

OFFICINALIA COMPOSITA.

Acetum simplex.

Oxicratum.

Emplastra. Diapompholig.

De spernate Ranarum.

Saturninum &c.

Unguenta. Album.

Alabastrinum.

Comitissæ.

De Cerussa.

De Lythargyrio.

Infrigidans G A L.

Populeum. &c.

II. AD STRINGENTIA.

EX REGNO VEGETABILI.

Acacia. *Cort. Succus.*

Alchimilla.

Anserina.

Balaustiorum *Flores.*

Bistorta.

Berberis.

Equisetum.

Fructus, omnes immaturi.

EX REGNO ANIMALI.

Sepiæ atramentum.
os.

EX REGNO MINERALI.

Alumina.

Bolus Armena.

Bohemica.

Calces bibulæ adstringentes.

Cerussa.

Croci.

Cretæ.

Lapis Calaminaris.

Hæmatites.

Lythargyrium.

Lutum fornacum.

Minium.

Saccharum saturni.

Thermarum martialium sedimentum terreum.

Terræ Sigillatæ.

Alba.

Rubræ.

Terra pavimentorum nigra.

Tutia.

Viride Æris.

Vitriolum.

Vitrioli Colcotar.

Terra dulcis.

Zinci flores.

OF-

OFFICINALIA COMPOSITA.

Olea. Ligustrinum.

Myrtinum. &c.

Emplastra.

De Lapide Calaminari.

Diapalmæ.

Defensivum.

Stypticum Crollii &c.

Unguenta.

De Lythargyrio.

Diapompholigos.

Vina.

Auftera.

Rubra.

Vinorum Rubrorum Fæces.

III. NARCOTICA.

EX REGNO VEGETABILI.

Bella donna.

Crocus. Eius *praeparata*.

Hyoscyamus.

Papaver. *praeparata*.

Solanum,

OFFICINALIA COMPOSITA.

Olea. Hyosciami.

Papaverinum.

Emplastrum.

De Cicuta.

Narcoticum Mynsichti.

Unguentum.

Anodynun.

Populeum compositum.

Et hæc quidem ea sunt, quæ potissimum in hanc causam recenseri possunt; est tamen iudicio in his omnibus chirurgico opus, cum enim in triplici hac classe nonnulla potentiora sint, sint & imbecilliora alia, quibus utendum, præsens castus semper instruere debet: Est ubi ex binis classibus diversa feliciter coniungas, tum ubi hæc potiora, illa deteriora observes: Sed hæc per regulas tradere nimis longum. Non recendendum tamen, quod iam olim HIPPOCRATES bene monuit, similia inveteratas inflammations denigrare, tum quæ GALENUS edixit, vehementi iam in parte inflammata incuneatione facta, repercutientibus non amplius utendum esse, quibus & ea addi pulcherima possunt, quæ in hos textus *Hist. L. B. van SWIETEN* commentatur.

Narcotica quod spectat, ea quidem ex sua natura non adeo damnosa, modo sopito per hæcce dolori, non nimium fidat medicus, *L. B. van SWIETEN*, *Comment.* T.I. p. 366.



CLAS-

CLASSIS SECUNDA.

RELAXANTIA.

Quæ in fibris tensionem, irritabilitatem, dolorem tollunt, easque elongant, RELAXANTIA habentur.

INDICANTUR vero hæcce.

I. Ubi maior in parte inflammatæ irritabilitas, elasticitas nimia, aut vibratio, hinc ubi per repercutientia resolutio sperari non potest.

II. Ubi in parte nimia siccitas.

III. Ubi in eadem nimia rigiditas.

IV. Ubi nimia contractio.

Contraindicantur in contrariis.

Cum vero nonnulla relaxantium solum humectando, alia emolliendo, alia iterum temperando agant, etiam horum triplex statuenda classis est.

I. HUMECTANTIA.

Aqua moderate calida,

Aquæ Calidæ vapor.

Balneum.

Fomenta plantarum aquosarum moderate calida.

Similia saponacearum plantarum.

K 3

II. EMOL.

II. EMOLLIENTIA.

EX REGNO VEGETABILI.

Vide T. II. p. 3. seq.

EX REGNO ANIMALI.

Adeps.

Axungiae omnes.

Butyrum.

Medullæ.

Olea pressa.

Et hæc quidem pinguia circumspetius adhibenda, ut & emplastra his facta, quod fervidam inflammationem illico denigrent, alios casus vero potentissime iuvent, quod illico relaxant.

COMPOSITA OFFICINALIA.

Olea omnia mollia.

Unguentum de Althæa.

Populeum.

Emplastra.

Diachylum simplex.

De mucilaginibus.

III. Tem-

III. TEMPERANTIA.

EX REGNO VEGETABILI.

| | |
|---------------|-------------|
| Farinæ | coctæ in |
| Cerealium. | Aceto |
| Secalis &c. | vel |
| Leguminum | Lacte, |
| Fabarum | decocto |
| Lupinorum &c. | emollienti. |

Furfures.

Cerealium.
Pulpæ. Cassiæ
Pomorum.

Mica panis.

EX REGNO ANIMALI.


Lac.

Stercora animalium, Vaccinium &c.

Postrema huius ordinis remedia quandoque emollientibus, quandoque anodynis magis combinanda, ut sævities symptomatum leniatur. Omnia tamen relaxantia, præprimis emollientia, vix diu parti imposita, ne inde suppuration certius cicatur, relinquenda; dolore, irritatione, tensione, remittentibus auferenda.

IV. ANODYNA.

Antea recensita, p. 147.



CLASSIS TERTIA.

RESOLVENTIA.

Quae humores inter solida stagnantes in minores partes solvunt, inde obstructionem, partis tumorem, motus impotentiam auferunt, RESOLVENTIA: quae eosdem attenuant, dividunt, ATTENUANTIA, quae diluunt, DILUENTIA strictius dicuntur.

Materies his haud adeo diversa, est tamen quae magis in solida, est quae in fluida magis agat salina.

INDICANTUR I. Prioribus secundum exigentiam applicatis, inflammatione tamen nondum resoluta, etiam in phlegmone oedematoso.

II. In oedemate.

III. Tumoribus cysticis.

IV. Tumoribus scirrhosis.

V. Tumoribus aereis.

VI. Obstructionibus aliis.

Verum quia humoris profunde impacti resolutio obtineri solum potest, vel elasticitate, irritabilitate, tensione solidorum minutis, si aucta sint, vel solidorum actione adacta, si imminuta sit, vel deinceps adactis diametris, ut obstruens molecula transire, vel humorum minuta mole, ut per angustias transe possit, in totidem classes haecce distribuenda resolventia sunt;

cum

cum vero, quæ elasticitatem, irritabilitatem tollunt, tensionem in solidis minuant, relaxantia, emollientia sint, eadem vasorum diametrum adaugeant, contrahi hæc duo capita in unum possunt.

I. RESOL. RELAXANTIA.

| | |
|--|--|
| Ex Humectantibus. Emollientibus. Temperantibus. Anodynis. | } } } } conflata, priori capite dicta sunt. |
|--|--|

II. RESOL. STIMULANTIA.

LENIORA.

EX REGNO VEGETABILI.

- Apium.
- Artemisia.
- Betonica. *Herb. flores.*
- Chamomilla. *Herb. flores.*
- Chamæpitys.
- Chærophylum.
- Cicuta maior. *interne, externe, omni forma.*
- Daucus.
- Fœniculum.

K 5

Hedc.

Hedera Terrestris.

Hypericon. *Herb. flores.*

Marrubium.

Melilotus.

Sambuci *flores.*

FORTIORA.

Absynthium.

Vulgare.

Romanum.

Anisum.

Arnica.

Arum.

Afarum.

Bryonia.

Carvum.

Coriandrum.

Cuminum.

Ebulus. *Folia, cortex.*

Eupatorium.

Hyssopus.

Iris. *Rad. Succus.*

Imperatoriae *Radix.*

Iuglandis *folia.*

Iuniperus. *Folia, Baccæ.*

Lavendula.

Lauri. *Fol. Baccæ.*

Lupulus. *Herb. Turiones.*

Maiorana.

Melissa.

Mentha.

Peta-

- Petasitis.
Polium.
Pulegium.
Rosmarinus.
Ruta.
Sabina.
Thuya.
Sambuci tort. med. Fol.
Saponaria.
Semina IV. calida Maiora.
Scordium.

EX REGNO ANIMALI.

Cantharides.

EX REGNO FOSSILI.

- Alumen plumosum.
Arena calefacta oedemati applicata.
Ammoniacum sal. *Flores.*
Petroleum.
Salia fere omnia maxime, vero alcalina in morbis
frigidis.

OFFICINALIA COMPOSITA.

- Ex Gummatis simplicibus.
- | | | |
|------------|---|--------------|
| Ammoniaco. | 1 | <i>Aceto</i> |
| Bdelio. | | |
| Euphorbio. | | |
| Galbano. | | |
| Opopanax. | | |
- Sagapeno.

Ex

Ex aceti simplicis aut medicati vapore,

Oleis. Plantarum aromaticarum

Acrium.

Euphorbii.

Cucumeris asinini.

Nicotianæ.

Philosophorium.

Ceratis de cumino &c.

Emplastris

Diachylo.

De galbano.

De vigo simplice.

Cum mercurio.

Gummato.

Ireato.

Unguentis

De Artanita.

Neapolitano.

III. RESOL. ATTENUANT.

EX REGNO AQUEO.

Aqua,

EX VEGETABILI.

Debiliora in causa calida, vide *Refrigerantia.* 143.

Ci-

Cichorii.

Endiviae.

Tragopogoni.

Taraxaci.

Scorzoneræ. *Decocta, succi.*

Sambuci flores &c. infusi.

E X V E G E T A B I L I

Fortiora in causa frigida.

Allium.

Alliaria.

Armoracia.

Beccabunga.

Cochlearia.

Cepa.

Eruca.

Erysimum.

Nasturtium.

Piperitis.

Porrum.

Raphanus. *Herb. Pulpa. Sacchar.*

Scordium.

Sinapi. *semina.*

Thlaspios *semens.*

E X

EX REGNO ANIMALI.

Serum lactis in inflammati resolutione utile.

Millepedes. *Pulvis, Succus,* in pituitoso magis.

EX REGNO FOSSILI.

Sales.

Ammoniacum.

Borax.

Nitrum.

Mercurius, & Mercurialia.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Ex Camphora. Camphoratis plerisque.

Mellitis.

Saccharatis.

Cineribus clavellatis.

Saponibus tan liquidis quam solidis, solutis.

Tartari sale. Oleo per deliquium.

Omnia hæc resolventia non omnibus convenientia-
tibus, ut ingens pro indole morbi in his selectus. In
inflammatione resolutio ut obtineatur, relaxantibus
incidentia feliciter adduntur. Fortiora stimulantia
oedemati, tumori cystico, aereo, scirrhofo, oppo-
nuntur. Incidentia stimulantibus fortioribus etiam iun-
cta in tumore aquoso, pastaceo præscribuntur, rela-
xantia potissimum in erysipelate.



CLAS-

CLASSIS QUARTA.

SUPPURANTIA.

SUPPURANTIA, seu pus moventia, etiam maturantia, & concoquentia aliis dicta, illa habentur auxilia, quæ suppurationem, vel arcentia, vel retardantia impedimenta removent, eaque, quibus puris generatio perficiatur, requisita ponunt. Evidem aliter haec definiri non possunt, quod ipsa natura concoquat, & puris generatio a sanitate superflite dependeat, BOERHAAVE, *Illustr. L. B. van SWIETEN.* Cum igitur suppuratione naturæ, non medicamenti, effectus sit, totum quod arte fieri potest, est, ut tollantur illa impedimenta, quæ boni puris, vel in vulnere, vel in abscessu, generationem prohibent, reliqua natura sibi semper sufficiens perficit. IDEM.

Indicantur ubi omni resolutionis spe excisa, tumor, calor, dolor, rubedo, & reliqua symptomata in parte inflammatæ augmentur, non quidem summa cum velocitate, sed continuo tamen incremento, IDEM. In hoc vero naturæ medicæ negotio, scrupulosiori attentione opus, ut ea, quæ superadditi debent auxilia, rite intelligentur. Est enim ubi iuvari non postulat: est ubi refrænari, est etiam ubi incitari velit, tum ubi quandoque binas postremas indicationes repletas desideret; unde quatuor suppurantium Classes.

I. Quidem ubi natura sibi sufficit & pars solum ab aere externo arcenda, fovenda mollibus, humidis,

II. Ubi

II. Ubi relaxanda est eadem.

III. Ubi stimulanda.

IV. Demum ubi, & emolliri, & stimulari simul pars debet.

I. HUMIDA. MACERANTIA.

Dum artis auxilio, nec fræno, nec calcare indigens natura, carere potest, sed inimicus solum arcendus aer est, calor, & humiditas in parte suppuranda conservanda sunt, quæ omnia ex moderamine symptomatum intelliguntur, tum demum hæc indicantur. Forina remediorum, fomenti, cataplasmatiſ.

EX REGNO VEGETABILI.

Acetosa,

Armeniaca mala cocta.

Avena cum aqua cocta, farina,

Beta.

Brassica.

Cerasa.

Chondrilla.

Cichorium.

Dens leonis,

Endivia.

Fraga.

Hor-

Hordeum.

Lactuca.

Mercurialis.

Mora.

Parietaria.

Pomorum *pulpa*.

Raparum, *assatarum*, *cotitarum* *pulpa*.

Secale *farina*, *panis*.

Spinachia.

Triticum.

Uvæ.

E X A L I I S.

Aquæ calidæ vapor.

Cera.

Pix.

Stercora animalium *blanda*, *humida*.

II. R E L A X A N T I A.

Quando tensæ in parte inflammata carnes, membra-
næ emolliendæ, humorum minuendus impetus,
impacti acris rodens vis corrigenda, vel demum gan-
grænæ metus adeſt, indicantur, maxime autem in an-
thrace, furunculis, QUESNAY. In contusionibus nul-
la solutione continui facta, præſente magna inflamma-
tione, dolore, urgentibus pervigiliis, & imminentे
partis suffocatione, GRASHUIS. His tamen ſæpe re-
Crantz M. M. T. III. L fol.

solventia misceri debent, IDEM in questione ab inclyta Academia Regia Chirurgica proposita pro præmio 1746. determiner ce que c'est que les remèdes suppurratifs &c. A specie tamen relaxantium oleosa, & oleis omnibus in vigore inflammationis pertinacis absconditum, ne pars nigrescat citius, QUESNAY. Tum & hæc in parte corporis elastica scrupulosius vitanda, ut in tendine, MUNNICKS, in nervo, IDEM, nec inflammato ossi superponenda, quia corruptitur, HILDANUS, HEISTER. Sed huic irritantia convenient, ut euphorbium, ESCHENBACH, eadem in questione ab inclyta academia regia chirurgica proposita Determiner ce que c'est que les remèdes suppurratifs &c. Forma horum, vaporis, fomenti, cataplasmatis, unguenti, emplastri.

EX REGNO AQUEO.

Aqua calidæ vapor.

Vapor decocti emollientis.

EX REGNO VEGETABILI.

Althæa. *Folia, Radix, Mucilago, farina.*

Alcea. *Folia, Radix, flores.*

Arabici *Gummi, Mucilago.*

Branca Ursina.

Caricæ pingues.

Ficus.

Lili albi *Radix.*

Lini. *femen, farina, oleum.*

Malva.

Paf.

Passulæ Maiores.

Minores.

Semina mucilaginosa -

Cydoniorum.

Lini.

Psyllii.

Symphyti radix.

Verbascum.

E X R E G N O A N I M A L I.

Animalium stercore mollia.

Hominis,

Vaccarum.

Animalium pinguedines.

Anatis.

Caponis.

Porci &c.

Pinguia alia.

Butyrum.

Ceti sperma.

Lactis tremor.

Medullæ.

Vitellus ovorum.

Pus ipsum maxime suppuratorium, MONRO Society
in Edimburg. Vol. V. P. I. & in carie ossium secca
gangrenosa utile balsamum, IDEM, unde etiam par-
tium glandulosarum suppuratio exspectanda, & cruda
nunquam incidenda glandula est, ut aliqui inflamma-
tis mammis faciunt.

L 2

O F.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Gummata

| | | |
|--------------|---|---------|
| Ammoniacum | } | oleo |
| Bdellium | | soluta. |
| Galbanum &c. | | |

Olea varia Preffa

Amygdalarum dulcium.

Lini.

Olivarum.

Raparum.

Cocta, emollientia, quæ cæterum à
Chirurgis laudantur, inutilia sunt.

Oleum ceræ.

Unguenta

Altheæ.

Basilicon.

Populeum.

Cataplasmata, de mica panis cum lacte.

Herbar. acescent. sub ciu. affat.

Emollientium.

Emplastra

Diachylon simplex.

De Gummatis.

Mucilaginibus.

Malacticum.

De spermate ceti.

III. STI-

III. STIMULANTIA.

Indicantur *I.* ubi inflammatione non resolvenda natura exstimulanda, ut incitato parum motu felicius succedat suppuration, præcaveatur scirrhous *L. B. van SWIETEN*, ubi in parte suppuranda tensio nulla adest, sed potius indolentia, *ESCHENBACH in quaestione de suppurantibus pro praemio ab Insula Academia Regia Chirurgica proposita.*

II. In inflammatione cœdematosa.

III. In inflammatione in gangrenam tendente, ex causa maligna principium vitate debilitante, QUESNAVY. l. c.

IV. In inflammatione in gangrenam terminata, ESCHENBACH Q. c.

V. In glandulosis obstructionibus, non resolubilibus, nec tamen scirrhosis, GRASHUIS. Q. c.

In hac ampla remediorum messe magna delectus esse cura debet, exigua tamen illi, qui naturam inflammationis, intensitatem eius, & aliorum morborum conditionem exactius introspexerit. Sic rubefacientia, & corrosiva huius speciei, partibus gangrenosis iam tutius, quam adhuc inflammatis admoventur, ut & tumoribus fuscatis, excrescentiis carnosis, fistulosis, ulceribus suppurandis.

Forma varia cataplasmatis, unguenti, pulveris.

EX V E G E T A B I L I B U S.

Abrotanum. *Herb.* }
Absynthium. *Herb.* }

Summit.

Alliaria.

Allii bulbus. *affatus, coctus.*

Aristolochiae radix.

Cepa, *cocta, affata.*

Cicuta, magis resolvens, minus calida.

Cortex medianus

Ebuli,

Sambuci.

Crocus.

Juniperi *baccæ.*

Ruta.

Seminum IV. Calidorum Maiorum } farina.

Minorum } cocta.

Sinapi *farina.*

EX ARTEFACTIS.

Camphora.

Farinæ melle subactæ.

Olea stillatitia.

Salia

Ammoniacus.

Borax.

Terebinthina.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Oleum. Euphorbii.

Myrrhæ per deliquium.

Un-

Unguenta

Basilicum.
Maturativum.

Emplastra

Diabotanum.
Diachylum cum gummatibus.
De galbano crocatum.
Vesicatorium.

FORTISSIMA RUBEFACIENTIA.

Alumen uslum.

Ari Radix.

Bryoniæ Radix.

Cantharides.

Euphorbium.

Fermenta animata.

Olea Empyreumatica

Cornu cervi &c.

Oleum Philosophorum.

Tartari per deliquium.

Spiritus acidi concentrati.

Sulphuris.

Vitrioli &c.

Spiritus fali ammoniaci.

Butyrum antimonii.

Lapis infernalis.

Lapis causticus.

Mercurius sublimatus.

Dissolvente Diaphoretico cum purgativa.

Divinum.

IV. EMOL.

IV. EMOLlient. IRRITANTIA.

Indicantur potissimum in inflammatione partium glandularum, siquidem haec in his in scirrum ex facilis transit, L. B. VAN SWIETEN, QUESNAY.

Forma unguenti. Emplastri. Cataplasmatis.

EX VEGETABILIBUS LENIORA.**Gummi**

| | |
|---------------|---|
| Ammoniacum | Soluta aceto magis, vitello ovi minus stimulantia. |
| Bdelium. | |
| Galbanum | |
| Opopanax | |
| Sagapenum &c. | |

EX ALIIS ACRIORA.

- Cafeus putridus.
- Fel taurinum.
- Fermenta.
- Olea Rancida.
- Sapo niger.
- Theriaca.

COMPOSITA OFFICINALIA.**Emplastrum**

- Diabotanum.
- Diachylon cum gummatis.
- Divinum.
- Ireatum.

Tum

Tum medicamenta Nro. II. & III. varia combi-
ta forma, huc faciunt omnia.

Et hactenus quidem de omni suppurantium medi-
camentorum specie actum est; est tamen adhuc de
his in genere tenendum, suppurantia a digestivis non
adeo distincta esse, suppurantia maturando abcessui
dicari, digestiva abcessui rupto, ulceri maturando im-
pendi, utrinque, ut pus bouum laudabile fiat, impo-
ni. Quoniam tamen etiam digestiva alio capite chirur-
gis recensentur, ea hic subnectere lubet.

I. DIGESTIVA EMOLlientIA.

S I M P L I C I A.

Propolis.

Adipes *liquatae*.

C O M P O S I T A:

Unguentum.

Altheæ.

Basilicum.



MOS

L 5

II. BAL.

II. BALSAM. STIMULANTIA.

S I M P L I C I A.

Balsama,

Copayvæ.

Peruvianum.

Opobalsamum.

Terebinthina.

C O M P O S I T A.

Balsamum Arcæi.

Tinctura Aloes.

Myrræ.



COM-

III. ADSTRINGENTIA.

S I M P L I C I A.

In Mat. Med. T. II. dicta.

C O M P O S I T A.

Mel Rosatum.

Aqua Calcis, potius siccans.

IV. ESCHAROTICA.

Vide rubefacientia fortiora sub tertia suppurantium specie. Ceterum hæc partibus nervosis applicari non debent; quæ enim has mordent; non raro convulsiones cire solent.

X. D E T E R G D I G E S T I A.



CLAS-

CLASSIS QUINTA.

DETERGENTIA.

DETERGENTIA, deterfiva, etiam mundificatoria, ea dicuntur remedia, quæ ex vulnero purulento, vel ulcere, omnia auferunt obstacula, ut vulnero coire, ulcus compleri possit. Verum cum hæcce obstracula tam ab ipso pure vel qualitate, vel quantitate peccante, quam a corruptis vasorum, & mortuis extremitatibus ponantur, medicamenta detergentia his obveniant necesse est, ut vel inde multiplex horum classis, & varia forma intelligentur. Indicantur vero detergentia in omni ulcere, excepto cancroso, in quo lenientia solum convenient, *FLEURANT dans la Question pour le prix 1746. determiner ce que c'est que les Remedes deterfifs &c.*

I. DETERG. DIGESTIVA.

Hæc in omni abscessu rupto, ulcere primis statim diebus, ut semimortua vasorum extrema, superficiem ulceris constituentia, a vivis abscedant partibus siveque reddantur puræ, L. B. van SWIETEN, indicantur. Non est tamen his diu insistendum omnium consensu, siquidem marasnum, & carneum fungosam inducent, *LOUIS dans la Question proposée des deterfifs 1746. maxime, si ex foliis emollientibus pinguis bus*

bus constent. Et in integrum his abstinendum, si ulcus vividam firmam carnem habet, si digestiva in ulcere dolores causant, & mordent, **FLEURANT Q. c.** Quæ vero forma lavamenti præscribantur, sequentia sunt:

Absynthium.
Alliaria.
Enula Campana.
Hedera terrestris.
Hypericon.
Hyssopus.
Marrubium.
Mentha.
Pulegium.
Veronica.
Virga aurea &c.
Quæ forma unguenti.

PINGUIA EMOLlientIA.

Albumen ovi.
Axungiae.
Olea presla.
infusa.
cocta.
Pinguedines.
Seva.

BALS. LIQUIDA STIMULANT.

Copayvæ.
De Mecha.

Pe-

Peruvianum.
Terebinthina &c.

BALS. SICCA STIMULANTIA.

Myrrha.
Olibanum.
Styrax.

Est ubi pinguia solum, sed raro, est ubi haec cum balsamis varia inter se commiscentur proportione, ut iam maior vis emolliens, iam stimulans maiori, pro ipsius ulceris conditione habeatur. Sic ex balsamo nativo quoque, vitello ovorum, & melle, digerens tale medicamentum optimum conficitur, L. B. van SWIETEN. Si ulceris superficies rubore, puris immixti quantitas incipiat, est ab oleosis abstinentum, ut & digestivis aliis stimulantibus.

OFFICINALIA COMPOSITA.

| | | |
|---------|---|---|
| Syrupi. | Absynthii Enulae. Hederæ Terrestris. Hyssopi &c. | } in unguenti formam cum melle acti. |
|---------|---|---|

Unguenta.
Apostolorum.
Basilicum.
Digestivum &c.

Sapones aqua soluti, oleo, syrupo, unguento mixti, unguenti vel lavamenti formæ inserviant, & efficaciter omnia detergunt.

II. DE-

II. DETERG. IRRITANTIA.

Irritantia tum ulceribus immittuntur, dum a prioribus non satis excitata natura, mortuarum a vivis separationem fibrarum efficere haud potuit, hinc ulcus mundatum non fuit. Acriori itaque stimulo opus. Et quidem praeter balsama priora, quæ minuta soluim pinguium quantitate, etiam digerentia irritantia sunt, formæ lavamenti inserviunt.

EX REGNO AQUEO.

Aquaæ minerales salinæ, & sulphureæ, quæ diversis in regionibus variæ nobis sunt:

Aquaæ Egranæ } in lotione,
Carolinæ }
Badenses } embroca.

Formæ huic, vel alteri, unguenti nempe, famulantur

EX REGNO VEGETABILI.

Antiscorbuticæ, omnes acres plantæ.
Perficaria urens.
Ruta.
Sabina.
Scordium &c.

EX ANIMALI.

Urina vel simplex, vel virtute præcedentium dives.
Bilis animalium.

EX

EX FOSSILI.

Alumen. Etiam adstringens.

Sal Ammoniacum.

Borax.

Marinum.

Vitriolum, etiam adstringens.

Mordacia.

OFFICIN. SIMPLIC. COMPOSITA.

Mel }
Saccharum. } Leniora.

Sapo.

Tinctura

Aloes.

Myrræ.

Aqua phagadænica.

FORTISSIMA.

Alcalinorum salium lixivia.

Alumen usum.

Calx æris.

Viride aeris.

Mercurius præcipitatus Ruber.

Sublimatus corrosivus.

Lapis infernalis.

Unguentum Ægyptiacum.

Quæ omnia variis inter se modis pro casus necessitate combinantur. Notandum, corrodentia hæcce ultima, ulceri sordido rebelli, etiam fungosa carne luxurianti, tantum conveuire, his novam inflammationem, & suppurationem moveri, esse igitur semper his deter-

gen-

gentia digestiva mollia superponenda, ut eo facilius
eschara secedat.

III. DET. ANTIPUTREDINOS.

Sæpe etiam ex ulcere fœtidus ichor manat, colore ni-
gro lintea inficiuntur, instrumenta tingantur; tum
quæ putredini resistant, indicantur, **LOUIS.** Hæc ve-
ro multum variant pro indole & natura ulceris, a cau-
sa specifica exorti; ita in venereo semper mercurialia
his adduntur, in scorbutico succus citri, gummi laccæ
tinctura aluminosa, spiritus salis marini, in canceroso
vis cicutæ commisceatur, in scrophuloſo oxymel squil-
liticum, & alia, antiputredinosis balsamicis iunguntur.

Forma varia est.

E X S I M P L I C I B U S.

Acetosellæ Succus.

Aurantiorum Acidorum.

Citri

Lemoniorum

Acetum.

Omphacium. Simul adstringens.

Tartarus, acidus, & salinus.

Succi.

E X C O M P O S. O F F I C I N A L I B U S.

Acetum Rutaceum. Simul vulnerarium.

Theriacale. Stimulans.

Mel Rosatum.

Crantz M. M. T. III.

M

Oxy-

Oxymel simplex.

Squilliticum. *Incidens, stimulans.*

Oleum Terebinthinæ.

Spiritus Vini. *Coagulans.*

Camphoratus.

Salis marini

Nitri dulcis. } *Simul caustici.*


Tincturæ

Aloes }

Myrrhae }

Gummi laccæ, spirituosa.

Et hæc quidem præcipua horum materies est, non tamen in omni putrido ulcere conveniens omnis, quod spiritus vini in ulceribus cerebri, cerebrum a corruptione haud præservet, QUESNAY. *Memoir. de l' Acad. de Chirurgie* T. I. bene vero oleum terebinthinæ, balsamum commendatoris, IDEM. adhæc in carie ossis cariosi tinctura Aloes sœpe alvi profluvium fuscitavit. Alex. MONRO. *Society in Edimb.* Vol. V. P. I.



CLAS-

CLASSIS SEXTA
E X S I C C A N T I A.

Quae nimiam partis humiditatem absorbent, par-
temque sicciorum reddunt, **EXSICCANTIA**,
Indicantur

I. Dum plurimo, & nimis tenui humore vulnus,
ulcus madet. L. B. van SWIETEN.

II. *Dum alia corporis humani sana pars incommodo constanter sudore perfunditur: sed his rebus multo opus iudicio, ut, an siccare conveniens, intelligatur.*

*III. In pertinaci vasis rupti, discissi, sanguinis, se-
ri, lymphæ fluxu, aut stillicidio.*

Contraindicantur vero

I. In punctura, CHARMETTON in Quæstione ab inclyta Academia Regia proposita pro præmio 1748. Determiner ce que c'est que les Remèdes dessicatifs, & les caustiques.

II. In ulcere veteri, annofo.

*III. In ulcere quounque inflammatu, sicco, dolente, NANNONI, in eadem questione pro præmio
1748.*

Cum vero perpetua illa, & molesta humoris trans-sudatio vel ex tenuitate humoris per partem fluentis,

vel ex debilitate partis humores haud coercentis oriantur, exsiccantium duo generalia constituentur genera, hæc humores, illa solida corridentia, insipillantia nempe, & adstringentia, quorum priora interno dicata usui magis, in Materia Med. T. II. dicta, hic haud repeatam, cum de unica horum divisione solum dicturus sim, de coagulantibus nempe, tum de adstringentibus. Verum quia in recenti, nimio humore perfuso, ulceræ, sepe nec evidens fluidorum tenuitas, nec certa solidorum relaxatio criminari potest, proin operosa hac curatione opus non sit, medicamenta exsiccantia ratione effectuum in sequentes classes distribuo.

I. EXSICC. BIBULA.

Hæc indicantur I. dum nec in fluidis, nec in solidis multa labes, sed ex solo fotu extravasati, maceratione leniori, ancipites ulceris recentis extremitates elaterem suum amiseré quodanmodo, ut impulsum viribus cordis humorem non coercere amplius, nec in vasa lateralia sufficenter impellere possint.

II. Ubi completo bonis avibus ulceri, cicatrix inducenda, CHARMETTON.

III. Ubi in ossium carie incommodus ex ossium cellulosis humoris proventus Alex. MONRO, Society in Edimburg T. V. P. I.

Inter hæc sunt

Plumaceola simplicia, } fumis aromaticis imbuta
Rasa, } sicca.

Spongia præparata.

Hæc

Hæc vero cum lœvia, porosa, sicca sint, ex extremitatibus hiantium vasorum humidum bibendo, & in se attrahendo, ulceris liberant superficiem, sicciorēque reddunt, ut hand continuo amplius maceratis, puncta contactuum augeantur, cohæsio increscat, impulsis resistentia fluidis maior ponatur, coercentur fluida arctius, & per lateralia vasa distribuantur felicius, sic demum totus compleatur hiatus. Nec repugnare bi-
bulos terrestrium pulveres in hanc classem revocanti, qui si impalpabiles sint, in parte molli indicantur, L.
B. van SWIETEN, in ossea minus, Cl. MONRO. Ex hoc censu sunt

Cancrorum lapides praeparati.

Corallia rubra praeparata.

Ossa calcinata, præcedentibus magis bibula, sed etiam magis caustica caute applicanda.

II. EXSICC. ADSTRINGENTIA.

In solidis suppuratione maceratis debito maior, quam quæ simplici humidi absorptione emēdetur laxitas, medicamenta, elementa fibrarum arctius compingentia, coadunantia requirit; quæ quoniam etiam imperspirabilem partem reddunt, ob id duplēm indicatiōnēm explent. Inter hæc usitatoria sunt

Aqua frigida in recenti ulcere proficua, CELS.

Aqua aluminosa.

Bolus.

M 3

Ca-

Calaminaris lapis.

lapidis *praeparationes.*

Pompholyx.

Tutia.

Hæmatites Lapis.

Plumbi *praeparata.*

Ceruffa.

Minium.

Lythargyrus.

Saccharum saturni.

Terra Aluminis.

Zinci flores.

OFFICINALIA COMPOSITA.

Unguenta.

Album simplex.

Ad ambusta.

Comitissæ.

De Lythargyro.

De Minio.

Nihili.

De Tutia. Simul Anodynnum.

Emplastra.

Album coctum.

Diapalmæ.

De Lapide calaminari,

Defensivum.

Saturninum.

Stypticum.

Triapharmacon.

III. EXSICC. AROMATICA.

Indicantur, dum stimulo opus, ut solutæ fibræ vis
prior infundatur.

EX SIMPLICIBUS.

Camphora.

Colophonia. Lenior.

Gummi.

Elemi.

Juniperi.

Myrræ.

Tacamahaca.

Masticæ.

Olibanum.

Sarcocolla.

Styrax.

EX COMPOS. OFFICINALIBUS.

Aquæ vulnerariæ.

Lac Virginale,

Spiritus vini simplex.

Camphoratus.

Tinct. præcedent. simplicium, aliæ Aromaticæ.

Unguentæ.

Album Camphoratum.

Digestivum spiritu vini camphorato &c.
animatum,

Emplastræ

Divinum.

Gryfeum.

Oxicroceum. &c.

M 4

Fe.

Feliciter admodum hæcce prioribus iunguntur. Sic in spiritu vini alumen solvit bono effectu, alia aliter combinari possunt. Ex his vero omnibus, a quarta Classe suppurantium nempe, huc usque recensitis, facile patet:

Quid censendum de sarcoticis sit, & quæ eligenda: eum enim ea, quæ regenerationi carnis deperditæ favent, SARCO TICA merito habeantur, & suppurantium, seu digestivorum omnes species, omnes detergentium, tum demum, & exsiccantium huic famulenter, ea sarcotica esse clarum, hinc, ut hæc multiplicia, calida, frigida, humida, sicca, emollientia, adstringentia, sic & illa esse evidens. Non datur igitur ullum medicamentum universale vel digestivum, vel detergentem, vel exsiccans, minus adhuc sarcoticum, ut materia chirurgica a multis inutilibus liberari possit. In arte salutari perpetuo sumnum erit cognitio exacta morbi, huic soli remedium facile; nec obstant specifica.



CLAS-

CLASSIS SEPTIMA

CAUSTICA.

Quæ urunt, rodunt, consumunt partes corporis humani, quibus applicantur, CAUSTICA dicuntur. Hæc vero duplia sunt, actualia vel potentialia: priorum etiam in cadaver actio est, ignis enim omnia consumit: posteriorum solum in corpus vivens: funestum hinc omen, dum non urunt amplius vesicatoria.

Duæ potentialium, de quibus hic unicus sermo, classes constituuntur.

I. Rubefacientium.

II. Cathereticorum, seu escharoticorum vel ruptiorum est. Quibus in morbis quæque indicentur, sub speciebus dicetur.

I. R U B E F A C I E N T I A.

Quæ maiori ad partem corporis, cui applicata fuere, concitato per stimulum, quem habent, humorum affluxu, rubere partem faciunt, RUBEFACIENTIA, Epispastica; quæ pustulas, aut vesicas excitant, VESICANTIA, vel vesicatoria appellantur.

Indicantur. *I.* In avertenda in partem nobilem, vel irritabilem humorum fluxione: sic in oculorum, dentium, auricularum morbis, locis retro aures, vel nucha agglutinantur, **CHARMETTON**, licet in dolore dentium vehementiori arteriæ temporali nonnulli, alii maxillæ angulo imponant.

II. In evocando impacto ex parte quadam humore, ut in iisdem morbis, tum in doloribus rheumaticis, arthriticis, ischiadicis, &c. An convenienter in morsu venenato? bonus ab his effectus observatus in *Act. Nov. Acad. N. C.* quem haud placere video **CHARMETTON** an recte?

III. In revocando humore repulso, ut in podagra retropulsa &c. ulceribus manantibus capitis exsiccatis, & inde maiori orto malo, epilepsia &c. L. B. van SWIETEN. Sed tum parti, unde repulsus humor, applicanda sunt.

Contra indicantur vero in bubone venereo, tumore scrophuloso, **CHARMETTON**. Forma varia solida, cataplasmatica, emplastica.

EX VEGETABILIBUS.

Allium.

Arum.

Cyclaminus.

Clematis.

Efula.

Euphorbium.

Flammula.

Piper.

Pyrethrum.

Ra-

Ranunculi.

Raphanus Rusticanus.

Ruta.

Sinapi.

Staphysagriæ semen.

EX ANIMALIBUS.

Cantharides.

Stercus Columbarum.

EX COMPOS. OFFICINALIBUS.

Fermentum Panis.

Emplastrum Vesicatorium.

Si ablata a vesicante facta vesica, effuso humore, siccare confilium, primo mollia, pinguia digestiva, dein exsiccantia imponuntur; si partem attracto humore ulterius perfundi opus, leniora tubefacientia, digestiva stimulantia admoventur; & hæc quidem omnia pro intentione medentis varia esse solent.



II. CA-

II. CATHAERETICA SEU ESCHAROTICA.

Hæc fibras corporis omnes, tam cutaneas, quam carneas, & alias destruunt.

Indicantur *I.* Si fungosa in ulcere haud sensibili caro, coalitum impedit.

II. Si carnis vegetatio, vel excrementia, ultra æquabilem partis sensibilis naturaliter constitutæ superficiem emineat, ut in morbis palpebrarum, sicu, verruca, ectropio, in morbis oculorum, encanti, pterygio completo; in morbis narium, oris, ani, partium genitalium utriusque sexus, CHARMETTON. Q. c.

III. In gangræna humida, applicatis incassum optimis & indicatissimis spirituosis, IDEM.

IV. In tumore frigido ex congestione humorum orto, scirrhoso quounque, etiam glandulari indolente, tum bubone venereo, pestilentiali, scrophuloso, tumore critico maligno, IDEM. Alias indicationes vide in T. III. de argento, ubi de lapide infernali fermo.

Contra indicantur *I.* In morbis complicatis, ut in ulceribus malignis, maxime cancerosis. CHARMETTON.

II. In venereis, pestilentialibus, scrophulosis, iuncturas, tendinosas ligamentosasque partes, vel etiam gland-

glandulosas inflammatas, duras, inæquales, vicinis adhærentes, o cupantibus. IDEM.

III. In ulceribus carie exceptis, in his etiam cariem auferre intentio. IDEM.

IV. In magnis Polypis.

LENIORA.

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Euphorbium | } | Ex Veget. |
| Iris florentina | | |
| Sabina. | | |
| Cineres clavellati. | | |
| Alumen ustum. | | |
| Borax | | |
| Calx viva. | | |
| Calx veneris. | | |
| Ærugo. | | |
| Ochra. | | |
| Vitriolum album. | | |
| Cyprinum. | | |

COMPOSITA OFFICINALIA.

| |
|-----------------------|
| Aqua Phagadænica. |
| Balsarium Martiatum. |
| Oleum Tartari p. d. |
| Unguentum Ægyptiacum. |

FORTIORA.

Arsenicum album.

A multis chirurgis adhibitum verum venenum est,
quod hoc scopo applicatum totius corporis tremorem
induxit MONRO. L. c. quare raro & caute adhibendum.
Au-

Auripigmentum.

Realgar.

Mercurius præcipitatus Albus.

Ruber.

Sublimatus corrosivus.

Et hæc sæpe salivationem induxere MONRO L. c.

Spiritus acidi concentrati.

Nitri.

Salis.

Vitrioli.

Hi vel puri, vel gleba metallica divites applicantur,
sed substantia metallica imprægnati ossium cariei adhi-
biti, violentos dolores, sæpe convulsiones causavere.
MONRO. l. c.

Butyrum Antimonii.

Lapis causticus.

Infernalis.

Et horum quidem omnium; & pro conditione par-
tis, cui applicanda, & pro aliarum circumstantiarum
ratione, forma, lenitas, activitas, variare multum so-
lent. Tutissime vero omnium applicari potest lapis
infernalis: Reliqua enim ulceri adhibita in totam eius
superficie agunt æqualiter, lapis autem infernalis sin-
gulis punctis potest applicari, l. b. van SWIESTEN.



CLAS-

CLASSIS ULTIMA
D E P L E N T I A
C H I R U R G I C A.

Etiam alia sunt ad deplendum seu evacuandum constituta chirurgica, alia medica auxilia; priora hinc recensenda, maxime hirudinum suctione, phlebotomie, scarificatione, fonticulis, setaceis, vesicantibus, quibus tam abdominis quam thoracis paracenthesim, cranii perforationem addere posses, complentur; posteriora iam Tomo II. huius operis dicta sunt.

HIRUDO *Offic.* Syst. Naturæ. Classis Naturalis Vermium, ordo intestinorum. *Germ.* Blut-Igel. *Gallis* Sangsue. *Anglis* Leech.

HIRUDO Medicinalis RAY, hirudo depressa fusca, lineis flavis dorsalibus sex, intermediis immaculatis, subitus cinerea nigro maculata, *Cl. LINNÆO* definitur, ut facile a *Sanguisuga*, quæ marginem lateralem flavum gerit, distinguitur. Utriusque iconem nobis servavere Acta STOCKH. 1757. N. 4. F. 1. 2. 3. 4.

Medicinalis hirudo princeps hemorrhoidalium sector venarum vermis, plus una vice sese sanguine ingurgitare valet, & haec quidem, quæ cæteris omnibus virtutibus animantibus intemperantia est, huic laniardi conciliat, ut denum etiam vitia aliquam gloriam consequantur! & ob ingluviem sanguisugo modestiori & una solum

solum vice sanguine fese obruente, præferatur. Haud tamen reticendum, sanguine seimel potum, etiam postridie vacuum, minus sœpe gulosum deprehendi, & segnius venam, quam iterato respuit, pertundere, & lentias, quasi prioris culpæ conscient animal, inebriari: sive vero vel de hac, vel alia de causa torpidus & deses sit vermis, est vero sœpe de lœvi, stimulari in obsequium & crapulam potest, etiam absterione partis, lactis, sanguinis illitu allici: iamque parti cui applicatur insistere, radicari firmius, & longo gurgite sanguinem bibere parasiticus incipit, quo satur, fese sœpe a loco ipse dimittit, sœpe tamen adhuc pertinacius adhærescit: at tum divelli non debet, est enim in hac re periculum, sed sale, cinere, aut alio pulvere acri conspergi, sic enim facile abscedit. Est etiam ubi largiori depletione opus sit, tuncque huic cauda abscinditur, & iam pleno rivo per vulnus, fuctus sanguis profluit, nec tamen aut ideo cito animal moritur, aut a partis complexu remittit; tantusne est amor potus? quasi discissi corporis interitum diluere hacce volutate aut vellet aut posset animal!

Vulnus a verme illatum triquetrum, sœpe diu adhuc sanguinem stillat, etiam post duodecim horas, & meticuloſis timoreni incutere posset, ob id diligandum, ut venarum sectiones solent, dum prius, aut aceto, aut vino, aut spiritu vini ablutum fuit.

USUS CHIRURGICUS ab omni tempore ad venas hæmorrhoidales deplendas multus & utilis, quod ab ipso loco affecto, sanguis evocetur *C. QUESNAY Traité de la jaignée*, etiam morbis oculorum adhibitus, hirudinibus oculorum exteriori angulo appositis, *C. PRINGEL* angulo interiori carunculæ, *JAMES Dist.*
Uni-

Univers. Gingivis, linguæ inferiori parti, genis in dolore dentium; in tumore pedum oedematoſo, plantis pedum, in podagra cum tumore aquoso vehementer inflammatuſo ſub malleolo, & pedum digito maximo, *Cl. GISLER Abt. Reg. Suec. T. XX. a Cl. KAESTNERO edit.* etiam in dolore crurum a diurna febre relicto, tentatis incassum aquis mineralibus, remediiſ aliis, imo electricitate, *IDEA.* Sunt qui etiam eryſipelati, cancro apponant, *IDEA ibidem.*

Ex proposito instituta Chirurgica operatio, qua vas rubrum venosum ut sanguis effluat, ſecatur, **PHLEBOTOME**; qua aperitur arteriosum, **ARTERIOTOME** appellatur. Utramque immensa ſæpe utilitas, ſæpe etiam irreparabile dampnum ſequitur, quod cum per omnes caſus dicere nimis longum, quibus quæque rebus instituendæ ſint, quibus non poſſint, attis Magistri cum alii, tum maxime in abſoluto de venæ ſectione traclatu *Cl. QUESNAY* conſuli debent, qui ut quidem de multis caſib⁹ pulcherima memorizæ prodidit, ita de graviditate exquifeſtudine judicavit, inorbum graviditatem non eſſe, nec propagationis humanae ſpecieſ ſecuritatem ſcalpello, aut coim mendasse, aut concrediſſe naturam videri, perrara in adeoque occaſionem occurrere, qua gravidæ in venam dimitti ſcalpellum debeat, cuius iudicio & ego accedo, tum quod abſque phlebotomo feliciter animalia utero gerant & pariant, & ipſa humana ſpecies, ante uſum hujus instrumenti haud magis miſerande, graviditate defuncta fit.

SCARIFICARI pars corporis dicitur, dum veſimpiſci ſcalpello, vel in achiña pluribus ſcalpellis in-
Crantz M. M. T. III. N. ſtructa

structa cutis concinditur; Simplici scalpello plerumque Chirurgi utuntur, cum ad profundas illas scarificationes, incisiones vocant, ut partes tensæ, infarctæ in summa inflammatione convulsionem, gangrenam minante, relaxentur, QUESNAY, in ipsa gangrena ut vivarum actio excitetur, OMNES, tum ad eas ad paniculum adiposum usque factas, quas mollis, pellucidus lymphaticus scroti, femorum, crurum, pedum tumor posulat, ut emaciatur, DIONIS *Cours d'Operations.* In ultima vero hac curatione scire juvat, plaga scalpello factas, gangrena saepè vitiari, LA FAYE dans les notes, ob id vino rutaceo, corticis peruviani decocto vel in initio foventas, myrra, aloë, accensis vaporandas, tum spiritu vini camphorato, unguento de styrace, ubi iam vitium adest, obliniendas.

Scalpellum vel simplex vel compositum superficiis illis scarificationibus, quibus sanguinem e parte evocare intentio, maxime admovent: is vero abundantius extrahitur, si consciæ parti, CUCURBITA linamento ardente rarer, aut sine omni flamma, solius machinulæ pneumaticæ beneficio, quod L. B. van SWIETEN & adhibet & probat, exquisite ita adaptetur, ut recte impressa inhærescat, tum enim multo sanguine impletur; sin minus, novo vel eodem linamento ardens cucurbita, iterum iterumque applicatur, donec satis factum fuerit. Auxilii hoc genus in locum venæ sectionis multis suffectum, etiam diris morbis a sanguine natis oppositum fuit, ut cephalæ, apoplexiæ, nervorum resolutioni, marcori, & inexpugnabili dormiendi necessitatibus, concisa occipitii cute, CL. WALTER *Dissert. de scarificat. occipitis;* & ante hunc iam dudum in morbo herculeo occipitium incidere & cucurbitas admovere, etiam occipitium ferro can-

candente adurere, ex veterum doctrina jussit CELSUS,
& in omni morbo, ubi deobstruens sanguis immediate
evocari potest, valet cucurbitis excepta scarificatio, Cl.
QUESNAY.

FONTICULUS, quod quasi ab ipso fonte ma-
la materies fluere crederetur, dictus, est, vel ferro
scidente vel caustico ad paniculum adiposum usque
erofum ulcer, quod piso, globulo quounque alio im-
misso, vinculo ad id accommodato valentius adstringe-
tente, coire impeditur. Corporis sedes his opportu-
næ fonticulis sunt summum caput, fontanellam locum
chirurgi vocant, & hie in desperata cephalalgia eligi-
tur, PLATNER *Instit. Chirurg.* Opportunior in nu-
cha sedes est inter alteram, tertiamque colli vertebram,
maxime lippientibus & ex levissima causa ophthalmia
laborantibus, PLATNER, quibus fonticulus sepe pro-
fuit, L. B. van SWIETEN. *Comm. T. I.* Excitatitur
quoque in brachio inter deltoidem & bicipitem, & in
femore supra genu ad quartum circiter digitum, inter
musculum vastum & gracilem, tum in crure ad quar-
tum digitum infra genu, inter musculum soleum &
gastrocnemium externum, PLATNER, rarius inter
costas, quod dum tamen factum esset in latere vomica
affecto sputo cessante, æger servatus est, WILLIS.

SETACEUM nomen a setis traxit, quod olim
chirurgi pilis ex equorum candis ad id uterentur. Hic
vero est setaceorum excitandorum modus; vel digitis
vel forcipe, arrepta cum paniculo adiposo cutis ele-
vatur, latiore acu, scalpello trajicitur, filum crassius
intortum, vel linteum vel vitta in vulnere relinquitur,
quotidie per vulnus ducitur, pure infecta pars absin-
ditur, recens etiam digestivo illinitur. Valet in lip-

N 2 pi-

pitudine, oriente suffusione, etiam amourosi, PLATNER & OMNES OCULARES CHIRURGI, in molestissima cephalalgia, RUY SCHIUS, L. B. van SWIETEN, in stupore post apoplexiā manente, LA MOTTE *Traite complet de Chirurg.* in memoria lēsa ex lapsu, MEDICAL ESSAYS, Vol. V. p. I.

VESICATORIA dicta p. 122.

PARACENTESIS abdominis, thoracis, scroti, ut & cranii perterebratio, quibus & aqua & sanguis & pus & alijs quilibet humor evocatur, maioris momenti operationes, cautelas requirunt plurimas, & ex propriis fontibus peri debent: consule maxime *M. J. H. L. B. van SWIETEN* commentaria.



INDEX