

doloris sedandi vi præditis commodè miscetur, & herpetas ac erysipelata illitu restinguit. Herba verò cum coma trita testibusque circumlita, libidinis in somno imaginationi simul & feminis profusioni obnoxiiis opitulatur. Sed & genitalia illitu effæta languidioraque reddit. Lac itidem extinguit, & virginum mammas crescere non patitur: ac puerorum quoque testes nutrimento defectos ita reddit, vt intabescant. Maxima efficacissimaque vis Creticæ, Megaricæ, Atticæ, & in Chio ac Cilicia nascenti.

*De Taxo.* CAP. LXXX.

**S**MILAX à quibusdam thymalus, à Latinis Taxus appellatur, arbor abietis magnitudine & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Sed nigrescunt pulli gallinæci, qui Italicæ taxi fructu vescuntur: & qui eundem ederint homines, alii profluuiis corripuntur. Narbonensis verò tam præsentis est veneni, vt qui sub eius umbra sederint obdormierintve, lædantur, & sæpenumerò etiam moriantur. Cæterùm hæc de taxo traduntur eo consilio, vt ab ea quisque caueat.

*De Apocyno.* CAP. LXXXI.

**A**POCYNON aliqui cynanchon, nonnulli pardalianches, alij cynomoron,

alij denique cynocramben, hoc est, brassicam caninam, appellant. Est verò frutex longis constans virgultis, vitilium modo obsequiosis, fractúque ferè inuictis: foliis hederae, attamen mollioribus & per extremum acutioribus, grauíque odore, quadantenus viscosis, & luteo succo turgentibus. Fructus ceu fabarum siliqua digiti longitudine protenditur, folliculari specie, minutis intus seminibus duris, paruis atque nigris. Huius folia cum subacta farina in panes coacta & in cibo data, canes, lupos, vulpes & pantheras necant, ac protinus earum quadrupedum coxendices resoluunt.

*De Nerio.* CAP. LXXXII.

**N**ERION quibusdam rhododaphne, aliis rhododendron vocatum, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus crassioribusque foliis quàm sint amygdalina: flore ad rosæ similitudinem conformato, & siliqua fructui amygdalino proxima: quæ quidem dehiscens, lanosa quadam natura acanthij pappos representante plena reperitur: radice acuminata & longa, lignosa atque gustanti salsa. Nascitur in viridariis, maritimisque locis, & secus amnes. Flores ac folia canibus, asinis, mulis & plerisque quadrupedibus venena sunt: hominibus verò, contra venenatarum bestiarum morsus præfidia, si è vino bibantur.

bibantur, eoque magis ruta addita. Imbecilliores autem animantes, uti caprae ac pecudes, si aquam biberint in qua illa maduerint, moriuntur.

*De Fungis.* CAP. LXXXIII.

**F**VNGORVM differentia duplex. Aut enim edules sunt, aut exitiosi & perniciosi. Ac tales quidem multis de causis eadunt: nempe quia iuxta clauos rubiginosos, aut putridos pannos, aut serpentium latibula gignantur: aut etiam arboribus, quae priuatim noxios pariunt fructus, adnascantur. Habent porro & qui tales sunt concretum quendam strigmentique modo viscosum intra se lentorem, ac etiamnum posteaquam terra sunt eruti si reponantur, celeriter corrumpuntur & computrescunt. At innocetiores, quique veneno imbuti non sunt, gratiam iuribus conciliant, iucundique sunt saporis. Veruntamen & hi ipsi largius sumpti, nocent: quippe qui aegre concocti strangulant, aut choleram morbum accersunt. Remedio est nitri & olei, aut lixiuij cum acida muria potus, haustumve thymbræ decoctæ origaniue iusculum. Est & remedio finum gallinaceum ex aceto potum, aut ex copioso melle delinctum. Ceterum alibiles illi sunt, aegreque dissoluuntur: quin & integri ut plurimum una cum recrementis alui reiciuntur.



*De Colchico.* CAP. LXXXIII.

**C**OLCHICVM, quod aliqui ephemerum, alij agrestem bulbum vocant, sub finem autumni florem edit croci candicantem: deinceps verò folia bulbi, sed pinguiora: caulem dodrantalem cum rufo semine: radicem cortice præditam è nigro fuluescente: quæ quidè delibrata candida, tenera, succi plena atque etiam gustanti dulcis reperitur. Habet verò bulbus eius mediam rimam fissuramve, è qua flos erumpit. Plurimum in Messenia & apud Colchos enascitur. Comesta radix, fungorum more strangulando enecat. Hanc autem idè studiosius descripsimus, vt ne fortè per imprudentiam pro esculento bulbo in cibòs recipiatur: mirum enim quantum saporis iucunditate imperitos alliciat. Opem ferunt eadem quæ fungis deuoratis, insuperque lac bubulum epotum: ita auxiliatur, vt si affuerit, aliud nullum desideretur auxilium.

*De Ephemero.* CAP. LXXXV.

**E**PHEMERVVM, quod alij agrestem irin appellat, caulem foliaque habet lilij, sed hæc tenuiora: flores candidos, amaros: semen molle: radicem vnam digitali crassitudine, longam, astringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentium doloribus præcipua, si decocto ij colluan-

colluantur. Folia verò in vino cocta illitá-  
que, œdemata tuberculáque discutiunt, quæ  
quidem humidi nihil dum contraxere.

*De Helxine.* CAP. LXXXVI.

**H**ELXINE, quam nonnulli parthe-  
nium, alij perdicium, alij sideritin seu  
Heracleam, alij vitrariam seu vrceolariam,  
alij ixinen syluestrem, alij clbadium, alij de-  
niq; polyonymon appellant, nascitur in ma-  
ceriis & parietinis. Cauliculos profert tenues  
ac leuiter rubentes, folia mercurialis, hirsu-  
ta: & circa caules velut exigua femina, aspe-  
ra, vestibus adhærescentia. Vim habent folia  
refrigeratoriam & astringentem: qua ex  
causa sanant illitu crysipelata, condylomata,  
adusta, incipientes panos, omnéque inflam-  
mationis genus & œdemata. Succus eius  
cum cerussa, crysipelatis & herpetibus vtili-  
ter illinitur: vti & podagris, si cerato cypri-  
no aut hircino seuo exceptus fuerit. Vete-  
rem quoque tussim emendat succus, instar  
cyath. haustus. Quin & tonsillis inflam-  
mationem sentientibus vtiliter & gargarizatur  
& oblinitur, necnon & aurium dolorem  
cum rosaceo instillatus leuat.

*De Alsine.* CAP. LXXXVII.

**A**LSINEN alij myosota vocant, quo-  
niam foliis muscutorum auriculas i-  
mitetur. Alsine verò dicta est, quòd opacis

nemorosisque locis gaudeat. Herba est helxina similis, at humilior, longioribusque foliis ac minimè hirsuta: & cum teritur, odorem cucumeris reddit. Vim porro refrigerandi astringendique obtinet: quam obrem oculorum inflammationibus commodè cum polenta illinitur, auriumque dolori succus infunditur: denique ad eadem omnia quæ helxine valet.

*De Lenticula palustri.*

CAP. LXXXVIII.

**L**ENS palustris in aquis pigris stagnantibusque reperitur, mucosus scilicet lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ: propter quod omnibus inflammationibus, erysipelatis, podagrisque & per se & cum polenta conuenienter imponitur: insuperque puerorum enterocelas agglutinat.

*De Semperuino magno.*

CAP. LXXXIX.

**S**EDVM magnum Semperuuii nomen sibi vendicat, quoniam folia semper vireant. Caules edit cubitales, aut etiam altitudinem eam excedentes, crassitudine pollicari, pingues, egregiè virentes, characiæ tithymali modo incisuris distinctos: folia pinguia, pollicari magnitudine, & extremo cacumine linguæ similia: & infima quidem in terram conuexa: quæ verò sunt in capite, ita conferta



conferta adductaque inuicem, vt orbiculato ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in locis montosis & argillofis. Sunt & qui ipsum supra domicilia ferant. Vis ei perfrigerare & astringere. Quamobrem folia tum per se, tum etiam cum polenta imposita, valent ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta & podagras. Succus autem ad capitis dolores cum polenta & rosaceo instillatur: morsis à phalangio potui datur, itémque profluuiò alui laborantibus atque dysentericis. Sed & teretes lumbricos pellit ex vino potus, & fluorem muliebrem sistit, in vellere subditus: denique oculorum lippitudinibus à sanguine obortis vtiliter inungitur.

*De Semperuuo paruo.* CAP. XC.

Semperuiuum minusculum in parietinis, petris & maceriis, nec non & scrobibus opacis nascitur: cauliculis ab vna radice multis, tenuibus: qui quidem crebris cincti sunt pusillis foliis, iisque rotundis, pinguibus, exilibus, mucronatis. Promit & à medio caulem palmum ferè altum, umbella floribusque tenuibus & ex luteo pallidis præditum. Folia eisdem cum priore viribus pollent.

*De Semperuuo tertio.* CAP. XCI.

Videtur & tertium esse semperuiui genus, quod aliqui portulacam agræstem aut