

repida diluas, moxque eo caput nitro antè  
perfrictum illinas. Sunt & qui in vino tun-  
dant, itaque assuerent. Caterùm fructus  
commodè quoque œdematis imponitur.

*De Ægilope, siue festuca.*

CAP. CXXXIX.

**A**EGILOPS, herbula est folia tritici ha-  
bens, sed molliora, & in summo capite  
femina suis inclusa folliculis bina ternave  
rubra, è quibus aristæ veluti capillaceæ ex-  
eunt. Herba cum farina imposita, sanat ægi-  
lopas, duritiâsq; discutit. Ad eadem succus  
cum farina permixtus siccatusq; reconditur.

*De Bromo.* CAP. CXL.

**B**ROMVS, herba est Ægilopi similis, exie-  
catoriam vim habens. Quamobrem si  
cum radicibus in aqua decoquatur ad ter-  
tias, iurique colato per modus mellis admi-  
sceatur, rursumque discoquatur dum mellis  
crassitudo fiat, medicamentum parabitur;  
quo quidem imbutum linteum & naribus  
etiam per se inditum, ad graueolentia na-  
rium vlcera erit efficax. Sunt qui tritam a-  
loën addant, eodémque modo vtantur. Cæ-  
terùm cum rosis siccis in vino decocta, gra-  
uem oris halitum emendat.

*De Glauce.* CAP. CXLI.

**G**LAVX foliis cytiso aut lenticulæ simi-  
lis est, quæ quidem supernè videntur.

Gg. iij.

auerfaque candidiora spectantur: ramulos verò spargit à terra quinos senòlve, tenues, à radice dodrantaes: flores autem viola albæ, purpùrei exeunt, attamen minores. Nascitur iuxta mare. Ipsa decocta cum hordeacea farina, sale & oleo, in sorbitione lactis vbertatem intermissam rekituit.

*De Polygala.* CAP. CXLII.

**P**OLYGALA, frutex brevis est, palmi altitudinem petens, foliis lenticula, gèstu subacerbo. Potus is, lactis in idem abundantiam facere creditur.

*De Oxyris.* CAP. CXLIII.

**O**XYRIS, herba est furculacea, colore nigro, tenuibus virgis, fractuque contumacibus: in quibus foliola terna, interdum & quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra initio, deinde colore mutato rubescencia. Decoctum eius potum iuuat arquatos.

*De Smilace aspera.* CAP. CXLIIII.

**S**MILAX aspera folia habet periclymeni sarmenta multa, tenuia, paliuri aut rubi modo spinosa: & sese arboribus circumuoluit, per eas sursum deorsumque repens. Fructum verò profert racematum, ceu exilibrutisæ racemulum, qui quidem vbi maturuit, colore est rubro, gustumque leniter quodammodo mordet: radice denique est dura crassaque. Nascitur locis palustribus & asperis.

asperis. Folia fructusque contra venena efficacis antidoti vim habent, siue ante, siue postea bibantur. *Quin* & memoriae proditum est, siquid ex his infanti recens nato tritum propinetur, nulla ei postea venena nocitura. Inciditur & ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta quibus venena arcentur.

*De Smilace lauis.* CAP. CXLV.

Smilax lauis folia habet hederacea, sed molliora, lauiora tenuioraque, itemque flagella æque ac prior, ac nullis spinis horrida: quibus tamen haud secus ac illa arbores scandit, iis sese circumuoluens: semen verè gerit ceu lupini, nigrum, exiguum, supra quod flores perpetuò visuntur candidi, vndique numerosi & orbiculati. Ex hac potro smilace per æstatem topiarij operis umbacula factitantur: at folia per autumnum amittit. Cæterùm semen cum dorycenio potum ternis singulorum obolis, vt somnia tum varia, tum etiam tumultuosa videantur, efficere perhibetur.

*De Russo, seu Myrto syluestri.*

CAP. CXLVI.

**M**YRTVS syluestris seu oxymyr sine, folium fert myrti, sed latius, ad formam lanceæ mucronatum: fructum rotundum, medio folio inhaerentem, qui per maturitatem rubet, nucleumque ossis instar durum.

G. iij.



complectitur. Ramuli ab vna eadēque radice numerosi exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, cubitales, foliosi: radix graminis similis, gustanti acerba & subamara. In asperis & præruptis locis enascitur. Folia & baccæ in vino potæ, vrinæ cient, menses pellunt, & calculos vesicæ frangunt. Morbo quoque regio, vrinæ stillicidio & capitis dolori medentur. Sed & radice decoctum in vino potum, eosdem illos præbet effectus. Porro & cauliculi pullulare incipientes, asparagorum vice ac olerum modo in cibo sumuntur: sunt autem amari, vrinæque cient.

*De Lauro Alexandrina.*

CAP. CXLVII.

**L**AVRVS Alexandrina, quam aliqui Idæam, aliqui danaën, alij hypoglottion, alij zalæam, alij denique stephanen vocant, foliis est myrti sylvestris, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in mediis foliis rubro, ciceris magnitudine. Ramos vtrò per terram spargit dodrantes, interdum etiam maiores: radice myrti sylvestris simili, at maiore, odorata, mollioreque. Nascitur in montosis. Radix drachmarum sex pondere in vino dulci pota, difficulter parientibus vrinæq; stillicidio laborantibus auxiliatur. Sed & sanguinem etiam extrahit.

*De*

*De Daphnoide.* CAP. CXLVIII.

**D**APHNOIDES aliqui euperalon, alij chamædaphnen, alij peplion vocant: exiguus frutex est, cubitalis, ramis multis à medio sursum versus lori modo flexilibus & obsequiosis, iisque foliosis. Ramulos vestiens cortex supramodùm viscosus est: at folia sunt lauri, verùm molliora, validiora, fractûque contumacia, quorum gustatu os faucêsque mordentur & accenduntur: flores candidi: fructus, cum ematurur, niger: radix supervacua. Nascitur in montosis. Folium seu aridum, seu etiam recens, potu pituitosa per aluum deicit: vomitus quoque ac menses ciet: quin & commanducatum, pituitam à capite extrahit: sternutamenta etiamnum mouet. Cæterùm & quindenz ipsius bacca potu, purgant.

*De Chamedaphne.* CAP. CXLIX.

**C**HAMAEDAPHNE, quam & Alexandri-  
nam aliqui vocauerunt, virgas promit  
singulari ramulo constantes, cubitales, re-  
ctas, tenues ac læues. Sed & huic folia sunt  
lauri similitudine, at læuiora multò tenuio-  
ràque ac viridiora: fructus rotundus, rubens,  
foliis annexus. Huius folia trita illitæque,  
capitis doloribus inflationibusque stoma-  
chi succurrunt: eadem bibita cum vino, eos-

mina sedant. At succus cum vino propinatus, menses venalesque ciet: idem quoque subditus in pello præstat.

*De Helleboro seu Veratro albo.*

CAP. CL.

**V**ERATRUM album folia fert plantaginis aut betæ sylvestris similia, sed breviora, nigriora & dorso rubescentia: caulem palmi altitudine, concavum: qui quidem tunicas quibus conuoluitur abdicat, cum arescere incipit. Radices subiacent numerosæ, tenues ac fibratæ, ab exiguo & oblongo capitulo ceu cepa exeutes, eidemque annexæ. Nasçitur in montosis & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum autem habetur veratrum, quod modicè extentum est, candidum, fragile, carnosum, minimè exarurum aut iuncum referens, aut dum frangitur, pulverem emittens: sed tenuem habens medullam, gustûque non admodum feruens, neque saluam subinde ciens: huiusmodi siquidem strangulat. Primatum tenet Anticyrenum. At Galaticum æquè atq; Cappadocicum, candidius est, iunco simile, maioremq; strangulandi vim habet. Porrò vomitionib; varij coloris humores extrahit: collyriis admiscetur, quæ caliginem oculorû discutiedi vim habent: menses pellit, partûsq; peccat.



necat, appositum: sternutamenta mouet, ac  
 moues interficit, cum melle & polenta suba-  
 ctum: quin & carnes colliquat & absumit, si  
 coquatur vna. Datur & ieiunis per se, item-  
 que cum sesamo & prissana aut alicâ cre-  
 more, aut cum aqua mulla, aut pulte, aut  
 lente aliâve forbitione. Sed & cogitur cum  
 pane, atque ita inassatur. Apparatus verò in-  
 superque victus ratio vtentibus accommo-  
 data diligenter ab iis tradita est, qui ex pro-  
 fesso de ipsius dosi scriptitarunt. Sed maxi-  
 mè Philonidæ Siculo Ennæo assentimur.  
 Longum enim foret, in hac quam præcipuè  
 instituimus materiae Medicæ tractatione,  
 victus rationem ad medendum necessariam  
 simul & semel exponere. Sunt tamen non-  
 nulli qui dent ipsum cum larga forbitione,  
 aut copioso cremore: vel etiam exhibito  
 parciore cibo post illicò veratrum offerant:  
 ac iis præsertim quibus strangulationis sus-  
 spicio imminet, aut corporis imbecillitas a-  
 det. Illo enim modo sumentibus purgatio  
 periculo vacat, quòd non intempestiuè in-  
 stitue citius medicamentum corporibus ac-  
 cedat. Caterùm & sedi subditæ ex eo balani,  
 cum aceto vomitiones concitant.

*De Helleboro seu Veratro nigro.*

CAP. CLI.

Helleborum seu veratrum nigrum aliq̃