

Solis ardore contractas & papulas in facie tollit. Vomitiones autem mouet aluūmque soluit, cum hydromelite: sed valde stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu subducit: at cortex eius, magis astringit. Ceterum quod ex caetula expressaque reliquum est, quasi recrementum seu magma, sine gmatibus imiscetur, quæ ad scabritias & pruriginas accommodantur.

De Narcisso. ¶ CAP. CLXI.

NARCISSYM sunt qui, haud secus ac lilium, liriū appellarint. Foliis quidem porrum refert, at tenuia ea sunt, minoraque multò & angustiora: caulis inanis ac sine foliis supra doctantem attollitur: flos in ipsius cacumine albus, intus croceus, & in quibusdam purpureus: radix intus candida, & rotunda, bulboia: semen velut in membrana seu pellicula, nigrum & oblongum. Probabilissimus nascitur in montosis, odore suauis: reliqui porrum imitantur, & herbaceum quendam odorem respiciunt. Radix cocta seu edatur, seu etiam bibatur, vomitoria est: ambustus igni prodest, cum melle trita: praecisos neruos imposta glutinat: luxatis malcolis diurnis que articulorum doloribus trita ex melle illita que subuenit. Vitia cutis à sole contracta, itemque vitiliginem cum vrtice semine & aceto emaculat: cum eruo

Hh. iij.

autem ac melle, vlcerum sordes expurgat,
& abscessus rumpit agrè maturescentes: de-
nique infixæ corpori extrahit, imposita cum
lolij farina & melle.

De Hippophaë.

CAP. CLXII.

HIPPOPHAES, quo vestes à fullonibus
interpolantur, in maritimis sabulosis-
que nascitur. Est autem frutex è cremiorum
genere, densus & furculos suos quoquouer-
sus expandens, foliâque habens longâ, olea-
ginis proxima: sed angustiora mollioraque,
inter quæ candicantes spinæ emicant, sicca,
angulosâ, distantes inter se: flores hederæ
corymbis similes, ac veluti racematim sibi
inuicem cohærentes, minores tamen ac
molles, candidos simul & ex parte puniceo
colore rubentes: radicem crassam, mollem,
lactei succi plenam, gustu amaram. Ex hac
perinde ac è thapsia liquor excipitur, qui &
per se & cum erui farina subactus siccatur,
& ad vsum reconditur. Sincerus is, biliosa, a-
quosa pituitosaque detrahit, oboli pondere:
at erui farina exceptus, quaternis obolis ex
aqua mûssa. Sed & frutex cum radicibus sic-
catus tunditur, & cum aquæ mûssæ diuisidia
hemina tritus exhibetur. Cæterum è radici-
bus ac simul etiam herba ipsa succus itidem
hæud secus ac è thapsia exprimitur, cuius in
purgationibus modus est, drachma vna.

De

De Hippophaëto. CAP. CLXIII.

HIPPOPHAËTON, quod aliqui etiam hippophaës appellant, nascitur iisdem locis, quibus & hippophaës; estque spinæ fulloniæ genus. Humi verò sternitur, sine caule ac flore: minutis tantum foliis, iisque spinosis, & capitulis inanibus; radice crassa & molli. Succus foliis, radice & capitulo exprimitur: qui quidem exiccatur, atque datus cui volueris obolis. tribus in aqua mulsa, aquam pituitamque detrahit: priuatim verò orthopnœæ, comitialibus, nervorumque vitis convenit huicemodi purgatio.

De Ricino. CAP. CLXIII.

CROTONA, hoc est, ricinum seu cici, alij qui sesamum sylvestre, alij scseli Cyprium appellant. Ricini verò nomen accipit à similitudine, quæ est illius semini cum ricino animali. Arbuscula est parvæ fici altitudine, foliis platani, at maioribus, lævioribus ac nigrioribus: ramis caudicibusque cauis in harundinis modum, semine in vitis asperis, quod decorticatum ricinum animal representat. Ex eo oleum nomine cicinum exprimitur, sibi quidem ineptum ac foedum: sed aliàs lucernis, & emplastris vtile. Grana numero triginta purgata tritaque, potu pituitam bilem aquasque per aluum

extrahunt, ac vomitiones etiam cient. Veruntamen admodum ingrata laboriosaque est eiusmodi purgatio: liquidem valenter stomachum subuertit. Tula vero & imposita eadem; varos & vitia cutis à sole contracta depurgant. At folia cum polentæ polline trita, oculorum œdemata inflammationesque leniunt. Eadem seu per se, seu etiam ex aceto illita, lactis vbertate turgentes mammæ cohibent, & erysipelata restringunt.

De Trihymalæ, seu lactaris herbæ.

CAP. CLXV.

TITHYMALORVM genera septē: quorum masculus characias, quasi vallaris, ab aliquibus comatus, amygdaloides aut gobius appellatur: alter, qui cœcina existimatur, myrtites, quem & caryitem aut myrsinitem vocant: tertius parahus, quem nonnulli trihymalidem appellant: quartus helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides, [quasi arborescens]: septimus denique platyphyllos, [quasi lati folius] dicitur. Porro Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, aceti lacteoque succo referti: folia sunt circa ramulos oleaginis similia, sed longiora & angustiora: radix crassa lignosaque: in caulium cacuminibus coma iunci similium virgultorum, sub quibus caua quædam peluibus aut alucolis similia,

ac

ac in iis semen. Nascitur in asperis & montosis. Succus lacteus per altum puitam bidemque trahit, obolis bilis in posca sumptis: at cum aqua mulla, vomitiones etiam mouet. Circa vindemiam succus is congestis ramulis, mox dissectis & in vas inclinatis, excipitur. Aliqui adiecta erui farina pastillos ex eo fingunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in ficos quæ exsiccantur terq; quaternasve guttas instillant, vt cum iis inarescant, eiusmodique ficos ad vsum recondunt. Sed & per se tritus in pila, cogitur in pastillos atque reponitur. Porro qui succum colligit, minime obuersum vento stare, aut oculis manus adiuuere oportet: quinimò antequam operi sese accingat, corpus, præsertimque faciem, collam scrotumque adipe aut oleo cum vino perungere. Quoniam verò fauces idem exasperat, catapota quæ ex eo concinnantur, cera aut decocto melle oblini, atque ita dari par est. Caricas verò binas ternasve solvendæ alui gratia sumpsisse satis est. Recens idem succus ex oleo illitos in sole capillos detrahit, renascentisque flauos & exiles efficit, tandemque omnes abolet. Dentium cauis inditus, eorum dolores leuat: sed cera dentes oblinendi, ne fortè præterlapsus is fauces linguamve malè afficiat. Tollit & aliu

myrmecias, pensiles verrucas & quæ thymi
 florem repræsentant, itémque lichenas. Va-
 let idem aduersus pterygia, carbunculos,
 phagedænas, gangrænas atque fistulas. Legi-
 tur semen autumnò, & siccatum sole leuiter
 runditur, tandémque ab aceribus repurga-
 tum loco mundo reponitur. Similiter & fo-
 lia siccata reponuntur: quæ haud secus ac se-
 men lactei succi effectum præbent, dimidio
 acetabulo pota. Sunt qui ipsa inueterant, ad-
 misto etiam cum lacte, lepidio calcôque
 contuso. Sed & radix drachmæ pondere hy-
 dromeliti inspersa potaque, per aluum pur-
 gat. Decocta eadem cum aceto, dentium do-
 loribus auxiliatur, siquidem ea colluantur.

De Tithymalo femina.

Femina, quam myrsiniten aut caryiten
 vocarunt, similis suapte natura daphnoidi:
 foliis myrti, sed maioribus ac firmis, in sum-
 mitate acutis, atque etiam aculeatis. Sar-
 menta mittit ab radice dodrantalia, fru-
 ctumque profert alternis annis nuci simi-
 lem, qui quidem leniter linguam mordet.
 Nascitur & hic in asperis. Succus lacteus, ra-
 dix, semen & folia, consimilem antedicto
 fortiuntur facultatem. Sed ille, ad citandas
 vomitiones hoc ipso efficacior.

De Paralio.

Tertij generis tithymalus Paralios voca-
 tur.

tur, quem aliqui tithymalida aut mecona appellauere. Nascitur in maritimis, ramis palmum altis, erectis, subrubentibus, quinis senisve à radice exeuntibus: circa quos folia serie quadam digesta, eaque parua, quadantenus angusta, oblonga, & lini foliis similia: capite in cacumine orbiculato, in quo semen erui simile, varium, flores albi. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Idem huius qui antedictorum vsus, similiterque reponitur.

De Helioscopio.

Qui Helioscopius dicitur, foliis est portulacæ, attamen tenuioribus rotundioribusque, ramulis ab radice quaternis aut quinis, dodrantali altitudine, tenuibus ac rubentibus, lactis succi copiosi plenis, capite anethi: semine velut inter folia locato. Comam cum sole circumagit, ideoque Helioscopij nomen accepit. Ceterum in ruderibus potissimum & circa oppida nascitur. Colligiter semen succusque, vt & aliorum: nam & eadem que superioribus vires, non tamen vsquæ adeo valida.

De Cyparissia.

Cyparissias caulem profert dodrantalem, aut etiam altiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine pullulant, molliora tamen tenuioraque: atq; in totum nuper nascentem

pinum æmulatur, unde & cognomen traxit. Candido & hic succo refertus est, eique vis eadem, qua superioribus.

De nascente in petris tithymalo.

Dendroide nominato.

Qui vero in petris nascitur, Dendroides, quasi arboreicens, cognominatus, foliolus est in cacumine, densamque spargit comam, succo lacteo prægnans, subruentibus ramis, foliis circum ipsa myrti tenuioris, semine characiæ. Eiusdem est effectus, cuius & antedicti, simili que modo reconditur.

De Platyphyllo seu latifolio.

Platyphyllos, verbalco similis est. Radix, succus & folia, aquas per inferna trahunt. Pisces necat, rulus aquaque dilutus, id quod & ante memorata tithymalorum genera præstant.

De Pityusa. CAP. CLXVI.

PIT Y USA, quam alij clema, alij cram-
bion, alij paralion, alij denique canopi-
con vocant, a cyparissia tithymalo specie
differre existimatur, id eo que etiam in tithy-
mali genere connumeratur. Caulem profert
cubito altiorem, crebris geniculis interse-
ptum, foliolis acutis ac tenuibus circunda-
tum, pini folia imitantibus; flores exiguos,
penè purpureos; semen latum instar lenticu-
lae; radicem candidam, crassam, lacteo succo
refertam.

refertam. Quibusdam in locis frutex hic
prægrandis inuenitur. Purgat per inferna
radix, drachmis duabus data in aqua mulla:
femen vero, drachma vna. At succi farina ex-
cepti cochlearium in catapotio datur: folio-
rum denique modus, drachma tres.

De Lathyride. CAP. CLXVII.

LATHYRIS, quam & aliqui tithymalon
appellant, eamque tithymalorum nu-
mero ascribunt, caulē cūbiti alti-
tudine & digiti crassitudine, inanem. Sunt
porro in ipsius cacumine ala, & folia qui-
dem in caule oblonga, amygdalinis proxi-
ma, sed latiora & lauiora: quæ verò in sum-
mis exeunt ramulis, minora conspiciuntur,
aristolochiæ aut hederæ oblonga figura. In
summis autem surculis fructum gerit tripli-
ci loculamento distinctum, rotundum ceu
capparium: in quo tria sunt minuta semina
incurvantibus tuniculis inter se discretis,
eruis maiora, quæque decorticata candida
sunt, & gustu dulcia. Radix tenuis & candi-
da, nullius vsus: totus verò frutex lacteo suc-
co turget, vti tithymalus. Aluum purgant
grana septem, octo, in catapotio sumpta,
vel esitata, & cum caticis palmulifve deuo-
rata: sed aqua frigida postea sorbeat. Tra-
hunt autem pituitam, bilem & aquas. Suc-
cus tithymalini modo exceptus, eundem

effectum præbet. Cum gallinaceo etiam aut
oleribus folia decoquuntur in eisdem vsus.

De Peplo. CAP. CLXVIII.

PEPLON, alij sycen, alij papauer spu-
meum appellant: ex guus frutex est, la-
ctei succi plenus, folio paruo ceu rutæ, at la-
tiore: vniuersa coma ferè dodrantali, rotun-
da, humi sparsa: semine sub foliis paruo, ro-
tundo, minore quàm candidi papaueris.
Herba multiplicis est vsus, at radicem habet
vnicam, eamque superuacuam, è qua totus
frutex erumpit. Nascitur in hortis ac inter
vites. Colligitur messibus, ac siccat in ymbra,
crebròque versatur. Semen verò tustum
repurgatumque reconditur. Bilis ac pituita
detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis
hemina potio: opsoniis admistum, contur-
bat aluum. Muria quoque conditur, itaque
asseruatur.

De Peplide. CAP. CLXIX.

PEPLIS, quam vocant aliqui syluestrem
portulacam, Hippocrates peplion, in ma-
ritimis maximè nascitur. Frutex verò est ra-
mulus quoquoersum expandens, & candi-
di succi plenus, foliis hortensis portulacæ,
rotundis & infernè rubentibus: semine sub
foliis rotundo, ceu pepli, feruente gustu: ra-
dice tenui, singulari ac superuacua. Colligi,
reponi,

reponi, darique vti peplus, itidemque condi-
ri solet: ac eadem quoque vires habet.

De Chamæsyce. CAP. CLXX.

CHAMÆSYCE, quam aliqui Sycen no-
minant, ramos emittit quaternum di-
gitorum, per terram stratos, teretes, lactei-
succis plenos: folia lentis figura, peplo simi-
lia, parua, tenuia ac terræ inhaerentia: semen
sub foliis rotundum, ceu pepi: radicem tenuem
ac superuacua: sed neque florem, neque caulem
promit. Rami ex vino triti & in pello appo-
siti, vuluæ dolores sedant: œdemata vero,
pensiles verrucas & myrmecias illiti tollunt.
Elixir autem si comedantur, aluum soluunt.
Sed & corundem succus, simili effectu prodest:
prætereaque illitus, aduersus scorpionis
ictum auxiliatur. Valet & contra oculorum
hebetem aciem, itemque caliginem, incipientes
suffusiones, cicatrices ac nubeculas, cum melle
inunctus. Cæterum in petrosis aridisque nascitur.

De Scammonia. CAP. CLXXI.

SCAMMONIA ramos ab vna radice mul-
tos profert, ternum cubitorum, pingues &
quadantenus hirsutos: foliis itidem hirsutis,
helxinæ [cissampeli] aut hederæ similibus,
sed mollioribus ac triangulis: floribus
albis, rotundis, in modum calathorum con-

li. j.