


ENCHIRIDIUM MEDICUM

AUTORE
JOHANNE KÆMPF

M. D. SERENISS. LANDGR. ET PRINCIP.
HERED. HASS. &C. &C. ARCHIATER ET CON-
SIL. AULIC. SOCIETAT. ACAD. SCIENT.
PRINCIP. HASS. ET SOCIETAT. PATRIOT.
HASSO HOMBURG. REGIÆ SUECIC.
INCORPORATÆ SOC. ET HUIUS
SUBDIRECTORE.



FRANCOFURTI & LIPSIÆ
EX OFFICINA GARBIANA
MDCCLXXVIII.



PROOEMIUM.

Enchiridium hoc, jam diu in privatos ut & tyronum usus conscripsi. Nunc emendatum paululum, publici juris facere non hæsito; quam sine cortice nucleus, utile tamen spero, evolvendi, consulendi & memoriam sublevandi scopo, & acceptum. Continet præcipua, causas, diagnofin & curam concernentia momenta, pure quidem practica, Medico clinico fcitu fumme neceffaria, ex innumeris fide digniffimis obfervationibus, in tot fcryptis inclytorum auctorum difperfis, & hic illic in commentariis &c. fparfim notatis, haud parvulo labore collecta, digefta & laconice defignata, beati patris, practicotati, chariffimi fratris, feliciffima praxi clari, propriaque experientia probata, aucta. Diligentiffimæ *in cognofcendis & expifcandis caufis* fcificitationi; acuendo ad *rectius diftinguenda* iudicio, & *potenti in agendis paucitati*, ceu maximi ponderis momentis & axiomatibus, hancce elaborationem fuper-
* 2 strue-

❧) ○ (❧

fruere conatus sum. Per magnæ cau-
sarum multiplicitati divina fere memo-
ria impar est. Huic succurrendi gratia,
causas curiose collectas, in certas classes,
secundum notam illam Boerhaavii men-
tem redegisti. Tabulam hanc, causas
morborum sistentem, opusculo ideo
præfixi, quia methodus, medendi car-
do, in clara earum notitia vertitur.
Multas adjeci, quæ rarissime obveniunt,
& quæ gravium quanquam pathematum
origines, minutissimæ vero apparentes,
toties negliguntur, vel prætermittun-
tur indagando in altiora: Exhortatus
exemplo convulsionum, quas vidit
Boerhaave, ex capitis infantis constri-
ctione, ex acicula tenelli cuti infixæ:
gravissimæ ophthalmiæ, Morgagni, ex
ala muscæ ad corneam adglutinata vix
tandem animadversa. Uti & ipse vidi
& sanavi, sublata causa, affectum sopo-
rosus ex pedum sudoribus retroactis;
cephalalgias sat rebelles, ex intermisso
usu consueto pulveris peti, ex nimia
collaris strictura, ex carbonum dolo-
sâ in hypocaustis, pedes refocillan-
tium, vel infusum Thee sorbillantium:
marasnum senilem ex subito nimis pro-
hibito abusu spiritus adusti, qui per
annos

annos antea in deliciis fuit; lumbares dolores antinephriticis & hæmorrhoidalibus remediis diu, male tractatos, ex nixu, quem ocreæ angustiores caufarunt: valetudinarios obstrictam & mollem nimis diætam. Inter caufas, sæpe occultas, infarctus viscerum abdominalis, potissimum numerandi, qui crebrius, quam vulgo creditur, mihi quotidie obveniunt, & de quibus in curatione morborum chronicorum & acutorum semper cogitandum. Maximam navavi operam in colligendis & follicite discernendis signis, & feligendis aptandisque, quæ cuilibet speciei quadrant, remediis. Hæc ut unico intuitu perlustranti undique pateant, in brevissimum, ideoque incomtum sermonem contrahere studui. Dispareres varias morborum inutiles denominationes, de quibus auctores sæpe discrepant, illasque morborum definitiones, quæ diagnofin minus illustrant, omifi; & repetitiones, quas rei gravitas non postulat, vitavi. Brevitatis necessitate coactus, auctorum, quorum aratro solum perstrinxi, nomina, in vitus silentio præterivi; eorum ipfiffima, quantum fieri potuit, verba quam studio retinuerim. Mor-

Morbos, qui maximam affinitatem habent, uti cephalalgia cum reliquis morbis capitis, sub uno titulo pro exemplo normaque reliquorum, fusius elaboravi; iis vero momentis, quæ cuilibet specifica sunt, non defui adjiciendis. Vix ullum remedium simplex aut compositum mandavi, quod non crebriori usu expertorum practitorum, vel propria experientia probatum fuerit. In his recensendis simplicitati studens raro prolixior fui. Sunt vero morbi, e. g. hypochondriacum malum, phthisis &c. qui formularum mutationes & variationes exigunt; & idem malum, e. gr. lues venerea, non semper eidem remedio, quamvis huic specifico cedit, alteri auscultaturum. Quando decoctorum vel infusorum compositiones, plura simplicia ingrediuntur, non eo scopo factum est, ut singula simul adhibeantur.

De nonnullis remediis, nuper celebratis, ideo mentionem non feci, quia eorum determinatus effectus nondum sufficienter constat; alia vero, quorum virtutes (ut cl. Spielmanni, viri ab omni præjudicio alieni verba, mea faciam) a nube tessium non levium confirmatæ sunt, quamvis a nonnullis frustra adhi-

bita

bita, ab aliis vituperata & damnata fuerint, optimo jure hic locum inveniunt.

Sic dicta venena potissimum puto, ab illustribus de Stoerck, in plus quam mille & mille miserorum mortalium solamen & salutem versa. Ipse herbæ anagallidis flore puniceo, tempore solstitii æstivi collectæ, cum herbæ alfinæ non commutatæ, vetustate non corruptæ, & rite usurpatæ, vires ad hydrophobiam vel rabiem post morsum canis &c. vere rabidi præcavendam, immo ipsum paroxysmum mitigandum efficacissimas específicas, nec unquam fallaces, in innumeris fere casibus, tam ac testis, quam ac Medicus, totis pagis succurrens, læte expertus sum; quamvis aliis minus efficax visa fuerit.

Unde quæso hæc discrepantia? Diversa forsitan plantarum patria & solum, admodum diversam ipsis imprimunt vim. Diversum clima ægroti temperiem immutans; mali sæpe non satis cognita complicatio; botanices ignorantia, inde e.g. cicutæ virosæ & chærophylli bulbosi cum conio maculato commutatio; fraus quorundam pharmacopolarum, & impia negligentia, qui quid pro quo, saltem vetusta obsoleta vendunt, & medica-

TRUD

dicamenta non curate præparant; medicaminum incongrua dosis & adhibendi modus, vel non continuatus usus; ægroti idiosyncrasia, morositas, ignavia, tædium, inconstantia, fiducia & requisitæ curaturæ (quæ in nosocomiis mira facit) defectus. Hæc singula vires optimi & specifici remedii infringere, nec non in nocivum invertere valet. Concurrunt novitatis odium, pruritus contradicendi, animositas, & præjudicium tam contra, quam pro, quo virtutes infallibiles ac de divino universali remedio expectant. Auctorum dissensum, inprimis circa medicamentorum effectus in certis morbis, inter se, nec non cum propriis observationibus conciliare annisum. Formulas mihi familiares, aliasque non omnibus notas, in enchiridio citatas, sub finem invenies, Benevole Lector! Mox & alteram Enchiridii partem, huic multo compendiosior, quæ in febribus versabitur, in lucem mittere liceat.

Ne tædeat nimis jamjam prolixitatis in opusculi fronte, Vale!

Dabam Hanoviae 1778.

CAUSÆ



CAUSAE MORBORUM.

Aliaque Momenta, in qua Medicus clinicus inquirere debet.

I)



INGESTA. a) Alimenta, cibi peccantia, qualitate acri, falina, acida, austera, alkalescente, muriatica, aromatica, pingui, rancida, viscida, glutinosa, dura, sicca, fermentescibili, flatulenta, relaxante, obstipante; defectu, copia, varietate sibi contraria, avidius, vix masticata, sub animi & ingenii laboribus, potissimum ab infirmis deglutita. Voracitas post morbum aut inediam. Annonae caritas. Panis non bene cocti & fermentati, mucidi, calide ex furno extracti usus &c.

b) Potus qualitate, quantitate, defectu nocentes: Abulus spiritus fermentati, ardentis, aromatizati, empyreumatici; vini vilioris, ex uvis immaturis, austeri, crassi, crudi, tartarei, vapidi, vaporosi, nimis sulphurati, fermentantis; cerevisiae male coctae, non defaecatae, acescentis vel

A ex

ex frumento humido pptae; non minus aquae gravioris, durae, impurae, particulis heterogeneis, calcareis &c. refertae, tepidae, Thea, Coffe &c. impraegnatae.

c) Venena & veneni vim habentia. Venena acria corrosiva, acida alkalina, narcotica, coagulantia, styptica, incrassantia, dissolventia, incognitae naturae & singularis in certas partes agendi effectus, ex tribus regnis desunta: Veneni vim exferentia & sub medicamentorum & alimentorum titulo oblata: Tinctura antiptitica gramanni, antihecticum Poterii; cathartica drastica &c. &c. medicamenta male adhibita; purgantia, vomitoria, instante mensium fluxu, post animi agitationes vehementes; eorumque nec non mercurii & Guajaci usum excipiens refrigeratio; Potus frigidus post iram, vel corpore calente; vina lithargyrio fucata, cerevisia soporiferis alterata, aqua putrida, stagnans, infectis scatens, alimenta in vasis aeneis, plumbeis diu servata, cucumeres aere inquinati, panis ex fecali cornuto, rubiginoso pptus gypso &c. corruptus; carnes animalium aegrotantium, vel ex morbo mortuorum; olera, fruges, fructus horæi, rubigine, ovulis, excrementis insectorum conspurcata; cum seminae raphanistri, lolio temulento &c. mixta, fungi, mytuli venenati; pulvis peti in capsulis plumbeis diu servatus.

d) Aër nimis frigidus, calidus, ficcus, humidus, rarus, densus, subterraneus, diu reclusus; miasmate, vaporibus noxiis, ovulis insectorum, transpiratione multorum hominum, fumo, vapore carbonum, candelarum, potissimum extinctarum, liquidi fermentantis, metallico plumbi, mercurii

curii, floris calcis vivae, sulphuris, arsenici, narcoticorum, aliorumque venenorum, exhalationibus paludum, post fluminum inundationes, tempestates pluviosas, partium animalium putrescentium, coemeteriorum, cloacarum, plantarum alkalinarum putrefactarum, lini & cannabis in aqua maceratorum refertus, aliove modo corruptus, in scholis, nosocomiis carceribus, fodinis, puteis, cubiculis, depressis, humidis, haud ventilatis. Huc quoque pertinent venti a regionibus infalubribus venientes.

2) **GESTA** a) Motus muscularis nimius fortior, statim post cibum sumtum & post quietem diurnam, in aëre calido institutus.

b) Quies nimia; otium vel vita sedentaria.

c) status, sessio; decubitus singulares.

d) Vigiliae, lucubrationes protractae.

e) Somnus immoderatus in aëre impuro calido arcte concluso; sub decubitu supino decliviori, statim a cibo sumto; ventre repleto.

f) Animi pathemata, indignatio vindictae cupiditas; amor, moeror, iique compressi, averfatio, metus, terror, imprimis quos morbi contagiosi inculcant, auri sacra fames, Zelotypia, Philautia excedens, scrupuli circa religionem, gaudium magnum, improvisum; quorsum quoque meditationes profundae, abtractae & imaginatio vivida, sive Enthusiasmus pertinent.

3) **EXCRETA** nimia quantitate. Lympha, serum, mucus, sauguis, lac maternum, per evacuationes morbosas, alvi fluxus, sudores, diabeten, haemorrhagias &c. per artificiales improvi-

de ac intempestive institutas, purgantia, diuretica, sudorifera, Venae sectiones &c. saliva per malam consuetudinem, tobaci fucionem, mercurii usum, affectum hypochondriacum, semen per pollutiones, veneris abusum potissimum pramaturum & onaniam, liquidum nervorum per plerasque has evacuationes, inprimis feminis & per Cs. gener. 2. a - d - & f.

4) RETENTA *b*) faeces alvinae, (vide Alvi obstipationem) lotium, (vide urinae difficultates) semen, in lascivis, vividae imaginationis hominibus; transpiratio, sudor; manationes ferrosae, mucosae, narium, in coryza, Tabaco asuetis, aurium, oculorum &c. fluor albus, Gonorrhoea, Dysenteria pluresque aliae evacuationes consuetae aut criticae salutares sufflaminatae.

b) Menses, haemorrhoides aliaeque haemorrhagiae suppressae; lac repulsum (vide morbos puerperarum & lactis metastases.)

c) Artificiales, consuetae evacuationes neglectae.

d) Febres intermittentes, pramature cohibitae, acutarum crises turbatae.

e) Cutis defoedationes, scabies, gutta rosacea, herpes, tinea, erysipelas, parotides, bubones, exanthemata retrograda, repulsa, fonticuli, ulcera consolidata.

f) Arthritis, Podagra, oedema, sudor manuum, pedum, subaxillaris retrogressa, retroacta. Huc faciunt, refrigeratio, Vestimenta leviora, vere & autumnio gestata, animi agitatio, terror &c. evacuationes naturales, artificiales excedentes,
intem-

intempestivae, vires fractae, opiata, saturnina sulphurata &c. in- & externa.

5) **APPLICATA EXTERNA** a) aëris injuriae, subitaneae mutationes; calor interdiu intensissimus, subsequente nocte frigida. vide Nro. I-d Infolatio.

b) Balnea calidiora, inprimis post iram, frigida, atmosphaera humido frigida in locis subterraneis, quibus calens corpus immisum.

c) Venena in Unguento & Empl. Cingulo &c. praecipue partibus vulneratis, excoriatis, exulceratis apta. Viperae &c. ictus, lanceola corpori impuro prius apta; nidor carbonum ex batillis suppedalibus illis ascendens.

d) Violentia externa, vulnerans, contundens, erodens, adurens &c.

e) Vestes angustiores; unde venarum jugularium compressio per collare, viscerum thoracis & abdominis per loricas illas rigidas, arctiores.

f) Odor gravis, crebrior narcoticorum, spirituosorum, aromatum, florum, aquarum odoriferarum &c.

6) **PLETHORA** vera, spuria, universalis, particularis, vel topica.

7) **SANGUIS** nimis tenuis, aquosus, debilis ex mollitie, regimine, diaeta strictiore; abusu tepidae, fructuum horaeorum, vegetabilium, potissimum enascens; unde auctior transpiratio, sudor, urina; foex alvi liquida, corporis infirmitas, nervorum mobilitas &c.

8) SANGUIS nimis spissus, glutinosus: unde circulationis, se- & excretionis segnities, impedimenta, infarctus.

9) CACOCHYMIA VARIA biliosa alkalescens subputrida, acida, vapida, atrabilaria, muriarica, scorbutica, scabiosa, scrophulosa, variolosa, morbillosa, miliaris, erysipelacea, arthritica, venerea, cfr. Nro. 4-e-f. pituitosa, aliusque naturae incognitae, puogenesi, cancronecrosi, insectorum generationi, antipathiae &c. lenocinans, rarefaciens, coagulans, dissolvens, refrigerans, calefaciens, mira procreans.

10) DEBILITAS FIBRARUM redundantia liquidi aquosi; oleosi, mucosi, imbutarum, juncta sensibilitate, mobilitate nimia, vel interdum justo minori, hæreditaria, congenita, acquisita per Nro. 1. 2. 3. 7. potissimum per venerem praematuram; educationem mollem, mores & phantasiã à juventute depravatas; per vitam sedentariam, voluptuosam, vel otium, corporis & animi agitationes, praecipue celatas; balneorum tepidorum & remediorum intempestivum usum; venena quaedam, morbos, dolores, convulsiones, spasmos diuturnos, partus laboriosos, evacuationes &c. praegressos; unde ex levi causa anomalia motuum, ataxia spirituum & sensibilitas mire depravata.

b) Irritabilitas nimia fibrarum magis fixarum, rigidarum, juncta nonnunquam debilitate, ex humoribus phlogisticis, biliosis acribus; post abusum ingestorum spirituosorum, vasa nimis distendentium, aromaticorum, acrium; post animi pathemata vehementiora, vigiliã, jejuniũ protracta &c. unde proclivitas in febriles motus

motus &c. haec species Climati & temperamento calido sicco potissimum familiaris est.

11) DISPOSITIO HAEREDITARIA.

12) AETAS, SEXUS, TEMPERAMENTUM.

13) CONSUETUDO, IDIOSYCRASIA ANTI-PATHIA, vel Individui singularis constitutio & dispositio: unde rerum non naturalium, ejusdem medicaminis, veneni, contagii, tam diversa & sibi contraria operatio; e noxiis euphoria, ex innoxiiis laesio &c.

14) CONTAGIUM.

15) Non raro mirorum Phænomenorum & fonticorum symptomatum morborumque causae medicum fugiunt, quas in sequentia, aliaque innumera, ob levitatem apparentem toties neglecta momenta, attente inquirens, difficile quidem detegēt. Viscerum infimi ventris infarctus qui multo crebrius, quam vulgo creditur, clandestinas infidias struunt; glandularum meseraicarum obstructions; molimina haemorrhoidalia, vermes, mucus, saburra primarum viarum, interdum latentia & maxima ventriculi & intestinorum cum sensorio communi ad finitas; aliaeque sedes morborum, ob partium vicinitatem &c. occultae in disitis partibus functiones turbantes; uteri prolapsus, herniae saepe celati: Erysipelas retrogradum, inopinato apoplexiam &c. inducens, arthritis anomala, lues venerea & purpura chronica mire larvatae; stillicidium sanguinis per nares retentum, repressum, & lotii excretio imminuta: hymen anusque imperforata; calvariae neonatorum depressio, facile praetervisa; sensibilitas & mobilitas illa immoderata, en-

thusiastica fere, hodie magis magisque solemnis, (Empfindsamkeit) unde ex levissimo stimulo motus vitiosi, ob nervorum sensibilium consensum mirifice propagati; perversae phantasiae, & alta mente repositae curae: Anteaetæ vitæ genus, quoad minimas circumstantias quidem; ejusdem nimis æquabilis mutatio in priori contrariam e. g. laboriosi in otiosum subitanea: morbi perpeffi, eorum medicatio imprudens; morborum exitus & transitus; erroresque aegrotantium, in usu remedium, in Diæta & regimine & iisdem nimis strictis commiffi: pathematum opificibus familiarium origo; anni tempus, loci climatis vel aëris, aquarum, exhalationum &c. peculiaris conditio & influxus; virus febris intermittens, innumeros morbos periodicos procreans; genius morbi endemii, inprimis epidemici, toties mutabiles, ejusque tam obscurum imperium in intercurrentes & subsequentes morbos. Unde horum phases peculiæ, de cubitus certas partes occupantes, & consuetæ salutaris medelæ inefficacia; unde abortus, hæmorrhagiæ, apoplexiæ &c. epidemice quasi grassantes; unde forsitan novorum morborum genesis; aliorumque morborum complicatio intricata. Huc refer morbos imaginarios & simulatos, de quibus non raro uti de graviditate celata curiosius cogitandum est.

MORBI CAPITIS.

Causæ tam idiopathicæ quam sympathicæ.

- 1) Cerebrum concussum, pressum, irritatum læsum, per violentiam externam, casum ab alto; ictum, bombardæ explosionem; sternutationem
for-

Ius, per animi pathemata; imaginationis vim; imprimis per terrorem vel moerorem & iram compressos, amorem celatum; per applicata externa (cfr. Csas. gener. Nro. 5.

5) Ejusdem pressio, tensio, vellicatio, in variis visceribus, thorace, renibus, hepate, utero, &c. &c. crebrius vero in ventriculo & intestinis, per saburrati viscidam, acrem, fermentantem, flatu, vermes, venena; (cfr. c. gener. Nro. I.) per bilem corruptam aeruginosam; mox irritationis causam, mox effectum; per alvi obliptionem &c. &c.

6) Mitiores Capitis morbi saepe recrudescentes, e. gr. Coryza, Cephalalgia habitualis: qui facile in graviores, in apoplexiam &c. &c. transeunt.

7) Inanitio vasorum & defectus spirituum, post haemorrhagias aliosve morbos enervantes; abusum veneris &c. progressos (cfr. Csas. gener. Nro. 3.)

Methodus medendi generatis.

Evacuantia; derivantia; revellentia; purgantia, variis emetica; diuretica, sialogoga, errhina, clysmata, venaesectiones in brachio, vel pede deia jugulo; scarificationes narium, occipitis profundae, cruorem ex sinibus lateralibus elicientes; hirudines circa tempora, post aures, ad anum; Cortex Cocognidii, aceto maceratus brachii, Betae folia; Vesicatoria parti praecedenter affectae apponenda ipsique capiti, post ulcera ibi exsiccata: vel haec suris admovenda (Emplastr. vesicat. cum una aut altera parte Empl. hyosciami,

mi, & pauxillo Camphor. miscetur; semper tamen, ex tempore, notabili portione pulveris Cantharidum, subtilissime triti conspergitur & cuti, antea ad rubedinem perfricatae & spiritu vini absolute aptur. Vesica inde excitata, provide aperta, atque cuticula remota, vulnus Unguento ex Ol. ovorum ℥vj Sperm. cet. ℥ij Cerae albae ℥j ter de die deligatur, vel folia heder. arbor. imponuntur.) Fonticuli in continuatione futurae temporalis vel petrosae inusti; Setacea; manu & pediluvia tepida, profunda, interdum balnea, epithematibus frigidis capiti simul impositis, praemissis frictionibus; subjunctis sinapismis, vel Empl. de Galban. cum salis cornu Cervi & pulveris Scillae pauxillo, ad plantas pedum. Decubitus elevato capite, pedibus pendentibus; & cataplasmatibus, Decocto Althææ tepido, crebro irrigandis inferioribus circumdatis; Vapores Capiti admissi, naribus hausti; Cataplasmata, fomenta, capiti appda. Quandoque ad scalpella chirurgica, trepanationem deveniendum. Porro cacochymiam variam corrigentia, diluentia, demulcentia ad sua loca invitantia; splanchnica; menstrua & haemorrhoides provocantia; stomachica; antidota; anthelmintica, antiscrophulosa, antihysterica, antihypochondriaca, antiphlogistica; bilem corrigentia, Cephalica vel sic dicta specifica - antiepileptica, nutrientia, roborantia, raro opiata. Quatenam vero ex his remediis in determinato casu, prae caeteris conducant, quatenam obsint, ex Phaenominis conjunctis, ex aegri temperie, ex Causarum antecedentium historia, prudens Medicus prudenter determinare conabitur & simul *Causarum occasionalium* sollicitam evitacionem inculcabit: Quo pertinent *Lacus Splen-*

splendor, sonitus, odor gravis; lectio intenta; meditatio profunda, respiratio praepedita, tussis, vociferatio, vomituritio, nixus, status, sessio, decubitus sanguinem versus Caput determinantes & in eo retardantes; Somnus pomeridianus; motus nimius, aër impurus, calidus in cubiculo &c. solis radii; nidor carbonum, halitus fermentantis liquidi, vapor domicilii calce recenter incrustati, collare aliaque vincula nimis stricta; mitra densa, gravis; alvus obsipata; pedes frigidi; ingluviens, inprimis inebriantium & coena opipara Ventriculum onerans, distendens; venus; animi agitatio; Idiosyncrasiae cognite inimica, vel ingesta vel apta. (cfr. Csas gen. Nro. 2.)

CEPHALALGIA.

Causas & methodum modendi generalem vide sub morbis Capitis.

Externa sequentia ad plurimas Cephalalgiae species accommodata sunt. Capitis abrasio, frictio, ablutio cum oxycrato, ligatura: Epithema frontale & fomentatio frigida totius Capitis ex Infus. flor. arnicæ sambuci, rosar. rubr. & paxillo sem. cumin. contuf. ꝥ v. Aceti rutac. ꝥꝥ. nitri ꝥꝥ. Salis ammoniaci crudi ꝥꝥ ppta. An verbena collo appensa & ejus aqua destillata cum Spiritu Vitrioli mixta interne adhibita? Empl. de ranis cum Mercurio, ad tempora; linimentum ex Oleo hyosciami Ess. Galbani Bernhard. inspissata & spiritu salis ammoniaci compositum; spiritus aethereus cum Camphora ad Verticem, tempora & locum dolentem; vapor oxycra-

oxycrati capiti, naribus admissus; succus Betae, hederæ terrestres cum quadruplo aquae rosar. dilutus & liquore anodyno minerali mixtus, naribus adtractus: hirudines pone aures; rube-faciens adjuncturas brachiorum. R. Empl. o-xycroc. p. ij galbani p. i. adde olei succini ali-quot guttulas; vel epispasticum ex fermento pa-nis succo ceparum & Baccis Juniperi contus. cui pro renata oleum destillatum majoranae & spi-ritus salis ammoniaci vinosus addi possunt; plan-tis pedum & poplitibus, praemissis frictionibus & pediluviiis *adpta*; enemata quotidiana, interdum Balnea tepida.

Curam specialem Cephalalgiae Sanguineae cognoscendæ ex temperie calida, plethorica; sæpius ex motibus febrilibus; faciei, oculorum rubore; vasorum inflatione; narium, oris siccitate; pulsu frequenti, fortiori in rarum tandem abeunte; urina rubra; ex praegressis, victu lau-to, vinoso; balnei calidi usu; exercitio immo-dico; pathematibus animi gravibus; insolatione; evacuationibus sanguinis intermissis, cohibitis (vidæ Csas gener. Nro. 10. b.) absolvunt: venae sectio larga, prius in pede aut Brachio, deinde in jugulo instituta; cujus reiterationem, plethora, pulsus plenus durus & celer indicant; fomenta-rio frigida ad Caput supra descripta, cum pedilu-viis tepidis simul adhibitis; scarificatio occipitis, narium, præmisso inspiratu vaporis emollientis (summe necessaria, si narium hæmorrhagia aut suppressa est, aut instat) hirudines circa tempo-ra, pone aures Nro. X-XII. eae in molimini-bus hæmorrhoidum ad anum; ligatura supra ge-nua; sinapismi, post fatus pedibus adpti; cathar-tica antiphlogistica, Tamarindi, Cassia; Electuar.
Tar-

Tartarifatum; Cremoris Tartari continuatus usus; Magnesia cum succo citri bene saturata. R. Conservae Acetofell. ℥j. Pulpae Tamarind. ℥℥. Spirit. Vitriol. q. s. ad gratum acorem, Syrupi Citri q. s. ut fiat Electuarium. Potatio larga, frigida feri lactis, radice gramin. Tarax fragar. saponariae, herbae Borag. Bugloss. Bellid. min. Acetofell. Chaerefol. Agrimon. fumariae, Scolopendrii & similibus alterati & Syrupo de Cichor. edulcorati; ejusmodi Ptisanae oxymelle, succo Citri vel Elixir Halleri acidulatae &c. aliaque refrigerantia in & externa. Clysmata tepida ex Decocti rad. Altheae ℥x. Nitri & pulveris radice Scilla. aa. ℥j. ppt. dein emollientia, sine stimulo, crebro apta & quamdiu fieri potest, retenta. Diaeta tenuis, blandissima, magis vegetabilis suadenda, inprimis acetaria ex lactuca Borag. &c. Situs erectus, pedibus pendulis; Caput denudatum; quies summa. vide Csa's occasionales evitandas, sub MM. gener. descriptas. Fibrae siccores & humores acres, remedia magis relaxantia, & demulcentia, lactinia copiosa &c. nec non Balnea tepida; Haemorrhoides, Menses &c. suppressi, remedia fluxum leniter revocantia, Clysteres viscerales, cataplasmata ad abdomen, Balnea hirudinesque ad anum &c. (vid. sub obstructione viscerum) exposcunt. Omnes concussionis & Vomitorio excitatae, spiritus odoriferi, aliaque stimulantia hic locum non habent.

CEPHALALGIA PITUITOSO - SEROSA, ex temperie frigida, pituitosa; facie magis pallida; palpebris tumidis; oculis &c. humidis, pulsu debili, languido, extremis frigidis, ex praegressis, vita otiosa, mora in aëre humido, frigido, evacuationibus

nibus pituitæ per nares & fauces & feri visceri
per alias vias; iisdemque suppressis, oedemate pe-
dum &c. retro gressu suspicanda est.

M. M. Purgantia, helleborata, mercurialia,
noduli laxantes amari, interdum vomitoria; Vi-
num Huxham. tandem parvis dosibus, Clysteres
acriores, Vesicatoria, Setacea, fonticuli, Rubefa-
ciens cuti huc & illuc infricandum. ℞. Ungt.
Pomad. ℥ij Pulv. Cantharid. ℥ij ms. -- Immer-
sio Brachiorum ad cubitum usque & pedum in
aquam sat calidam, frictione sub aqua simul in-
stituta; Emplastr. suppedale mitius Boerhavii; si-
napismi: ℞. fermenti panis, Pulver. Sinapi rec.
aa. ℥ij. fol. rut. rec. ℥ij. Salis Gemin. ℥℞. a-
aceti scill. q. s. ms. f. pasta (cfr. M. M. gener.
Morbor. Capitis) — Gargarismata ex Decoct.
rad. Angel. Pyrethri, Galang. fol. rut. orig. flor.
lavendul. ad mixto spiritu salis ammoniaci, vel
Oxymelle scillit.; Masticatio Pastillorum. ℞.
Ceræ alb. rad. Zingiber. aa. ℥℞. ms. f. l. a Pa-
still. — Errhina, succus heder. terrestris, Be-
tæ, aqua dilutus; pulvis ex herbis cephalicis vel
cubebis foliis asari & sfo; Sal vol. siccum angl.
vel Spiritus Castor. compositus, cum aceto rutæ
combinatus naribus admota: Interne. solutio
Tartari emet. cum pauxillo Extr. Capit. Papav.
mixta, minutis dosibus crebrius exhibita, Extr.
Aconiti, Pillul. scilliticae vel ex sapone antimo-
niali: Gummi Amoniaco, sagap. Galb. rad. ari
rec. Mercurio vivo mucilagini Gummi arab. sub-
acto, compositae. Mixtura ex aqua rutæ, lilior.
conv. sulphure aurat. Antimon. potabili; Spi-
ritu Minder. Syrup. de Erysim, Oxymello scill.
conflata; Infus. herb. Arnicae, marrubii alb.
Verb.

Verbas Hyfopi. Origani falv. flor. Tiliae Sambuc.
Arnicae, rorismar. &c.

CEPHALALGIA SEROSA. A fero magis acri,
tenui, eoque retento aut retroacto oriunda. (cfr.
Csas gener. Nro. 4-a-e-f- & Nro. 9.) a non-
nullis exanthematica, arthritica, &c. nominata.

M. M. Remedia Acrimoniam diluentia, de-
mulcentia largiffime haufia; revellentia, ad fua
loca invitantia; Cathartica lenia, Antiphlogiftica,
diaphoretica, diuretica, difcutientia, Paregorica,
cardiaca; Emulfio oleofa mannata, Electuaria
fub Cephalg. fang. defcripta &c. ferum lactis
rad. gramin. Tarax. liquirit. fol. fumar. flor.
Sambuc. & Diacodio alteratum; Decoët. rad.
Alth. rafur. Saffafr. adjecto roob. Sambuc. cum
vel fine lactae pptum; Emulfiones camphoratae,
Infufum falv. flor. Sambuc. Succo citri acidula-
tum, Succus Betulae, Chaerefol. cum mixtura
fimplici, Liquor anod. min. Hoffmanni cum Spi-
ritu Cornu Cervi fuccinat. mixtus, Aether Vitrio-
li Mofchatus; Cortex Peruv. cum Efs. vol. Gua-
jaci, Pulvis Doweri, flores Sulphuris, Sulphur
auratum antimonii potabile, vel fapo antimonii
in liquore Terrae foliatae Tartari folutus. —
℞. aquae flor. Sambuc. ℥vj. Aceti Sambuc. ℥℞.
Roob Samb. ℥j. ms. D. omni hora Unc. ij - vel
℞. Aquae flor. Samb. ℥℞. Salis volatilis Cor-
nu Cervi ℥j Aceti q. s. ad faturationem, mellis
℥℞. ms. D. cochleatim. — Inter efficaciffima
& fecura militat: ℞. Extr. Aconiti gr. ii. Sac-
chari ℥ij ms. f. Pulvis subtiliffi. in fex Dofes
dividendus D. Mâne & vesper. una; fuperingeflo
potu demulcente copiofo. Externe manu-pedi-
luvia,

livia, præmissis frictionibus, lintea cerata viridia pedibus circumdanda, sinapismi, unguentum rubefaciens, cortex cocognidii, vesicatoria temperata (vide M. M. gener. morbor. capitis & cephalalgæ pituitosæ); Infitio scabiei, nonnquam balnea tepida; semper clysteres emollientes, paregorici, usque resorbeantur retenti. Ex hisce, discutientia calida, cardiaca, quo & opiata pertinent (quæ in concurrente anomalia motuum potissimum locum habent), cum grano salis adhibenda, iisque venæ sectiones reliquaque antiphlogistica sæpe præmittenda & interponenda sunt. In temperie calida, plethorica, febre juncta, in inflammationis metu; doloribus acerbis & in fibra sicca, horum loco curatio cephalalgæ sanguineæ, junctis emollientibus, aere involventibus & lenissime expellentibus, in usum vocanda; ea vero lege, ne vires expultrices, venæ sectione nimia & frigidis deprimantur, sed in justo moderamine serventur, & potius subleventur. Aegroti alimentis eupeptis demulcentibus, decocto granulorum sagu, rad. salep. &c. nutriendi (cfr. arthritidis anomalæ curam.) Postea cacochymia varia, propriis suis remediis impugnanda & viscera debilia cortice peruviano roboranda. Diathesis erysipelacea elixirio acido, cremore tartari cicuranda.

AD CEPHALALGIAM a LOTIO IMMINUTO RETEN-
TO B. Spirit. cornu cervi ℥ij aceti scillit. ℥ss.
syrupi de erysim. lob. ℥ij laud. liq. Sydenh. gtts
vj-viij ms. D. omni trihorio gtts L. Eclegma, ad
tussim catarrhalem ordinatum; Clysteres, potus
nitrosus, terebinthina renum regioni affricta, ca-
taplasmata, venæ sectio repetita, catheter, tandem
paræntesis in perinaeo.

B

Cr-

CEPHALALGIA SCORBUTICA. Ex gingivis laxis, tumentibus, sanguinolentis, ex ulceribus, si quae adsunt, spongiosis, mollibus, in ambitu livescens interpersis punctis albis suspicanda. (reliqua criteria vide sub scorbuto) antiscorbuticis.

CEPHALALGIA VENEREA. Ex dolore osteocephalo, rodente & terebrante, in interiore ossium parte, noctu & lectuli calore exasperato; dolore fixo, in medio pectoris diu perseverante, condylomatibus, anum obsidentibus, ex tumoribus glandularum inguinum, colli, sub axillis &c. Ulcerum, si quae adsunt, conditione; quae in ambitu rubra, mollia, in fundo ex albo cinerea, lardacea sunt; ex ulcerationibus faucium, ovulae, tonsillarum &c. ex maculis duris, parum elevatis, rotundis, rubris cum margine duro, albo, partes corporis superiores occupantibus & in fronte sic dictam coronam veneream formantibus; exostosis, urina crassa, subtrubida, cum sedimento tenaci, quasi grandinoso, odoris foedi, cognoscenda, antisyphiliticis & externe empl. ad ganglia (Dispens. Brandenb.) capiti raso imposto sanatur.

CEPHALALGIA STOMACHICA, quae reliquis speciebus crebrius occurrit et cujus diagnosin absolvent, lingua, dentes sordidi, anima foetida, ructus acidi, nidorosi, rancidi, sapor ingratus, appetitus dejectus, interdum nimius, nausea; Vomitus sordium, molestiae sensus circa praecordia, anxietas, ventriculus inflatus, phlogoses, tremor labiorum, manuum, dolor artuum, soda, cardialgia, borborygmi, alvi inconstantia, praegressa ingluvies; Vomitoria, purgantia amara, acidul. Sedlizenfes exigit (vide reliqua sub digestionelasa, imprimis ex esa 1ma & 2da). Huc pertinet

finet *verminosa*, (cujus curam vide sub epilepsia.)

CEPHALALGIA BILIOSA. Ex sapore amaro, anxietate, ardore, lingua squalida, anima foetida, nausea, fiti, excretionibus biliosis, colore cutis, albugineæ flavescente, urinæ flammeo, croceo; quandoque molesta constrictione, dolore circa hypochondrium dextrum, versus præcordia sese extendente; meteorismo, temperie biliosa, anni tempore, morbis biliosis favente, ipsaque epidemia, ex prægressis animi affectibus, potissimum ira & quacunq; irritatione nervorum vehementiori, hysteriarum & hypochondriacorum dijudicanda. Remedia sub cruditatibus biliosis & cephalalgia sanguinea descripta sunt. Vide ibidem electuaria; & serum lactis frigide & copiosius sumendum.

CEPHALALGIA STOMACHICA GRAVIS. Post partum copiosum dyspeptorum fermentantium, flatulentorum apoplexiam minitans, cum inflatione & anxietate summa nupta, opem citam exposcit; clysteres acres, potum largum, spiritu sulphuris acidulatum, vomitorium ex radice Ipecacuanh. gr. vj cum tartari emetici gr. I - II. mixtis: quandoque simul venæ sectionem. Interdum vero *cephalgia ex cerebri concussionem ejusque vasorum lenta & levi obstructione*, eveniens nausea; Vomitu, languore, debilitate summa, pulsuque sæpe inordinato incedit & fordes ventriculi mentitur. Cujus medelam vide sub cephalalgia sanguinea.

CEPHALALGIE, A VENENIS NARCOTICIS, quo NIDOREM CARBONUM refer, quæ ex sensuum stupore, capitis sopore, torpore, interdum agrypnia, delirijs miris, aliisque morbis capitis, viri-

um languore, dyspnœa, pulsu tardo, depresso, a-pepsia, alvi obstipatione &c. suspicatur; medentur, acida, acetum, succus citri &c. præmissis vomitorio, vel vomitu, faucium irritatione procurato, sæpe venæ sectione; in aëre libero, large sumenda; clysteres ex oxycrato, acres, pediluvia, frictions plantarum cum aceto & sale, acetum rosaceum ad frontem & nares, aceti vapores. NECROSIS ex ejusmodi venenis, fecali cornuto, rubiginoso &c. orta, corticem peruv. cum pauxillo opii mixtum, fomenta antiseptica.

CEPHALALGIA A MORSU VIPERÆ alkali vol. & theriac. aa. ʒj vel mercurium mucilaginosum Plenki, cum extr. gent. r. mixtum; Externe theriacam in vino solutam, vel oleum olivarum: *Ex vino lithargyrio fucato; vapore plumbi &c. curam colicæ pictonum exigunt.*

CEPHALALGIA AITRA BILIARIA, HÆMORRHODALIS, UTERINA, SCROPHULOSA; ex alvi obstipatione &c. medendo principi morbo sanatur.

CEPHALALGIÆ, EX NERVORUM SENSIBILITATE, SPIRITUUM MOTU VIITIATO ORIUNDÆ, HINC SÆPE HYSTERICA, HYPOCHONDRIACA dictæ diagnosis & curam vide sub malo hysterico & hypochondriaco. Profuit rad. valerian. pulvis ad ʒj ter de die exhibitus. *Ex inanitione vel defectu spirituum* analeptica blande nutrientia — *Ex doloribus partium remotarum*, otalgia, nephritide &c. Paregorica, clysteres emollientes, venæ sectiones & medelam principis morbi.

PERIODICA ex viro febris intermittens latente, præmissis evacuationibus, corticem peruv.

EX OBESITATE, abstinentiam, dietam tenuem, macilentam, leniter stimulantem, ex pane bis cocto, affata

assata carne &c. motum corporis modicum; saponis venet. vel & oxycrati largum usum, oxymel. scilliticum, interpositis evacuationibus.

EX JCHORE, SUB CUTIS CAPITIS *densis crustis collecto vel ex ulcere post vulnuseculum citius consolidatum*; vulneris amplificationem, ulceris in:indificationem.

EX MERCURIO IN CAVITATIBUS CRANII DELITESCENTIE usum largum decocti bardanæ, enulæ, & pimpinellæ albæ, interpositis purgantibus petunt. Interdum spiritus mercurialis Swietenii in pariori dosi simul adhibendus; qui tunc facîle salivationem excitabit.

A GRAVEDINE, A MUCO INDURATO in massas membranaceas, polyposas, quandoque, conerescente, sinus frontales occupante, vapores initio emollientes lactis, decocti majoranæ, malvæ; postea succum hederæ terrestris, & seminis, nigellæ, naribus inspiranda, errhina præcipue ex pulvere Hippocastani; cucurbitam parti frigenti verticis superinpositam, ac deinde unctiorem ejus cum oleo succini. *Catarrhalis a transpiratione suppressa* diaphoretica, demulcentia, sub cephalalgia ferosa descripta, nonnunquam venæ sectionem & catharticum lene exposcunt.

STERNUTATIONEM NIMIAM sedat ET CEPHALALGIAM INDE ORIUNDAM SÆPE PERICULOSAM præcavet, lac cum malva coctum, ex cava manu, per nares attractum.

CEPHALALGIÆ A NARIUM HÆMORRHAGIA COHIBITA curam vide sub hæmorrhagia narium.

EX VERMIBUS ALIISQUE INSECTIS IN SINUBUS FRONTALIBUS HOSPITANTIBUS, qui sternutatione

frequenti, dolore fixo, mordaci, potissimum in apice nasi, ad motum corporis incremente; narium siccitate, pruritu, odore foetido & vertigine se manifestant, inspiratio pulveris tabaci, fumi ex foliis absynth. marrubii, beton. rad. angel. succino & antimonio crudo, & decocti mercurii vivi cum aqua Anhaltina & syrupo absynth. mixti medentur. *Cephalalgia vehementi gratidarum* cita venæ sectione & repetita, & ex dentibus cariosis eorum avulsione, succurrendum.

AD CEPHALALGIAM a CRANII CARIE, TUMORE, os crebrioribus foraminibus pertundendum. *Ad eam ex causis idiopathicis Nro. I. fonticis.* Evitatis causis occasionalibus, sub M. M. gener. descriptis, tentandum, quid fomentatio capitis (vide M. M. gener. cephalalgia), & æthiops antimonial. ex infuso arnica, cardui benedicti & stipitum virid. dulcamara, succo heder. terrestris & oxymelle alterato, junctis revellentibus præstent. Tandem post incisionem cutis cruciatam, & hinc longam suppurationem excitatam, ad terebrationem deveniendum. Cephalalgia ob defectum suturarum incurabilis est.

VERTIGO, STERNUTATIO MORBOSA; INCUBI QUEDAM SPECIES; AFFECTUS SOPOROSI ET CATALEPSIS ex iisdem causis, quæ cephalalgiam excitant, maximam partem enascentes, eandem fere medelam exposcunt. Remedia externa, somnolentos & catalepticos frigidiores excitantia vide sub lipothymia.

APOPLEXIA.

Vel subitanea actionum animalium abolitio, ea difficili ac stertorosa respiratione, somno profundis-

fundissimo, pulsu in principio magno & artuum laxitate cognoscenda & distinguenda. Felicius præcavetur, quam curatur. Imminentem præfagiunt vertigo, dolor capitis, inprimis occipitis gravativus; junctis nonnunquam, nausea, conatu vomendi, & vomitu bilioso, æruginoso, a levi capitis motu recrudescentibus, non raro pro vitio ventriculi imponentibus, cui neglecta venæ sectione (quæ momento citius vomitum &c. sedat) & reliquis antiphlogisticis, calida sæpe stomachica damnose opponunt. Porro, turbatio visus, tintus aurium, vox tremula, artuum gravitas, tremor, fornicationis sensus, difficilis incessus, somnolentia, somnusque minus placidus, dolores circa præcordia sensibiles quidem, sed fugaces, incubus frequens, faciei, oculorum rubor, physiognomia mire mutata, insolita mentis alienatio, pigritia, memoriæ debilitas, frequentes insultus paralytici, partiales, fugaces & leves. Periculum eo majus est, si hæc crapula venere, studiis, mœrore &c. &c. debilitatis, iracundiis, obesis, catarrhosis, asthmaticis, plethoricis, senibus & causas occasionales supra notatas non fugientibus contingunt.

Hoc morbo semel correptis, tensionis, circa nucham sensus & appetitus mire auctus, insultum intra duos, tresve dies reversurum portentunt, hinc ut ad hæc phænomena attenti sint & remedia prophylactica sine mora in auxilium vocent, sedulo monendi sunt.

M. M. GENERALEM vide sub morbis capitis, specialem sub cephalalgia. Frequentissime apoplexia sanguinea occurrit; sæpe pituitosa, nonnunquam serosa, cum sanguinea complicata, ra-

rius stomachica, ex inanitione vasorum vel spirituum defectu, a venenis &c. &c. idiopathica, epidemica.

PARALYSIS.

Sæpius apoplexiam insequitur, interdum præcedit, vel absque ea, ex ejus diversis causis provenit, aut ex quibuscunque ingeneratur, quæ cerebrum, medullam, nervos, arterias comprimendo, erodendo, vulnerando & summopere enervando; per ligaturas fortes, tumores frigidos, serophulosos, inflammatorios, spinam bifidam, luxationes, fracturas, ulcera &c. &c., evacuationes ingentes, aliosve morbos fonticos prægressos, spirituum vel sanguinis influxum in partes musculosas præpediunt vel nexum tollunt. Uti apoplexia bene in *sanguineam*, *pituitosam*, *serosam*, *stomachicam*, *scorbuticam*, *hypochondriacam*, *serophulosam* &c. &c. distinguitur. Hinc eadem sere M. M. locum habet, potissimum in paralyti ex apoplexia nata, eaque recenti. Degenerat enim sæpe adultior in alias species, calida in frigidam &c. Venæ sectio si indicatur, in parte lateri resoluta opposita instituitur.

IN PITUITOSA, reliquis multo frequentiori, opem ferunt attenuantia, leniter stimulantia, febrem mitem & diarrhoeam excitantia, nervina, cephalica, spiritus & sales volatiles, antimoniales, mercuriales, reliquaque remedia sub cephalalgia pituitosa descripta; Sal cornu cervi ad ʒʒ & ultra in aqua fragranti solutum, mane in lecto sumendam & decoctum ligni sassafras, Guajaci vel infusum herb. arnicæ, salvia, roris-

rorismar. rutæ, flor. arnica &c. superbibendum,
 unaque partes affectæ perfricandæ. Conserva
 millepedum, ætheris virrioli veri gttas v-x-xx.
 Pulveris flor. arnica ℥ij-ijj ex conserva meliss.
 salviæ pedetentim de die, tinctura vesperæ aureæ;
 spiritus volatilis, oleosus, extemporaneus, ex olei
 majorani, rorismarini, rutæ aa ℥ß in spiritu
 vini rectificatissimi ℥ij solut. adjectis spirit. salis
 ammoniaci dulcific. ℥ij conflatus, sic dicta spe-
 cifica antepileptica. Inter mitiora laudandus
 spiritus antiscorb. Draw. vel aperitivus Penoti
 omni trihorio ad gttas xv-xx. ex decocto mera-
 co rad. valerian. & fol. aurant. syrup. papav. &
 oxymelle scillitico edulcorato sumendus: (qui in
 affectibus tam paralyticis, apoplecticis, quam
 soporosis, convulsivis ex abusu quidem spiri-
 tuosorum vel crapula enatis sæpillime exopta-
 tum effectum præstitit) Elix. ex extr. nervino,
 arnica & aqua nervina compositum & ex in-
 fuso fol. salviæ, succo citri acidulato propina-
 tum. Externe balnea nervina, Embrensia, va-
 porosa, embrochæ, fomentationes aromaticæ;
 emplastrum Galbani, saponatum, de ranis cum
 mercurio, linimentum ex sapone ven. & spirit.
 vin. rectific. desuper desagrato adjecta camphora
 pptum. cum aqua Anhaltina aut spirit. tere-
 binth. aut essentia Galbani Bernh. mixtum, li-
 nimentum volatile ex oleo olivarum p. ij. & spi-
 ritus salis ammoniaci p. j. conflatum, vel R.
 Ungti nervini ℥ij pulver. cantharid. gr. xxx.
 spiritus salis ammoniaci q. s. ut f. linimentum;
 junctis frictionibus, spinæ dorsi, artubus & jun-
 cturis & ex his quædam capiti appda; Vesicato-
 ria magna vel & empl. suppedale mitius Boerh.

ad nucham, si partes superiores, & ad os sacrum si inferiores paralyfi afficiuntur, ignis electricus. Ex his vero calida, acriora interdicut, plethora; apoplexia sanguinea recenter prægressa vel imminens; Causa idiopathica fonticæ, irritabilitas nimia, febris & tussis sicca.

PARALYSIS LINGUÆ masticatione cubebarum, oleo cajeput vel liquore anod. min. frustulis cinamomi aliquamdiu infuso, stro instill. & sub lingua detento; gargarismate (vide cephalalgiam pituitosam) vesicatorio ad nucham.

PALPEBRARUM inunctione linimenti supra notati cum balsamo vitæ & oleo tartari fœd. mixti. *Vesica & ejus sphincteris*, unde retentio & incontinentia urinae: infuso salviae, femin. anserin. vinoso, adjecto rob. juniperi, enematis, balneis, injectionibus nervinis, suffitu ex mastiche & succino, vesicatorio, vel empl. melilot. cum Galb. & Sagapen. mixto, vel emplstr. supped. mit. Boerh. ossi sacro, aceto bezoardico, vel uncto sapon. cum comitiff. mixto, linimento vol. pubi & perinæo apptis sanantur. Paralytici affectus periodici aut intermittentes cortic. peruv. superandi. Paraplegia ex lapsu plerumque lethalis est.

EPILEPSIA.

Quo pertinent vertigo caduca, lipothymia & incubi species &c. cum motibus spasmodico-convulsivis; & motus spasmodici vel convulsivi cum sensuum abolitione invadentes.

Causæ & M. M. sub morbis capitis in genere & sub cephalalgia in specie descriptæ sunt.
Et

Et vix est una aut altera ibi enarrata causa, quæ non ad epilepsiam, (ob cerebri forsan debilitatem & irritabilitatem innatam aut acquisitam) pronis, hunc morbum inducere possit. Enumeratis vero, pro diversitate causarum, tot variis remediis, sic dicta *specificæ* vel diathesin epilepticam corrigentia, sæpe interponenda, aut pro re nata, demum subjungenda sunt. Inter hæc eminent, radicis valerian. mont. (effossæ antequam caulem edidit, siccatæ & in vase clauso servatæ) fol. aurantiorum pulvis, infusum & extractum spirituosum, in conubio cort. peruv. moschus, camphora, flores zinci, optime calcinati & ab acido liberati, a gr. j. ad gr. xij, in extracto nervino offerendi; gummata ferulacea, spiritus cornu cervi, oleum animale Dippelii, purissimum vero, cum spiritu nervino vel atheris pauxillo mixtum ad gtt. L. & ultra exhibitum, vel oleum anisi destillatum, purissimum ad ℥ j pro dosi; ex aqua dest. rosar. rut. fol. & sem. angelic. rec.; aut ex aqua vel infuso spec. nervin. sumenda. Elixir nervinum &. Aquæ destillatæ nervinæ ℥vj, spiritus nervini extr. nervini aa. ℥ss of-
 fæ albæ Helmont. ℥ss-j syrup. cinamom. ℥iij
 ms. D. bis, quater, de die cochl. i. Interdum
 usus opii vel ejus loco extr. capit. papav. rh.
 aut potius extr. hypocyami, minus quam opium
 obstipantis, tentandus; ex infuso fol. aurantior.
 elixirio acido Dippel. pro re nata, largiter aci-
 dulato. Externe ugtum ad atrophiam vel saponat:
 (vide sub paralyfi) spinæ dorsi, cum frictio-
 nibus appdum. An visci querni, lumbricorum
 terrest. in vino enecatorum præparata, bufones
 combusti, cochlearum testæ, in specie harum mar-
 gines & spiræ, pulverisati, hic plane inertia reme-
 dia

dia sunt?— Per multos saltem epilepticos tam adultos (ubi nullum acidi indicium fuit) quam infantes, pulveris cochlearum & lumbricorum, (ab aliis, quibus arcano fuit, ordinati) usu sanatos vidi. Unde quæso hæc efficacia?

Inter epilepsiæ species, illæ ex vi imaginationis, terrore, marore, amore, iracundia & inde bile commota, ex sero acri, corrupto, retro-actō, fluxu sanguinis per nares, uterum &c. retento, cohibito, ex febre intermittente suppressa & venoris excessu crebrius obveniunt: Illa vero a vermibus & mucō sape tenacissimo, copiosissimo aliisque sordibus primarum viarum longe frequentissime occurrit. Hæc species vermiosa, pituitosa, præmissis digestivis, mucum incidentibus pulvere nempe stomach. Birkm. mixtura Riveriana, salibus mediis; pilulis ex gummi ammoniaco & bulbo ari rec. vino ammoniato Huxhami a gttis x. ad xl., aqua diluto &c. interpositis anthelminticis, femine scilicet cinæ selecto, a stiptibus aliisque quisquiliis pulverulentis &c. curiosius purgato; Electuario ex mercurio viv. mucilaginoso camphorato; Extr. cort. peruv. & pulvere rad. filicis &c. composito aut ℞. Petrolei veri ℥j Castorei q. s. ut f. pil. gr. iij pond. D. omni quadrihorio pil. iij. nec non stomachicis, infuso nempe vinoso cort. peruv. herb. absynth. fol. & cort. aurant &c. purgantibus repetitis, quandoque vomitoriis oppugnanda. In quem finem conducunt ℞. Pulv. rad. jalapp valerian. salis polychrest. aa ℥j oxymel scillit. ℥iv. ms. D. bis—quater de die ℥℔ ex infuso meraco, fol. aurantior. & herb. spigeliæ, vel pilula ex MPill. viscer. cum aloë extr. valerian.

rian. asa foetida, calomel. resina jalapp. & petroleo composita. In malo vero pertinaci bolus, ex mercurii dulcis, sem. cynæ aa gr. x-xx & conferv. ros. q. s. conflatus, vesperi, & sequenti mane pilulæ purgantes R. extr. cathol. gr. x-xx. scamonii resin. jalapp. aa gr. v. spirit. vini q. s. gumi gutt. grana x-xv. in infuso mannato fumendæ; subjuncta aqua mercuriali, & uncto de arthanita aut linimento ex oleo terebinth. petroleo & felle tauri, abdomini illinendo & clysmate ex aqua mercuriali, rad. valer. herb. absynth. flor. chamom. asa foetida, camphora, sapone nigro, oxymelle scill. & similibus alterata, simul adhibitis. Hæc vero ea lege præscribenda, ut digestivis cum anthelmintibus & stomachicis per 5-6. dies usurpatis, cathartica demum subjungantur, quæ denuo digestiva &c. excipiant; omniaque secundum hunc ordinem repetantur, quam diu heterogenea, mucus varii coloris, vermiculis quasi refertus & sperma ranarum referens excernantur. Interdum mucii tenacitas purgantia fere drastica exposcit.

TÆNIE CURAM vide sub morbis infantum.
Curationem sordium biliosarum &c. vide sub digestionem læsa, cephalalgia biliosa &c.

EPILEPSIA EX CAUSIS PARTES EXTERNAS AFFICIENTIBUS, cujus paroxysmus instans sensu formationis vel auræ frigidæ ascendentis suspicatur, ligaturis strictis præcavetur, & fomentatione, frictione, inunctione, scarificatione profunda, suppuratione diurna, inustione, amputatione denique partis primo affectæ, vel ubi mali origo sedem habet, curatur; internis non neglectis, Præ-

Præ-

Præcavetur sæpe paroxysmus epilepsiæ in genere sumendo gtt̄s xxx. sequentis. ℞. Asæ fetid. pulveris. ℥j solve in spiritu cornu cervi succinato ℥j & superbibendo haustum infusi meraci specier. nervin. itemque infusum moschatum ano injiciendo; in specie vero verminoso-stomachicæ, vomitorio cum potu tepidæ largo & clystere ex saponè & sale, instante paroxysmo exhibitis. Et vomitus, fauces, si fieri potest, ope plumæ in oleum tinctæ, irritando, sub ipso paroxysmo excitatus, magnum levamen adfert. Eo durante corpori pulvinaria supponenda, & dentibus linteum convolutum interponendum; Paroxysmo vero finito cardiaca propinanda.

Plures epilepticos, ex causa vix detegenda, haud verminosos, usus largus & diurnus pilularum, ex mercurio mucilaginoso Plenckii, extr. valerian. spirituoso, asæ fetid. & camphor. conflatarum, a malo quoque inveterato, liberavit. Eadem in affectibus epilepticis convulsivis hysteriarum concurrente obstructione mensium & in luis vener. reliquiis efficaces fuerunt. Inquiras nonnunquam in epilepsiam simulatam. *Convulsiones, tetanus, tremor, trismus, chorea Sti. Viti, &c.* ex causis epilepsiæ proritati ejusdem medelam exigunt: jungendus cort. peruv. pertinax usus. Interdum emollientia in & externa locum habent. Emulsio ex ol. amygd. d. syr. de Alth. aa ℥j bals. peruv. gtt̄s xxx. vitello ovi & aquæ melifs. ℥viij composita & balnea emollientia; nonnunquam vero aqua frigida, copiose hausta. Profuerunt quoque flores zinci indici, rite ppti, ter de die, ipecac. vel tarta-

tartarus emet. in minimis dosibus exhibit. Mor-
bis convulsivis ex causa externa paregorica re-
media & chirurgia opem ferunt.

VISUS VITIA.

Causarum plures & hisce appropriata medela,
sub morbis capitis, in specie sub cephalalgia de-
signata, oculorum morbis applicanda sunt. *Oph-
thalmiæ humidæ, serosæ catarrhali* medentur,
acrimoniam diluentia, demulcentia, & pro varia
indole, varie corrigentia, feri affluxum ab ocu-
lis derivantia, revellentia & per idoneas vias eli-
minantia, externa demulcentia, sedantia, mundi-
ficantia, vascula relaxata, roborantia. In quem
finem laudanda sunt: cathartica antiphlogistica,
rhabbarbarina, cum cremore tartari; Infusum
folior. fennæ, cum decocto succoladæ pptum.
diutius usurpatum; serum lactis acetosa pptum;
Pisana ex avena rad. gramin. bardan. tarax.
lapat. & Liquirit. cum vel sine nitro composi-
ta; succi herbarum, betulæ; decocta lignorum;
æthiops; morsuli antimoniales; pilulæ ex mer-
curio vivo mucilaginoso Plenckii & pulvere pu-
rificante conflata, tandem corticis peruv. præpa-
rata; Mars solubilis; acidulæ minerales martia-
les, cum vel sine lacte; Masticatoria; cortex co-
cognidii ad brachia, vesicatoria minora, mitiora
pone aures, majora ad partes inferiores; Cucur-
bitula scarificata, Nro. 6. & plures, suris omni
hebdomade, denique bis in mense appositæ; Ve-
næ sectio; insitio scabiei; inunctiones articulo-
rum, cum uncto mercuriali ad scabiem. Ho-
rum selectum, temperies calida, plethorica, fri-
gida, cachectica, cacochymia varia, lentor hu-
morum, morbi progressus, complicatio, partium
rela-

relaxatio, glandularum intumescencia determinant. Inter topica profunt, initio pulpa pomorum, mucilago, lac &c. sub ophthalmia sicca descripta; album ovi, ad duritiem coctam, dissectum. ℞. Pulpæ cassiæ fistul. rec. extractæ ℥ij Mucilag. sem. psyllii, aqua papav. rh. extracti ℥j ms. & applica; facculi pulvere valerian. fol. hyssopi & paxillo camphoræ, flor. benzoës & gummi galban. repleti, libere desuper oculos pendentes; postea, albumen ovi cum aluminis gr. v-x. conquassatum; elutiones tepidæ cum aqua rosar. crocata; fofus, lotiones, cum aqua fontana, admixta quarta parte succi portulacæ, initio tepidi, subfrigidi, denique frigidi. Hisce incassum tentatis. ℞. Aquæ rosar. ℥iv-vj. Vitriol. albi ℞i ssri Saturni ℞β Camphoræ in spiritu vini soluti gr. vj. ms.; (quod quoque ad *fistulam lacrymalem tam spuriam, quam veram* conducit) Ungtum oculare Sloane ℞. Tutia pptæ ℥j Lap. hæmatit. ppti ℞ij Aloës luc. ppt. gr. xii. Margarit. ppt. gr. xv. Pingued. viper. q. s. terantur curiose super porphyrite ac subigantur ut f. Ungtum molle - vel ℞. Ungti pomat. ℥β Mercurii præcip. alb. gr. xii. ms. cujus paxillum oculo affecto penicillo bis de die adfricetur, clausisque mox palpebris aliquamdiu retineatur; postea oculus aqua tepida cum aliquot guttulis spirit. vini mixta eluatur. Cautissime vero topicis repellentibus & acribus utendum, quæ, non nisi causis maximam partem sublatis, in morbo adultiore, habituali, urgente ob relaxationem summam, affluxu & in minus sensibilibus locum habent.

PALPE-

sanguis columbæ vel pulli vel lac croco tinctum, oculis calide affundatur; aut pulicula ex siefalbo & aqua rosar. confecta, & urgente dolore tandem ex sief. cum opio, mediante vesica, ac perforata, oculis injiciatur. Doloris & inflammationis vehementia sedata, fomenta ex stipitibus virid. dulcamar. & foliis hyssopi cum vino rubr. ppta; tandem albumen ovi cum alumine mixtum & aqua ophthalmica supra descripta in usum vocanda. Eadem fere medela ad *ophthalmiam siccam, herpeticam, phlyctanoden* & ex *ulceribus corneæ enatam* valet. *Ulcera corneæ* & *sacci lacrymalis* mundificanda, solutione lapid. divin. gr. vj. in aqua calcis cochl. ij - iij & absterfione mediante infuso absynth. & hyperici cum aqua calcis ppto empl. diapompholyg; tandem applicando R. Aquæ calcis ℥iv. salis ammon. ℥j. flor. virid. æris gr. I — II. solvantur. *Ad malum levius recens* & *ad inflammationem tarsorum* & *carunculæ lacrymal.* cum *oculorum siccitate*, sanguis columbæ, mucilago, lac erocat. (vide supra) vel lac maternum adhibenda vel R. carnis pomor. crud. mundor. ℥vj. album ovi N. i. in pulterem redactam massam, divide in duas partes, unam inter duo lintea, non nimium frigidam, applica oculo; hac calefacta, applica alteram, vel collyrium ex albumine ovi cum aqua rosarum conquassato, crocato pptum.

IN OPHTHALMIA EX FERRI PARTICULA *oculo infixo tentandum*, quid vis magnetica præstet.

OPHTHALMIA RHEUMATICA præmissis præmittendis, cort. peruv. cum tinct. Guajaci volat. ex decocto avenæ rad. gram. cichor. dulcamaræ copiossi-

piofius hauflo fanatur. Curatio *ophthalmiæ biliofa periodica* fub cephalalgia: *Verminofa, vene-rea, fcorpulofa, fcorbutica*, fuo loco petenda. Externe ad fcorpulofam ungtum Sloane laudatur.

OPHTHALMIA a carie dentis & fapius ab abfcefſu in finubus maxillaribus latente orta, a multis præterviſa, dentis evulſione curatur.

CATARACTA *incipiens*, diſtinguenda a caligine, & amauroſi, per opacitatem, pone pupillam conſpicuam & a fuſſione per viſum nebuloſum, decurtatum, curatur avertendo-congeſtiones; (cfr. morbor. capitis curam) inprimis lympham acrem, ſpiſſam corrigendo, diſſolvendo, revellendo, tonum reſtaurando. R. Saponis antimon. extr. arnicæ ſpirituofî calomel. aa. ʒj. camphoræ, croci, aa. ʒj theriac. androm. ʒj. ms. f. pilul. gr. ii. pond. D. bis de die N. 4-8. extract. aconiti vel extr. hyoſc. alb. a grani triente incipiendo & ſenſim augendo doſin; extr. pulſatill. nigr. cum tribus vel ſex partibus ſtri bene mixtum ad gr. v - xx - xxx. bis, terve de die; millepedes vivi contuſi conſerva roſar. excepti Nro. vi-x. denique xx-l. ex fero lactis, rad. Valerian. fœnicul. fol. herniaræ, Euphraſ. & flor. arnic. alterato, quotidie ſumendi. Externe commendanda faliva jejuna, fedulo affricta; oleum animale, inſtillatum; ſpiritus falis ammoniaci vel eau de Luce, cavæ manus infricati & mediante hac oculis & naribus admoti. Errhina, ex nucleis hyppocaſtani, in clybano exſiccatis, pulverifatis & cum cubebis & ſtro mixtis; ſcintillæ electricæ ex circumferentia oculorum elicite, ibidemque & pone aures hirudines

C 2

appo-

appositi, oculorum & narium scarificatio, pediluvia tepida, crebriora. *Evitentur in hoc, uti aliis oculorum vitiis, aër frigidus, solis ardor, lucis splendor, acria in- & externa, fumus &c. lacrymæ, lucubrationes, microscopiorum & telescopiorum non coloratorum usus; visio assidua rerum minutarum, aliique oculorum labores. Tandem ad auxilia chirurgica & dioptrica deveniendum.*

AMBLYOPIA ABSOLUTA, VEL VISUS DEBILITAS, a retinæ sensibilitate minori, post oculorum defatigationes, præcipue in ætate profecta enascens, curatur, quiete oculorum perspicillis biconvexis; tonicis in- & externis, lotione quotidiana matutina oculorum, faciei & pone aures, aqua frigidiore, adjecta quandoque quarta parte succi portulacæ; infuso meraco, rad. fœnic. Valerian. herb. Euphrasiæ. Cort. peruv. cum gttis x. essent. succini, juxta Hoffmann. pptæ, mane fumendo; ruta masticata & oculis adhalata, aqua ophthalmica confortante, crebro, frigide, cum fricatione adhibita, quæ ex grumis panis autopyri; (cujus pastæ pulvis rad. Valerian. herb. rutæ, flor. arnicæ, sem. fœnic. myrrh. & caryophyllor. aromaticor. subactus fuit,) per descensum, destillatur irrorando semper grumos, aqua rosarum, & cui aquæ vulnerariæ & camphoræ paucillum admiscetur; nec non nodulis rad. Valerian. herb. hyssopi Euphrasiæ, sem. fœnic. repletis, in vino rubro maceratis, noctu imponendis.

HYDROPTHALMIA. Cathartica, diuretica, vesicatoria, setacea, tandem paracentesin oculi & tonica externa exigit.

AMBLY-

AMBLYOPIÆ, RELATIVÆ, MYOPIÆ, PRESBYOPIÆ ars dioptrica.

NYCTALOPIÆ, correctis causis occasionalibus & præmissis evacuantibus, revellentibus, venæ sectione, vomitorio, vesicatorio, cortex peruvianus opem fert.

AMAUROSIS vel suppressio visus sine sensibili oculorum opacitate, concurrente plerumque pupillæ immobilitate, cujus principium in cerebro, ad thalamos nervorum opticorum, in horum nervorum tractu, vel in tota retina. Causas vide sub morbis capitis *M. M.* sub cephalalgia, paralyti, cataracta & amblyopia absoluta. Laudantur præparata flor. arnicæ. *R.* Flor. arnicæ \mathfrak{zj} - $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. infunde aquæ *ib.* *I.* coque in vase tecto per $\frac{1}{2}$. horæ & colaturam exhibe paulatim in die, vel pulv. arnicæ \mathfrak{zj} - *ij* in electuario; tartarus emeticus in parvis dosibus; & fonticuli in continuatione futura temporalis vel petrosæ iniusti, aut scarificationes occipitis. *R.* Extr. acanit. gr. \mathfrak{ss} . sri albi \mathfrak{zj} *ms. f.* pulv. tenuiss. & f. tales *Nro. iv. D.* mane & vesperi unus.

AMAUROSIS INTERMITTENS cortice peruv.

CONGENITA INFANTUM aqua ophthalmica confortante.

AMAUROSIS EX VULNERE SUPERCILII ipsius pressione & frictione ea parte, ubi ramus nervi ophthalmici ex orbita emittitur, curanda.

STRABISMI species emendabiles curantur indagando Causas amblyopiæ & guttæ serenæ, iisdemque medendo; quandoque curam caliginis adhibendo. Ex prava consuetudine enatus, cu-

ratur perspicillis concavis, conoideis, apice tantum pertufis (Masques à louchete) vel apud adultos, attentione & minorum ante speculum lectione.

SUFFUSIO, SCOTOMA vel hallucinatio visus circa phantasmata; nempe, puncta lucida, deorsum lentissime labentia; muscas, telas araneas, colores, scintillas &c., quæ suffusi vel oculis niditissimis gaudentes, præ oculis obversari sibi putant, a cataracta incipiente distinguenda, per pellucitatem humorum: plerumque ex sensibilitate nimia nervorum; in specie retinae, & quandoque ex diathesi phlogistica; plethora & congestionibus sanguinis & feri versus caput enascitur & curatur; mox roborantibus, antihypochondriacis, antihystericis, & mox antiphlogisticis; derivantibus & evacuantibus remediis; externis humorum affluxum diminuentibus, (vide amblyopiam) porro evitando attentionem melancholicam, causas occasionales; (vide cataractam) utendo denique vitris planis, colore subviridi, aut flavescente tinctis.

SUFFUSIO radians, seu epiphora, ophthalmiæ humidæ & amblyopiæ symptoma, sanato principe morbo, curatur.

DIPOPLIA plerumque intra paucos dies evanescens raro remediis indiget.

CALIGO, a NEPHELIO, vel macula corneæ subpellucida (ab opacitate humoris aquei, inspectione obliqua distinguenda).

AB ALBGINE vel macula magis crassa, alba, subeminente; a pterygio, ungue nempe & panno & a leucomate cicatrice, causatur ab inflammatione

tionē variolosa, lippitudine, prægressis; ab ambu-
 sione; a rodentibus, spiritibus acidis, calce
 viva, collyriis acerbis & spiritu vini male appli-
 catis, &c. curatur, sedata prius inflammatione,
 externis, vapore decocti Valerian. fœniculi hy-
 sopi &c. succo anagallid. calcitrapæ; tandem che-
 lidonii majoris; vel vino emetico, aqua rosar.
 diluto, bis de die caute instillatis; felle piscium,
 axungia viperæ; oleo chartæ, melle edulcoratis
 & apptis. instar vero omnium, pulvere ophthal-
 mico cl. Baldingeri. *℞.* Sfri albi, boli armen.
 albi vel rubr. cremoris tartari aa. q. s. ms. f. pul-
 vis subtilissimus, cujus parva portio, absque irri-
 tatione & flatu bis de die oculo applicetur. Ad
 malum rebelle & interna, extr. aconiti & solu-
 tio mercurii sublimati &c. adhibenda. In malo
 ex causa venerea oriundo eadem solutio, pul-
 vere, ex sro & mercurio dulci constato, simul
 externe applicato, in usum vocanda.

LUPIA, HORDEOLUM ALLEQUE EXCRESCENTIÆ
 fotus resolventes; frictions cum limacibus &
 saliva jejuna; digestiva; empl. diachyl. cum
 empl. de ranis cum mercurio, mixtum; levia
 cathærica, caute vero appda; spiritus falis am-
 moniaci guttulam, vel lapidem infernalem & tan-
 dem excisionem exposcunt. Excrescentiæ petio-
 lata, filo vincienda & ulceribus inde enatis empl.
 diapomphol. appdum.

AUDITUS VITIA.

OTALGIÆ CATARRHALIS EX DECUBITU PITUI-
 TOSO - SEROSO; RHEUMATICÆ, curationem vide
 C 4 sub

sub ophthalmia humida, rheumatica & sub cephalalgia.

Inter externa præprimis veniunt epithemata, vapores, prægorico discutientia; panis calidus dissectus, suffitus ex succino & sfo auribus apta. succus ruta, decocto alth. dilutus, oleum animale, auribus instillata.

OTALGIA INFLAMMATORIA M. M. vide sub ophthalmia graviore. Externe, cataplasmatibus, discutientibus, paregoricis interponendi sunt vapores ex lacte, flor. chamom. samb. & croco alterato, auribus admittendi; & lac cum rad. alth. flor. papav. rh. coctum ipsis instillandum, & hirudines circa aures ponendi. Si vero suppuratio evitari non potest, ad maturantia progrediendum, abscessus ruptio & puris exitus promovendi, respirationis nixu, sternutatione, vomitu &c. **Ulcus mundandum** decocto vulnerario, cum melle rosar. liquamine myrrhæ, balsam. sulphuris; simul meatus auditorius gossypio, muscarum aditum & vermium generationem præpediente, obturandus. Reliquarum specierum *A colluvie biliosa, a dente carioso periodica* &c. &c. curam vide sub ophthalmia.

OTALGIA a CORPORIBUS QUIBUSDAM IN MEATUM AUDIT. INGRESSIS. Corpuscula, lubricata prius viis, suspensa manu, mediante volsella, educenda & insecta ope olei amygd. amar. injecti & diu retenti enecata, ope specilli, lana involuti & terebinth. imbuti, auri immitti, ibique circumacti, extrahenda vel nixu respirationis & sternutamento eliminanda.

AUDI-

AUDITUS DIFFICILIS, CONFUSUS; BOMBUS; SUSURRUS; TINNITUS; SURDITAS. Ponderatis causis sub morbis capitis recensitis, & bene perpen-
sis procatarcticis curatio, sub cephalalg. fan-
guinea, pituitosa, serosa, stomachica, biliosa, ve-
nerea, scorbutica, hæmorrhoidali, hysterica, hy-
pochondriaca, idiopathica, periodica &c. descri-
pta, accommodanda. Cfr. quæ sub cataracta,
amblyopia, amaurosi & suffusione notata sunt
remedia.

**A CERUMINE INDURATO, MEATUM OBSTRUEN-
TE.** Injectionibus lactis, in quo sapo venet. &
syrup. altheæ solvantur & repurgatione meatus,
mediante specillo curatur.

**AB OBSTRUCTIONE, COMPRESSIONE, PARALY-
SI TUBÆ EUSTACH.** cognoscenda, si expirationis
nixu edito, neque bombus sentiatur, neque tym-
panum protuberet; & a repletionem cavitatis
tympani quocunque liquido, rore condensato &c.
plerumque ob tubam obstructam, sanantur vapo-
ribus ori admissis; gargarismatibus, e. gr. ex o-
xymelle scillitico; masticatoriis, aërem masti-
catione rad. angel. sem. feniculi &c. medica-
tum, vel fumum tabaci suctum, compressis la-
biis & naribus, per tubæ viam impellendo; Er-
rhinis, pilulis, extractis &c. ad cataractam or-
dinatis; acidulis martialibus &c. Reliqua in- &
externa vide sub cephalalg. pituitosa & paraly-
si. Eandem fere medelam *vitia auditus, a*
laxitate membranarum exigunt, quæ decubitu
feroso, catarrhis, emollientibus male apptis &c.
&c. causantur & ex prægressis, inspectione, au-
ditu acutiori, si tympanum forte a causa qua-
dam tendatur, ut fit in sono graviori & cælo
fere-

sereno, & contra auditu debiliori, sub caelo nebuloso, pluvioso, dignoscuntur. Profunt quoque panis recens dissectus, cujus pastæ rad. Valerian. baccæ lauri, sem. fœnicul. subacta fucunt, & cui essent. castor. & spiritus vin. camphor. crocatus instillatur, auribus calide admotus; decoct. vinosum rad. Valer. fol. hyssop. agrimon. centaur. min. ejusque vapor tepide immissa; aqua ex frutice fraxini incensa destillans, cum succo sedi majoris & ovulor. formicar. mixta; castoreum cum sale volatili cornu cervi mixtum syndone involutum; oleum animale, chamom. acustic. Wedel. moschus, ope gossypii adptâ; fumus nicotian. suctus & auribus inflatus, & olei petræ carbonibus instillati, iisdem aptus; fonticulus processui mastoideo incustus; stillicidia, ignis electricus.

AD VITIA AUDITUS EX MEMBRANIS SICCS, ex regimine & medicamentis calidis; mora in aëre fervido &c. oriunda, remedia blanda oleosa; lac; vapores molles adhibenda.

A FRAGORE MAGNO, aër haribus & ore compressis, nixu expirationis, sæpe in tubam Eustach. urgendus.

SURDITAS a CARIE, OSSICULA AUDITUS &c. occupante; a tympano rupto; exostosi; mala conformatione & defectu partium auditui inservientium incurabilis est a membrana meatui obdulta, a polypo, steotomate aurem occupante chirurgiam exigit. Malum palliant tubi acustici; radii sonori aperto ore excepti & bacilli lignei inter lardi & loquentis dentes maxillæ superioris interpositi.

DEN-

DENTIUM VITIA.

ODONTALGIA. M. M. Sanguineæ vel inflammatoriae, pituitosæ, ferosæ, stomachicæ, hinc sæpe periodicæ, arthriticæ, venereæ, hystericæ &c. &c. vide sub cephalalgia.

AD INFLAMMATORIAM simul cataplasmata, & collutio emoll. paregorica adhibenda; aliena calida; acria in- & externa.

ODONTALGIA GRAVIDARUM venæ sectione; *nutricum* vero, quandoque, non nisi dente sanissimo fracto aut evulso mitigatur.

AD PITUITOSO - SEROSAM VEL CATARRHALEM ET EX DENTIBUS CARIOSIS sæpius occurrentem, præter revellentia in- & externa; sudorifera, vesicatoria, hirudines pone aures, interdum venæ sectionem &c. (vide supra) laudanda sunt; infusum vinosum, anserinæ meracum cum essent. Guajaci vel pimpinell. liquore anod. min. & laudano liq. Sydenh. mixtum, in ore detentum; elixir. acid. Dipp. balsam. odontalg. cum & sine opio; oleum animale, camphoræ, caryophyllor. cajeput. vel horum loco naphtha vitrioli, cum pauxillo laud. liq. Sydenh. gossypio excepta & cavitati dentis appra; fumus sri, tabaci, dentibus admissus; sal. vol. siccum angl. naribus admotum; liquor anod. min. illis adtractus; spiritus bezoard. Buff. aliquot guttulæ, mediante bombyce auribus immisæ, massæ odontalgicæ sequentis, cl. Voglero probatæ, portio fabæ magnitudine gingivis admota R. pulv. mastich. sandaracæ aa. ʒij sang. drac. optimi ꝑ ß opii crudii gr. ii. ol. anthos destill. gtt̄s viij. spirit. cochl. q. s. ms. f. massa emplastri consistentia. Sævities vero dolo-

doloris tandem, præmissa sufficienti evacuatione, opii interno usu mitiganda.

Quandoque dentis cavitas plumbanda, vel cauterium actuale adhibendum, vel ad evulsionem deveniendum. Qua operatione nonnunquam ophthalmia, cephalalgia, tussis &c. quas dentes carioli causarunt, curantur. Præcavetur dentium caries, os crebro eluendo decocto rad. lapath. acuti, folior. heder. arbor. salviæ, rutæ, flor. lavend. cui aliquot guttulæ œu de Luce vel spiritus salis ammoniaci instillantur, & fricando dentes, carbone panis vel fraxini pulverisato & panno aspero: Item masticatione myrrhæ. *Gingivis laxis, cruentis, ulceribus obsessis, dentibus inde vacillantibus & satori oris* consultitur tinctura gingivali balsamica: Electuario sequenti, ℞. Tincturæ myrrh. ad dimidias abstractæ ℥ij pulv. fol. salviæ, flor. ros. rubr. ossis sepiaæ aa. ℥iij sang. dracon. cort. granat. aa. ℥ij gummi lacca, alum. usti. aa. ℥j mellis rosar. q. s. addi possunt cocinell. ℥ij & olei cinnamom. aliquot guttulæ — vel ℞. Terræ catechu, sang. dracon. aa. spirit. cochl. q. s. ut leni digestionem solvi possint & f. linimentum spissius opernicilli appdum; masticatione crebriori gummi mastichis, vel trochiscorum terræ Japon. fol. acetosæ & cochleariæ; collutionibus elixirio vitrioli Mynsicht. cum melle ros. & s. q. aquæ mixto & scarificatione gingivarum. Cfr. curam scorbuti.

STUPOR DENTIUM sublevatur linteo calido dentibus appio, masticatione portulacæ & acetosæ.

PECTO-

PECTORIS MORBI.

PHTHISIS PULMONALIS, pulmonum functionem laesam, & enata suppuratione, humorum corruptionem summam, per pus resorptum, eorumque jacturam involvens; suspicanda, ex tussi sicca vel humida, vel quæ committatur aut rejectione quorundam, veluti granulorum, foetentium, si conteruntur, corpusculorum, cum sensu quodam in pectore gravante; aut si vomica aperta est, sputorum, maxime griseorum, flavorum, dum siccantur, subdulcium, vel salforum, foetidorum, in aqua subsidentium (nisi spuma sustineantur) valde foetentium, si prunis injiciantur, viscosorum quidem, sed friabilium, hinc a mucosis distinguendorum, quæ in longa filamenta ducuntur, alba & pellucida magis sunt; porro suspicanda ex anxietate, dispnœa post pastum, per motum, scalarum ascensum, respirationem profundam & mitem fumum auctis; ex dolore pectoris fixo; decubitu in uno vel altero latere difficili; sapore salso, dulci, denique amaro; lingua rubra vel mucro nigro oblecta; febricula, initio miti, post pastum percipienda, tandem hectica, vespere exacerbata; pulsu frequenti, urina rubra, vigiliis, volarum calore; genarum rubore stipata; irascentia, emaciatione corporis, denique spasmo faucium vel raucedine, sudoribus nocturnis viscidis &c. &c. ab hæmoptoe, in inflammationem & exulcerationem vel pulmonum debiliam infarctum abeunte; a diathesi phlogistica; a tuberculis crudis, pulmonum functionem impedi-entibus vel inflammatis & exulceratis; a pneumonia exulcerata; a catarrho diuturno; a cacochymia varia, imprimis morbillosa, metasto-
si,

fi, violentia externa & ab effluviis variis venenatis, acribus, acidis, metallicis; calcis viv. &c. pulvisculisque inspiratis enascitur. Id quod potissimum chemicis, metallifossoribus, statuariis, gypsariis, molitoribus familiare. Cfr. causas gener. quarum pleraque, ex hæreditate &c. &c. dispositis, morbum facile inducunt.

M. M. Variæ causæ prædisponentes & occasionales varie corrigendæ, tollendæ, inprimis obstacula in abdomine latentia removenda, hæmoptysis præcavenda, curanda, methodo descripta; & pulmonum laxitati, & ex hæreditaria labe suspicandæ, decoct. peruv. rad. graminis & fol. millef. succurrendum.

INFLAMMATIO LENTA a causa gener. io. - b, hæmoptysi male tractata; haustu frigido corpore calente, inprimis enata, sensu caloris; somno interrupto; macie, tussicula, febricula &c. per intervalla & sat diu affligens, venæ sectionibus parvis, diæta tenui, vegetabili; demulcentibus, decocto limacum, fero lactis, nitrosis, acidis, succo cucumerum, oxymelle &c. sæpe cum gummi ammoniaco, extr. cardui benedicti, cascar. & arnic. combinandis; cataplasmate ad pectus, ex farina herb. resolv. marrub. arnic. flor. samb. &c. cum aqua vegeto-miner. ppto; pediluviiis, sinapis- mis sananda. *Colluvies biliosa*, si in culpa est, evacuanda. Eandem M. M. exposcunt *tabercula inflammata* catarrhalem tunc sæpe mentientia, febrem. *Taberculis crudis* sæpius ex hepatis vitio, & glandularum meseraicarum obstructione & abusu spiritus vini oriundis; tussi ovilla, quandoque pituitosa; respiratione ad motum, calor

rem

rem &c. difficili, stipatis, & exhaustos, interdum, sine ulcere & dolore, jugulantibus, medentur: Pilulæ viscerales N. adjectis extr. cicut. rubiæ tinct. liquirit. sapon. antimon. sæpe scilla, nonnunquam calomel. emulsio gummi ammoniaci; vinum antim. Huxh. ad guttas xxx. potui insill. succi herb. heder. terrestr. tarax. &c. Conserva millepedum cum sulphure aurat. antim. liquid. mixta; Pulveres rad. ireos fl. seneg. rubiæ T. flor. benzoës hac conserva excepti: Decoct. gland. ilign. exsiccat. & parum tostorum rad. seneg. rub. tinct. & furfurum tritici leniter tostorum; infusa rad. fœnic. enul. ireos flor. herb. heder. terrestr. marrub. alb. hyssop. flor. sambuc. arnica, admixto oxymelle scillit. eorum vapor inhalatus, derivantia, pediluvia, epispastica, cathartica ex rheo & manna, enamata; venæ sectiones parciore, topica ad pectus, nonnunquam ad hepatis regionem, si durities ibi detegitur, cfr. curationem glandularum meseraicarum & viscerum abdominis obstructionum; quæ sæpius phthisin inducunt, mox vero mentiuntur.

PTHISIS a steatomate, polyypis, carcinomate, hydatibus; emphysemate, aneurismate, angustia aortæ, situ viscerum præternaturali, vix cognoscendis, rarissime medelam admittit.

CATARRHO INVETERATO opem ferunt diætæ lactea; cathartica ex pulpa cassiæ, cum manna & rheo, repetita; subjunctis vesperi opiatis, syrupo dracodio &c. demulcentia, emulsiones temperantes, diaphoreticæ, diureticæ; pilulæ ex succo liquirit. myrrh. olibano, succino, mastiche & bals. peruv. sæpe de die, parvis dosibus, cum melle exhibitæ; suffimigia ex succino & mastiche &c.

&c. ferro calido inspersis & ibi liquefactis inspirata; subjunctis decocto peruv. cascarill. cum melle mixto; vesicatoriis ad furas & pro re nata venæ sectione.

CACOCHYMIA VARIA vide Csas gener. Nro. 9. suis propriis remediis corrigenda, e. g. Phthisis scorbutica, succis betulæ, fumar. heder. terrefr. cum vel sine melle mixtis, serum acre tenue, retentum, retropressum, pulmones petens; emulsivis, demulcentibus, lacticiis cum balsamicis mixtis; decocto limacum; ostreis crudis, esu cucumerum, fragorum &c.; cicurandum, involvendum, discutiendum & revellendum, methodo sub cephalalgia serosa descripta. In hac specie fonticuli, setacea, sudor prudenter prolektus & purgantia lenia, cum opiatibus caute adhibita, sæpe locum habent.

PHTHISIS INCIPIENS, AB INSPIRATIS, PULMONES IRRITANTIBUS, remedia lubricantia, demulcentia, sub tussi titillatoria ordinata; imprimis inspirationem vaporum emoll. exposcit. Quandoque ad pingua, glutinosa, axungias recentes; olea blanda &c. deveniendum. Iisdem remediis, calculorum, pulmones obsidentium relectio facilitatur.

PHTHISI ULCEROSÆ medentur, acrimoniam purulentam cicurantia; per idoneas vias eliminantia, ulcera detergentia, consolidantia & jacturam humorum blande refarcientia; pulmones roborantia, aquæ Embenses, Fachingenses, Selteranæ, cum lacte capræ, aut asinæ, aut vacæ, herbis antiphthisicis nutritarum, decoctum hordei, avenæ, cum lacte, vel acidulatum; lactebutyratum; serum lactis, cum cerevisia pptom &

& herb. millefol. tussilag. heder. terrestr. arnic.
 ruta mur. aut succis herbarum & præcipue dau-
 ci hortensis, vel sro succis imbuto (quorum præ-
 parationem vide sub obstructione viscerum) al-
 teratum. ℞. Infusi per macerationem saturati
 & cum expressione colati rad. card. fullon. rec.
 saponariæ, summitatum, herb. urtic. minor. uren-
 tis, heder. terrestr. millefol. bellid. min. cum flor.
 coque vase bene tecto, porro ad dimidias, lente
 & cum mellis tantundem ad electuarii diluti con-
 sistentiam redigatur & aceto vel elixirio acido
 aciduletur. D. omni 1/2. horæ cochlearculum —
 ℞. Hrb. botryos Mj. spirit. vitriol. gtts xx. sri.
 q. s. ut f. l. a. conserva ad ℥ij de die sumenda;
 conserva rosar. mollis, aut solida; succus cucu-
 nerum cum sro mixtus; lac medicatum: —
 ℞. Bals. de copaiv. sro subact. ℥j, adde emul-
 gendo lactis rec. ℥ss. aquæ faching. vel selter.
 ℥j. D. omni hora ℥ij; aut ejus loco, extr. myr-
 rhæ aquos. cum æq. portione sri lactis mixtum
 ad ℥j. exhibitum, — ℞. Extr. cascarill. aquos.
 cichor. aa. ℥ij. interdum extr. cicuta ℥j. extr.
 croci ℥j. pulv. rosar. r. heder. arb. aa. ℥ss.
 spirit. vitrioli dulc. gtts. xx. bals. peruv. q. s.
 ms. f. pil. gr. iij. omni trihorio 3 - 4. sumen-
 dæ — ℞. Extr. cort. peruv. ℥ss. saponar. gly-
 zirrh. aa. ℥ij. croci ℥ss. mucilag. sem. cydon.
 q. s. ut f. elect. dosis ℥j. bis, quater de die, quæ
 vero diminuenda vel cortex plane interdendus,
 si sputa inde supprimantur. Prædicant nonnul-
 li semen phellandrii sive fœniculi aquat. & ℞.
 Lichen. island. ℥j. digere cum aquæ font. ℥xvj
 ad remanent. ℥xij. & adde syrup. scill. ℥ss. D.

D

omni

omni bihorio ꝑj. — Recensitis vero longe præstat sequens, crebriori & quotidiana experientia præbatum, ad acre tenaciter involvendum & partes gelatinoso-glutinofas refarciendas &c. efficacissimum remedium. (*) R. Limaces tres, quinque, bene lotos, incisos & contusos, coque in decocti rad. graminis, taraxaci, herb. marrubii, millefol. virgæ aureæ &c. quibus femoris vitulini pars addi potest. ℞iſſ, ad dissolutionem limacum; in colatura solve syrup. de farfar. vel siri rosac. ꝑſſ. & pro re nata adde lactis tertiam partem D. mane per vices, subjunge elixir. ex extract. card. bened. cascarill. aquoso, spiritu nitri dulci & aqua menth. compositum, ante epulas adhibendum; vapores ex decocto pectorali, cum oleo terebint. mixto inspirati; exulcerationes artificiales, vesicatoria, fonticuli, intra costas inuſi, setacea, imminente quidem suppuratione magis proficua; cataplasma supra notatum; empl. de Galbano; ungtum volatile ad pectus; æris mutatio, equitatio; mora in aëre, exhalationibus ceræ flavæ & picis, igne liquefactarum imprægnato; inspiratio æris fixi, ex mixtura cretæ & aceti ascendentis; ambulatio inter abietes; diæta ex alimentis eupeptis, blandis, acescentibus, acrimoniam corrigentibus, demulcenti-

(*) *Maculae ex linteis colaturæ limacum inservientibus haud elui possunt. An succus expressus cochlearum parvularum, quæ super carduo stellato inveniuntur, a cel. Morgagni commendatus ejusdem virtutis est?*

centibus, crebro, sed parce ingestis: olera congrua daucus hort. cichor. urtica min. urens, brassica crispa &c. cum vel sine jusculo carnis & cancr. fluviat. ppta, adjecto succo aurantiorum; acetaria ex lactuca, bellid. min. cichor. &c. omiffis tunc lactiniis; jusculum emulsivum Fulleri; gelatina ex avena excort. ℥ss. ras. C. C. passul. aa. ℥ij. cancror. fluvi. contus. Nro. XII. & femore vitul. concis. & cum ossibus contract. confecta, fago aqua & lacti incoctum. Pulmentum ex farina secalina aqua & butyro infusum coctum, cum vel sine lacte caprino. Decoctum ex farina avenae tostae, pauxillo chocolat. & lacte pptum. Roob pomorum spissius; lactinia, ventriculo ea non respuente; cerevisia medicata. Interponenda interdum cathartica manata, nisi diarrh. colliquativa instans ea interdicit. Ex enarratis caute feligenda, quae cuilibet temperiei, gradui, causae praegressae, probe discernendis & morbo complicato quadrant. Et hac sub conditione balsamica, praeparata animalia & cortex peruv. & acida mineralia, a multis hic damnata, magni usus esse possunt, experientia teste.

SYMPTOMATA MITIGANDA: TUSSIS victu tenui; potu demulcente; frequenti, in ore gestatione trochiscorum ex pulpa rad. alth. gummi arab. sro pporum; butyro cacao; syrupo diacodii & denique opio, caute adhibito.

AD SPUTA VERO SUPPRESSA solutio gummi ammoniaci in aqua hysopi, adjecto oxym. scill. & syr. diacod. fomenta emoll. tepida ad pectus; vapor ex infuso herb. aromaticarum, cum acetate mixto, inspiratus.

D 2

AD

AD VENTRICULUM DEBILIOREM infus. frigid. herb. card. bened. sstrum myrrh. elixir. ex extract. cascarill. aquos. &c.

FEBRIS venæ sectionibus parvis, pro virium conditione repetitis, acidis, syrupo acetosellæ, oxymelle, succo cucumerum maj. fructibus horæis maturis; electuario supra descripto, cum tantillo nitri; non minus, si sordes primarum viarum peccant, catharticis antiphlogisticis curanda. Exulenti vero, quæ sanguinis calorem & acrimoniam putridam, vel biliosam intendunt: Balsama, lac, juscula carnis & similia, nec non cort. peruv. si nempe sanguis ex phlogosi spissus & vera inflammatio timeatur.

SUDORES COLLIQUATIVI leniendi emulsione diacodiata, saturatori, cum decocto hordei & aquis analepticis parata; lacte ebutyrato; decocto quassæ, aqua calcis cum lacte, nonnunquam haustulo vini Pontak, aëre frigidiasculo, lotione roborante.

DIARRHŒA COLLIQUATIVA decocto quassæ; enematis ex decoct. cort. peruv. saturato, lacte & pauxillo opii pptis.

PHTHISIS FEBRES, INPRIMIS INTERMITTENTES excipiens, evacuatis sordibus, sublatis obstructionibus viscerum & correctis impuritatibus sang. cort. peruv. exposcit.

CURATIO PHTHISEOS NOTHÆ, pulmonibus illæsis, sputo varii coloris, viridis &c. puriformi stipatæ; arthriticis, hæmorrhoidariis, gravidis præcipue familiaris; puogeneseos & febris lentæ & hæctica, a viscerum abdominis vitiis, exulceratione evenientis parum a præcedenti differt.

In

In hepatis quidem exulceratione, quæ dolore hypochondrii dextri compressivo, pulsatili; respiratione anhelosa; cutis colore flavescente; urina crassa, rubra; dejectionibus, mox durioribus, mox liquidis & spumosis stipata est, puris excretio per laxantia, resolventia, rhabarbarina, salina, mitiora, inprimis per clysteres ejusmodi; & *in venum exulceratione*, quæ gravitate continua in lumborum alterutro; cruris stupore; urina sedimentum fluidum, album, mucidum, lacteum, eruentum deponente incedit, per lenia diuretica, sal ammoniacum &c. promovenda est. *Uteri exulcerationi*, quæ ex dolore, in infimo ventre & effluxu humoris purulenti cognoscitur, potissimum injectionibus & fotibus idoneis succurrendum est. Semper vero non satis laudandum illud decoct. limacum, subjunctis clysteribus visceralibus, crebrioribus & elixirio supra notato, cui extr. cicuta admisceatur, in usum vocandum est.

TUSSIS.

CATARRHALIS, TITILLATORIA: BRONCHUS potissimum ex transpiratione, frigore suppressa oriunda, curatur sero lactis, ope cerevisiæ ppto, vel decocto furfurum leniter tostorum cum rad. ireos florent. herba tussilaginis, veron. florib. samb. & verbasci infusis & melle edulcoratis; vaporibus ejusmodi inspiratis; decocto dauci hortens. Rapar. emulsivis mannatis; sro glyzirrhizato & pasta dialth. crebrius in ore gestatis; mucilage cydon. butyro cacao; looch. ex ovo, mucilaginoso; melle cum pauxillo pulveris zinziberis mixto; pulvere ex spec. diaireos rec. ℞. flor. D 3 fulph.

sulph. nitri dep. aa. ℥ij. croci. ℥j. sſri canar.
 ad pond. omnium conſtato, adjectis pro re nata,
 falis ammoniaci puriff. & ſeminis anifi aa. ℥℞.
 & opii aliquot granis; pomo excavato, melle im-
 plecto & cocto; eclegmate ꝛ. Ol. amygd. d. ℥℞.
 ſpirit. vitriol. parum dulcificati ℥j. ſyrup. papav.
 rh. ℥iiij. ms. agitando dentur per vices cochle-
 arcula aliquot. — ꝛ. Rad. alth. ℥ij. graminis.
 ℥j. fol. tuſſilag. Mij. concis. coque in s. q. aquæ,
 ſub finem coctionis adde flor. verbaſci M. j.
 rad. ſœnic. enulæ aa. ℥℞ liquirit. ℥ij. croci
 ℥j. & poſt ſufficientem digeſtionem colaturæ ꝛiv.
 admisce antimonii diaphor. non abluti ℥iſſ ſy-
 rup. diacod. ℥iſſ. oxymell. ſcill. ℥iſſ. D. omni
 bitorio ℥iiij. externis revellentibus, pediluviiſ.
 &c. Nonnunquam febris & tuſſis vehementia v. ſ.
 expoſcit. Materia peccante ſufficienter cicurata
 & per diaphoretica, cathartica, imo vomitoria,
 quæ potiſſimum, concurrente colluvie bilioſa
 non negligenda ſunt eliminata, roborantia cor-
 tex peruv. caſcarill. &c. adhibenda ſunt. Ea-
 dem fere medela lubricans, demulcens cum va-
 poribus valet in *tuſſi ab ariditate tracheæ &*
pulviſculis acribus inſpiratis, nec non a corpuſ-
culis peregrinis in faucibus, partim muco in-
tricatis, hærentibus, ſubjunctis, hoc in caſu vo-
mitoriiſ & a muco fauces titillante; ubi vero in
hæmorrhoidalem morbum ſimul inquirendum
eſt. (cfr. morbos œſophagi) Ad raucedinem
cum tuſſi nuptam, decoctum braſſica rubra, ſtro-
edulcorat. & pauſillo nitri alteratum.

TUSISS

TUSSIS CATARRH. DIUTURNÆ VEL HUMIDÆ, MUCOSÆ, HABITUALIS phthifin saepe mentientis curam vide supra sub phthifi, ex catarrho inveterato. Conferunt quoque mallicatio camphor. & olibani; emulsio gummi ammoniaci cum syrupo altheæ; balsam. de copaiva, ex ovo forbili, eff. Galb. Bernh. elix. pect. Wed. sulphur aur. antimonii potabil. spirit. salis ammoniaci anis. extracta, vel succi inspissati card. bened. tarax. heder. terrestr. cum oxymelle scill. ex decocto rad. rub. tinct. pulvis cascarilla, purificans; externe pediluvia; clysmata; vesicatoria ad furas; remedia ad tubercula cruda. Horum selectum feri acrimonia, mucî tenacitas, pulmonum relaxatio & stomachi vitia complicata, determinant.

TUSSIS CACOCHYMICÆ RHEUMATICÆ medellam vide supra sub phthifi, a cacochymia varia.

TUSSIS PLETHORICÆ, SICCÆ junioribus, plethoricis, post s. evacuationes retentas, suppressas vel ex tuberculis, calculis, polypis pulmones obsidentibus, &c. evenientis, curam vide sub hæmoptysi & phthifi.

TUSSIS STOMACHALIS, ex stimuli sensu, in scrobiculo cordis, quoties tussendi paroxysmus instat; ex tussis, post epulas, cum conatu vomendi, vel vomitu evenientis, vehementia & sonitu profundo & criteriis, sub cephalalgia stomachica notatis cognoscendæ, curationem absolvent vomitoria; purgantia & preparata ex rad. enulæ, fœniculi, quassia, ir. flor. zingiberis, cort. cascarill. herb. marrub. alb. card. bened. hyssop. R. Mann. el. ℥j. sal. ammon. ℥ij. extr. enul.

D 4

card.

card. bened. aa. ℥j. conferv. flor. falv. ℥ss. syr.
de hyfop. q. s. ut f. elect. D. omni trihorio ad
nucis jugland. magnitudinem. Vide reliqua sub
digestione lafa.

TUSSIS HYPOCHONDRICA, HYSTERICA, ex mo-
bilitate nempe nervorum, ex obstructione visce-
rum abdominis & *tussis ex irritatione nervo-
rum, per vermes, dentitionem difficilem, costam
fractam* &c. proritata, modendo principi mor-
bo & illa a variis insectis intra pulmonem de-
litescens, succo marrubii albi & scilla cu-
ratur.

TUSSIS CONVULSIVA IN GENERE, modo an-
tihysterica, opiata, extract. capitem papaveris
rhoados a gr. ij. ad x — xx. modo involventia,
demulcentia, spermaceti recens, jusculo calidif-
simo solutum, adjectis aliquot granis flor. benz.
eclegma sub tussi catarrh. descriptum; modo et-
iam expellentia, vinum antimon. huxh. flor. sul-
phuris larga dosi & revellentia exposcit. (vide
supra sub phthisi a cacochymia & sub catarrho
suffocativo) Et quævis tussis ferina; graves mor-
bos, apoplexiam, hæmoptysin, abortum, herni-
am &c. minitans, præcipue illa ex anomalia mo-
tum, post animi affectus convulsiva, opio mi-
tiganda, præmissa in plethoricis v. s.

TUSSIS CONVULSIVÆ STOMACHALIS CLANGO-
SÆ VEL FERINÆ medelam vide sub morbis in-
fantum.

A S T H M A.

Uti tussis, optime in *humidum*, ex materia
catarrhali, pituitosa, viscida, & *ficcum* ex s.
eva-

evacuationibus retentis, suppressis & ex irritan-
 tibus inspiratis; porro in *cacochymicum*, a sero
 acri retento, retroacto; pedum œdemate, sudore
 repulso &c. in *stomachale*, *hypochondriacum*,
hystericum, ex flatulentia, mobilitate nervorum,
 obstructione, tumore viscerum, ascite sæpe laten-
 te & in *convulsivum varium* distinguitur &
 eadem fere methodo sanatur. Perpensis ergo
 sedulo morbis prægressis & concomitantibus &
 causis paroxysmum accelerantibus & retardan-
 tibus, remedia selecta, ex illis, quæ sub va-
 riis tussis & phthiseos speciebus descripta sunt,
 huic morbo applicanda sunt. Sæpius obvenit *asth-
 ma ex pituita lenta, cum stomachi, hypochon-
 driorum vitis & flatulentia complicatum, con-
 currentibus semper spasmis, interdum acrimo-
 nia*. Hinc toties in usum veniunt emetica, rad.
 ipecac. cum liq. anod. m. frigide infusa & par-
 vis denique dosibus, credro exhibita; cathartica;
 clysmata mox acria, mox antispasmodica, car-
 minativa, cum asa foetid. ppta; vapores ex in-
 fuso salvia, flor. sambuc. cum aceto vel sale am-
 moniaci mixto inspirati. Rad. seneg. rub. tinct.
 herb. & flor. arnic. scill. dracunculus; crocus;
 gummi ammoniacum; sagapenum; ess. Galban.
 Bernh. sulphur aur. antimonii potabile, oxymell.
 colchicum, spiritus salis ammoniaci anif. elix.
 pector. Wed. kermes min. vinum antimon. huxh.
 ꝛ. Herb. rec. mari veri ꝛß. kermes miner.
 gr. ij. sachari q. s. ut f. conserva D. pro dosi
 bis de die — ꝛ. Pulv. summitat. marrub. alb.
 ꝛ j. croci ꝛ ß. moschi gr. ij. extr. card. be-
 ned. ꝛ ij. extr. capitum papav. rh. gr. iij. mu-
 cilag. sem. cydon. q. s. ut f. bolus ex infuso sa-
 turato fol. hysopi heder. terrestr. & flor. arni-
 ca,

D 5

ca,

cæ, sambuc. oxymelle scill. largiter alterata
 vel ex vino generoso calido, quassia prius infuso,
 bis de die sumendus — Mixture asthmatica Tril-
 lero probata: ℞. Aquæ dest. tussilag. pulmon.
 veron. fœnic. hysop. aa. ℥j. elix. pector. Wedel.
 ℥ij essent. pimpin. alb. liquirit. aa. ℥j. extr. casca-
 rill. enul. ℥j. syr. de alth. ℥j. oxymell. scil-
 lit. ℥℞ D. omni trihorio cochl. ij. — ℞. Aqua
 hysop. ℥x. spirit. sulph. p. c. ℥j. mixtis instilla
 liq. cornu cervi q. s. ad saturationem, dein ad-
 de gummi ammoniaci acet. scill. soluti vel asæ
 fœtid. ℥ij syrup. de hysopo ℥j. D. omni 2. hor.
 cochl. ij — ℞. Gummi ammoniaci aceto scill.
 fol. ℥ij. oxymelle scill. ℥ij. aquæ majoran. hy-
 sop. aa. ℥iij. ms. D. omni trihorio cochl. ij —
 ℞. Millepd. vivor. ℥℞. contusis in mortario
 affunde aquæ asthm. hydromellis aa. ℥vj. cum
 colatura fortiter expressa conteratur ac emulgea-
 tur gummi ammoniaci ℥℞. sri albi ℥j. traje-
 ctus liquor D. omni 6horio ad cochl. ij. ex cy-
 atho infusi hysop. & flor. arnicæ, cui portiuncula
 spirit. salis ammoniaci anisati instillatur. — ℞.
 Ess. Galb. Bernh. inspiss. ℥iij. gummi sagapen.
 saponis antimonialis, mucilag. gummi arab. bulbi
 ari. rec. aa. ℥j. bene invicem tritis admisce
 extr. enulæ, hysopi marrubii alb. spirituosor.
 card. bened. aquosi aa. ℥ij capitum papav. rh.
 bals. tolut. aa. ℥j. ms. f. pil. gr. ij. pond. D.
 4ter de die 10 - 15. ex infuso herb. heder. ter-
 restr. marrubii alb. dracunculi, millefol. hy-
 sop. rad. ir. flor. enul. fem. fœnic. vel ejusmo-
 di aquis destillatis; junctis interdum, specificis
 anti-

antipilepticis, nitro, v. f. revellentibus, pediluvii, cataplasmatibus, sinapismis, vesicatoriis ad pedes, fomentis, ungtis ad pectus, immersione brachiorum in aquam fat calidam, cum frictione; remediis fluxus suppressos revocantibus &c. &c. Cfr. curam digest. læsa, tuberculorum crud. & arthritidis anomala. *Asthmatis sicci species, ex tuberculis crudis & arthritide anomala enata equitatione, juncto lactis usu mitigatur. Curam asthmatis a cerebri vitiis & inde enata levi resolutione nervorum, pulmonum, diaphragmatis & reliquorum muscularum respirationi inservientium vide suo loco.*

ASTHMA VEL ORTHOPNŒA EX TUMORE COLLI magno, rebelli, essentia aconiti brevi curatum est. *A vermibus in ventriculum & œsophagum reptantibus, ab hydrothorace, medendo principi morbo; a venenis, fungis, vaporibus venenatis, remediis sub cephalalgia & vomitu notatis: a violentia externa vehementibus costarum aut sterni contusionibus, fracturis, luxationibus & cartilaginis xiphoideæ intropressionem chirurgia & asthma periodicum præmissis præmittendis cort. peruv. sanatur.*

ASTHMA EX POLYPIS CORDIS, ejusdem magnitudine p. n. aneurismate aortæ; ex cartilagine costarum, immo annulorum bronchiorum offescentia; tuberculis copiosis, calculis prægrandibus; vomitibus pulmonum; tumoribus variis; emphysemate pulmonum; gibbositate; laryngis vitiis, tumoribus, ulceribus &c. strumis collis inveteratis enatum, vix sanabile est.

CA-

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

stricte sic dictus, est infarctus bronchiorum, ex defluxione copiosa, repentina materia catarrhalis, per glandulas universae arteriae asperae relaxatas; concurrente interdum constrictione spasmodica, ex acrimonia pituitae & repletione vasorum encephali, ob sang. circulum, in pulmonibus impeditum. Indicantur v. s. pro re nata repetita, enemata acria, tandem ex fumo tabacii; manu- & pediluvia calidiora, cum frictionibus & reliqua revellentia externa, vesicatoria &c. vapores supra notati inspirandi; fomentum discutiens, emolliens vel linimentum volatile ad pectus; bolus, mixtura ad asthma; sulph. aurat. antimon. potabile, cum aequali portione syrupi croci mixtura & omni 1/2. hora ad cochlearculum unum aut alterum propinatum; extr. aciniti (vide sub cephalalgia serosa) ipecac. vel tartarus emet. in parvis dosibus exhibiti; spirit. salis ammoniaci aceto saturat. adjecta M Pil. de cynogl.; oleum animale, cum naphtha vitrioli, paulillo scillae impraegnata, mixtum, ex infuso calido, copioso folior. hyssopi &c. (vide sub asthma-
te.) Interdum antiphlogistica interponenda. *Ad catarrhi suffocativi speciem* ex destillatione materiae catarrhosae viscidae, acris, per nares internas, laryngem male afficiente; praeter potum calidum, diluentem, demulcentem, diaphoreticum, copiosum, gargarismata & linimentum volatile supra notatum, collo appda.

CATARRHI SUFFOCAT. SPURII ex inflatione summa ventriculi; ex vasorum encephali lenta obstructione; ex polypis &c. &c. curationem vide

vide sub cephalalgia, asthma & tussi convulsiva.

RAUCEDO.

Csæ & M. M. vide sub tussis variis speciebus. Pertinacioris ex glandularum arytenoidearum obstructione oriunda medelam vide sub tuberculis. Valent in primis vapores ex infus. flor. sambuc. &c. inspirati. *Raucitas* & *aphonia periodica* malo hysterico, moliminibus hamorrhoidalibus, vermibus, lascivie medendo, *siphilitica*, *scorbutica*, ex *ulceribus consolidatis* suis propriis medicinis curatur. *Raucitas* & *aphonia* ex *nervo recurrente, dissecto*; *ulceribus profundis, venereis* & *phthisi consummata* enata incurabilis est. *Aphonia* ex congestione s. versus cerebrum curam vide sub apoplexia.

PALPITATIO CORDIS.

Csæ. Vitium cordis ejusque valvularum & corporum cor proxime ambientium, callositas, aneurisma &c. polypi calculi; an vermes? &c. in illis contenti; vitium viscerum remotorum, cerebri, intestinorum, a vermibus, flatibus affectorum. Cfr. Csæ gen. 1, - a - c. 2, a - f. 3, - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - M. M. Pro causarum diversitate admodum diversa est; sape v. s. temperantia, evacuantia, opiata, antihysterica, anthelmintica, nutrientia, revellentia externa locum habent. Quod si vero malum idiopathicum, incurabile est; mitigantia conveniunt; huc refer

anew-

aneurisma cordis & vasorum vicinorum majorum crebrius obveniens, ex gravi pertinacique molestia in præcordiis, cum sensu ponderis & magnæ molis pulsantis & præfocantis quasi, a minimo motu increfcente suspicandum; ab hujus ruptura mors subitanea.

POLYPI CORDIS & VASORUM MAJORUM rarissimus quidem in viventibus morbus. Cæs gener. 1, - b - c - 2, 3, 4, 6, 8, 15, imprimis animi deliquia frequentia aliique morbi fontici prægressi; mœror; spiritus vini abusus. Inter signa fallacia quidem referuntur palpitation cordis frequentissima; pulsus inæqualis, intermittens, debilis; dolor fixus in pectore, præcipue in sinistra parte, gravativus, anxius, titillationis sensus, circa cor in ex- & inspiratione contingens; dispnœa; eorum augmentum ab omni motu & stimulantibus; vasorum colli magnus motus. *M. M.* Cæs prædisponentes & occasionales corrigendæ, morbus palliandus v. s. repetitis; diluentibus, saponaceis, resolventibus — *R.* Pulpæ tamarind. roob. samb. aa. ℥ss. nitri deparati ʒj. m̄s. s. bis de die, mane cum fero lactis, vesperi vero cum paragorico camphorato, per sesquimenfem usurpandum.

LIPOTHYMIA SYNCOPE.

Cæs. Nervi, sive ad originem compressi sive alibi irritati, dolore, odore, gravibus animi perturbationibus &c.; cerebri & cordis morbi; hujus fibrarum laxitas & cavitatum, imprimis auriculæ dextræ dilatatio naturali major; aër cor pr. nat. distendens; polyipi in eo contenti &c. *hydrops*

drops pericardii &c. vide Csas gener. I, - c-d-2, - f-3, 4, 5, - b-c-d-e-f-6, 9, 10, 15. digestio læsa; flatus, idiosyncrasia. Instantem paroxysmum avertunt immersio brachiorum ad cubitum usque in aquam sat calidam, frictione sub aqua simul adhibita; ær frigidior, liberior; potus frigida; situs horizontalis; vestimentorum relaxatio; Elæossum cinamom. spirit. castor. compositus; spiritus æthereus, cum balsamo vitæ mixtus; pilulæ ex asa foetid. castor. camphora mastiche, sale cornu cervi & terebint. conflata; ex infuso fol. salvia, melissæ, rutæ, asperulæ &c. succo citri acidulato; nec non lenis vomitus, faucium titillatione, vel infus. chamom. card. bened. tepidum affatim bibendo &c. excitatus, si nempe inægesta dispepta, venenata, saburra acris, putrida, maligna subesse putentur. Ex præsentī excitant aquæ frigida conspersio in faciem, nucham; inflatio errhinorum; foetida; salia volatilia, spirit. castorei compos. acetum rut. cum aqua anhaltina mixt. sal volat. angl. cepæ dissectæ; pulvis odoratus — R. Ol. still. cinamom. gtts. vj. meliss. rorismar. aa. gtts. iv. sal. vol. sicc. ammoniaci ℞. ssi alb. ℥ss. cinabaris q. s. ad coccineum colorem accurate mista, vasculo vitreo immissa, obturaculo vitreo claudenda, naribus supponenda; titillatio faucium; frictiones lenes, concussiones & abdominis pressionēs; epithemata ex supra notatis, ad tempora, axillas, præcordia, carpos manuum; clysteres antihysterici, denique acres ex fumo tabaci; sinapismi; cucurbitulæ; inflatio aëris in os, ope tubuli; immersio brachiorum in aquam calidam.

Post

Post paroxysmum analeptita, vinum generosum aromaticum; elixir nervinum; juscula consummata; gelatinæ aromate condita & remedia, quæ varius morbi fomes, cacochymia varia; exanthemata retropulsa; vermes; digestio lasa; flatu; dolores; inanitio; antipathia; animi pathemata; malum hystericum &c. exigit. In lipothymiis, ex hæmorrhagiis, abortu enatis & plethoricarum, absint excitantia, acria, calida. Eadem fere ratione suffocatis, per vaporem carbonum, fodinarum metallicarum, latrinarum, sepulchrorum, puteorum, liquidi fermentantis &c. &c. succurritur; simul v. f. in aëre libero instituenda & lavatione frigida ex oxycrato, epithemata ad caput & pectus & enemata ex eodem adhibenda; *aqua submersi* vero stragulis calidis, vel arena, cineribus calefactis obtegendi & *congelati* nive fricandi sunt. Sub syncope defuncti, inprimis hystericæ, tardius sepulturæ tradendi. Exploranda prius vita minima superstes per excitantia supra designata & fortiora, e. gr. per ferramentum candens plantis adptum, nec non per carptæ lanæ flocculum, cerei flammulam, nitidum speculum ad os naresque admota; per poculum aquæ, variis pectoris locis impositum; per repetitas pulsus explorationes, manum digitosque, ad cordis regionem, arterias carotides colli & illiacas adfemora descendentes, attente appdo & per v. f.

OESOPHAGI MORBI.

INFLAMMATIO, AMBUSTIO, EXCORIATIO, ARDOR, DOLOR, quibus cremor lactis vel R. syrup. papav.

papav. alb. cremor. lactis aa. ℥j. vitell. ovor.
 Nro. 2. aquæ rosar. ℥ij. ms. f. linctus, vel lo-
 och mucilaginosum in ore tenenda & pedeten-
 tim deglutienda, vaporesque emollientes me-
 dentur.

SPASMI incautis anginam imponentes, pha-
 ryingem occupantes, unde deglutitio impedita;
 linguæ, colli rigiditas; suffocatio, sensusque palii
 infixi: vel inferiorem partem gulæ afficientes,
 unde deglutorum quidem progressus impeditus,
 maxime circa cardiacam, eorum & pituitæ rejectio,
 cum nausea & tussi & dolore inter scapulas.

Csæ. Mobilitas nervorum hypochondriaciis
 & hystericiis, animi affectibus agitatis, familia-
 ris; faburra ventriculi; ejus vasorum infarctus;
 vermes; refrigeratio; fluxus sanguinis suppressi;
 læsio nervorum colli &c. *M. M.* varia, pro
 causarum indole. Cathartica, ex elect. de man-
 na; clysmata antihysterica, opiata, carminativa;
 emulsio, ex ol. amygd. fyr. de alth. bals. peruv.
 vitell. ovi & aqua chamom. ppta &c. &c. Epi-
 themata ex herb. aromaticis, theriaca, oleo macis
 & spir. vin. camphor. ppta, pectori & spinæ dor-
 si; cucubitæ nuchæ; empl. oxycroc. cum galb.
 & ol. succin. mixt. plantis ped. imposita; frictio-
 nes; vesicatoria; pediluvia. Jungenda sæpe v. s.
 Profuerunt aliquoties eff. Galb. Bernh. micæ pa-
 nis instillata in ore detenta & paulatim deglutita,
 præmissis clysmate ex solutione asæ foetid. nec
 non pulvis scolopendr. vulg. ad ℥j. cum camph.
 gr. x. conserva melissæ exceptus.

DEGLUITIO IMPEDITA AB ATONIA PARALY-
 TICA ŒSOPHAGI quoad vires exhaustis senibusque
 familiaris. *M. M.* vide sub paralyfi.

E

ANGU-

ANGUSTIONES œSOPHAGI per tumorem, intruso stilo flexili, cui spongia alligata, detegendum; per steatoma, scirrhos, fungos, aneurisma, pinguedinem, frequentissime vero, ob glandularum œsophagi & vicinarum partium obstructionem, earumque exulcerationem, medellam vide sub gland. meseraic. obstructione, tuberculis & asthma, a tumore colli. Quomodo œsophagus, a corporibus heterogeneis, sive figura acuta ipsi infixis, sive mole impactis, liberandus sit, vide Heisterum, acta Edinburg. & Tissot. avis au peuple. Huc pertinet quoque tumor colli singularis ex vitio ventriculi enatus; cujus pressionem borborygmi ad stomachum descendentes & ructus subsequuntur; nec non appendicum ossis hyoidis luxatio, deglutitionem boli majoris insequens, contrectatione repetita ossis curanda; non minus prolapsus uvulæ, cujus apici pulv. alum. aliquoties admovendus est. Quibus deglutitio plane impedita est, enemata nutrientia ex lacte cum surfuribus cocto, nec non gelatinosa crebro injicienda & nonnunquam alimenta instrumenti chirurgici ope in ventriculum compellenda.

ABDOMINIS MORBI.

Digestio lesa.

Csæ I) cruditates acidæ, alkalescentes, puitosæ in ventriculo & duodeno, potissimum hospitantes. M. M. cruditates suis propriis remediis cicurandæ, diluendæ, incidendæ, earum acrimonia demulcentibus copiosis involvenda; & purgantibus, sæpius vomitoriis eliminandæ, superingesto tunc potu tepido, tam largo, donec liqui-

liquidum plane inspidum rejiciatur; ingesta, variis cruditatibus lenocinantia, evitanda & ventriculus roborandus.

In specie *cruditatibus acidis* (unde sapor similis, voracitas, stupor dentium, pallor faciei, rejectorum color viridis, niger, odor acidus, stranguria) medentur, vomitorium. ℞. Tartari emet. a granis ij, ad grana v. solve in aquæ ℥xij. sumatur tertia vel quarta pars omni quadrante horæ, usque vomitus succedat, vel ℞. pulv. rad. ipecac. ℥iſſ. cort. aurant. ℥ij. crem. tart. ℥ſſ. ebulliant cum aquæ font. ℥iv. colaturæ adde oxymell. scill. ℥ſſ. D. cochleatim; acidulæ Sedlizenses; decoctum quass. foliis senn. infusum; magnesia ex sale amaro præcipitata & calcinata; pulveres absorbentes; aqua calcis, stomachicis amaris alterata. ℞. Corall. rubr. margarit. ppt. vel magnesiæ aa. ℥ij. N. M. ℥ſſ. sapon. venet. extr. rad. quassæ, enulæ aa. ℥i. bals. peruv. q. s. ut f. trochisci pisi magnitudinis. Elix. aperit. Claud. gtts xl. pilul. ex sapon. v. & MPilul. viscerali conflata; Æthiops martialis cum pulv. rhei mixtus; amara, inprimis rad. quassæ pro potu; acidulæ Fachingenses; decoct. cornu cervi, cui lixivium salis tart. instillari potest. Pro alimento, animalia, juscula carnis, cum vitello ovorum, pisces, carnes teneræ assæ. Nonnunquam obstructioni pancreatis & glandularum mesenterii, medendum. Quod si simul pituita peccat, cepæ, sinapi, raphanus rust. &c. sub cibis adhibenda. Huc pertinet fermentatio magna, in ventriculo, a comestis fructibus horæis facta; spiritu sulphuris per campanam vel absorbentibus copiosis sedanda.

CRUDITATIBUS ALKALESCENTIBUS, BILIOSIS, OLEOSO - RANCIDIS, PUTRIDIS (unde oris amaror, siccitas; ructus olidi, fauces exurentes; sitis; nausea summa; vomitus; alvini fluxus biliosus; foetidi; urina acris flammea, foetida; cephalalgia &c.) lene emeticum, — elect. tartarificatum — R. Crem. tart. subtiliss. pulverisat. sri albi, panis biscoct. sriati aa. ℥℔. cribratis omnibus adde spirit. vitriol. gtts. viij. syr. rosar. solut. q. s. ut f. electuarium — vel R. Conserv. acetos. ℥j. pulp. tamarind. ℥℔. spirit. vitriol. q. s. ad gratum acorem, syrup. berber. q. s. ad electuar. consistentiam; rheum; cassia; elix. acid. Dippelii, Halleri, vitrioli Myns. pulvis Fulleri. R. Cremor. tartar. ℥v. flor. balaustr. ℥j. spirit. vitrioli gtts. vj. ms. serum lactis ope acetosellæ pptum, frigide & copiose exhibitum; nitrum cum stro mixtum; victus mere vegetabilis, fructus horæi, præparata hordei, oryzæ &c. vide reliqua, quoad diagnosin sub cephalalgia biliosa & quoad curam sub cephalalgia sanguinea. *Cruditatibus vero ex abusu absorbentium terrestrium enatis, acida diu & tandem emeticum opponenda.*

CRUDITATIBUS PITUITOSIS, GLUTINOSIS ex temperie pituitosa; lingua glutinosa, substantia alba, lardum referente, obducta; sensu materiæ tenacis fauces obsidentis; appetitu dejecto; alvo tarda; ex effectu leni, aut nullo catharticozum fat efficacium; urina tenui, limpida & inprimis ex rejecta materia peccante cognoscendis; scilla ppta, pulveres ex sale med. rad. ari. scilla & elaeostro cinamom. vel stomach. Birkmanni; saponis; aqua calcis, stomachicis incidentibus, radice seneg. rub. tinct. enulæ, pimp. alb. herb. marnu-

marnubii alb. hyfopi alterata & ejusmodi clysteres opponenda; his præmissis, ad vomitoria, purgantia, inter quæ mixtura antihypochondriaca, omni bihorio-trihorio ad gtt̄s 50-58. exhibita, præstat, & denique ad usum gummi gutt. quod bis, ter de die a granis v. ad x. cum manna propinatur, deveniendum. Hac methodo quandoque sat diu continuandum est, ob pituitæ, in canali alimentari ejusque cryptis, immo profundius latentis incredibilem copiam, ob ejus tenacitatem summam & ob incognitam dispositionem pituitam, & in ipso sanguine generandi. Nonnunquam reliquæ cruditates, pituitæ implicitæ sunt, acre illud viscidum ingenerantes, unde non tam aperte quidem, sed eo pertinacius vexant, & multum negotii faciunt. Hypochondriacus, alvi obstipationi &c. obnoxius, enematis visceralibus, bis de die, diutius adhibitis & interpositis salibus digestivis, quandoque mixtura antihypochondriaca Hallensi, mucum stupenda copia & cum illo lapillos forma & colore calculis felleis simillimos, sed re accuratius examinata, ex sacharo, quod æger in deliciis habuit, & pituita conflatos, cum euphoria ano ejecit.

2) FIBRARUM VENTRICULI NIMIA LAXITAS, juncta nonnunquam sensibilitate nimia, cruditatibus lenocinans & ex iisdem oriunda, nec non ex ventriculi repletionem ad crepaturam usque; ex Csis gener. 1, 2, - b - c - e - f - 3, 4, & præcipue 10, in specie ex dysenteria graviori prægressa, vel cohibita; ex abusu potus tepidi, veneris, mastupratione in prima juventute exercita; mercurio male adhibito; catharticis; venæsectionibus, opiatibus & relaxantibus crebro usurpatis.

Sanatur evitando, corrigendo & eliminando
 Csas & roborando nervos in genere & stomachum in specie. Quod præstant præter supra notata, pilulæ viscerales N. cum extr. aloes; tinctura rhei Darelij cum extr. menth. spirituoso; liquore terræ fol. tartari mixta, aqua menth. cinamomi diluta; mars solubilis cum æquali portione pulveris rhei mixtus & ad ℥ss. — ℥ij. exhibitus; elixir. proprietatis, aperit. claud. stomach. vien. Hoffmanni, cum aqua carminat. & bals. vitæ combinat. elixir. Rob. Whytt. — ℞. Cort. peruv. el. ℥iv. rad. gent. r. flav. cort. aurant. aa. ℥iſs spir. vin. gall. ℥iv. digere per sex dies, balneo arenæ, cola. — ℞. Herb. menth. piperit. card. bened. aa. ℥iſs. asperula cum floribus ℥ss. flav. cort. citri flor. cassiæ cinamomæ aa. ℥ij. incisus infunde aquæ destill. nerv. ℥ij. stent in maceratione frigida, per 12. horas, agitando sæpe vitrum; colaturæ ℥ij. exhibe, ante epulas. — Vina medicata, ex rad. gent. rubr. enul. zedoar. galang. cort. aurant. peruv. Winteran. cascarill. ligno lentisci herb. menth. piperit. card. bened. cent. sem. fœnic. adjecto tartaro solub. cum vino generos. frigide infusus, sub epulis ad ℥iij. sumenda. elect. diateffaron; rotulæ & morsuli stomach. Gaubii; mars solub. cum elaeoffro cinamomi mixtus; acidulæ mineral. martiales, pulvis roborans — ℞. Extr. cort. peruv. cascarill. aa. ℥ss. vitrioli martis factitii gr. viij. elaeoffri cinamom. ℥ij. ms. divide in viij. partes — Elix. nervinum; myrrh. selectæ, cinamomi, cort. peruv. rhei frustula crebro masticata & deglutita. Pro potu decoct. cassiæ lign.

lign. cort. aurant. citri rec. mastichis &c. chalybeatum; vina meraca, oleosa, malvaticum, hungaricum, de mallaca, pontak &c. pro alimento cibi eupepti, zinzibere, pipere, N. M. panis biscoctus, semine foeniculi, carvi, anisi conditi; loco potus theæ, mane jentaculum hypochondriacis ordinatum & post prandium potus bischopp. externe epithemata nervina, infuso vinoso, herb. menth. piperit. card. bened. flor. cassiæ cinamomeæ; aurantior. virid. sem. carvi contus. imbuta, frigide abdomini appda; empl. stomach. — R. Ladani mollis ℥i℥, thuris ℥℥. cinamomi. ol. nucist. express. aa. ℥ij. olei essent. menth. bals. tolut. aa. ℥j. ms. scrobiculo cordis & costis sinistris, infimis imponendum. Cataplasma theriacale; — R. Theriac. andr. ℥ij. balsam. nucist. ℥i. peruv. vel tolut. ℥℥. mista, extensa ad alutam exhibe forma emplastri; ungtum ad atrophiam; frictiones aromaticæ; balnea frigida; motus corporis; perspiratio aucta, per motum corporis, equitationem &c. interdum jejunia & auxilia moralia, medicamentis præferenda sunt. Reliqua vide sub malo hypochondriaco.

3) FIBRARUM VENTRICULI SENSILITAS, IRRITABILITAS nimia ex Csa gener. 10, b. siti, siccitate, calore, febricula stipata, venæ Snem; saponacea acida, roob Ribes. &c. elect. tartarif. pulpam cassiæ; infus. malthæ hordei, decoct. hord. cum succo citri; serum lactis cum acetosella pptum & herba agrimonie, melissæ & asperule alteratum, in progressu chalybeatum; aquam frigidam, tinct. ros. vel oleo vitrioli cum æquali portione spir. vini rectificatiss. edulcorato, acidulatam; dietam magis vegetabilem; enemata; balnea

nea tepida exigit. Si denique amara, elix. stomach. vien. &c. locum habent, ea cum acidis min. elixirio acido Dipp. combinanda sunt.

Senibus vero phlegmaticis, qui longo abusu spiritus vini rigiditatem fibrarum contraxerunt, usus spiritus adusti paulatim interdicens & ejus loco vini generosi modicus usus, cum condito zinzib. theriaca androm. diatesaron & spir. aperit. penot. permittendus, externe vero nunquam exulcerationes artificiales procurandæ. Huc pertinet digestio lasa ex cerebri vitiis, cuius diagnofin & curam vide sub cephalalgia.

4) LIQUORES DIGESTIVI INERTIA, DEFECTU, COPIA, SPISSITUDINE ET ACRIMONIA PECCANTES. M. M. viscerum abdominis, præcipue hepatis, pancreatis, glandularum meseraicarum vitis & humorum cacochymia varia succurendum; bilis defectus amaris supplendus, ejus fervori vero remediis sub 3, notatis consulendum. Sputatores salivam deglutiant. Profuit, acrimoniam cicurando R. Pulv. cort. fassafraf. ʒß. ol. still. fassafraf. gttm. i. ms. f. pulv. D. ante prandium & cœnam unus. Citam quoque opem tulit, in malo rebelli cacochymico, vesicatorium dorso impostum, incredibilem feri acerrimi copiam educendo & exanthemata livida, copiosa provocando.

5) LÆSIO NERVORUM PARTIUM REMOTARUM chirurgiam exposcit.

SODA sanatur cruditatibus acidis, alkalescentibus, acrimonia liquorum digestivorum, ventriculi atonia medendo. Sodæ gravioris febricula, dolore fixo potissimum circa præcordia, anxietate
summa

jungendus. Mera mechanica, acus ferrea, euprea &c. deglutita, aceti usum diuturniorem exposcunt. *Vomitus a carnibus, ovis putridis, barbi, lucii ovulis & similibus deglutitis, præmisso antiemetico river. potu tepido, copiosissimo & clysmate, acida exigit.*

3) A SERO ACRI RETENTO, RETROACTO M. M. vide sub cephalalgia serosa. Huc pertinet *vomitus, a diarrhæa suppressa, ortus, mixtura Riverii & clysteribus emollientibus, eccoproticis curandus.*

4) A PLETHORA VASORUM VENTRICULI, VEL EORUM INFARCTU, atrabiliaris, hæmorrhoidariis & gravidis potissimum familiaris. Cæs gener. 4, - b - c - d - & I, - b - M. M. vide sub vomitu cruento. Eadem fere adhibenda est in *vomitu admodum dolente.*

5) AB INFLAMMATIONE INCIPIENTE VENTRICULI, post sumta acria; venena, potum frigidum, corpore exæstuante; post iram emetico tractatam; serum acre repulsum oriunda, ex doloris exacerbatione in ipso momento, quo aliquid ingeritur; singultu dolorifico; anxietate summa & febre suspicanda; pulsu vero non semper exploranda.

6) VOMITUS AB IRRITABILITATE NIMIA FIBRARUM VENTRICULI, VEL VOMITUS SINE MATERIA a levissima causa, imaginatione depravata, vel ex idea rei, quæ nauseam & vomitum sæpe excitavit proritatus, imanis quidem, hysteris, hypochondriacis & debilibus, ex causa gener. 10, familiaris, moribus hysteris, urina pallida, vertigine, borborygmis, ructibus, flatibus inodoris,

ris; copiosis stipatus, compefcitur aqua frigida acidulata; infuso malthæ hordei; austeris; anodinis; quiete; clysmatibus, primo revellentibus, postea cum theriaca pptis; antiemetico Riverii, ex sale absynth. fumo sulphuris non expositi ℞ j. & succi limon. cochl. i. ppto sub actu effervescentiæ fumendo vel ℞ aquæ menth. aut theriac. compos. ℞iij. vini generos. rhenan. ℞i℞. succi citri rec. ℞℞. falis absynth. ℞℞. syrup. cort. aurant. q. s. ad gratiam, adjectis pro re nata aliquot guttulis laud. liquid. ms. D. pro aliquot haustulis — vel ℞. Infusi semivinosi meraci flor. calcatripp. ℞ i. succi limon. ℞i℞. falis absynth. ℞j. ms. D. per vices, interpositis liquore anod. min. Hoffm. elaeosiro menth. instillato, ex infuso frigido specier. nervin. cum syrup. citri mixto & frictionibus pedum & abdominis; tandem opio in forma pilulari. Externe cataplasmate theriacali vel ex pane, aut ejus fermento, vino generos. aceto, spir. vin. camphorato, herb. menth. rec. contusa, vel pulvere aromatico composito. Postea roborantia conveniunt, decoctum quasii, cort. peruv. cascarill. &c. elixirio acido Dipp. acidulatum (vide digestionem læsam Nro. 2.)

7) EX ANIMI PATHEMATIBUS, SYMPATHETICUS & QUILIBET VEHEMENS INANIS VOMITUS eadem medela, mutatis mutandis, mitigatur. Consulendum simul morbo principi, hernicæ incarcerationæ; obstructioni alvi, a scybalis; ileo; colicæ, stricturæ ductuum biliariorum; viscerum, præcipue pancreatis, hepatis & lienis obstructioni, tumori, inflammationi; cephalalgicæ; ischuricæ, capitis, diaphragmatis &c. vulneribus, contusionibus, ulce-

ulceribus, &c. confer *M. M.* sub colica, ileo &c.

8) A CARTILAGINE ENSIFORMI INTROPRESA. Cartilago, thorace in genua reflexo, aut digitis, aut cucurbitis coecis educenda: a *costæ luxatione aut stomachi hernia* ejus repositione.

9) A REFRIGERATIONE, alexipharmacis; opiatis; epithematibus; balneis nervinis & appositis lateribus calidis, plantis pedum sanandus.

10) A CALLO, SCIRRHO &c. *ventriculi, cardiae, pylori* (cujus speciei suspicionem dant cardialgiae pertinaces, crebriores, sub actu digestionis evenientes; pondus loci; moderamen dolorum, a fortiori ventriculi compressione; tactus, & prægressa) diæta molli, tenui palliandus.

11) A CARBONUM FUMO, acidis, aceti vapore sanandus, vide reliqua sub cephalalgia a narcoticis.

12) A VECTIONE in curru vel navi præcavetur pilula opiata, ex aqua cinamom. aut haustu vin. gallici rubri, aut tinctura martis aromatica, externe epithemate nervino.

VOMITUS HABITUALIS, usu emetici, minimis dosibus, crebro exhibitis, pulveris *N. M.* parum tostæ, & glandis querni ex vitello ovi; aqua menth. diluto; nec non rad. colomb. & extr. cicutæ &c. *Periodicus vomitus* fluxu hæmorrhoidum non raro curatus est.

SINGULTUS.

A plerisque vomitus causis enascitur eademque *M. M.* curatur, a cruditatibus nempe variis

riis; vermibus; venenis; drastis & insequente
 crustæ villosæ denudatione; a causa 3tia 4, 5, 6,
 7, 8, 9, & 10ma. Ad singultum, ab anomalia
 motuum; præter remedia, sub sexta specie vomit-
 us recensita, laudantur, julapium moschatum;
 bolus & essentia antihysterici; præparata, ex rad.
 galang. ol. amygd. cum aliquot gutt. ol. destill.
 anethi & oleum essent. absynth. cajeput. animal.
 Dippel. sro instillata; carminativa cum opio; clysm-
 mata, nec non constrictiones abdominis per vin-
 cula; cataplasma theriacale ad digestionem læsam;
 cucurbitæ; inspiratio profundior; sternutatio. *Se-
 num singultus, post diarrhæas, aut vomitiones
 poscit anodina & enaleptica.*

CARDIALGIA.

M. M. ex cognitis vomitus causis 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 9 & 10. petenda. Profuerunt quoque,
 cicuratis nempe & eliminatis cruditatibus, per
 cathartica, sub colica recensita, oleum cajeput.
 vel ol. essent. chamom. menth. animal. Dipp. in
 spir. æther. soluta, admixto spirit. salis ammo-
 niaci dulci vel cornu cervi succinato; thea viri-
 dis ut masticatorium; bolus ꝛ. mosch. gr. viij. asæ-
 fœtid. gr. v. camphor. mucilage gummi arab.
 subact. gr. ij, extr. menth. spirituosû ꝑ ꝑ. sy-
 rupo croci q. s. ex aqua nervina sumendus; ef-
 sent. antihysterica; clysmata, ex speciebus ner-
 vinis, adjectis capitibus papav. & oleo lini ꝛ.
 lapid. cancr. ꝑ. ol. destill. menth. cum sri ꝑij
 in elæoffrum redacti gutts x. spirit. salis ammonia-
 ci anisati ꝑij. laud. liquid. ꝑ. syrup. menth. ꝑj.
 aqua menth. ꝑvii. ꝛs. D. omni bihorio aut tri-
 horio

horio cochl. ij. vel elix. nervin. vel electuarium
 ℞. extr. cort. peruv. ℥ss. menth. spirituosi
 myrrh. aa. ℥ij. camphoræ pauxillo gummi tra-
 gacanthi subactæ ℥ss. extr. glyzyrrh. ℥ij. mucil-
 lag. sem. cyd. q. s. ut f. electuar. D. sexies de
 die frustulum N. M. magnitudinis.

AD CARDIALGIAM, ex causis 2, 3, 4, miti-
 gandam. ℞. Spec. nervin. recent. mj. lumbr.
 terrestr. rec. Nro. 30. ol. amygd. d. rec. ℥ss.
 vini generosi ℥viii. ms. coque ad vini consum-
 tionem colaturæ cum forti expressione factæ ad-
 de bals. tolut. ℥ss. D. ℥j. ex jusculo. Externe
 suadenda sunt cataplasmata emollientia, inter-
 dum rubefacientia; linimentum ex ol. hyoscia-
 mi ℥ij. ol. essent. menth. gttss viij. & spirit. salis
 ammoniaci urinosi q. s. pptum; emplastrum. ℞.
 Empl. de labdano vel diabol. ℥ijss. camph. opii
 aa. ℥ss. - j bals. peruv. q. s. ut f. empl. scro-
 biculo cordis & costis inferioribus, sinistris, dor-
 sum versus imponendum, diu gerendum; balnea.
 Simul victus curiosior & quies, instante paroxys-
 mo, postea exercitatio imperandi. Evitandæ cau-
 sæ occasionales, inprimis spirituum adustorum
 abusus. *Cardialgia* & *colicæ ab obstructione*
calculosa choledochi & ureterum, curam vide
 sub ictero & nephritide; *verminosæ* vide sub mor-
 bis infantum. *In cardialgia hysterica, spasti-*
ca, sæpe icterum transitorium causante, sequens
 formula semper probati usus fuit. — ℞. Camph.
 gr. x. mucilag. gummi arab. q. s. asæ foet. ℥ss.
 extr. lumbr. terr. ℥j. ol. destill. menth. gttss.
 vj. ms. f. pilul. gr. j. pond. D. omni trihorio
 Nro.

Nro. 4. -- 6. Exasperatur sæpe cardialgia vel minima dosi spirituosorum, pulverulentorum & salinorum.

COLICA.

Csæ sub digestionem læsa & vomitu maximam partem enarrata sunt.

M. M. gener. clysmata emollientia, cum nitro & melle, vel electuario lenitivo; aut ex ferro lactis cum floribus chamom. & cremore tartari; cathartica blanda, pulpa cassiæ, cum electuario de manna mixta, vel emulsio ex ol. amygd. syrup. dialth. aa. ℥j. camph. ℥j mucilag. gummi arab. q. s. mannæ, pulp. cassiæ aa. ℥j. liq. terræ fol. tartari ℥ij. & infus. spec. nerv. ℥xij. parata, crebro, ad cochl. ij. sumenda; tinctura rhei Darelîi cum mixtura Riverii, liquore anod. min. & aliquot gtts laudani liq. mixta; acidula Sedlizenses, cum vel sine lacte pro sordium accumulatione diutius usurpanda. Pro potu infus. meracum rad. liquiritiæ cum pauxillo sem. anisi; emulsiones, decoct. avenæ, cum fol. alth. flor. chamom. samb. femine cydon. lini, tamarindinatum, large sumenda. Externe cataplasmata emollientia, fofus: ℞. Flor. chamom. roman. melilot. aa. mj. bacc. lauri. fem. carvi, lini, foenu græc. capit. papav. alb. aa. ℥j. coque ex lactis q. s. per 1/4 horæ colaturæ fortiter expressæ ℥b iv. admisce saponis venet. ℥ss. croci pulv. ℥ij. f. pannus laneus hoc liquore bene imbutus, mox expressus imponatur universo ventri ac quovis bihorio renovetur: Super adplicetur vesica

vesica suilla, oleo humectata; ungt. alth. cum camphora in ess. galb. solut. & pauxillo olei chamom. essent. &c. epithema ex infus. spec. nervinar. saturatissimo, cum spiritu salis ammoniaci mixto; Infusus vaporosi; pediluvia; balnea; epispastica ad pedes; vesicatoria; alvo nihilominus pertinaciter clausæ, enema ex juseculo pingui cum infusi croci metallor. ℥ij. vel ex foliis aut fumo tabaci aptur. Dolor immanis, denique opium, præcipue in clysteribus; plethora vero & instans inflammatio, quæ nonnunquam pertimescenda est, v. s. repetitam & reliquam *M. M.* antiphlogisticam exigit. Superato dolore, tonica conducunt. Cfr. *M. M.* digestionis læsæ & cardialgiæ.

M. M. SPECIALIS COLICÆ FLATULENTÆ ex ingestis fermentantibus, flatulentis, post evacuationia rhabarbarina; remedia carminativa blandâ; infus. specier. nervin. elixir nervinum. Externe spirituosa.

COLICÆ BILIOSÆ, PITUITOSÆ, AB ACIDO diagnofin & medelam vide sub cruditatibus & cephalalgia biliosa.

AD COLICAM PITUITOSAM ex pituita vitrea, dolorem contumacem, gravativum, pali infixi speciem referentem, præ aliis emulsiõ gummi ammoniaci laudatur, junctis clysteribus viscerabilibus.

COLICÆ a VENENIS DRASTICIS & INDE ABRASO MUCO, resina jalappæ &c. & ab acubus &c. deglutitis. *M. M.* vide sub vomitu & cardialgia.

Coli-

COLICÆ SPASMODICÆ a SERO ACRI ARTHRI-
TICO SCORBUTICO &c. *retento, retroaſto.* M. M.
vide ſub cephalalgia ſeroſa & colica ſaturnina.
Præter clysmata, fomenta balneaque mollia, non-
nunquam v. ſ. adhibenda. Conferunt quoque
flores ſulphuris, cum ſyrup. diacod. mixti, ex in-
fuſo chamomill.

COLICA VERMINOSA ex dolore fugaci magis,
rodente, pungente, & a loco in locum ſerpente,
dejectionibus alvinis grifaceis nocturnis, junctis
reliquis ſub vermibus notatis ſignis arguenda,
interdum lene vomitorium; cathartica, clys-
mata oleoſa; ſuccum limon. cum ol. amygd. de-
coct. rad. gram. flor. chamom. cum mercurio
vivo infuſum & cum manna & ſyrupo perſicor.
mixtum; externe petrol. &c. exigit.

COLICA AB ANOMALIA MENSIVM, HÆMOR-
RHOIDUM v. Snem, diluentia, demulcentia, e-
mulſiones nitratas, lac ebutyratum, cataplasma-
ta, clysmata mannata & fomenta oleoſa, vide
cardialgiam ſpasmoticam & catamenia dolori-
fica.

COLICÆ a FIBRARUM LAXITATE, *ſenſibilitate*,
ex leviffima cauſa recurrentis medelam vide
ſub digeſt. læſa. Valent inprimis infuſ. cort.
peruv. cum ſpecieb. nervin. pptum (vide malum
hypochondriacum) adjecto extracto menthæ ſpi-
rituoſo, liquore anod. min. vel ſpiritu nervino;
epithemata ſpirituoſa. Vehemens inde *enata cõ-*
lica ſpasmotica vel ſine materia opiatis miti-
ganda (vide ſymptomata hystericæ).

COLICA CHRONICA, a ſanguinis ſtagnatio-
ne; glandularum tumore; ſcirrho; cancro
F aliis-

aliisque intestinorum & viscerum vicinorum vitiis diæta blanda, tenui, lactea pallianda & morbo principi consulendum.

COLICÆ CONSENSUALI a calculo renum, felæo moto &c. M. M. vide suo loco.

COLICA SATURNINA, PICTONUM doloribus atrocibus abdominis, ad lumbos & dorsum serpentes; alvi obstipatione pertinaci; scybalorum durorum, stercorei caprino similibus excretionibus; ventris retractione spasmodica & artuum semiparalyti incedens; a vini lithargyrio fucati, aquæ, alimentorum, in vasis stanno obductis, cupreis, plumbeis, diu servatorum; vini pomacei, in ejusmodi vasis ppter & medicaminum saturninorum usum; fumis saturninis, arsenicalibus deglutitis; hinc metallurgis, pictoribus, figulis & futoribus corium metalla fusis dealbantibus, familiaris; sæpius ab ingluvie acidorum; a miasmate arthritico, scorbutico, febricoso intus retento, vel repulso oriunda, sanatur enematis; cathartice lenientibus, sub methodo generali descriptis; potissimum emulsione ex ol. amygd. dulc. & interdum vomitorio leni, mucum tenacem eliminante; potu demulcente, emolliente, copioso; mucilaginoso; emulsionibus, sæpe camphoratis; butyro cacao; Pilulis seq. ℞. Petrolei veri ℥j. castorei q. s. ut f. pilul. gr. iij. D. omni trihorio pilulæ tres, subjunctis semper remediis visceralibus, extr. tarax. &c. pilulis visceralibus N. & clysteribus quotidianis. Tandem aluminis usus tentandus. — ℞. Aluminis, ssi vel gummi arab. aa. ʒß. -- .i ms. D. ter de die. Externe cataplasmatibus emollientibus; fomentis oleosis; balneis copiosis, nonnunquam vesicatoriis

riis & post v. s. quandoque opiatis (vide arthritidem anomalam & cephalalgiam serosam). Eandem fere *M. M.* exposcit *colica ab hernia, plus minus incarcerata*. Simul prolapsus, præmissio clysmate, ex decoct. spec. emoll. & pulv. scill. ℥j. parato, cataplasmate cum aqua vegeto-minerali ppto vel fomentatione frigida ex aceti opt. ℥i. nitri ℥j. salis ammoniaci crudi ℥ij. & aquæ font. ℥x. conflata, sufficienter, fofus, leni, indefessa sensimque aucta pressione, reponendus, vel ad herniotoniam deveniendum. In gangrænam tendenti eff. Galb. Bernh. &c. adplda.

ILEUS

A plerisque, supra & sub alvi obstipatione recensitis causis, crebrius ex hernia, ex ingestis siccis, constringentibus, in crassantibus, saturninis aliisque venenatis; a vermibus, invaginationem excitantibus; scybalis induratis, accumulatis enascitur. Adhibenda *M. M.* general. colicæ. Vomitus antiemetico Riverii, denique pilula opiata cohibendus, tum alvus aperienda cathartici, emollientibus, adjecto interdum sale glaub. &c. Oleo lini recenter expresso, ad ℥viii, cum cerevisia calida, ea quidem lege adhibendo, ut omni hora & post alvi laxitatem, omni bihorio cochl. i. deglutiatur & enematibus (in decocto flor. malvæ, chamom. melilot & fol. atriplicis rec. infunde, per bihorium fol. rutæ rec. mj. in colatur. ℥i℥. dissolve salis ammoniaci ℥℥. adde ol. nucum & mellis mercurial. aa. ℥ij. divide in duo clysmata, intra bihor. injicienda) vel ex jusculo

sculo pingui cum infuso croci metall. denique ex fumo tabaci pptis. Quibus opiata, potus demulcens copiosus, balnea emollientia & reliqua externa subjungenda. Inflammatio v. Sine avertenda. Causarum diversitas vero aliqualem hujus methodi mutationem facit.

ILEUS a TUMORE, SCIBRHO, &c. intestina angustante, comprimente vix sanabilis; *ex spasmodis vero hysteriis* curationem colicæ spasmodicæ exigit. Ileus pertinax, in hysterica, vomitu stercoreo, prolapsu uteri, ob tumorem abdominis, fere inflammatorium, haud reponendo aliisque symptomatibus pessimis stipatus, quibusvis optimis, in- & externis incassum tentatis, tandem pilulis ex asa foetid. camphora &c. (vide sub cardialgia) parvis, sed saepe repetitis dosibus exhibitis, alvum brevi laxantibus, curatus fuit.

ALVINI FLUXUS.

Csas diarrhoeæ, vide sub digestionem læsa N. 1. & 2. quo referenda, ingesta fermentantia, irritantia, venenata, mercurialia; vermes; transpiratio suppressa; adeps fusus, nec non sanguis aquosior; viscerum vitia; cacochymia varia cfr. Csas gener. 4 & 9. unde diarrhoea arthritica, scorbutica, venerea &c.

M. M. generalis. Diarrhoea, fordes viscidas, in intestinorum plicis diu & pertinaciter hærentes; humores cacochymicos varios, luxuriantes, versus intestina delatos, vel critice huc determinatos eliminans & vices lochiorum, fluoris albi, hæmorrhoidum, mensium, febrium intermitt. recidivarum, suppressarum, cum euphoria supplens,

hinc

hinc a morbis fonticis, inprimis capitis præfer-
vans, eosdemque fanans, non cohibenda, quam-
diu præternaturalia, biliosa, æruginosa, nigra, pi-
tuitosa, admodum fœtida, purulenda &c. egerun-
tur, febris abest atque appetitus viresque vigent;
sed potius artis adminiculis, vomitoriis, cathartici
lenibus; potu blando, acre diluente, involente,
copioso; sero lactis; decocto oryzæ &c. enemati-
bus emollientibus & remediis, conatus irritos,
spasmos, dolores sedantibus, facilitanda, promo-
venda; denique cruditatibus expurgatis & debili-
tate torminibusque urgentibus, a lenientibus, ro-
borantibus, ad opiata, adstringentia devenien-
dum. Quo spectant, rad. ipecac. tartari emetici
solutio, rhei ppta &c. juncto interdum sale am-
mon. interpositis diluentibus, demulcentibus,
mucilage gummi arabici, sem. cydon. emulsio-
ne cum gummi arab. ppta. decocto furfur. le-
niter tostorum, cum fol. malva, flor. chamom.
&c. clysteribus similibus. Subjuncto vesperi
opiato. Porro nux moschat. cassia lignea; cina-
mom. cort. cascarill. peruv. gummi mastich.
sulphur crudum; rhabarbarum tostum cum tan-
tillo opi; lysimachia; simaruba; serum lactis
aluminatum Mülleri (vide hæmorrhag.) ℞. Tin-
ctura rhei ℥ij — iij. salis mir. glaub. ℥ij. — ℥℞,
mucil. gummi arab. ℥ij — iij. laudan. liq. Sy-
denh. gtts. iij — viij. aquæ millefol. chamom.
menth. aa. ℥j ms. D. per vices, experti usus
formula, cui interdum subjunge sequentes —
℞. Extr. cort. peruv. ℥iij. cascarill. ℥j. ligni
campech. glyzirrh. aa. ℥ij. mucilag. sem. cydon.
q. s. ut f. elect. D. bis quater de die ℥j. vel ℞.

terræ japon. ℥ij. decoct. quass. ℥. i. coque ad
 consumptionem 4tæ partis; decantato adde aquæ
 cinamom: cyd. syrup. cydon. aa. ℥ij. dosis cochl.
 i. omni hora vel ℞. pulv. rad. bistort. baccar.
 myrti aa. gr. xij. ms. f. cum roob cynosb. bolus.
 Decoctum a Fullero laudatum. ℞. Diascord. frac.
 ℥℞. crustam panis albi inferiorem coque ad duas
 tresve ebullitiones in aquæ ℥j. sub finem adden-
 do sri ℥℞. colaturæ per pannum adjice aquæ
 cinamomi lactæ ℥ij. D. per vices. Rad. colum-
 bo a ℥℞. ad ℥ij. omni 3-4 horio. Externe ol.
 nucist. expr. mastich. &c. epithemata sub colica
 ordinata; fascia roborantibus imbuta, ventrem
 constringens; cataplasma theriacale ad digest. læf.
 Nro. 2. indusia lanea, mastiche &c. perfumiga-
 ta; vesicatoria, cfr. medelam vomitus cardiacæ.
 colicæ. Si febris inflammatoria diarrhœam com-
 mitatur, v. f. aliaque antiphlogistica simul adhi-
 benda. Pro nutrimento sint cibi pauci eupepti,
 juscula, cremores ex avena &c. Transpiratio &
 diuresis promovendæ & pedes pannis laneis cali-
 dis fovendi.

M. M. specialem diarrhœæ a variis cru-
 ditatibus, hinc biliosæ, mucosæ, &c. vid. sub
 digest. læf. Nro. 1.

AB INGESTIS ACRIBUS DRASTICIS, VENENIS
 &c. unde hyperemesis & hypercatharsis; vide sub
 vomitu Nro. 2.

A VERMIBUS sub colica verminosa.

A TRANSPIRATIONE SUPPRESSA vide sub vo-
 mitu Nro. 9.

DIAR-

DIARRHŒA a MERCURII ABUSU, COLLIQUATI-
VA emollientibus, demulcentibus, opio in potu
& clysteribus sanatur.

A DIATHESI SUBPUTRIDA SANG. ex ructibus
putridis; fœcibus fuscis, pessime olentibus; uri-
na turbida, fœtidissima; meteorismo; lingua
plumbea quasi; virium defectu; siti mediocri &c.
cognoscenda, sero lactis aluminato diacodiato
Mülleri — R. Aquæ flor. rhœad. ℥b. i. syr.
diacod. ʒiij. Spirit. sulph. p. c. ʒj. ms. D. om-
ni bihorio aliquot uncia, interpositis aliquo-
ties de die, laud. liq. gttis x-xx.

A CACOCHYMIA VARIA & VISCERUM VITIIS
remediis variæ causæ propriis, mox antiscorbuti-
cis, mox antisphyiliticis, mox splanchnicis &c.
& externis revellentibus; junctis demum robo-
rantibus (vide arthritidem anomalam). Curam
palliativam *diarrhœæ pessimæ, phthisicis, hydro-
picis, scorbuticis supervenientis* vide sub phthisi.
Vir diarrhœa ad quævis rebelli, per decem an-
nos pessime vexatus, tandem cruenta, emacia-
tus, morti proximus, decocto limacum, subjun-
cto cortice cascarillæ, sanitati restitutus est.

Dispositio ad diarrh. ob intestinorum la-
xitatem & sensibilitatem, ex levi causa, animi
pathemat. refrigeratione pedum &c. repullulan-
tem, hypochondriacis, hysteris familiaris, cor-
rigitur remediis roborantibus, in- & externis
sub M. M. gener. notatis, quo imprimis indusia
lanæ & fascia referenda sunt, cfr. medelam di-
gest. laf. Nro. 2.

F 4

LIEN-

LIENTERIA

Vel dejectio celer ciborum & potulentorum
indigestorum & crudorum.

Cæsæ ventriculi & intestinorum laxitas summa, ex purgantium, potus tepidi, spirituosius abusu; dysenteria male curata &c. &c. ex liquorum digestivorum inertia & acrimonia cfr. Csas gen. Nro. 10. M. M. vide sub digest. las. 2 & 4. Laudant quoque lac ebutyratum vel serum lactis aluminatum, vel chalybeatum, cum vitellis ovorum mixtum; pulverem N. M. cum vitello ovi frixi, ex decoct. baccar. juniperi. gland. quercu. tostiarum, cum aqua calcis parato: Elect. ex extr. ligni campechens. cort. cascarill. rad. quass. fol. menth. spirituosius, syrupo cinamomi & mucilage cydon. — R. Pulv. cort. fumarub. Ziß. lud. liq. Syd. gtt. iij. ms. & divide in doses sex, sumatur omni trihorio pulvis unus. — Frictiones abdominis & spinæ dorsi cum balsam. nucist. *symptomatica* a scorbuto, lue venerea, ulcere ventriculi &c. ex aphtis, vermibus prostrata, medendo principi morbo curatur.

COELIACUS FLUXUS.

Seu diarrhœa chymosa, dejectio nempe sæ frequens & copiosa excrementorum plerumque valde fetentium, coloris ut plurimum albicantis aut cinerei. Cæsæ intestinorum potius, quam ventriculi laxitas, in ipsis hospitans fermentum, liquores digestivos corrumpens, & pulvis absorbentium nimis subtilis & copiosus deglutitus, muco intricatus, orificia vasorum lacteorum & cholodochi oppilans; sæpius glandularum mesenterica-

raicarum obstructio. *M. M.* vide sub digestionem læsa Nro. 1 & 2. & sub obstructione glandularum meseraicarum, non omittis frictionibus aromaticis fedulis abdominis.

DIARRHŒA CRUENTA sive dejectio sanguinis sinceri, sine dolore & tenesmo. Cæsæ plethora, ex dicta lauta; ex evacuationibus sang. suppressis, neglectis; sanguis nimis aquosus; laxitas arteriarum mesenterii; obstructio viscerum abdominalium; diarrhœa biliosa male tractata. *M. M.* Inter alia, lac ebutyratum, vel serum lactis aluminatum; acidulas martiales cum lacte; decoctum cort. peruv. cascarrill. cum pauxillo gummi arab. ejusmodi clysteres & pulverem ex simarub. sub lienteria descriptum exposcit; interpositis quandoquæ rhabarbarinis & si saburra peccat, leni vomitorio caute adhibito. Plethoricis vero hæc sæpe salutaris evacuatio non tam facile cohibenda, sed v. f. & temperantibus potius diminuenda. Postea curatio eo dirigenda, ut viscerum obstructiones, si in culpa fuerint, tollantur & fluxus sang. suppressi revocentur.

HEPATICUS FLUXUS vel dejectio seri sanguinei, loturæ carnis instar, ex iisdem fere causis oritur & eadem *M. M.* sanatur.

PERIODICUS, FEBRILIS, EXCEDENS quantocumque cort. peruv. cohibendus. —

EX HEPATIS ULCERE propullulans incurabilis est.

DIARRHŒA CRUENTA, que autumnis pomis admodum divite grassata est & sang. aquosi copiosa excretionem, quandoque vomitu cruento, doloribus & tenesmo mitioribus, quam in dysenteria;

F 5

teria, concurrente interdum febre catarrhali stipata, permultos vexavit, qui fructibus horæis abusi sunt, hisque sibi sang. dissolutionem & primarum viarum flatulentiam & atoniam contraxerunt, sequentibus — R. Tinct. rhei ℥ij. — iij. mucilag. gummi arab. ℥ij — iij laud. liq. Syd. gtts. v - viij. aquæ millefol. menth. chamom. aa. ℥j. ms. D. per vices potuque demulcente, copioso; clysteribus similibus; subjunctis tonicis, brevi sanata est.

DIARRHŒÆ INFLAMMATORIÆ M. M. vide sub dysenteria inflammatoria.

DIARRHŒA PURULENTA, ULCEROSA Csa abfcessus, ulcera intestinorum vel viscerum remotorum, ex eorum inflammatione aut dysenteria prægressis enata. M. M. victus tenuis, vegetabilis. Decoct. vulnerar. cum limacibus & lacte pptum, admixto, agitando balsamo de copaiba; lac ebutyratum; decoct. cort. peruv. cum melle & liquamine myrrh. — R. Terebinth. ven. ℥j. mucilag. gummi arab. ℥ij, mellis ℥j. syrupi papav. alb. ℥℥ diligenter in mortario tritis: adde emulgendo infusi virg. aur. ℔ iss. D. vasculatim. — Clysmata. R. Flor. chamom. mij. cum lactis s. q. coque, vase clauso, per 1/4 hor. colaturæ ℥viiij. admisce sub sedula agitatione balsami de copaiva ℥ij, mellis ros. ℥ij. injiciatur ter, quater de die. Cfr. medelam phthiseos exulceratæ.

AD DIARRHŒAM DOLORIFICAM, cum tenesmo, ab abrafo mucos, erosione & excoaratione ventriculi & intestinorum per saburram acrem, roden-

dentem, post sumta venenata, drastica; iram vehementem; frequentem; choleram; dysenteriam, quandoque post cessationem hæmorrhoidum in senibus. Conferunt demulcentia, diluentia copiosa. R. Cera flav. ℥j. pulv. gummi arab. ℥ij. ms. & affusa pauca aqua subige & ultimo adde bals. peruv. gtt̄s xv. siri alb. ℥℞. syrup. papav. alb. ℥j iterum misce & subige D. tribus vicibus ex decoct. ath. chamom. & millefol. clysmā — R. Sem. lini ℥ij. capit. papav. Nro. 1. coque per 1/4. hor. in s. q. aquæ colat. ℥℞. adde vitell. ovi.

CHOLERA.

Csæ vomitus & diarrhœa summo impetu simul agentes, sæpius bilis acris, ex irritatione nervorum, calore æstatis &c. magis magisque corrosiva. Vide Csas gener. Nro. 1, a-b-c- & 4, a-e-f. M. M. materia peccans acerrima cito temperanda & ad exitum disponenda & evacuatis cruditatibus, motus excedentes, opiatis sopiendi, denique roborantia adhibenda. Huc faciunt: Emulsio mannata ad colicam; cremores hordei &c. decoct. panis avenæ vel furfurum leniter tostorum, cum pauxillo lactis vel ejus loco syrupo berberum mixtum; decoct. hordei cum capitibus papav. flor. chamom. & crocoppptum; acidulæ Selteranæ, Embenses cum lacte; lac ebutyratum, cum mucil. sem. cydon. vel ovis forbilibus; Emulsiones; juscula pulli exenterati & sem. 4. frigidis repleti, pedetentim quidem, sed largissime, in balneo emoll. tepido, haurienda; interposito sæpe antiemetico Riverii; gelatine

latina linctusque ex cremore lactis, syr. diacod. vel alth. mucilag. sem. cydon. & aqua rosar. pptus, exulcerationi optime consulens; remedia sub vomitu Nro. 2. & cardialgia spasmodica recensita; clysmata ex oleis chamom. millefol. & liquamine verbasci ppta, omni bihorio & abdomini olea similia aut cataplasmata appda. Absint stimulantia, calida.

Plethora, pulsus durus & dolorum atrocitas. v. Snem ingesta a- & dispepta & colluvies verminosa cathartica, pro diversis cruditatibus, varia, ex rheo, tamarindis & magnesia ppta, cumque pauxillo opii combinata, præmissa mixt. Riverii, initio morbi & viribus constantibus exigunt. Cfr. curationem diarrhœæ. Morbo superato roborantis, rad. columbo a ʒʒ. ad ʒij. omni trihorio sumenda; acidulæ martiales, cum lacte; serum lactis chalybeatum cort. peruv. conducunt. *Periodica* cito cort. peruv. cum pauxillo opii cohibenda. *Epidemica* medela parum a præcedenti recedit.

Cholera epidemica, febre vehementi stipata, mulieres potissimum infestans, infuso laxat. vien. cum aqua menth. camph. & sale absynth. succo citri saturato, mixta, & infuso largo rad. liquirit. & flor. sambuci, junctis antihysteris in- & externis, sæpe feliciter superata est. *Hysterica sine materia* & sicca curam colicæ spasmodicæ exigit.

DYSENTERIA

Vel dejectio frequentissima, torminosa, tenesmodes materiæ mucosæ, filamentosæ, puriformis

formis, cruenta, biliosa, varii coloris, putrida, cadaverosa, febre plus minus sensibili stipata, sub finem æstatis ferventis, post crebriores aeris mutationes, ex calido in humido-frigidum & post sumta alimenta rubigine infectata maxime eveniens; contagiosa, epidemica. Præcavetur evitando Csas gener. Nro. 1, a-b-c-4, 5, a-refrigerationes, inprimis nocturnas, contagium ex ægroti halitu & excrementorum exhalatione facillime contrahendum, usurpando acescentia; virus; mixturam antiemet. River. cum mixtura simplici; rheum cum cremore tartari; emeticum, subjunctis thëriaca & externe frictionibus aromaticis. Optime in *biliosam plus minus putridam, inflammatoriam, malignam & in chronicam* distinguitur.

M. M. BILIOSO - PUTRIDÆ, quæ multo frequentior est & ex febre bilioso-putrida prægressa, vel intercurrente ejusque symptomatibus, junctis illis dysenteria propriis, horripilationibus recurrentibus, subsequente calore, lassitudine, gravitate artuum dorsi & lumborum magna, cephalalgia, nausea, siti, sapore amaro, vomitu bilis, interdum vermium, euphoria ex vomitu, facie plerumque pallida, & excrementorum conditione &c. cognoscitur. Initio emeticum, superingesto potu largo, tepido, infusi flor. chamom. verbasc. sem. lini &c. non obstantibus graviditate, hernia haud reponenda & inflammatione, exhibendum. R. Aquæ flor. chamom. ℥vj. pulv. rad. ipecac. ℥ß. tartari emet. gr. ij-iv. ms. D. omni 1/4 horæ cochl. ij. donec optatus effectus sufficienter eveniat, vel — R. Mann. ℥ß. pulp. cassiæ ℥iij. vel potius extracti cassiæ ℥ß. liquefiant

fcant in decoct. hordei ꝑ i. colaturæ adde tartariemet. gr. iij. fyr. diacod. ꝑ. D. omni 1/2 horæ ꝑiv. ejus vomitorii, & in progressu morbi reiterationem, ingluvies, nausea, sapor amarus, vomitus, anxietas, &c. suadent; subjungenda decoct. hordei, in ejus mensura crem. tartar. ꝑj. & fyr. berber. ꝑiij. solvantur. per noctem consumenda; sublequente die tamarind. ꝑiij. in aquæ ꝑ j. coct. aut haustus ex pulpæ cassiæ, mannae aa. ꝑj. salis Sedliz. ꝑj. - iß. & s. q. aquæ chamom. pptus, vel anima rhabarb. (quæ fibræ laxæ, vomituriens, & sub finem morbi magis proficua est,) cum pauxillo laud. liq. Sydenh. combinanda, si dolore inde exasperantium, cfr. M. M. gener. colica. Quorum purgantium & quotidianam repetitionem, dolorum, tenesmi, febrisque pertinacia, excrementorum & virium conditio determinant. Interponenda acre involventia, dolores lenientia, decocta fuffur. leniter tostorum vel oryzae, rad. alth. scorzon. raparum, cornu cervi, florib. chamom. rosar. millefol. verbasci, semine lini, cydonior. contus. & pauxillo lactis alterata, aut oxymelle acidulata; emulsiones; serum lactis; lac ebutyratum & similia copiose hausta; emulsio arabica; ejusmodi clysmata, adjectis oleo chamom. & verbasci; species diatragacanth. frig. recentissima; pomorum excavatorum, gummi arab. & mastiche repletorum & sub cineribus assatorum pulpa. Nonnunquam anthelmintica adjicienda. Putredinis major gradus cort. peruv. & rad. serpentar. virgin. exigit. Externe conducunt cataplasmata, inunctiones, balnea, pediluvia, vesicatoria. Alimenta sint ex acefcentibus, fructus horæi,

horæi, cremor hordei &c. aliena alkalescentia, obstipantia, calida, acria. Regimen sit temperatum, aër purus suffimigiis corrigendus; alvum exonerantibus vas infuso flor. chamom. &c. tepido repletum supponatur. Cfr. M. M. cholera. Denique materia peccante eliminata, opiata, roborantia, theriaca, diascordium, aqua calcis gummi arabico alterata, cort. peruv. cascarill. rad. colombo &c. caute adhibenda. Eandem fere medelam *dysenteria miliaris* exigit.

LEVIOR SPECIES, BILIOSA, MINUS PUTREDINOSA vel ex materia catarrhali, pituitosa, acri, varioque cacoehymico fermento, non putrido quidem, sub alia conditione vero febres epidemicas excitante, intestina versus determinatis, enata illisque potissimum familiaris, qui abusu fructuum horæorum canalem alimentarem debilitant, ibi fermentum acre ingenerant & massam sanguinis nimis tenuem reddunt, cito sæpe sanatur, mannam vel rheum, in decocto coffée tenui, largo, cum lacte mixto, per 3-4. dies, interdiu emulsionem arabicam, vel ex oleo amygd. d. syr. diacod. vel alth. aquis rosar. cinamomi & potu demulcente paratum vel decoctum saturatum pedum vituliq. oryza, adjecto pauxillo aquæ calidæ aut aquam cum pane tosto, florib. rosar. rubri & capit. papav. infusam; vesperi vero, post clystima demulcens injectum, opium; denique 4to, 5to die, cort. peruv. cascarill fumendo.

DYSENTERIA OB DIATHESIN PHLOGISTICAM, PLETHORAM & BILIS FERVOREM, INFLAMMATORIA febre vehementiori; pulsu duriore, celeri, nonnunquam vero humili, debili, sibi subobscurè dissimili; dolore continuo, acuto, feroci, magis fixo,

fixo, tactu & post ingesta, acriori; rubore faciei; lingua sicca; excrementorum paucitate; vomitu crebriori & abdomine duro, tenso; tandem physiognomia mire mutata, oculis quasi enterrefactis; interdum livore quodam circa labia stipata, cathartica minus fert. Venae sectionem vero pro virium conditione repetitam exigit, simulque potum demulcentem, pargoricum, in quo, pro re nata, pauxillum salis ammoniaci solvi potest; emulsionem cum camphora, mucilage gummi arab. bene involuta, nitrata; decoct. hordei, rad. alth. cum flor. chamom. & gummi arab. clysteres similes crebriores, sed parvis portionibus aptos; externe pediluvia, ungt. de alth. cum camphor. & eff. Galbani mixtum, superinposito cataplasmate emolli. cum aqua vegeto-mineral. parato; nonnunquam vesicatoria temperata. Gangrænam manifestant dolorum subitanea remissio & dejectiones nigrae.

DYSENTERIA MALIGNA. prostratione virium, anxietate summa; sensuum hebetudine; stupore; incuria; fœcum odore, fere cadaveroso, aliisque symptomatibus ominosis, insolitis, sibi contrariis, e. gr. delirio, cum calore parvo, calore magno absque siti &c. inprimis post moram in aëre corrupto & sub epidemia febrium putridarum continentium, subito invadentibus dignoscenda, rarissime v. s. interdum vero emeticum reiterandum, ad bilem putridam, turgentem, ex ventriculo & duodeno, & cathartica antiputredinosa, lenia, ad saburram ex reliquis intestinis eliminandam exigit, præmissa & interposito antiemetico Riverii vel haustu ex sale absynth. $\ni \beta$.

&

& aceti bezoard. ℞. composito, sub actu effervescentiæ exhibendo. Id quod crebro sumtum, tutius vices evacuantium, in virium, ex causa magis nervosa, depressione, noxiorum gerit. Hisce subjungenda antiseptica, roborantia, cardiaca, serum lactis vinosum, vel ope solutionis aluminis vitriolatae Mülleri pptum, cum aqua destill. chamom. & rosar. mixtum; decoctum hordei cum cort. peruv. & cascarill. floribus chamom. & taleolis aurant. amar. & syrupo rosar. Berber. cinamomi pptum; juscula acidulata, emulsiones camphoratae, mixtura simpl. spirit. Mindereri vel naphta vitrioli crocata, moschata, aut ℞. rad. serpent. virg. contus. ℥j. spirit. vitriol. dulc. ℥j. digere in balneo mariae per 2. horas, colat, adde oxym. simpl. ℥j. ms. & digere D. gttæ x-xx. ex aquis destill. meliss. ruta, galeg. chamom. rosar. syrupo contrayervæ composito edulcoratis; fructus acaciæ in aceto macerati; miva aliaque præparata acidula cydoniorum; sinapismi; vesicatoria ad pedes &c. fomenta amara theriacalia ad abdomen; epithema antisepticum, cardiacum ℞. herb. scord. menth. summit. ruta fol. torismar. aa. Mss. cort. cinamom. peruv. nuc. myrist. aa. ℥ij. conc. contusa cum aceto rosar. & vino rhen. aa. ℥viij. coquantur in phiala alta vitrea per 1/8. hora, liquori decantato adde aquæ prophylact. sylv. ℥ij. ms. s. hoc liquore imbuta spongiola admoveantur scorbiculo cordis, axillis, carpis, naribus, Omnia vero cum grano salis adhibenda.

DYSENTERIA CHRONICA curatur evitando
Csas occasionales & adhibendo ipecac. denique
minoribus dosibus cum pulvere cort. simarub. &
G tantil.

tantillo opii mixtam; rheum tostum, subjunctis interdum opiatis; potum & clysteres demulcentes; juscula cum farina leniter & per se tosta, sem. carvi & N. M. ppta; trageam granorum aetes ad ℥j- ℥ij. præparata ex quassia, cort. peruv. cascarill. simarub., elect. sub malo hypochondriaco descriptum; decoct. vel pulv. fol. Lyfimach. vel decoctum expertissimum ℞. Flor. lytri salicariæ rec. mj. si vero siccæ sint ℥j. bulliant in aquæ vel hydrogalæ ℥viii colatura, per vices sumatur; vinum rubr. Pontack. acidul. martiales cum lacte.

DYSENTERIE EXULCERATÆ, *cacoehymicæ, dolorificæ a mucro abrafo, excoriatione curatiorem*, vide sub diarrhœa.

SYMPTOMATICA ex visceribus canerosis, putrefactis incurabilis est.

AD TENESMUM cathartica repetita; clysmata, mox tamarindinata, mox ex decocto faturato corticis peruv. sem. lini, fœnic. græc. capit. papav. floribus chamom. mucilage gummi arab. liquamine verbasci aliisque lenientibus & antisepticis ppta (cannula vero, pulli intestinulo inverso, obvoluta sit) nec non infessus vaporosi; inprimis cataplasmata, ex lacte, croco, tantillo camphoræ &c. anum continuo comprimentia; quandoque venæ sectio.

AD RHEUMATISMUM DYSENTERICUM ubi, doloribus in extremitatibus cessantibus, statim colici dolores & diarrhœa oriuntur, parvæ doses hypoc. cum opio, quibus rheum in refracta dosi sæpius interponitur.

ALVI

ALVI OBSTIPATIO.

Causæ: atonia intestinorum & ad spasmos proclivitas; pituita tenax; acidum luxurians; plethora universalis & particularis, in vasis hæmorrhoidalibus; defectus liquidi lubricantis, saponacei, ob vasorum sang. glandularum, ductuum biliferorum obstructionem, potionem parcam, sudoris & urinæ excretionem nimiam; ingesta dura, sicca, austera, macra, tosta; panis biscoctus, tostus; spiræ; pulticulæ ex milio, pis; ova dura; omnia opera pistoria; caseus; castaneæ; nuces; mala cydonia; pira immatura; fructus mespili, acaciæ; vina rubra &c. saturnina; cacochymia. Diversis his causis varia curatio accommodanda. Levatur malum motu corporis placido; surgendo consueto prius e lecto; potu sufficiente; indulgendo certo & determinato tempore & insistendo alvi exonerationi; hoc quidem mane & animo a meditationibus plane libero; hauriendo simul decoct. caffèe cum manna & fumum tabaci; fumendo loco panis similaginis. panem autopyrum, mane butyro illinitum; clysteribus leniter stimulantibus, ex decocto spec. emoll. cum melle mercuriali & sale gemmæ vel cum elect. lenitivo aut uncto clysmatico; inunctione abdominis uncto eodem; vaporibus mollibus ex decocto brassicæ crispæ ano admissis; balneis emoll. confectione Hamech, cum uncto de althea mixta, plantis pedum apta; globulis carminativis, R. Salis com. ℥ss. sapon. ven. ℥j. mellis inspissatiq. s. ms. f. suppositorium, oleo absynth. illinendum, vel potius ex alumineis crudi particula confectum, oleo lini obducendum, simulque olei lini cochl. II superbibenda; pilulis saponaceis; passulis, prunis laxativis; cre-

more tartari, cum extracto taraxaci rec. mixto; mannatis, tamarindinatis; roob ebuli ℥i. cum rhei gr. v. mixta; mixtura antihypochondriaca & acetariorum, ex lactuca quotidiano usu.

AD ALVI VERO OBSTIPATIONEM EX ATONIA & SPASMIS ORIUNDAM, exoptata virtutis sunt pulvis tenerrimus cort. peruv. selecti cum pauxillo cremoris tartari & mars solubilis cum rhero mixtus.

OBSTIPATIONIS GRAVIORIS CURAM vide sub ileo.

OBSTIPATIO EX INTESTINORUM TUMORE CALLOSO, SCIRRHOZO, *excrecentiis carnis, coactu &c. vel ex tumore partium vicinarum intestinalium comprimantium*, vix aliam, quam palliativam curationem admittit. Ne vero hanc coarctationis species cum illa crebrius obveniente confundas, quæ ex infarctu vasorum & glandularum, potissimum intestini recti oritur, & remediis in sequenti capite notatis superanda est.

OBSTRUCTIONES VEL INFARCTUS VISCERUM ABDOMINIS.

Cæ. Sanguis spissus, in concrementa polyposa vel & tartarea, tandem degenerans; quem inducunt & partim visceribus impingunt.

Cæ gener. Nro. 1, 2, 3, 4, 5, e-9, 10, 11.

SIGNA DIAGNOSTICA; physiognomia peculiaris vix describenda, crebriori experientia ediscenda;

da; color corporis pallidior, flavus, fuscus cum maculis similibus; macies; torpor; frigus; sanguis eductus nigricans; serum intensius flavum; pulsus tardus, durus; respiratio lenta; urina sæpe cruda; concoctio læsa; alvus tarda; fœces parvæ, duræ; molimina hæmorrhoidalia; affectus spastici in abdomine; palpitationes cordis; anxietas; sputatio frequens; tumor, durities, sensus ponderis & tensionis fixus; mox sub hypochondrio sinistro perceptibiles, quod lienis infarctum; mox sub dextro, cum albugineæ colore mirunt pallido, interdum flavo, cum oris siccitate, amaritie, quandoque tussi sicca periodica, quod multo frequentiore hepatitis obstructionem; mox sub scorbiculo cordis, cum œsophagi constrictione, soda, cardialgia, singultu periodicis, conatu vomendi, & rejectione mucii, striis & grumis sanguinis remixti, vomitu cruento &c. contingentes, quod vasorum ventriculi infarctum; mox sub umbilico cum affectibus hæmorrhoidariis &c. quod infarctum vasorum mesenterii manifestat. Non vero semper hisce signis incedunt infarctus. — Latent quandoque sub larva pathematum, quæ in remotis partibus præcreant. Verissime Hippocrates: (Epidemior. VI. 7.) atrabilarii etiam epileptici consueverunt fieri plerumque &c. & (Aphorismor. VII. 40.) si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, (quasi) atrabiliarium tale est.

M. M. Humores spissi, mobiles reddendi, obstructions emolliendæ, stimulantæ, referandæ, & ad exitum disponendæ, denique partes nimis relaxatæ roborandæ. Id quod præstant: Radicis rhei, tarax. cichor. sub. tinct. saponar. cum

foliis, graminis, ari, curcumæ, pimpin. alb. junip. herb. scolopendr. heder. terrestr. card. bened. saponar. millefol. marrub. alb. arnicæ cum floribus. Ex quibus modo recentibus, modo exsiccatiss, adjecto tartaro tartarifato &c. decocta saturatissima, cum vel sine fero lactis pparantur, syrupo viscerali quodam & oxymelle edulcoranda, vel juscula, vel cerevisiæ & vina medicata, aut succi conficiuntur. ℞. Fol. & rad. tarax. saponar. herb. heder. terrestr. absynth. trifol. fibr. cum s. q. aquæ triturando, in massam contusa, digerantur in machina papiniana vel indantur ollæ fictili, vitreatæ, quæ operculo tecta & lutata, clibano, post panes extractos, immissa, stet sex horas, dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat. Dosis ℥iv - vj ter de die; vel idem succus sro imbuatur, super lapide marmoreo posito leniterque exsicceatur. Hacce operatione aliquoties repetita, srum viride (in phiala oleo destillato grato irroratum asservandum) in aqua destill. vel vino solutum exhibendum. ℞. Succor. expr. rad. tarax. &c. ℥ij. terræ fol. tart. quantum in succo solvi potest, saturatis adde, extr. card. bened. &c. ℥j. leni adhuc calore digerantur, solvantur, D. bis de die cochl. I - II. in vasculo feri lactis. — ℞. Extr. card. bened. methodo Garajawa parati, heder. terrestr. & saponar. spirituosi aut per fermentationem parati; gummi ammoniaci aceto scillit. solut. aa. ℥iij. sapon. antimonialis ℥ij. in liquore terræ fol. tart. s. q. soluti, tincturæ succini inspiss. ℥iij. aquæ menth. melisf. aa. ℥iij. ms. aut ℞. extr. tarax. tartari tartarifat. aa. ℥ss. aqua tarax. per fermenten-

mentationem parat. ℥x. D. ter-quater de die cochl. i-ij, superbibendum infus. amar. herb. chamædr. chamæpyt. &c. Pilulæ viscerales N. cum saponе antimoniali extr. cicutæ, calomel. rad. ari recenti &c. mixtæ; summitates, vel apices herbar. splanchnicar. tenerrimæ l. a. exsiccatæ, vel in pulverem redactæ, qui aut per se, aut roob sambuci exceptus, bis de die, ad ℥j. ex solutione salis alkalinii puriss. cum f. q. aceti acerrimi saturata & aquis, post fermentationem destillatis, convenientibus, bene diluta sumitur. — R. Mercurii vivi, cum mucilag. gummi arabici rite subacti ℥j. (vide sub lue venerea) admisce sensim conterendo extr. saponaria, trifol. fibr. aut fumar. syr. fumar. aa. ℥℔. aquæ fumar. ℥x. D. mane & vesperi cochl. ij; millepedes vivi, contusi, conserva nasturtii excepti; acidulæ, & sub ciborum titulo, fructus horæi, aut crudi, aut cocti, rapunculi esculenti, spinachia, brassica, admixto, pro re nata, pauxillo germinorum sambuci, primo vere propullulantium; cucumeres, endivia, acetosa, bellis min. borago, buglossa, cichor. lactuca &c. inter quarum preparationes imprimis acetaria laudanda sunt. Inter recensita vero remedia longe præstant clysmata ex decocto meraco, specierum splanchnicarum, cum furfuris portione ppta, omissis oleosis & salinis, adjecto vero, ubi intestina minus irritabilia, vel clysteribus assueta sunt, in majori dosi gummi ammon. ope longæ triturationis cum æquali portione tartari vitriolati soluto, quotidie ad ℔. j. post alvi dejectionem, sive fœcibus clysmatis, portione antea eductis, tepide appda & ad sui consumptionem retinenda. Quorum pertinaci ad

G 4

plu-

plures menses, immo ad annos protracto usu, concrementorum dictorum eliminatio efficacissime procuratur; junctis fomentationibus sedulis abdominis, mediante cataplasmate emoll. discutiente ex rad. dulcamar. rec. levistici, alth. fol. cicuta, hyosciami, tabaci bonæ notæ, arnic. inarrub. alb. flor. chamom. sambuc. sem. cumin. cum hydrogala s. q. ad emollitionem usque coctis & adjectis roob sambuc. & farina sem. lin. q. s. vesica fuilla, oleo madefacta, tegendo. Quæ combinata remedia, hic & ad fluxus tam sanguineos, quam serofos suppressos revocandos, crebriori experientia teste, mira præstant. Innumeros enim aliis plane incurabiles morbos abdominis & sub larva variorum pathematum capitis, pectoris &c. Iudentes hisce sanatos læte vidimus. Spectatæ utilitatis quoque sunt balnea, inprimis thermæ Embsenles, quæ salia tam alkalina, quam neutra-saponacea (quibus viam per poros cutis in massam sanguinis patere, institutis experimentis constat:) sat copiose & principium martiale sulphureum, subtilissimum in sinu gerunt, pro varia temperie, mox tepide, mox frigide adhibenda; nec non frictions abdominis aromaticæ; unguentum ad atrophiam; emplastrum de cicuta rite & recenter paratum, cum gummi galbano viliori & pauxillo olei cornu cervi vel tartari mixtum, & motus corporis per equitationem &c. Selectum horum remediorum, temperies sicca, calida, humida, laxa, infarctuum varii gradus, cacochymia diversa, digestionis læsæ & cruditatum conditio determinant. *Temperies e. gr. sicca, calida vel diathesis sang. phlogistica vide Cæs gener. 10, — b —.* Succos temperatos, ferum lactis, sub cephalalgia sang. descriptum.

ÆTA-

ÆTATE VERO PROVECTIONES, ABUSUI SPIRIT. ARDENTIUM DIUTIUS ADDICTI, extracta splanchnica, in spirit. aperit. Penoti vel antiscorbut. Drowitz soluta, immo essentias; *temperies humida, fibra laxa*, hodie magis solemnis, saponacea, resolventia, semper cum roborantibus, cort. peruv. marte solubili combinata. *Cachymia scorbutica* succos fumar. trifol. fibr. cochlear. betulæ; *venerca* mixturam mercurialem recensitam exposcit. Interponenda sunt, pro re nata, derivantia, evacuantia, excretiones suppressas revocantia, aut earum vices gerentia. Morbi varii, lues venerca &c. cum infarctibus complicati, non eradicantur, nisi infarctus prius sublatus fuerint. Huc pertinet sanguinis stagnatio, ex potu frigido, post corporis incalescentiam & lapsu ex alto, cui medentur, præmissa venæ sectione, R. infusi semivinosi meraci, stipit. dulcamar. fol. card. bened. consolid. sarac. flor. arnicæ ℥ij, syr. hed. terrestr. ℥iv. theriaci andr. ℥β. ms. D. ℥iv. bis-ter de die. Reliqua interna, pro varia temperie, gradu & indole, ex hisce causis enati morbi, seligenda, vide supra; externe vero cataplasma supra notatum, nec non spirit. terebint. sedulo appda sunt. Ne symptomata, excretiones salutare dictorum concrementorum &c. præcedentia & concomitantia, anxietas nempe summa, lipothymia, pulsus intermittens, vomitus æruginosus & foetidus; immo dejectiones cadaverosæ, nigra, convulsionones pathemataque pleuritidem, colicam inflammatoriam mentientia, semper terreant. Quæ demulcentibus, antispasmodicis remediis, inprimis crebrioribus elysteribus mitigantur, interpositis nonnunquam

G 5

cardia-

cardiacis, antisepticis. Febris intermittens, fataliter superveniens, curam, teste crebriore experientia, admodum accelerans, minime cohibenda, sed continuato usu spianchnicorum resolventium promovenda.

Non raro, saburra, variæ indolis, interdum copiosissima, viscidissima, coli inprimis cellulis impacta, ibique, per menses, immo annos, tenacissime hærens, viscerum infarctus, vel malum hypochondriacum mentitur, enematis supra descriptis eliminanda. Eorundem pertinaci usu, pituita vitrea, veteribus insuperabilis, certe vincitur. Cfr. dissertationem meam de infarctu vasorum ventriculi. III. Profess. Faber ulteriorem expositionem novæ methodi Kæmpfianæ curandi morbos chronicos inveteratos. Cl. Elvert dissertationem sistentem novas observationes de infarctibus venarum abdominalium internarum eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda & cl. Koch dissert. de infarctibus vasorum in infimo ventre.

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

Csæ: digestionis læsa variæ species: (de quibus vide supra) Csa gener. Nro. 10, (unde malum hypochondriacum nervosum vel sine materia) & obstructio viscerum sub hypochondriis sitorum, juncta semper irritabilitate & sensibilitate nimia fibrarum laxarum, in specie ventriculi & intestinorum, quarum causarum qualibet alteri velificans originem dare potest; unde toties abstrusa complicatio. Plurima innumerabilium sympto-

symptomatum, quibus polymorphum hoc malum incedit, explicantur ex consensu nervorum; ex imperio miro canalis alimentaris irritabilioris, in sensus internos, & in totam corporis compagem; (in certis subjectis admodum conspicuo & singulari; in aliis minus, quamvis stimulus multo fortior fuerit: Id quod patet ex epilepsia &c. &c. vermibus interdum paucissimis excitata) ex venæ cavæ, portarum, diaphragmatis, hepatis, renis &c. pressione & spastica constrictione, per, ipsis vicina aut connexa, ventriculum & duodenum, cruditatibus inflata & irritata & per colon scybalis refertum; ex sang. circuli impedimentis, per infarctus & hæmorrhoidum fluxum irregularem & ex atonia particulari, spasmos recrudescentes excipiente, hinc intestinorum tono inæquali & motu peristaltico turbato. Augent malum attentio continua, mœsta & fortis ad corporis statum & medicamentorum voracitas. *M.* *M.* Causa primaria & complicata, temperiei & cacochymia variefate bene observatis & ponderatis, ex remediis sub digestionem lesa, obstructione viscerum, & epilepsia recensitis, ea seligenda, quæ cuilibet causæ, temperiei & cacochymia quadrant, eaque pro re nata combinanda.

Profuerunt. — *R.* Pulv. cort. peruv. ℥iij. tere cum s. q. mucilaginis gummi arab. per horulam, postea lagenæ immixtis affunde infusi spec. nervin. frigidij ℥ij. aquæ nervin. vinosæ ℥vj. stent in digest. frigida per 12. horas, lagenam exacte clausam sæpe concute; dein cola, cum forti expressione; Residuum vero cum pauxillo gummi arab. aliquamdiu tritum coque in infusi fol. aurantium & summitatum millefol. ℥xij ad ℥vj. & frigesactum

stum cola. Tum in colaturis mixtis dissolvé,
 extr. tarax $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.: extr. nervin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. D. bis-ter
 de die $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — iv. Pro pauperibus loco cor-
 ticis peruv. cortex salicis vel hypocaustini adhi-
 beri potest. Infusum pro hoc labore vel dige-
 stione calida, vel, operosius quidem frigida pptur,
 Specier. nervin. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. macis $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. macerando, in
 aquæ fontanæ frigida $\mathfrak{ss}\mathfrak{ii}\mathfrak{ss}$. per sex horas, sub
 crebriori agitatione vasis clausi & affundendo co-
 laturam eidem portioni spec. nervin. de novo &
 procedendo uti prima vice. Si potio hæc adhuc
 valentior desideretur, in singulis cyathis adjice
 cort. in tenuissimum pollinem redacti $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. & sic
 turbidum liquorem propina. Porro decoct. rad.
 quass. & fol. aurantior ter de die ad $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. frigidè
 exhibendum instillatis cuilibet dosi gttss x —
 xv. olei vitrioli cum equali portione spir. vini
 rectificatiss. edulcorati. — Elixir Roberti Whytt.
 R. Pulv. cort. peruv. opt. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. rad. gent. rubr.
 flav. cort. aurant. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. spirit. vin. gall. $\mathfrak{ss}\mathfrak{iv}$.
 digere per sex dies, balneo arenæ, cola; vinum
 medicatum ad digestionem læsam ordinatum, vel
 ex radice quassæ, fœniculi & speciebus nervi-
 nis paratum, sub epulis sumendum; — R. Extr.
 cort. peruv. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. cascarill. lign. camph. vel quass.
 sã aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. liquiritiæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. salis ammoniaci $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 moschi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. mucilag. sem. cydon. q. s. ut f. ele-
 ctuarium, aut boli. Dosis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. elixir nervin. ad-
 jectis extr. cort. peruv. cascarill. & tincturæ
 martis cum spir. sal. gl. pptæ, aliquot guttulis;
 pilulæ viscerales cum floribus salis ammoniaci
 martialibus vel marte solubili & camphora mix-
 tæ, ex aqua nervina; pulvis roborans, ad dige-
 stionem

tionem læsam; acidularum martialium usus dieteticus, diuturnior, vel horum loco R. aquam font. aëre fixo l. a. impregnatam, in cuius thj. vitrioli martis fact. gr. i. solutum est; masticatio crebrior frustulorum mastichis, cinamomi, cort. peruv. rhei, myrrh. select. & succi catechu. quo pabulo anxia imaginatio hypochondriacorum, quæ & crebriorem formularum mutationem exigit, continuo late & innoxie occupatur.

Inter externa, sub obstructione viscerum ordinata, imprimis laudanda frictiones aromaticæ, inunctiones cum bals. nucist. balnea & clysmata roborantia, subfrigida, Emplastrum galbani crocat. M. cum oleo hyosciami & bals. nucist. malaxat. nec non cingulum, pulvere myrrh. galban. vilioris, rad. valerian. fol. aurant. mille fol. cort. peruv. cascarill. limatura lign. santal. citr. & rhodii repletum, aqua meliss. composita & solutione martis solubilis irroratum, abdomen leniter constringens. Interpositis quandoque tinctura rhei Darelîi cum extr. rad. quassia & sale mirab. in aqua menth. solutis, mixta; pulveris seq. usu. R. Pulv. flaved. cort. aurant. rhei opt. tartari tartarificati aa. gr. xx. - xxx. ms. pro dosi, cui, pro ne nata, spir. bezoard. Bussi gtt. xv. & extr. cap. papav. rh. gr. i. - ij. in spiritu soluta instillantur; acidulis amaris Sedlizens. mixtura antihypochondr. hal-lensî; elixir. aperit. claud. superingesto decocto rad. quassia & aliquot guttulis laud. liq. Syd. &c. Obstipatio alvi, quæ sæpius ex atonia intestinorum venit, tum roborantibus superatur; pulvere cort. peruv. cum pauxillo cremor. tartari vel marte solub. cum rheo mixtis: concurrentibus
vero

vero viscerum obstructione, pituita vitrea & scybalis induratis, enemata quotidiana adhibenda sunt. Lotii imminutionis, unde tot symptomata, medelam vide sub malo hysterico. Urgentibus symptomatibus spastico --- convulsivis succurritur specificis sic dictis antiepilepticis & opiatis, quæ vero caute & raro in usum veniant, bolo antihysterico; spiritu nervino; pulvere absorbente Wedel. extr. hyosciami ad gr. j. — ad gr. iv. nonnunquam hirudinibus ano applicatis; exulent opiata, si temperies calida (vide Csas. gener. 10. — b.) & plethora concurrunt; tum potius remedia sub digestionem læsa Nr. 4. recensita antiepilepticis jungenda. In specie, ad temperiem biliosam cum obstipatione, continuatus usus lactuæ, in forma acetarii & coctæ magni auxilii est. Nuper hypochondriacum palpitationi cordis continuæ vix non succumbentem sanavit exanthema serpiginosum ope ess. Guajaci volat. expulsum. Quod si scorbutus calidus complicatus est, succus fumar. & cochl. ex sero lactis; si cachexia & glandularum meseraicarum obstructio concurrunt, decoct. rad. rub. tinctor. & gland. ilign. exsiccat. & tostar. præ aliis laudandum. Diathesin acidam, spasmos & tormina a laxantibus, quassia præparata corrigunt. Diarrhœam pertinacem hypochondriacam & hystericam admodum rebellem, decoct. quassia, adiectis glandib. ilign. tostis, bene chalybeatum & symptomata gravia a vermibus complicatis anthelmintica cicurant, cfr. curam mali hysterici. Plurimis hypochondriacis ingesta glutinosa, farinosa, pinguis, flatulenta, acescentia, fermentantia, fructus horæi, legumina aliaque olera copiose sumta; potus vini & cerevisiæ vilioris, aquæ tepidæ, maximas mole-

mole-

moestias creant; quibus vero cibi duriores a juventute nutrimento fuerunt, illis diæta strictior, victus tenuis, anxie sumtus nocet, corpus mutatione aliena, subita, alterando, chylum nimis tenuem procurando & fibras relaxando. Hinc multis concoctu difficiliora, immo quodammodo noxia concedenda, præcipue si æger ea anxie cupiat. Humores enim inquieti & inde secreti liquores digestivi, ex longo usu summe dyspeptorum, his homogenei & pares redduntur, ingestis vero prioribus contrariis & eupeptis impares sunt, & fibræ motrices ventriculi, ob majus negotium, quod duriores cibi faciunt, agiliores & fortiores fiunt. Ventriculus quoque durissima, cum magno appetitu deglutita interdum concoquit & certa idiosyncrasia, nostro morbo solemnis, veneni vim habentia fert. Simul vero ciborum masticatio sufficiens, motus corporis quotidianus, deambulatio, rusticatio, venatio, potissimum equitatio & peregrinatio imperanda; potus coffeæ & theæ interdicendus, & horum loco jentaculum ex frustulo panis similag. tosto, vino rubro gallico calido imbuto, cui pulv. sem. carvi fœniculi cinamomi cort. & folior. aurant. & siri inspergitur, sumendum. In primis eo laborandum, ut hypochondriacorum imaginationem luxuriantem tot pathematibus, quibus affliguntur, trepide inhærentem eaque multo augmentem, alio applicemus. Quantum hoc possit ad ipsam stimuli vim infringendam, videmus in sternutantibus, singultantibus &c. quibus & levi attentione circa improvisa excitata, motus hi convulsivi non absimiles subito sæpe supprimuntur. Plura vide infra sub insania. Ne vero Medicus, assiduus, & ut plurimum, in-

nibus

nibus, hypochondriacorum & hysteri-
corum que-
relis lassatus, de fontica visceris labe securus sit.

INSANIA, MELANCHOLIA, MANIA.

Csæ: mali hypochondriaci, quo imprimis for-
des viscida primarum viarum referenda; pletho-
ra, potissimum ex causis gener. Nro, 4 - b - c -
& 10, - b -, enata; cerebri debilitas & vasorum
encephali turgescencia, a venenis narcoticis, cre-
brius a causa gen. 2, - f, - inducta. Reliqua vi-
de sub causis morborum capitis, in specie cephal-
algie. M. M. generaliore remedia antihypochondriaca, antihysterica, splanchni-
ca, aperientia, spasmos infimi ventris relaxantia,
orgasmm sang. sedantia, encephalum debile
roborantia; junctis plerumque reuulentibus, pro
re nata venæ sectione, cucurbitulis, pediluviis, bal-
neis, potissimum clysteribus quotidianis, hirudi-
nibus ad hæmorrhoides, epispasticis, vesicatoriis,
pedibus diutius appdis, fetaceis, insitione scabiei
(vide sub cephal. pituitosa & serosa) purgantibus
& vomitoriis iisque interdum sat validis &
sæpe repetitis, nec non sopientibus extr. capitum
papav. rh. hyosciami, id quod, præmissis præmit-
tendis, & justo tempore adhibitum mira præstat.
℞. Tinct. inspiss. vel extr. spirituosi flor. hyper-
rici, summitatum anegallidis flore puniceo aa. ℥ij.
tartari tartarisati ℥ss. oxymellis scillit. ℥j. aquæ
rutæ ℥vj. ms. D. lapius de die cochl. I - II - III.
vel — ℞. Salis tartari ℥j. solve in aceti acerrimi
in quo herb. anegallidis & hyperici macerata

q. s.

q. s. ad saturationem, adde roob sambuci, oxy-
 mellis scill. aa. ʒj. D. bis de die — R. Aceti
 acerrimi ʒiſſ. D. horis pomeridianis per vices,
 pramiſſo mane inuſo meraco fl. hyperici; ele-
 ctuarium tartariſatum cum extr. hellebori nigri
 mixtum; tinctura martialis helleborata; ſpecifica
 antiepileptica, camphora, moſchus, decoctum me-
 racum ſpecier. nervin. oleo vitrioli, parumper
 dulcificato, largiter acidulatum, adjecto extract.
 capit. papav. rh. vel hyoſciami pauxillo; ſerum
 lactis rad. polypod. tarax. rhei, Valeriana, foliis
 aurant. rut. meliſſ. ſaly. anagall. millefol. hype-
 ricii cum floribus, alteratum & roob berberum
 &c. edulcoratum. Horum ſelectum, pro varia
 morbi cauſa, indole & complicatione, prudens
 medicus facile determinabit. Epithemata ex ca-
 ſeo ſecundario recentiff. cum aceto, nitro & ſale
 ammoniaco, vel ex aqua roſar. aceto rutaceo, ni-
 tro, ſyrupo papav. alb. & camphora ppta deſaſo
 capiti, ſub balnei tepidi uſu frigide impoſita; non
 minus ſtillicidia thermarum capiti raſo caute appta.
 Simul depravata imaginatio corrigenda eſt, aver-
 tendo animum ab objecto conſueto ad alia, priori
 contraria, inducendo caute alium affectum, erro-
 ribus ægri, aſtute aſſentiendo vel reſiſtendo;
 hinc maniacorum audaciam vi reprimendo, me-
 lancholicorum triſtem animum erigendo, ſpe,
 ludis, muſica, feſtivaliſ ſpectaculis, conſabulatio-
 ne amici blandioris, varietate objectorum in iti-
 nere, & varia ſtratagemata & artificia curatoria,
 ingenioſe adhibendo; nimiam hilaritatem deſipi-
 entium, riſus intempetiſivos &c. objurgatione &
 minis prohibendo; melancholicos ex falſis timo-
 ribus, quibus longe inhæſerunt, nonnunquam

H

veris

veris periculis terrefaciendo & pavorem incutiendo; furentes vero, vinculis firmis quidem, sed minime duris, continendo.

CURATIO INSANIE ATRABILIARIE sub obstructione viscerum fusius descripta est. Cfr. *M. M.* gen. fructus horæi, cerasa, frage, cucumeres sale conditi, coagulum lactis acidulum & lac ebutyratum, sub ciborum titulo, copiose offerenda sunt.

INSANIA NERVOSA a CAUSA MERE IDEALI & AB INANITIONE ex *Csis* gener. Nro. 3, & 10, - a - exposcit remedia nervina, roborantia, antispasmodica, replentia, præmissis nonnunquam demulcentibus, refrigerantibus; spirit. æther. cum oleo animali mixt. tincturam martis helleb. ex spir. nervin. aqua meliss. rut. anagall. fi. pun. diluto: Præparata rad. Valerian. & herb. anagallidis, camphoram, moschum; vinum generos. extr. hyosc. vel capit. papav. rh. potum chocolade cum infuso fol. aurant. anagall. flor. pun. & flor. hyperici meraco pptum. ℞. Bals. peruv. ℥j. spir. rosar. rectificatiss. q. s. ut solvatur balsamus & f. l. a. essentia, D. gtt. xx. bis de die in vino generoso — ℞. Camph. cum mucilag. gummi arab. bene trita gr. xxx. ascendendo ad gr. LX. syrup. rad. s. aperient. aceti acerrimi aa. ℥vj. aquæ sambuc. ℥j. ms. per 3 - 4. septiman. quotidie sumendum, superingesto julapio temperante vel decocto hordei &c. infusum meracum specier. nervin. elixirio acid. acidulatum; cort. peruv. martialia; enemata ex dicto infuso cfr. *M. M.* gener. & mal. hypochondr. & hysteric. aliena sunt evacuantia. In hac specie plurimum

a con-

a consiliis & monitis medici & amici placidi, ingeniosi & philosophici, qui diversitati animorum sese accommodare eorumque fiduciam captare norunt, exspectandum est.

MANIA PLETHORICA, BILIOSA, EX SANGUINIS ORGASMO, reliquis frequentior; venæ sectionem; purgantia antiphlogistica — R. Salis tartari ℥ij. solve in acet. acerr. s. q. pro una vice mane sumendum; nitrum; spir. acidus; acet. destill. ad ℥iſſ. per vices, de die; emulsiones; serum lactis, ope acetosell. pptum, fol. & flor. hyper. anagall. & agrimonix alteratum; alimenta, sub insania atrabiliaria notata; hæmorrhagias, nuperrime suppressas, revocantia & externa sub M. M. gen., exigit. Ctr. M. M. spec. cephalalgix, ubi quoque curatio *insania cacochymicæ, a vermibus in intestinis & sinus frontilibus hospitantibus; a metastasi lactis &c. a sordibus primarum viarum, a venenis &c.* descripta est.

AD INSANIAM PERIODICAM cort. peruv. tandem in usum vocandus. Ad morbum complicatum feligantur, combinentur remedia convenientia, sub variis speciebus descripta. Melancholicus ex dispositione hæreditaria, animi affectibus & atra bile, usu largiori extracti anagallidis garayani & tartari tartarifati perfecte & constanter convaluit. Fœminæ nonnullæ gravidæ partu, aliæ graviditate, ab insania liberantur.

ICTERUS.

Cæ, quidquid bilis secretionem, potius vero excretionem, in duodenum impedit, ductus

H 2

ctus

ctus biliarios obturando, comprimendo, constrin-
gendo.

1.) Bilis spissior & calculi vesiculæ fellæ
commoti.

2) Pituitosa, viscida colluvies, in duodeno
hærens & se osculo cholidochi opponens, a cibis
dispeptis, glutinosi; potu aquæ argillosæ, topha-
cæ, cerevisiæ acefcentis; meconio tenaci; colo-
stro caseoso; colon fœcibus induratis turgens.

3) Hepatis vitia varia, infarctus, scirrhi,
steatomata &c. lienis obstructio eorumque cau-
sæ; glandularum arteriæ hepaticæ intumescen-
tia, ex glandularum meseraicacum obstructione
eveniens. Quamvis omnia hæc sine ictero ad-
esse possunt.

4) Spasmus, ab animi pathematibus, ira
&c. venenis, morsu viperæ, felis &c. drastici,
vermibus; a podagra, scabie, tumore pedum &c.
retrogradis; & per consensum, a læsionibus, do-
loribus, vicinarum & remotarum partium excita-
tus; spasmus hystericus, hypochondriacus. De-
teguntur diversæ hæc causæ ex prægressis & ex
symptomatibus morbisque cum ictero conjun-
ctis. Concurrunt & aliæ causæ bilis copiosioris
ingenerationi & alterationi faventes, ingesta quæ-
dam, exæstuationes, anni tempus, temperamen-
tum, idiosyncrasia.

M. M. ICTERO a CAUSA NRO. I. vide in-
fra, sub calculis vesic. fell. laudantur quoque
quotidianus usus vitell. ovar. recentium & Ba-
sapon. ven. Ꝟß. solve in aquæ fumar. Ꝟi, adde
syrupi fumar. Ꝟij. rhei el. Ꝟiß. ms. D. omni
bihorio coehl. ij. ex fero lactis copioso.

M. M.

M. M. ICTERO a CAUSA Nro. 2. vide sub digestionem laesa. Sæpissime vomitoria & clysmata interponenda sunt.

M. M. ICTERO a CAUSA Nro. 3. vide sub infarctu viscerum. Valent imprimis succus rad. tarax. pilulæ viscerales N. cum saponem venet. rad. ari rec. extr. rubiæ, & cicuta combinatæ, ex liquore terræ fol. tartari & sulphure aur. antimon. potabili, aqua diuretica dilutis, sumendæ, nec non conserva milleped. Kleinii R. conserv. fumar. ℥j. extr. fumaricæ ℥℞. terræ fol. tartari ℥ij. surup. fumar. q. s. ut f. elect. D. ter de die ad nucis jugland. magnitudinem & decoct. merac. rad. graminis, cichorei, ari, curcum. rub. tinct. glandium ilign. exsiccat. herb. mar. rub. alb. scolopendr. fumar. salv. flor. cheiri sem. aquileg. cum sero lactis, adjecto tartaro tartarifato pptum & sro viscerali (vide obstructionem viscerum) vel syrupo viscerali, vel oxymelle scillitico edulcoratum, diutius usurpanda.

M. M. ICTERO a CAUSA Nro. 4. vide sub colica & calculis felleis. Ictericis vero plethoricis, diathesti calida sicca, (vid. causas gener. 10, -b-) & bilis fervore laborantibus, ubi fæces sunt liquidæ, biliosæ, acres, remedia antiphlogistica, diluentia, sedantia, serum lactis; acida cum lacte &c. cathartica lenia, ex tamarindis, cassia, &c. indicantur. *In morsu viperarum* R. salis vol. oleos. ℥℞. laud. liq. Syd. gtt. xv. syr. diacod. ℥j. aquæ still. rut. ℥v. D. omni hora cochl. i. superbibendum infusum theæ.

ICTERUS, EX HEPATE, VENTRICO, &c. *inflammatis*, sublata inflammatione; *ex utero gravido*, venæ sect. & factu excluso; *febris intermittenibus autumnalibus superveniens*, obstructione hepatis sanata; *criticus salubris*, sub declinationem februm continuarum succedens transpiratione aucta, sponte cessat. In quavis fere specie, cholagoga, rhabarbarina interponenda & enemata; cataplasmata; empl. discutiens, unguentaque cum lenibus frictionibus; & colore flavo disparente, roborantia, cort. peruv. martialia adhibenda.

HEMORRHAGIÆ &c. EX SANGUINIS DISSOLUTIONE serum lactis aluminatum & cort. peruv. exigunt. *Icterus periodicus a viro febris intermittenis*, non a calculis vesicæ felleæ dependens, catharticis & cortice sanatur.

CALCULI & AMURCA BILIOSA TENAX, VESICULÆ FELLEÆ.

Mœrori & iræ subjectis; litteratis; inprimis vetulis; calculis urinariis laborantibus familiares; arguuntur ex molesto tensionis & ponderis sensu, circa præcordia; quandoque cardialgia aliquot a pastu horis eveniente; tunc flavedine in cantho oculorum majori & urina magis tincta; postea doloribus subitaneis, intolerabilibus, cardialgiam vel colicam referentibus, nec non vomitu enormi, interdum bilioso & febre, non diu quidem durantibus, ictero subsequente, qui post aliquot septimanas vel menses redit & tandem manet perpetuus. Excretio vero calculorum, ut plurimum inflammabilium & aqua

aqua leviorum, vel amurcæ biliosæ, cum ictero periodico, criterium dant certissimum.

M. M. in paroxysmo decoct. spec. pector. vel hordei cum rad. alth. liquirit. pareiræ brav. herb. malv. salv. flor. sambuci, chamom. verbasci croco & melle vel syrupo althææ pptum & emulsio feminis cännabis, cum lacte mixta, crebro & copiose sumenda; quò & vomitiones salutares sublevantur. Ex supra dictis speciebus cataplasmata, adjecto saponè ven. ppranda, regioni hepatis continuò imponenda & simile decoctum, cum urina vero recenti pptum, crebro ano injiciendum; sapius laxans, ex mannæ ℥ij. cremor. tartari ℥iſſ. nitri gr. xij. & ol. amygd. dulc. ℥iſſ. simul, per vices sumendum. Urgente vero dolore & vomitu, præmissa interdum venæ sectione, opium in emulsione oleosa manna adhibendum. Cfr. *M. M.* gener. colicæ. Remittente paroxysmi savitia, R. sapon. ven. ℥iij. antimonalis ℥ſſ. ſſri ℥ij. ol. amygd. d. ℥i. ol. anisi chamom. destill. aa. ℥ſſ m. f. massa. D. omni-bihorio ℥ſſ. Hacce cum potu diluente, emolliente, eccoprotico, aliquamdiu usurpato, balnea domestica adhibenda & dein æger in ipso balneo catharticum sumat. Post paroxysmum, ægroto, sæpe de morbo parum molesto, latente, securis *M. M.* ictero, a causa Nro. 3. suadenda.

HYDROPS.

Colluvies laticis lymphatico serosi, vel in textu celluloso, vel in cavitatibus cerebri, thoracis, testium, uteri, abdominis, ibique vel inter

H 4

perito-

peritonæi lamellas, vel in distinctis vesiculis. Unde anasarca, hydrocephalus, in- & externus, hydrothorax, hydrocele, ascites, hydrops sacculus, ovarii &c. &c. Ascites incipiens difficilius dignoscendus conjicitur ex appetitu dejecto; ariditate faucium subinde recurrente; siti; cutis siccitate; subsultibus somno; urina pauca rubra; torpore; gravitate; strictura pectoris; dispncea nocturna; duritie abdominis, tactu percipienda; lento abdominis tumore; pedum œdemate, matutino tempore minori, sensim ascendente, femora & scrotum occupante. Accedit fluctuatio; hernia aquosa; anxietas; orthopncea; alvi constipatio; aquæ stagnatio & reliquorum humorum alkalescentia; unde urina fœtida, lixiviosa; febricula increescens; sitis intensissima; tussis & lethalis tenesmus; constrictio colli; diarrhœa; hæmorrhagia; gangrana. Hydrops peritonæi ab ascite per sequentia signa internoscatur; ille multo lentius, quam hic sine pedum tumore increfcit; foeminis potissimum familiaris est, ob gestatas thoraces arctiores &c.; vigor corporis, faciei color naturalis, cum actionum incolumitate hic persistunt; urina magis naturalis; nulla febricula, nulla spirandi difficultas & sitis; nullus dolor, nisi morbo diutius progresso, nullumque levamen ex usu purgantium & diureticorum; fluctuatio minus perceptibilis, aliaque quandoque tumoris abdominalis figura. *Hydropis causæ*, quidquid laticis serosi vel lymphatici affluxum copiosorem procurat, ejusque resorptum & refluxum ad cor impedit, vim vitæ infringendo, vascula exhalantia dilatando, constringendo, stimulando, bibûla & venas majores obstruendo, vascula lym-

lymphatica rumpendo, humoribus lentorem, acrimoniam & dissolutionem inducendo, quo spectant Cæs gener. Nro. 3, & 10, infarctus, scirrhi viscerum, crebrius hepatis & lienis; obstructio glandularum meseraicarum eorumque causæ, inprimis Cæs gener. Nro. 1, — b — c — 4, 5, — a — d — & — e cacochymia varia Nro. 9., icterus inveteratus; asthma; polypi cordis &c. saburra verminosa. *M. M.* Aquæ stagnantes evacuandæ, vomitu, purgatione, diaphoresi, tutius diuresi; nec non scarificatione & paracentesi. Simul causæ recentis emendandæ & postea tollendæ, quo præcipue debilitas & lentor, tam causa, quam effectus morbi pertinent. Huic scopo inserviunt tartarus emeticus in aqua solutus, in minimis tandem dosibus crebro exhibitus; rad. jalapp. aquæ Selizenses vel per se vel cum acidulis martialibus aut aquis diureticis, baccarum nempe juniperi fol. petrosel. chærefol. Valerian. fragariæ, fœniculi mixtæ; ℞. Scamoni ʒj. antimoni crudi, croci martis aperitivi aa. ʒʒ. ms. exhibeantur grana xx. de die in forma electuarii vel boli. (Efficacissimum remedium, cujus autor famosus ille Dowerus est. Perplures enim hydropicos & ad incitas redactos, gangrena jam partes externas occupante, ex orci faucibus eripuit.) Cremor tartari, vel per se, vel cum rheo aut cort. peruv. combinatus vel in cyatho aquæ Fachingensis solutus & sub effervescentia ter de die ad ʒj. exhibendus; oxymel colchicum aut per se, aut cum liquore terræ fol. tartari, spir. nitri dulci & syrupo papaveris alb. mixtum ad cochlearculum unum aut alterum,

H 5

omni

omni bihorio sumendum; pilula scill. Edinburg.
 cum mercurio dulci mixta; remedia sub ictero
 a causa Nro. 3. descripta; pulvis ex colomel.
 sulphure aur. antimonii, millepedibus, æthiope a-
 nimali & sale vol. succini conflatus, superin-
 gestis aquis diureticis supra nominatis. ℞. Sa-
 pon. antimonialis extr. tarax vel. cichorei aa.
 ℥i℥. solve in liq. terræ fol. tartari ℥j d. f.
 omni trihorio gtts 50 — 60. — ℞. Conser-
 va milleped. Kleinii ℥i℥. rad. ari recentis, cum
 mucilag. gummi arab. tritæ ℥ij. nitri depurati
 extr. absynth. aa. ℥j. scillæ ℥i. roob junip. ℥i.
 ms. f. electuar. D. ter-quater de die cochlear-
 culum unum aut alterum. — Præmissa & in-
 terposita solutione salis tartari ℥ij. in aceti a-
 cerrimi f. q. ad saturationem, mane sumenda.
 — ℞. Mixturæ simpl. bene camphorata, liq.
 terræ fol. tartari vel spir. Mindereri vel solu-
 tionis sal. cornu cervi puriss. in f. q. aceti scil-
 lit. extr. trifol. fibr. aa ℥℥. oxymellis scill.
 vel colchici ℥ij-iv. aquæ diuret. ℥ij. ms. D. qua-
 ter, sexies de die cochl. i-ii. cerevisiæ & decocta
 cum radice quassia, vincetox senegæ. rub. tinct.
 pimpin. alb. cort. ulmi, baccis junip. strobulis
 pini, summitatibus genist. cum floribus, herb. fra-
 garia, ononid. cum flor. scordii sem. fœnic.
 Danci ppta. In quibus pro re nata ferrum
 candens exstingui, roob ebuli, juniperi, syrupi de
 spina cervi & rad. quinque aperientium solvi
 possunt; clysmata similia, adjectis pulv. scill.
 ℥ij. parva portione, sed crebrius appda; vinum
 medicatum, ex vino acidiusculo, cui lapid. cancr.
 vel cineres genistæ admiscentur. Hydragoga
 for-

fortiora, malo recenti, robustis, phlegmaticis, visceribus plane illæsis dicata sunt; evacuantiâ lenissima, cum analepticis roborantibus & blande nutrientibus nupta, debilibus ex causa gen. Nro. 3, & 10; incidentia, visceralia, imprimis *enemata* lentori humorum, obstructis visceribus; ex iisdem aciora, frigidis; acida vero, cremor tartari, succi; temperiei calidæ, plethoræ ex causa gener. Nro. 4., & alkalescentiæ morbo aucto magis familiari conveniunt; aliena hic calida, stimulantia oxymell. scill. & colchic. cujus usum quoque interdicut, feri inflammatio, spasmus vehemens & scirrhi exulcerati. Subjungenda quandoque remedia feri & sanguinis evacuationes, transpirationem &c. menses, hæmorrhoides &c. suppressas revocantia, cacochymiam variam cicurantia, antivenerea, antiscorbutica &c. acresque humores retentos, retroactos, ad sua loca, insitione scabiei &c. invitantia (vide cephalalg. serosam) anthelmintica. *Puer anasarca rebeli, ex scabie retropulsa orta diu laborans, insitione scabiei brevi sanatus fuit, alii eodem morbo detenti balneo sicco, ex foliis betulæ calefactis preparato, orto hinc sudore copioso, convalescerunt.* In plerisque speciebus diætâ tenuis ex alimentis nec laxantibus, nec septicæ indolis, carne oxifacharo condita, oleribus cichoraceis, cœna parcissima; in nonnullis abstinentia a potu; motus corporis; frictio mollis, cum oleo olivarum; epithemata, emplastra discutientia suadenda. Siti, calori, tussi &c. ex alkalescentia, spiritus acidi; erosionibus ungt. nutritum, cum populeo. mixtum; instanti gangrenæ fomentationes, eum decoct. cort. peruv. fol. alliarie & rutæ
meden-

medentur. Aquis vero, aut remediis internis, aut scarificatione aut taleolis rad. bryoniae, leniter contusis, calefactis & cruribus appris, aut paracentesi lenta, ne derivatio subitanea fiat; aut beneficio naturae eductis, roborantia ex marte & cort. peruv. interpositis diureticis, sale tartari ad \mathfrak{z} j, in infuso baccarum juniperi soluto vel \mathfrak{z} . Terebinth. pur. \mathfrak{z} ij. pulv. gent. q. s. f. pilulae gr. ij. D. omni trihorio pilul. v. propinanda & partes flaccidae fasciis fumo aromatico aut spirituosus imbutis, deligandae. Iisdem remediis oedemata pedum, ex mera atonia partium externarum curantur. Scrotum aquis distensum, aqua calcis, cinere spongiae combustae alterata fovetur. Venae sectiones & opium rarissime locum habent. Primam indicant plethora ex sanguinis evacuationibus suppressis &c. inflammatio, dolor vehemens; alterum vero spasmi, dolor, ex violentia externa &c. & dispositio hysterica.

HYDROPS PECTORIS varias thoracis cavitates & pericardii ipsosque pulmones occupans, tussim & asthma inveterata, pulmonum inflammationem, cordis morbos, hydrocelen & oedema pedum discussa; refrigerationem corporis calentis; scabiem repulsam &c. plerumque excipiens, divinatur ex progressu sensu ponderis prementis ad diaphragmatis margines; dyspnoea; oppressione, repente, a primo somno quandoque excitantibus, auctis erecto corpore, diminutis vero supino vel in alterutrum latus decubitu; tussicula; siccitate faucium; siti; sensu frigoris crebro affligente; palpebrarum inferiorum, pedum manuumque oedemate, cito apparente; scroti tumore & ad ejus augmentum vel decrementum decremento

to vel incremento symptomatum; urina pauca, lateritia; ex dolore dorsi & scapularum, interdum lypothimiis; pectoris tumore, dolore, torpore, vel paralyfi incipiente brachii & strepitu ex concusso pectore. Quorum vero pleraque signa haud perpetua sunt.

M. M. Præter remedia supra descripta magni auxilii sunt: R. Liq. terræ fol. tartari ℥℥. spir. nitri d. ℥ij. oxymell. colchic. ℥v. D. omni hora cochlearculum ex decocto meraco rad. seneg. & rub. tinct. (qua formula, hydrothorax, in sene, cum orthopnoea, suffocationem minitante, ex tumore hepatis enormi, post podagram retrogradam enatus, efficacissimis incasum tentatis, miro modo, brevissime sanatus, materia arthritica ad articulos migrante; tumore disparente & lotio copiosissime fluente) nec non fomenta ex rad. levistici bryon. foliis rec. ebul. marrubii, arnica, scordii, absynth. & sem. carvi vino & aqua calcis incoctis; linimentum volatile, thoraci; pediluvia, fonticuli, scarificationes, folia betulae calefacta pedibus appda; tandem setaceum, per scrotum transmissum & paracentesis, si de morbo certi esse possumus.

DE HYDROCEPHALO vide infantum morbos.

HYDROPS IN CAVO UTERI LATENS, a gravitate bene distinguendus, mammarum mollitie, tumore pressioni cedente & fluctuante; præter interna, frictiones; fomenta supra notata; emplastrum Galbani; balnea; vapores; injectiones; enemata, ex speciebus emollientibus, adjectis postea uterinis exposcit. Denique orificium uteri, stylo mutico referandum & evacuatis aquis, inje-

injectiones deterſivæ inſtituendæ. Eadem ſere
M. M. tympanites uteri curatur.

HYDROPS OVARII ſterilibus & vetulis magis
 familiaris, e tumore in uno vel altero hypoga-
 ſtrio duro, diu haud moleſto, paulatim, abſque
 notabili actionum leſionē, ſine magna coloris
 cutis mutatione increſcente; interdum e crure
 ejuſdem lateris œdematoſo & ejus crebriori fu-
 dore ſuſpicandus, (Cfr. ſigna hydropis peritonæi)
 vix curabilis eſt. Abſint remedia fortiora, con-
 cuſſiones abdominis. *Anaſarca & aſcites in*
euſplanchnicis balneo ſiccō, ex foliis betulæ ca-
 leſactis ppto, vel totum corpus iisdem involven-
 do, ſudore copioſiſſime erumpente, brevi ſanati
 ſunt.

HYDROCELE vel ſerotum in- & exter-
 num cellulofum vel involucrium vaginale vel ſac-
 cum hernioſum occupat. *M. M.* Priores ſpe-
 cies, anaſarcæ cura & externis ſub hydrocephalo
 notatis diſcutientibus roborantibusque remediis
 & denique ſcarificatione, paracentefi longoque
 vulnere ſerotum, ultima aſcitis & herniæ radicali
 cura ſanantur. Ne cum hydrocele tumorem du-
 rum teſtis aliumve inflammatorium, ſarcocelen
 confundas, quæ recens, ſequenti epithemate ca-
 lide impoſito ſæpius ſanata eſt — R. Aquæ cal-
 cis viv. ℥viij. tincturæ ſuccini largiter campho-
 rata ꝑj. lapid. calamin. ppt. tutiæ pptæ aa. ℥iij.
 ms. —

TYMPANITES.

Vel intumeſcentia inſignis abdominis, a ma-
 teria elatiſtica, fermentante, flatulenta, ſæpe pu-
 trida,

trida, in tubo alimentario, rarissime abdominis cavo & textu celluloso contenta; ascitis mox causa, mox symptoma; a qua distinguitur, per ventris tumorem, anterieus magis prominentem; sonitum percussu ventris; defectum fluctuationis & reliquorum signorum ascitis; interdum per borborygmos & per levamen, fugax quidem, erumpentibus flatibus; per levitatem ægri ad stateram.

Cæ nonnunquam obscuræ, complicatæ, digestionis læsæ & mali hypochondriaci & icteri; atonia summa intestinorum, cum sensibilitate & spasmis sæpe junctis, ex prægressis, colica, ileo, opiatorum, drasticorum abusu, fluxu alvino male tractato, aliisque morbis & causis, spasmodicas stricturas & insequentem relaxationem intestinis insistentibus, oriunda; sæpius Csa gen. Nro. 4, metastases, saburra mucosa, viscidissima & verminosa colluvies; rarius inflammatio intestinorum incipiens; atra bilis turgens, tabes putrida viscerum abdominis; ibique collectæ aquæ putrescentes, *M. M.* varia pro diversis causis. Cfr. curam digestionis læsæ, & mali hypochondriaci. Ex his valent imprimis pulvis roborans; infusum saturatum specier. nervin. & rad. quasi. & cort. peruv. vel cascarill. decoct. malor. aurant. virid. chalybeatum, quandoque elixirio acido acidulatum frigide pro potu ord. exhibendum. *R.* ssi alb. \mathfrak{z} ij. ol. destill. menth. gtts. v. in mortario vitreo bene subactis adde syrup. menth. \mathfrak{z} ss. aquæ menth. \mathfrak{z} x. spir. menth. \mathfrak{z} ß. m^s. *D.* omni bihorio cochl. *I.* — Elixirium Roberti Whytt cum spiritu nitri dulci vel mixtura simpl. mixtam; præmissis & interpositis interdum

dum catharticis, cum antispasmodicis mixtis, mixtura antihypochondriaca Hallensi; vel antiemetico Riverii mox per se, sub actu effervescentiæ, mox cum extr. quass. aquæ menth. tinctura rhei Darelî & pauxillo opii combinato, largius exhibito; clysmata antispasmodica, carminativa, subfrigida, vel ex fumo tabaci; frictions arom. fomenta sicca vel ex aqua frigida; cingula sub malo hypoch. ordinata, sensim constringentia, nervina; motus corporis. Spasmi vel dolores ex spirituum ataxia, urgentes, quandoque antibysterica, opiata, parca dosi exigunt. Spasmi vero & dolores ex plethora Csa gen. 10. b. & inflammatione incipiente v. snem, reliquaque antiphlogistica & emollientia, sedantia petunt. Si fluxus s. & feri suppressi & stagnationes in systemate ven. port. & uteri vasis, uti sæpius accidit, in culpa sunt, ipsi revocandi vel artificialibus supplendi & remedia ad obstructionem viscerum, præcipue clysteres viscerales, experti hic usus, crebriores adhibendi. Eadem ad saburram viscidam superandam valent. *Tympanites ex eroso intestino, corrupto viscere & vulnere vesiculae felleæ incurabilis est.* Huc pertinet *emphysema universale* vel cutis flatulenta & elastica intumescencia strepitum sub tactu edens, a variis causis internis, sæpius externis, vulneribus &c. enata, catharticis, diureticis, tonicis, fomentis discutientibus, frictionibus, scarificationibus & inprimis electrificatione sanandum.

CALCULI RENUM ET VESICÆ

Diagnosis difficilis quidem calculorum renum, formatur ex prægressis, dispositione hæredi-

reditaria, causis cognitis; ex dolore fixo, in alterutra lumbari regione, crebrius sinistra, raro in utraque faviente, juxta ductum ureteris, oblique versus vesicam sese extendente, ad serobiculum cordis progrediente, ibique acerbis, cum nausea, vomitu, a unctione in rheda, s. exaltatione &c. recurrente; (a dolore vero, renum regionem occupante rheumatico, scorbutico, vel ex vitio pancreatis, mesenterii, moliminibus hemorrhoidalibus, vermibus, aneurismate, abscessu, carie vertebrarum &c. ibidem latentibus enato, bene distinguendo;) tenesmo frequenti ad urinam reddendam; urina initio paucis, aquosa, acris, aestu cruenta, turbida, arenosa; faemoris stupore, dolore; testiculi retractione.

CALCULI VESICÆ vero præsentiam patefaciunt recensita signa prægressa; dolor in hypogastrio, in excernenda urina, cum lotii diminutione aut crescens, aut quandoque cessans; pondus in perinaeo assiduum; stranguria aliæque difficultates urinæ, turbide, graveolentis & sedimentum crassum deponentis, sub decubitu horizontali facilius fundendæ; alvi simul tenesmus; incessus cruribus divaricatis; frequens in glande penis pruritus; membri erectio; contactus digitis ano vel vaginæ immerfis, tandem catheter, nisi calculus membrana sit inclusus. Mentuntur vero calculum vesicæ fungus, excresecntia, scirrhus vesicæ, ejusque vasorum infarctus.

Cæ: lotii profluvium retardatum, stagnatio, putredo; corpora heterogenea, ipsi inharrentia, viarum urinaryum laxitas innata, aut acquisita, spasmus, compressio, læsio, ulcus, pus, grumi sanguinis; diuturnus decubitus; vita sedentaria; obesitas;

I

fitas;

fitas; humores viscosi viscera obstruentes, sæpius chylofis depravata, ob glandularum meseraica-rum oppilationem; materia arthritica, tartarea. Sæpe aquæ & vini, peculiaris conditionis potus, dispositis calculos, uti strumas (in certis regionibus multo frequentiores, in aliis rarissimos) ingenerant.

M. M. In paroxysmo, vide sub colica & calculis felleis; quo spectant, liq. terræ sol. tart. cum quinta parte laud. liq. Syd. mixtus ad gtt̄s 50-60. exhibitus, vel mixtura Riverii cum opio, oleum animale cum spiritu nitri dulci mixta; elect. de manna — R. Olei amygd. d. ℥j. bals. peruv. gtt̄s xxx. syr. alth. ℥j. mucilag. gummi arab. ℥ss. accurate terendo subactis admisce paulatim aquæ fœnic. ℥iv. petrosel. ℥viiij. ut f. emulsio, D. quavis 1/2. horæ cochl. i. — R. Extr. cascarill. tereb. ven. aa. ℥ss. opii gr. iv. ms. f. pilul. gr. i. pond. D. semel, bis de die Nro. -vj. pro potu acidul. Fachingenses, Selteranæ, Emb-senses cum lacte & syr. diacod. mixta, vel decoctum saturatum rad. altheæ gram. dauci & liquoritæ, adjecto mucilag. sem. cydon. v. f. balnea, ex speciebus emollientibus & capitibus papav. parata; cataplasmata similia; ugtum altheæ cum uncto anodino mixtum; emplastrum de labdano ad regionem lumbarem; clysmata emollientia, adjectis electuar. lenitivo & nitro, crebriora; injectiones oleosa in vesicam. Calculi in urethram impacti egressus promovetur, urethram laxando, sub calculo comprimendo, inflando, fugendo, oleum injiciendo, calculum tenaculis, foreipe Halleii adprehendendo, urethram dissecando.

M. M.

M. M. extra paroxysmum. Conveniunt aquæ minerales, Fachingenses, Carolinae, Embesenses, Selteranae; vinum acidulum, in cuius $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ostracoderm. recent. calcinat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. extinguantur; succus betulæ; infusum herb. absynth. plantag. aquat. uvæ ursi, cum decocto saturato rad. rub. tinct. asparg. lupuli, seminis dauci & baccar. juniperi pptum & cum lacte capr. mixtum, adjectis, aut liquore nitri fixi, aut elixir. acido Dipp. omisso tunc lacte; serum lactis cort. rad. acac. sylvestr. radice cichor. filipend. herba chærefol. hederæ terrestr. scolopendr. urticæ & succo raphani alteratum, & similia clysmata; vinum medicatum ex cortice rad. acaciæ, ononidis, peruv. & radice gentian. rubr. ante epulas; condimentum rad. armorac. sub cibis; rheum masticatum; pilula viscerales N. cum saponem v. vel antimoniali mixtæ; pilul. scill. Edinburg. ex aqua antinephritica dispens. Leidens. & Amstelod. — R. Ol. dest. cort. aurant. gtts. iv. f. cum stri albi $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. elæosacharum, cui adde uvæ ursi $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, gummi arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. rad. jalapp. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ms. D. singulis vel alternis diebus; aqua calcis ostrearum cyathus unus aut alter, de die cum saponis v. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ - $\mathfrak{i}\mathfrak{v}$ - $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ — per plures menses usurpandum; mutatio putei suspecti, saltim ejus aqua destillata adhibenda. (vide elix. & elect. ad hydropem & remedia ad glandularum & viscerum abdominis obstructionem & ad arthriditem ordinata.) Externe ball. Pareir. brav. &c. victus magis vegetabilis; motus corporis. Temperies & causæ variæ, selectum remediorum, non ubivis tutorum, determinant. Acida e. gr. temperiei calidæ, sicca, biliosæ, alkalescenti, urinæ putredini

I 2

dica-

dicata sunt; alkalina verò, aqua calcis &c. in humorum lentore, acido, austero, magis proficua sunt. Nonnunquam *grumi sang. ureteribus impacti, aut exitum ex vesica molientes, nec non infarctus vasorum vesica*, ex hæmorrhoidum vel mensium suppressione aut hæmorrhoidibus vesicæ oriundi, dolorem ex calculis, quandoque ischiaticum mentiuntur. *In priorè casu cura sub paroxysmo calculi descripta adhibenda. In altero eadem, tentatis simul catoplasmate, ex fol. alth. hyoseiami, semine lini & cepis, sub cineribus assatis, pubi & perinæo imposto, balneis & clysteribus emollientibus & emulsione. R. Aceti scill. ℥ij. ol. tartari per deliq. q. s. ad saturat. ol. amygd. d. ℥j. cum vitell. ov. q. s. vel mucilag. gummi arab. subacti, nitri ℥℞, aquæ ceras. n. ℥iv. syr. de alth. ℥℞. D. omni 1/2. hor. cochl. i. Polypi cathetere removendi & emissio lotio, decoct. rad. alth. sem. lini, adjecto sapone calide injiciendum. In tertio. v. f. nitrata, papaveracea, balnea, pediluvia, clysmata, fots, hirudines, & denique saponacea, acida, & præparata ex rheo rad. valerian. & cort. peruv. adhibenda sunt.*

NEPHRALGIA PITUITOSA, ex prægressis temperie phlegmatica & urina viscida, alba, cognoscenda, diuretica paulo acriora, sub hydropæ descripta; oleum juniperi in emulsione balsamica supra recensita; cathartica mercurialia; vesicatoria; cucurbitas; cataplasmata; uncta ex sapone nigro, cepis assatis, oleo lauri, juniperi & camphora, ad lumbos, exposcit.

NE-

NEPHRALGIA VERO HYSTERICA VEL HYPOCHONDRIACA, cujus criterium inter alia urinæ albæ copiosa excretio dat, carminantibus, fœtidis & opiatis curatur.

ULCERA RENUM & VESICÆ, ex prægressis calculo, inflammatione, contusione aliisque læsionibus; ex acribus, excoariantibus, huc delatis; ex urina instar feri lactis turbida; vel & cruenta, graveolente, sedimentum crassum, glutinosum, purulentum, flocculentum, membranosum deponente, cognoscenda, cathartica lenia, diluentia, demulcentia, detergentia, vulneraria exigunt; elect. ex manna, tamarindis & rheo pptum; emulsiones; lac ebutyratum; lac, cui bals. de cobaibe agitatione admiscetur; acidul. martiales cum lacte; pilul. ex succo liquirit. extr. myrrh. & paxillo terebint. constat. decoct. rad. alth. dauci hort. herb. botryos, flor. hyper. cum lacte & aqua pptum, limacibus contus. alteratum, melle edulcoratum; ejusmodi injectiones ingerantur in vesicam & anum. cfr. M. M. sub phthisi exulcerata & mictu cruento.

ISCHURIA VERA & SPURIA, DY- SURIA & STRANGURIA.

Cfæ I.) Renes, ureteres, vesica calculo, arenulis, pituita, pure, grumis sanguinis, infarctu vasa vesicæ distendente; inflammatione, ulcebus & inde excitato spasmu, male affecti.

2) Eorum atonia paralytica, a retentione urinæ diuturniori &c.

I 3

3) Com-

3) Compressio, irritatio, a vicinis partibus, utero prolapsio, gravido, hydropico; intestinis amurca fermentante, scybalis, tumore hæmorrhoidali obsessis; hernia aliæque extra vesicam positæ causæ, unde ejus collum comprimitur.

4) Urethra calculo, grumo sang. mucos. pure, tumore prostatae &c. calloso, fungoso, inflammatorio, venereo, obstructa, compressa; eadem coalita.

5) Acrimonia lotii, a cerevisia fœculenta; vino fermentante; cantharidibus; draclicis; a discrasia humorum senibus familiari, ejusque diathesis pituitosa.

6) Transpiratio suppressa, post refrigerationem, serum arthriticum, scorbuticum, herpeticum &c. remanens, retropressum.

7) Spasmi hysterici, hypochondriaci.

M. M. generalis. Eccoprotica; clysmata emollientia, quibus interdum aquam vegeto-mineralem admisce; olea blanda, nonnunquam juniperi. *R.* Mannæ el. ol. amygd. d. syrup. de alth. aa. ℥j balf. peruv. gtts. xxx. nitri depur. ℥ss vitell. ovor. Nro. i. accurate terendo subactis admisce paulatim aquæ foenicul. ℥iv. petroselini ℥vj. ut t. l. a. emulsio. *D.* quavis 1/2. hor. cochl. i - ii - iv. — *R.* Spir. cornu cervi ℥ij. aceti scillitici ℥ss tyrap de crys. lob. ℥ij. laud. liq. gtts. viij. *D.* omni 3. horio gtts. l. succi expressi cochleariæ, limonum, chærefol. plantag. cum syr. alth. mixti & omni trihorio ad ℥iv. ex decocto saturat. pectorali & rad.

rad. valerian. & fœniculi nitrato fumendi; potio ex sale absynth. aceto scill. saturata, aquis diuret. diluta, syr. de alth. vel diacod. edulcorata; decoct. gland. ilign. parum tostar; linimenta ex oleo chamomill. destill. & cocto mixto; cataplasma, adjectis cepis assatis; vapores ex raphani rust. decocto ad renum regionem, pubem & perinæum; epithema frigidum ad plantas; empl. de galbano croc. cum hyosc. & ol. cornu cervi fact. ad lumbos; terebintina iisdem affricta; injectiones; balnea emoll. (vide remedia sub calculorum paroxysmo descripta) interdum v. f. aliaque remedia antiphlogistica; hirudines ad anum; catheteris applicatio, ejusdemque, flexilis quidem retentio. Si vero hæc locum non habent, tandem ad punccionem in perinæo progrediendum.

M. M. Specialem a causa prima, vide sub calculo & mictu cruento.

A 2da vide sub paralyfi. Perinæo ol. chamom. dest. cum cocto mixtum affricandum.

A 3tia sublati variis causis curantur; e. gr. hirudines ano appdo. Si de vermiculis vesicam occupantibus suspicio est, aqua mercurialis injiciatur.

A 4ta manu chirurgica egent, vide luem veneream.

A 5ta cathartica, diluentia, antizymotica, demulcentia, emulsiones; decoct. spec. pest. aqua Faching. Selter. cum lacte; clysmata emoll. pulvis lapid. caner. pptus cum baccharum lauri, ex decocto summitatum anethi &c. fumendus. Si

vero a mucō venit, incidestia, stimulantia, catheter, vide cephalalgiam pituitosam. *Cfr. M. M. general.* & sub mictu cruento designatam.

A 6ta M. M. general. subjonctis aromaticis & opiatis, *cfr. M. M. arthritidis anomala.*

A 7ma antihysterica, opiata, tandem roborantia.

AD HERNIAM VESICÆ isehuricæ effectum & causam, compressio lenis, frictio, fascia & epithema roborans, tumori appda.

MALUM EX SUBLUKATIONE SPINÆ VERTEBRARUM, OSSIS FEMORIS; EX TISULIS, CONTUSIONE *pubis* & *peritonæi*; *pene vel vagina imperforatis* & *ex muscutorum abdominis vulnero oriundum*, chirurgiam exposcit. Vix curabile est, ex scirrho, callo, paralyfi perfecta vitioque male conformationis vesicæ &c. & calculo majori.

DIABETES.

Sive profusio nimia, potionum copiam excedens urina, in aliis aquea, cruda, in aliis pallida & turbida, aut crassa, in aliis melle quasi tincta & simul dulcis; siti ingenti; lumborum & coxæ dolore, viscerum & præcordiorum aestu affligens & corpus tandem tabe consumens. *Cæ:* renum relaxatio, sanguinis dyscrasia, dissolutio, in serum, interdum putridum; ejus versus renes invitatio, congestio. Quibus vitiis occasionem dant chylosis imperfecta, ob dyspepsiam, sordes pr. viarum, vermes, sæpius ob glandula-

dularum meseraicarum obstructionem, crebro latentem, debilitas. Vid. Csas gener. Nro. 10. morbi spasmodici; scabies &c. repulsa, transpiratio suppressa ex refrigeratione &c. atra bilis; abusus potus tepidi theæ, diuretici, spirituosi; miasma incognitum; an cutis inhalatio nimis aucta? Cfr. causas ischuricæ.

M. M. Humores a renibus revellendi, renes roborandi, sanguis corrigendus, compingendus, cause occasionales evitandæ & tollendæ. Huc faciunt rhei, tandem tolli constans usus, ejus & mastichis masticatio; pulvis vel extracta cort. peruv. lign. campech. & uvæ ursi, ex tinctura rosar. sumenda — R. Martis solubilis ℞. nitri puri ℞. ſti ℥i℞. ms. D. omni 4. horio ℞. — ℥ij — emulsio ex gummi arab. & amygd., serum lactis aluminatum; decoct. gland. quere. tostarum, vel rad. consolid. maj. altheæ sol. Lysimach. chalybeatum; vel decoct. rad. quassia, cum pauxillo spir. vitrioli mixt. frigide haurienda; tandem opiata, trochisci de earabe ad ℥℞. si spasmi & transpiratio suppressa peccant, adhibenda. Externe ungt. comitisf. vel oxyceratam, lumbis cum fricatione vel vesicatoria appda, quandoque tinctura cantharid. balnea laconica, locum habent. Simul potus parcus, meracus, vinum Pontak &c. motus corporis, perspiratio libera, somnus longior, alimenta sicca, pulvere nucistæ conspersa, interdum ex lacte suadenda.

DIABETES A SCYBALIS, FLATIBUS COLI, RENEM SINISTRUM COMPRIMENTIBUS clysmatibus, eccoproticis, carminativis & symptomaticis ve-

vioticus hystericeis, hypochondriacis familiaris, remediis primario morbo appropriatis sanatur.

INCONTINENTIA URINÆ.

Causa: relaxatio sphincteris vesicæ & plurimæ, sub ischuria & diabete notatæ causæ, mitiores quidem.

M. M. vide sub paralyfi, ischuria & diabete. Inter externa empl. melilot. cum galban. sagapeno & pauxillo pulveris cantharid. mixtum, offi sacro apudum præstat. Pueri hoc malo vexati moneantur, ut singulis horæ quadrantibus mingant.

MALUM EX LÆSIONE POST VIOLENTIAM EXTERNAM lithotomiam, partum difficilem, ex fistulis, luxatione vertebrarum, scirrho proflata &c. &c. incurabile, palliant vesica suilla ppta, alligata, penem excipiens & in textu sequiori pta, vel annulus vaginæ aptus.

STILLITIDIO URINÆ ex musculorum acceleratorum vitio succurrit compressio perinæi.

MORBI UNIVERSALES VEL PARTES EXTERNAS POTISSIMUM OCCUPANTES.

SCORBUTUS

Incipiens dignoscitur, lassitudine insigni; dyspnœa; gingivis laxis, tumidis, sanguinolentis, venis cœruleis distinctis; stomacace; maculis artuum, præcipue tibiarum, varii coloris, lividis,

vidis, flavis, instabilibus & doloribus vagis, imprimis gentium.

Csa: humorum lentor, acrimonia salino-pu-trida; solidorum atonia. Quam conditionem inducunt suppressæ evacuationes; obstructiones viscerum eorumque causæ; imprimis mora in ære corrupto, humido-frigido, in locis mari vicinis, humidis, subterraneis; alimenta dura, viscosa, pisces & carnes pingues, corruptæ, suillæ, sale & fumo indurate, farinacea cruda, panis mucidus, aquæ putridæ, verminosæ; defectus alimenti vegetabilis, acescentis, voracitas, otium, terror, mœror, mundities neglecta.

M. M. Remedia splanchnica, saponacea (vide succos, sstrum, elixiria decocta & clysmata sub obstructione viscerum descripta) interpositis lenibus catharticis. Elect. tartarifato &c. junctis antiscorbuticis sic dictis specificis, quorum plurima ad primam & alteram classem pertinent. Herb. cochl. nempe, nasturt. beccabung. trifol. fibr. fumar. raphanus rust. lapat. acut. strobuli pini; acida vegetab. mineral. poma aurant., citri, acetosæ, acetosella; quo & sstrum, ob vim saponaceam, antisepticam & demulcentem refer; subjunctis roborantibus cort. peruv. Winterano — R. Herb. acetosæ Mij. coque in s. q. feri lactis per 1/4 horæ colat. ℞j. adde salis acetosellæ ℞j. syrupi acetosellæ ℞ij. ms. D. omni trihorio vasculum — R. Lactis ℞j succor. cochl. acetosell. aa. ℞iſs, aurant. nasturt. aa. ℞j. coque ut f. serum, bene a coagulo separandum. R. Malth. hord. ℞vj. sedi minimi vermicularis

ris

ris ℥j — ij. coque in mens. i. aqua per 1/4. hora, digere cum semine foenic. Div. & rad. liquir. ℥ij. per 4. horas, colatura bene strata sumatur per vices: Residuum forma cataplasmatum artubus contractura laborantibus applicetur; — conserva nasturtii & acetosellæ cum syrupo antiscorbutico dispens. Parisiensis; elix. ex extract. trifol. fibr. aurant. virid. aquis antiscorbuticis & spir. antiscorbutico Drawitz. vel cornu cervi succinato compositum, elix. acid. Dipp. proprietatis Paracelsi.

Pro nutrimento, quod succi plenis parca manu exhibeatur, sint spinachia, chærefol. ci-chor. endivia, lactuca, brassica, acetosa, poma matura &c. acetaria ex nasturtio &c., panis bis-coctus. Pro potu cerevisia medicata — R. Herb. nasturt. cochl. aa. Mvj. raphan. russ. ℥j. vel hujus loco sedi minimi ℥vj brassicæ r. aliquot capita incis. infunde cerevisiæ fermentantis ℔L. fugiendæ simul causæ occasionales. Interdum v. s. sudorifera locum habent. In peiori gradu, dum respiratio anhelosa & membra lento tumore inflata sunt. R. Pulv. rad. enulæ ℥j. jalapp. ℥ij. salis ammoniaci ℥i℔. conserv. nasturt. ℥v. syrapi de spina cervin. ℥i℔. ms. D. omni bi-horio ℥j.

STOMACACES gargarisma quotidianum, ol. vitrioli gtt. x. acidulatum; folia cochlear. masticata; succum limonum, cum spiritu salis mixtum; ore continendum exigit. Ad gingivas linimentum ex ess. myrrh. melle rosar. & spiritu salis compositum.

Ulcus-

ULCUSCULA ORIS lamellis citri fricentur, ad
 cruentationem, vide reliqua sub odontalgia.

ULCERIBUS cacoethicis, maculis scorbuticis,
 spiritus falis, decocto rad. Iapati acuti meraco,
 bene dilutus, adjectis extr. cort. peruv. & liquam.
 myrrh. *callosis* sapo niger, cum solutione gum-
 mi galbani, camphora & sale ammoniaco mix-
 tus, pomatum Goulardi, ad ulcera venerea ordi-
 natum medentur.

CARNI LUXURIANTI alumen ustum *artubus*
tumidis, *rigidis*, *dolentibus* fatus, ex decocto
 anticorbutico, cum aqua calcis & lacte ppto, ad-
 jecto saponem & sale ammoniaco.

MACULÆ ALBÆ, LATIORES, CUM MARGINE
 INELAMMATO, POTENTES, GANGRENAM MI-
 NITANTES INTERNA ORIS OCCUPANTES MIXTURA
 sequenti, mediante linteo carpto, crebro irro-
 randa — R. Spir. fal. com. ℥j - iij. mellis ro-
 sar ℥iſſ. aquæ flor. sambuc. rosar. aa. ℥ij. ms.
 subjuncta collutione demulcente prægorica. In-
 crescente vero putredine spir. falis per se appdus.
Partibus externis gangrænescentibus aqua cal-
 cis cum sale ammoniaco & spiritu camphorato
 mixta medetur. *Profluviis sanguinis*, maculis
 livescensibus ex sanguinis dissolutione, elixirio
 acido Dipp. & sero lactis aluminato, cortice pe-
 ruv. *Diarrhææ & doloribus variis* decocto de-
 mulcente, paregorico, mixtura simpl. &c. con-
 sulitur. Remedia mercurialia & vesicatoria in
 scorbuto minus tuta sunt.

ADFE-

ADFFECTUS SCABIOSI.

Csa: serum acrimonia peculiari imbutum, viscidum, plus minus in putredinem vergens; occasionales, sub scorbuto descriptæ; metastases; crisis; sapissime contagium; vestitus ex lana sordida; mundities neglecta; saburra primarum viarum verminosa; an infecta?

M. M. A præcedenti parum differt. Conducunt nempe, præter dietam strictissimam, antiscorbutica, splanchnica, roborantia, non omisis quandoque antiseptics, elix. acido Halleri &c. præcipue si de inquinamento putrido, aut bilioso non dubitandum est. — R. Extr. tarax. tartari tartarifat. aa. ℥ss. aquæ tarax. per ferment. parat. ℥x. ms. D. quater de die cochl. i. superbibendum serum aut decoctum infra descriptum. Prædominante vero humorum lentore, mercurialia, sulphurata, antimonii præparata, præmissis & interpositis lenibus cathartics, egregii sunt usus. R. Panaceæ mercurii gr. vj. magnesiæ alb. ℥j. sulphuris aurat. antimonii tertiæ præcip. gr. ij. camphor. gr. iij. ms. s. omni quarta die sumendus; sulph. aur. antimon. potabile; mixtura ex mercurio vivo, mucilage gummi arab. subacto & in aqua fumarie soluto; pilulæ ex mercurio mucilaginoso, extr. cicut. & sapone antimoniali conflata & reliqua sub lue venerea descripta; flores sulphuris; pulvis purificans — R. Pulv. antimon. crud. ℥ss. magnes-optim. ℥j. elæoffri fœnic. ℥v. ms. D. ℥ss — j. ter de die. — R. Pulv. antimon. crudi, amygd. d. aa. ℥ss. cond. cort. citr. ℥ij. cum
s. q.

s. q. sſri in aqua ſoluti f. l. a. morſuli, in viij. partes æquales dividendi. Quotidie unus, tribus vicibus, comedatur; ſerum lactis antiſcorbuticum, vel decoctum rad. tarax. lapati acuti, juniperi, graminis, bardanæ, corticis interni ulmi, herb. ſaponar. fumar. heder. terreſtr. melle vel ſiro largiter edulcoratum ad ℥ iij. de die & ſi urinæ excretio reſpondet, nec ventriculus repugnat, ad ℥ v-viij. exhibendo. Ex his ſeligenda, quæ cuique temperiei conferunt. In multis enim ſcabie medicamentis paulo acrioribus & calidis exaſperatur. Simul evacuationes ſ. ſolemnes ſuppreſſæ, retentæ, in ordinem redigendæ, viſcerum, glandularum obſtructiones referendæ. De quibus in rebellibus cutis affectibus ſemper cogita. Externe, lotio crebrior & balneum ex decoct. ſpec. emoll. Mvj. herb. rutæ, ſalviæ vel cicutæ & nicotianæ aa. Mj. rad. helleb. albi Mij. & ſalis ammon. ℥j. pptā. ℞. Ungti pomat. ℥j. mercurii præcipit. albi bene edulcorati ℥j. ol. tartari per deliq. ℥ij. ms. quo quovis veſpere articuli, avellanæ quantitate tepide inungantur; thermæ Embſenſes, Aquisgranenſes.

AD SCABIEM PARTICULAREM ſub uſu interno- rum, ſupra deſcriptorum, externe ſequentia conveniunt: herba boni Henrici rec. bis de die impoſita; lotio, uncta ſupra dicta; liquamen myrrh. cum baſamo ſulphuris & aliquot granis mercurii præcipit. mixtum; aqua vegeto-miner. Goulard. cum ſolutione ſalis com. mixta caute vero appda; aqua ex ramuſculis ſiccis betulæ, ſuper ferro puro, frigido, deſtagratis elicitā; ſolutio aquoſa mercurii ſubl. corroſivi, cum
muci-

mucilagine fem. cydon. & melle ros. mixta, qua partes affectæ aliquoties de die irrigantur.

AD HEPETEM, SERPIGINEM PERTINACEM tentato usu in- & externo acidi vitriolici, & lotionis cum decocto hellebori albi, vesicatorium loco affecto imponendum.

AD TINEAM: caput tonsum, cataplasmate ex cremore lactis, melle & foliis boni Henrici ppto, repetito ad ppto, decocto supra notato lavandum, abstergendum, dein pulvis bufonum exsiccorum inspergendus. *Ad pruritum* partium nonnullarum intolerabilem, pomatum Goulardi, ad ulcera venerea ordinatum.

AD PUSTULAS FACIEI lotio: R. Aqua font. ℥j. salis com. ℥j solvantur; succus citri cum pauxillo pulv. zinziberis mixtus; frictions; scarificatio dorsi. Sub cura scabiei, mundities observanda, vestimenta quotidie mutanda, interdum sulphure parumper perfumiganda; lanæ, aer frigidus, alimenta pinguia, acria, exæstuantia & causæ occasionales evitandæ & succis plenis jejunia imperanda.

Scabies fani, ex contagio recenter contracta, internis vix indiget. In critica vero, congrua interna remedia, externis diutius præmittenda sunt.

SCABIEI VENEREÆ, SCORBUTICE, ARTHRITICÆ, EX ACRIMONIA BILIOSA, EX MENSUUM OBSTRUCTIONE ORIUNDÆ &c. curam vide suo loco.

Scabies a fructibus immaturis & austeris comesis facile curatur: R. Sapon. v. ℥℞. solve
in

in aqua fumar. ꝑ j, adde syr. fumar. ꝑij, rhei
el. ꝑij. ms. D. omni bihorio cochl. j.

In morbis ex scabie retropressa, quo inprimis nervorum debilitatem vel mobilitatem nimiam refer, tandem infitio scabiei & electrificatio tentanda. Reliqua vide sub cephalalgia serosa.

Infans duorum annorum scabie fetida diu vexatus, exhaustus, variolis corripitur, quibus sustinendis vix par fuit, perpetuo in matris sinu fovendus, ne retrocedant papulae; postea febre lenta consumitur, vix ossibus haret. Decocti vero limacum usu, brevi a febricula & cacochymia variolosa & scabiosa liberatus & integre sanatus est.

LUES VENEREA.

Csa: miasma venereum, per contagium, ex congressu, attractione partium exulceratarum, lactatione, osculis & per hereditatem, propagatum. Cujus quidem prima indicia in ea parte plerumque comparent, ad quam virus primum adptum fuit.

LUES INCIPIENS, gonorrhoea virulenta; canceris venereis; phymosi, paraphymosi; bubonibus; testibus inflammatis &c. incedit. *Confirmatio* vero, vel stricte sic dicta lues venerea, a modo receptis symptomatibus neglectis, male curatis, vel ex miasmate activiori, communicato, oriunda, symptomatibus enumeratis gravioribus, fauciumque ulceribus; ossium doloribus, noctu vehementioribus, mediam ossis partem occupantibus; carie;

K

tung.

tumoribus dolentibus; glandulis strumosis, exulceratis; cutis maculis, fissuris, pustulis & ulceribus lardaceis, mollibus stipata est.

CURATIONEM GONORRHŒÆ *virulentæ & fluoris albi venerei in stadio primo, sapissime inflammatorio absolvunt, v. f. cujus reiterationem inflammationis, ardoris urinæ & doloris gradus & duratio determinant; antiphlogistica; emollientia, virus & urinæ acrimoniam diluentia, demulcentia, copiosius epota & externe apta, subjunctis lenissimis catharticis antiphlogisticis; nec non mercurialibus, si de resorpto viro radices altius agente certi sumus: R. Amygd. dulc. ℥iij. cum camph. gr. x. tritarum, sem. canabis ℥j. f. cum decocti rad. gram. alth. dulcamar. meraci q. s. emulsio. Colaturæ ℥j. admisce aquæ rosar. ℥x. nitri puri ℥ij. syr. rosar. solut. alth. aa. ℥ij. D. omni bihorio ℥iij-iv. decoct. spec. pector. vel althææ, cum nitro largiter edulcoratum; serum lactis tamarindinatum radicibus althææ, bardanæ liquirit. herb. agrimon. saponar. bugloss. boraginis & sem. rutæ alteratum & syr. rosar. solutivo, & similibus ea dosi edulcoratum, ut largiter potum alvum quotidie bis-ter moveat; clysmata, cataplasmata, fomenta, lotiones, vapores, coli & perinæo apta, balneaque, quibus penis inter mingendum immittitur, ex decocto specier. emoll. sem. lini & pauxillo saponis, cum lacte aqua diluto ppta; quandoque uncta mercurial. ad genitalia, inguina, perinæum: R. Mercurii vivi, gummi arab. aa. ℥ss. admisce ungti pomati ℥ss-j. camph. ℞j. & in malo admodum rebelli, injectiones ex mercurio dulci cum oleo recenter expresso*

presso mixto, adhibenda. Inflammatione remittente terebint. & bals. de copaiv. Præparata. R. Bals. de copaiv. ℥j. mucilag. gummi arab. ℥ij. diligenter subactis adde lactis amygd. fib. s. bibat pro lubitu. Electuarium mundificans: R. Rad. dulcam. rasur. lign. sassifr. aa. ℥j ligni sancti fol. fenn. aa. ℥vi. rhei ℥j. cort. sassifr syr. fumar. ℥x dosis ℥ij-vj. bis de die; pilulæ ex calomel. extr. cicuta sapon. antimon. extr. rhei & pauxillo camphor. vel sal. vol. cornu cervi conflata; pulvis mercurialis ad scabiem ordinatus, ex decocto gland. ilign. exsiccat. & tostatum, rad. sassaparill. juniperi, ligni sassifr. quassia &c.; acidula Fachingenses, Selter. cum lacte balneaque Embsenia locum habent. Diatam vide sub lue confirmata, quæ, sat diu, cicurata quamvis gonorrhœa, continuanda. Denique fluxu materiæ nunc spissioris & albidioris sine ardore succedente vel

GONORRHOEA EENIGNA, ob laxitatem partium, sine ulla miasmatis virulenti suspicione, insequente, roborantia in- & externa; locum habent. Tinctura succini juxta mentem Hoffmanni parata; terra catechu; gummi mastich. olibani cort. peruv. — R. Oliban. ℥j. terendo cum s. q. mucilag. gummi arab. solve in aqua cinamom. cyd. ℥vj. adde syr. kinakina ℥j. D. bis de die cochl. ii. — vel — R. Poly. colophon. cort. peruv. aa. ℥ss. ms. D. bis de die, ex decocto meraco rad. sigill. salom. herb. ononidis, hepat. nob. equiset. & aparine vel ex decocto rad. quassia ol. vitriol. parum dulcificato,

K 2

acidulato, vel aluminato; pulvis roborans ad digestionem læsam, acidulæ martiales; serum lactis roborantibus alteratum, chalybeatum; martis solubilis solutio. Externe suffitus ex olibano, mastiche succino, colophonia & baccis juniperi; frictiones aromaticæ; epithemata ex aceto bezoardico, aqua vulneraria & vegeto-minerali, balneaque frigida; injectiones purificantes subadstringentes, caute administratæ, in quem finem præsentissimi auxilii est liquor cl. Vogleri. R. Aquæ calcis ℥ij myrrh. terræ japon. aa. ℥℥ ms. f. solutio quæ colanda; junctis sedulo rhabarbarinis. R. Pulv. rhei gr. xv. gummi arab. gr. v. bals. de copaib. q. s. ut f. bolus, ex infuso meraco herbæ saponar. rec. & rad. sarsapar. sumend. Pilul. N. visceral. cum extr. cicutæ mixtæ. Eadem fere valent in tabe dorsali & in *fluore albo benigno*. Concurrentibus vero cacochymia variæ, catarrho retrogrado, hæmorrhoidibus, obstructioni glandularum meseraicarum, vermibus, prolapsui uteri &c. simul consulendum, & venus, cibi discepti, calida, irritantia, diuretica, potus tepidus nimius, decubitus in dorso evitanda.

GONORRHOEA VIRUL. MALE CURATA. Cathartica mercurialia; morsulos antimonialis; saponem antimoniam; vinum antimon. Huxhami, ad vomitum usque exhibitum; extractum cicutæ & aconiti; serum lactis supra descriptum & externe fofus, balnea emollientia exigat.

AD TESTIUM TUMOREM INFLAMMATORIUM EX consensu & gonorrhœa male tractata sæpius enascentem, remedia antiphlogistica, in & externa, ad primum stadium præscripta; Gonorrhœam

rhœam revocantia; mercurius gummosus, cum nitro, in emulsione; suspensorium; sedata inflammatione fomenta ex herba cicutæ, ungtum mercuriale & empl. ad bubones ordinata; interne extr. cicutæ & aconiti. *Ad inflationem membri v. f. larga, catharsis repetita, fofus emolliens, subfrigidus.*

AD ULCERA VENEREA partes genitales &c. obsidentia, præmissis antiphlogisticis, ungtum ex mercurio præcipit. albo cum uncto digestivo mixtum; pomatum Goulardi: R. Cera granulos. ℥vj. leni igne fusa adde ol. olivar. ℥ivß. l. a. incorporatis, lente immisce extr. saturni ℥j. camph. ℥j nupta ab igne remove & spatula tamdiu agita, donec refrixerint; frequentes lotiones, cum decocto rad. bard. lapat. acut. althææ, fol. rut. salv. admixta sexta parte solutionis mercur. sublim.; nec non folia cicutæ & boni Henrici recent. contrita, appda, balneaque ex dictis rad. & herbis, admixto cuilibet pintæ extr. saturni cochlearculo uno. Quæ quoque in *scabie venerea* proficua sunt.

AD FAUCIUM ULCERA, elutiones, cum modo dicto decocto, vel cum mixtura mercuriali Plenkii, admixto melle rosar. adhibendæ. *Ad phymosin & paraphymosin* remedia antiphlogistica; fomentationes; vapores; injectiones crebriores, inter præputium & glandem, sordes, ulcuscula eluentes, cicurantes, ex infuso meraco cicutæ cum solutione aquosa mercur. subl. vel gummosi; deterfione, ope plumaceoli, simul caute adhibita; balnea emollientia, ex lacte saturnino, adjecta solutione mercurii gummosi; catapl. cum

K 3

aqua

aqua vegeto-min. pptum, interpositis catharticis antiphlogisticis; extr. cicuta & aconiti. tandem manus chirurgica. *Ad sphaecelum imminentem*, cataplasmata; fomenta, ex foecibus vini, aqua bene dilutis, decoct. aquoso, meraco cort. peruv. fol. cicuta, alliat. scord. absynth. ruta &c. adjectis, pro ne nata, sale ammon. aceto, aut aqua calcis.

AD BUBONES, inguina, interdum axillas, collum &c. occupantes, cicurata phlogosi, ungtum mercuriale, cum extr. cicuta & essent. galbani Bernh. empl. discutiens, cum mercurio & camph. mixt.; cataplasma, cum aqua vegeto-minerali paratum. Quando in suppurationem tendunt, maturantia, denique scalpellum, junctis semper internis antisyphiliticis gonorrhœam revocantibus, & si in indurationes scirrholas, aut ulcera maligna abeunt, extracta cicuta & aconiti, ex decocto gland. jlig. tostorum, adhibenda, bubones vero, qui a sanguine jam dudum infecto superveniunt, statim caustico aperiendi.

AD TUMORES DUROS, EXCRESCENTIAS VARIAS, CALLOSITATES, ungtum mercuriale, cum sapone nigro & camphora mixtum, ol. animal. Dippelii, solutio mercurii subl. quadruplo decocti rad. bard. & lapathi acuti diluta. Eadem *veruccæ, condylo-mata*, nec non *macula venerea*, ope penicilli saepe irroranda. *Excrecentiæ majores* haud inflammata lapide infernali tangendæ, & paulo post, aqua tepida, cui aliquot guttulæ olei tartari per deliq. infillatæ sunt, fovendæ; interne, & in *tophis exulceratis*. R. Extr. aconit. mercur. dulc. aa. gr. vj. Sri albi ℥ij, ms. s. pulv. divide
in

in doses sex, D. ter de die dosis una, superbibendo decoct. bardan. & sarsaparill.

AD TUMORES SCIRRHOSOS VEL CALLOSITATES URETHRÆ, ex gonorrhœa inflammatoria, male tractata, oriundos & urinæ difficultates excitantes, præter interna, absente inflammatione, virgulæ ceracæ Goulardi, ex extr. saturni ℥ij. & cera ℥ss. pptæ appdæ. *Ad ulcuscula*, ex dolore perseverante, locum urethræ circumscriptum occupante & effluxu materiæ magis ichorosa, pauca, sanguine tinctæ cognoscenda, penicillum ex linteo carpto, costæ ceti alligatum, remediis idoneis, initio, uncto ægyptiaco, cum aloe mixto, dein ad consolidationem, aceto lythargyrii, aqua diluto imbutum, catheteri immissum, ad locum affectum, magis resistentem extruditur, ibique aliquoties circumagitur.

AD PROSTATARUM TUMOREM ungtum mercuriale & empl. dialulphuris Rulandi adptur.

AD OPHTHALMIAM VENEREAM, ex tumore duto corneæ, massam carnis referente, materiam spissam, flavescensem, rodentem plorante, vesiculis obfita cognoscendam, remedia antiphlogistica, gonorrhœam revocantia, cataplasma, cum aqua vegeto-minerali pptum. *Excrescentia circa corneam transparentem* cito per incisionem auferenda. Phlogosi sedata, solutio mercurii sublimati fumenda & ejus solutio aquosa in nares injicienda, subjungenda injectio lactis. Eædem injectiones *ozanam* sanant.

LVS CONFIRMATÆ curationem absolunt
 mercurius, sub varia forma exhibitus, & deco-
 ctum rad. bardanæ, graminis sarsaparill. taxaci,
 lignorum, imprimis guajaci, non adeo meracum,
 sibiatum, adjecta, sub finem radice liquirit. ad
 mensuram, & si urinæ excretio respondet ad men-
 suras ij. & ultra, de die sumendum; præmissis &
 interpositis catharticis, vel electuario mundifi-
 cante s. q. sumto & balneis domesticis. — R.
 Mercurii vivi puriss. ℥j. gummi arab. ℥ss. ter-
 rantur invicem in mortario lapideo, calefacto,
 affusa subinde aqua menth. sat diu & indefesse,
 donec mercurius plane dispareat in mucum, nec
 sedimentum deponat, exacte subactis admisce sen-
 sim conterendo extr. bardanæ vel saponariæ vel
 trif. fibr. syr. fumar. vel diacod. aa. ℥ss. aquæ
 fumar. ℥vij. & pro re nata camph. ℥j. D. bis
 de die cochl. ij. — R. Mercurii vivi ℥j. mucilag.
 gummi arab. q. s. terantur ut supra, adde extr.
 ticutæ ℥j - ij. salis vol. cornu cervi ℥ij. inter-
 dum extr. aconiti vel pulsatill. aliquot grana,
 pulvis liquir. q. s. ut f. pill. gr. ij. ponderis; D. bis
 de die No. 6. vel R. Calomel. sulph. aur. antimo-
 nii tertie præcip. aa. ℥j. ms. & post diurnum
 tritum adde extr. sassaf. & gummi guajaci aa.
 ℥iv. camph. ℥ss. theriaci androm. q. s. ut f.
 pill. gr. ij. ponderis; D. bis de die 12 - 15. ex deco-
 cto lign. quajac. rad. bard. junip. herb. saponar.
 adjecto antimonio crudo — R. Mercurii sublim.
 gr. xii. spiritus frumentii vel potius aquæ font.
 ℥s. ij. digere, vitrum subinde agitando, donec
 mercurius solutus fuerit, adde pro re nata camph.
 gummi utillag. gummi arab. trita ℥ij. syr. dia-
 cod.

rod. ℥iv. D. ℥℞. --- j. vel cochl. i-ij. bis de die, ex decocto hordei, cum quarta parte lactis mixto, vel alio demulcente, copiose hausto. Vitio vero pulmonum & ventriculi laborantibus, & hæmorrhagiis subjectis noxium est. Quum salivatio non semper tuta & mercurii effectum infringat, ea instans, enematis, cathartico ano-dino, & seposito per aliquot dies medicamento mercuriali, præcavetur. Nimia coërcetur iisdem & marrubio, quassia, camphora. In malo pertinaci frictions mercuriales, præmissa catharsi, venæ sectione & balneis viginti aut triginta, ea lege instituendæ, ut prima die pes alteruter ungti Neapol. ℥ij. - iv. calide, per semihoram inungatur, dein udone tegatur, tertia die alter pes similiter inungatur, post triduum tibia una, post triduum altera, tibialibus similiter induenda & ita procedendo ad femora, nates, dorsum & brachia. Præcavendo semper ptyalismum, febrem, aliaque symptomata gravia, methodo supra descripta.

AD OSSIUM MORBOS & LUEM SCROPHULOSAM decoctum lign. guajaci gland. ilign. exsiccat. & tostar. & extr. aconiti (vide tumores duros) præstant. Phthificis ex lue & infantibus, lac capræ, cui mercurius infricatur, confert. Sub horum usu diæta strictior observanda; refrigeratio, potulenta spirituosa, alimenta dispepta, pinguis, acris, salsa, aromatica fugienda. Varia ægroti temperies non negligenda. Ad peculiarem illam sensibilitatem & dolorem colliuteri, fœminis lue affectis, vel ab eadem non bene sanatis, familiarem præter interna, suffimigia aequali parte, cinabaris & croci suadenda sunt. Curam claudant purgantia repetita ad mercurii

reliquias eliminandas. Nonnunquam in complicationem curiosius inquirendum est. Vir nobilis in juventute gonorrhœam sibi contraxit, quæ male suppressa, aliquot demum post annos, in Ozenam foetidissimam erupit. Ex mercurialibus, salivatione, balneis laconicis, innumerisque aliis remediis, suafu celeberrimorum Medicorum, in Francia, Germania & Hollandia usurpatis levamen quidem habuit, sed malum semper eodem cum vigore recrudit. Quum vero ex relata accuratiori historia morbi patuisset, illum complicatum esse, ægrotum nempe in pueritia obstructione glandularum meseraicarum laborasse, ejusque vestigia ad ætatem proveciorem usque propagata fuisse, remedia sub atrophia descripta, junctis aliis visceralibus & externis adhibita sunt. Quibus æger intra duorum mensium spatium plane ab ozæna &c. liberatus est.

RHEUMATISMUS.

Bene in *universalem febrilem*, qui juncta febre continua, plures partes externas simul occupat, vel alternatim, ex uno articulo in alterum migrat, cum vel sine rubore stipatus, & in *chronicum* vel *particularem* eumque vel *calidum* vel *frigidum* distinguitur. Cæs: serum luxurians, acre, in lentorem pronum, in minimis cutis vasculis stagnans. Inter occasionales inprimis veniunt, transpiratio, sudores suppressi post subitaneas refrigerationes; comestationes; venus, ira; coluvies biliosa (vide Csas gener. Nro 1, 4, 8, 9, 11, & 15.) quandoque arthriticum, peculiaris naturæ inquinamentum, admodum mobile,

bile,

bile, ventriculo inimicum, concurrit. Unde morbo nomen arthritidis vagæ competit.

RHEUMATISMO UNIVERSALI FEBRILI medentur, v. s. pro re nata, bis & pluries repetita; cathartica antiphlogistica. ℞. Elect. tartarif. pulpæ tamarind. aa. ℥j. falis sedativi vel de Seignette ℥ss. ms. D. omni 1/2. horæ ℥j. donec commode purgetur, subjunctis enematibus erectoribus, ex decoct. alth. sero lactis, melle, &c. pptis. Nonnunquam sordes bilioso-pituitosa vomitoria exigunt. (signa vide sub cephalalgia biliosa). Potus sit copiosus emulsionis, decocti specier. pectoral. cum hydrogala ppti vel decocti hordei radice bardan. foliis urticæ urent. min. saponar. nitro & oxymelle alterati — ℞. Flor. samb. Mij. concis. infunde s. q. feri lactis fervent. per 1/2 horam colat. ℔ij. adde nitri puri ℥j. roob, samb. ℥ijss. fyr. rad. s. aperient. ℥ij. ms. D. omni bihorio ℥ijj. calide. — Emulsiones camphorata; mixtura nitrata, adjectis extr. card. bened. bard. spiritu cornu cervi aceto saturato & fyr. de alth. Febre remittente & corporibus phlegmaticis remedia sub rheumatismo chronico notata, mitiora quidem, interponenda. Opium raro locum habet; in exacerbatione vero dolorum summa, convulsionem minitante & sensibilibus, motuum anomaliam subiectis, præmissis evacuationibus, concedi potest. Externe vapores, per tubum, ad locum affectum directi; fomentationes molles, ex infus. herb. cicuta & flor. samb.; sacculi, seminis canabis contus. ℥vj. flor. chamom. samb. aa. ℥ss. repleti, & folia boni Henrici rec. imposita, & febre

bre multum mitigata, vesicatoria partibus dolentibus apta & balnea tepida conferunt, partesque affectæ linteis ceratis involvenda; illis surgentibus rubentibus, hirudines appdi. Non omnis vero rheumatismus remedia externa fert. Nōtrimento sint juscula ex hordeo, avena, oryza, poma cocta, lac. Evitentur causæ occasionales. Debilitas, fugato morbo, restans, roborantibus cort. peruv. lacticiinis, motu corporis frictionibus sedulis superatur. Eadem fere *M. M.* valet in *rheumatismo chronico, particulari calido* vel in *Csa gener. Nro. 10, -b-* plethoricos, biliosos nempe invadente, vel motibus febrilibus stipato. Diathesi vero phlogistica cohibita & calido rheumatismo, tempore in frigidum degenerate, & in rheumatismo frigido pituitosorum, ex remediis sequentibus prudens Medicus seligat, quæ cuique temperiei & cacochymia quadrant; cathartica nempe efficaciora, mercurialia; aqua amara Sedliz.; mixtura antihypochondriaca Hall.

— *R.* Tinctura vol. guajaci cum vitello ovi subactæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. aquæ hord. $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$. syrup. diacod. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ms. D. tertia pars, ter de die ex decoct. meraco lign. sassafrass., rad. sigilli salom. dulcamar. bardan. levistici, herb. chamædr. urticae urent. min. largiter edulcorato, adjecto antimonio crudo

R. Liq. anod. min. Hofm. cornu cervi succinat. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ol. cajeput vel chamom. destill. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ ms. D. guttul. xx - xxx. — *R.* Sapon. antimon. rhei el. gummi ammon. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. guajaci nativi extr. urticae min. myrrh. aquos. vel trifol. fibr. vel card. bened. vel cicuta aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. bals. peruv. q. s. ut f. pilul. gr. ij. pond. D. quater, ter de die *Nro. vi - viij.* *R.* Pulv. antimon. crudi, lap. cancr.

cancr. cort. Winter. aa. ℞. ms. D. bis de die; morfuli antimoniales; tartarus emeticus solutus, roob, samb. & fyr. papav. alb. exceptus, vel vinum antimon. Huxh. minimis dosibus, ex decoct. rad. quass. exhibita; pulvis sub rheumatismo universali descriptus; extr. aconiti cum stro triti a gr. 1/4. ad gr. j. ter de die; acidula Fachingenfes, Selter. Schwalbac. &c. cum lacte mixta, succus betulæ, ex ejus ramis superioribus elicitus; remedia stomachica, splanchnica, antatrophica, antiveneræ, anthelmintica, antiscorbutica. --- R. Rad. ari rec. in pulvem contuf. pulv. gummi arab. aa. ℥j. trititando mixtis, admisce conservæ cochl. q. s. ut. f. elect. D. bis, quater de die ℥j. Hæc vero sub diætâ strictiori adhibenda. Externe sinapismi; vesicatoria temperata; cortex cocognidii, cucurbitæ; fetacea; ungtum sapon. admixto pauxillo olei hyosciami; empl. hyosciami camphoratum, præmissa sedula frictione; inustio mediante lanugine foliorum artemisiæ; ignis electricus; balnea crebriora ex decocto rad. sigill. salom. &c. supra descripto, adjecto sapon. ven. thermæ Aquisgranenses, Embenses; stillicidia; vapores; indusia lanæ. *Doloris ischiatici curatio parum differt.* Inter externa eminent clysteres; cucurbitulæ; vesicatoriæ; rad. bryon. recens. contusa cum oleo lini mixta, tepide imposita; inustio; Ess. galbani vilioris cum sapon. chym. Dipp. extracta; calæ viva cum uncto sapon. mixta. Interne vero pulvis Doveri ex tartari vitriolati p. ix. opii & rad. ipecac. p. i. conflatus, eximii usus est.

RHEU-

RHEUMATISMUS PERIODICUS a viro febrili, præmissis præmittendis, cortice peruv. curatur, *Ad contracturas pertinaces*, non satis laudanda sunt balnea Embsenſia laconica, embrochæ, junctis frictionibus & inunctionibus cum linimento sapon. ad paralyſin præſcripto.

ARTHRITIS FIXA, PODAGRA, GONAGRA, CHIRAGRA &c.

Csæ: ſolidorum laxitas; concoctiones læsæ; humorum dyscraſia; liquidum peculiaris naturæ, mox tenacitate, mox acrimonia variæ indolis peccans; idioſyncraſia ſæpe hæreditaria, Csæ occaſionales ſupra deſcriptæ.

M. M. Prophylactica & radicalis, cognititas diverſas cauſas variè corrigendo & occaſionales evitando abſolvitur; adhibendo remedia ſub rheumatismo chronico deſignata; junctis majori doſi, roborantibus, ſtomachicis, ſplanchnicis amaris, interpoſitis catharticis ex rheo, hermodactylis, rad. polypodii, bryoniæ, mercurialibus; infuſum frigidum herb. abſynth. cum flor. decoctum ſupra notatum, adjectis rad. gent. r. arifoloch. r. rad. quaſſiæ, cort. peruv.; & ſi ſcorbutici quid ſubeſt, infuſum frigidum vinoſum raphani ruſt. vel ejus ſuccum; porro conferunt vina medicata ex rad. gent. r. quaſſiæ cort. peruv. Winteran. herb. trifol. fibr. chamædr. &c. Decoctum ex avena rad. bard. dulcamar. cichor. caſſia lignea & fol. urtic. min. pro potu ordinar.; elixir ex extr. bard. trifol. gent. rubr. abſynth. ligni & corticis ſaſſafras, liq.

liq. terræ fol. tartari & aqua cinamom.; admixtis, pro varia cacochymia alkalina aut acida, mox elixirio vitrioli Myns. mox sulph. aur. antimon. potab.; pilulæ viscerales N. cum saponem antimoniali mixtæ; Theriaca diatessaron admixto antimonio crudo; acidulæ martiales; balnea; diætæ strictior, interdum lactea, si nempe ventriculus lacticina bene fert, vini bonæ notæ moderatus usus, assuetis concedendus; motus corporis; transpiratio libera & frictio, inprimis pedum suadenda. Imminentem paroxysmum præfagiunt languor; nausea; ructus; borborygmi; capitis, dorsî, intestinorum dolores; tussis; catarrhus; stupor in articulo; segnities, vel dolor in motu membri; formicationes; pruritus; protuberantia venarum loco circumditarum.

PAROXYSMI MEDELA sub rheumatismo febrili descripta est. Debilibus vero, exhaustis, sensibilibus v. s. cathartica & refrigerantia minus conveniunt. Topica non tuta sunt; præter vapores ex hydrogala; fomenta mollia; ope spongiæ diu appta & cataplasmata ex dauco rasfo, adjectis foliis boni Henrici & hyosciami.

DIARRHŒÆ EXCEDENTI, eliminatis fordibus, vino muscatello rubro, opio, sale ammoniaco, cortice peruv. &c. consulitur.

TOPHIS, uncto saponis, cum oleo animali, oleo tartari & caseo antiquo mixto vel aceto concentrato Westendorffii. *Membrorum stupori, immobilitati &c.* vaporibus emoll. stilli. cidiis, frictionibus & uncto saponis cum alth. mixto. *Oedemati pedum* foliis betulæ calide im-

impositis. *Arthritis anomala, larvata, retropressa, non ad sua loca pulsa*, unde fontici capitis, pectoris & abdominis morbi, & externæ exoflores, ankiloses, caries, scirrhî, ulcera maligna, arguitur ex prægressis, causis occasionalibus, hæreditate vel idiosyncrasia, contagio, epidemia, doloribus, interdum obscureis, interdum urentibus quidem, sed fugacibus articulorum; ex lassitudine insueta, post motum & somnum; sudore urente, acidum olente; papulis miliaribus cutim obsidentibus; titillatione erronea in facie, maxime fronte; vultus colore flavo, fusco; stranguria cum urina vel tenui, aut spiculis quasi salinis referta, vel albicante, sedimentum album, læve, pingue per floccos deponente; ex colore nigro & foetore materia, quam ulcera arthriticorum sæpe plorant. *M. M. Virus arthriticum quantocivis, a partibus nobilioribus ad partes externas inprimis antea affectas, promovendum & eliminandum, per frictiones; sinapismos; vesicatoria diutius aperta servanda; enemata; pediluvia calidissima; folia betulæ, calide pedibus circumdata; potiones largas discutientes, diaphoreticas, demulcentes; haustulum vini Rhen. in quo salis cornu cervi gr. xv. soluta sunt; extr. aconit. a gr. ß. ad gr. i--ij. cum stro, in pulverem tritum & ex vasculo jusculi carnis mane & vesperi exhibitum, & si primæ viæ vomitu, diarrhœa afficiuntur, vini muscatelli genuini modicum usum, (vide sub cephalalgia serosa) nec non opiata, quæ vero in morbis capitis, peripneumonia & asthmate pituitoso, exulent.*

PLE-

PLETHORA, FEBRIS & INFLAMMATIO IMMI-
NENS. M. M. antiphlogisticam, v. snem lar-
gam in pede. *Saburra prim. viar.* cathartica rei-
terata, (ne vero diarrhœam, quæ sæpius cohiben-
da est, semper pro ejus indicio habeamus), mor-
bi magis chronici, arthriticæ indolis, usum an-
tarthriticorum, inprimis antimonii crudi & pilu-
larum ex saponè antimoniali. calomel, camphora,
croco & theriaca andr. compositarum balnearum-
que exposcunt, quæ bis de die, per unum alte-
rumve mensem & interdum centum plura adhi-
benda sunt, (vide sub colica pictonum) simul
udones ex tela cerata pedibus gerant ægroti.

HÆMORRHAGIÆ

Csæ: Sanguinis abundantia, commotio, ra-
refactio, nimia tenuitas, dissolutio, acrimonia
quæcunque scorbutica, arthritica, ab ulceribus
consolidatis &c. &c. vasorum relaxatio, viscerum
abdominis obstructio, tumor, eorum spas-
mi, sang. evacuationes suppressæ, neglectæ, ver-
mes; violentia externa, nixus valentior; sangui-
nis circulum æqualem impediens, vestimenta
angustiora, status, sessio peculiæres; diætã lautã,
vide Csas gener. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 15.

M. M. absolvant sanguinis plenitudinem
imminuentia; congestiones revellentia; prim. v.
sordes biliosas &c. evacuantia; refrigerantia;
acrimoniam corrigentia; derivantia; antispas-
modica; vulneraria externa, v. s. ea lege in-
terdum instituta, ut, appposito sæpe vulnere digi-
to, sanguis per longa intervalla in pauca quan-
titate fluat; cucurbitulæ & lintea succo planta-
L ginis

ginis, portulacæ &c. madida, regioni lumbari, splenis & ultima quandoque testibus apta; epileptica; pedi-maniluvia; enemata mollia, antispasmodica, alvum laxantia, crebriora; ligatura extremorum, frigidorum vero lenes frictiones; exulcerationes artificiales; vesicatoria temperata; fonticuli; cataplasmata & inunctiones antispasmodicæ ad abdomen; manna; Elect. tartarifatum, syr. rosatus & violar. solutivus. ℞. Aquæ ceras. nigr. ℥iv. oxymell. simpl. falis mirab. Glaub. aa. ℥j. nitri ℥ij. liq. anod. min. ℥ij. syr. cerass. acid. ℥vj. ms. D. omni 1/4. hor. cochl. j. donec commode purgetur; nitrum majori dosi; acida, vegetabilia & mineralia; ol. vitrioli cum æquali portione spir. vini mixtum ad gttas x - xx. exhibitum; emulsiva, demulcentia cum camphora nonnunquam mixta; julapia; decocta tamarind. septalii chalybeatum, vel cum solutione vitrioli martis factitii mixtum; avenac. Low. elixirio Dipp. acidulatum, cornu cervi citr. egelida, interdum frigidissima; serum lactis cum speciebus herb. millefol. urtic. geran. Rob, equiseti, pilosell. plantag. virg. aur. nummular. flor. ros. rubr. hyperici, rad. acori vulg. pptum; succi express. ℞. Herb. Bellid. min. tormentill. millefol. urtic. aa. Miij. contus. affunde aquæ heder. terrestr. & millefol. aa. ℥vj. In liquore expresso dissolve lap. prunell. ℥ij. syr. e ros. sicc. vel syr. e symph. Fernel. ℥ij. adde album ovor. conquass. q. s. decoct. rad. sigill. Salomonis cum lacte pptum; aquæ minerales cum lacte mixtæ; syr. diacod. pil. de cynogloss. mucilag. cydon. gummi arab. mars solubilis, cort. peruv.

peruv. — R. Pulv. sang. drac. cinam. aa. \mathfrak{D} \mathfrak{B} .
 vitrioli martis factitii gr. ij — v. ms. pro dosi,
 bis, ter repetenda vel R. Extr. cort. peruv. \mathfrak{Z} ij.
 tormentill. lign. campech. aa. \mathfrak{Z} i. glyzyrrh.
 \mathfrak{Z} ij. vitrioli martis factitii \mathfrak{D} j. mucilag. sem.
 cydon. q. s. ut f. electuar. dosis \mathfrak{Z} j. bis, quater
 de die; serum lactis aluminatum R. Lactis
 thib. alumin. \mathfrak{Z} ss. coque donec lac decompo-
 natur, in serum refrigeratum instilla, guttatim
 spir. vitrioli q. s. ad gratam aciditatem, colat.
 adde tincturæ cinam. \mathfrak{Z} i. syr. diacod. \mathfrak{Z} iss. D.
 omni hora vel bihorio cochl. I — II. — R.
 Tinct. cinam. \mathfrak{Z} ij. spir. bezoar. Bysf. liq. anod.
 m. aa. grts. XV. ms. D. remittente paroxys-
 mo. Horum selectum diversa temperies, caus-
 fa & concurrentes morbi determinant; quanti-
 tatem sanguinis detrahendi, plethoræ veræ & ca-
 loris gradus, pulsusque plus minus durus & ma-
 gnus. v. f. vero interdicit, pulsus parvus; de-
 bilitas; magna s. jactura prægressa; plethora spu-
 ria, in frigidis, ebullitio sanguinis non ita vehe-
 mens, ex bile commota. *Cholagoga* & fri-
 gida, in- & externa locum habent, in sordibus
 biliosis, quarum diagnosin vide sub cephalalgia
 biliosa. *Adstringentia* stiptica indicantur, mi-
 tioribus prius tentatis, plethora sublata, &
 summo imminente periculo, ex pulsu vacillan-
 te, venis collapsis, lypothimia, frigore judican-
 do. Eo cautius, si hæmorrhagia critica, perio-
 dica. *Demulcentia*, *emulsiva*, *serum acre*
involutentia, junctis interdum exulcerationibus
 artificialibus, in acrimonia quacunque. *Incrassan-*
tia cort. peruv. cum acidis mineralibus in san-

L 2
guinis

guinis dissolutione, tenuitate; ultima simul f. rarefactionem & fervorem, ex acrimonia biliosa, erysipelacea & ingestis calidis, optime cicurant. *Opiata cum inunctionibus anotinis* valent, quando spasmi, irritabilitas, tenesmi, tussis convulsiva &c. urgent. *Aliena* ubi febris & sanguis phlogisticus, alvusque obstitata. *Cortex quoque peruv. cum acidis mineralibus & camphora*, mobilitati nervorum spasmis abdominis, hysteriis, hypochondriacis juncta atonia, debilitate dicatus est. *Alienus* in tussi sicca, dolore fixo, phlogosi. Nutrimto sint cibi pauci, euchymi, blandi, acescentes, lac, imprimis lac capræ, herb. urticae &c. nutritæ, cibi farinosi, gelatinosi. *Alieni* dyspepti, flatulenti & qui chylum viscidum, acre largiuntur.

QUIES corporis & animi, vestimenta laxa, levia suadenda. Calida in- & externa interdicienda. Exhausti jusculis egelidis, crebro, sed parce datis, potu ex decocto furfur. vel farinæ avenæ tostæ & pauxillo chocolade, adjecto lacte nutriantur. Fluxu s. nimio cohibito, ad roborantia, splanchnica, evacuationes suppressas revocantia & anthelmintica &c. si indicantur, deveniendum.

NARIUM HÆMORRHAGIA.

Csæ gener. in specie, insolatio, capitis congestio; stimulantia in nares immissa.

M. M.

circa uvulam , sine tussi evenit; quod cum hæmoptysi non confundendum.

HÆMOPTYSIS

Aut sanguinis expectoratio cum tussi sine febre inflammatoria.

Cæsæ gener. in specie tubarum inflatio, vociferatio, cantus, catarrhus acris, thoracis formatio pr. nat. violentia nixus, externa;

M. M. vide sub generali. Indicantur præ aliis temperantia, demulcentia, serum lactis, vel decoct. rad. alth. sigill. Salomon. fyr. papav. rh. ejusque extracto, diacodio, mucilage gummi arab. alterata &c. cathartica, antiphlogistica, mannata, clysmata emoll. & pediluvia crebriora (cfr. medelam sub tussi) v. s. in brachio, cujus reiterationem petunt, pulsus plenior, durus, dolor obtusus, calor & tussis incrementes. *V. snæm, dietam &c. prophylacticam* vero imperrant, motus undulatorius, in hypochondriis; titillatio in aspera arteria, pruritus; caloris, gravitatis sensus in pectore; difficilior respiratio; anxietas; tussicula; alvi obstipatio. *Defuxiones acres; sapor salsus, sanguis excretus floridus, spumofus, calidus, sub excretionē titillans & tussis*, potissimum usum decocti demulcentis supra, & limacum sub phthisi descripti & olei lini recentis depurati, cochleatum sumendi exigunt.

DIÆTA sit tenuissima, blandissima ex lacteiniis, emulsivis &c. Quies, taciturnitas pertinax, præcipue si s. copiosus floridus spumofus eicitur,

citur, imperandæ. *Malo urgente R.* Extr. cort. peruv. ℥iij. cascarill. ℥j. ligni campech. liquirit. aa. ℥ij. mucilag. sem. cydon. vel gummi arab. q. s. ut f. elect. D. bis, quater de die ℥j. Postea ad grumos s. relictos resolvendos frequens aquæ tepidæ inspiratio suadenda.

Extra paroxysmum remedia, nodos pulmonum, obstructions viscerum infimi ventris referantia, suppressas menses, hæmorrhoides revocantia, tandem cort. peruv. cum grano uno aut altero limaturæ martis, nonnunquam mixtus roborandi scopo adhibenda. Sæpe sputa, purulentis similia, inodora & sudores viscerum, salutariter hæmoptoen, mox insequentia, vomitam & sanguis deglutitus nausam & vomitum excitans, vomitum cruentum mentiuntur.

VOMITUS CRUENTUS.

Inter Csas crebrius obveniunt fluxus menstrui, hæmorrhoidalis suppressio, infarctus viscerum abdominalium, imprimis vaforum ventriculi. Vide *M. M. gener.* In specie conveniunt, v. s. in pede; enemata emollientia, nitrosa cum melle & oleo crebriora; pediluvia; infessus vaporosi, aliaque revellentia; diluentia; temperantia; antispasmodica; demulcentia; ventriculo grata; frigidiuscula; blande acidia; decoct. hordei citratum, cum succis Berb. granat. millefol. decoct. Septalii tamarindinatum aut elix. acido Dipp. acidulatum; serum lactis aqua destill. rosar. rubr. & ipsis rosis rubris, cum semine alteratum; interdum chalybeatum, & remittente

L. 4. paroxysmum

paroxysmo eccoprotica. *Aliena irritantia salina, pulverulenta, oleosa, adstringentia & opiata, quibus vero dolore, spasmo, anxietate, vomitu urgentibus, præcipue per corrosiva, drastica pro-
ritatis, tentatis prius demulcentibus, non semper carere possumus. Externe epithema ex herb. menth. millefol. flor. chamom. sambuc. in aceto & vino vel aqua vegeto-min. coct. externa sub cardialgia ordinata. Tandem ad chalybeata chinata & visceralia blanda progrediendum. (Cfr. medelam infarctus vasorum ventriculi); ad vomitum cruentum, ex hirudine deglutita ol. amygd. dulcium.*

MICTUS CRUENTUS

Vel excretio aut lotii sanguinolenti, linteum album ipsi immixtum rubedine sanguinea tingentis, aut cruoris sinceri, ut plurimum ex renum, nonnunquam ex vesica, urethrae, imo vesicularum feminalium vasculis stillantis; a stillicidio s. ex præputio distinguenda, quod quidem guttatim & continuo, etiamsi urina non reddatur, evenit.

Csæ supra descriptæ, præcipue Csæ gen. Nro. 1 — a — c — 2, equitatio, vectio rudis & 4, — b — c — 5, b — c — d — e — 6, 9, calculus commotus; renum exulceratio; cantharides; sæpius hæmorrhoides suppressæ; rarissime vermes in vesica hospitantes (ne vero confundantur cum ascaridibus, ex ano ad partes genitales proserpentibus) & in infantibus, mictus cruentus, a fasciis & vestibus arctioribus.

M. M.

M. M. gener. pro potu sit decoct cerass. nigr. lac cum aqua Fachingensi, vel serum lactis cum syr. de alth. tandem chalybeatum & præmissis catharticis crebrioribus, ex manna & rheo; v. sne; temperantibus; emulsionibus nitrosi & demulcentibus; roborantia, vulneraria virg. aur. Equiset. millefol. ava ursi, tormentil. urtic. & gland. iligin. tosta in decocto, cum melle mixto; Cort. peruv. quassia; rheum tostum; rad. asparagi; succus catechu; aquæ minerales martiales: Externe fomentationes, ex aqua vegeto-minerali; interdum injectiones ex hydrogala cum syr. dialth. E vitetur decubitus in dorso.

MICTUS CRUENTUS EX CANTHARIDIBUS emulsionem arabicam camphoratam, & clysteres oleosus exposcit. Cfr. morbum hæmorrhoidalem.

DOLORIS, ISCHURIÆ &c. ex grumis s. in ureteribus hærentibus, & ulcerum curam vide sub calculo.

HÆMORRHAGIA UTERI NIMIA.

Cæ gener. Cfr. morbos gravidarum & puerperarum.

M. M. vide sub hæmorrhoidibus nimis. Præterea conveniunt, quies summa, lectum stramineum, aër frigidiusculus, partibus genitalibus admissus; lumbis vero & ventri leniter constricto, oxycratum frigide appositum; idem tepide injectum; denique cataplasma ex gypsi alb. Mij.

L 5

in fo-

in solutione aquosa gummi arab. dissolutis, hypogastrio nudo per tres horas admoendum & iterandum, & peffarium (vid. infra sub hamor. rhoid. nimis). Inter interna ꝛ. cremor. tartari subtiliff. pulverif. ꝛꝛ. pulv. cinamom. non acuti ꝛij- iij. substantiæ albæ fungosæ interior. cort. aurant. ꝛiꝛ. stri ꝛij. spiritus vitrioli ꝛ ꝛ. syr. e rosis siccis q. s. ut f. elect. aut serum lactis aluminat. pulv. ex vitriolo martis factitio, (vide supra) aut ꝛ. pulv. corall. rubr. succini, boli armen. sang. dracon. aa. ꝛij. sem. plantag. ꝛj. croci martis ꝛ j. syrup. de rosis siccis, q. s. adjecto, si spasmus & dolores urgent, opii pauxillo ms. D. ter de die ꝛj; non minus clysteres lenientes, crebro, sed parca portione, injecti; ipecac. gr. 1/4- 1/3. pars, omni 3. -4. horio exhibita. Nutrimento sint juscula meraca, gelatina, parca dosi.

AD HÆMORRHAGIAM MAGIS CHRONICAM de-coct. rad. quassia aut cort. peruv. roborans Septalii chalybeatum, vel elixirio acido Dippelii acidulatum; tinctura cinamomi cum martis solubilis solutione; acidula martiales; rhabarb. tostum; pilula viscerales N. cingulum uterinum, roborans; oleum nucist. ad abdomen; enemata, cfr. hæmorrhoidalem morbum. *Ad hæmorrhagiam a sanguine acri dissoluto* remedia sub hæmorrhagii ordinata; ad illam ex scorbutica diathesi succus limonum, cum spiritu salis mixtus;

AB ASCARIDIBUS enemata oleosa. Huc pertinet hæmorrhagia vetularum, post consuetam mensium cessationem, recrudescens, quæ, si post dolorem fixum, circa regionem uteri & effluxum ichoris, cum brevi levamine evenit, diathe-

diathesi canerosa excitatur & diata lactea mitiganda est. Tendandum, quid extr. cicutæ vel hyosciami albi præsent.

HÆMORRHOIDALIS MORBUS.

Molimina cognoscuntur ex digestionem læsa, torminibus, tenesmo, alvi obstipatione, lumborum dolore sine causa venientibus, ardoribus pruriginosis, in orificio intestini recti, sensu noduli alicujus in una alterave intestini parte, variis pathematibus spasticis ventriculum, intestina, vesicam &c. vexantibus, cephalalgia, cardialgia, anxietate præcordiali, vomitu periodico cum nausea &c. arteriarum femorum pulsationibus. Cæsæ gener. luxuries, mollities; in specie abusus aloëticorum; helleb. nigr. myrrh. croci; aromatum, allii, ciborum dyspeptorum, siccorum, incrassantium, duriorum, farinaceorum, non fermentatorum, potus spirituosi, aquæ tepidæ, theæ, caffè; scybala indurata; retenta; ascarides, (qui vero hæmorrhoides non raro mentiuntur) sæpius circulus sanguinis impeditus, ob vasorum infimi ventris obstructionem & ob spastica pathemata intestinorum, hypochondriacis frequentia; vita sedentaria; equitatio; venus nimia; vapores, hirudines ano crebrius aptæ; purgantia repetita; dysenteria chronica; partus difficilis, concurrente dispositione hæreditaria; an crebriores v. sines in pede institutæ?

HÆMORRHOIDUM NIMIARUM curam absolvent v. sines parvæ in brachio, eccoprotica, ex manna, tamarind; syr. rosar. solutivo, flor. sulphuris; emulsiones; nitrum; julapia, oleo vitrioli,

tricoli, parum dulcificato acidulata. Malo urgente; decoct. robor. sept. cum fol. millef. flor. ros. r. pptum, tandem chalybeatum, vel cum vitriolo martis factitio & succis tormentillæ, urticæ &c. mixtum; vel serum lactis aluminatum. R. Cort. peruv. simarubæ aa. ℥℥. syr. e rosis ficcis q. s. ms. D. ter, quater de die; grana mali punici masticata, cfr. *M. M. generalem*. Externe linimentum ex theriacæ recent. ℥vj & opii gr. iv-vj. ad umbilici regionem; vel R. Extr. saturni, aluminis aa. ℥℥. vini rubri ℥ij. ms. His madida fasciæ, abdomen constringentes, retentis simul, quantum fieri potest, forcibus cruentis; spongia aceto vel spir. vini rectific. imbuta, ad anum; injectiones frigide, ex decocto tormentill. denique suppositoria solutione vitrioli imbuta; vel ex fungo igniario facta.

M. M. FLUX. HÆMORRHOID. CHRONICO, causæ occasionales, supra descriptæ evitandæ; hinc diæta stricta, priori contraria observanda; saburra prim. v.; acrimoniæ humorum, plithoræ & orgasmo, si peccant, occurrendum; circulatio sanguinis impedita in ordinem redigenda sedando motus spasticos, cicurando atoniam, irritabilitatem nimiam, referando viscerum infarctus (vide curam mali hypochondr. hysterici & obstructionis viscerum). Huc faciunt pilulæ viscerales N. cum extr. cicuta, valerian. cort. peruv. & flor. sulphuris; mars solub. cum rheo; acidular. martialium usus diæticus & clysteres viscerales quotidiana. Eandem fere medelam exposcunt hæmorrhoides cœcæ & mucosæ, adjectis hic mucum incidentibus, saponaceis, sangu-

guinem purificantibus, interpositis catharticis. Nunquam arte temerarie provocentur hæmorrhoides, nisi satis constet, quod natura eo vergat, & quidem in emolumentum ægrorum. Spontaneæ ergo, criticæ salutares magis, pathemata varia pr. viar., part. genitalium, vesicæ &c.; morbos capitis, thoracis, abdominis fonticos, nonnunquam præcavescentes, levantes, curantes, si consueto parcius aut cum difficultate fluunt, (quo & molimina refer) aut male suppressæ, leniter per anum promovendæ sunt, secundum M. M. infra ad hæmorrhoides suppressas, descriptam. Eadem ratione medetur hæmorrhoidibus, a tramite aberrantibus, in vesicæ, urethræ, vagina hæmorrhoides cruentas, mucosas, abeuntibus, ibidem & circa anum, mariscas dolentes, exulceratas, fistulas, variasque excrescentias, tumores & inflammationes testium, serpiginem, priapismos, pollutiones aliæque mala excitantibus, quæ suppicionem luis venereæ falso incutiunt. Fluxus nempe hæmorrhoidalis per anum proliciendus & reliqua medela descripta adhibenda, junctis externis congruis. Cfr. curam stranguriæ, doloris ex grumis sang. &c. sub calculo notatam.

AD HÆMORRHOIDES CŒCAS, INFLAMMATAS, DOLENTES, cibi, potus & remedia antiphlogistica, demulcentia, emollientia, laxantia; v. s. in brachio & pede, scarificationes superioris & internæ partis femorum; decoct. tamarind. — R. Elect. lenitiv. Fl. ℥ij. flor. sulphuris ℥℞. nitri ℥ij. syr. aur. q. s. ut f. elect. D. bis de die ℥j-iiij. vel R. Flor. sulph. pulv. liquirit. salv. aa. ℥j. f. c. s. q. bals. Locatell pilulæ, ex singulis drach.

drachmis Nro. 6. D. ter de die pilulæ tres, ex emulsione, juncto vesperi diacodio; serum lactis rad. alb. chelidon. herb. scrophul. millef. flor. chamom. sambuc. & verbasci alteratum. Externe clysteres ex ol. lini ꝑj. syringa tenui crebro injiciendi (cujus cannula intestino inverso columbæ vel gallinæ involvatur); infusus vaporosi; infus. saturatum herb. linar. flor. verbasci, sambuc. sem. hyosciami, adjecto aceto vel tantillo extr. saturni, ope spongiæ; vel cataplasma, ex dauco raso, & radice verbasci contusa apdum; vel ungtum de linaria, cum liquamine verbasci & oleo hyosciami mixtum, vel pulvicula, ex pomis acidulis in aqua vegeto-min. coctis; vel pulpa contusa cucumerum & succus semper vivi, cum vitello ovi mixtus, addito opii grano; hisce imbuta suppositoria mollia, vel ex melone aut cucurbita facta. Sanguine vero coagulato turgentes, lanceola caute aperiendæ, s. evacuan- dus & oleum myrrh. p. d. cum uncto nutrito illinendum, vel hirudines Nro. 5, 7. bis in septimana adhibendæ. Nodi interni in ani sphinctere incarcerati, digito intruso, reponendi. *Ad gangrænescentes* est. galb. Bernh. ope linteorum duplicatorum appda est. *Exulceratis* linctus catelli, affuso lacte allectati crebrior; ungtum superius cum bals. sulph. amygd. & ol. myrrh. apdum; superimposito epithemate ex aqua cal- cis vel ros. & extr. saturni.

HÆMORRHOIDES MALE SUPPRESSÆ REVO-
CANDÆ. V. s. cucurbitulis ad femora, frictio-
nibus pedum, imo ani, ope foliorum ficus &c.
linctu capis junioris; pediluv. clysteribus emoll.
cata-

cataplasmatibus continuo adptis; balneis; tandem suppositoriis ex sale gemmæ cum melle cocto & pauxillo aloës pptis. Horum auxilio sufficienter elicitis, hirudines appdæ. Interne cathartica ad colicam ordinata; emulsiones oleosæ, balsamica, cum nitro adhibendæ. Exulent pellen-tia; cessantibus vero motibus febrilibus & spasticis; peccantibus atonia, lentore humor. temperie pituitosa, pitul. viscerales cum extr. aloë myrrh. aquos. aconiti; martialia &c. Iosum habent.

AD COLICAM ET HERNIAM HÆMORRHOIDALEM emulsio ex ol. amygd. d. vitell. ovor. & syr. papav. lac ebutyrat. clysteres mannatæ.

AD DOLORES LUMBORUM empl. galb. oleo hyosciami malaxatum.

AD OBSTIPATIONEM ALVI alkohol. cort. peruv. optimi ℥℔. - ∅ ij. cum tertia parte crem. tartari mixt. ter quater de die.

MORBI MULIERUM.

MENSIVM JUSTO TARDIOR ERUPTIO, SUPPRESSIO, RETENTIO, IMMINUTIO, MATORIOR CES-SATIO MORBOSA: unde innumeri morbi, menstrui evacuatio per insolita loca, tumores pe-riodici, chlorosis, pica, &c. &c.

Csæ 1). Atonia præcipue uteri (vid. Csas ge-ner Nro. I - a -) sanguinis circulus languens, mixtio insufficiens, in cachexiam, cacochymiam pituitosam & tandem infarctum vasorum uteri degenerantes, atiaque morbosa constitutio frigi-da ex febre intermittente suppressa &c.

2) San-

2) Sanguis abundans, nimis motus, ejus spissitudo phlogistica, fibræ magis rigida, irritabiles, vasorum strictura, angustia vegetis, robustis, temperiei calidæ familiares, vid. Csas gener. 10, — b —).

3) Sanguis deficiens in phtisi &c. post morbos, vulnera perpeffa.

4) Hymen imperforatum, vaginæ coalitio; prolapsus.

5) Porro inter causas suppressionis referenda sunt, vapor carbonum vivor. genitalibus crebro admissus; thoraces rigida, arctiores; cibi dyspepti; refrigeratio; mœror; terror; ira &c. quæ tanto magis nocent & subitanæam suppressionem sæpe inducunt, quando instante aut emicante fluxu & dispositis accidunt.

M. M. Ad Nr. 1.) Fibra laxa roboranda; cachexia, cacocymia variæque morbosa qualitas, curiose exploratæ, aut causæ sint, aut effectus corrigendæ, & fordes primarum viarum, si peccant, eliminandæ. Hoc facto ad emenagoga, inprimis circa periodum adhibenda, deveniendum. R. Martis solubilis gr. xv. cinamom. gr. v. siri ad pondus omnium ms. D. hæc portio bis, ter de die ex infuso pulegii vinoso; vel limaturæ martis gr. ij — iv. quotidie in cochl. offæ per plures menses deglutita. R. Conserv. meliss. ℥iij. extr. tarax. ℥j. martis sstrati ℥ß-j. fiat cum syr. cinamom. electuarium, D. omni trihorio cochlearculum — R. Cort. peruv. cinamom. Winter. limat. martis aa. ℥ß. ms. f. pulvis, cui affunde vini generosi ℔ij. in leni digestionem

ffione relinque per 24. horas, dein colaturam exhibe ad cochl. j. ter de die — R₄. Fol. rec. levist. q. s. irrorata aqua cinamom. lact. ℥i. exprimatur fuccus, sumantur ℥vj. de die. Decoct. vel infusa rad. curcum. long. aristol. r. zedoar. herb. marrubii meliss. chamæpyt. rutæ sabin. matricar. flor. chamom. cheiri, feminis nigell. fœnic. bac-car. junip. lauri croci &c. cum vel sine vino & marte ppta, calida vel frigida.

Pilulæ viscerales cum gummi sagapeni, florib. salis ammoniaci martialibus & oleo sabinæ mixtæ, vel ex mercurio vivo cum mucilag. gummi arab. subactò, asa foetida & extr. myrrh. con-stata; myrrhæ elect. sedula masticatio; antimo-nialia, pulvis purificans &c. Elixir. aperit. Clau-deri, adjectis borace, extr. hellebori nigri, & si spasmi concurrunt, opio. — R₂. Rad. helleb. n. ℥ß. infunde aquæ rutæ ℥ß. D. sex diebus ante periodum menstruum, mane & vesperi cochl. j. minuendo dosin, si alvus inde purgatur. Ex-terne linimentum ex ol. nucist. express. lauri- no ol. destill. succini, galbani & spir. sal. am- moniaci pptum, ad uteri regionem; bals. empl. cingulum, enemata, injectiones, antihysterica; cataplasmata ad obstructions viscerum ordinata; balneum vaporis, ex decocto herb. sabinæ, ma- tricariæ, artemisiæ, pulegii, baccarum lauri, ad- jecto sale ammoniaco; frictions; cucurbitulæ; pediluvia; balnea; ignis electricus; motus cor- poris. Simul causæ occasionales evitandæ. Ven. s. & cathartica raro indicantur, cfr. curam con- crementorum uteri & mali hysterici. Ex dictis seligenda & combinanda, quæ cuilibet principio morbi, ejusdem complicationi & temperiei, &

M

in

in hac specie differentibus, propria sunt, e. gr. infarctus sanguinem admodum glutinosum contrinentes, usu largo martialium sæpius pertinaciores fiunt. Hinc ipsa, res solventibus, emollientibus, parca copia jungenda vel postponenda, e. gr. limat-martis pauca grana, sub cibis cum splanchnicis offerenda. Mercurium in lentore humorum, vasa uteri obstruentium efficacissimum & specificum auxilium præstare, sæpissime expertus sum.

M. M. ad 2) *V. f.* antiphlogistica, emollientia, antispastica, in- & externa, serum lactis, cremor tartari &c. balnea, clysmata, pediluvia tepida, mollia; subjunctis lenibus emenagogis ex chamomill. &c. & phlogosi cicurata, opiat. Aliena martialia.

M. M. ad 3) Morbo principi medendum vires restaurandæ. Aliena emenagoga.

M. M. ad 4) Chirurgiam exposcit.

M. M. ad 5) In subitanea suppressione sub initio curatio ad 2) ineunda; in progressu vero, indolis solidorum & fluidorum, varie degenerantis ratio habenda. Ingluvies prægressa catharticum exigit. Fluorem album inde enatum pulvis ex succino alb. camphora & nitro confectus brevi sanat. Fluxus menstruus tardior, quibusdam sanis naturalis & hæreditarius, idemque ex vitio uteri insuperabili retentus, nunquam violenter movendus.

AD CATAMENIA DOLORIFICA præmissis *v. f.* catharticis, anthelminticis, si indicantur, relaxantia, antispasmodica; infus. spec. nervinar. meracum pro potu & pro clysmatibus, quibus capit.

capit. papav. flores cheiri & ol. chamomillæ adde; emulsio ex ol. amygd. d. &c. ad dolores hystericos ordinata, adjectis extr. myrrh. aquoso, tinct. fuccin. inspissata & præmissa v. sne, opio. Sæpius pilulæ, ex mercurio vivo mucilag. gummi arab. subactæ, egregii usus fuerunt; subjungenda crebro roborantia.

SYMPTOMATA EX MATURIORI CESSATIONE MENSTRUI morbosa scilicet, præcauentur & curantur v. s. reiterata; cremoris tartari & decocti hord. rad. quass. &c. elix. acid. Dipp. acidulati diuturno usu; diæta strictiori & motu corporis.

STERILITAS

Nupta cum arte salutari, obstetricia rationalis, sæpissime opportunitatem suppeditavit in impedimenta fertilitatis dulcissimæ, matrimonialis inquirendi, eaque ex optato removendi. Certissime igitur observatæ, permulta & sat felici experientia circa sterilitatis causas & medelam ingenue hic communicabo.

Longe rarius, quam vulgo creditur, vir in culpa est tori infœcundi. Sufficiunt modicæ erectionis & ejaculationis vires, concubitus æstu in focum quasi potentix collectæ, ad imprægnandum fertilitati ex omni puncto aptum uterum. Seminis virilis puritas vel impuritas & inertia potius neonati corpusculi qualitati & sanitati vel favere, vel obesse videtur, quam ipsi conceptioni.

Est tamen, ubi viri impotentiam generandi compertam habemus. E. gr. ex atonia paralytica erectorum post veneris abusus; quam sanavit

M 2

D. Cha-

D. Chaptal immerso aliquoties pene intra decoctum sem. sinapis; ex virga male formata, in loco incongruo perforata; ex urethrae nimia obliquitate, angustia, nodis, glandulis tumefactis, varicibus, ulceribus, ad margines spongiosis, callosis, cicatricibus eminentibus, quibus candelis Goulardi subveniendum; ex membri spasmodica, immo epileptica rigiditate, in coitu adveniente, sic dictis specificis antiepilepticis curanda; ex præputii orificio nimis angusto &c. In mulierum vero genitalibus latebris centies concipiendi impotentiam & deploratam toties sterilitatem conjugiorum causam reperies, vix semel in marito.

STERILITATIS AUTEM MULIEBRIS, quæ proficuo adminiculo patet, sex diversas causarum species observavi. *Primam* magis extimam, cum valde infrequens sit, tacuissimam, nisi mihi pertinacissima occurrisset. Est magna proportio inter nimium peripheriæ colem & strictiora muliebria, adeo, ut introitum denegent, hymene etsi jam disrupto. Curavi confici ex ebure speculum quasi vaginæ uteri, membro virili paulo longius & gracilius, versus apicem extenuatum, secundum longitudinem quadrifidum, cruribus in fine crassiori, ope verticulorum cum mobilitate firmatis; cochlea in medio abscondita, quæ antrorsum divaricantur quatuor crura, ut in vaginam intrusa eam modesta vi sensim distendant. Id per aliquot 7manas quotidie aptum & per horulam in vagina detentum claustra tandem aperuit. *Alteram* eaque sepiissime obvia consistit in axis uteri cum axi vaginæ nimis acuto angulo, orifi-

orificio itaque uteri retrorsum nimis verso, os
 sacrum spectante, ideoque in plicis vaginæ ab-
 secondito, quo spermati ejaculato impragnans in-
 troitus præcluditur. Absolute tollitur hoc ob-
 staculum, vel coitu a posteriori, vel pessario ex
 subere cera obducto, cavitati pelvis adaptato, quo
 uteri cervix et orificium antrosum, medium ver-
 sus vaginæ dirigitur. *Tertia causa* ut priores
 mechanica & non minus mollissimis nostris tem-
 poribus consueta pendet a prolapsu uteri imper-
 fecto, seu orificii uteri, laxatis ligamentis ex sua
 sede descensu, vix ad unius vel alterius pollicis,
 ab extremis labiis distantiam; ita, ut penis immis-
 sus præter orificium uteri transeat, & semen retro
 hoc orificium in fundum diductæ vaginæ ad cer-
 vicem uteri nunquam non inutiliter evomat. Ju-
 vat ut in priori vitio pessus ex subere ceratus, quo
 uterus ejusque os altius in pelvi suspendatur, bi-
 balumque emisso spermati respondeat. *Quartam*
causarum speciem constituunt infarctus vaso-
 rum minimorum, præcipue uteri, quibus tam
 sanguis menstruus difficulter emittitur, quam ros
 quilibet vitalis, cum debita ad fecundandum
 jucunditate ex osculis villisque uteri exsudare
 impeditur, uterus ideo quasi exsiccat. Signum
 diagnosticum dant catamenia interdum non in
 omnibus quidem anomala & justo parciora, sem-
 per vero dolores varii circa pelvim, quæ præ-
 grediuntur menstrua & comitantur. Amara,
 salina & gummata visceralia deobstruentia ad
 infarctus alias præstantissima hic omne punctum
 non absolvunt. Oportet jungere mercurium vi-
 tum Plenckii cum camphora, qui specifica ut
 videtur vi, minimos in utero canales & rece-
 ptacula perreptandi præditus; ea dosi, ut ne qui-

dem salivationem moveat, in pilulis, nuptus distis amaris & gummatis galbani & asa. Balnea simul conducunt, præcipue Emsensa, vel Wisbadana, non satis in hoc casu celebranda. Quibus ad Emsensa &c. aditus impossibilis, locum teneant domestica tepida ex herbis uterinis cum sapone & clysteres ex visceralibus nervinis. His certe, credas experto, curatam continges metam. De fluxu menstruo, infarctibus vasorum majorum aliisque obstaculis cohibito, capit. antec. sermo fuit.

Quintam causarum sterilitatis speciem exhibet irritabilitas nimia nervorum uteri & ad inæquales, non tamen semper dolorificas constrictiones sensilissimarum partium proclivitas, quo se & excretiones in iisdem continuo turbantur, mucus forsitan in intimis recessibus & præcipue in tuba fallopiana obturans coacervatur, hinc ad ovarium aditus impossibilis. Divinatur hoc obstaculum ex memorata nervorum inimica mobilitate & ad spasmos propensione. Juverunt nunquam non pilule ex asa fetida, majori dosi, nuptæ extracto cort. peruv. Valerian Lumbicior. aliisque viscerabilibus moschoque & similibus largiori manu propinata. Ubi acrimonia forsitan venerea, arthritica, exanthematica, aliave infidet nervis uteri, spasmos proritans ea simul debellanda, quod vide suo loco.

Sexta denique causa innititur tono genitalium muliebrium internorum valde relaxato, frequentissimo hodie, ob laxissimum nostri seculi genium, mollitie defluens, sobitioni calidorum immersum vitæ genus; nec non de deploranda, arcana, hodierni avi pernicie masturbacione cogitan-

gitandum. Non valent laxissima partes, spermaticos latices ad suas oras deferre, nec quos receperunt, continere, nec fecundatum ovulum fulcire. Auxilio sunt roborantia ex marte, cort. peruv. myrrh. aurantiis &c. &c. cum uterinis vel in forma extractorum pilulari, vel ex infusis vinosis; externe cingulum uterum roborans.

Maceratis simul fluore albo, addas injectiones in vaginam balsamo de copaiva conditas. Hæmorrhoidum anomalarum, vaginam versus vergentium, ibique vel fluentium, vel cæcarum & dolentium sub coitu, vel mucosarum curam vide sub hæmorrhoidibus; hæmorrhagiam uteri &c. suo loco.

Ubi duo pluresve recensitarum causarum complicatæ, M. M. complicatis speciebus quadrantes judiciose conjungendæ. Prætermitto rarissime obvenientes, artem eludentes sterilitatis causas, quas exhibent perversa varia, mutila, imperforata muliebrium internarum, a nativitate constructio; cæ nimia obesitate pressæ, obturatæ; ovaria, hydatibus, scirrhis &c. obsessa; vesicularum humor concretus, aliove modo corruptus, ovula, fœda lascivia avulsa, perdita; quarum causarum plurimæ suspicandæ potius quam dignoscendæ.

CONCREMENTA UTERI.

Sive massæ filamentoso-membranaceo-polyposo-carnæ, scirrhosam, cartilagineam substantiam interdum referentes & hydatibus referatæ. *Diagnosis* mensium fluxus mox largior, mox parcior, mox plane suppressus ejusque quantitas

M 4

gluti-

glutinosa, filamentosa, putrida, anxietatum præcord. palpitationum cordis crebrior & repentinus insultus; phlogoses; hypophthalmia livida; abdominis tumor duriusculus, non acuminatus, sed planior & versus hypochondria latior, isque inæqualis, inde a tumore uteri, foetu gravidi, distinguendus; nonnunquam abdomen modo distentum, modo flaccidum, ibique dolor pungens fugax crebrior; sensus & doloris sensus, a lumbis incipientis & versus inguina descendens doloribus ad partum veris analogus, mammae simul materia lactiformi turgescens. Raro ultra trium mensium spatium post menses retentos, in utero hospitatur.

Cæ: præter mensium vitia eorumque causas, imprimis lochia aliæque uteri hæmorrhagia suppressæ; hinc cruor coagulatus in uteri cavo restans & in polypos coactus; hinc quoque excrementæ ex vasis uteri; obstetricum manus rudes; lascivitas; sæpius secundiparum particula, vel placentula abortus, retenta & ovum imperfectum, molarum potissimum causa. *Curatio* a medela mensium, a causa prima, suppressarum parum differt. Profuerunt quoque vinum medicatum. R. N. M. Nro. 4. — 6. rad. levistic. curcum long. aa. ℥i. cinamomi ℥iij. incis. infunde vini generosi ℔ij. D. bis de die ℥ij-iiij. vel R. malor. aurant. amar. viridium, vel subviridium, in taleolas minutim concis. Nro. IV--V. sri alb. grosso modo contusi ℔℔ N. M. in India condit. Nro. II. cas. lign. ℥℔. vini generosi ℔j. aquæ q. s. coquantur lenissime ad mollitiem & syrapi consistentiam, D. sæpius de die,

die taleolus unus, aut alter, cum aliquot cochlearculis fyrupi; elixir. nervin. cum ess. succini juxta Hoffmann. parat.; cingulum antihystericum; inunctiones ope ungti ex pulv. baccar. lauri ol. oliv. & bals. nucistæ confiati crebriores; interpositis pilulis visceralibus, cum asa fetida, quandoque cum mercurii maciluginosi pauillo mixtis, clysmatibus, & balneis; ea quidem lege, ut, inprimis balnea, per 6—8. dies, mensium periodum præcedentes, pilulæ vero durante quoque fluxu, hisque sat diu usurpatis, denique martialia adhibeantur.

Mulier sterilis incidit in hæmorrhagiam enormem, cui anasacra supervenit. Ex prægressis signis supra descriptis concrementa uteri subesse conjecturans, clysteres viscerales, ter, quater, de die repetendas & decoctum roborans Septalii elixirio acido Dippelii acidulatum præscripsi eo effectu, ut foemina subortis post aliquot dies, doloribus ad partum vehementibus, concrementa, vas, mensuram continens replentia, adjuvante obstetrice enixa & simul ab hæmorrhagia & hydrope liberata fuerit, posteaque mater aliquot infantum devenerit. Cfr. dissertationem cl. Schmid de concrementis uteri & in ea relatos, ex praxi nostra desumptos casus.

MALUM HYSTERICUM

Stricte sic dictum, vel cujus primaria sedes in utero est (cum malo hypochondriaco, cum quo quidem multa pathemata communia habet & quandoque infelici connubio complicatur, non confundendum), sequentibus inprimis sympto-

M 5

mati-

matibus, admodum mutabilibus, incedit; pulsu tardo, stricto & depresso; copiosa lotii limpidi excretionem; junctis interdum anxietate & cordis palpitatione, paroxysmi prodromis; sensu globi ex infimo ventre ad fauces ascendente, ibidemque hærente; colli tumore; faucium strangulatu; frigore acri, non superando, lumbos & occiput potissimum occupante; dolore lumborum, intestinorum; umbilici retractione; clavo; aponia; deliriis; fletibus & cachinnis, mox se excipientibus &c.; sopore; syncope incautis mortem imponente; alvi obstipatione, mox diarrhœa, eaque interdum viridi; vomitu aliisque motibus spasmodicis miris & ex minimo strepitu excitationis, in convulsiones & epilepsiam quandoque degenerantibus. Cæs: debilitas, mobilitas generis nervosi (vide Cæs gener. Nro. 10, — a — & b.) in specie vero, uteri a natura laxi, & partium ad eum pertinentium irritabilitas nimia; circulus sang. in vasis uteri inæqualis; plethora topica; menstrua, lochia vel nimia, vel suppressa; (cfr. Cas vitiorum menstrui) fluor albus, isque cohibitus; concrementa, prolapsus uteri; tumores varii ejusdem, ovarii &c. glandulæ harum partium obstructæ aliaque vitia; cacochymia varia irritans huc determinata; humor spermaticus luxurians, fervidus; hinc imaginatio vivida; salacitas; veneris usus denegatus, unde mœror, furor uterinus &c. venerisque abusus, masturbatio; quandoque vermes intestinorum; ascariides ad muliebria proserpentes; viscerum abdominis infarctus; suaveolentium & in rariori quidem idiosyncrasia, fœtidorum odor; dulcia gustata multa que alia, in - & externa leviter irritantia, dispositis motus anomalos excitant.

Quam-

Quamvis in alijs magnæ noxæ in utero adesse possint; quarum tamen nervi, ad irritamenta suscipienda non tam proni sunt & quæ ejusmodi gravibus affectionibus non vexantur.

M. M. RADICALIS. Roborantia, martialia; cort. peruv. radiceis acaciæ; succus catech.; ess. succini Hoffmanni; cinamom. *N. M.* gummi ferul. pil. visceral. cum marte solubili & pauxillo ol. cornu cervi conflata; pulvis roborans ad digest. læf. Csam 2) adjectis aliquot granis pulv. castorei; ex aqua nervin. & ess. succini inspissata sumenda; infus. specier. nervin. decoct. rad. quass. frigidum elixir acido Dipp. acidulatum; serum lactis, foliis aurant. hyperici, cum floribus & pauxillo spicæ celt. alterat. & chalybeatum (cfr. *M. M.* malo hypochondr.); frictions; epithemata aromatica; cingulum abdomen leniter constringens, pulvere myrrh. galb. castor. rad. Valerian. fol. aurant. matricariæ, *N. M.* cort. cascarill. peruv. & limatura *L.* santal. citrin. & rhodii repletum, aqua meliss. compos. cum solutione martis solubilis mixta, irrorandum; clysmata roborantia, antihysterica; balnea initio tepida; dein frigida, inprimis Emsensia; lavationes totius corporis subfrigida, frigida; junctis frictionibus; motus corporis; regimen justum. *Aliena:* Evacuationes; potus aquosus nimius, inprimis tepidus. Si vero cathartica, ob prægressam ingluviem, præsentis fordes, indicantur, ipsis extr. rad. quass. & pauxillum laudani adde; simul cacochymia suis propriis remediis cicuranda; uteri vitia tollenda & reliquæ cause occasionales evitanda, aut repositione prolapsus uteri aut anthelminticis &c. &c. corrigenda

gendæ sunt. Nonnunquam ardentioribus votis exoptatum conjugium suadendum, aliis dissuadendum. Uterus enim gravidus mox pathemata hysterica compefcit, mox proritat.

IN TEMPERIE CALIDA PLETHORICA ex *Csa gen.* Nro. 10, — b — antiphlogistica v. f. saponacea, acida; roob, ribes, rubi ideï &c. elect. tartarif. pulpa cassiæ; serum lactis cum herb. acetosell. pptum & rad. gram. fragar. fol. scolopendr. meliss. agrimonix, asperulæ alteratum denique chalybeatum; decoct. hordei succo citri vel elix. acid. Dpp. acidulatum, clysmata, balnea mollia, tepida, diæta magis vegetabilis, nonnullis lactea, conveniunt. Debilitatis & exhaustis, ex prægressis hæmorrhagiis, partu difficili, doloribus, morbis acutis &c. &c. (Cfr. *Csas gener.* Nro. 3.) præter roborantia præscripta, victus eupeptus, aromaticus, potus ex farina avenæ tosta, lacte & pauxillo chocolade pprus, interdum diæta lactea confert. Monita & consilia moralia vide sub infania.

SYMPTOMATA SPASMODICO-CONVULSIVA mitigant antihysterica, asa foetida; castoveum; galbanum; myrrha; camphora; sal volat. cornu cervi; crocus &c. quo & antiepileptica & opiata spectant; Pilulæ ex dictis gummatibus, extr. Valerian. rutæ spirituosis, croco & pauxillo opii vel extr. hyosciami constatæ; tinctura fuliginis, cum spiritu salis ammoniaci ppra, vel spir. Minder. cum ess. succin. mixtus, adjectis aliquot guttulis laudani; elix. uterin. croll. — *Re.* Aquæ nervin. ℥vii. ess. galb. cum liq. anod. min. ppt. ℥ij. salis vol. cornu cervi, laud. liq. Syd. pulv.

pulv. castor. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. nitri depurati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ms. D.
 omni $\frac{1}{2}$. hor. cochl. ij. — R. Aquæ nervin.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{viii}$. in qua extingue camphoræ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ad sui con-
 sumtionem, adde syr. diacod. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. dosis $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. —
 R. Pulv. fol. scolopendr. vulg. matricariæ aa.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. nitri gr. v. ms. D. bis de die, ex infuso,
 vel potius ex succo fol. matricar. sumendus —
 Inter efficaciora bolus seq. referendus: R. Mo-
 schi, asæ fœt. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. extr. capit. papav. rh.
 vel hyosciami gr. i—ij. syr. croci q. s. bis de
 die exhibendus vel in decocto clysmatico solutus
 ano appdus — R. Ess. castorei, carminat. We-
 del. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. laud. liq. Syd. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. extr. croci gr.
 x. ms. D. omni quatrihorio gttas xl. — L. — R.
 Extr. hyosciam. D. bis, ter de die gr. j. ascen-
 dendo per intervalla ad gr. ii — iv. & plura.
 Præmissis vel subjunctis, si temperies calida &
 plethora, vel saburra pr. viar. se manifestant,
 mox v. sne, mox cathartics, quibus antihyste-
 rica, opiata admisce. Externe acetum rutæ.
 cum essent. castor. & aqua anhalt. mixtum, pro
 odoramento, vel spir. cornu cervi cum spir. falis
 ammoniaci mixtus, aut fumus succini naribus
 admittus; (cui, si aspersionem aquæ frigidæ, ti-
 tillationem plantarum, frictiones crurum, im-
 mersionem brachiorum ad cubitos usque & pedum
 in aquam sat calidam, frictione sub aqua, simul
 adhibita; constrictionem abdominis, mediante
 cingulo antihysterico, clysmata addis, opti-
 ma excitantia, in sopore & lipothymiis habes);
 porro balsamus, ex ceræ $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. olei rut. cocti nu-
 cest. express. aa. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ol. destill. succin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. gum-
 mi

mi galb. aſæ foetid. ſolut. aa. ℥ii. extr. caſtor.
 ℥ij. conſarus ad nares, tempora, verticem, um-
 bilicum & ſpinam dorſi; empl. ex galbano in
 tinctura caſtoſei ſoluto, adjecto pauxillo tacama-
 hac. camph. & aſa foet. ad os ſacrum, uteri re-
 gionem & plantas, injectiones in alvum & vagi-
 nam, ex decoct. rad. Valerian. & fol. matricar.
 artemiſ. flor. chamom. & ſem. nigell. in quo
 galbanum & aſam foetidam ſolve; ignis electri-
 cus. Nonnunquam ſenſiſſimarum truncus cum
 artubus, ligaturis involvendus eſt.

Lotii imminutioni, limpidi excretioni
 medentur. ℞. Spir. cornu cervi ℥ij-ij. aceti
 ſcill. ℥℥. fyr. d. cryſ. lob. ℥ij. laud. liq. Syd.
 gtts. viij. ms. D. omni bi-trihorio gtts. xl — l.
 ex infuſo nervino; clysmata emoll. terebintina
 regioni renum affricta, quibus quandoque paro-
 xyſmus præcaveretur. *Vomitus* pilula ex caſtoſeo
 & opio cohibetur.

PALPITATIO CORDIS mox ſucci limon. coch-
 learæ, mox hauſtu ſpirituſo, opiato mitigatur;
ſaucium ſtrangulatus medelam vide ſupra &
 ſub morbis œſophagi. *Ad dolores inteſtinorum,*
cardialgiam, convulſiones. ℞. Ol. amygd. d. rec.
 ℥j-ij. balſ. peruv. gtts xxx. fyr. de alth. ℥j.
 mucilag. gummi arab. q. ſ. accurate ſubactis ad-
 miſce paulatim aquæ rutæ, menthæ, millefol. aa.
 ℥ij. chamom. ℥iv. ut f. emulſio. Doſis quavis
 ℥ſ. hora cochl. i — ij. opio tandem adjecto;
 clysmata antihyſterica, egelida, balſamusque mo-
 do deſcriptus, ad ſcrobiculum cordis, umbilicum
 &c. Nonnunquam vero v. ſ. aut præmittenda
 aut ſubjungenda. Et in paroxyſmo pro varia
 tempe-

temperie & idiosyncrasia, curiosius disquirendis, nullo in morbos magis fallacibus M. M. varianda. Plurimæ enim hysterica v. s. cathartica & suaveolentia minus ferunt; multis moschus majori dosi exhibitus, vel cum zibeto, mediante pessario vaginæ adptus, præsentaneum levamen adfert, quamvis eorum odorem adversentur; per-paucæ graveolentibus clysteribus, balneis &c. læduntur. *Dolor ischiadicus, hystericus*, fugax & tactu gravior, præter interna modo descripta, pannos fumo succin. imbutos calide aptos & electrificationem exposcit. *Pathemata hystERICA, periodica* gravia, cortice peruv. & opio prævertenda.

MORBI GRAVIDARUM.

In curatione tot pathematum gravidas affigentium, solícite indagandum est, an 1mo. *inexplicabilis illa uteri post conceptionem mutatio & inde sensilibus eveniens motuum anomalia*; an 2do. *Plethora*, an 3tio. *Uteri major dilatatio*, ex foetus incrementis mole & inde enata viscerum abdominis pressio, dislocatio causa sit & studiose explorandum, an dictæ causæ complicatæ sint & aliæ concurrant.

PRIMA SPECIES DIGNOSCITUR ex subjecto delicatulo, sensibili; ex prægressis motibus hystericis; ex nausea; vomitu; imaginatione & appetitu, mire depravatis; tremore; palpitatione cordis; lipothymiis aliisque symptomatibus hystericis, conceptionem mox insequentibus; quamvis & graviditate confirmata, hystericis contingant.

SECUN-

SECUNDAM SPECIEM PATEFACIUNT temperies calida, plethorica; fluxus mensium largior; dispositio ad hæmorrhagias & post imprægnationes evenientes; palpitiatio cordis; cephalalgia; odontalgia sanguinea; vertigo; agrypnia; dispnœa; vomitus; lipothymia; dolores; motus convulsivi varii aliæque symptomata, quæ ex plethora commota, vel ex sanguinis orgasmo propullulant, secundo & tertio in primis mense affligentia.

TERTIA SPECIES urinae difficultatibus; alvi obstipatione; tenesmo; hæmorrhoidibus; varicibus; œdemate; dispnœa; quandoque vomitu, in progressu graviditatis & sub finem contingentibus incedit.

M. M. *Prima species* antihysterica, opiata, roborantia; *secunda* v. snem, temperantia exposcit. *Tertiam* situs commodus, fasciæ, linimenta, interdum v. f. & eccoprotica mitigant. In complicatione antiphlogisticis opiata subjungenda. In quavis specie morbi concurrentes caute tollendi Saburra prim. viar. lenissime eliminanda & fœces induratae, quæ sæpe hæmorrhagias, abortum & partum difficilem inducunt, emolliendæ & educendæ, per clysmata crebriora, emollientia, tandem parum irritantia, (vide alvi obstipationem) per cathartica lenissima, manната, decoct. chocolade cum infuso colato flor. acac. persicor. & folior. fennæ pptum, syr. rosar. fol. & violarum edulcoratum, per tincturam rhei Darelii cum liq. terræ fol. tartari & anod. min. mixtam. R. Mann. elect. ℥j. pulpæ cass. ℥ss. salis mir. Glaub. ℥ij. solve in aqua menth. ℥ij. colaturæ adde syr. rosat. solut. ℥ss. liq. anod. ℥ss. D. tribus vicibus vel R. Elect. lenitiv,

lenitiv. pulpæ cassiæ tamarind. aa. ℥j. cremor. tartari ℥j-ij. pulv. rad. jalapp. ℥ij - ℥j. syr. cort. aur. cinamom. aa. ℥ij. ms. f. elect. D. in ea dosi quotidie, per vices, quo alvus semel, vel bis leniter sollicitetur.

NAUSEA, VOMITUS, evacuatis fordibus, mox v. f. & haustu aquæ frigidæ, acidulæ cicuratur; mox spirituosis, stomachicis & opiatis; remedio antiemet. River. elixir. stomach. aqua menth. diluto; liquore anodyno min. cum aliquot guttulis laud. liq. Syd. pane bis cocto, vino hispanico imbuto; fructus uvæ crisp. immaturi condimentis; cydoniorum præparatis; clysmatibus; theriaca ad regionem ventriculi. Jejuno ventriculo, qui vomitu magis patitur; juscula cum vitell. ovor. decoct. chocolad. &c. crebro, sed parce offerenda.

AD DIARRHŒAM EXCEDENTEM, torminibus stipatam, ab ingluvie, vel refrigeratione &c. præmissis tinct. rhei & clysmatibus oleosis, opii maturus usus, externe bals. nucist.

AD DYSENTERIAM BENIGNAM EX PLETHORA, recens nuptis familiarem & ad *tenesum* præmissis mannatis, emulsione balsamica, ex ol. amygd. d. &c. laud. liq. tydenti, clysmata, ex sem. lini, cum lacte cocto, adjecto vitello ovi ppta ad *aphoniam* v. f. remediaque antispasmodica, ad *thussim* præmissis demulcentibus & interdum v. f. opiata.

AD DOLORES PUNCTORIOS abdominis &c. linimentum ad mensium vitia ordinatum; cly-

N

steres

steres; interdum v. f. & paregorica. *Ad dolores & nodos mammarum* frictio lenis; cataplasma, vel fomentum ex hydrogala, sapone v. pauxillo camphor. & croci vel ex infus. flor. chamom. & sambuc. in cujus ꝑij. salis tart. ꝑij. solvuntur vel fomentum ex foliis alni & chærefol. concisis & probe calefactis; linimentum ex oleo hyosciami & spir. salis ammon. vel ex butyro albumine ovi, pauxillo croci & sale volat. cornu cervi; empl. de cicuta, siphon Steini; fuctio papillarum (cfr. curam stagnationis lactis puerperarum). Hisce si tumores duriores non cedunt, interne R. salis ammon. ꝑi. solve in vini rhen. ꝑꝑ. D. bis, ter de die cochl. ij. vel sapo antimonialis. *Papillæ nimis parvæ & retractæ* diutius ante partum fugendo & machinulis eliciendæ. De earum fissurio vide infra.

PEDES CRAMPO AFFECTI pulvinari involvendi & ol. olivarum illinendi. *Herniæ ligaturis* retinendæ. De *hæmorrhoidibus*, vomitu eruento fluore albo &c. vide suo loco. De *lipothymia*, *palpitatione cordis*, *tremore alisque motibus convulsivis* cfr. malum hystericum ad *ischuriam*, decubitus supinus, elatioribus coxis & demissiori capite, remotio orificii uteri a collo vesicæ & sub finem graviditatis, capitis fœtus; *cystoceles* curatio (quam vide sub *ischuria*). Si partus tempore accidat, nec catheteri aditus permissus, tunc subito aquæ rumpendæ.

AD INCONTINENTIAM URINÆ idem decubitus. *Ad varices* decubitus descriptus. Post partum, simul frictio lenis, matutina, spleniæ, aqua

aqua largiter falsa & cum spir. vini mixta, irrorata imposta, quæ fascia lata circumdata, ab inferioribus versus superiora lenissime comprimantur. *Ruptis* alkohol cum solutione aluminis. *Gangranescentibus* ungtum nutritum appda. *Ad pedum œdema* fomentum vinosum ex speciebus cephal.; sacculi sale & cinere vel foliis betulæ rec. repleti, fasciæ leniter constringentes, cathartica, frictiones abdominis cum linimento uterino.

AD PRURITUM ferinum, cum & sine pustulis tum ubique, passim, tum in genitalibus molestissimum, abortum minitantes, potus demulcens, leniens, copiosus, serum lactis; emulsiones; clysmata similia; vapores; fomentationes emoll.; cathartica lenia; sæpe v. f. reiterata, tandem opiata. *Ad aquæ spuria profusivum* quies; unguentum uterinum.

ABORTUS frequentius inter alterum & tertium mensem evenit, inopinato quidem; interdum vero imminentem præfagimus ex anxietate, horripilatione, frigore abdominis, pondere gravi in ipso, colore faciei livescente, syncope, tenesmo, mammarum marcore subito, motu embryonis cessante, aliisque fœtus emortui signis, doloribus illis ad partum similibus; cruoribus e genitalibus effluxu, causis cognitis prægressis & præsentibus, illis nempe, quæcunque uterum ad contractionem convulsivam irritant, aliove modo placenta separationem procurant. Quo imprimis referenda I.) plethora, corporis vehementis motus, coitus frequens, drasticonum, exsuantium, emenagogorum usus; ira, terror, violentia abdomini illata, ponderis elevatio, ves-

stes angustiores, clamor, sternutatio, tussis, vomitus excedentes. 2.) Uteri laxitas, debilitas, innata aut acquisita; dispositio ad motus hystericos, anomalos, levi ex causa excitandos, odore vario, brachio sublato, rei non potiundæ desiderio aliisque animi agitationibus, moliminibus menstruis, concrementis uteri, tenesmo, scybalis intestini coli; foetus mole & motu nimio, vomitu, tussi &c. &c. 3.) Nutrimenti defectus post morbos perpeſſos, febres, hæmorrhagias, fluorem alb., fluxus alvinos &c.

PRIMA SPECIES præcavetur quiete, v. f. in brachio, repetitis, sed parce institutis; antiphlogisticis; subjunctis antispasmodicis, opiatibus; nec non uncto, ex bals. nucist. uncto alth. & liqu. anod. min. composito; clymatibus demulcentibus, paregoricis (cfr hæmorrhagias uteri). *Secunda species* antihystericis, opiatibus, roborantibus, adstringentibus; pulv. N. M. & cortice aurantior. ex tinctura cinamomi, aqua nervina diluta, adjecto laudani liquidi pauxillo sumendis &c. &c. Externis, sub hæmorrhagia uteri descriptis, aliena v. f. &c. *Tertia species* blanda nutrientia, analeptica, roborantia & antispasmodica exposcit. Ubi vero placenta, vel ejus magna pars jam separata est, ex hæmorrhagia copiosiori &c. suspicandum, sepositis medicamentis, ad foetus educationem properandum est. *Abortus imminens* ex uteri angustia ceu abortus periodicis causa; ex ejus scirrho aliisque morbis fonticis; partium vicinarum magno vitio; placenta atrophica &c. foetus situ præternaturali, morte; funiculo nimis brevi, vel circa foetum varie contorto, arte vix præcaveri potest. Vires

res hæmorrhagia exhaustæ solo jusculo carnis vitulino, egelido sæpe, sed parca dato, restaurantur.

Post abortum perpeffum & ante novam impregnationem. *Ad futurum abortum præcavendum* M. M. sub concrementis uteri (quæ crebrius, quam creditur, abortui ansam dant,) descripta, adhibenda est, & ibi recensitis remediis, tam diu continuandum simulque a concubitu abstinentum est, donec statum gestationis tempus evensum sit.

PARTUM INSTANTEM indicant, fluxus humoris serosi, albescentis, interdum sanguine tincti, ex genitalibus, duos aut tres dies ante partum; dolores in regione lumbari insignes, ad inguina vergentes; urinæ excretio consueto major; rubor faciei; motus tremuli ad femora; interdum vomitus; tumor partium externarum; orificium uteri apertum.

MORBI PARTURIENTIUM ET PUERPERORUM.

AD PARTUM DIFFICILEM PRIMIPARARUM ANNOSARUM præcavendum, vapores molles & ol. amygd. cum decocto meraco rad. alth. diu conquassatum, partibus genitalibus appda.

AD DOLORES SPURIOS sursum potius tendentes, mox a flatibus & sordibus intestinorum, mox a plethora oriundos, præmissis, mox leni cathartico, carminativo, mox v. sine, nec non infuso & clysmate ex speciebus nervinis pptis &

N 3

ungto

ungto ex pulvere baccarum lauri & ol. olivar.
s. q. ppto, opiata conducunt. Sæpe sensilitas
tantum & mobilitas hysterica accusandæ veniunt,
tunc antihysterica, opiata sufficiunt, e. gr. bolus
antihystericus vel B. aquæ nervin. ℥viiij. tinct.
succini vel castor. ℥ß. laud. liquid. gtts xx-
xxx. ms. D. prima vice cochl. iij. reliquum
minoribus dosibus intra aliquot horarum in-
tervallum deglutiatur. Eadem, ad *languo-
rem, anxietatem, metum hystericarum, nec
non dolores ad partum deficientes* junctis tunc
ungto roborante, ex pulv. baccar. lauri &c. &
clysmata valent.

CURATIONEM, VOMITUS, LIPOTHYMIÆ, CON-
VULSIONUM, HÆMORRHAGIÆ &c. PARTURIENTIUM
vide sub morbis gravidarum & malo hysterico.
Symptomata lethalia, morbus miliaris, gangræ-
na, mors ex effusione sanguinis per tubarum
oscula, in cavitatem abdominis; ex dilaceratio-
ne uteri & ex derivatione subitanea humorum,
in partu quoque naturali evenientia, vix præ-
cavenda.

PUERPERARUM regimen sit temperatum, fi-
tus supinus, quietus, animus tranquillus, diæta
strictissima, alvus libera; sollicitanda hic obsti-
pata clysteribus vel suppositorio ex alumine, oleo
oblinito, (vid. obstipat. alvi) & puerperæ mo-
nendæ, ut, postquam aliquot horas post partum
quieverint, urinam tentent reddere. Pro nutri-
mento sint, juscula carnis adjectis pane atro,
vel succo citri, pro potu, decoct. hordei, radice
graminis & pauxillo sem. cicerum, herb. melif-
sæ,

ſæ, & flor. ſambuc.alteratum. Idem decoctum cum foliis virgæ aureæ, & fyr. viſcerali pptum & externe linimentum ex butyro & infuſo herb. majoranæ viſoſo, compoſitum. *Ad partes contuſas* conferunt: *Dolores poſt partum* ex partium dilatatione &c. ſæpiſſime ex grumis ſang. & placentæ partibus, in utero reſtantibus excitati, ligatura idonea; infuſo ſpecier. nervin. ol. amygd. d. rec. expreſ. cum fyr. cort. aurant. mixto; cataplaſmatibus, ex flor. chamom. baccis lauri contuſ. pane & lacte paratis. *Ungtis, clyſteribus, tandem potione opiata, minoribus doſibus exhibita mitigandi.* Ingruente vero febre lactea, opiata exulent; adhibentur decoctum recensitum & mixtura temperans, leniter camphorata.

DOLOR IN REGIONE OSSIS COCCYGIS vehementis, ex ejus luxatione veniens, digito ano intruſo, detegenda, reſpoſitione oſſis ſanatur.

LOCHIORUM FLUXUS NIMI CURATIONEM vide ſub hæmorrhagia uteri. Si vero lochia dolorifica, nimia, a portione ſecundinarum reſtenta; grumis ſ. uterum irritantibus; rudi contractatione & ſpasmis oriuntur, opiata, cum nitroſis mixta, ex decocto althææ exhibeantur. Grumi ſanguinis majores, blanda obſtetricis manu educendi, minores mollibus quoque preſſionibus hypogaſtrii, quoquoverſum inſtitutis promovendi, *cfr M. M. ſub abortu.*

LOCHIORUM SUPPRESSIO.

Cæ partus difficiles: partium rudis contractatio; placenta violenta extractio; cardiacorum, calidorum, parturientibus consueto propinatorum abusus; motuum anomalia; fibrarum strictura; ex animi pathematibus, refrigeratione &c. ingluvies s. lentore. *Ad temperiem plethoricam, calidam, suborta febre vel prægressa violentia* M. M. antiphlogistica adhibenda, v. s. diluentia copiosa; decoct. pro potu ordinar. adjectis flor. sambuci & semine lini; clysmata similia, cataplasmata emoll.; adjectis flor. arnica, subjunctis, si spasmi vel anomalia motuum timentur, opiatis cum refrigerantibus mixtis, emulsione galbani vilioris, cum nitro & syr. diacod. ppta &c. fascia simul nimis stricta relaxanda. Eadem M. M. in uteri inflammationis metu valet; quæ ex febre inflammatoria, dolore continuo, fixo, urente, in hypogastrio, tumore dolente in regione pubis; ex uteri ore duro, clauso, retracto & ad contactum dolente, tenesmis, stranguria & ex prægressis causis gravioribus suppressionis lochiorum cognoscitur. Ne vero uteri inflammationem cum illa puerperarum febre confundas, quæ ex colluvie biliosa enata, & in intestinorum & omenti inflammationem transiens, dolore fixo circa umbilicum & regionem iliacam, abdomine tenso, tactum non ferente; cephalgia frontali; coloris & quantitatis lochiorum mutatione; vomitu; diarrhœa, biliosis reliquisque ejusmodi sordium signis stipata est, & catharticis, vomitoriis & clysteribus curatur.

LOCHI-

LOCHIORUM FLUXUS SUPPRESSUS, *vel nimis parvus ob sanguinis lentorem, ingluviem &c. absente febre & in temperie magis frigida.* Pilulis visceralibus, ex infuso meraco fol. leuistici, menth. flor. camom. fumendis, non omifis externis sanatur. *Diarrhæam*, lochiorum vicariam excretionem, sæpe salutarem & ex lacte retrogrado venientem, ne stringas; ex ingluvie vero, refrigeratione, animi pathematibus ortæ & excedentis, medelam vide sub diarrhœa gravidarum. *Retentioni urinæ* ex prolapsu uteri, ejus repositione, ex partium contusione, demulcentibus, cataplasmatibus, enematibus oleosis; *ex atonia vesicæ*, topicis roborantibus, lenibus pressionibus abdominis & cathetere consultitur, cfr medelam sub urinæ difficultate.

DE INCONTINENTIA URINÆ vide ibidem. PLACENTA SI NIMIS FORTITER ADHÆRET, vel si orificium valde constrictum est, potius relinquenda, quam educenda. Ea restante, putrescente, injectiones crebriores in uterum, ex lacte, radice alth. flor. chamom. verbasci & croco alterato; ungtum de althea, clysmata emollientia; interne potissimum decoctum pro potu ordinario acidulatum & succus fol. leuistici rec. ad ℥iij. propinanda.

DE NODIS MAMMARUM vide morbos gravidarum. PAPILLARUM FISSURÆ linteis, succo semper vivi, madidis, crebro impositis, vel oleo cereæ limpidissimo, cum pauxillo liquamine myrrhæ mixto, vel capitulis ex creta confectis & spiritu mastichis prius imbutis, nec non stro

N 5 canna-

cannariensi; in flamma candelæ ceræ liquefacto & in cella ad deliquescentiam reposito pptis, subjunctis quandoque catharticis & s. purificantibus, curantur. Præcauentur sæpe nodi & fissuræ, formando, eliciendo, elongando & roborando papillas, ante partum, ope suctionis & fomenti spirituosi, roborantis, dictorum capitulorum cretaceorum &c.

LACTIS AFFLUXUS IMPEDITUR ET STAGNATIO IN MAMMIS NON LACTANTIUM discutitur linteolis mollibus, paululum comprimentibus; frictionibus, cum oleo chamom. camphorato, vaporibus oxycrati, flor. chamom. sambuc. melilot. lavend. & semine cumin. alterati; impositis fol. recent. alni juglandis, chærefolio, geranio robert. parumper calefactis & contus. rob. sambuc.; empl. spermat. ceti, cum melilot. & camph. mixto; nutrimento parco; potu diluente; diuretico; infuso herb. menth. flor. sambuci; alvo libera, enematum ope, fluxu lochiorum aucto. *Metastases lacteæ* a lacte suppresso suffocato; ab aëre frigido suscepto &c. Tumores opacos, albescentes elasticos, calidos, foveas non relinquentes, si digito premantur, descendentes potius, quam ascendentes in variis locis, potissimum in crure & tibia formantes oppugnantur fomentis ex infuso meraco flor. sambuc. chamomill. fol. alni chærefol.; in quo sapo v. & salis tartari pauxillum solvitur, interne pilulis, ex sapone antimon. rheo & pauxillo sale cornu cervi vel ammoniaci & extr. aconiti conflatis, ex infus.

AD

AD PARTES INTERNAS FACTÆ AD UTERUM
 PRÆCIPUE cujus symptomata sunt: uterus sta-
 tim post partum tensus; durus dolorificus, lo-
 chia suppressa & diarrhœa eorum loco, pulsus
 celer & durus; hæc in dies aucta, cum mam-
 mis flaccidis. Maxime profuit, omissa omnino
 v. s. m. ixtura largiter camphorata, cum cort. pe-
 ruv. nitro &c. simul emulsio, cujus ꝑj. cam-
 phoræ ꝑj. addita. Bis de die clyster R. cam-
 phor. ꝑj. teratur cum gi arabic. ꝑij. & affun-
 de brodii ꝑviiij. qui diu retinendus. Externe
 cataplasmata ex mica panis cum arnica & cam-
 phora.

LACTIS DEFECTUS corrigitur decocto ex
 rad. fœnic. d. ꝑij. folior. fœnic. menth. chære-
 fol. aa. ꝑiij. femin. fœnic. ꝑj. ms.

LACTIS STILLICIDIUM EXCEDENS, SUDORES
 ET FLUOR ALBUS, POST PUERPERIUM infuso meraco
 salviæ ad ꝑj. -- i. omni trihorio exhibitio mo-
 tuque corporis sanantur. Tabes a nimia lacta-
 tione nutricum, inappetentia, languore, sympto-
 matibus hystericis, calore hæctico & ipsius
 phthiferos signis cognoscenda, sanatur ab lacta-
 tione, cibus euchymis, lacticiis, cort. peru-
 v. & foliis salviæ simul adhibitis. Reliqua sym-
 ptomata vide sub morbis gravidarum. Non mi-
 nus de vermibus cogita, ob victum puerpera-
 rum tenuem, magis rebellibus. *Tumor abdo-*
minis; ex lochiorum retentione, inepta ven-
 tris deligatione; saburra; vermibus intestino-
 rum; ingurgitatione frigidorum, appropriatis
 reme-

remediis corrigatur. Ne eum confundas cum omenti tumore scirrhuso.

MORBI INFANTUM ET PUERORUM.

Neonato debiliori succurrimus ablutione tepida, vinosâ, sedulaque mucî, quò cutis obducitur, absterfione; balsamo majoranæ ad verticem, cardiam, spinam; semimortuo simul frictionibus plantarum &c. inflatione aëris in os & anum; compressione momentanea pectoris, suctione mammarum; halitu, cariophyllis mastificatis, vigorato, inspirato, narium titillatione, cepa dissecta pone aures, clysmate salino oleoso, interdum ossium cranii dislocatorum leni repositione, depressorum elevatione, ope empl. ex pice, ansam habentis; strangulatis quasi, facie tumida livescente, emissione insuper sanguinis ex funiculo, nec non eliminatione mucî, glottidem ocludentis, ope digiti faucibus intrusi. Funiculus umbilicalis l. a. deligandus, antea vero omnis sanguis prope umbilicum, in ipso contentus, curiosius mulcendo, eliciendus est. —

FRENULI SOLUTIO caute instituenda, ne ex raninarum læsione hæmorrhagia & ex f. deglutito putrescente, gravia symptomata, ne ex profundiori incisione, linguæ revolutio & suffocatio, saltim suctio impedita; ne denique ex insufficiente, suctio difficilis oriatur. Hinc *obstacula suctionis* linguam semper deprimendo, vel frænulum rite solvendo; non minus narium obstru-

obstructionem referando, illis tūrundas, succo betæ, aqua diluto cum sſro imbuto, vel radici nafi, butyrum majoranæ appdo tolluntor. *Corpusculum* ubivis perlustrandum, an vitium quoddam, anus imperforata &c. emendandum appareat.

MECONIUM quantocyus expurgandum, deficiente, vel insufficiente colostro R. syr. de cichor. eum rheo vel de manna laxatio. ℥ij. — iij. rosar. solut. ℥j. adjecto interdum sapon. venet. in vitell. ovi soluti \supset ℞. — j. intra 5-6 horas propinato; clysmate ex sero lactis saponato, mellito, quorum repetitionem fœcum coloro indicat. Simul exhibitis aqua simpl. melle vel sſro edulcorata vel sero lactis dulci.

LAC HUMANUM SUPPLEMENT lac asininum purum, vel vaccinum, decocto avenæ ex cort. oryzae &c. dilutum vel cum amygd. dulc. & aqua simpl. in emulsionem redactum. Infantuli mature forbitioni, ex vase assuefiant ob metum defectus improvisi lactis materni. Si hoc fieri non potest, sugant ex vasis vitreis illis, aquis odoriferis destinatis, oblongis, collo angusto, cui spongiola, papillam referens, immittitur. Pulmentum ex farina bene exsiccata, vel parumper tosta & lacte, vel hujus loco decoct. hordei aut aven. ex cort. cum jusculeo carnis aut pauxyllo butyri pptum, spissius, vel decoct. sago, vel panis biscocctus, in lacte non cocto tepide maceratus, ante quartum - sextum mensem non adhibentur, eaque in parvis dosibus, nisi defectus lactis ea prius exposcat. Involucra

lucra sint munda, sicca, ligulis instructa & tam
 laxa, ut omnes artus libere flecti possint; stra-
 gula mollis, levis; fontanella tecta quidem, sed
 non pressa, mitella sat larga; decubatio non
 semper in dorso, & ne lux unum feriat ocu-
 lum; gestatio mutua in uno & altero brachio,
 & moderata; exercitium mutuum manus utrius-
 que infantis; frictiones crebriores & munditiei
 cura summa; regimen temperatum; cubiculum
 aëre sæpe perflatum, lotiones post tertium diem
 frigida & quotidiana; absint medicamenta nimia;
 incongrua, opiata, oleosa; terrores; pusillorum
 receptio in lectum; degustatio & masticatio pul-
 menti osculaque a personis suspectis, ori in-
 fantis impressa. Infantulorum morbi ut rite
 cognoscantur, adstantes mulierculæ de illis, quæ
 nutrici & infanti acciderunt, curiose exploran-
 dæ & inquirendum, in ructus acidus; flatum; vo-
 mitum; sitim; famem; ventriculi repletionem
 nimiam; tussim; singultum; pavores aliasque
 nervorum agitationes; in urinæ copiam immi-
 nutam, unde tot mala, ejusque colorem p. na-
 turalem & contenta, calculi ramenta &c.; in
 fecum consistentiam, colorem, odorem & in-
 sufficientem excretionem; in suctionem impe-
 ditam ejusque causas, in halitum fervidum; re-
 spirationem celerem, difficilem; agrypniam;
 oris fauciumque pustulas; gingivarum intume-
 scentiam; in opiata clam exhibitæ; extrinsecus,
 in excoriations; exanthemata; acchores &c.
 eorum repulsionem; in crinones; aculas, festu-
 cas infixas; prolapsum ani; involucria nimis
 stricta; vaporem carbonum; alimenta in vasis
 metallicis servata; in infecta; non minus in
 paren-

parentum morbos & in infausta, quæ matri, durante graviditate acciderunt. —

NUTRICIBUS præcipue haud robustioribus, ingluvies dyspeptorum, acidorum, flatulentorum, spirituorum; otium; venus; refrigeratio, diæta, regiminis subitanea mutatio interdicens. Animi agitationes; lactis defectus; corruptio; morbi venerei &c. celati, caute expiscandi sunt. *Iratis* pulvis temperans cum liq. anod. min. *Terrefactis* liquor cornu cervi succinatus admixtis laud. liq. aliquot guttulis offerenda. Simul lac potius exsugendum, quam emulgendum.

DIARRHOEA LABORANTIBUS pulv. rhei ℥℥. & post 8. horas electuar. diascord. cochlearculum exhibendum. Hoc & fluxus menstrui tempore, infans nutrimento supra recensito nutriendus. Frequentissime *Acidum*, ex fœcibus viridescensibus grumosis & odore acido cognoscendum, cum *pituita* complicatum; ex ingestis aciescentibus; inertia bilis; abusu pulmenti, ex farina cruda ppti & atonia ventriculi oriunda, morborum infantilium causæ sunt. Curationem absolvunt antacida, leniter evacuantia, mucum incidentia & nervina. Pulvis puerorum ℞. lapid. cancror. matris perlarum, non alkalifatorum aa. ℥j. rhei elect. rad. ireos flor. aa. ℥j. cinamom. sem. fœnic. aa. ℥℥. ms. f. pulvis. D. ℥℥ - j. mixtura ℞. pulv. pueror. ℥j. sapon. ven. gr. xv. — xx. aqua menth.

menth. ℥ij. fœnic. tiliā aa. ℥j. syr. de cichor.
cum rheo, cort. aurant. aa. ℥j. D. bis, ter de
die cochl. j — ij. per aliquot septimanas con-
tinuanda; elixirii aperitivi claud. aliquot gut-
tulā, cum aqua cinamom. & syrupo alth. mix-
tā, syrupi laxantes, cum aliquot granis pulve-
ris rad. jalapp. mixti; interdum vomitorium ex
quarta parte grani tartari emetici in aqua solu-
ti & tartarus emeticus in dosibus, quæ vomitum
non faciunt, quotidie exhibitus; externe balsa-
mus nucistā. Pro nutrimento, gelatina cor-
nu cervi non acida, juscula carnis cum vitello
ovi & pauxillo aromatis. Pro potu acidulā
Fachingenses, quæ simul acidum & pituitam ci-
curant, & roborant, vel decoctum, pro potu
infantum ex ras. cornu cervi rad. gramin. li-
quirit. sem. anisi & fœnic. adjecto liquore ter-
rā fol. tartari. Nutricibus pulvis: ℞. Mag-
nes. alb. ℥j. flav. cort. aurant. sem. fœnic. siri
aa. ℥ij. ms. D. quater de die c. cultri; nutri-
mento cibi magis alkalescentes, motus corporis.

AD OBSTIPATIONEM ALVI ex pituita ejus-
que causis & lacte crasso proveniente, præ-
ter interna supra notata. ℞. Elect. de man-
na, D. omni trihorio ℥℥. vel ℞. ol. amygd. d.
rec. press. ℥j. mellis q. s. ut ol. subacte sub-
igatur, subactis adde syr. mannati ℥j. f. linctus
sæpius ad cochlearculum unum aut alterum su-
mendus. Externe suppositoria, globuli mo-
schati, sebum oleo illitum, enemata, uncta mol-
lia, mutatio nutriticis.

AD

AD PROLAPSUM ANI lenis & continua pressio prolapsi; pulvis milii adpersus; fomentum cum decoct. fol. quercus; fumus mastichis; infans alvum exoneraturus sellæ altiori insideat, ne pedes terram attingant.

TORMINA manifestant, inquieta jactatio, calcit ratio, clamores subitanei, vehementes, crebriores; suctio avidior, vel mammarum respuitio; ventris inflatio; dispnœa; agrypnia; subrisus in somno; fœcum color & odor præternaturalis; Cœ, meconii reliquiæ; acidum; lactis coagulum; pituita; mucus, sub catarrho deglutitus; alvi obstipatio, cutis defœdationes repulsæ; alimentum in vasis æneis servatum; refrigeratio; oleosorum, purgantium, inprimis pulmenti farinacei abusus; nutricis peccata, supra notata. *Remedia* vide sub acido, pituita, alvi obstipatione & ea, quæ supra nutricibus ordinata sunt. In genere, præmissa emulsione mannata, cum pauxillo liq. terræ fol. tartari. — ℞. Aquæ flor. til. ℥ij. menth. ol. amygd. d. aa. ℥j. salis tartari ℥j. vitell. ovar. ℥ij. mucilag. gummi arab. ℥j. ms. f. emulsio; D. omni 1/2. horæ cochl. i. - ij. cui, in dolorum sævitia, tentatis omnibus adde laud. liq. aliquot guttulas; pulv. puerorum cum pauxillo moschi mixtus. Externe cataplasmata balneaque mollia; sacculi aromat. carminativi ol. nucistæ cum ol. chamomillæ mixtum. *Mucus accumulatus suffocationem minitans vomitorium abusus oleosorum rhabarbarina, roborantia purgantium & alimenta in vasis æneis servata demulcentia, paregorica exposcunt; de revocandis efflorescentiis cutis vide infra.* Eadem fere *M. M. vomitui & diarrhœa,*

O

rhœa,

rhaæ, ex iisdem causis oriundis succurrendum; evacuatis sufficienter nempe fordibus, ope rhei, ad gr. XII., in syr. cydon. crebro adhibiti, nonnunquam vomitorii, & faburra acri varia cicurata; antacidis &c. cera, in lacte cocta, gummi arabico & amylo, & in clysteribus adhibito, vel R. decoct. rapar. ℥v. butyri rec. ℥j. injiciatur partitis vicibus ad ℥ij. tandem roborantia, decoct. Fulleri (vide diarrh. adult.) nux moschata, cinamom. &c. propinanda & denique ad *enormes excretiones cohibendas; nec non in diarrhæa & vomitu excedenti, a motuum anomalia, animi pathematibus, dentitione difficili &c.* opiata, laudan. liq. gtts ij. - iij. vel elect. diascord. ℥j. Externe empl. theriacale, bals. nucist. &c. in auxilium vocanda. *Ad tenesum* clyisma modo descriptum adhibendum.

SINGULTUS medelam vide sub vomitu. Simul fontanella & ventriculus a refrigeratione muniantur. *Convulsiones, eclampsia*, seu convulsiones epilepticæ haud periodicæ, quæ cognoscuntur ex prægressis torminibus, ex cremen-
tis viridibus &c. ex vigiliis; tremoribus; pavoribus; colore sublivido faciei; oculorum motu convulsivo, sursum & nasum versus; subse-
quente sopore profundo cum stertore. Proritantur, sæpissime, torminibus eorumque causis; nonnunquam excoriatione aliaque læsione externa; cutis defœdationibus, repulsis; lotii retentione, opiatas clam propinatis; dentitione diffic. calculo; ossium cranii depressione; vermibus; evacuationibus copiosis; nutricum culpa, animi affectibus; morbis venereis &c. defectu lactis; ex infantulorum urinæ & fœcum immi-
nutio-

nutione fuspicando; fluxu mensum &c. laborantium. *M. M.* sub paroxysmo absolvunt clysmata emollientia, & si acidum peccat, ex jusculo carnis vitell. ovar. & sapone pptā; fomenta vinosa; balnea tepida; balsamus nucistæ, ad verticem & robustis, annum excedentibus v. s., hirudines. Si vermes peccant ipecac. vel tartar. emet. solutio in parvis dosibus; si acidum & inde enata tormina, in culpa sunt, aut emuls. ad tormina aut *R.* tinct. salis tart. gttss XII. laud liq. Sydenh. gttss iv. ms. gttæ viij lacti nutricis instillantur & dentur pro dosi ad eum præcavendum -- *R.* Spir. cornu cervi succinat. ☉ ß. liquor anod. ☉ j. syr. papav. alb. ʒi. D. duabus vel tribus vicibus. *Extra paroxysmum*, remedia pro variis causis diversa vide sub torminibus &c. &c. nec non sub epilepsia adultorum. *Ad spasmus maxillæ* sæpe prætervium recens natis, a die ortus, tertia, ad duodecimum familiarem ex fletu insolito, obscuriori; oris apertura minori; gingivis paululum a se distantibus, immutabilibus; labiorum motu fere nullo; lactatione impossibili; deglutitione tamen in ore contentorum facili; alvo obstipata & flatibus distenta cognoscendum, tinct. rhei, cum pauxillo moschi, ol. tart. per deliq. & syr. papav. alb. ori itentidem infundenda; clysmata; balnea; vesicatoria; sinapismi ad pedes; uncta paregorica, ad partes affectas & ad spinam, etsi ex causa externa; prius remoto peregrino, acri, opiata largius oblata conveniunt. Nutriantur, lac cochlearculo ori sæpe instillando.

AD PARTES RUBORE, ardore, excoriatione affectas, ex urina acri &c. lac cum aqua calcis

O 2

dilu-

dilutum, floribus rosarum alteratum, cum mucilagine sem. eydon. mixtum. — R. Ungt. pommat. Ꝛß. flor. zinci, farinae sem. hycopodii aa. ꝓj. ms. — argilla fullon. in aqua soluta, interna congrua. *Ad crinones* pruritus, agrypniam, maciem &c. excitantes, frictionses ope panni lanei.

AD CUTIS DEFOEDATIONES, *vel affectus scabiosos variasque defluxiones* decoct. rad. sassapar. junip. bard. rub. tinct. gland. ilign. tostar. &c. pro potu ordinario; æthiops antimonial. flores sulph. gr. ij. — x., vel pulv. lign. guajac. rad. sassaparill. magnesiæ, matris perlar. & rhei in pulve vel ossa, & nutrici exhibitus; sulphur. aur. antimonii potabile; morsuli antimoniales Kunk.; quandoque diuretica; anthelmintica. Reliqua vide sub affectibus scabiosis adulatorum. *Achores, favus, crusta lactea*, sub usu internorum externe cremor lactis d.; oleum myrrh.; tandem ungt. popul. Ꝛß. cum mercur. præcip. alb. gr. ij. - iv. mixtum. Ubi vero cranii oculorum læsio pertimescenda, liquor. ex aquæ rosar. ꝓiv. lapid. med. croll. ꝓiv. & mercurii dulcis gr. viij. caute appdus, apposito simul nuchæ vesicatorio. *Tineæ* curam vide sub scabie adulator. sæpius de inquinamento venereo cogitandum. *Ad narium excoiationes* externe, aqua majoran. cum pauxillo vitrioli albi. *Ad varos* &c. eff. benzoës, gummi ceruss. in aceto solutum. *Ad efflorescentias cutis retropulsas*. Infanti sulph. aur. antimonii potabile, moschi gr. j. - ij., cum stro trit.; succus betulæ; æthiops antimon. flor. sulph.; sinapismi, immo vesicatoria ad pedes; præmissis interdum purgante. Cfr

Cfr *M. M. cephalalg. serosæ*; *nutrici flor. sulph. ex lacte, florib sambuci alterato, vel emulsio camphorata propinanda. Ad ulcera capitis, crustam lacteam retropressa* externe folia brassicæ, betæ, parum conquassata & calida, vel denique empl. *R.* empl. de meliloto partes x, vesicatorii p. j. ms. & capiti, pillis prius resectis, impone. *Ad linguæ tumorem* syr. rosar. in aqua scordii solutus, *calorem urentem* cremor lactis cum croco, *ulcera* oleum ovorum.

AD ANGINAM INCIPIENTEM syr. rosar. elixir. acido Dipp. acidulatus. *Ad tonsillarum, uvulæ tumorem* sinapismus, ad cervicem. *Ad ulcera papillarum* empl. malaëticum. *Ad parotides* vapor oxycrati; fricatio; empl. discutiens; interna. *Exulceratis* empl. diafulphuris imponendum. — *Ad strumas* eadem valent, non minus spir. vini mastichinus, cum alumine & acetum seillit. in- & externe usurpatum. *R.* nihil. albi ζ iv. ossis sepiaë putamin. ovor. aa. ζ ij. panni scarlat. ζ ijss. mixta vase clauso comburantur. Dosis pro adulto gr. xvij, bis de die, ea lege, ut in plenilunio, purgans fumatur & subsequentibus 6 - diebus, pulveres duodecim consumantur cum frictione part. tumidarum. Interdum glandularum meseraicarum obstructio subest. *Ad ranulas* mel rosar. cum pauxillo salis mixt. appt. nonnunquam ad incisionem deveniendum; pars sacci cultro auferenda atque vulnus caustico saepe tangendum, ne iterum concreseat

MACULE ALBÆ INTERNA ORIS OCCUPANTES, linteis, infuso semivinoso salviæ cum melle mixto madidis detergentur.

DENTITIO DIFFICILIS cognoscitur, ejulatu; agrypnia; calore; pavoribus; salivatione; gingiva-

givarum rubentium vel albicantium tumore; admotu manuum ad eas. Alvus tum vel obstipata, vel nimis laxa est. Accedunt interdum ileus, vomitus & fluor ventris viridis, cruentus; asthma; convulsiones &c. *Mitigatur* ol. amygd. d. syr. alth. diacod. &c. affricando; spongiam decocto meraco rad. althea, ficubus & croco alterato, repletam fugendo. Interne antiphlogisticis, emulsione nitrata; remediis alvum semper apertam servantibus; clysmatibus, elect. de manna; denique laud. liq. aliquot guttulis; hirudinibus ad tempora. Præcaveretur crebriore fricatione gingivarum, mediante digito, succo citri imbuti circa tertium mensem instituta. *Ad pathemata ex opiatorum abusu* Et carbonum vapore vomitus ope plûmulæ oleo madidæ fauces titillantibus, excitandus; enemata acriuscula; frictio plantarum, sinapismi ad pedes; acetum ad frontem, nares totumque caput; hirudines ad tempora & collum, interne acida blanda. *Ad calculum*, qui ex hæreditate urina copiosa, cum ejulatu excreta, eaque subito suppressa, arenulis mucosæ referta cognoscitur. Clysmata; balnea; fomenta mollia; interne ℞. infus. flor. malv. ꝑꝑ. ol. amygd. d. ꝑꝑ. vitell. ovar. No. 1. syr. papav. alb. ꝑꝑ. ms. D. crebro, parcis dosibus, cfr. *M. M.* calculi adulator. — *Aphthis* mediante penicillo applicetur crebro. ℞. Rob. diamor. dianuc. mell. rosar. aa. ꝑꝑ. spir. vitrioli q. s. ad gratam aciditatem; vel succus semper vivi major. cum melle rosar. & tantillo aluminis, & paulo post, infusum salviæ, vel partes affectæ abstergantur, ter de die, linteis, sequenti solutione calida imprægnato. ℞. Vitrioli alb. ꝑꝑ. solve in decoct. speci-

specier. pect. ℥viii. In pessimis ℞. extr. cicut. ℥ij. solve in aqua scord. ℥j. admisce mellis ros. ℥j. D. ut aliquoties de die, ulcuscula illinantur; deglutiatur decoct. dauci; succus rapar. affatar. cum melle rosar. mixtus; vel emulsio ex sem. bardanae p. j. pinear. p. ij. iij. aqua foenic. syr. de cichor. cum rheo & rad. s. aperientium. An satis tuta potio, tot laudata. ℞. Terræ japon. ℥iij. coque in aqua calcis ℥xij. ad consumptionem tertiæ partis. In colatura dissolve sri saturni ℥j. & mellis rosar. ℥ij. ms. D. omni hora cochl. j. in ore detinendum & si apthæ profundius in faucibus hærent, sensim deglutiendum. Nutrix pulverem ex magnesia & c. decoct. s. purificans sumat, & doloribus urgentibus opiata. Excoriationi, post desquamationem medentur. ℞. Syr. papav. albi, cremor. lactis dulcis aa. ℥ß. vitell. ovar. q. s. aqua rosar ℥j. ms. f. linctus, crebro in ore detinendus vel mucilag. sem. cydon. cum succo semper vivo mixtus.

AD DYSENTERIAM, desquamationem infrequentem eadem valent. *Ad icterum* a meconio, saburra viscida; syr. de cichor. cum rheo, admixto sapone; elect. de manna adjecto pulvere rhei (vide sub torminibus; vomitu, vermibus & ictero adulatorum). *Ad hydrocelem* frictio pannis massiche perfumigatis; empl. diasulph. vel ceratum, ex sapone chymico Dipp. & empl. diaphoret. Myns. paratum; interne tartari vitriolati usus diuturnus.

HYDROCEPHALUS IN- & EXTERNUS. Inter-
num curatu difficillimum suspicamur ex fontanella ampliori, sopore, languore, hebetudine,
inter-

interdum ingenio acuto; pupilla dilatata, ex anxietate; tussi & vomitu, situm erectum sequentibus; ex prægressis convulsionibus, dentitione difficili &c. *M. M.* resolventia, derivantia, roborantia, cathartica, errhina, fonticuli, setacea, vesicatoria ad nucham, fasciæ, aqua calcis & spir. vini camphor. imbutæ caput leniter constringentes; sacculi sale tosto & baccis juniperi repleti, spir. vini camphor. irrorati interpositis frictionibus; suffimigiis & inunctione bals. nucist. sulphuris & spiritu salis ammoniaci. Nutricis & infantis potus sit serum lactis dulce radice graminis ononid, asperag. petrosel. fœnic. & cichor. alteratum.

SPINA BIFIDA, pessimo omine juncta, roborantibus, adstringentibus deliganda, minime aperienda. *Ad gibbositatem recentem* epithemata roborantia, thoraces, vincula congrua; suspensio quotidiana, ope laquei & machinæ; interne, interdum antatrophica. *Ad anasacram puellorum* eusphanchnium, ex voracitate & vermibus oriundam; cathartica, rhabarbarina, sal absynth. sub cibus; vinum antimon. Huxh. a guttis 10. ad 40. potui instillatum. Eadem remedia *ad urinæ retentionem*, nec non aqua petroselini cum succo dauci — R. spir. cornu cervi ℥ij-ijj. aceti scill. ℥ss. syr. de eryf. lob. ℥ij. laud. liq. Syd. gtts ij. ms. D. omni trihorio gtts xv-xx. clysmata; terebinthina, vel castaplasmata, cum cepis assatis, ad renum regionem & pubem (vide sub acido & pituita.). *Ad diabetem* ex scybalis duris intestinum colon replentibus, elect. de manna; adjecto pulvere rhei, clysmata mollia. *Ad hæmorrhoides infantum* plerumque ex digestionem læsa vermibusque oriundas;

das; elix. stomach. cum tinctura rhei & liq. terræ fol. tartari, infus. specier. nervin. cum cremore tartari; anthelmintica, denique externa subadstringentia. *Ad vomitum cruentum neonatorum* ol. amygd. d. *Bubo crescentium* sponte solvitur. A parochidio caute distinguatur absentia testiculi, in scroto. *Ad phymosin ex collectione urinæ sub præputio* injectiones aquæ tepidæ, per orificium præputii, ope siphunculi, suspensa manu factæ; fomenta ex aqua vegeto-minerali. *Ulcusculis inde ortis*, fol. rec. boni Henrici & cicutæ, leviter trita appda. Tumor præputii, simul, continuo & leniter prematur. *Ad testium tumorem, circa pubertatis annos*, lenia cathartica, frictions, fumus mastichis &c. liq. terræ fol. tartari potui instillatus. *Ad navos maternos* albumen ovi; sanguis colombinus, fel piscis barbonis; ungtum ex sapone cum calce viva mixtum, post empl. adhæsivum, perforatum impositum, l. a. aptum ligatura, abscissio. *Ad verucas* empl. galban. cum sale ammoniaco; frictions cum lardo, sulphure consperso; abstinencia a lacticiniis & R. sapon. antimon. Zij. extr. tarax. gummi ammon. aa. ʒʒ. syr. cort. aur. q. s. ut f. pil. gr. j. pond. D. quotidie 15-40. — *Ad verucas majores* solutio argenti in spir. nitri, sæpe circa basin appda. *Ad pediculos pulvis cocculorum*, cum pomo cocto mixtus, appatus; sem. sabadilli mitræ insutum (caute vero his utendum), charta bibula, oleo lavendul. imbuta, imposita. —

AD CORYZAM, TUSSIM CATARRHALEM &c. diæta blanda. Emulsiones, serum lactis, cum cerevisia pptum, flor. sambuci, papav. rh. & paxillo vini antimon. Haxhami alteratum; de-coct.

coct. dauci hort. rapar. elect. de manna, cum antimonio diaphor. srum lactis; passula maj. ab acinis purgata, cum æq. portione sri mixta, in vase ferreo tosta & hoc facto, cum portiuncula essent. cröci agitando commixta, ad cochl. j. bis de die sumta. R. Pulv. lap. canceror. gr. v. kermes min. grani 1/4. pars D. in 6plo, sumantur duo de die in vehiculo grato; frictiones plantarum, cum sebo hircino liquefacto, tandem paregorica; oleum ovor. ad nares; sri inflatis, junctis quandoque stomachicis. *Ad tussim titillatoriam vel gutturalem.* R. Mellis ʒij. pulv. zinzib. ʒj. ms D. cochlearculum j.

AD TUSSIM FERINAM, CLAMOSAM, VEL STOMACHICO - CONVULSIVAM sæpe epidemicam, periodicam, remedia digestiva, vomitoria, cathartica, diuretica, & stomachico nervina punctum curationis absolvunt. Sequens methodus, tentatis prius aliis exoptati semper fuit effectus. Primitiva mixtura River. sub actu effervescentiæ exhibitæ, tartarus emeticus, in larga quantitate aquæ solutus, initio ad lenes vomitus proritandos, dein in ea dosi, qua vomitum rarius excitat, aliquoties de die propinetur, & si fieri potest, elixir. stomachicum cum liq. terr. fol. tartari & tinct. rhei Darelii mixtum, & pilulæ ex asa foetida & extr. cicutæ conflata subjungantur; simul enema ex infuso speciebus nervin. & asa foetid. ʒj, bis, ter de die injiciatur & cingulum, uncto ad atrophiam vel theriaca imbutum, regionem diaphragmatis leniter constringens, plantis pedum vero, cepæ affatæ, cum pinguedine asserina applicentur. Si putridi quid subest, sequens remedium ter, quater de die deglutitur. R. Spir. sal. com. parumper dulcificati gttis v-x. syr. diacod.

cod. q. s. ms. tandem ad roborantia progredien-
dum. ℞. Extr. cort. peruv. liquir. aa. ℥ij. cas-
carill. ℥j. mucilag. cydon. q. s. ut f. elect. D.
quater de die ℥℥-℥j. Paroxysmi savitiam le-
nit emulsio balsamica, moschata & spir. æthe-
reus vitrioli crocatus. Plethoricis v. f. admini-
stretur. Debilibus decoctum limacum bis de die
offeratur. Diæta sit strictior. Inter cibos vero
acetaria, & pro potu aqua font. aceto bezoard.
largiter acidulata, & stro edulcorata, vel de-
coct. furfur. leniter tost. speciebus nervin. &
herba rorismar. sylvestr. alterata, sapissime lo-
cum habent. —

TUSSIS CONVULSIVA SICCA ex acrimonia te-
nuissima, bronchiis impacta, medelam tussis ca-
tarrhalis, denique opiata exigit. Vide quoque
sub vermibus & efflorescentiis cutis retropressio;
& in urinæ retentionem inquireas, cujus cura su-
pra tradita est.

AD SIC DICTUM CATARRHUM SUFFOCATIVUM
vomitus titillatione faucium, vel quarta parte
grani tartari emet. soluti excitandus; kermes,
min. gr. ℞. vinum antimoniale Huxhami ad gttis.
xv-xl. bene dilutum; solutio extr. croci in spir.
falis ammoniaci anif. moschat. ad gttas v-viii,
vel pulvis Doweri ad aliquot grana, repetitis vi-
cibus propinanda; enemata salina; acetum me-
diante spongia, ad os & nares, cepæ assatæ cum
pinguedine anserin. mixtæ ad pedes, fomenta e-
moll. ad pectus, interdum v. f. adhibenda, vide
quoque sub tussi adulator.

VERMES INTESTINALES, LUMBRICI TERETES,
ASCARIDES TENIÆ VARIE SPECIES, FASCIOLA, TRI-
HURIS ALIQUE VERMES MONSTROSI. Certissimum
de

de eorum præsentia signum est excretio corporis delicti & mucii, sub epilepsia descripti. Inter dubia quidem signa referenda sunt, pruritus narium, color albus nasi, ceræ instar; faciei coloris mutationes repentinæ; alternans rubedo alterutrius genæ; labiorum ea formatio, ac si papillam teneat; salivæ copiosus effluxus, oris & sudoris foetor singularis, gingivarum erosiones, pupillæ dilatatio, dentium stridor, sopor, appetitus & alvi exonerationes admodum irregulares, bulimus, nausea, vomitus, urina turbida, lactescens, ejus difficultates, dolor abdominis vagus ejusque tumor quandoque post cibum sumtum, subito natus; exacerbatio symptomatum ventriculo vacuo; pulsus sæpe exilis, inæqualis &c.

ASCARIDES potissimum ex pruritu ani & tenesmo suspicamur. Vermes proritant innumeros morbos, copia, motu, perforatione & inprimis copioso mucos, in quo nidulantur, suis excrementis conspurcato; animi deliquia, somnolentiam, vertiginem, epilepsiam, paralysem, catalepsim, amentiam, cæcitatem, aphoniam, tussim siccam, affectus cutaneos rebelles, dolores rheumaticis ischiaticis similes, herniam spuriam, parthenata spastica, convulsiva, mira; hæmorrhagias, febres irregulares, putridas. *M. M.* pituita incidenda, vermes debilitandi, enecandi & cum mucos expellendi, canalis alimentarius roborandus. *R.* Pulv. rad. jalap. fol. sem. crem. tartari aa. *ʒj.* syr. cort. aurant. q. s. ut f. elect. cui, in progressu, loco cremoris tartari, sem. cynæ *ʒij.* & mercurii sexies sublimate \ominus *j.* admisce. *D.* infanti unius anni cochlearculum; bimulo cochl. *ij.* mane, jejuno ventriculo, ter, quater, donec commode purgetur. Delicatulis de-

decoct. chocolad. cum infuso fol. fenn. pptum. Hisce continuandum, quamdiu praternaturale quid, vel mucus descriptus excernitur. Interponenda stomachica & anthelmintica; vini rubri haustulum, sub epulis; elixir. stomach. pulv. stomach. Birkm. Inter anthelmintica primum tenent locum, sem. cynæ selectum quidem ab impuritatibus pulverulentis, squamosis, curiosius purgatum, vel abrotani campestris, quod cum æthiop. antimon. gr. v-viij. mixtum ad gr. xx — xxx. melle exceptum, aliquoties de die; ex succi betulæ vel aquæ mercurialis cyatho exhibeatur; (aqua mercurialis præparatur mercurii vivi ℥viij. cum decocto rad. graminis & herb. spigeliæ meraci ℥ij. in vase terreo digerendo & leniter coquendo, cui decantato mel vel syr. flor. persicor. vel de cichor. cum rheo addi possunt). ℞. Pulv. rhei sem. sarton. musci corall. aa. ℥j. mercurii dulcis ℞j. sri in aqua absynth. soluti & ad consistentiam cocti ℥vj. f. l. a. rotulæ, quarum una vel altera 4-6ies de die, ex succo dauci exhibetur. Expurgatis primis viis, sæpe profuit. ℞. Mercurii vivi ℞j-℥℥. mucilag. gummi arab. ℥i℥. terantur donec mercurius penitus dispareat, in mucum adde miscendo extr. cort. peruv. liquiritiæ, nuc. jugland. immatur. aa. ℥i℥. pulv. rad. dictamni albi ℥j. syr. de cichor. cum rheo q.s. ut f. elect. D. ter, quater de die cochlearculum unum vel alterum, nec non ℞. vitrioli martis factitii gr. ℥. sri rosar. gr. xv. ms. f. pulv. f. tales Nro. iv. sumat unum, deinde duos in die. Externe enemata ad ascarides; cataplasma ex absynth. rut. allio, felle tauri & farina (reliqua vide sub epilepsia ex vermibus) cibi sale, cepis, allio, aromate condiantur.

AD

AD TIENIAM, tam vulgarem, quam cucurbitinam priori magis rebellem expellendam M. M. sequens usu probata est. Aegrotis per aliquot septimanas pro alimento sit daucus hortensis, pro potu aqua miner. martialis vel artificialis, quæ aquam fontan. aëre fixo imprægnando ipsique solutionem martis immiscendo pptur, simulque sal digestivum quotidie sumant & enemata ex infuso flor. chamom. adjunctis sale amaro & sapone adhibeant. His peractis mane pulveris rad. filicis mario ℥iij. exs. q. aquæ filicis & menth. & elapsis duabus horis purgans mercuriale, ætati & constitutioni accommodatum jejuni deglutiant; umbilico ol. petræ & terebint. applicetur. Repetenda, si opus est. Sæpe vero mucii copia & tenacitas purgantia, usum gummi gutti exigit; confer curam cruditatum pituitosarum & epilepsie.

AD ASCARIDES ℞. acinor. mali citrii No. XII. — xv. contus. coque in lactis ℥iv. colaturam cum forti expressione factam & stro edulcoratam exhibe per tres, pluresve dies; enemata ex decocto rad. filicis maris & flor. chamomill. in quo mercurius vivus leniter coquitur & cui ol. ablynth. coct. & sal. amarum adjicitur, vel ex fumo tobaci & suppositoria ex lardo, sæpe repetita; vel — ℞. mellis ad crassitiem cocti ℥j. Specier. ner. simpl. Galen. ℥j. ms. fiat suppositorium, quod oblinatur uncto enulato, cum mercurio.

FEBRIS VERMINOSA, vomitoria lenia, aquam mercurialem, cum syrupo acetositis citri mixtam; vel ol. amygd. d. p. ij. succi citri p. i. adjuncto stro sæpe de die cochl. i.; emulsionem camphoratam & potum elixirio acid. Dipp. acidulatum, nec non decoct. acinor. citri vel electuar. & externa supra descripta exigit.

AD

AD CONVULSIONEM, *epilepsiam ex vermibus vomitoria lenica*, fol. aurant. rad. valerian. electuar. modo descriptum (vide sub epilepsia adultor.).

PERFORATIONEM ex dolore continuo, locum circumscriptum occupante, pertimescendam præcavent, cataplasma supra notatum, cum petroleo mixtum.

AD ANXIETATES ET INTUMESCENTIAM, *atania* extr. absynth. larga dosi exhibendum.

OBSTRUCTIO GLANDULARUM MESENTERII, *sive atrophia*, morbus quidem infantilis, sed nonnunquam ad adultos propagatus; in quibus sub larva variorum pathematum facile nos fallit. Diagnosin absolvunt læsæ digestiones & vermium (catrophie fidelium pedissequorum,) signa; venter durus, inflatus, quandoque retractus, ibique, in progressu morbi, tumores glandularum, tactu distinguendi, insequente macie reliquarum partium; voracitas; appetentia alienorum, interdum anorexia; sitis nocturna, jejuna; alvus modo strictior, modo laxior, mucosa, chylosa; tormina frequentia; tenesmi alvi & urinæ; lassitudo; animi dejectio, morositas; ad iram proclivitas, vesperi magis conspicua; urina albida, chylosa; facies pallida, tumidula; nasus, genæ, labia turgida; oculi lacrymosi; muci narium uberior fluxus; hypophthalmia livescentia; seropholæ omnesque glandulæ conglobatæ, subcutaneæ tumefactæ; quæ morbum tectum, præaliis signis manifestant. Cæ. debilitas universalis; in specie canalis alimentaris atonia; digestio læsa; saburræ viscidæ acidæ coacervatio; bilis inertia. Ad pravam hanc conditionem disponunt: genitores valetudinarii, belluones, luis venereæ reliquis,

quibus, genitalium debilitate affecti; matres hysterica, diætam sub graviditate negligentes, abortus perpeffa, thoraces strictiores gerentes; nutrices, lac non laudabile præbentes; infantum mundities, motus neglecti; mora in aëre humido, non renovato; educatio mollis; ingluvies dispeptorum, viscidorum, incrassantium; farinaceorum, panis non bene fermentati &c. abusus absorbentium terreorum; potissimum in pollinem redactorum, quæ mucò intricata, intestina crusta obducunt; potus spirituosus; aquæ tepidæ; medicamenta oleosa, opiata &c. (vide supra.) Atrophici, ob chylum non satis elaboratum, acescentem, nutritionem mancam, inæqualem, impturam, laxitatem &c. incrementem; innumeris pathematibus obnoxii sunt; inter quæ sæpius obveniunt, rhachitis; passio cœliaca; urinæ incontinentia; prociencia ani; cutis defœdationes; lippitudines; pruritus veneris; pollutio nocturna; gonorrh. affectus arthritici; calculosi spasmodicoconvulsi; incubus; noctambulatio; deglutitio impedita; hæmorrhagiæ, infarctus vasor. s.; phthisis pulm.; febres intermittentes, anomalæ, lentæ, hecticæ; ex glandul. meseraicarum exulceratione enatæ.

M. M. petit, viscidum, in primis viis & glandulas obstruens incidentia, resolventia, leniter evacuantia, antacida, anthelmintica; stomachica; roborantia. Evacuatis sordibus, mediante electuario ad vermes ordinato, vel decocto chocolade cum s. q. infusi folior. sennæ ppto & elaeffro citri edulcorato, vel ope vini antimonialis Huxh. ad ʒj. — ij. in vehiculo grato exhibiti, cibi quotidie pulvere subsequenti condiendi. —
R. Pulv. nucist. ras. cornu cervi, baccarum lauri
aa.

aa. q. s. ms. baccar. lauri, pius pastæ panis subactæ, in elibano coquantur & excorticantur. Subcibus limat. martis alkalifat. vel mars sstratus, quotidie ad gr. ij. — iv. & ultra clam exhibentur & potui ordinar. e. gr. cerevis. generos., frustulum rhei inscio immittatur & liquor terræ fol. tartari vel solutio salis mirab. gl. instilletur. ℞. pulv. rad. rub. tinct. sstri martis ad gr. x. ms. f. No. xii. tales doses d. in lacte, pulste, vel in conserva milleped. Pro delicatioribus — ℞. pulveris rad. rub. tinct. ostracodermat. sstri martis aa. ℥j. sstri in aqua rosar. soluti & ad consistentiam tabulati cocti ℥iv. f. l. a. confectio in tabulis ℥℞. ex infuso fol. ro-rismar. heder. arbor. & terrestr. mane & vesperi exhibenda. Pro potu ordinario, instar omnium, sit aqua mineralis Fachingensis, palato infantum gratum, antacidum, mucum incidens & roborans remedium. Huic superest, decoctum glandium ilign. parum tostatarum & rad. rub. tinct. cum ligni guajaci pauxillo, cui ad acidum peccans cicurandum, lixivii, ex salis tartari ℥℞. & aquæ ℥bj. ppto. gttæ 30. — 100. instillantur, vel aqua calcis admiscetur. Subjange vel interpone, pro re nata, pilulas, ex sapone antimoniali, extr. cicuta, menthæ spirituoso cort. peruv. pulvere millepedum & cacomæ constatæ, nec non elixir. stomach. cum syrupo cinamom. & conserva millepedum Kleinii mixtum. Externe frictions quotidianæ abdominis & spinæ dorsi, cum pannis fumo mastichis imbutis; inunctiones abdominis, cum uncto ad atrophiam, lotiones; balnea subfrigida ex nervinis & sstrb. anserina; clysmata ex decocto supra notato, adjecto sapone venet. alimenta sicciora; panis biscoctus, aromaticus; bro-dia carnis, cum rad. recent. graminis cichor. fœ-nic.

P

nic.

nic. herb. chærefol. petrosel. bellid. urtic. ; motus quotidianus, in aëre puro. Exhaustis decoctum, ex farina avenæ tostæ, lacte & pauxillo chocolade pptus, vel serum lactis dulce ope herb. gallii pptum, agrimonia & asperula alteratum & chalybeatum febricitantibus sæpius ex ulceratione gland. mesenterii, lac capræ decocto gland. ilign. exsiccat. rad. rub. tinct. &c. nutritæ cum aqua Faching. vel Embf. dilutum, nec non conserva milleped. propinentur. Reliqua vide in diff. M. Kämpf. de morbis ex atrophia.

RHACHITIS, *spina ventosa* & tumores *scrophulosi* eandem M. M. exigunt. Subjungendus cort. peruv. & rad. rub. tinctor. usus largiori dosi; fofus, ad *scrophulos clausos* ℞. sapon. com. ℥ij. aquæ calcis cum fol. cicutæ infus. ℥j. solve. Calefacto liquore, pars constanter foveatur. Ad *apertos* ℞. sapon. com. ℥j. aquæ calcis fol. cicut. infusi ℥vj. ciner. ℥ij. extr. cicut. ℥j. mellis chelid. ℥iij. ms. applicetur ut prius & plumacoli, hoc liquore calido gravidæ imponantur ulceribus. Nuper puer 12. ann. tumoribus & ulceribus scrophulosis pessime mulctatus emarciatus, pro insanabili habitus, post multa efficacia remedia sine levamine usurpata, tandem ad usum solutionis mercurii sublimati progressus est; hinc magnæ quidem turbæ, motus febriles excitati, quos decoctum limacum & cort. peruv. sedavit, paucis vero diebus tumores discussi, ulcera consolidata, & puer integre sanatus. Ex pluribus demum periculis constabit, an solutio hæc contra hoc occultæ naturæ, admodum volubile & rebelle virus, hucusque desideratam specificam viam exferat.

DESCRI-

Decorative flourish
 Descriptio quorundam in hoc opusculo
 citatorum remediorum & formularum.

Pilulæ viscerales nobis usuales.

℞. Extr. taraxaci ex radicibus & foliis per fermentationem incipientem ppti ℥℞.

Extr. millefolii, ex summitatibus & floribus, eodem modo ppti.

Extr. cardui benedicti & arnicæ (hæc ex herba & floribus) methodo garajana ppto aa. ℥i.

Gummi ammoniaci mediante solutione & sedula trituratione cum æquali portione tartari vitriolati vel terræ foliatæ tartari intime mixti & ad extracti consistentiam evaporati.

Resinæ hederæ aa. ℥℞.

Pulveris Rhei ℥ij.

ms. f. pilulæ gr. ij. ponderis, D. bis de die 15-30. ex aqua taraxaci & millefolii post incipientem fermentationem, destillata sumendæ. Adjicio nunquam extracti cicutæ, methodo garajana ppti ℥j-ij. extracti rubiæ tinctor. garajani & saponis antimonialis aa ℥ij. — potissimum si glandularum obstructio, scirrhi peccant & ad vim solventem augendam viscidam pituitani magis incidendam, ad affectus asthmaticos, hydropicos, urinæ difficultates &c. rad. ari recentes, scilla aa. ℥ij-iiij. & salis ammoniaci ℥ij. Non minus admisceo, emmenagogo scopo, extracti hellebori nigri ℥i. & extr. aloes aquosi ℥i℞-℥ij. si indicatur. Non raro ob fibræ laxam extracti corticis peruv. garajani quarta vel tertia pars addenda. Ad extracta &

aquas cum fermentatione ppranda sequenti modo procedatur.

Herba & radices recentes minutim concisa & contusa infundantur aquæ q. s. stent in loco tepido usque dum fermentatio manifesta incipiat, quod ex massa in vase ascendente, ex spuma & strepitu, quando agitur, cognoscendum, ante finitam fermentationem & NB. antequam massa acefeat, exprime succum, per colaturam & saepe repetitam subsedentiam depurandum. Pari modo cum aquis destillatis agendum. Destillatio vero sub primo subortæ fermentationis initio instituenda. Qui hujusmodi extracta & aquas cum illis comparare vult, qui methode consueta conficiuntur, mox convictus de ipsorum excellentia erit, & de eo, quod aquæ & ex inodoris & insipidis fere destillatæ non contemnendæ sint. Extracta garajana inter efficacissima militare experientia testatur. Deliculis ob compendium præcipue accommodata sunt. Certo extractum cardui benedicti garajanum præstantissimum est resolvens, roborans, stomachicum & tuto in acutis adhiberi potest. Continet enim sal nitrosum sat copiose & volatilis quid ipsi inesse ex odore gratissimo patet. Odor vero fœtidissimus extr. cicute garajani ejus vim specificam majorem evincit. Vires potentes, discutientes arnicæ, inter cujus præparata extractum garajanum multo præstat, innumera experimenta & nuper instituta probant *). Gummi ammoniacum sali medio intime nuptum facil-

*) *Extracta garajana Neowediis mediante machina ex munificentia celsissimi Comitis super Rhenum exstructa & ope balnei Mariae, a pharmacopola STADLER exactissime præparantur & viliori pretio venduntur.*

facillime in aqua & ventriculo solvitur, humoribusque miscetur & ad superandam spissitudinem mira præstat. De peculiari virtute roborante refinæ hederæ, celeberrimi Baldingeri experientia nos certiores facit. Methodus parandi sulphur auratum antimonii liquidum seu potabile, & saponem antimonii in actis acad. Mogunt. T. I. p. 232. descripta est.

Plures ex ejus usu pinguefactos esse, observavi. Summam hujus remedii efficaciam, quam quilibet facile perspiciet, celeberrimus & summe nobis venerandus ZIMMERMANN, in litteris ad nos datis, experientia doctus, hisce verbis designat. Magnum mihi est remedium. Ejus vices gerit sulphur auratum, methodo cl. HIRSCHINGII præparatum (vid. die fränkischen Samml. des 6ten Th. 34. St. S. 346.) quod, quamvis majori dosi deglutitum non tam facile nauseam creat.

Species nervina.

R. Rad. valerian. maj. montan. eo tempore effossæ, quo caulem nondum emisit. Foliorum aurantior. summitatum millefol. nobilis aa. ℥vj. folior. salviæ, menthæ piperit. aa. ℥ij. flor. chamomill. vulgaris & romanæ, millefolii vulgaris, semin. fœniculi dulcis aa. ℥j. grasso modo concisa, contusa & mixta s. ut supra. Adjicio quandoque cort. cascar. crocum, rasur. ligni fantali citrini & rhodii & flores cassiæ cinamomeæ. De eximia & singulari virtute nervina, anodina, antispasmodica, carminativa &c. harum specierum experti non dubitabunt.

Elixir. nervinum ex aqua, spiritu, extracto garajano & syrupo specierum nervinarum componitur.

Unguentum ad atrophiam, malum hypochondriacum, viscerum obstructions &c.

R. Olei cocti hyosciami ℥iv. succi rad. bryon. cicuta aa. ℥j. bulliant leniter ad succorum consuntionem; adde ungti de althea ℥ij. fellis tauri inspissat. & gummi galbani vilioris in s. q. saponis chymici Dippelii vel pro ditioribus in tinctura antimonii oleo juniperi saturata, solutorum aa. ℥i℔. (vide selectum medicamentum Kleinii pag. 229. & 309.) olei tartari empyreumatici subtilis ℥ij. & olei nucista & laurin. express. aa. ℥℔. ceræ flavæ q. s. f. l. a. ungtum.

Emplastrum discutiens.

Ex iisdem fere ingredientibus omisissis omitendis, adject. terebintina præparatur; addi possunt, ex tempore camphora, erocus, oleum cornu cervi sætid. menth. destill. &c.

Essentia galbani Bernhardi.

R. Gummi galbani ex granis siccis coaliti, aridi, nonnihil adjecti seminis retinentis ℥ij. spiritus vini rectificatissimi ℥xx. (sumo tertiam vel quartam partem liquoris anodini min. Hoffman.) Digerantur per quatuor dies, agitando crebro vitrum, stent deinde quiete, donec liquor clarus fiat, qui caute decantetur, (vide *Bernhard's chymische Erfahrungen* pag. 240. 241.) Virtutes, quas Autor de hac essentia ad ℥ij. in vehiculo convenienti per intervalla & externe cum linteamibus adhibita, laudat, eam nempe potenter discutere, dolores ex inflammatione cito sedare, sphacelum sistere, asthma, tussim veterem aliosque pectoris morbos, immo inflammatorios & malum hystericum sanare, crebro experti sumus.

Mars

Mars solubilis, seu tartarifatus.

℞. Limaturæ martis puræ rubiginis & cupri, five orichalci expertis partem unam, crystallo-
rum tartari pulverisat. partes duas. Miscen-
tur, aqua fervida humectentur & exsiccantur ali-
quoties, ut ferrum exacte solvatur. Massa tan-
dem contundendo, per cribrum & linteum tra-
jiciendo redigatur in pulverem tenuissimum.

Pulvis purificans.

℞. Flor. sulphuris partes duas, antimoniū
diaphoretici non edulcorati part. iss. rad. aristol.
r. myrrh. el. aa. part. i. ms. f. pulvis vel ℞. an-
timonii crudi alkalifati ℥ss. magnesiæ, nitri opti-
mi ℥j. sacchari canariensis ℥v. flor. cassiæ cina-
momeæ ℥ss. ms. f. pulvis.

Tinctura rhei Darcii, pro pueris.

℞. Rhei elect. ℥ij. uvar. pass. ℥j. cort. citri,
rad. liquir. aa. ℥ss. cardom. min. ℥ij. vini portug.
℥ij. concisa, contusa, mixta digere per quadri-
dium, colaturæ expressæ adde extracti spirituosi
enulæ ℥ss. sacchari albi ℥iij. adjicio liquorem ter-
ræ foliatæ tartari.

Syrupi viscerales, pectorales

Sequenti modo præparantur. Decoctum sa-
turatissimum & spissiusculum radicum florum, &
foliorum convenientium cum æquali portione mel-
lis ad consistentiam syrupi sub repetita despuma-
tione coquitur & colatur.

Vesicatoria.

Inter mitiora, quamvis sat efficacia, sequens
compositio præstat: — ℞. Picis ℥ss. resinæ ℥j.
storacis pulv. canthar. aa. ℥ss. ms. l. a.

Acidu-


Acidula Fachingenses

Quarum insignes vires usus nunc frequentissimus evincit, proximam affinitatem cum vicinis, celeberrimis, non satis laudandis acidulis Selteranis habent. Curiosius & vario modo ad fontem examinata, ejusdem naturæ salia alkalina tenera & si terra alkalina, cujus post lenissimam evaporationem vix nominanda portio restat, & sal commune, quo carent, non in censum veniunt, eadem quantitate exhibent. Hinc in iisdem morbis tuto exhiberi possunt. Puerperæ enim eas sine noxa in deciliis habent. Palato vero multo gratiores, nervis magis amicæ, & ut late expertus sum, antiseptica sunt indolis, multo tardius quoque decompositionem cum inde eveniente odore putrido, patiuntur. Ditiore enim sunt spiritu volatili aëreo - vitriolico - phlogistico & principii martialis subtilissimi quid in sinu fovere ex proxima vicinitate minerarum ferri & ex ochra vel flore martis patet, quem non ultra quam in scaturiginis receptaculo deponunt & qui levi encheirisi totus quantus in ferrum mutatur.

De acidulis Schwalbacensibus

Sat quidem notis, hoc mihi notatu dignum videtur, quod inter duos nunc usuales fontes, ille, quem *Stahlbrunnen* nuncupant, secundum meam & aliorum experientiam, roborandi scilicet scopo, multo præferendus sit & quod ratione copiosioris aëris fixi & martis cum Pymontanis conveniat & exteris ejusdem fere efficaciam esset, si lagenis vitreis transportantur.

F I N I S.



Errata typographica, Autoris per absentiam
quæ eripere B. L. sic emendabit.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
1. 2. lege: quæ.	214. 17. 1. calculis.
- 15. 1. quantitate.	218. 14. 1. inflatio.
2. 21. 1. ære.	- 32. lege: specier.
- 26. 1. femine.	219. 23. 1. retropressis.
6. 9. inter <i>cancro</i>	220. 29. 1. fenn.
& <i>necrosi</i> ponatur comma.	221. 13. 1. ζiij. ✓
6. 20. post <i>otium</i> deleatur comma.	- 18. 1. fanton.
18. 14. 1. uvulæ.	222. 10. 1. maris.
88. 17. 1. laud.	- 15. 1. guttæ.
110. 9. 1. a gr. j.	223. 2. 1. lenia.
152. 22. 1. pulveris.	- 16. 1. atrophix.
164. 4. 1. anodinis.	225. 1. post <i>lauri</i> adde (Baccæ lauri prius.
193. 25. 1. Sydenh.	- 3. 1. alkolifat.
- 28. 1. tussim.	- 4. 1. exhibantur.
194. 17. 1. fissuris.	- 18. 1. supparest.
200. 6. 1. lentor.	- 26. 1. calomel.
202. penult. 1. falis.	- 34. 1. hrb.
- ultim. post <i>infus.</i> adde: menthæ.	226. penult. 1. vim.
205. 9. 1. laxatio.	227. 9. 1. quæ.
206. 18. 1. flatus.	- 25. 1. recentium.
207. 6. 1. diætæ.	228. 14. 1. insipidis.
- 27. 1. alkolifatorum.	229. 6. 1. saponem.
212. 3. 1. lycopodii.	- 24. 1. grosso.
- 29. 1. ceras.	231. 13. 1. alkolifati.
213. 31. 1. maculæ.	232. ultim. 1. transportaretur.

Ob temporis angustiam nonnulla errata forsitan prætervifa sunt, permulta vero inter punctio- nis & sectionis adnotare non licet.

Univ.-Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek

Abteilung für Bibliothek