

25° vel 30° non excedente, siccetur, deinde in pulverem subtilem redactum in vase probe clauso loco obscuro servetur.

Sit pulvis subtilissimus et colore e fusco rubro; in Acido hydrochlorato facile et plane solvatur. Ubi unum gramma pulveris cum quatuor grammatis Nitratis natrici commixtum in crucibulo porcellaneo detonuit, liqvor, elixiviatione residui albi relicti paratus, postquam filtratus est et Acido nitrico accurate neutralisatus, Solutione Nitratis argentici addita, praeципitatum e rubro fuscum ne praebeat.

Kreosotum.

(*Creosotum Sv. 45. N. 54.*)

Kreosot.

Liqvor limpidus, coloris expers, tempore progrediente flavescent vel rubescens, paullo gravior quam Aqva, odore penetranti; in Aqvae partibus octoginta solubilis, in omni proportione Spiritus, Aetheris, Petrolei, Sulphidi carbonici solubilis; in Solutione Hydratis kalici prorsus solvatur, quae solutio, majore copia Aqvae addita, ne turbetur. Ad chartam exploratoriam indifferens sit. In vase, epistomio vitreo clauso, a luce remoto servetur.

Lactas ferrosus.

(*Sv. 45. Lactas ferrosus crystallisatus N. 54.*)

Melkesurt Jernforilte.

R. Sacchari lactis pulverati partes duodecim; 12
solvantur in

Seri lactis sponte acidi et turbidi partibus ducentis
quadragesima 240

et seponantur in loco, cuius temperatura sit 25° vel 30°, quo facta, mixtura fermentari incipiet. Acidum tum quotidie saturetur tanta copia

Bicarbonatis natrici,

qvanta sufficiat, donec partes tredecim vel qvattuordecim Bicarbonatis natrici adhibitae sint. Liqvor ad ebullitionem calefacto tanta copia Acidi sulphurici diluti addatur, ut reactio acida debilis efficiatur; deinde liqvor filtretur et in balneo aquae evaporetur, donec sexta pars relicta sit. Tum liqatori calido addantur

Sulphatis ferrosi partes novem, 9
antea in

Aqvae destillatae fervidae partibus duodeviginti.... 18
solutae. Mixtura colata per duos dies seponatur. Crystalla orta a lixivia separantur, qvo facto, primum parva copia Aqvae destillatae, deinde Spiritu abluantur, tum inter plagulas chartae bibulae pressa, leni calore adhibito, siccentur et in pulvrem trita in vase probe clauso serventur.

Sit pulvis crystallinus et albidus; in Aqvae partibus duodequinquaginta, in Spiritu parva ex parte solvatur; Solutio aquosa Solutione Acetatis plumbici addita vix turbetur. Postquam Oxydum ferrosum, addita Solutione Hydratis natrici abundanti, secretum est, liqvor limpide filtratus parvam copiam Sulphatis cupri additi inter bullendum ne reducat.

Lactucarium.

Lactucarium anglicum D. 50.

(Sv. 45)

Lactucarium.

Lactuca virosa L.

Frusta irregularia, angulata, opaca, fragilia, e flavo fusca vel e flavo grisea, sapore amaro et subadstringenti, odore narcoticō; cum Aqva bullienti trita liqvorem turbidum, massam tenacem relinquentem, praebent; in Aqva, Spiritu, Aethere ex parte solubilia sunt.

Lapides Cancri.

Lapides Cancrorum D. 50.

(*Lapilli Cancrorum Sv. 45.*)

Krebseoin.

Astacus fluviatilis Fabr.

Sunt orbiculati, plano- vel concavo-convexi, nisi magnitudinem adaequantes vel paulo superantes, albidi, e lamellis, quae per strata se excipient, compositi, in Aqva indissolubiles, in Acido hydrochlorato cum fervore dissolubiles, lamellas in similitudinem lapidum formatas, pellucidas, gelatinosas relinquentes.

Lapis divinus.

Cuprum aluminatum D. 50.

(*Lapis divinus Sv. 45. N. 54.*)

Alunholdig Kobbervitriol.

R. Sulphatis cuprici,..... 16

Nitratis kalici, 16

Sulphatis aluminico-kalici, singulorum partes sedecim 16.

Pulveratae misceantur et, leni calore exhibito, in patina porcellanea liqvefiant; tum ab igne removeantur et celeriter admisceatur

Camphorae pulveratae pars una,..... 1

antea cum

Sulphatis aluminico-kalici parte una 1

probe trita. Mixtura in lancem porcellaneam effundatur et refrigerata diffringatur; deinde in vase probe obturato servetur.

Sit massa ex albo caerulea, Camphoram redoleat, in Aqva, residuo perparvo relicto, solvatur.

Lapis Haematites.

Lapis haematitis crystallisatus nativus D. 50.
(Haematites Sv. 45).

Blodsten.

Massae globosae, reniformes, gibbosae, racemosae, stalaclideae, amorphae, colore e fusco rubro, structura fibrosa et radiata; sunt modice durae, sed in pulverem e fusco rubrum facile redigi possunt.

Lichen islandicus.

(Lichen vel Muscus islandicus Sv. 45. Cetraria islandica N. 54).

Islandske Mos.

Cetraria islandica Acharius.

Thallus erectus, foliaceus, varie laciniatus, margine fimbriatus, canaliculatus, altera superficie fuscus, altera pallidior, basi sangvineus, siccatus rigidus et fragilis, humectatus mollis, cartilagineo-subcoriaceus, sapore amaro, cum Aqva coctus refrigeratione gelatinam praebens.

Lignum Guajaci.

Lignum sanctum D. 50.
(Lignum sanctum, Guajaci Lignum Sv. 45. Lignum Guajaci officinalis N. 54).

Guajak-Ved, Pokkenholt.

Guajacum officinale L.

Lignum ponderosum, compactum, durum, duramine resinoso et e subviridi flavo, alburno leviore et pallide flavo; calefactum odorem benzoinum spargit. Rasura venalis frustis albidis, ex alburno vel e lignis alienis ortis, ne nimis mixta sit.

Lignum Qvassiae.

(*Qvassiae Lignum* Sv. 45. *Lignum Qvassiae amarae* N. 54).

Qvassia-Ved.

Qvassia amara L.

Lignum albidum, leve, in segmento transverso stratis concentricis et clarioribus et obscurioribus inter radios medullares angustos instructum, in frustis cylindricis, qvattuor vel octo centimetra crassis, cortice tenui et facile separabili tectis vel decorticatis, sapore peramaro. Rasura venalis ne adhibeatur, neve lignum Picrasmae excelsae Planchon, qvod Jamaicense vocatur, qvodqve prostat in frustis, tria fere decimeta crassis, in segmento transverso radiis medullaribus latioribus instructis, cortice cano et lignoso tectis.

Lignum Santali rubrum.

(*Santali rubri Lignum* Sv. 45).

Rödt Sandel-Ved.

Pterocarpus santalinus L. fil.

Caudices duri, ponderosi, extrinsecus e fusco nigri vel e fusco rubri, intus sangvinei, in Aqva sidentes, structura tenuiter fibrosa, fibris oblique et diverse contextis, in segmento sericeo-nitentes, inter fibras canales latiores, per longitudinem in quadrata divisos, resina e rubro fusca repletos continentates. Lignum in mercatura molitum occurrens pulverem levem, subtilem, rubrum exhibit, ex qvo Aqva nihil admodum extrahit, Spiritus pigmentum rubrum et resinaceum facile extrahit.

Linimentum ammoniacatum.

Linimentum ammoniatum s. *L. volatile* D. 50.

(*Linimentum ammonicum* Sv. 45. *Linimentum Ammoniaci* N. 54).

Flygtig Liniment.

R. Olei Olivarum partes tres;..... 3

in lagena cum

Solutionis Ammoniaci parte una 1
ad massam homogeneam et spissiusculam conqvassentur. In
lagena probe clausa servetur.

Sit colore albo vel e flavo albo.

Linimentum ammoniacatum camphoratum.

*Linimentum ammoniatum camphoratum, L. volatile campho-
ratum D. 50.*

(*Linimentum Ammoniaci camphoratum N. 54*).

Tyk Kampher-Olie.

R. Olei camphorati partem unam, 1

Olei Olivarum partes duas, 2.

Misceantur in lagena et cum

Solutionis Ammoniaci parte una 1
ad massam homogeneam et spissiusculam conqvassentur. In
lagena probe clausa servetur.

Sit colore albo vel e flavo albo.

Linimentum Opodeldoc.

Balsamum Opodeldoc D. 50.

(*Opodeldoc Sv. 45. Linimentum saponatum N. 54*).

Opodeldok.

R. Saponis butyracei siccati et rasi partes viginti
qvattuor; 24

in cucurbitam vitream amplam et vesica perforata clau-
sam immissae inter qvassationem saepe repetitam cum

Spiritus concentrati, temperatione aëris majore, par-
tibus centum nonaginta duabus 192
temperatione aëris minore,

partibus ducentis sedecim.....	216
digerantur, donec solutae sint, deinde in balneo aquae leviter ebulliant. In liqvore colato, adhuc fluenti solvantur	
Camphorae contusae partes quatuor,.....	4
et haec Solutio cum	
Solutionis Ammoniaci partibus duodecim,.....	12
Aetherolei Rosmarini partibus duabus,.....	2
Aetherolei Thymi partibus tribus	3
conquassata in cucurbita, ut supra docuimus, vesica clausa, leni calore exhibito, seponatur et in vasa minora statim claudenda et in balneo aquae frigido refrigeranda limpide decantetur. Residuum turbidum per Gossypium, parva copia Spiritus concentrati humectatum et in infundibulo calefacto collocatum, filtretur; deinde filtratum illa ratione, quae supra exposita est, tractetur. Servetur loco frigido.	

Sit album, subpellucidum, opalescens; calore manus in liqvorem limpidum liqvescat.

Linteum carptum anglicum.

Engelsk Charpi.

Liqvor acidus Halleri.

Elixir acidum (Halleri) D. 50.

(Liqvor acidus Halleri Sv. 45).

Hallers sure Draaber.

R. Acidi sulphurici partem unam;	1
in Spiritus concentrati partem unam.....	1
ita inter quassationem instilletur, ut mixtura non nimis calida fiat; tum liqvor in lagena epistomio vitreo clausa loco frigido servetur.	

Sit limpidus, coloris expers vel subflavidus; per aliquod tempus sepositus odorem Aetheri similem spargit.

Liqvor Arseniitis kalici.

Liqvor arsenicalis, Solutio Fowleri D. 50.

(*Solutio Arseniitis kalici N. 54*).

Fowlers Arsenik-Draaber.

R. Acidi arsenicosi pulverati partem unam;.....	1
immittatur in cucurbitam vitream, in qva insint	
Carbonatis kalici pars una,	1
Aqvae destillatae partes qvinque.....	5.
Mixtura calefiat, donec omnia soluta sint, deinde admisceantur	
Spiritus Lavandulae simplicis partes qvinque	5
et Aqvae destillatae qvantum reqviritur, ut pondus li-	
qvoris sit	
partium centum;	100
tum liqvor filtretur. In lagena probe obturata servetur.	

Nota. Partes qvinque hujus Liqvoris tantam copiam Acidi arsenicosi continent, qvantam partes sex liqvoris in *Pharmacopoeia Danica 1850* praescripti.

Liqvor Clauderi.

Elixir aperitivum Clauderi D. 50.

(*Elixir aperitivum N. 54*).

Clauders Draaber.

R. Stigmatum Croci nuper siccatorum partem unam,..	1
Aloes grosse pulveratae,.....	2
Gummi-resinae Myrrhae grosse pulveratae, singulo-	
rum partes duas,.....	2
Carbonatis kalici depurati partes qvattuor;.....	4
per tres dies inter agitationem saepe repetitam cum	
Aqvae Sambuci partibus triginta.....	30
digerantur.	

Liqvor refrigeratus exprimatur et per aliquot horas se-
positus, ut turbantes partes subsident, filtretur. Eodem modo
servetur, qvo Tincturae.

Sit obscure fuscus, non pellucidus, sed limpidus.

Liqvor Menyanthis acidus.

Elixir antarthriticum D. 50.

(N. 54).

Sure Bukkeblade-Draaber.

R. Extracti Menyanthis partes quinque;	5
misceantur		
Tincturae Menyanthis partibus triginta tribus,	33

qvo facto, affundantur
Liqvoris acidi Halleri partes duae,..... 2
dum vas saepius conqvassatur. In vase vitro epistomio vitro
clauso servetur.

Ante dispensationem diligenter conqvassetur.

Sit spissiusculus et colore obscure viridi.

Liqvor pectoralis.

Elixir pectorale D. 50.

Bryst-Draaber.

R. Extracti Glycyrrhizae partem unam;	1
solvatur in		
Aqvae Foeniculi partibus tribus;	3
solutio seponatur, ut turbantes partes subsident, deinde co- letur et probe conqvassetur cum		
Spiritus ammoniacati anisati parte una	1.
In lagena probe clausa servetur.		
Sit e nigro fuscus; limpidus dispensemur.		

Liqvor Succinatis ammonici pyroleosi.

*Liqvor Ammonii succinici, Liqvor Cornus Cervi succinatus D. 50.
(Sv. 45. Solutio Succinatis ammonici pyro-oleosi N. 54).*

Ravsyret Ammoniak-Draaber.

R. Acidi succinici partem unam; 1
teratur cum

Aqvae destillatae partibus octo, 8
deinde inter agitationem sensim addatur

Supercarbonatis ammonici pyroleosi
tanta copia, ut Acidum plane neutralisetur. Solutio parata
per aliquot dies seponatur, deinde filtrata in lagena probe
clausa a luce remota servetur.

Sit limpidus, recens paratus colore flavo, postea colore
paullo obscuriore, odore empyreumatico; calefactus prorsus au-
fugiat; ad chartam exploratoriam sit indifferens; pondus speci-
ficum sit = 1,050—1,054.

Liqvor Supercarbonatis ammonici pyroleosi.

*Liqvor Ammonii carbonici pyro-oleosus, Liqvor Cornus Cervi D. 50.
(Solutio Sesqvicarbonatis ammonici pyro-oleosi N. 54).*

Hjortetaksalt-Draaber.

R. Supercarbonatis ammonici pyroleosi partem unam; .. 1
conqvassatione solvatur in

Aqvae destillatae partibus sex; 6
solutio per unum vel duos dies saepiusque agitetur,
deinde filtretur et in lagena probe clausa loco frigido et um-
broso servetur.

Sit primo limpidus colorisqve expers vel subflavus, postea
subfuscus et subturbidus. Calore adhibito omnino avolet.
Pondus specificum sit 1,060—1,065.

Lycopodium.*Semina Lycopodii D. 50.**(Lycopodii Semina vel Farina Sv. 45. Semina Lycopodiorum N. 54).***Hexemel.****Lycopodium clavatum L.**

Pulvis subtilissimus, mobilissimus, pallide flavus, digitis adhaerescens, Aqvae, qva difficulter miscetur, innatans, prunis injectus cum strepitu celerime deflagrans. Sit prorsus siccus, non adulteratus qvisqviliis vel polline saturate flavo Pinorum aliarumque plantarum, qvi pulvis facilius conglomeratur; cum Aqva coctus, Solutione Jodi spirituosa addita, colore caeruleum ne efficiat.

Manna.*Manna calabrina D. 50.**(Manna electa v. calabrina optima Sv. 45. Manna Orni Europaea N. 54).***Manna.****Fraxinus Ornus L.**

Frusta plana vel canaliculata, siccata levia, fragilia, subviscida, fracta strata concentrica exhibentia, colore albido vel subflavo, sapore dulci, non acri. Dispensetur, si medicus Manna canellatam vel electam poposcerit.

Massae irregulares, albidae vel subflavae, glebulis subfuscis et subviscidis mixtae, varia magnitudine, sapore subdulci cum quadam acrimonia, nauseoso, vocantur Manna vulgaris vel „Gerace“.

Utraque in Aqva et Spiritu bullienti, nullo fere residuo relicto, solvi potest.

Massa Pilularum de Cynoglosso.*(Massa Pilularum sedantium cum Cynoglosso N. 54).***Hundetunge-Pillemasse.**

R. Opii pulverati,..... 4