

conqvassentur cum tanta copia

Aqvae destillatae,
 ut, liqvore ebullito, deinde refrigerato et filtrato,
 partes viginti 20
 remaneant; ex his, additis
 Sacchari albi partibus qvadrageinta, 40
 Syrupus, calore adhibito, paretur.
 Sit colore subflavo; Balsamum toltanum redoleat et resipiat.

Tartarus boraxatus.

Cremor Tartari solubilis D. 50.
 (Sv. 45. *Tartras boraxato-kalicus N. 54*).

Borax-Vinsten.

℞. Biboratis natrici partem unam; 1
 in patinam porcellaneam immissa solvatur in
 Aquae destillatae bullientis partibus octo; 8
 solutioni addantur

Bitartratis kalici partes duae. 2.
 Ubi Bitartras kalicus, calore adhibito, solutus erit, liqvor fil-
 tretur, deinde in balneo aquae evaporetur, donec massa densa
 et tenax, post refrigerationem dura remaneat. Haec exempta
 et adhuc calida in laminas tenues extrahatur, quae in furno,
 leni calore adhibito, plane siccentur; tum laminae contusae in
 vase vitreo haud nimio et probe obturando serventur.

Sit albus et sapore acido, ex aëre humorem attrahat, in
 aeqvo pondere Aquae solvatur; solutio, Solutione Sulphidi
 hydrici addita, ne coloretur, neve Solutione Ammoniaci super-
 saturata, addita Solutione Sulphohydratis ammoniaci, coloretur.

Tartras ferrico-kalicus.

Vinsurt Jerntveitte-Kali.

℞. Solutionis Sulphatis ferrici partes tres; 3
 diluantur

Aqvae destillatae partibus novem.....	9
et inter perpetuam agitationem in mixturam, e	
Solutionis Ammoniaci partibus tribus.....	3
et Aqvae destillatae partibus sexaginta.....	60

paratam, infundantur. Si mixtura parata reactionem alkalinam manifestam non prodiderit, tanta copia Solutionis Ammoniaci addatur, ut illud fiat. Sedimentum deinde in linteum distentum colligatur et Aqva destillata eluatur, donec liqvor defluens, Solutione Chloreti barici addita, non amplius turbetur. Massa pultacea in patinam porcellaneam immittatur et, admixta

Bitartratis kalici parte una,..... 1
calore 60° non excedente calefiat, donec paene omne Oxydum ferricum solutum sit. Solutio seponatur, ut turbantes partes subsidant, deinde, limpida decantata eodem calore adhibito, ad crassitudinem syrupi tenuis evaporetur et, laminis vitreis inducta, in furno plane siccetur. Sqvamae siccae et pellucidae hac ratione paratae colligantur et in vase probe obturato servantur.

Sint sqvamae e fusco rubrae, pellucidae, in Aqvae partibus quinque vel sex plane solubiles, in Spiritu indissolubiles. Partes centum continent paullo plus quam partes triginta Oxydi ferrici vel Ferri partes viginti unam.

Tartras ferroso-ferrico-kalicus.

(Loco Globulorum Tartari martiati D. 50).

(Globuli Martiales Sv. 45. Globuli Tartratis ferrico-kalici N. 54).

Jern-Vinsten.

R. Ferri limati partem unam,.....	1
Bitartratis kalici depurati venalis pulverati partes	
quinque;.....	5
mixtae in vas lapideum aptum immittantur et tanta copia	
Aqvae destillatae humectentur, ut puls oriatur. Haec, calore	

adhibito, inter agitationem saepius repetitam ita digeratur, ut Aqva evaporatione consumpta semper restituatur, donec massa homogenea et nigra orta sit, et portiuncula exempta in Aqva maxima ex parte solvatur, solutione colorem e nigro viridem induente. Jam praeparatum plane siccatum in pulverem redigatur et in vase probe clauso servetur.

Sit pulvis e nigro viridis, mox colorem fuscum induat, in Aqvae partibus sedecim maxima ex parte solvatur.

Tartras kalicus.

Kali tartaricum, Tartarus tartarisatus D. 50.

(*Tartras kalicus Sv. 45. Tartras bikalicus crystallisatus N. 54.*)

Vinsurt Kali

℞. Bicarbonatis kalici partes qvinque, 5
 Aqvae destillatae partes duodecim; 12
 in patinam porcellaneam immissae calefiant, donec bulliant;
 tum sensim addantur

Bitartratis kalici partes novem 9
 vel tanta copia, ut reactio alkalina liqvoris paene tollatur.
 Deinde liqvor filtretur et evaporatus sepositusque in crystalla redigatur, quae caute siccata in vase probe obturato serventur.

Sint crystalla coloris expertia et diaphana; in Aqvae partibus tribus quartis, bullientis parte dimidia limpide solvantur. Solutio aqvisa sit reactionis subalkalinae, Solutione Sulpho-hydratis ammonici addita ne coloretur.

Tartras natrico-kalicus.

Tartarus natronatus D. 50.

(*Tartras natrico-kalicus Sv. 45. Tartras natrico-kalicus crystallisatus N. 54.*)

Seignette-Salt.

℞. Carbonatis natrici partes quattuor; 4
 immittantur in patinam porcellaneam, quae in balneo aqvae sit collocata, et in qva insint

Aqvae destillatae bullientis partes viginti quattuor;. 24
tum inter agitationem sensim addantur

Bitartratis kalici partes quinque..... 5

vel tanta copia, ut reactio liqvoris alkalina paene tollatur. Deinde liqvor filtratus evaporetur et ad crystallisationem separatur; crystallae, parva copia Aqvae frigidae abluta, siccantur. E lixivio remanenti, evaporatione continuata, plura crystallae parari possunt. Crystallae collectae siccantur et in vase probe clauso servantur.

Sint crystallae coloris expertae, pellucidae, in Aqvae partibus duabus solubiles. Solutio Solutione Oxalatis ammoniaci et Solutione Sulphohydratis ammoniaci ne turbetur.

Tartras stibico-kalicus.

Tartarus stibiatus, Tartarus emeticus D. 50.

(*Tartras stibico-kalicus Sv. 45. Tartras stibico-kalicus crystallisatus N. 54.*)

Brækvinsten.

R. Aqvae destillatae partes quinquaginta;. 50
in patina porcellanea calefiant, donec bulliant, tum addantur

Oxydi stibici partes quattuor..... 4

et Bitartratis kalici partes quinque..... 5.

Mixtura inter agitationem saepe repetitam per unam horam ita coqvatur, ut Aqua evaporatione consumpta sensim restituatur. Tum liqvor quam calidissimus filtretur, deinde evaporetur, donec partes viginti septem remaneant, et inter perpetuam agitationem refrigeretur. Pulvis crystallinus inde ortus separatur a lixivio, quae, ad quartam partem evaporata, inter refrigerationem pulverem crystallinum rursus secernit. Pulvis, Aqua destillata frigida elutus, inter plagulas chartae bibulae leni calore siccetur et in vase probe clauso servetur.

Sit pulvis peralbus, crystallinus, in Aqvae partibus quindecim, bullientis partibus duabus solubilis, in Spiritu indissolubilis. Solutio aqvosa, addita parva copia Acidi tartarici, Solutione Chloreti barici vel Nitratis argentei ne tur-

betur. Si pulvis in cochleari ferreo candefactus erit, donec Acidum tartaricum plane destructum sit, residuum candescens, si afflaveris, odorem alliaceum ne spargat.

Testae Ostrearum praeparatae.

Conchae praeparatae D. 50.

(*Testae Ostrearum praeparatae Sv. 45. Conchae Ostreae edulis mundatae N. 54.*)

Præparerede Østersskaller.

Testae Ostrearum cum Aqva coquantur, ab omnibus quisquiliis adhaerentibus ope scopulae purgantur, abluantur, siccentur, in pulverem subtilissimum terantur, laevigentur Aqva et iterum siccentur.

Sit pulvis subtilissimus, albus, insipidus, Acidis perfusus valde effervescat, ignitus odorem debilem et animalemmittat et colorem subcanum induat.

Tincturae.

Nisi alia parandi ratio praescripta est, species aut, si molliores sunt, minutim concisae, aut, si duriores sunt, grosse pulveratae cum menstruo inter quassationem quotidie saepe repetitam loco umbroso per tres dies digerantur aut per octo dies macerentur. Adhibeantur vasa, quorum volumen ad dimidiam tantum partem substantiis Tincturae repleatur; vasa inter macerationem claudantur, inter digestionem vesica humida, acu perforanda, obtegantur. Digestio calorem 35° — 40° , maceratio calorem 15° — 20° requirit. Ante utramque operationem pondus vasis et substantiarum, quae insunt, in vase inscribatur; digestionem aut macerationem peracta, et liqvore satis refrigerato, pars ponderis evaporatione fortasse consumpta restituatur, admixto Spiritu concentrato, si menstruum est Spiritus dilutus vel Spiritus concentratus.

Deinde Tinctura decantetur, et residuum, si opus est, celeriter prelo exprimatur; liqvores statim collecti per horas vi-

ginti quattuor vel diutius in vase clauso seponantur, ut turbantes partes subsidant, eo loco, quo Tinctura servanda est, ibiqve in infundibulo operculo tecto filtrentur.

Tincturae sint limpidae et eas tantum substantias, e quibus paratae sunt, redoleant vel respiciant.

Serventur Tincturae in lagenis probe clausis loco umbroso, cujus temperatura sit decem — quindecim graduum.

Tinctura Absinthii.

(Sv. 45. *Essentia Herbae Absinthii N. 54*).

Malurt-Draaber.

℞. Herbae Absinthii partem unam, 1
Spiritus diluti partes quinque 5.

Digerantur.

Sit colore e subfusco viridi.

Tinctura Aconiti.

(*Essentia Foliorum Aconiti N. 54*)

Stormhat-Draaber.

℞. Herbae Aconiti partem unam, 1
Spiritus diluti partes decem 10.

Digerantur.

Nota. *Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Aconiti Ph. Dan. 1850.*

Tinctura amara.

(*Tinctura Absinthii composita, Tinctura amara Sv. 45. Essentia amara N. 54*).

Bitter Draaber.

℞. Fructus Anisi partem unam, 1
Fructus Aurantii, 4

Foliorum Cardui benedicti,	4
Radicis Gentianae, singulorum partes quattuor, . . .	4
Herbae Absinthii partes sedecim,	16
Spiritus diluti partes centum quadraginta quinque.	145.

Digerantur.

Sit colore e subviridi fusco.

Tinctura Arnicae.

Volverlei-Draaber.

℞. Florum Arnicae partem unam,	1
Spiritus diluti partes decem	10.

Digerantur.

Nota. Quinque partes respondent circiter quattuor partibus Tincturae Arnicae Ph. D. 1850.

Tinctura aromatica.

(*Sv. 45. N. 54.*)

Krydrede Draaber.

℞. Corticis Cinnamomi Cassiae partes quattuor,	4
Florum Caryophylli,	1
Rhizomatis Galangae,	1
Rhizomatis Zingiberis,	1
Fructus Cardamomi, singulorum partem unam,	1
Spiritus diluti partes quadraginta	40.

Digerantur.

Tinctura aromatica acida.

Elixir aromatico-acidum D. 50.

(*Essentia aromatica acida N. 54.*)

Sure, krydrede Draaber.

℞. Specierum Tincturae aromatae praescriptarum partes quinque	5.
---	----

Digerantur, addita mixtura, ex

Acidi sulphurici parte una.....	1
et Spiritus diluti partibus viginti quattuor.....	24
parata.....	

Tinctura Asae foetidae.

(Sv. 45. *Essentia Gummi-resinae Ferulae N. 54*).

Dyvelsdræk-Draaber.

℞. Gummi-resinae Asae foetidae pulveratae partem unam,	1
Spiritus concentrati partes quinque.....	5.

Digerantur.

Sit colore e subflavo fusco.

Tinctura Aurantii.

Tinctura Corticum Aurantium D. 50.

(*Tinctura Aurantii Sv. 45. Essentia Corticis Fructuum Aurantii N. 54*).

Pommerans-Draaber.

℞. Corticis Fructus Aurantii partem unam,.....	1
Spiritus diluti partes quinque.....	5.

Digerantur.

Tinctura balsamica aromatica.

Balsamum vitae Hoffmanni, Mixtura oleosa balsamica D. 50.

(*Essentia aetherea balsamica N. 54*).

Hoffmanns Livsbalsam.

℞. Pyrolei Succini partem unam,.....	1
Aetherolei Caryophylli,.....	2
Aetherolei Cassiae,.....	2
Aetherolei Lavandulae,.....	2
Aetherolei Macidis, singulorum partes duas,.....	2

Balsami peruviani partes tres;	3
conqvassentur cum	
Spiritus concentrati, antea Radice Alkannae pulchre tincti, partibus qvadringentis octoginta octo	488

et, parvo temporis spatio interjecto, filtrentur.

Tinctura Benzoes.

(Sv. 45).

Benzoe-Draaber.

R̄. Resinae Benzoes partem unam,	1
Spiritus concentrati partes qvinque	5.

Digerantur.

Tinctura Benzoes composita.

Balsamum Commendatoris D. 50.

(*Tinctura Benzoes aloetica Sv. 45*).

Sammensatte Benzoe-Draaber.

R̄. Aloes partem unam,	1
Balsami peruviani partes duas,	2
Resinae Benzoes partes novem,	9
Spiritus concentrati partes sexaginta	60.

Digerantur.

Tinctura Calabar.

Kalabar-Draaber.

R̄. Seminis Calabar partem unam,	1
Spiritus concentrati partes decem.	10.

Digerantur.

Sit colore e subfusco flavo.

Tinctura Calami.

Tinctura Calami aromatici D. 50.

Kalmus-Draaber.

℞. Rhizomatis Calami partem unam,.....	1
Spiritus diluti partes quinque	5.

Digerantur.

Tinctura Cantharidum.

(Essentia Cantharidum N. 54).

Spanskflue-Draaber.

℞. Cantharidum nuper grosse pulveratarum partem unam,	1
Spiritus diluti partes triginta.....	30.

Digerantur.

Sit colore e subflavo viridi.

Nota. Quindecim partes respondent circiter octo partibus Tincturae Cantharidum Ph. Dan. 1850.

Tinctura Cantharidum fortior.

Tinctura Cantharidum concentrata D. 50.

(Essentia Cantharidum fortior N. 54).

Stærkeste Spanskflue-Draaber.

℞. Cantharidum nuper grosse pulveratarum partem unam,.....	1
Spiritus concentrati partes quinque.....	5.

Digerantur.

Sit colore e subfusco viridi.

Nota. Quinque partes respondent circiter quattuor partibus Tincturae Cantharidum concentratae Ph. Dan. 1850.

Tinctura Cascarillae.

(Sv. 45. *Essentia Corticis Eluteriae N. 54*).

Kaskarille-Draaber.

- ℞. Corticis Cascarillae partem unam, 1
 Spiritus diluti partes quinque 5.
 Digerantur.
-

Tinctura Castorei canadensis.

(*Tinctura Castorei Sv. 45. Essentia Castorei N. 54*).

Canadisk Bævergeil-Draaber.

- ℞. Castorei canadensis grosse pulverati aut minutim con-
 cisi partem unam, 1
 Spiritus concentrati partes quinque 5.
 Digerantur.

Sit colore saturate fusco.

Nota. Vide Tincturam Castorei moscovitici.

Tinctura Castorei moscovitici.

Russisk Bævergeil-Draaber.

- ℞. Castorei moscovitici grosse pulverati aut minutim
 concisi partem unam, 1
 Spiritus concentrati partes quinque 5.
 Digerantur.

Sit colore e rufo fusco.

Nota. Ne dispensetur, nisi Tinctura Castorei moscovitici disertis verbis postulata erit. Si Tinctura Castorei, nulla designatione accuratiore addita, postulata erit, Tinctura Castorei canadensis dispensetur.

Tinctura Chinae Calisayae.

Tinctura Chinae regiae D. 50.

(*Tinctura Cinchonae Sv. 45. Essentia Corticis Cinchonae regii N. 54.*)

China-Draaber.

- ℞. Corticis Chinae Calisayae partem unam, 1
 Spiritus diluti partes quinque 5.
 Digerantur.
 Sit colore e rubro fusco.
-

Tinctura Chinae composita.

Elixir roborans ad modum Whytti D. 50.

(*Tinctura Cinchonae amara Sv. 45. Essentia Corticis Cinchonae regii composita N. 54.*)

Sammensatte China-Draaber.

- ℞. Corticis Chinae Calisayae partes octo, 8
 Radicis Gentianae, 3
 Corticis Fructus Aurantii, singulorum partes tres, .. 3
 Spiritus diluti partes septuaginta 70.
 Digerantur.
-

Tinctura Chinoidinae.

Chinoidin-Draaber.

- ℞. Chinoidinae pulveratae partes duas; 2
 solvantur conterendo in mixtura, ex
 Acidi hydrochlorati parte una 1
 et Spiritus concentrati partibus septendecim 17
 parata. Per aliquod tempus seponantur, tum filtrentur.
 Sit colore fusco.
-

Tinctura Cinnamomi.

(Sv. 45).

Kanel-Draaber.

- ℞. Corticis Cinnamomi ceylanici partem unam, 1
 Spiritus diluti partes quinque 5.
 Digerantur.

Tinctura Colchici.

Tinctura Colchici e Seminibus D. 50.

(*Essentia Seminum Colchici N. 54*).

Kolchikum-Draaber.

- ℞. Seminis Colchici grosse pulverati et per cribrum
 trajecti partem unam, 1
 Spiritus diluti partes decem 10.
 Digerantur per octo dies.

Nota. Duae partes respondent circiter uni parti Tincturae Colchici e seminibus Ph. Dan. 1850.

Tinctura Colocynthis composita.

Tinctura Colocynthis D. 50.

Koloqvint-Draaber.

- ℞. Fructus Anisi partem unam, 1
 Fructus Colocynthis seminibus liberati partes decem, 10
 Spiritus concentrati partes centum 100.
 Digerantur.

Nota. Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Colocynthis Ph. Dan. 1850.

Tinctura Croci.

Safran-Draaber.

- ℞. Stigmatum Croci nuper siccatorum partem unam, ... 1

Spiritus diluti partes decem..... 10.

Digerantur.

Sit colore saturate aurantiaco.

Nota. *Quinque partes respondent circiter quattuor partibus Tincturae Croci Ph. Dan. 1850.*

Tinctura Digitalis.

Tinctura Digitalis purpureae D. 50.

(*Tinctura Digitalis Sv. 45. Tinctura Foliorum Digitalis N. 54.*)

Fingerbolle-Draaber.

℞. Foliorum Digitalis nuper grosse pulveratorum partem unam, 1
Spiritus diluti partes decem 10.

Digerantur.

Nota. *Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Digitalis purpureae Ph. Dan. 1850.*

Tinctura Digitalis aetherea.

Ætheriske Fingerbolle-Draaber.

℞. Foliorum Digitalis nuper grosse pulveratorum partem unam, 1
Aetheris spirituosus partes decem..... 10.

Macerentur, deinde ad 10⁰—15⁰ refrigerentur, quo facto, quae partes evaporatae erunt, Aethere spirituoso admixto, restituantur; tum in infundibulo operculo tecto celeriter filtrentur, sub finem operationis levi pressu adhibito. Servetur in lagena epistomio vitreo probe clausa.

Nota. *Quinque partes respondent circiter quattuor partibus Tincturae Digitalis aetherae Ph. Dan. 1850.*

Tinctura Digitalis rubra.

Elixir antasthmaticum Aaskovi D. 50.

Aaskovs Draaber.

℞. Foliorum Digitalis nuper grosse pulveratorum partes duas,.....	2
Radicis Glycyrrhizae echinatae minutim concisae partes quattuor,.....	4
Ligni Santali rubri pulverati partem unam,.....	1
Aqvae Foeniculi,.....	10
Spiritus diluti, singulorum partes decem.....	10.

Digerantur.

Nota. Qvinque partes respondent circiter sex partibus Elix. antasthmatici Aaskovi Ph. Dan. 1850.

Tinctura Gentianae.

(Essentia Radicis Gentianae N. 54).

Enzian-Draaber.

℞. Radicis Gentianae partem unam,.....	1
Spiritus diluti partes quinqve.....	5.

Digerantur.

Tinctura Guajaci.

(Essentia Resinae Guajaci N. 54).

Guajak-Draaber.

℞. Resinae Guajaci partem unam,.....	1
Spiritus concentrati partes quinqve.....	5.

Digerantur.

Tinctura Guajaci ammoniacata.

Tinctura Guajaci volatilis, Tinctura Guajaci ammoniata D. 50.

(*Sp. 45. Essentia Resinae Guajaci ammoniata N. 54*).

Ammoniakholdige Guajak-Draaber.

R. Resinae Guajaci partes tres,.....	3
Solutionis Ammoniaci partes quinque,.....	5
Spiritus concentrati partes decem.....	10.

Macerentur. In vase vitreo epistomio vitreo probe clauso servetur.

Nota. Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Guajaci ammoniatae Ph. Dan. 1850.

Tinctura Lavandulae rubra.

Spiritus Lavandulae compositus D. 50.

(*Tinctura Lavandulae aromatica Sp. 45. Essentia Florum Lavandulae N. 54*).

Sammensatte Lavendel-Draaber.

R. Corticis recentis Fructus Citri minutim concisi partes tres,.....	3
Florum Lavandulae minutim concisorum partes triginta sex.....	36.

Macerentur per noctem in apparatu ad destillandum apto cum

Spiritus diluti,..... 150

Aquae communis, singulorum partibus centum quinquaginta,..... 150

quo facto, destillatione secernantur

partes centum quinquaginta..... 150.

Destillatum digeratur cum

Corticis Cinnamomi Cassiae partibus quattuor,.... 4

Fructus Cubebae,..... 1

Florum Caryophylli, singulorum parte una, 1
 Ligni Santali rubri pulverati q. s.
 ad Tincturam colore saturate rubro tingendam.

Tinctura Lobeliae.

Tinctura Lobeliae inflatae D. 50.

Lobellie-Draaber.

R. Herbae Lobeliae partem unam, 1
 Spiritus diluti partes decem 10.

Digerantur.

*Nota. Qvinque partes respondent circiter quattuor partibus
 Tincturae Lobeliae inflatae Ph. Dan. 1850.*

Tinctura Menyanthis.

Tinctura Trifolii fibrini D. 50.

(Essentia Foliorum Menyanthis N. 54).

Bukkeblade-Draaber.

R. Foliorum Menyanthis partem unam, 1
 Spiritus diluti partes qvinque 5.

Digerantur.

Tinctura Moschi.

Moskus-Draaber.

R. Moschi partem unam, 1
 Spiritus diluti, 25
 Aquae destillatae, singulorum partes viginti qvinque 25.

Macerentur, postquam Moschum cum parva parte menstrui
 contriveris.

Sit colore e subrufo fusco.

Tinctura Myrrhae.

(*So. 45. Essentia Gummi-resinae Balsamodendri N. 54.*)

Myrrha-Draaber.

R. Gummi-resinae Myrrhae partem unam,	1
Spiritus concentrati partes quinque	5.
Digerantur.	

Tinctura Nucis vomicae.

Tinctura Nucum vomicarum D. 50.

Rævekage-Draaber.

R. Seminis Nucis vomicae grosse pulverati partem unam,	1
Spiritus diluti partes decem	10.
Digerantur.	

Nota. Quinque partes respondent circiter duabus partibus Tincturae Nucum vomicarum Ph. Dan. 1850.

Tinctura Pimpinellae.

(*Essentia Radicis Pimpinellae N. 54.*)

Pimpinelle-Draaber.

R. Radicis Pimpinellae partem unam,	1
Spiritus diluti partes quinque	5.
Digerantur.	

Tinctura Pomi ferrata.

Tinctura Ferri pomati D. 50.

(*Solutio Extracti Pomorum ferrati N. 54.*)

Draaber af æblesurt Jern.

R. Extracti Pomi ferrati partem unam,	1
Aqvae Cinnamomi spirituosae partes quinque;	5
conterantur, seponantur, ut turbantes partes subsidant, decantentur, filtrentur.	

Sit limpida et colore e nigro fusco.

Ferrum politum in hanc Tincturam, parva parte Acidi hydrochlorati mixtam, per aliquod tempus demissum, indumento rubro et metallico ne inducatur.

Tinctura Pyrethri.

Bertram-Draaber.

℞. Radicis Pyrethri partem unam,.....	1
Spiritus diluti partes quinque	5.
Digerantur.	

Tinctura Qvassiae.

Qvassia-Draaber.

℞. Ligni Qvassiae rasi vel minutim concisi partem unam, 1	
Spiritus diluti partes quinque	5.
Digerantur.	

Tinctura Ratanhiae.

(*Essentia Radicis Krameriae N. 54.*)

Ratanhie-Draaber.

℞. Radicis Ratanhiae minutim concisae partem unam, ..	1
Spiritus diluti partes quinque	5.
Digerantur.	

Sit colore e rubro fusco.

Tinctura Rhei amara.

(*Sv. 45.*)

Bittre Rhabarber-Draaber.

℞. Radicis Serpentariae partes tres,	3
Radice Gentianae partes octo,	8

Radicis Rhei partes triginta duas,	32
Spiritus diluti partes trecentas viginti	320.

Digerantur.

Nota. *Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Rhei amarae Ph. Dan. 1850.*

Tinctura Stramonii.

Tinctura Stramonii e Seminibus D. 50.

Pigæble-Draaber.

R. Seminis Stramonii partem unam,	1
Spiritus diluti partes decem,	10.

Digerantur.

Nota. *Duae partes respondent circiter uni parti Tincturae Stramonii e Seminibus Ph. Dan. 1850.*

Tinctura thebaica.

Tinctura Opii spirituosa D. 50.

(Tinctura Opii Sv. 45).

Vinaandholdige Opiums-Draaber.

R. Opii pulverati partem unam,	1
Spiritus diluti partes decem,	10.

Digerantur.

Nota. *Quinque partes respondent circiter sex partibus Tincturae Opii spirituosae Ph. Dan. 1850.*

Tinctura thebaica benzoica.

Elixir paregoricum, Tinctura Opii benzoica D. 50.

(Tinctura Opii camphorata Sv. 45. Essentia Opii benzoica N. 54).

Beroligende Bryst-Draaber.

R. Aetherolei Anisi partes tres,	3
Camphorae partes quattuor,	4

Acidi benzoici,	6
Opii pulverati, singulorum partes sex,	6
Spiritus diluti partes mille ducentas.	1200.

Digerantur.

Tinctura tolutana.

(*Tinctura Tolu Sv. 45. Essentia Balsami tolutani N. 54.*)

Tolubalsam-Draaber.

R. Balsami tolutani partem unam,	1
Spiritus concentrati partes quinque.	5.

Digerantur.

Tinctura Valerianae.

(*Sv. 45. Essentia Radicis Valerianae N. 54.*)

Baldrian-Draaber.

R. Radicis Valerianae partem unam,	1
Spiritus diluti partes quinque	5.

Digerantur.

Tinctura Valerianae aetherea.

Ætheriske Baldrian-Draaber.

R. Radicis Valerianae partem unam,	1
Aetheris spirituosus partes quinque	5.

Paretur eadem ratione, qua Tinctura Digitalis aetherea.

Servetur in lagena, epistomio vitreo probe clausa.

Tragacantha.

Gummi Tragacanthae D. 50.

(*Tragacantha electa Sv. 45. Gummi Astragalorum N. 54.*)

Tragakanth.

Astragalus verus Oliv., A. gummifer Labill. et aliae species.

Laminae planae, tenues, subrotundae vel spiraliter tortae, falcatae, toris concentricis et semirotundis instructae, aut frusta tenuia, filiformia, plus minusve cochleata, toris parvis et concentricis instructa. Substantia est cornea, subdiaphana, lenta, difficilis ad pulverandum, colore albo vel e flavo albo, odoris expers; in Aqva turgescit, non dissolvitur, cum Aqva bullienti mucilaginem spissam praebet.

Trochisci Ipecacuanhae.

Ipekakuanha-Kager.

R. Radicis Ipecacuanhae pulveratae grammata tria; . . . 3
infundantur

Aqvae communis ferventis grammata quindecim; . . . 15
per aliquot horas digerantur, tum colentur et filtrentur.

Filtratum, additis

Sacchari albi subtilissime pulverati grammatibus
centum quadraginta septem, 147

Tragacanthae subtilissime pulveratae grammatibus
tribus, 3

in massam redigatur, e qua formentur ducenti Trochisci, qui,
leni calore siccati, in vase clauso loco sicco serventur.

Singuli Trochisci contineant, quae ex centigrammate uno et
dimidio ($1\frac{1}{2}$) Radicis Ipecacuanhae, Aqva adhibita, extrahi possint.

Trochisci Santonini.

Santonin-Kager.

R. Santonini grammata sex; 6
conterantur in pulverem subtilem et accurate misceantur

Sacchari albi pulverati grammatibus quinquaginta
septem, 57

deinde, calore adhibito, misceantur

Seminis Cacao tosti cortice denudati in massam sub-
tilissimam redacti grammatibus quinquaginta septem 57.

Hinc fiat massa, e qua Trochisci ducenti formentur. Serventur in vase clauso loco prorsus sicco.

Singuli Trochisci tria (3) centigrammata Santonini contineant.

Tubera Jalapae.

Radix Jalapae D. 50.

(*Jalappae Radix Sv. 45. Radix Ipomaearum N. 54.*)

Jalaperod.

Ipomaea Purga Hayne.

Tubera globosa, piriformia vel oblonga, varia magnitudine, integra vel dissecta, solida, ponderosa, extrinsecus fusca, rugosa, rugis resina nigra obductis, intus e flavo fusca, zonis frequentibus, obscurioribus, concentricis, cellas nitentes et resinosas continentibus instructa. Centum (100) partes pulveris tuborum minimum decem (10) partes resinae contineant.

Tubera Saleb.

Radix Saleb D. 50.

(*Saleb Radix Sv. 45. Radix Orchidum N. 54.*)

Salebrod.

Species variae generum Orchidum.

Tubera irregulariter ovata vel oblonga, rarius palmata, unum vel duo centimetra et dimidium longa, subdiaphana, consistentia cornea, colore sordide albo vel e subfusco albo; pulverata cum Aqua mucilaginem praebent.

Ungventa.

In Ungventis parandis diligenter prospiciendum est, ne major calor adhibeatur, quam qui necessario requiratur. Substantiae volatiles non ante addendae sunt, quam massa ad 60° vel 70° refrigerata est. Ungventa ne sint grumosa vel glebosa, neve odorem rancidum spargant. Serventur ab humore, luce, calore, quam maxime remota.