

L I E E R I L
D E
Affectibus Colli.
C A P. I.
De Angina.

Angina) quasi intus angens, præcludit enim eibi, potus & cœsi in tritum; ab ἄγκυῃ suffoco, strangulo; Cynanche, quod canibus, Synanche, quod suis familiariest sint morbi.

Definitio; haec descriptio est admodum generalis, quia non omnis fauciū inflammatio est angina, ut in variis morbis, febri ungarica. E. non est reciproca definitio.

Faucium inflammatio ab Hippocrate distinguitur ab angina 6. Epidem. lect. 7. t. i. quibusdam vero fauciū inflammatiōes aderant, aliis angina.

Hec jam potest substitui definitio, quod sit cum febre continua, dolore, ardore deglutiendi difficultate & suffocationis metu.

Differentia delimitur à musculis affectis, qui variis sunt, vel œsophagi, laryngis, vel arteriæ arteriæ. Oesophagi externi inflammati efficiunt Parafynanche; Interni vero synanche; haec species familiaris est suis, que ut plurimum moriuntur. Arteriæ arteriæ inter-

næ sive laryngis musculi afficti generant Cynanche, quæ species familiaris est canibus. Externi vero seu asperæ arteriæ capitii musculi inflammati Paracynanche constituunt.

Pances i. e. Pars ex gula & gutture constituta.

Partes affecte sunt variae communes nempe quæ palatum constituunt. Respiration & deglutitio præprimita laeduntur ab ipso morbo, etiam alia symptomata accidunt.

Nota; partes haec omnes non semper omnes laeduntur, sed pro diversitate symptomatum.

Si Hippocratem consulamus, is tres tantum admittit differentias delumptas à morbi gravitate & vehementia; Prima est paracynanche, quando tantus adeat in fauibus & collo tumor, ut proprii Laryngis musculi constringantur cum orthopnea, otis rictu, linguis exertione, oculorum prominentia, facie rubore, aphonia & potus in nates regurgitatione,

Pp 2

Altera

Altera est in qua rubor & inflammatio
se magis foris & extrinsecè extendunt,
vocatur paracynanche.

Tertia, in qua solum rubor & tumor
in colli & nervis musculis conspicitur
extrinsecè cum minoribus symptomati-
bus.

Est vel vera vel notha : & hac vel ra-
tione cause vel ratione effectus, ut pluti-
num angina sit per viam fluxionis, ra-
tissime per viam congestionis,

Est vel maligna vel benigna ; In illa o-
mnia symptomata sunt graviora & con-
tagiosa, in hac vero non ita.

Hec notata adhuc est differentia & ab
Autore omissa.

Causa, medietas est aëris frigidus, iactus;
potus frigidus.

Ebrietas est quævis repletio ; sanguis
bilioſus, vel lymphæ actiori imprægnat-
tus per arteriæ jugularis ramos influit.

Pituitosus humor illegitimam & no-
rithum potius excitat & sapissime, quod no-
randum, sit à mensum seu hamorrhoidi-
um suppressione.

Quibus ex angina in pulmonem fit
malici conversio, inter septem dies mori-
untur, si vero hos effugerint, suppurati
sunt. l. 5. aph. x.

Angina correpto tumorem in collo
stieri bonum, morbus enim fortas verti-
tut l. 7. aph. 49.

Angina deserto, tumor & rubor in
pectore superveniens bonum, morbus ex-
iit fortas vertitur l. 6. aph. 37.

Si febre detento collum repente per-
vertatur, ut vix deglutire queat, nullo
in fauibus existente tumore, mortifer-
um : l. 8. aph. 35.

Indicationes desumuntur à morbo,
cans morbis & viribus.

In principio qui commendatur etiam
ipsius lingue, hinc gargarizatio valida
etiam non approbatur.

Humor vel influxit, qui resolvendus,
vel concoquendus si aliter fieri nequit &
suppurandus & mūrandus, vel adhuc
influxit, qui repellendus, revellendus &
derivantus, vites vero roborandæ.]

Periculosisima quæ nulla in fauibus
præbet ligna, [tumorem seu inflamma-
tionem,] præter dolorē & orthopœ-
am.

Quæ sit ob laxationem vertebræ etiam
pro incurabili habetur.

Inter revellentia primum obtinet locum V. S. quæ parcus in hyeme quam
estate administranda, & quidem partis
vicibus. Si à mensum vel hamorrhoidi-
um suppressione seceratur vena in pede,
post sub lingua aperiatur vena, non vero
in principio, ne tota corporis plethora il-
lic trahatur.

Post lenitivum exhibeatur, præser-
tim si sit à pituita, ex manu, el. 3ij. Crem-
tart. 3j. In juseculo seu aq. aliqua destil-
lata.

Repellentia externe collo nunquam
applicanda, sed solum in gargaritis lo-
cum habent; Atque decocta varia, plan-
tag. tormentil. fol. quercus, rosar. rubr.
succ. granat. myrtill. mel rosar. quod
valde stirgerit.

Si dolor urget, lac chalybeatum de-
tur pro gargarizatione.

Post digerentia addantur decoctis;
aprimon. betonic. hyssop. & tandem sup-
purantia.

Quod si tumor non rumpatur frus-
tum panis vel carnis per vim deglutiatur,
vel quævis centaur. min. cum albo greco
affu-

assumatur. Landatur etiam ad rumpendum abscessum sanguinem diaphoreret.

Abscessus rupto aeger commode locandus, ut puer effluere queat.

Laryngotomia non minus rara quam periculosa, modum operandi tamen docet *Holdanus*.

Dizæa debet esse tenuissima, quia juxta Hypocratem in morbis acutis tenui vivitu utendum.

Semper convenit V. S. si non evacuativa, tamen ventilativa.

An sanguis ad animi deliquium sic mitendus, ut voluit Galenus in febribus ardentibus, magnis inflammationibus & vehementibus doloribus? *R.* Neg. Obstat difficultas respiratio & suffocationis metus, deinde spiritus vitales hic satis sunt necessarii ad respirationem.

Etiam imminentis signa sunt consideranda.

V. S. est optimum, praesentaneum & compendiosum remedium, præmit tamen debet Enema.

In quo latere sit secunda V? *R.* in opposito primo, post etiam in affecto; Si vero nullum discrimen appareat unum latus praælio dolere, mittatur sanguis e dextro brachio. Vena mediana vel balistica.

Quid faciendum si menses sunt superpressi vel hemorrhoides; vel si fluant, quæ vena secunda? *R.* Considerandum an metus adhuc suffocationis, si adhuc, præmittatur Sectio V. brachii, secus vero pedis.

De purgantibus notandum; si febris precedat, vel simul cum angina invadat, purgantia possunt dari, quia humores sunt quasi turgescentes; debent tamen

febrim non augere, nec humores valde agitate, *Cassia, manna, tamarindi syrup.* ros. solut. viol. de cichor. c. rheo &c. *Ele-* *Eleuar, diacatholic.*

Repellentia interne dantur in forma gargarismi, non debent esse actri, nec deleteriam habere qualitatem, ne accidat nobis id, quod Medico contigisse Galenus meminit, qui atramentum satorium pro' gargarismo prescripsit. Parantur potissimum, quod Galenus interdum innuit, ex moro ex corticibus viridibus juglandum, acidâ cerevisiâ & melle.

Gargarismi non tuò in principio præscribuntur, quia propter illum motum major fit agitatio humorum ut magis influant, potest tamen quis eo uti ut taliter detineat in ore, in statu vero commode adhiberi poterit. Quies hic est summe necessaria præpræsum. in principio ubi turgent humores, quo magis enim corpus movetur eò major fit agitatio sanguinis.

Somnus non adeo turus, quia refluxus augetur & inflammatio major fieri potest in somno, in o. n. inflammationibus somnus non conductus.

Purgantia sine ratione omittuntur. *Zæ-* *cute, Lufstan.* quæ tamen præscribi debent non insolida forma ut pilulari Eleuar, boli &c. sive potius in forma liquida.

Ei cum vomitus si periculosis, purgans debet esse saucibus gratum v. gr. ex manna, *R.* manna, eleat. *Zij, Crem, tart.* *ZB.* solve in calore tepido balnea Mariæ c. i q. acidularum Willungenium sete Dendistemensium, addito parum succi citri, post clarificetur cum albumine ovi & filtretur per chartam empoeticam, cui odor & gustus suavis concilietur recen-

Pg 3 tibus

tibus corticibus citri , si sit potio clara & g. a. r. est n. o. b. l. e & gratum purgans , unde dicitur Cæsareum seu Imperiale , quia Imperator solet uti hoc purgante ad 3j. vel 3. B. si desint acidula potest sumi aq. flor acatar. & addi Spir. vitriol. ad gratiam.

In angina maligna summo cum successu exhiberi possunt medicamenta emetica.

Sudorifera, si adsit malignitas, summe necessaria sunt, talia debent esse quæ vim habent simul refrigerandi sanguinem quando transversulum, quale est nitrum prolatum dol. ad 3j.

De purgantibus notandum quod debent esse talia quæ non agunt &c. Vid. supra.

Medicamenta contra Anginam.

Rad. potest addi radix tormentill. plant. fl. ligustris celebres sunt propter vim adstringendi: syr. pap. errat. rob. dianuc. quod habet vim alexipharm. & adstringendi etiam summam penetrandi.

Repellentia nunquam externè collo applicanda, sed in forma fakem gargarismatum.

In gargarism. possunt addi vel substitui plantago. flor. tormentill. mel rosatum quod non solum repellit sed & valde abstergit.

Adstringentia sola non debent præscribi, sed semper digerentia & suppurantia debent admisceri, quia si solis adstringentibus uteremur, tum major fieret inflamatio, quia porti constringentur siveque sanguis detineretur & non posset evacuari.

Formule in gargarism.

Loco liquoris in quo species coquan-

tur, potest substitui cerevisia acida in qua species possunt coqui, si dolor urgeat, lac chalybeatum.

Inter dilicutientia commendatur decoctum agrimon. beton. hyssopi.

Ali negligunt decoctiones & solvunt nitrum in aq. fontana, vel confundunt cancroso in aq. fontana, & addunt parum acetii illoque utuntur pro gargarismate.

Medicamenta extensa emollientia & resolventia adhibentur vel in forma Cataplasmati, vel linimenti imponuntur, possunt illis que Auth. habet alie herba addi malva bis malv. flor. chamom. sambuc. melilot. quæ ad mucilaginem coquuntur. Ol. lumbricor. terrestr. præferuntur, ol. sept. florum Mysichtis, ol. lapon. Vener. inter Emplastrum commedatur Emplastrum de meliloti, diaphoret. Mysicht.

Observ. 1. Causa mortis fuit angina maligna, hinc noctu V. S. deinde magnum commissit ertorem, quia assunxit medicamentum catharticum.

2. Quæ abscessus rumpunt sunt Mercurius diaphoret. pulv. centaur. min. cum albograco & melle assumptus, nidus hirundinum. Excreta animalium conducunt in ipso affectu propter vim resolventi propter talia nitrola, quibus imprægnata sunt ut album græcum, nidus hirundinum.

Formule.

Progargarism. &c. Semper vivi maj. ex prime luccum, hujus luci, &c. It. i. Salis armon. 3vj destillentur legearris. S. Sonderl. Wasser gegè di Breun si placet potest addi succus canceror expressus; optimè etiam resolvit cassia extracta, si cum aq. plantaginis solvatur & sepius gargarisetur.

Con-

Convenit etiam hoc : R. nid. birund.
zib. Empl. de melilot. zj. medull. cassia
zib. c. l. q. sap. f. catapla(ma S. Umbeschlag
Umbden Hals.

Sine coctione : R. Aq. prunell. semper
viv. corticum nucum aa. zj. Rob. dianuc.
zib. lap prunell. zib. S. Gurgel-Wasser.
R. Flor ligust. balaustr. rosar. rubr. tor-
ment. aa p. j. lucila crassè dentur ad char-
tam , S. Species mit saurem Bier zu
kochen.

Enema potest esse tale in angina quod
debet præmitti V. S. & herb. violaria,
mal/v. aa. m. j. chamomill. centaur. min.
aa p. j. rad liquirit. alth. aa zj. Sem lin.
zib. prunor. dulc. num. iv. Coq. in aq.

font. Colitur. R. ff. adde Electuar. dia-
catholicon zj. o o viol. amygd. aa. zj.
vitell. ovi. salis gemma zib. m. f. Enema.
Conveniant etiam clysteres nutritientes ex
julculo capon. carn. gallin. Et quia febris
urget , convenit aq. cordialis frigida
Saxon.

Destillatum externè applicandum , Re-
cipe herb. sanicul. alchymill. pyrola utri-
usque, matris sylvestris, veronic. hederæ
arbor. fragaria, consolid. Sarracen. aa.
milt. rad. vincetox. m. & albigracimij.
infundantur in cetevia velulta & acida
per aliquot dies , post destillentur S. ut
ante ; manè & vespere potest gargarilari
zger.

C A P U T II.

De Scrophulis.

Definitio) Sunctumores penduli pro-
pia membranā inclusi & doloris
expedites, subibus sunt communes.

Continent in se humorem pulii vel
melli similem.

Hippocrates putat fieri strumas ab an-
no 14 ad 42. ab ea vero atate ad annum
65. fieri negat: nullam tamen video ra-
tionem.

Molesta magis sunt quam viri humo-
re infidiosa , excitant rancidinem , di-
ffusoram & formam minus decoram.

Canse est humor crassus & latus, quen-
titutam vocant.

Non videtur verisimile quod si humor
excrementium quia sine corruptione tam-
diu subsistere non posset , tandem tamen
hic humor putredine & corruptioni sit ob-
noxius.

Sed est succus glandularum nutritius,
qui nimia in copia adductas vel à causa
aliqua violenta expressus è glandulis hu-
mores tales excitat. Hinc peculiari etiam
aliqua membra concluduntur : (Sener-
tus & ali faciliatem formaticem hic ac-
culant:) verum hoc esse probat Cal. 23.l.
6. ap. T. mæ. à Guldenflee.

Inter causas locum habent æquæ ni-
vales & cruda , in Carinthia, Styria &
Alpibus, struma sunt endemias, & qui tan-
in illa loca pervenient bidemq; aliquam-
diu degunt, eodem modo corripuntur.

Ocum etiam trahit hic humor è cibis
crudis & crassis, hinc ærat pueril. familia-
res sunt scrophulæ.

Signis diagnosticis non indigemus.

Prognosis) Institutur talis, omnes dif-
ficulter curantur, facilis tamen in pueris
quam in adultis.

A. valis

A vasis liberæ faciliter curantur, quâm
quaæ vasis implicatae sunt ob metum ha-
morrhagia si extindantur, vel ob metum
graviorum symptomatum si caustica vio-
lenta apponantur & virulenta, cum virtus
eorum toti Massæ sanguineæ communi-
cari facilime possit, in colli parte anterio-
re sine periculo maximo excindi neque-
unt propter nervos eo loci latentes, qui
laesi aphoniam inducunt, quod Medico
enidam, referente Galeno accidit, qui à
strumis quidem per excisionem liberavit
puerum, sed mutum reddidit.

*Nisi radicitui evallantur facile rege-
nerantur; Radix scrophulariae, urtica
mortua, rufi civalent.*

Danda opera an insensibiliter discuti-
possit materia per topica emollientia &
resolventia, vel an ad suppurationem do-
duci possit. Suppuratione factâ observan-
dum apertione non esse faciendam, nisi
totus humor suppuratus fuerit, ne ca-
lore exspirato, reliquus magis indu-
rescat.

Quod si nec hoc modo curati possint,
restant lectio & per caustica potentialia
assumptio. Illa periculi & timoris ple-
na ut ante diuum. Hæc judicium & pru-
dentiam exactam requirit, nesci, partes
vicinae ledantur: hinc munienda sunt
ungue refrigerante Galni, vel rofaco
alijs defensivo frigido.

Modum sectionis habent Sennert. In-
stit. l. 5. part. 1. sect. 2. c. XIII. Inter cau-
stica primas obtinet arsenicum, quod ul-
tradi midii grani tritici quantitatem non
adhibendum, & æger interea, ut febrici-
tans & febri maligna decumbens tractan-
dus.

Laudatur lapis causticus à Sennert. in

Instit. l. 5. & ult. descriptus. Item causti-
cum apposuit Timaeus in propriâ filiâ fru-
stra tentatis aliis, &c. calc. viv. 3. b. min.
3. b. sapon. fullon. q. s. coq. ad duritium
Japidis, vide in casibus ejus.

(Purgantibus addatur semper Mercurius
dulcis pilul. de galbano composite
Sylv. etiam convenient.)

Potenter etiam dicitur hoc Empla-
strum. u. Galban. acet. foliat. 3. pica na-
val. 3. sal armon. 3. pulv rad. scro-
phular. 3. Emplastr. Diachyl. c. gum-
mat. 3. b.

Excusione curatam strumam in brachio
& axilla dextra vid. cas. med. Timae. l. 6.
v. 23.

Sin pendeant strumæ ab exili radice, li-
gari potest radix fetu equino aut filo se-
rico.

Reges Gallia curant per donum inper-
naturali, quod per successionem ad omnes Reges, nullo habito familiæ tespeta
au pervenit, primus fuit Ethnicus &
Idolorum cultor, conversus vero ab uxore
& baptizatus donum habuit sanandi per
factum scrophulas. Hinc tali utuntur for-
mula:

*REX TE TANGIT, DEUS TE SA-
NET.* Integrum tractatum hac de re
scripsit Andreas Laurentius, Medicus
Gallus.

Riverius] Curatas strumas habet in
observationibus suis cum communicatis, ob-
serv. 18. observ. 9. ubi miram humoris
strumas excitantis a credinem, ut ossa et
iam exedere & colligare posuerit, re-
censet.

Sequuntur Externa, spir. gummi am-
moniac. sopicus D. Geilfus. o. o. circula-
tione

tum D. Fausti Archiatti olim Heidelbergensis.

Zacurus Lusitanus commendat e sum serpentum, laudat etiam extetnē pinguedinem serpentum.

Medicamenta ut plurimum exhibenda Lunae crescente. His tentanda est ipsa discessio, si non juvant, tentanda suppuratione, non tamen aperiendus tumor, nisi prius bene sit cocta omnis materia in illo.

Si haec non respondent Voto Medici, ad extrema configuriendum, quod si per cauteria & novaculae; intertem tamen est curatio periculosa, quia vasa facile possunt laedi E. defensivum prius debet adhiberi, ut unguentum Galeni.

Inter caustica primas obtinet arsenicum, sed non sine periculo adhibetur propter saevissima symptomata: ultra dimidium grani triticei pondus non est imponendum; quia vero est periculosum, alia adjungenda. Videatur Senert. de lapide caustico lib. 5. Institut.

Causticum tale prodet, sc. calcis viae zib. minii zib. Sapon. fullonum q. s. coque ad duritatem lapidis, qui per 3. horas consumbit scroptulas filii illius à Guldeneckle / estque tutius quam arsenicum. ad pag. 62. ibi item pumex potest addi, Emplastr. diaulpiur. Rulandi, de ammoniaco composito Fausti, Tale etiam habet Guldenecke. sc. Galbani aceto soluti zib. picis navalis zib. salis armoniae. zib. pulver. rad. scrophular. zib. Emplastr. diachol. cum gummis zib. m. f. Emplastr. S. Plaster gegen Kröpfe.

Sequens Emplastrum. sc. Rad. bryos. egclam. Enula, cusumeria agrestis aa. zib.

Coque cum vino & acetato anatica potionem, deinde pistentur & per setaceum transcolentur, add. pulver. rad. irid. myrrh. oliban. mastich. croci. aristoloch. rot. aa. zib. flor. chamom. melilot. sambuc. aa. p. j. opopan. sagopen. armoniac. bdellii. galbani in ag. vite solutor. aa. zib. gummi hedera. styrax. calamite aa. zib. euphorb. zv. sem. Staphisagi zib. argenti vivi saliva jejuni hominis extingui zib. o° litor. ovor. cissipi aa. zv. adipis anserini. anatini. suilli. medulla cruris vituli aa. zib. mucilaginis seminislini. fennugraco. rad. alth. aa. zib. m. cum cera & terebinthina f. emplastrum.

Observ. Glandulae emollienda] Scrophulae tales habent naturam ut emollientes queant. Medicus tamen tenti suas vires oportet. Medicam. sunt scrop. radix scrophular. principatum obtinet, & omnibus debet addi medicamentis; hoc pertinet pulv. ad Strumas Augusti de Villa nova.

Pag. 64. in notis Deck. lit. L unguentum est tale Poterii. sc. fol. nicotian. recent. m. vj. butyri insulsi zib. therebinthina veneta zv. misceatur simul & insolenur per octiduum, colentur & tortulari fortiter exprimantur; Expressioni adde Cer. & citrina. gummi armoniac. Galban. aa. zib. pulver. antimonii crudis subtilissime triti, cinnabar. aa. zib. myrrha. thuris aa. zib. m. f. unguentum quod à Poterio laudatur pag. 64. l. c.

Observat.] Et plerumque in mesenterio sunt scrophula tales, ideo contabescunt agri, quia denegant influxum succœ latet.

Qq

C A P.

CAP. III.

De Anevrismate.

In infantibus facile pro vena inciditur arteria, qualem observationem habet Riverius cent. iij. observ. 43. quem tumorem curavit adstringentibus ex bolo, terra sigillata, aceto & albumen ovi, falcia acutissimè superinducta.

In observ. communicatis. 12. refert, ingen em in molem extrevisse tumorem post arteria incisionem ex appositione medicamentorum resolutum, & tandem sponte apertum eo in loco, ubi incisio facta fuerat. Cent. 4. observ. 34. refert de melancholico, cui tumor mollis sub clavicula dextra eminuit cum insigni pullatione qui insanabilis fuit, post mortem arteriam magnam ascendentem à corde ad claviculam adeò dilatatam, ut brachii ferè magnitudinem æquaret.

Tunica ejus erat admodum densa & cartilaginea.

Curatio.

Convenit Cataplasma, sc. Thur. mastich. aa. 3ij. Balaust. myrtill. acacia, hyposist. matricar. gallar. immatur. aa. 3ij. flor. rosar. rubr. 3ij. c. album. ovif. cataplasma proctinus & in principio statim tumori applicandum, post apponere laminationem plumbeam & superimpone Emplastrum contra rupturam Augustanorum, vel tale sc. Rad. bistort. consolid. maj. cynogloss. sigill. Salomon. aa. 3j. flor. rosar. rubr. ligust. chamomel. melilot. balaust. fol. heder. arboresc. sem. p. foliat. aa. 3ij.

summit. cupress. bacc. myrti, malicoris. aa. 3ß. mumia, sanguin. dracon. sarcocoll. mastich. myrrh. thuris aa. 3j. Croc. martis 3ß. f. pulvis subtilissimus ter acetato rosar. irrotandus & rursus siccandus est, terendus, & per cibarium trajiciendus c. ol. mastich. cera & terebinth. f. Emplastrum. Totum verò brachium ligetur falcia madefacta tali Epithemate.

sc. Aq. burs. pastor. plantag. Sperm. ran. 1ß. alum. crud croci Martis aa. 3j. litharg. 3ij. album. ovor. no. ij. m. Hæc tutissima methodus est curandi aneurismata & tales humores.

Hortius laudat Magisterium opii, si statim in principio applicatur, quia sanguinem ad mitaculum usque sistit; idem præstat compositum sperniolæ, cuius descriptionem vide apud Schröderum, vel sperniola Crolli, quia refrigerat potenter.

Puerpera sapientis inopinato moriuntur, quatenus ob nimium parturiendi conatum aneurisma internum rumpitur, & sanguis in cavitatem nobiliorem effunditur, cujus causam sapè non cognoscunt adstantes & Medici, quia aneurismata interna non cognoscuntur, nisi post mortem aperto cadavere.

Observ. 1. habet etiam Riverius observat 18. in observationibus communicatis etiam talem habet casum,

LIBER