



De Tumoribus.

MOrbi conformatio[n]is sunt, quæ conjunctos s[ecundu]m s[ecundu]m habent morbos intemperici.

Causa,

Tumorum est humor aliquis, qui colligitur, vel per lentam congestionem, vel per impetum: per lentam congestio[n]em, quando sanguis laborat intemperie etassa humor[em]que crassum alicubi deponit, qui ob crassitatem non potest progressi, facit huc pororum perversio. Cum impetu fit tumor à causis externis, nempe à lapto, dolore, &c.

Signa diagnostica.

In sensus incurvunt, in principio enim pars incipit intumescere, in augmento dolor angerit, in statu ad extremum pervenit, in decrescentia paulatim imminuntur symptomata.

Prognosis.

Si tumor sit ex pituita, & melancolia, est chronicus, si vero exibile & acido, plus alit periculi.

Habenda in prognosi est ratio partis affectar[um], si etiam tumor circa partes non aded carnosas, vel aliquam partem nobilior[um] extiterit, plus alit periculi, quam si in ignobiliori,

Humores vel dissipantur, si symptomata & tumor decrebat, suppurationem praesens dolor, induratio oritur ex praeposterio usu repellentia.

Curatio

Consistit 1) in fluxus inhibitione, 2) in congregatorum ablatione, cum materiali intercipiunt: intercipientia non sunt ponenda in ipsa parte affecta sed in superiori parte, hinc ex albumine ovi, bolo armena, terr. sigillata, imponuntur cataplasmata parti vicinae.

Repellentia ipsi parti affectae imponuntur, iisque in principio debet uti, sed non debet fieri à parte ignobilior[um] ad nobilior[um], hinc usus eorum fecerit exspiravit. Incommoda, quæ repulsionem sequuntur, sunt: obstructio magis augetur, sunt enim frigida, styptica, incrassantia, unde major inflammatio, & Gangrena sequi solet, modus operandi est hic, v. gr. aqua frigida, refrigerando, h. e. quietem induendo, humores incrassando, obstruendoque poros, hinc omnia repellentia naturæ sunt frigidæ, terrestria, crassa, &c.

Ad partem oppositam ignobilior[um] deber fieri revulsio, idque vel secundum longitudinem, vel laitudinem, v. gr. in ophthalmis V.S. & fonticulus in brachio adhibetur, quod est revulsorium.

Derivatio fit in parte vicina, ubi vesicatum excitatur.

Ipsa pars roboranda.

Ablatio fit resolventibus, sed haec in inflammatione non rito adhibentur, quia humor per talia incrassatur, sive difficitibus curatur, hoc videmus in Erysipelite, quod, nisi cautè tractetur, facile abit

abit in Gangrenam, nempe si adhibeantur frigida, si autem calida adhibeantur, atque resolventia, facile curatur, quod videmus, si adhibeatur Spiritus vini.

Resolventia constant ex partibus subtillioribus, rigidioribus, camphoratis, Spiritu vini.

Suppurantia impedit partium subtilliorum exitum, humoremque magis exigit, ut mutetur in pus.

De Tumoribus in specie. Inflammatio.

Quæ est tumor præternaturalis, cum dolore & rubore.

Ad eam non solum requiritur extravasatio, sed etiam restagnatio, cum sanguis ingreditur vasa minutiora, atque sic ob angustiam non potest progredi, sive restagnat, & inflammatio causatur.

Signa diagnostica sunt, rubor, dolor, calor, pulsatio, splendor.

Prognosis.

In parte nobiliori inflammatio est periculosa, in ignobiliori facilè curatur.

Curatio.

Diæta, sexque rerum non naturaliam bona est habenda ratio, vinum nocet, cibis sint calidi, aromatici &c. potest esse certevisa tenuis.

Humoris affluxus revellitur V.S. in parte opposita instituta, derivatio fit ad partem vicinam; Author plura habet repellentia.

N.B. Repellentia semper miscenda sunt resolventibus, Author præponit duo cataplasma, notatu digna.

Suppurantia non statim in principio sunt adhibenda, sed attendendum, an

humor possit discuti, si autem dolor augeatur, Authoris cataplasma possunt adhiberi.

Symptomatum.

Habenda ratio, quorum urgentissimum est febris, quæ hic est symptomatica, curari debet non purgantibus, quia hæc eum pestis hic sunt fugienda, danda potius blandiora diaphoretica, non tamè clysteria sunt omittenda, quæ apprimè convenient in quavis inflammatione, in parte ignobiliori inflammata, mitissima quidem adhiberi possunt purgantia, sed in parte nobiliori, planè exulari debent.

Secundum symptoma urgens est dolor, contra quem Author egregium præponit cataplasma.

De Erysipelite.

Quod est tumor, ortus ex bile, vel Sulphure, in sanguine contento.

Symptomata.

Sunt dolor, calor, inflammatio, febris.

Causa.

Est effervescentia particularum Sulphurearum, propter bilem abundantem, sed ut plurimum oritur à causa externa, nempe ob frigus, sic puerperæ patientur Erysipelas, quando mammæ frigoti diutius fuere expositæ.

Signa diagnostica.

Sunt: æstus, dolor, febris, quæ invadit cum horrore, insequitur calor, sentitur dolor, paulò post rubedo & tumor.

Prognosis.

Erysipelas non est periculosum, nisi ab exteriori ad interiorem partem

Ddd 2 repella-

repellatur: Si est in parte tendinosa, plus alii periculi, quam si est in parte carnoa.

Curatio.

Dæta probè est obseruanda, ubi etiam ratio est h. benda sex rerum non naturalium, aer frigidior per inspiracionem potest admitti, sed non debet admitti externè ad partem affectam.

Purgantia sunt omittenda, V. S. ratione febris potest administrari, quā præmissa, sudorifera sunt adhibenda, ex ag. flor. sambuci. Rob. sambuci. Externè oleosa & pinguia, ut & repellentia sunt vitanda.

Author commendat quedam, possunt etiam ea, quæ in infl. immatione adhiberi, sed tamen omissis oleis.

Pro cura prophylactica fl. sambuci. coquantur cum lacte, lac que horis matutinis assumentur.

Stercus ovini convenit pppter. Creta vulgaris pulverulata prodest, quia absorbet, ut & farina liquiritiae.

Mynstichtus habet pulverem, qui applicari potest cum charta emperetica, cœrulea: Alii præparant chartam cum cera, & ol. Rosatum, si hæc non satisfaciant, adhibendum cataplisma ex foliis Tussilaginis supra descriptum, sub titulo, Inflammationes vulnerum.

De Oedemata.

Oedema est tumor pituitosus, qui si ciliè oritur in hydrope, & cachecticis, differt gradu saltem & quoad fluiditatem à tumorē aquoso, facile oritur in pede.

Signa.

Sunt, color albus, si tangatur cedit digno, & fovea relinquitur,

Causa.

Est humorum circulantium crassities, & restagnatio lymphæ.

Discutientibus, humorique motum reconciliantibus; V. S. hic non indicatur, quia non ad eum plerora, vel n. mis motus. V. S. hic potius noxam, nempe humoris obstructionem potest inferre.

Conveniunt purgantia, ex Lalappa, agarico, Sem. catham. fol. Senn. Extr. panchym, ext. diacarthami & sudorifera. Respiciendum in purgantibus ad morbum præsentem, qui, si non fert purgantia, v. gr. Phthisis, debent omitti.

Quæ in forma l. quida exhibentur, fortius juvant: v. gr. lixivium è cineribus garment. vicis, lepins calidè imponit ut calc. vivæ, luffi miguum ex aceto, super laterem calescentem.

N.B. Prolunt quoque sudorifera, ex gr. decoctum lignorum, quod videti potest apud Sculterum, pag. 43.

Extr. diacarth. 3j. v. Div.

Solv. in vino, adde.

Tart. Vitriolati. gr. xij.

Syr. rosar. solut. 3ij.

ag. mirab. 3j.

Mic. pro una dosi.

Si fortius desideretur.

Gumm. gatt. corrat. gr. viij. v. xij.

Solv. in

ag. cinamom. adde

Inlepp. rosar. p. m.

S. Purgier. Franc. a. i. m.

De Scirrho.

Sciribus est tumor admodum durus, oritur expositura, acida, austera. ejusmodi tumores facile oruntur sub axillis, circa collum, in mammis, circa hypochondriū sinistrum.

In-

Internè.

Conveniunt, quæ habent vim volatilē, & viperar. volat. Tinct. ♂ nii, &c. * aromaticus.

Externè.

Quæ vim habent dissipandi, emolliendi, v.g. Empl. dia sulphuris Rulandi, quod malaxati potest cum o° tattari, si tumores hi imprudenter tractentur, degenerant in Gangrenam, hinc semper vindendum, utrum possint emolliri.

Sunt, qui externis admiscent sal. volat. lini.

De Tumore aquoso.

Tumor aquosus convenit cum Oedemate,

Internè.

Conveniunt purgantia, quæ habet Author.

Externè.

Cataplasma Authoris; sterlus columbinum convenit propriæ ♂trum, proflunt epithemata ex ♂tro, & le *co, & spirit. vin. ut & Willisi empl. dia saponis.

De Hydrocephalo.

Hydrocephalus est tumor aquosus capitis, curatu difficultis, si aliquoties catarratica fuerint adhibita, convenit & ♂lis *ci; Tinct. ♂ nii; Timaus à Guldenklee curavit cataplasmare al. quo ex farinis: Potest quoque applicari fomentum in forma sicca, ex cineribus: sem. mali, sem carvi, & sale communi, quæ intra linteum duplicatum imponuntur.

De Tumore flatulento.

Tumores flatulenti facile oriuntur in hypogastrio, conveniunt hic omnia quæ adhiberi solent in colica, ex flatibus, Empl. carminat. Sylvi. Ung. carmi-

nativ. Mysicht. o° carminativum e-
judem.

De Atheromate, Steatomate, & Meliceride.

Tumores hi propria includuntur capsula: Atheroma & Meliceris oriuntur in omnibus partibus: Steatoma in glandulis, post febrem quartanam: manibus possunt tractari.

Omnis difficile curatur, internè con-
veniunt discutentia, quæ promovent
sanguinis circulationis item & redditum,
pro diversitate partium, diversa tumoti-
bus his imponuntur nomina; Externè
conveniunt & scutentia, sed si haec non
sufficiant, configendum est cautelum
potentiale: Sed observandum hic, quod
hoc in parte nervosa non habeat locum;
vel excindantur, hic autem observan-
dum, ne largior hemorrhagia excitetur,
primò incisio debet fieri usque ad pellicu-
lam, ne materia excitetur, secundum
longitudinem pellicula debet liberari à
cute & carne, & postmodum extrahiri,
quod potest videri apud Scultetum, &
Tim. à Guldenklee.

De Herpete.

Herpetes sunt tubercula parva, &
quoniam flavescent, accusatur bilis;
Internè conveniunt sanguinem purgan-
tia, sudorifera, ♂ niata, acidulæ. Ex-
ternè, saliva hominis jejuni, addito succo
cittri, vel tubigine ferti; pulvis creta, cum
lacte dulci, & addi potest Nitrum.

Curantur etiam externè lamina plum-
bea ♂ illita, & superimposita. Jacob van
Meckern suppeditat alium modum cu-
randi, nempe per fortiorum concussio-
nem, semel vel bis superimposito cerato
Vigonis.

Ddd 3

De

De Scrophulis seu strumis.

Oriuntur potissimum circa collum, ab obstrukione, & lymphâ crassa, & ut plurimum sunt à mensibus suppressis, & partu difficulti.

Externa remedia sunt duplia, vel resolventia, vel exedentia, si sunt in parte musculosa, possunt excindi, prout Gûldenflee/ in praxi annotavit: Notari possunt Ung. Authoris, ut & empl. ex ranis cum grio, sale volat. *co; ut & aliis, proficuum quoque est °° lacertarum, cuius præparationem vide apud Scultetum.

Internè, convenit electuarium ex pulv. lacertar. & melle, de quo horis matutinis per 40. dies capiat æger magnitudinem nucis moschatae; vel pulv. sequens:

*Bz. Pulv. contrastruma, Querc. 3ij.
Arcan. dupl. 3ij.*

Misc. fiat pulv. dosis quantum capit culpis cultri, bis de die luna decrescente sumatur.

N.B. Sistrum tendant ad suppurationem, notetur Ung. Authoris. Sunt, qui habent pro arcano, hoc: Si struma bis v. 3, fricentur manu hominis mortui.

De Bubone.

Hoc symptoma urgentissimus est dolor: Externè convenienti °° vulgaria scorpionum: bubo benignus est resolvendus, malignus veò suppurandus ut & Venereus, internè convenient decoctum lignorum.

De Carbunculis.

In his, signa sunt: Dolor exquisitissimus, rubedo in locis vicinis, postmo-

dum supervenit nigredo, in locis excavatis, ut carpo manus, regione cordis pars talis trahetur, ut pars ambusta, sc. eschara est promovenda, ut decidat: euadem in finem facit empl. Authoris, crustâ separata, convenit Ung. fulcum F. Wüzi, cui semper addenda est thesiaca: V. S. nocet in carbunculo cum peste, sed sine peste convenit: ut & sudorifera, v. gr. Diaſcord. bezoard. orient. & occident. Tr. bezoard. frigida, ut sunt succus citri &c. in peste admovevi debet ferrum Δatum & antraci, & buboni, nihil enim infensius veneno pestilentiali, quam ignis.

De Cancro.

Cancer est tumor præternaturalis, durus, cum distensione valorum, sanguiferorum: estque vel exulceratus, vel non exulceratus: mammæ facile eo corripiuntur, propter consealum iater uterum & mammae, hæ, cum magis æri expununtur in lactatione, item, propter congeriem glandulatum.

Cancer occultus mitius est tangendus manifesto, manifestus, sive exulceratus non est attingendus, malum hocce curatu est difficultissimum, ulceratus enim in virginibus annosis nunquam, in Juvenculis vero admittit curationem. Tim. à Gûldenflee/ omnia habet remedia contra cancrum, epithema ex farina milii in cancro occulto optimum est remedium, sed cum tumor increvit, contagiendum ad operationem manualem, nempe cancer est excindendus, sed & hæc operatio est periculosa: calidiora, & exagitantia vitentur, ne acre illud volatile exagitur, caro bubula in cancro occulto immitti solet, quia eâ saturatur acidum vola-

volatile, hinc hæna valde prosumt, ut
empl. hænum; Author commendat
quintam essentiam Arsenici, sed quis eum
imitetur. Internè primò convenient
melanaga, postea Tr. & nii. Tul-
pius in cancro ulcerato uitut sequenti
pulvere:

R. Plumb. liquef. q. v.

add. ♀ viv. & ♀ vit. tantilli.

Sic omnia redigere potes in pulv. fria-
bilem.

**S. Besonderes Krebs-Pulver in die
Wunden justreuen.**

De Gangræna.

Si Gangræna sit à frigore, pars affesta
fricetur nive, & aq. frigida, postmodum
foveatur ∇ , in qua theriaca, vel mithri-
datum est solutum, vel imponatur fo-
mentum Authoris.

Si ex lufocatione caloris naturalis, ab
obstructione, convenit ∇ Iphagædenica,
supra descripta, si ex scorbuto, inter-
nè convenient omnia aromaticæ, ex-
ternè ea remedia, quæ Author habet,
spir. antiscorbuticum, quo pars externè
foveatur. Sequens admodum est effi-
cax.

(Sæpius in morbis chronicis ex longo
decubitu sit gangræna ossis coccygis,
Vide Hild. obi. 3. cent. 1.

R. Spir. nasturt. 3ij.

satis 3ij.

Misc. imponatur extermè calidè.

Pars cadaverisata separanda à lana: si
sedata Gangræna reperiatur caries ossis,
sequens adhibeatur:

R. Spir. vin. 3ij.

& vitriol ad acidit.

S. Mixtur, zu Aufwaschen.

De Paronychia.

Germanicè vocatur das böse Ding/
hic urgentissimum est symptoma dolor,
Author habet cataplisma ex lacte, dolo-
re sedato fiat incisio, deinde ad noveatur
theriaca, cum spir. vin.

De Anevrismate.

Sæpè talis tumor sit absque incisione,
tuncque est instar ovi Gallinacei cum
pulsu simili, qui est in corde.

Abstinendum hic ab apertione. &
suppuratione, quia post hemorrhagiam
cutari non potest, adstringens & repel-
lens optimum est, hinc lamina plumbea,
decoctum adstringens, & solutio vi-
trioli in tali casu optimo cum successu ap-
plicantur.

De Ophthalmia.

Hic hirudines applicari debent vasis
temporalibus, qui locus est optimus. V.
S. sub lingua convenit.

COL-