diſcraſia ⁊ ꝯſimilis certe multo magis icurabilis remanebit. ⁊ qđ vltra ſi correctionē haberet multo magis perpetuaret vita vel non hr̄et vtiq; tēpus ꝑficiendi operationes in melioꝛib⁹. ¶ Si vero in iuuenib⁹ ſit plurimū curā hēt ⁊ magis ſi pueris inſit. hn̄t eniʒ iuuenes naʒ forte reſumibilē nāliter ⁊ ſi accn̄taliter ſit defecta: ⁊ pueri mlto magis Et ꝓinde a fortitudine nāli optimi ſunt reduci ſm̄ magis ⁊ min⁹: niſi accn̄talis ſiccitas ſit ꝯfirmata: vt qꝛ tetigerit adeo mēbra ſolida ꝙ tertia humiditas poſita ſit in ꝑiculo non vltra extēdi iā totali ꝯſumpta. ⁊ ſi nō in toto: in parte vtili ⁊ maioꝛi. Et qđē remediū i cura ē ſola diſcraſie ſicce alteratio. q̄ qđē cū frati ſit iūcta complebitur cū humectātib⁹ calidis tempare. Qualia ſunt q̄ in cura ethice febꝛilis ſunt dicta minus eis aut ꝯmixtis aliq̄bus calidis odoꝛiferis ⁊ cū actuali caľitate mioꝛi approxiatis. Ex qb⁹ eſt balneū ꝑdcm̄ decoctōis in aq̄ ei⁹ floꝛib⁹ camomille melliloto ⁊ caľlus actu q̄ʒ febꝛili cōueniat. Et q̄le ē lac a quo nō ē extractū butiꝝ habens plus mellis ⁊ mel ipm̄ quod eſt vltimū in iuuamēto iſtis ſicut vltimū in nocumēto febꝛilib⁹ dictis. Et q̄les ſūt alie medicine humide ⁊ calide: vt cliſteria facta ex fenugreco: ſeie lini: capitibus ⁊ pedibus agni: oleo camomillino: ⁊ ſiſamino: ⁊ melle. Et ſyrupi ex aq̄ decoctionis ipſoꝝ. ⁊ ꝓprie ex floꝛibus camomille: ⁊ ſiſamo ⁊ çuccaro nabit: ⁊ melle. Et ciba ex calidis ⁊ hūidis vt pineis dactilis maturis: paſſulis: fiſticoꝝ: amig. dul. ligri. ⁊ alijs ſimilibus illis. Et cerotaria ex oleo ſiſamino: vel amigdalarū dulcium cū cera ru. Et fricationes foꝛtes trahentes nō reſoluentes. Et quales ſunt cibi calidi humidi potentia ēt actu: facile penetrabiles: ⁊ velocis deſcēſionis in q̄bus nō ſit viſcoſitas ſicut aqua carnis: ⁊ vitella ouoꝝ ſoꝛbiliū: epata gallinaꝝ pinguiū: ⁊ carnes noue columbe non pinguis valde cuʒ aqua roſ. ⁊ fructus predicti: ⁊ potus vini maturi ſubtilis ⁊ odoꝛiferi cōuenientis q̄ntitatis minus limphati. Et qualia ſunt alia ex non nālibus rebus ꝓpoꝛtionabilia illis. Et ſi ſiccitas cū equalitate actiuaruʒ ſit iuncta cū eis fiet eius curatio: remiſſis tamen a caliditate naturaliter vel artificialiter ſaltem mixtione.

¶ Cap. iiij. de cura ⁊ medicinis ethice ⁊ putride ꝯplicate.

Ethice febꝛilis cū putrida cōplicate. ¶ Cura eſt
e q̄tuoꝛ res. Pꝛima abſciſio cauſe. ſecūda alteratio
febꝛilis diſcraſie. tertia regimen. ⁊ q̄rta coꝛrectio accn̄tiuʒ. Abſciſio cauſe eſt putredinis euō ⁊ multa mundificatiua. Ipſa. n. putredo exiſtens febꝛilis putredinis cā imediata q̄ eſt cā ethice. aut cā eſt ethice mediata ⁊ ſiccā eſt cauſe. Et pro eo cura ab ea eſt recto oꝛdine inchoanda. nā ea euacuata ceſſabit putrida ⁊ ethica conſequēter: ⁊ ea manente q̄ntuncūq; febꝛis vtriuſq; magnitudo ⁊ incenſio poſſit remitti. ſemꝑ tn̄ ꝓcedit conſumptio ꝓpter reſeruationē putredinis ꝓlongātis febꝛem a remiſſiuis cāuʒ. Inquit. n. G. Non eſt poſſibile diſpōnem vllaʒ curare finalr̄ manente adhuc cā faciente eam. ⁊ ꝓpterea a putredine inchoanda eſt cura. Inq̄t. n. Abo. cū due egritudines iungūtur ab ea icboanda eſt cura que cā eſt alteri⁹ ſine qua alia curari nō poteſt. Qualiter aūt ⁊ q̄bus curet̄ ⁊ euacuet̄ putredo ſupius dcm̄ e. Alteratio quoq; febꝛilis diſcraſie q̄liter ⁊ q̄bus ꝯpleatur medicinis ſupius eſt dcm̄. Et tamē qꝛ diſcraſia febꝛilis eſt magna. nā ad ꝯſumptōeʒ ꝑducens q̄ſi preuendicans ſupra curā: oʒ ſimul digerendo ⁊ euacuando putredinē diſcraſiaʒ alterare: ⁊ ſi nō conueniat in auxilijs vtriq; cauſe. ſ. ⁊ febꝛi cōmune auxiliū impendat̄ ⁊ ſimplex flatica vel melica ſit putredo ꝙ nāliter talis inuenire eſt poſſibile ſm̄. G. dicentē. Itaq; in ꝯrijs diſpōnibus difficile eſt iuenire auxiliū qđ multuʒ ꝓſit: obſit aūt nihil. fiat ſcđm artē ꝯpoſitū in partib⁹: mixtū aut diſtinctū loco vel tempoꝛe ſit equale ſiue iequale eq̄litate ⁊ iequalitate ſeruata: vt ſic alteret̄ febꝛilis diſcraſia ꝙ non icrudet̄ putredo: ⁊ illud fiet ſi alterātia exterius ⁊ iteri⁹ non remiſſe calidi miniſtrent̄. Et ꝓinde lac deneget̄ q̄ntūcunq;. n. cōuenit ethice imediate: magis tn̄ nocet ei mediate. qꝛ putredinē auget q̄ cā eſt ſue cāe. Et ſilr̄ balneū dōec ſit digeſta putredo: ⁊ alijs auxilijs ꝓcuret̄: que ⁊ ſi alteri noceāt: non tamen valde que tue diſcretioni relinq̄mus cā bꝛeuitatis: ⁊ regimen ⁊ accn̄tiū coꝛrectionē cū oīa ex ꝑdcis ſint nota.

¶ Incipit ſecunda particula ſectionis ſecunde continens ſummas quatuoꝛ.

Sequitur ſecunda particula ſectionis ſecūde q̄ ē de medicis apatū q̄ plurimū febꝛis ſeq̄tur de ꝑtib⁹ cirurgie cōtinens ſūmas q̄tuoꝛ. Sūma ꝑma eſt de medicinis apoſtematū ſanguineorum continens capitula. xiij.

¶ Cap. ꝑmū eſt ꝓhemiale ⁊ eſt ſermo generalis in apatibus: cauſis: ſignis ⁊ cura omnium.
¶ Caplm̄. ij. de flegmone ⁊ eſt apoſtema ſanguineuʒ ⁊ de medicinis eius.
¶ Cap. iij. de apoſtemate glandulaꝝ ſeu flegmone capꝫ ⁊ de medicinis eius.
¶ Cap. iiij. de flegmone quod dicitur antrax ⁊ carbūculus ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. v. de flegmone qđ ſpina dicit̄ clauus vel furunculus ⁊ medicinis eius.
¶ Capi. vi. de pruna ſeu carbone ⁊ igne perſico ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. vij. de vena egrediendi ⁊ medicis eius.
¶ Cap. viij. de panaricio ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. ix. de apatibus paruis ſeu puſtulis illi⁹ generis vt ſunt moꝛbili ⁊ variole ⁊ medicinis eoꝝ.
¶ Cap. x. de exituris caľis ⁊ extriſecis qꝛ de itriſecis in ꝑma ſectōe ē dcm̄: ⁊ erit ſmo gn̄alis i terminatōib⁹ apatū.
¶ Cap. xi. de eſtiomeno ⁊ cancrenis eius.
¶ Cap. xij. de moꝛo ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. xiij. de appropꝛiatis apoſtematum ſʒ diuerſitatē membꝛoꝝ in quibus fiunt.

¶ Cap. ꝑmuʒ eſt ꝓhemiale: ⁊ eſt ſmo generalis in apatibus cauſis ſignis ⁊ cura omnium.

Poſtema ſm̄. G. eſt tumoꝛ preter naturā quo mē
a bꝛa magnitudine deficiunt ab eo quod eſt ſʒ nāʒ
Diuiditur aūt ⁊ variatur ꝑ genera ⁊ ſpēs variatione ſuaꝝ cāruʒ penes q̄s eius cura ſeu medicatio plurimū variat̄. ⁊ ꝓinde ad curā neceſſariaʒ regrende put ad glauconē docuit. G. que ſunt quatuoꝛ: mālis: foꝛmalis: efficiēs ⁊ finalis. Mālis eſt duplex. vna in qua. ⁊ eſt oē membꝛis hn̄s regimen adeo vt in oſſe ⁊ cerebꝛo etiā fieri poſſit: q̄ʒ ſerapioni videat̄ ꝯtrariū: eo ꝙ recipe nequeunt: extēſionē magnitudinis ⁊ tumoꝛis que eſſentialia ſunt apoſtemati ipſi. Ad quod rex Abo. reſpondit oſtendens ꝙ in ꝑdictis mēbꝛis poſſit fieri apoſtema ſic. oē qđ recipit nutrimētū ⁊ recipit augmentū ſupfluitatis ipſi⁹ cū in eo collecta fuerit recipere pōt: ⁊ extēſionē ⁊ ſi non magnaʒ vt expedit in apoſtemate ꝓprie: tamen aliqualē recipit: que fit ſilis apoſtemati ſenſui manifeſta: vt hoc dici poſſit ꝙ fieri poſſit apoſtema in eo ſiue ſit ꝯſimile: cuius egritudo eſt ꝑncipaliter ſiue officiale: cuius egritudo eſt ꝯnter. ⁊ tamē a natura ci⁹ mutata foꝛmā accipit. ſ. magnitudinē ⁊ tumoꝛem: eo ꝙ leſio nature ipſius ⁊ operationis ſilr̄ eius magis manifeſta eſt ſenſui q̄ʒ leſio nature ꝯſimilis: licet pꝛincipaliter ſit in ipo. Alia materialis eſt ex qua. Et eſt quatuoꝛ humoꝛes. aquoſitas ⁊ ventoſitas. penes tales cās diuidit̄ in genera ⁊ ſpecies eēntiales. In genera. naʒ apatū aliđ calidū. aliud frm. In ſpēs. nā calī qđdā ē ſanguineū: qđdā coľicū: qđdā ꝯmixtū. Et fri qđdā flicū: qđdā mlicū: qđdā aquoſū: ⁊ quoddā

ventoſum.⁊ ea q̄ gn̄tuꝫ ſunt illoꝝ:ſꝫ ipi⁹ mā plurimū mix/
ta eſt. veꝝ q꞉ morbi ſpecificati cura magis ꝓpa eſt ⁊ certa
apparetq꞉ apa ĩq̄tū morb⁹.⁊ accñs eſt ſpecificeẗ duplr vt
per ſubm in quo ⁊ eēntiā ei⁹ depēdētē a mā ei⁹ ex q̄ ſꝫ du
plicē ei⁹ gn̄atōeꝫ dcām. Et medicia ſeu cura ꝓpa ei debeẗ
ſm ꝯſideratōeꝫ qdē ꝓut ē mēbri organici a c⁹ nā curatōis
ſumiẗ ĩgeniū rōne c⁹ ita eſt morb⁹ vni mēbro ꝓpus ꝙ nō
alteri. vbi gr̄a. ſirſen:freneſis:litargia:pleureſis:ꝑipleumo
nia:⁊ ſilia. iſta ita ſunt organicis mēbris a q̄bus denoīatio
nem recipiūt ꝓpa egritudo ꝙ nō alteri. q꞉ nō epati nec ſtō
nec renib⁹ nec ſilib⁹ eis. Et ſub hac rōne eius cura cecidit
ſeu ꝑtinuit ad ſectōeꝫ ꝑmā. vt q꞉ in ea egit de cura apatuꝫ
occulorꝫ mēbroꝝ.ſ.in ꝓfundo corꝑis poſitoꝝ q̄ officialia
ſunt. ſm vō ꝯſideratiōnē ſue eēntie q̄ morb⁹ cal's eſt ⁊ fri/
gid⁹ a nā hūoris ꝓcedēs.⁊ ſic eſt ꝯſilis in ꝯſili mēbro a c⁹
nā curatōis vie ſumit ĩgeniū: q꞉ q̄ſtitatis calefaciēdi ⁊ in/
frigidādi exiccādi ⁊ hūectādi habeẗ ab ea cadit ſeu ꝑtinet
ad hāc ſectionē ſcdām:vt q꞉ agaẗ in ea de cura apatū appa
rentiū.ſ.cutis ⁊ ſubcutaneoꝝ vt carnoſoꝝ q̄ vlr toti⁹ habi
tuꝫ ꝯprehēdūt:ſꝫ ĩfraſcripta cura ĩq̄tū gn̄alis ĩtrinſec⁹ ſit
cōis. Cā efficiens duplex eſt.ſ.ĩtrinſeca ⁊ extrinſeca. Intri/
ſeca vō eſt duplex. ſm duplicē modū fiendi ipi⁹. Nam aut
ſit ſꝫ modū ĩfluxiōis ⁊ eſt plimū.⁊ tūc cā eius erit triplex:
vt ex ꝑte ĩfluentis ſeu mittētis vt corꝑis totius:vel mēbri
⁊ eſt plectoria:vel cacochimia:cū v̄tutis ipi⁹ fortitudīe nō
abſolute. ſcda eſt ex ꝑte mēbri recipiētis.⁊ eſt d̄bilitas ei⁹
nālis vel tēporal:⁊ vacuitas diſponēs ad recipiendū:⁊ do
lor fortis ⁊ calitas in attrahēdo coadiuuās:ēt ſi nō ſit eius
ſitus ĩferior: ⁊ mittētis repl'o nō exiſtat. tertia eſt viaꝝ ap/
titudo. q꞉ ipaꝝ largitas venaꝝ vel poroꝝ de mittēte ad re
cipiens ꝑtenſoꝝ. Inqt.n. Ioā. Modi morboꝝ ⁊ in natura
li mlīa cū aliquo hūoꝝ cōcurrentiū ad ĩfirma mēbra ſunt
q̄tuor. ꝑmus ē v̄tus mēbri ĩpellētis ⁊ debilitas recipiētis.
ſcōs eſt multitudo hūoꝝ. terti⁹ eſt debilitas v̄tutis nutriē
tis.⁊ q̄rtus largitas vie vt poroꝝ vt ſupra in iūcturis ē di/
ctum. Aut ſit per modum ꝯgōnis ⁊ illud ſit raro. Cuius
cā eſt debilitas ſola mēbri in quo apa eſt:q̄re nō ſuum pōt
ꝓpriū cōuertere nutrimētū totū vel ſm ꝑtē:q꞉ membruꝫ
ſit paruū ⁊ nutrimētū multū:vel q꞉ nutrimētū poſſit con
uertere.ſꝫ ſupfluitates ei⁹ nequeat expurgare:vel debile ĩ
ſe:vel q꞉ ſit multe groſſe ⁊ viſcoſe:aut ĩbibite:vel q꞉ duct⁹
ſint obſtructi:vel ꝙ deſiẗ ei exercitiū: vel eūo nālis ꝯſue/
ta ei vel artificial'. Inqt.n. H. Et.n. tēptat qdeꝫ nā ſuis ſem
per vtēs v̄tutib⁹ aſſimilare quocꝫ q̄ nutriunẗ. qōcunqꝫ fie
ri pōt benignū. expellere vō qō nō eſt tale. ſi vō qn̄qꝫ ꝓpter
groſſiciē vel viſcoſitatē vel ſubtilitatē ĩbibitā:vel multitu
dinē ſupfluitatis : vel ꝑꝑ quādā ſtructionē: vel ꝑꝑ ſui ipi⁹
imbecillitatē nequeat ex ſe expellere: qō maluꝫ eſt:nece ē
⁊ ipm morās ſm aīalis corꝑ⁹ corrūpi.⁊ in ipſa ꝑticula egri
tudinē ꝓcreari:vt apa qō vel erit ſiēs vel ſcm̄. Fiēs vt dū
mā influit vel gn̄atur ⁊ coadunaẗ in vacuis mēbroꝝ re/
giōibus. Factū vō cū iā ĩfluxit vel gn̄ata eſt vel coaduna/
ta ⁊ dẗ ꝓpe exitura. Et eſt hn̄s q̄tuor capl'a. Cā vō debili
tatis vtriuſqꝫ mēbri ĩterior plimū ē malitia ꝯpl'onis diuer
ſe vel equal'. nālis vel accn̄talis:⁊ eſt hūoris vicio plimuꝫ:
vel ſine obſtructōis cā plimū eſt coartatoria ⁊ ē multitu/
do humoꝝ ⁊ ſupfluitatū ⁊ ipſaꝝ groſſicies ⁊ viſcoſitas ex
regiē ꝓcedēs vel nā mēbri. q꞉ ſint eius ſupfluitates tales
vt ſunt nerui:pāniculi:oſſa ⁊ ſilia. ⁊ eſt cā an̄s. Cā vō extri/
ſeca ⁊ eſt cā ꝑmitiua cōis q̄tū ad vtrūqꝫ fiendi moduꝫ eſt
malitia regiminis nō ſolū in cibis ⁊ potib⁹:ſꝫ in alijs oib⁹ ne
ceſſarijs reb⁹ nō nālib⁹:tal'r vt ex eis ꝓcedant oēs cāe ex/
trinſece ꝑnarrate:⁊ mot⁹ humoꝝ ĩfluentiū:vel multiplica
tio ⁊ aggregatio ipoꝝ in mēbro apando ex q̄bus ſunt ma
xime motus fortes corꝑorei ⁊ aīales ⁊ vinū: ⁊ ēt cāe nō ne
ceſſarie. vt caſus: ꝑcuſſio:morſus ⁊ ſilia. Cā formalis eſt

detractio nālis mēbri magnitudis apati ab eo qō eſt ꝑter
nām. Et ſꝫ hanc diuiſionē diuidiẗ apa. q꞉ aut eſt tumoris
grādis vt apa eſt:aut parui: vt eſt puſtula ⁊ bothor. Cā vō
final'. q꞉ aut erit ſalubre aut mortale q̄tū ad finē vltimuꝫ:
aut q̄tū ad finē mediuꝫ q eſt altero modoꝝ ſex. q꞉ aut re/
ſolueẗ:aut maturabiẗ: ⁊ ſaniaẗ:aut lapideaẗ :aut putreſit
⁊ corrūpeẗ fetēter:aut ſubito aperieẗ ⁊ ſuffocat :aut ꝑmu/
taẗ. Et melior haꝝ eſt reſol'o. ſcda maturatio ſeu ſaniatio:
mala eſt apertio ſubita ⁊ ſuffocatiua:deīde corruptio:lapi
datio vō media eſt. ꝑmutatio pōt ſe hr̄e ad bonū ⁊ maluꝫ.
¶ Signa deīde ad curā apatis certā ⁊ ꝯpletā opꝫ inueſti
gare. ſigna generū ⁊ ſpērum ⁊ cārum eius. dictum.n. eſt ſu
pra in ꝑncipio operis auctoritate. H. Q꞉ cura cuiuſlꝫ mor/
bi cōfeſtim ſequiẗ cognitionē facientis cāe adeo vt dicat
ad glauconem. Nihil mirabile in tm̄ medicos peccare in
ſanatōibus ĩq̄tū ⁊ in cognitōe fallunẗ. Signoꝝ ergo apa/
tuꝫ q̄dā ſunt generaliſſima: quoꝝ q̄dā ſunt exterioꝝ:q̄dā
interioꝝ. Exterioꝝ ſunt manifeſta ſenſui:vt apatum exte
riorum membroꝝ:⁊ ſunt tumor ⁊ ĩflatio. Interiorum ve/
ro q̄dā ſunt eēntialia ⁊ cōia oibus:vt ſunt grauitas vel tē/
ſio ⁊ ĩflatio ſeu tumor ſi ad ipm cū medio ꝑueniat ſpūs:vt
q꞉ fuerit in ſtō:epate vel ſplene. Quedā accidētia ex cōita
te ꝓpter vicinitatē vel colligantiā:vt tenuitas in mirach
vētris:extenuatio corꝑoris ſubita ⁊ in oculis ꝯcauitas re/
pentina. Quedā ſunt ſigna generū ipi⁹. Nā ſi ſit calm̄ ꝑdi/
ctis ſignis addeẗ ĩflāmatio ⁊ dolor acut⁹ ⁊ fortis ⁊ perdu/
rans. Et hoc iō:qm̄ in eo nō ſolū eſt repl'o: ſꝫ malitia ꝯpl'o/
nis diuerſe ⁊ cōtinuitatis ſol'o:q̄ ⁊ ſi ſigna ſint: ſūt ēt cōcau
ſe vt ſupra dcm̄ eſt. q̄bus ſiens apa ſi nō obuieẗ ad factōis
cōplementū breuiter ꝓduceẗ. Et ꝓinde hyp. inuenimus
in affo. dixiſſe. Dolores in laterib⁹ ⁊ pectorib⁹: vel in alijs
partibus ſi multū ſteterint ad diſcedendū magnū malū.⁊
eſt ēt febris maxime ſi ſit cordi ꝓpinquū ⁊ putrefactū ſeu
ſaniē faciet ⁊ ēt comitanẗ illa. ¶ Et ſigna ſpērū q̄ ex mā
ſunt depēdentes ſūt ſigna materieꝝ ipi⁹ ex q̄bus ſiunt q̄
ĩfra dicenẗ. Et ſunt in ſūma. Nā ſi qdem ſit calm̄ ⁊ mā ei⁹
ſit ſanguis:accidētia predicta erunt obtuſa. Si vō colera:
erunt intenſa. Si vō aduſta:erunt ĩtenſiora. Si vō frigida
dolor erit ꝑuus:nec tumor magn⁹ ⁊ acutus. q꞉ mā eſt diſ/
fuſa ⁊ viſcoſa nō bene cōgregabilis:nec eſt febris ĩq̄tuꝫ
huius:niſi per putrefactionē caliditatem acqrat. ¶ Et ſi/
gna ſpērum ĩfra dicenẗ. ⁊ ſunt in ſūma ſigna dn̄y flegma/
tis vel mlīe.⁊ ſi ꝑuenire poſſit ad ea ſenſus in ſl'atico ſen/
tiet ſr̄itatem:albedinē ⁊ mollicie. In mlīco duricie ⁊ ſuſci
tatem abſqꝫ dolore oīo. Et in ventoſo tenſionē reſiſtentē
tactui cum dolore. ¶ Signa vō ſuboꝝ ſeu cārum māliuꝫ
ſunt. Nā ſi fuerit ĩ mēbro ſenſibili neruoſo erit dolor acu/
tus pungitiu⁹ ⁊ fortis qn̄qꝫ perducēs ex cōtinenti ad ſpaſ/
mum alienationem ⁊ anhelitus nocumentum. ⁊ pulſus ē
ſerinus. Si vō in membro ĩſenſibili ſiat. ſit in eo grauitas
ſine dolore acuto:vel eſt dolor grauatiuus ⁊ pulſus vndo
ſus. Et ſignum ꝓꝑꝛy mēbri officialis in quo eſt: ē nocumē
tum opatiōis illius. Et ſigna modoꝝ ſunt. nā ſi per modū
influxiōis ſiat:videbis ſigna repl'onis totius vel alicuius
membri ⁊ venaꝝ ⁊ debilitatē membri : ⁊ per coꝝ eūoneꝫ
ceſſat vel minuiẗ apa. ſi vero per modū congeſtiōis:ſigna
debilitatis membri apati ſola aderunt: vel cum regiminis
malitia ⁊ predictarum priuatione. Et ſi quoqꝫ ſit in fieri:
videbis augeri tumorem ⁊ accidentia quotidie parū poſt
parum. Si vero factum:iam materia eſt aggregata cum
cupo:tumor permanebit in eē ſuo. ⁊ dolor ⁊ febris ex tūc
augebitur ꝓpter digeſtioneꝫ materie que ex tunc incipit
fieri ſi fieri debꝫ. ¶ Signa vero temporꝫ ei⁹ ſunt triplici/
ter ſumpta. vt qa penes eſſentiam eius:penes accidentia.
⁊ penes ſigna digōnis ⁊ indigōnis. Penes eēntiam qdē.
nam in ꝑncipio incipit tumeſcere membrum : deinde au/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0481-1
DFG

getur donec ſtet:deinde ſtat in vltimo:in regionib⁹ mem/
broꝝ:deíde minuit̃ ⁊ reſoluit̃ ſi debeat eſſe ſalubre. Sed
dices vbi ſunt vacue regiões membroꝝ cū dicat Ariſt.nõ
eſſe dare vacuū in nã:Cui reſpõdet.G.dicēs.Qm̃ aūt i cõ
tinuo nõ eſt dare vacuū ⁊ ſi aliqd īfluxerit cõcurrūt ad ſe
inuicē vniuerſe ꝑticule corporis:queádmoduꝫ ⁊ in aq̃ vi/
demus ſi ergo ꝯcurrūt ꝓ effluxionē vt qd nõ rareſiēt ꝓ
īfluxionē.ſic ergo ſunt.⁊ ſi nõ actu:potētia tñ. Penes acci
dentia võ.nã ſi in ꝑncipio fiūt ꝑdcã eēntialia erūt leuia:⁊
cū ꝑuenerint ad augmētū augebunt̃ ⁊ apud ſtatū vltima
bunt̃ ⁊ in declinatione remittent̃ dõec totalr̃ ceſſent ſi ſa/
lubre ſit apã.ſi võ mortale ſtabūt in acumīe ſuo donec ex
tinguãt.Tertio penes digõnis ſigna:ei⁹ tēpora dignoſcun
tur.nã ſi icipiat maturari:videbis duriciē q̃ in ꝑncipio fu/
it minui:⁊ dolorē ⁊ febrē augeri ſi fuerint: vel inſurgere:ſi
nõ fuerint:deíde vltimari qñ digõ ⁊ maturatio fit cõple/
ta:⁊ virulentia egredit̃ ſi ſit nõ ſub cute celatū:vt q̃ i ocu/
lis naribus vel labys pleura ⁊ ſilib⁹ fiat. Jngt.n.G. Jn oī
apãte ſub cute celato ſolet eruginoſus exire liquor:maxīe
ſi calīm ſit vel maturū:⁊ vltimo cū cõpleta eſt ⁊ ꝑfecta mi
nui.⸿ Signa forme eius ſūt. Naꝫ ſi apã fuerit magnum:
grauedo ⁊ dolor erit maior ⁊ maior leſio opatõis cõſuete.
Si vero ꝑuū vt puſtula vel bothor ꝑdcã ſunt minora.Si
gna vero finis ⁊ terminatõis ſūt diuerſa ꝭm diuerſitatem
ipſi⁹:nã ſiqdē reſolũat̃ remiſſio fiet doloris grauitatis ⁊ fe
bris ⁊ alioꝝ cõcomitantiū accītium:⁊ v̄tutis iualeſcētia ⁊
fortitudo.⸿ Signa võ maturatõis ⁊ ſaniatõis ſeu ſuppu
ratiõis fientis ſūt ꝓlongatio apãtis pulſatio ⁊ doloris ⁊ fe
bris augmentatio:ſed ipſi⁹ facte illoꝝ eſt diminutio. Jngt
.n.hyp.in aꝭo.Circa gñationē ſaniei dolores ⁊ febres acci
dūt magis q̃ꝫ ꝑfecta ſanie:⁊ cū hoc eſt augmētatio grauita
tis ⁊ põderis.⸿ Et ſigna eruptiõis ſūt rigor:diminutio gra
uitatis ⁊ doloris ⁊ fortis egreſſio puris.Et ex ſignis bonis
ſunt.vt ſanies q̃ erūpit ſit laudabilis:q̃ alba lenis ⁊ eq̃lis
carens malo odore:⁊ ſeq̃ diminutio vel ceſſatio febris do
loris ⁊ alioꝝ accītiuꝫ:⁊ v̄tutis iualeſcentia ⁊ opationū ei⁹
Que ſi ſunt eꝯ ſunt mali ſignificatiua.Signa ſubtiliatõis
⁊ ꝯuerſiõis in lapidē ſūt diminutio doloris ⁊ febris oīo cuꝫ
duricie vel augmētatio ſi in ꝑncipio fuerit.Et ſigna corru
ptõis fetētis ſunt mutatio coloris ad liuiditatē vel nigre/
dinē mēbri vel vicini ⁊ exeūtiū fetor. Signū ſubite aper/
tiõis eſt ſubita minoratio grauedīs ⁊ doloris in apãte mem
broꝝ ⁊ permutatio ei⁹ in membro ad qð trãſit mã:⁊ q̃nq̃ꝫ
exitus puris vel ſanguis.Signa võ ꝑmutatõis ſunt diuer
ſa ꝭm diuerſimodã ꝑmutatõeꝫ ipſi⁹.Et ſunt. nã ſiqdē mu
tatio ſit de iteriorib⁹ ad exteriora ſūt alienatio accītiuꝫ ⁊
ꝑmutatio iterioꝝ ſit⁹ cū dolore:tumore ⁊ q̃litate mutata
exterius in mēbro ad qð mutat̃. Jn quo ꝓinde dolor ⁊ ca/
liditas ē ꝑus ꝑcepta:⁊ ſunt bona: ꝯ̃ria võ mala. Jngt hyp.
in aꝭo.Eriſipilã iteri⁹ extra cõuerti bonū. exterius võ it⁹
malum.Aut erit de nobili ad ignobile:vt de principali ad
emunctorium aut econuerſo. aut de minus nobili ad ma/
gis nobile: vt de pleura ad pulmonem : aut de pulmone
ad cor:aut de ſupiori ad īferi⁹.aut eꝯ.⸿ Siqdē ergo ꝑmo
mõ ꝑmutet̃ ſigna erūt alienatio doloris ⁊ febris ⁊ alioruꝫ
accītiū:⁊ virtutis īualeſcētia:⁊ in grauitate dolore:calore
⁊ tumore in emūctorio.Si võ ꝑmutet̃ eꝯ ſigna erūt ꝯ̃ria:
⁊ malitia anhelitus ⁊ pulſus.ſi permutatio ſit ad ſp̃ūalia ⁊
ad cor.q̃ eius ꝯſecutio ⁊ diuiſio erunt manifeſta ⁊ pulſus
diuerſitas ⁊ ineq̃litas.Si ãt fiat de ſupiori ad īferi⁹ vt de
cerebro ad cor.ſigna erunt eadē cū ꝑdictis.Si võ de eo vl̃
ſp̃ūalib⁹ ad nutritiua:ſigna erūt tenſio in hypocundrys ⁊
grauitas.ſi ecõuerſo de īferiorib⁹ ad ſupiora mutet̃ : ſigna
erūt malitia anhelit⁹.q̃ coãguſtatio eius ⁊ dolor pectoris
⁊ grauitas in parte furcule ⁊ ardoris ⁊ doloris mutatio de
īferiorib⁹ ⁊ nutritiuis ad ſp̃ūalia ſi ad ea permutatio fiat.

Si vero ꝑueniat ad cerebꝝ ſeu caput dolor erit capitis ⁊
alienatio ⁊ vigilie:⁊ q̃nq̃ꝫ ſubeth ⁊ ſtupor.Si võ ad emun/
ctoriū poſt aures ſigna erūt q̃ ſunt dicta ⁊ bona nūcia ſi cõ
ſiſtit virtus.De his aūt oībus q̃liter ⁊ in q̃bus fiat ⁊ cuꝫ q̃/
bus iuuent̃ termīatiões bone ⁊ obuiet̃ malis īfra ſp̃ãlem
afferem⁹ xp̄o duce ſermonē.⸿ Cura apãtis duplex eſt.ge
neralis ⁊ ſp̃ãlis.Gñalis qdem eſt eũo.Cū.n.ſit morb⁹ mã/
lis ex replõne vacuitatū regionū membroꝝ ipm inq̃ꝫtum
h⁹ eũo ſanat vt hyp.dixit.Complet̃ aūt eius eũo q̃nq̃ꝫ eũo
ne ꝑtis apãte ſola vt cū apã fuerit iã fcm̃ quocūq̃ꝫ modo:q̃
ꝓpria ⁊ abſoluta cura nõ eſt.fiet aūt per extractū ſolū de
parte patiēte q̃ duplr̃ hꝫ cõpleri. per dyaforeſiꝫ ꝑmo.ſcðo
per tarapationē.Quib⁹ aūt ꝑticularib⁹ medicis cõpleant̃
hec ambo ſuperi⁹ dcm̃ eſt.⁊ in ſp̃ãli cura īfra dicet̃. Si võ
nõdū fcm̃ ſit:ſed adhuc ſit fiens quocūq̃ꝫ mõ fiat ſola par
tis in qua ſit eũone nõ ſanat̃:q̃nimo ēt ei⁹ ſanatio ꝭꝫ.G.ſit
cõpoſita ex ꝑuiſione ⁊ cura ſic morbi fientis cuiuſlꝫ:oꝫ vt
ꝑcedat ꝑuiſio ⁊ abſciſio efficientis cãe:deíde ſequat̃ cura
apãtis facti ſeu eũo mãe iã īfluxe:vt his ⁊ alys cõſideran
dis attētis ei⁹ medicatio apãtis ꝯſiſtat in quatuor. Jn ab
ſciſione an̄tis cãe q̃ ſic eſt in cura apãtis ſeu abſciſiõe mãe
influxe iã ⁊ cõcepte in parteq̃ꝫ collecte q̃ cã cõiuncta ipſi⁹
exiſtit in regīe ⁊ accidentiū correctiõe. Abſciſio vero an̄ce
dentis cãe cõplebit̃ ſi per modū fiat īfluxiõis ꝑmo cū eũo
ne totius corporis vel mēbri īfluentis ꝯuenīeti ⁊ circūſtã/
tys ⁊ cū deriuatõe ad ꝯ̃riuꝫ cū eoꝝ alterius ꝑſupponat̃ re
pletio. Fiet aūt duplr̃ ꝭm duplicē modū replõnis.aut.n.ē
plectoria.aut cacochimia. Siqdem autē plectoria ſit eũo
eius cõplebit̃ flõmia per antiperiſtaſiꝫ fcã:vel ei ꝓportio
nalibus magis ꝓꝑe ⁊ in ieiunio q̃ꝫ cū re alia ſic eſt fricatio
mlt̃a ⁊ aſpera exercitia balnea ampliora ⁊ euaporãtia far
maca ⁊ purgatio cū ſolutiuis.flõmia enī euacuabit̃ ⁊ ieiu/
nio in oī diſpõne ſi cum febre.alias vero nõ. Jteꝫ ſi reple/
tio multa ſit neq̃ꝫ balneis neq̃ꝫ exercitys impericuloſū eſt
vti. Si võ repletio ſit cacochimia farmacia euacuabitur
appropãta cacochimie q̃ ex ꝑdictis eſt nota. Scðo cū cõ
ſtringētibus ⁊ coartãtib⁹ venas medias atq̃ꝫ ductus. Fit
aūt illð cū ſtipticis ⁊ põticis applicatis venis ītermedys:
ſi ſint apparētes qualia in cura iuncturaꝝ ⁊ alibi dcã ſūt ⁊
īfra dicent̃ in ſp̃ãli cura.Et tertio fac cū ꝯfortãtib⁹ mēbꝝ
ne recipiat:q̃lia ſunt ſtiptica farmaca ſubaꝫ ei⁹ coadunan/
tia ⁊ adequãtia cõplõneꝫ ipius cū calitate vel f̄ritate:ꝓut
diſcraſia exigit vel ꝓꝑetate ⁊ cū ſedãtibus dolorē ei⁹ atq̃ꝫ
calorē ne vlterius trahat:q̃ ſunt ſupra nota in cura iūctura
rū ⁊ ſtõi.⁊ infra in ſp̃ãli cura dicent̃.Et cõdiſi cū aceto ꝓhi
bent apã in ꝑncipio.Sed ſi per modū ꝯgõnis ſit fiens cõ
plebit̃ cū ꝯfortatõe ex adeq̃ntib⁹ ꝯplõnē ipi⁹ mēbri i quo
apã ſit ⁊ vnietib⁹ ſubaꝫ ei⁹ ne mãm gñet:qm̃ cã ei⁹ iterior
an̄s eſt ꝯplõnalis nõ hūoralis vel exterior ꝑmitiua niſi re
plõ an̄s ſit in ei⁹ d̄bilitate cū cã. quo caſu ꝑmittere oꝫ eũo
nem vt dcm̃ eſt. Eũo vero apãtis ⁊ eũo mãe īfluxe ⁊ ꝯgre
gate i ipſa ꝑte q̃ ad curã ſpectet ñ ꝓꝑe fiet diuerſimode ꝭꝫ
diuerſum ei⁹ fiendi modū.ſi.n.per modū īfluxiõis ſit fcm̃
ꝯplebit̃ duplr̃.ꝑ recurſuꝫ. ⁊ ꝑ extractū. Per recurſum fit
triplr̃ ꝑ pulſuꝫ.tractū.⁊ trãſmiſſuꝫ.⁊ his oīb⁹ vel plib⁹ tñ
recurret.Si võ ꝑ modū ꝯgõnis ſit factū cõplebit̃ ſilr̃:lꝫ ꝑ
extractū de patiēte magis:⁊ ꝑ pulſuꝫ min⁹.pulſus ãt mãe
fit ſi in ꝑncipio īfret̃ ⁊ ꝑti patiēti ſtiptica apponam⁹.Cõpe
tūt.n.talia repcuſſiua i ꝑncipio oīs apãtis ꝑ īfluxiõis mõꝫ
fiētis inq̃ꝫtū apã eſt:lꝫ fallat rõne mãe:vel q̃ f̄re groſſe et
viſcoſe.h ex talib⁹ ituent̃ magis.vel q̃ venenoſa tibi re
pulſio ipellit ad ꝑncipale cū ſua ꝓꝑetate ad cētrum.i.cor.
Aut rõne mēbri:vt q̃ ſit emūctoriū alicui⁹ ꝑncipal̃ ad qð
influxit mã a quo repulſio nõ ad circūſtantes ꝑticulas re
pellit mãm ⁊ diſſemiat:ſed ad ꝑncipale totū reddit vnitã
ꝓꝑ vie amplitudinē:in alys võ excuſat a replõne ad illud

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0482-7
DFG

cūo diſſeminatio materie ⁊ eius ꝓprietas. Tractus autē
fiet cum euōne partium oppoſitaꝝ ⁊ remotaꝝ. ⁊ illud cū
fricationib⁹: ligaturis: cōpreſſionib⁹ doloroſis: ⁊ vētoſatio
nibus: in partibus illi oppoſitis ⁊ remotis vel ꝓpings vt
mā de loco apando ⁊ de ꝓfūdo corporis ad exteriora tra/
haſ queādmodū i pleureſi ⁊ litargia vētoſam⁹ exteri⁹. ⁊ i
alys vt mām euamus ⁊ extraham⁹. ſic quoqȝ flōmam⁹ et
venas lingue ingnātia ⁊ ſaphenā in apatib⁹ matricis ⁊ ve
ſice ⁊ renū. Trāſmiſſus vero cū applicatiōe medicinaruȝ
ſtipticantiū ſupra ipȝ ↄplet. his.n. oībus vel plurib⁹ ⁊ mā
actu fluens adhuc in venis eſt puis mēbri repellet ⁊ q̄ flu
xa iaȝ eſt recurret ad circūiacētes ꝑtes diſſemiata: vt for/
te vno auxilio ſilr īfluēs mā ⁊ effuſa tota depaſſa vel paſſu
ra ꝑticula expellat. Et illud eſt cū mā recurrere hñ ſit ap/
ta: ⁊ qꝛ calida ſit ⁊ ſubtil. Extract⁹ de ꝑte faciēte fit duplr
īſenſibilr ꝑ dyaforeſim ⁊ dyaforetica farmaca: vel ſenſibi
liter ꝑ curationē ſeu ſectionē vbi nō recurret tota: qꝛ groſ/
ſa ſit ⁊ viſcoſa. precedet aūt eas maturatio et mollificatio
reſolōnē qñȝ ⁊ mollificatōeȝ qñqȝ ⁊ ſaniatōeȝ ⁊ taraxatio
nē: deide ſequit mūdificatio ſaniei: deide icarnatio ⁊ ↄſo/
lidatio vlceris ⁊ vltimo ſigillatio ſeu cicatriçatio ei⁹. Qui/
bus aūt medicis hñt illa cōpleri ſupra in ꝑma ſectiōe vbi
de cura apatū egim⁹ dcm̄ eſt. ibi.n. oñdimus ꝙ ex medici
nis particularib⁹ apatū q̄dam erant repercuſſiue frē ⁊ ſti
ꝑtice vel calē. q̄dā trahētes. q̄dam dyaforetice. q̄dā ſaniā/
tes ⁊ maturātes: q̄dam erūpētes. q̄dā mundificātes: q̄daȝ
icarnantes. q̄dam ↄſolidātes: ⁊ q̄dam ſigillantes ſeu cica/
triçātes. tali ordine approximāde in tꝑib⁹ eius. ⁊ ordo eſt
vt in ꝑncipio apatis per modū īfluxiōis fiētis magis ⁊ ca/
lidi in emūctorio nō exñte ſupponant repcuſſiua. Quapp
Albo. dixit. ⁊ oȝ vt i potu tribuat hñti apata aqua endiuie:
aqua ſolatri: cū medull caſſief. Si vero ſint ſtiptica calida
tēperate ⁊ in augmēto ꝑmixta dyaforeticis: ⁊ in ſtat⁹ ꝑn/
cipio ⁊ ꝑlio ei⁹ magis. ⁊ tūc etiā attrahētia ſic miſtrent cū
ſcalpellatiōe ſeu ſcarificatiōe. ⁊ ꝓprie cū mā multa vel ma
la ꝑducēs mēbꝝ ad correctōȝ in quo nō expectata ē digō.
In fine ſtat⁹ ⁊ declinatōe vero dyaforetica ſola hñtia gd
ſtiptici ⁊ aromatici ſi in mēbro ſit v̄tutē influētē hñte: qō
ſi nō reſoluat ⁊ mā ſit aggregata tota vt facta ſit exitura
maturātia ⁊ ſaniātia miſtrent: deīceps facta ſuppuratiōe
⁊ dubellati erumpētia miſtrent. Fiat aūt apertio ſm̄ pro/
ceſſum rugaꝝ membri niſi in qbuſdaȝ de qb⁹ infra dicet.
Deide mundificātia ſanieȝ ⁊ pus. Deide icarnantia ſi ex/
pediat. Deide cōſolidantia: ⁊ vltimo cicatriçātia: ⁊ in alys
aliter terminādis ſeu finiēdis. aliter aūt eſt operādū ꝓut
in ſpāli cura dicet. Et de terminādis ſm̄ alteꝝ ꝑdictoruȝ
modoꝝ diximus: eo ꝙ iter ceteros ſunt meliores vel bo/
ni. Et modus eſt vt apocruſtica in ſuo genere frigida ⁊ ſti/
ꝑtica dyaforetica ⁊ calida ſint tēperata: ⁊ ſaniātia calida ⁊
humida in ſcdo gradu ſint ꝓportionata nāe māe mēbri.
⁊ ꝓinde variant ſm̄ varietatē illoꝝ nō excedēdo. accidit
.n. ex coꝝ exceſſu icōueniētia multa. Ex repcuſſiuis gdeȝ
vehemētia doloris ꝑꝑ retentionē māe ⁊ ſoliditatē mēbri
⁊ reductio qñqȝ ad ꝑncipale. ⁊ qñqȝ iduratio apatis. ⁊ qñȝ
tendit mēbrū ad corruptōeȝ cū viriditate ⁊ nigredine ⁊ ꝓ
ꝓrie qñ medicat cū eis in fine rei ⁊ ꝓpe ſtatuȝ. Ex dyafo/
reticis vero fit cicatriçatio apatis ⁊ doloris additio ꝓpter
ſiccitatē. Et ex ſaniātib⁹ corroſio mēbri ⁊ vlceratio. ſanies
.n. longo retenta tēpore acuit dixit. G. Cū ergo talia vide/
bis īſurgere iconueniētia opȝ vt deſiſtas ab eis: ⁊ corrigas
iconueniētia nocumēta q̄ ꝓuenerunt. Et illud eſt vt dolo
ris violētiā ⁊ vehemētiā tollas ⁊ corrigas cū embrocis ca
lidis anodinis ⁊ cū emplis ex eis vt ſemie aneti: ⁊ radice li
lij: florum camomille: lily: fenugreco: ſe. lini: ⁊ radi. biſmal
ue: ⁊ cum oleis eoꝝ ⁊ fecibus eorundē: q̄ indurationeȝ ei⁹
corrigunt. reditiōe ad ꝑncipale obuies cum cordialib⁹ ſti/
ꝑticis intus ⁊ extra approximatis cum vētoſis rubifican/
tibus ſupra ꝑteȝ. Et ſi mēbrū vireſcat vel liueſcat. qꝛ tēdit
ad corruptioneȝ ſcalpellabit vel ſcarificabit ꝓfunde vel
ſuꝑficialr ꝓut nāe membri ↄuenit ⁊ loco ipſi⁹: ſed ꝑus iun
ge membꝝ ex bolo armeno diſſoluto in oleo roſ. vel aqua
cū alys auxilys dicēdis in cura eſtiomeni: ꝙ ſi cū toto hoc
nō ſaluabit: ſed putreſcit: iuſſit Hyp. abſcindere ipȝ ne pu/
tredo ex eo ꝑueniat ad alia mēbra. ⁊ qñqȝ morit ⁊ in oīb⁹
cōfortabunt ꝑncipia cū tiriaca vel metridato. Scliroça
tionem vero ⁊ exiccationē ex dyaforeticis ꝓueniēteȝ cor/
riges cū mollificātib⁹ diu approximatis ex mucillagibus
adipibus: medullis: ⁊ ſilibus qb⁹ humectātibus dolor ceſ
ſat. Corroſionē ex ſaniantib⁹ ītroductā cū mundificātib⁹
⁊ icarnātibus dictis: ⁊ alys q̄ ifra dicent auxiliāte xp̄o. Cū
qꝫ apata mēbra in nā ſint dr̄ia cōſilia. ſ. ⁊ officialia ꝑdicte
ēt medicine ſint dr̄ntes ſuba ⁊ v̄tute opȝ ex illis eligere in
cura apatis talia q̄ nāe mēbri, in quo fit tam cōſili q̄ȝ offi/
ciali cōueniāt vt cura ei⁹ cum talibus reddat habilis ↄue
niēs ⁊ cōpleta nō ſolū quo ad reȝ ꝑter nām eius talē ↄſide
rare ſufficit. qꝛ apa talis morbus eſt ⁊ ex tali cā ſeu mā: ſed
ēt cui⁹ mēbri ſit vel in quo ſit. apa.n. ſua eēntia ꝓpria ⁊ mā
ſuiſqȝ tēporibus medicias varias idicat ⁊ diſtiguit: ſic nā
mēbri in quo eſt ꝓpa q̄ſtitas ipſaꝝ determinat ſpēm pro/
priā ſibi eligit ordinē atqȝ aptū vtēdi moduȝ locūqȝ imiſ/
ſionis ipaꝝ ⁊ expulſiōis māe. Tal aūt mēbri nā ↄſtat eſſe
cōplonal: qꝛ cala vel frā: ſicca vel hūida. Et ↄplonal q̄l. qꝛ
ſitus ⁊ ſocietas forma cū receptaculis atqȝ via ꝑncipatus
ſeu dignitas ⁊ ignobilitas. Et cōis qꝛ ſube raritas ⁊ denſi/
tas: ſenſibilitas ⁊ inſenſibilitas. qꝛ hoc mō q̄ſtitatē auxilio
rum ſeu medicinaꝝ cōuenientiū apati ꝑdictaꝝ gdem nā
cōſilis mēbri determiat. Nā ſi apa calidū ſit in mēbro ca
lido repcuſſiua frā debēt eſſe ſi in frō fortiora ⁊ dyaforeti
ca cala ſint in mēbro calido fortiora: in frigido leuiora ⁊ ſi
milr de alys auxilys. Et ſi mēbrū ſit valde ſenſibile vt eſt
neru⁹ corda vl ſtōs ⁊ oculus magis leuiora: vt ſint immor
dacia ſufficiunt: lȝ eūo vlis debeat eſſe maior: ēt nō exñte
multitudie vt nā reddat auara: initēdo tñ forti dolori tra
henti ipſius. Et ꝓinde ſedātia dolorem opȝ eſſe fortiora q̄
ifra dicent. Nā quoqȝ officialis ſilr iliā determiat vt ſit⁹.
Nam ſi fuerit mēbꝝ apatū in ꝓfundo multiplicāda ⁊ eli
genda ſunt repcuſſiua ⁊ ſilr dyaforetica ⁊ alia auxilia q̄ le/
ptomeris ſūt ſube vt cito ꝓueniant in ꝓfundū ⁊ ꝓꝑe rep/
cuſſiua. Et cuȝ talia ſit difficile iuenire vt ſupius dcm̄ eſt:
eis parū miſceat aceti vel croci. Forma ēt. nā ſi mēbrū in
quo apa eſt in ſua receptatiōe hȝ receptaculū ſeu viā aptā.
vnde mā facile poſſit educi vt eſt ſtōs medicie ꝑdicte ⁊ ꝓ
ꝓrie ſolutiue debent eē leues. ſi v̄o ecōtra erūt ↄrie. Prin/
cipatus quoqȝ. nā ſi ꝑncipia ſint frā: repercuſſiua ⁊ dyafo/
retica calida oȝ eſſe leuiora ⁊ nō pura: ſȝ ſtipticis ⁊ aroma/
ticis mixta in quātitate minori: ſi ignobilis fortiora ⁊ ma/
iora. eligit quoqȝ ꝑncipat⁹ medicinas ſibi ꝓprias ⁊ cordia
les odoriferas ⁊ confortatiuas virtutuȝ ꝓpriarum in eis.
ignobilitas vero cōmunes. ordinem quoqȝ ⁊ modum. qꝛ
talia non multa in quantitate nec ſubiecto: ſed paulatim
oportet ipſa ⁊ laxatiua ꝓpria ⁊ nobili miſtrare: licet medi
cine debeant eſſe prompte vt cito iꝑrimant collectionem
quā in eis ꝓhibeant fieri: cū in eis ſit periculum grande.
Ignobilibus vero ⁊ innatam tantum virtutem habenti/
bus fortia atqȝ ſubito niſi ꝑncipalium terreatur natura ⁊
emunctorys nobilium dyaforetica tñ ⁊ fortia. Socie/
tas quoqȝ locum imiſſionis medicinaruȝ: ſi enim ſit in ce
rebro per nares per palatum aures ⁊ ſimiles regiones me
dicinas immittes. ſi auteȝ in ſtomaco per os: ſi in iteſtinis
inferioribus per anū: ſi in ſuperiorib⁹ per os. Et in vtriſqȝ
ſimul per ambas. ⁊ ſi in ēpe ſit materia per iteſtina expel/
les cum ventrem ſoluentibus: ſi in gibbo cū diureticis et

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0483-3
DFG

prouocantibus vrinā.ſi in vberibus per matricez in men/
ſtruis.ꝛ ſi in matrice per ſaphenā.ꝛ ſi in gutture ꝑ venarū
eius apertionē.Sequit̄ regimē in ſex reb⁹ nō nālib⁹ ꝛ ne/
ceſſarijs ꝛ nō necarijs:qđ cām ꝑmitiuā tollit oēm ſuperi⁹
ꝑnarratā ſi adſit:vel ꝓhibet:ſi nō adſit.oꝫ ergo eē tale vt
v̄tutē digeſtiuā ꝛ nutritiuā ꝯfortet ī corpore:attractiuā cō
tēperet ꝛ retētiuā ꝛ ēt expulſiuā atq; repl'onē minuat ſi ī/
ueniat ipm ꝓut diſpōni ꝯuenit q̄lis ſupra ſectōe ꝑma ī cu/
ra debilitatis ſtōi ꝛ digōne eſt dcm̄:ꝛ extenuatiua dieta.
Accn̄tiū quoq; correctio in febri.ſ.ꝛ doloris ꝓꝑe pꝫ ex his
q̄ dcā ſūt in cura febriū ꝛ de ſedātib⁹ dolorē in ſectōe ꝑma
ꝛ ꝓꝑe in cura egritudinum iuncturaꝝ.Et ex eis ſūt cal'a ꝛ
hūida tēperata q̄ īfluxā mām reſoluūt aliā nō trahēdo al
terantq; cal'itatē vt ētetrafarmacū a lana ſuccida ol'o cali
do īfuſa.ꝛ iuſqamū:opiū:plūbū:ceruſa:ꝛ portulaca in cali/
dis.Et ē ꝓꝑa ill' in qb⁹ timet̄ putrefactio. ¶ De due res
lꝫ ſint in nūero vltime:ſūt tn̄ in ordie ꝑme in apatis cura.
Regimē.n.ꝛ dieta cura ipſi⁹ fūdamētū ē gnāle ī cura egri
tudis oīs.Et qn̄q; ſola ipſi⁹ bonitas ē ſufficiēs vt oñſum ē
ſupra.ꝛ dieta extenuatia ī p̄ntis egritudis cura ē efficaciſ/
ſima.abſcidit.n.oēm ei⁹ cām a q̄ depēdet.nā ꝑmitiuā ꝛ ex
trinſecā tollit ſi adſit:vel ꝓhibꝫ ſi nō adſit.an̄tē p̄ntē ꝛ ac/
cidētalē abſcīdit:quo min⁹ vel nō vltra fluat:cōiūctā quo
q; in apatis pte iā īfluxā diminuit ꝛ reliquū reſoluit vel ſa
niatōi dimittit.Sedatio quoq; doloris ꝗ ꝓuocādo reuma
fit cā collectōis apa fieri vetat.ꝛ deide ſi aliq̄ mala q̄litas
fortis a reumate fluēte in pticula ſit īpreſſa vt eūone illi⁹
rēaneat facta alteret̄ vt ꝯtemperātiā hēat q̄ ſꝫ nāꝫ. In al/
teratōe aūt ipſi⁹ necaria ē ꝯplonis cognitio.ſine.n.ea neſci
m⁹ q̄ꝫtū oporteat alterare.ꝛ qn̄ ab alteratōe deſiſtere.ꝛ ſic
duoꝝ alteꝝ eſt necariū:vel nō curare:vel ī ꝯriā diſpōnem
adducere.Sequit̄ cura apatū ſpālis ſ͂m vnāq̄q; ei⁹ ſpēm
ꝛ primo de flegmone pro eo q̄ ſepius accidit:ꝛ q̄ febres ꝛ
alia ſinthomata facillime operatur.

¶ Capl'm ſcōm de flegmone qđ eſt apoſtema ſanguineū
ꝛ de medicinis eius.

F Legmon eſt apa ſanguineum ex ſanguīe benigno
mediocriter groſſo ꝛ multo plimū.q̄ repēte īflu/
xo ex toto corpe vel aliquo mēbro:puta epe in ſua
nā manētib⁹ per venas ad vacuas regiōes ſubcutanearuꝫ
ptiū ſeu mēbroꝝ vt carnis ꝛ lacertoꝝ ī eiſq; collectio. qn̄/
q; per modū ꝯgelationis aggregato.vn̄ nece eſt ipſas ptes
extēdi ꝛ in tumorē leuari ꝛ cū eis īſil' cutē q̄ ſup eas exiſtit
Et cāe eius īteriores ꝛ exteriores ex p̄cedenti capl'o gnāl'r
note ſunt.dcm̄ eſt pluries gnāles canones debere in ſpāli
obſeruari vt eis manuducti ad ſpāliū īuentiōem ſit facile
ptrāſire.Ut aūt eas ſpāliter oñdam⁹ ſcias q̄ cā iterior ex
triplici eſt pte.ex pte q̄dē corporis vel epis:ꝛ ē repl'o ml'ta
ſanguis boni groſſi vel mediocris cōſiſtentia:quā ꝑ multi
tudine ꝯtinere nō valuit:ſꝫ ſua fortitudie expulſiue nō ab
ſoluta ꝑ venas magnas ad ꝑuas.ꝛ de ꝑuis ad mīmas car/
ni diffuſas aptis eaꝝ orificijs illū īfluūt ad vacuas regio/
nes illoꝝ.Alia ē q̄ ex pte lacertoꝝ ꝛ carnis recipiētis illi⁹
īfluxionē:ꝛ eſt debilitas illoꝝ nālis vel tpal' vel ex cā exte
riori q̄ dicet̄:lꝫ cooperet̄ raritas ꝯpōnis ꝛ nā ſāguis ꝛ poſi
tio in circūferētijs corpis ꝛ partib⁹ ſubcutaneis: ad quas
flux⁹ ſanguis nāliter ꝛ ꝓmpte mouet̄ magis q̄ꝫ ad alia mē
bra ad qđ adiuuat dolor ꝛ cal'itas in ea gnāta ex cā ipa ex/
teriori vel iteriori in fluxu ſāguis ad ipaꝫ ꝗ ad īfluendum
ſanguinē adiuuat attrahēdo vel ēt alia mala q̄litas q̄ effi
cit vt tractus ad nutriēdū ſāguis in eis nō ꝯuertat̄ debili/
tando:q̄r ſupeſt in ipis:lꝫ ſit raro vt ſupra dcm̄ ē.Et tertia
eſt ex pte venaꝝ ipaꝝ mediaꝝ per quas īfluit ex toto cor
pore vel tēpore ad illā.ꝛ eſt largitas ꝛ multitudo orificio/
rum ipſaꝝ.Cā vero exterior eius eſt malitia regimis ī ſex
rebus neceſſarijs ꝛ abuſus ꝛ nō neceſſarijs: ꝛ talis ꝑdicta/
rum cārum īterior cā fiat. ¶ Signa eius ſūt ſenſus dolo/
ris in ꝓfundo mēbri vbi tumor eſt vltra cutez.q̄ caro la/
certoſa ꝛ ſenſibilis valde in c⁹ vacuo multitudo ſanguis ē
collecta extendēs ꝛ ſcindēs ꝛ cuꝫ eo pulſatio:eo q̄ arteria
muſculi a repletiōe coartante multitudis eſt cōpreſſa. Et
ꝓinde ibi cōcuſſio ꝛ in tactu reſiſtētia q̄daꝫ ꝛ cum rubore
calido:ꝛ īflāmatio multa aq̄ flegmonis nomē aſſumpſit ꝛ
illud nō.q̄ ſanguis ex ſe calidior ſit īflux⁹:ꝛ q̄ lꝫ in ſe beni
gnus ſit:tn̄ in illis ptib⁹ itrāſpirabilis manēs excecatione
poroꝝ ipſoꝝ ꝛ ſupadiacentis ēt cum multitudine ꝛ groſſi/
cie cutis īflāmat̄ ꝛ inflat ꝛ maxime ſi putreſcat.ꝛ ſigna cā/
rum eius ex p̄cedēti capl'o gnāli ſunt nota. ¶ Cura ſpālis
ſicientis flegmonis ex cura gnāli q̄ꝫtū ad canones attendē/
dos in ea eſt nota.Cōſiſtit.n. in q̄tuor rebus dictis: q̄ꝫtum
vero ad iuentionē auxilioꝝ ſpālium medicinaruꝫ qb⁹ res
cōpleant̄ ꝑdicte preiacet ipaꝫ mōſtrare. Abſciſio ergo cāe
ei⁹ an̄tis ꝛ influentis ad p̄ns ꝑmo cōplebit̄ cū flomia ma/
gna perducēte ad lipothomiam vt cām an̄tez totam ꝛ ali/
quid de cōiuncta educat. Un̄ Gal.ait. In maximo.n.dolo
re ꝛ in acutiſſimo apate nulla melior medicia hac eſſe pōt
ꝛ de nigra ſi totū corpus ſit īfluens:ꝛ de baſilica ſi epar:vt
cum ꝓportionalib⁹ ei vt ſupra dictum eſt.ꝛ ꝓprie in cura
febris ſinoche:ita tn̄ q̄ fiat antipaſſādo ſemꝑ: vt euādo
a mēbro mittente vel corpore ſemꝑ a mēbro apante deri
uet.Si q̄dem ergo in ſupioribus partibus corporis ſit:flo
met̄ de vena inferiori vt ſaphena ꝛ ſilia. ꝛ econuerſo ſi in
īferioribus de baſilica.ſi vterq; de nigra ſeu media.Et ſiq̄
dem aliqs hūor ſanguini mixtus ſit ꝗ ipſius ſubam ingroſ/
ſauit qn̄q; vt fl'a vel ml'ia:deīde purgatiōe educat̄ cū far/
macia hūoris ꝓprij ſeceſſiua ſi ī īferiorib⁹ ſit: vel vomitia
ſi in ſupiorib⁹ ſit.Et ſi in vtriſq; eſt vtraq; abſciſiōe pre/
miſſa an̄cedentis ꝛ īfluentis ſanguis: ¶ Opꝫ ad reꝫ ſcđaꝫ
vt flegmonis curā ſcđo accedere.ſic aūt ꝑdictū eſt cū eūo
ne cāe cōiuncte influxe ad partē ꝛ aggregate in eo. cōplet̄
ēt cuꝫ cataplaſmabit̄ parti ſupappoſitis in ꝑncipio ex apo
cruſticis niſi in emūctorijs:ꝛ q̄ multiplicia ſūt vt virga pa/
ſtoris:mirtus:oliua ſilueſtris:portulaca:memithe: lēticu/
la aq̄:ſemꝑuiua ꝓprie ꝛ ſolatruꝫ cum eoꝝ ſuba vel ſucco:
oleo roſ.vel ex corticibus granatoꝝ vel balauſtiaꝝ deco/
ctis in vino cum aq̄ co mixto: vt nām mēbri mām repellē/
do ꝯſeruent:ſuppaddat̄ tn̄ aceti paꝝ:qm̄ ad vtrūq; ſeꝫ.
Optimū.n.eſt farmacū tale oēm q̄ſi itentōez quā gerim⁹
cōplens.repcutit.n.qđ ſuperfluit ꝛ īfrat ac trāſcurrit:ꝛ re/
currere fac̄ qđ iā īfluxū eſt:ꝛ in pticula ꝯtinet̄.Et.n.robur
in ponēdo ad vtrūq; cōplendū effic̄ ipaꝫ potentē vt plurī
mū.ꝛ q̄ cal'itatē extiguit q̄ doloris eſt cā ꝛ ſedat dolorē.ꝛ
ſi īdigeat fortiore illo adde illis.ſandal. acatiā: fauſel.iuſ/
q̄amū albū:ꝛ pſiliū:ꝛ herbā apatū.ꝛ iuuat̄ cū croco:miti/
.n.eaꝝ nocumentū ſtipticitate ꝛ cal'itate ꝛ ꝯfortādo corꝫ
ſua ſubtilitate v̄tutes adiuuat penetrare.Ꝙ ſi dolor forti/
ficet̄ augmēto apatis vt dicta repercuſſiua in ſedatōe ipſi/
us nō ſufficiāt:oꝫ ad ipi⁹ ſedatōez vacare ꝑus cū alijs opa/
tiuis auxilijs in qb⁹ tertia res ꝯphēdit̄ ad curā necaria q̄ ē
correctio accn̄tiū q̄ ad alia ꝓcedat̄ auxilia q̄ huic rei ꝯplē
de ſī opportuna.niſi.n.ꝑus ſedet̄ ī ꝓuocādo reuma flōnē
augmētabit ꝛ recurſuꝫ ēt ꝛ abſtractu māe ꝓhibebit ꝛ tra/
ctū. Jnq̄t.n.Abo.Cūq; ad diuerſuꝫ trahere volueris, loci
dolorē ꝑus ſeda. Jnſtare igr̄ ad ei⁹ ſedatōez opꝫ.Cōplebit̄
āt cū nō ſiccātib⁹ ſtipticis ꝛ ꝯglutinātib⁹ q̄ reūa retinēt ꝛ
īcuneāt ꝓhibēdo reſol'onē poroꝝ cuꝫ obſtructōe.ob quā
rē ſanguis itrāſpirabil' fact⁹ īflāmat̄ ꝛ retentus ebulit pti
culam magis ſubalterat ꝛ extēdit.ꝛ ſic auget dolorē.Sed
cū mollificātib⁹ poros ꝛ māꝫ īcuneatā ī apata pticl'a reſol
uētib⁹ abſq; attractōe cū cal'itate tpata:et hūiditate in q̄
mēbꝝ tractabile reddit:ꝛ feruorē caloꝝ obtūdit.ꝛ ſic cāꝫ
vtrāq; doloris tollit.ſ.malā ꝯplonē mēbri ꝛ ei⁹ extēſiōeꝫ.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0484-9
DFG

Qualia ſunt ex ſimplicib⁹ mellilotum: malua: biſmalua: ſemen lini: fenugrecũ. ⁊ ſilia q̄ in cura iuncturaꝝ ſũt dcã. Et q̄lia ſunt ꝯpoſita ex eis: ⁊ ex his q̄ ſũt ꝓpͣ farmaca per dulce vinũ vel coctũ: ⁊ oleo roſ. vel cera breuis in eis liq̄fa cta. oꝫ aũt tale farmacũ cũ lana ſuccida: yſopum hũidã q̄ꝫ plimũ hñtem applicare eſtate frm: hyeme vero tepidũ. Et ſilr cataplaſmata q̄ ꝑ arnogloſſaꝫ: ⁊ lentes: panẽ ⁊ oleũ ro. vel violatũ. Etiã oꝫ ponere ſupra patiẽtẽ ꝑticulã ſpõgiã vi no ſtiptico madefactã: aut aceto limphato cuꝫ frã. Et ſi in pͥncipio volueris regere cũ ſedatõe doloris ꝑꝑ magnitudi nem eius vbi p̄dcã apocruſtica dolorem mitigantia non ſuffecerint: miniſtrabis iſta. q̄ ſi iſta non ſuffecerint mini ſtrabis volubile. quoniam eſt vehemẽtis iuuamẽt i in pͥn cipio ⁊ ſtatu: ⁊ apiũ ⁊ ſilia q̄ cũ reſolõne ſtipticent ⁊ ꝓhibe ant ⁊ iſluxionẽ mãe. Et deiñ farmacũ: qđ ex faria aq̄ calã ⁊ oleo calõ cõmiſcet̃ ⁊ ſilia nõ miſtrent̃ in pͥncipio. ſũt. n. reumatib⁹ diſpõnib⁹ aduerſantia valde. Et ꝓinde añ euo nem ⁊ ſi videant̃ aliq̄liter mitigare: magis. n. trahũt q̄ꝫ re ſoluãt: ꝓinde dolorẽ cõiter magis augebũt talib⁹ auxilijs videbim⁹ geſcere flonẽ. Cũ aũt qđ ẽ velut bulliẽs flegmo nis ⁊ feruoꝛ ceſſauerit a mitigatiuis ſimplicibus ſecedere ad dyaforetica ideſt euapoꝛãtia trãſire opꝫ paulatiꝫ: q̄lia ſunt p̄dcã tẽperata vt camõilla ⁊ ſilia q̄ nõ moꝛdeãt. Cum n. mẽbrũ patiẽs in ſupꝑficie poſitũ ſit: ꝫ valde calã ⁊ acuta ſint dyaforetica moꝛdebũt illud applicata ⁊ dolebit non paꝝ ſi ſilr patit̃ ⁊ doleat: q̄re reuma ꝓuocabũt. ⁊ ſic flonẽ augmentabunt. Opꝫ ergo illa eſſe tꝑata: nec ẽt dure ſube ꝑꝑ eandẽ cãm: nec cũ digitis applicet̃ foꝛtiter vel leuiter vel tãgẽdo cũ pluma: qñ ſilr miſcebis eq̄liter ⁊ cũ venerit ad ſtõm illa augebis. in fine v̄o ei⁹ in declinatiõe pura ⁊ ſi ne mixtiõe illoꝝ aliq̄ miſtrabis. Et ꝯpoſita q̄ if̄ra dicent̃. Sꝫ in circuitu ſtiptica ⁊ ꝓͥpe dyafoꝛetica foꝛtia ſunt. Et ſi nõ reſoluat̃ ſuperq̄ꝫ ꝑticula appareat ſanies dimiſſis dya foꝛeticis ſaniãtib⁹ ⁊ maturãtib⁹ ẽ vtenduꝫ: q̄lia ſũt farina tritici vel oꝛdei cũ vino vel pſilio in capite ei⁹: vel cũ exic catiuis in circuitu: ⁊ alijs q̄ if̄ra dicent̃. Deide appente ſa niatõe cõpleta: oꝫ aperire cũ cauſtico farmaco: vel cutello ſi nõ timeat in loco emũctoꝛij ei⁹: foꝛtaſſe tñ oꝫ añq̄ꝫ ad ſa niãdũ deuenias: ⁊ ẽt reſoluendũ aperire ipm ſeu ſcarifica re ⁊ ſcalpellare ſeu ſãguinare vt mã effluat: ⁊ ꝓͥpe cum mã multa in apꝫte fuerit ꝯgregata ⁊ icuneata ꝑducẽs ad ſuf focationẽ mẽbroꝝ ꝑꝑ ſuffocationẽ caloꝛis nãlis ei⁹ a mul titudine vel malicia vt i alijs: vel ẽt cũ iſ̄ridãtia ad ſuper ceſſuꝫ ꝑuenerũt vt ſupͥ⁹ ⁊ poſt ſcalpellationẽ embꝛoca cũ aq̄ calã maris vel reliq̄s ſalſis. dyafoꝛetica. n. añ hec ſunt nociua ⁊ maxie ſaniãtia cũ putrefactiã ſint mẽbrũ magis ad putrefactionẽ adducent. cũq̄ꝫ apꝑueris euãbis ſanieꝫ: ⁊ cũ volueris vuln⁹ abluere mellicrato ⁊ vino mellito vten dũ. Cauẽdũ aũt ne aquã imittas vel oleũ: qñ aq̄ hũectat ipm cũ opoꝛteat exiccare ⁊ oleũ ſoꝛdidũ reddit. Sꝫ ſiq̄dẽ adhuc flonabit cataplaſma deniq̄ꝫ ꝑ lẽtes. q̄ꝛ repꝑcutiũt ⁊ reſoluũt tꝑate: ⁊ ſic flonẽ ſedãt ⁊ ceſſare faciũt: applicabis nõ flegmonati aliqđ farmacoꝝ qb⁹ in talib⁹ iciſiõibus ad mitigationẽ doloꝛis vtimur: applicãdũ: q̄le eſt quo vtunt̃ empici: ex vtraq̄ꝫ ſubã oua cõcuſſa adiuicẽ cõplica exteri⁹ imiſſa cũ vino vl̃ lana nõ ſuccida: ſꝫ molli. mitigat. n. iciſio nis doloꝛẽ ⁊ ꝓhibet reumatis iſluxionẽ ꝑꝑ doloꝛẽ. Deide v̄o ablutõe fcã imitte puluerẽ thuris ad exiccãdũ ⁊ ꝯſoli dandũ vel coꝛticũ ei⁹ ⁊ maſticis ⁊ ſiliũ. Adhuc ſupponere opꝫ exteri⁹ lanã vel linũ v̄io ſtiptico madefcm̃ iniectũ aq̄ ꝑmixto q̄ꝫtũ vtiq̄ꝫ poſſit bibi. vulneri v̄o nihil pinguiũ far macoꝝ afferri oꝫ: q̄le eſt macedonicũ ⁊ tetrafarmacũ ex farina aq̄ ⁊ oleo mixtũ. certiſſime. n. exiccari idigent ⁊ ꝑꝑ ſaniẽ ⁊ putredinẽ: ⁊ ꝑꝑ carnis regñationẽ ſi q̄ deꝑijt ⁊ ꝓͥpe in gñatõe ſaniei: ⁊ c⁹ mã eſt hũoꝛ crud⁹ ⁊ caro attrita: ⁊ ꝑꝑ cicatrizationẽ ⁊ ꝯſolidationẽ. Uñ. H. Nõ ſanant̃ vlcera ni ſi ꝑfecte ſeu certiſſime. ſ. q̄ꝫtũ ad p̄dcã oĩa exiccent̃: ita q̄ oꝫ ſanare eos q̄ in reumate flonũt.

¶ Quarto ꝯſiſtit in cu ra regiminis. ſit aũt regimẽ i dieta extenuatiua ad frm ⁊ ſic cũ vergẽs. Eos v̄o q̄ ꝑ modũ ꝯgõnis ſunt q̄ñq̄ꝫ fiẽtes cura rioꝛ auxilijs per oĩa cõſilib⁹ ẽm pl̄s ⁊ min⁹ dr̃ntib⁹ a p̄di ctis pͥmo euone vl̄i: flomia. n. i ſaniatõe p̄dcõꝝ pl̄s ꝯuẽit: i ſaniatõe iſtoꝝ min⁹. pl̄s ꝯuenit i ill̄: q̄ꝛ cũ ſꝑ in ill̄ p̄ſuppõa tur vl̄s replõ coꝛpoꝛis toti⁹ vel ep̄is: i iſtis q̄ñq̄ꝫ fit vl̄ nõ. Cũ. n. fiat a debilitate ꝑticule ex cã ꝓcatartica vel añcedẽ ti gñali imediata. ⁊ ꝓͥpe nõ ꝯuenit eis flomia niſi qñ cum mala q̄litate ſeu ꝯplõne ledẽte ipaꝫ fuerit ꝯiũcta p̄dcã re pletio: vel cã ꝓcatartica ſupꝑueniẽs iuenerit cã: ſꝫ illud eſt raro. ⁊ qñ ꝓinde min⁹ ꝯuenit ⁊ plimũ nõ min⁹ ꝯuẽit q̄ꝫ qđ ꝯuenit ſemꝑ: ꝓpͭa ſi opoꝛteat illã p̄termittere oĩo ꝑꝑ ma gnitudĩeꝫ ⁊ malitiã apꝫtis in vtriſq̄ꝫ nõ exĩte hũoꝝ abũ dantia: ſꝫ cũ moderatiõe in iſtis mĩoꝛis q̄ꝫtitatis eẽ dꝫ q̄ꝫ i illis ꝑꝑ eãdẽ cãm ꝓͥpe: q̄ꝛ vbi mã influit maioꝛis q̄ꝫtitatis eẽ p̄ſumitur: q̄ꝫ vbi ſolũ extitit gñata: cũ illic nõ in tm̃ iſlu ens ſit: ſꝫ ẽt gñata. h̄ v̄o gñata ſola.

¶ Scđo i ꝑticlari euo ne nõ taꝫ ꝑ recurſum q̄ꝫ ꝑ extractũ de ꝑte patiẽte. q̄ꝛ repꝑ cuſſiua ſtiptica ⁊ attractiua euãntia ⁊ dyafoꝛetica ⁊ ẽt ſani antia in iſtis mĩoꝛa ⁊ leuioꝛa eſſe oꝫ q̄ꝫ in illis ꝑꝑ eãdẽ cãꝫ. Regimẽ vero ei⁹ ex p̄cedẽtib⁹ eſt manifeſtuꝫ: ⁊ ẽ vt in oĩ bus ad frm ꝯuertat̃ ⁊ ſiccũ.

¶ Repꝑcuſſiuũ efficax ⁊ exꝑ tuꝫ ⁊ cõe in oĩb⁹ ſatis tꝑatũ. ℞. aq̄ ro. ꝑtes. iij. aceti al. ⁊ bo ni ꝑteꝫ. i. olei ro. ꝑtes. ij. ꝯq̄ſſent̃ ſilr ⁊ cũ ſpõgia peciola du plicata in eis madefcã epithimet̃ ⁊ inouet̃ freq̄nter. ⁊ qñ q̄ꝫ expedit aliquẽ ex ſuccis p̄dictaꝝ herbaꝝ addere ill̄ ꝑꝑ doloꝛis ⁊ iſlõnis magnitudinẽ.

¶ Dyafoꝛeticuꝫ emplm̄ ꝯueniẽs ⁊ exꝑtũ. ℞. floꝝ camõille: aneti: fenu. añ. ℥. i. radi cũ yreos. ℥. ß. decoq̄nt̃ in v̄io: ⁊ deide terant̃ ⁊ ꝯficiant̃ cũ melle ⁊ emplent̃ ⁊ addat̃ paꝝ croci. Emplm̄ ex fecib⁹ olõ rũ dcõrũ eſt efficax ⁊ exꝑtũ.

¶ Emplm̄ cõe ⁊ exꝑtũ i ma turatõe ⁊ ſaniatõe flonũ. ℞. folioꝝ malue: radicũ malua uiſci: radicũ lilij al. q̄ ſũt ſic̃ radix allei in coloꝛe ⁊ foꝛma ⁊ eſt liliũ domeſticũ. añ. ꝑtes eq̄les bulliãt in aq̄ ⁊ cõterant̃ cũ aſſungia putrefacta vel butyro ⁊ ẽplet̃.

¶ Emplꝫ cõe ſatis ⁊ exꝑtũ in maturatõe ⁊ mũdificatõe flonũ aptoꝛuꝫ. ℞. farine tritici. ℥. iij. aſſungie: olei cõis. ana. ℥. ij. mell̄. ℥. ij. croci. ʒ. i. bulliãt ſilr in olla dõec ꝑfecte miſceant̃. deide au ferat̃ ⁊ vſui reſeruet̃: ⁊ cũ oꝫ extẽdat̃ ſuꝑ peciola ⁊ ſuppo nat̃ ⁊ appꝛẽhẽdat vlcus ⁊ totũ flonẽ mũdificatõe fcã perfe cte abluat̃ cuꝫ vino ſtiptico tepido ⁊ repleat̃ vlc⁹ peciolis ⁊ filatis ⁊ deſuꝑ emplm̄ apoſtolicon ſupponat̃. Et finalr cũ puluere gallaꝝ deſuꝑ ꝯtrito cicatrizet̃.

¶ Ca. iij. de apꝫte glandulaꝝ ⁊ flone eaꝝ ⁊ medicis eius.

Glandule ſunt mẽbꝛa carnoſa ad modũ glãdis ro tunda rare ſube alijs mẽbꝛis diſtĩcta ⁊ in vacuita tibus eoꝝ poſita hñtia velamẽ durũ. Quaꝝ q̄dã ſunt opatões faciẽtes q̄dã iuuamẽtũ p̄ſtãtes: ⁊ ſi nõ opera tionẽ faciãt ſic̃ p̄me. Jngt. H. vnũq̄dq̄ꝫ membꝛoꝝ: ⁊ ſi nõ faciat opationẽ: tñ efficit iuuamẽtũ. Opatões v̄o faciẽtes ſunt glandule teſtiũ in gñando ſꝑma: ⁊ mamillaꝝ i gñan do lac. ⁊ q̄ ſunt in radice lĩgue in gñando ſaliuã: ⁊ q̄ ſunt in radice v̄ge in gñando hũiditatẽ cõtẽꝑãtẽ acumẽ vrine: q̄ nomẽ ꝓpͥũ nõ hñtes ſicut p̄miſſe noĩate ſunt glandu le noĩe gñali: de quaꝝ apꝫtibus dictũ eſt ſupra in ſectiõe p̄ma: vbi de gñe officialiũ mẽbroꝝ exeuntiuꝫ ad p̄dictas opationes cõplendas a nã ſunt oꝛdinate. ⁊ ꝓinde nõ ſim pliciter glandule ⁊ in abſtracto ſunt dicte: ſꝫ mẽbꝛa glan doſa in cõcreto. q̄ꝛ velut officialia hñtia ꝯmixtos neruos ⁊ plurimas arterias. Facientiũ aũt iuuamẽta q̄dã ſunt glandule emunctoꝛioꝛum membꝛoꝝ pͥncipalium que fa ciunt iuuamentum in receptione ſuperfluitatum ipſoꝛuꝫ nomen aderie proprium aſſumentes tanquam ad reci piendum apte ꝓpter debilitateꝫ ⁊ ſpongioſitatẽ ipſaruꝫ.

Ingt.n.Abo.quedã ſunt ĩteruacuitates alioꝝ mẽbroꝝ q̃ꝫ
plurimum corporis diffuſe ad replendum vacuitates ipſo
rũ mẽbroꝝ:⁊ recipiẽdũ cũ expedit ſupfluitates eoꝝ ⁊ ner
uoꝝ pãniculoꝝ muſculoꝝ:arteriaꝝ ⁊ venaꝝ q̃ illis ſũt for
tiora. Ingt.n.H.ſingulũ mẽbroꝝ cũ debile fuerit: vicini
ſui recipit ſupfluitates. ⁊ tñ qꝛ noĩe ꝓprio carẽt noĩate ſũt
noĩe gñis.i.glãdule.de q̃rũ apatib⁹ hic ĩtẽdim⁹ vt ꝯſimiliũ
mẽbroꝝ tãq̃ꝫ nõ hñtiũ ꝑdictaꝝ opationẽ.Accidit ergo eis
⁊ magis:⁊ ad ei⁹ dãs apã p modũ ĩfluxiõis plĩmũ ſupflui/
tatũ a ꝑdictis mẽbris pncipalib⁹ ⁊ fortib⁹:⁊ q̃ñꝫ p viaꝫ cri/
ſis: vt cũ vt⁹ pncipaliũ facta potẽs ſupra mãꝫ diſpõnũ ſua
ruꝫ ꝓpꝭ illã p viã deriuatiõis mittẽs ad illas nõ potẽs ex/
tra corp⁹ expellere:⁊ q̃ñqꝫ p viã ſinthomatis.vel qꝛ multi
tudine ⁊ malitia nãe ĩ mẽbris ꝑdictis exñte q̃ cogunt̃ ad il
lã imittere nõ potẽtia extra expellere ꝑꝑ aliq̃ꝫ cauſaꝝ ꝑdi
ctaꝝ ĩ caplo gñali. vel qꝛ vlcus ſit,ĩ aliq̃ extremitatũ cor/
poris.puta pede:brachio:ſeu hũero aut mãu: aut dolores
ad qd tracte ⁊ ĩmiſſe ſupfluitates trãſeũtes p illos exñtes
ĩ via facile ibibunt̃ ĩ eis: ⁊ ꝓpꝭ ĩ arteriys que cũ nõ valeãt
eos a ſe expellere remanẽt ĩ eis:⁊ gñant apa. Qd gd diuer
ſuꝫ ẽ ĩ ſpẽ ꝫꝫ diuerſitatẽ mãe eis ab illis ĩfluxe. Qꝫ.n.ĩ ade
nis fit plurimũ eſt ſanguineũ vt ẽ cor ⁊ epar ꝓprie:⁊ q̃ñqꝫ
flẽcũ cũ mittit̃ a cerebro illis. Qꝫ vͦ ĩ aliys fit glãdulis plĩ/
muꝫ ẽ flẽcũ eo ꝙ mẽbra a qb⁹ mã illis imittit̃ ſint nãe fre
quoꝝ cib⁹ nõ bñ digerit̃:⁊ ſic ꝓculdubio in flẽa ꝯuertit̃ vt
ſupra plĩes dcm̃ eſt.⁊ q̃ñqꝫ ſanguineũ cuꝫ a muſculis illis
ĩmittit̃.Et qdẽ ĩ eis oĩb⁹ apa:aut ſeruat ĩflãmationeꝫ:⁊ dr̃
flegmon ꝓpꝭ:aut vindimia ꝫm diuerſitatẽ mãe:aut in ſcli
roſim vertit̃:⁊ duriciẽ:⁊ dr̃ ſcrophula:aut bociũ.de qb⁹ oĩ/
bus ẽ p ordinẽ ꝓcedẽduꝫ.⁊ hoc ꝓpꝭ de eaꝝ apate ſeruãte
naturã flegmonis: de aliys vͦ ĩfra:⁊ pͥmo de ſignis.ſcdo
de cura.❡ Signa vͦ ſunt manifeſta eo ꝙ exterius poſita
ſunt in ꝓpriys locis nota:in qbus manifeſte ſunt tumores
apparentes cum rubore:dolore:⁊ feruore adeo ꝙ extẽdit̃
quãdoqꝫ vſq; ad cor:⁊ fit effimera febris: vt ſuperi⁹ dictũ
a eſt. Cura vͦ flegmonis glãdulaꝝ:vt adenaꝝ:⁊ aliaꝝ ẽ ſic
cura flegmonis ꝑdicte lacertoꝝ ⁊ carnis: differẽtis tñ ĩ re
percuſſione.nam oĩa ab abſciſione ſuccedẽtis cauſe ꝑꝑ re/
ꝑcuſſiua ſunt hic neceſſaria ꝑmittẽda: deinde ſubiũgen/
da dolorẽ ſedantia ꝓprie dicta ex lana ĩfuſa in oleo calido
pͥmo ſuppoſito.deide addito in fine eius ſale:donec ſedet̃
dolor:ex quo etiam ꝯſuetum eſt apoſtema ceſſare.Deinde
ꝓcedendũ eſt ad curã apatis ⁊ euonẽ cãe ꝯiuncte ĩcunca/
te in pte ⁊ repcuſſiuis obmiſſis eis cũ reſolutiuis ẽ ꝓcedẽ
dũ ⁊ attractiuis quocũq; mõ ⁊ cũ emplis rubificãtibus ⁊
ventoſis.Et ex appropãtis ꝯuenientib⁹ talibus apatibus
poſt aures factis ẽ emplm factũ ex abſinthio ⁊ foliys myr
te cõtritis vel ex foliys lauri ſolatro.⁊ ſi ſit in radice auris:
cõfert viſcoſitas limaciaꝝ ⁊ butirũ ĩmiſſuꝫ ⁊ lĩgua arietis
ſi ſit calidum:deinde cum maturantibus ⁊ ſaniantibus ſi
opꝫ. deĩde cũ aptõe cũ farmaco caſtoreo vel alio ruptorio
vel ex nouacula:Sit aũt ĩciſio ⁊ aptura vniformis p trãſ/
uerſum in lõgitudĩe cruris fcã.repercuſſio.n.in talib⁹ ĩ pn
cipio miſtrata cũ ſtipticis ſuppoſitis valde eſt mala ⁊ ꝓpꝭ
cũ per modũ:⁊ viã criſis eſt flegmon ⁊ ĩ adenis: qm̃ tũc ĩ/
pedit opationẽ nãe nãliter opantis:quã ſi expedit oꝫ iuua
re cũ attrahẽtib⁹ ꝑdcis:⁊ aliys q̃ ſupra diximus ſectiõe pͥma
in cura apatuꝫ nõ ĩpedire ⁊ mãm repellit ad pncipalia ꝑꝑ
cõitatẽ in via ſic adene repercuſſiõ nõ repellet ad illa niſi
fortis ſit:quo cãu nõ repellet ab illis ad pncipalia ꝓpꝭ:ſed
ad ĩteriora ⁊ vicina nobiliora eis. Si quoq; flegmon ſit p
modũ ſinthomatis vt ꝑꝑ multitudinẽ mãm ⁊ malitiã ei⁹
repcuſſio eſt nociua valde:⁊ maxĩe ſi nõ ꝑceſſerit multitu
dinis euo ⁊ repcuſſio fortis ſit: qm̃ repercuſſio: tũc fiet ad
pncipale ĩteriora vel vicina nobiliora.ſꝫ ꝑmiſſa tũc euone
⁊ tractiõe ac driuatõe ad oppoſitũ mẽbri pncipalis ne mã
augeat ſua multitudine apa ⁊ corrũpat mẽbrum bubonis
miſtrabis diaforetica ſeu mollificãtia ex farina tritici vel
ordei cũ aq̃ ⁊ oleo addito cũ melle.Et ex ꝓpriys cõibus oĩ
bus eſt cicer ⁊ farina ei⁹ nec timebis tũc de augmẽtatiõe
apatis per diaforetica:nec de repulſione ad pncipalia:qm̃
euo ⁊ deriuatio ſecurat ab illis niſi ĩ adẽis flegmõ exiſtat
Si vͦ ſit ꝑꝑ vlcus alic⁹ eoꝝ ſedabis dolorẽ vlceris ꝓut ĩ/
fra dicet̃ ⁊ mũdificabis ipm ⁊ ſup apa mollificãtia miſtra
bis.Si vero apa ſit vndumioſum cognoſcet̃ ⁊ curabit̃.ſic
ĩfra de cura vndimie dicet̃:⁊ eſt huic dicte ꝓxima:tñ dĩns
in q̃to.nã oꝫ diaforetica eſſe fortiora in hoc ⁊ ẽt ſaniãtia ⁊
alia q̃ ſequunt̃ ad illa vt mũdificãtia ex qb⁹ ꝓpriũ eſt fex
olei:qd mũdificat apata in glãdulis:⁊ ꝓpꝭ cũ foliys ſuis ⁊
dolorẽ ſedantia leuiora vel nõ neccaria ⁊ vlceꝝ cõglutinã/
tia.Si quoq; in ſcliroſim ꝯuertat̃:⁊ maxĩe qd vndimioſũ
ẽ curabit̃ ſic ĩfra dicet̃ de ſcrofulis.⁊ caplo de bociys de q̃
bus ĩfra dicem⁹ ſi xp̃s ãnuat q ſit bñdict⁹.⁊ vltĩo regimen
dcm̃ in cura illis eſt miſtrãdũ ⁊ diuerſum ꝫm nãm mãe.
❡ Emplm exptũ ad diſſoluẽdũ apa glandulaꝝ nõ ſcliro
ticatũ. Rꝫ.herbã q̃ dr̃ ſpargula:c⁹ folia ſũt aſpera ꝑuo ĩ mo
dum ſtipitis poſita.⁊ ſilr ſtipes ⁊ ꝓlongat̃ p palmã.Et te
re ⁊ fac bullire in vino limphato cum aſſungia porcina ⁊
ſuperpone precedente euacuatione.

❡ Caplm.iiij.de flegmone,qd antrax dicitur ac carbũcu
lus ⁊ medicinis eius.

Ntrax ẽ apa paruuꝫ ad modũ puſtule ſeu bothor
a in pncipio fraudulentũ ⁊ venenoſum cõburens ⁊
corrũpẽs pticulã cui accidit vlcerãdo: ⁊ reliq̃s ad
iacẽtes ĩflãmando ⁊ vlteri⁹ corrodẽdo. ⁊ petens antrũ.i.
corporis abſconſum:⁊ ꝓpꝭ cor a ꝓprietate venenoſitatis
ſue ⁊ potẽtia cõiunctõis in pte:q̃re dcm̃ eſt antrax: ⁊ ꝓin/
de paruũ eſt apa debilitatẽ opat̃ pulſum tremorẽ ⁊ ſinco/
pim:⁊ deide occidit.Qꝫ aũt expulſioneꝫ ei⁹ mãe in pticula
a nã negerat facere:⁊ ſi pncipalibus ꝓpingor eſt eo ꝙ diſ
ſoluta erat in corpore tũc.⁊ ꝓinde debilis vͥtutis exñs re
gulabat̃ melius a nã.Carbũculus aũt eſt ſpẽs ei⁹: ſꝫ mino
ris malitie.Et cã ei⁹ eſt ſanguis groſſus ⁊ malus.qꝛ aduſt⁹
ex aduſtiõe.n.acq̃ſiuit groſſiciẽ ⁊ malitiã nõ ex mixtione.
Et q̃ñq; per aduſtionẽ acq̃ſiuit citrinitatẽ:q̃ñq; viriditatẽ
⁊ varie colore.q̃ñq; nigredinẽ ꝫm diuerſitatem aduſtiõis
ſue.cuꝫ.n.ſanguis bon⁹ eſt:⁊ nãe benign⁹ ceteris hũoribus
fit iuuãtior: cum vͦ a nã recedit fit malus.⁊ quãto magis
recedit fit maioris malitie ſic dcm̃ fuit ſupra in ſectõe pͥ
ma.caplo de ſuffocatõe mͥcis a ſeie fcã. Cũ igit̃ ſanguis
adurit̃ a nã multũ recedit ſicq; vehemẽtẽ acq̃rit malitiã
venenoſã.⁊ ſic qdẽ ita groſſus ⁊ ita exiccat⁹ cũ mlta calita
te ĩfluit alicui particule repẽte ⁊ ſilr colligit̃ in ei⁹ vacuo ⁊
cõburẽdo ſtatiꝫ vlc⁹ faciẽs eſcarã operat̃ ꝙ circũ adiacẽ
tes partes oẽs in tumorẽ flegmonoſũ cũ ebullitõe eleuat
vt ẽt febriat patiẽs ⁊ illud ꝑꝑ ſanguinẽ tractũ ad locũ vl/
ceratũ ex dolore horribili. ẽ.n.horribilr doloroſũ.Et nõa
tur apa hoc vlceratũ antrax latĩe cõbuſtio.Cũ ergo ſãguis
ille groſſus ⁊ venenoſus ebulliẽs nõ fuerit ſicc⁹ vt ꝑdictũ
eſt:ſed aliquos liquores ſubtiles remiſſos hẽat influx⁹ ad
particulã in ſupficie ei⁹ veſicas erigit ſiles ei⁹ qui ab igne
coctus exiſtit:qb⁹ corruptis eſcaroſuꝫ ab eis vlc⁹ ꝑficit̃ ⁊
eſt carbũculus minoris malitie q̃ꝫ antrax ꝑꝑ liquores ad/
mixtos obtũdentes acuitatẽ ab aduſtiõe adeptã ⁊ eſt hñs
iudicia ex pte coloris ⁊ pticule ſeu loci ⁊ diſpõnis ei⁹.colo
ris qdem.nã qd eſt nigri coloris ſeu liuidi vehementioris
eſt malitie. Vñ cathelani blaſſemantes dĩt buba nigra.
deide viridis:deiñ citrini.Ex pte pticule cui accidit ſeu lo
ci.nã qd eſt in extremitatib⁹ magis mĩoris ẽ malitie: ⁊ q̃
to magis eſt in corpore ⁊ in partibus ꝓpinquioribus pnci
palibus:⁊ in emũctoriys eorũdẽ malignũ eſt magis ex par
te diſpõnis loci:nã ſi pars vel loc⁹ aptõis ei⁹ exiccat⁹ fuerit

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0486-1

malus eſt. ſi vero nõ exiccatus fuerit minꝰ malū eſt. Et ſi
oĩa diſpõne colore ⁊ loco cõueniant in malo peſſimū erit
⁊ mortale. Jngt hyp. in p̃mo pnoſticoꝝ. Si in egro corpo
re fuerit antrax aut carbūculus ſiue pceſſerit ſiue egritu/
dini ſupuenerit opꝰ eſt attēdere ſigna q̃ ſequūt. Qꝛ ſi exic/
catus locꝰ fuerit ⁊ colorē viridē hūerit vel citrinū vel liui
dum ptulerit mortē pximā dicit. ¶ Et ſigna vniuſcuiuſ/
qꝫ ppa ⁊ diſtincta ex dictis colligere poteris inſil'r ſi volue
ris. ¶ Cura vero eiꝰ in gnqꝫ rebꝰ exiſtit. Jn euõne omnis
replonis cõis. Cõplet vero cū fl'omia perducēte ad defe/
ctionē mox cū apparuit abſqꝫ oĩ dilatatõe ſi cõditões ade
rint opportune antipaſi ſeruata. niſi trāſitus fiat ſup pnci/
pale. pſeruat. n. a magnitudine fl'onis circūſtātes particu/
las: deīde cū purgõne humoris aduſti. Scõo cõſiſtit circa
euonem particularē ptis ſeu mãe apatis. Cõplet aūt cum
ſcarificationibꝰ pfundis pp groſſiciē triſtantis hūoris vt
trahat extra. ⁊ cū cauteriçatione vlceris eſcaroſitata q ca/
dat cauteriçatio ſupra ipm tantū ⁊ circū adiacētes partes
flegmoniçātes nõ tāgat. iutil'r. n. cõbures ⁊ nõ abſqꝫ nocu
mentis. qδ gdem inuit Gal. dicēs. Nullus igr dabit illud
qδ afferat nullā vtilitatē. nocumētū vo hꝫ ſecum imēſuꝫ.
Cauteriçabis gdeꝫ cauſticis farmacijs ex acutiſſimis igni
ſitibꝰ. ſic ex vitreolo ex limatura eris aduſti arſenico calce
⁊ ſandaraca ſil'mixtis. ⁊ cõburit ſil'r igni. Qꝛ ſi grādis eius
malitia appuerit vt nꝫ illa in adurēdo ſufficiat ⁊ ppe ī an/
trace: igne cõbures: ⁊ qñqꝫ cū cādela ardente ſup effuſa. ⁊
qñqꝫ cū ferreo vel cū aureo iſtrumēto ignito ſup imiſſo.
talis enī cauteriçatio pprie mãm venenoſā a pfundo cor
poris ⁊ a pncipalibꝰ ad locū appropriatis trahit potēter. ⁊
tractā qñqꝫ inſenſibil'r effluere facit extra vt cuꝫ egredit
attramētuꝫ videat: ⁊ qñqꝫ iſenſibil'r reſoluit ⁊ cõſumit: vt
deīde nõ extendat corruptio: ⁊ periculū ſue malitie euite/
tur. Et pinde nõ tardet gn ſtatim euone vl'i p̃miſſa hmõi
cauteriçatio fiat. Dilatio. n. ipſius pducit ad morteꝫ feſti/
naꝫ. ⁊ pinde cõſequēter ⁊ feſtine herbā ſcabioſaꝫ: quā ma
ter mirifice cõmēdauit cõtritā ſimpl'r emplābis cū inoua
tione frequēti a ppetate antracē ait necat in tribꝰ horis.
Et pinde ſi ſuccus eiꝰ eis tribuas citiꝰ ⁊ tutius opaberis. ⁊
maxie ſi cū eo lutū ſigillatū imiſceas vel tiriacā niſi inflā/
matio ɔdicat. ¶ Tertio cõſiſtit in accñtiū correctiõe. cõ/
plet āt vt ſi rubor dñet ⁊ mlta iflāmatio: cū dolore ardēte
ī loco cauteriçato ⁊ adiacētibꝰ ptibꝰ: tū pp nām mãe vene
noſe pncipalis ⁊ attracte: tū pp nām ignis vel farmaci cau
ſtici additi cuꝫ farmaco dulci remittat: qδ fit ex pane cli/
banaceo ⁊ vino acetoſo vel arnogloſe ſucco vel decocta lē
ticula cuꝫ pane in aceto. Et ſi tumoris magnitudo exiſtat
cum vino gdeꝫ ſtiptico: deinde aūt cum aceto ⁊ ɔñter ca/
taplaſmabis orobi farina ſup cuꝫ oximelle nõ ſup vlcꝰ: ſꝫ
circa ipm: qꝛ mordēt. hec. n. farmaca extiguūt feruorē ⁊ ar
dentē dolorē atqꝫ extenuāt tumorē ſua ſtipticitate nec cū
ea mãm repellēt ad iteriora. ſ. pncipalia: ſed cū ſint ethero
genea extinguūt ſua tēperata ſtipticitate vel remittūt fer
uoreꝫ iflatõeꝫ ⁊ ardorē: ⁊ admixta calitate illā trahūt ⁊ re
ſoluūt iſtuxā mãm ſic ne aliqd repercutiat ex eis. Sꝫ far/
maca ſaniantia nullatenꝰ talibꝰ oꝫ afferre ne putrefactio/
nē in pricula augeāt. Jngt hyp. in affo. Calim ſanieꝫ faciēs
nõ oĩ vulneri opportunū eſt ad ſalutē. vlcus vo: qδ ipreſſit
corrigat ⁊ regat regimie vlceris maligni fraudulēti corro
ſiui qδ ifra dicet. Et ſi δbilitas pulſus ſeu tremor aut ſin/
copis ex fumo ſue malitie venenoſe cor attigere cõtingat:
cū cõfortātibꝰ cor ⁊ alia pncipalia ex friis ⁊ ſtipticis notis
intus ⁊ extra approximatis auxilijs adiuuet. ⁊ cū deriuāti/
bus fumos venenoſos ⁊ eoꝝ mãm. et cū fricationibꝰ. liga
turis cõpiſſiõibꝰ doloroſis ⁊ vētoſatõibꝰ q̃ ſupra in ſectiõe
p̃ma ſunt dcā. ¶ Quarto cõſiſtit in regie ⁊ ē vt regat aere
ſalso tēperate reſoluēte mãm: nõ tñ multū ne phibeat re/
frigeriū in iteriorībꝰ ⁊ nobilibꝰ iflāmatis moueat ⁊ parū
geſcat: vt mā ſemp trahat ad extra ⁊ reſoluat: ⁊ pinde vi
gilet nec dormiat niſi paꝝ vt ſemp mā trahat ad exterio/
ra nõ reuocet ad iteriora. Jngt. n. G. ſonꝰ ⁊ vigilie reuoca
tiõe caloris nālis cū hūoribꝰ ad iterius exteriꝰ fiūt. Et p/
inde tota die vigilet ⁊ maxie hora noctis p̃ma q̃ multū cõ
ſueuit nā puocari ad ſonū. ⁊ regat cū clamoribꝰ ſonis acu
tis ⁊ fortibꝰ ⁊ alijs expergefaciētibꝰ dcis ī litargia vſqꝫ ad
horā matutinalē ſanguis q acuti hūoris eſt frenū. minore
tur cibꝰ: ⁊ potꝰ ſit ex friis ⁊ humidis abſtergentibꝰ paꝝ nu/
trientibꝰ ⁊ a pncipalibꝰ repellentibꝰ: q̃lis ē kiſt ordei ⁊ oſa
in pncipio: aq̃ ordei ⁊ granatoꝝ ſuccus ī pceſſu: ius carnis
⁊ ſilia. Et ɔfortet verbis ⁊ ſuaſiõibꝰ cite ſalutis. Et ex cõi/
bus cū pprietate ex ſimplicibꝰ in expulſiõe venenoꝝ et
mãꝝ venenoſaꝝ eſt coagulū edi agni pulli cerui vel vitu/
li ſūptū cū vino ⁊ lutū ſigillatū cū vino ⁊ linitū cū aceto: ⁊
ſemen citri cū ex eo ſumunt. ʒ. ij. cū vino thure ⁊ aq̃ calida
Et ex cõpoſitis iteriꝰ approximādis ē ficꝰ ſicca cū ruta cū
nuce vel auellana ſūpta. Et ex iteriꝰ ſūptis ⁊ exteriꝰ linitis
eſt tiriaca ⁊ exteriꝰ ē aleū cū auellanis ⁊ pipe emplātum.
¶ Quito ɔſiſtit ⁊ vltimo ī cura vlcerꝫ maligni ⁊ corroſiui
q̃ ifra deo dāte dicet. ¶ Medicamē efficax ⁊ exptuꝫ va/
lēs ī pncipio antracis cū apparuerit nigra mortificās ipſaꝫ
℞. vitellū oui: ɔfice cū ſale trito. ⁊ extēde ſup peciolas ro
tundas ad modū carleni: ⁊ ſint nouē vel. xij. que ſucceſſiue
vna poſt aliā applicet: ⁊ vnaq̃qꝫ moret in loco p horā. Se
quētibꝰ vo diebꝰ cū attractiuis ⁊ mūdificātibꝰ medicet.

¶ Ca. v. δ fl'one qδ ſpīa dr clauꝰ ⁊ furūculꝰ. ⁊ medicis eiꝰ.

Dimia eſt apa flegmonicum ex ſanguine bono ⁊
a ſubtili a corpe ifluxo ad ſubcutaneas ptes: ſꝫ ſub/
tilitate ſuē nõ remanet ī carne: ſꝫ ptrāſit ad cutē
⁊ colligit in ſuis poris dēſatis: vt neq̃at expirare. Et ſigna
eiꝰ ſūt: nā ē tumor eiꝰ paruꝰ ſine pulſatiõe: ⁊ color rubeꝰ: ⁊
doloris acuti pungitiuꝰ ad modū pūctõis ſpine. q̃re dcm̃ ē
ſpina. Aliq dicūt illud clauū. aliq furūculum. aliq ademe/
nul. Et cura eiꝰ eſt cura fl'onis carnis. ⁊ muſculoꝝ dicta q̃
nõ ē ptermittēda: cū qñꝫ ex errore amplıet ⁊ deueniat ad
apa magnū. Cõplet aūt p̃mo cū euonibꝰ. minoribꝰ tñ ī q̃n/
to: eo q huiꝰ mā minor eſt. ex fl'omijs ⁊ farmacijs: qm̃ ſt
efficaciores in reſoluendo ⁊ faciendo ceſſare illa a multi/
plicatõe ipſaꝝ. ⁊ ex eis eſt rarefactio cutis ventoſatio ī dor
ſo: ⁊ naribꝰ. ¶ Scõo cū pticularibꝰ ⁊ localibꝰ remedijs ex
repellentibꝰ ī pncipio vſqꝫ ad tertiū dieꝫ. deīde cum reſol/
uentibꝰ. q ſi non reſoluat: qδ raro accidit: illō maturet. ⁊
ſi difficulter veniat ad pus ⁊ caliditas eiꝰ eſt grauis: tūc fle
botoma venaꝫ q̃ ibibit ipm. deīde ventoſa locū: ⁊ nõ agas
illud ī pncipio qm̃ egrediet ſanguis ⁊ hūor virulētꝰ. ⁊ reti/
nebit groſſus: ⁊ fiet illud vlcus durū. cūqꝫ maturat: ⁊ non
aperit: perfora ipm aut cū medicis aut cū ferro. Et de re/
percuſſiuis cõuenientibꝰ eſt oleū ro. cū aceto ⁊ lacte. Et ex
reſoluentibꝰ cõueniens eſt emplm̄ de paſſulis cuꝫ melle ⁊
floribꝰ camomille ⁊ baurach. Et de maturātibꝰ cõueniens
eſt frumentū maſticatū: emplātū: ⁊ ficꝰ ⁊ paſſe cū melle. ⁊
ſilia. Et ex rūpentibꝰ bonū eſt emplaſtꝝ qδ fit ex ſeie lini
fimo colūbino ⁊ fermento. ¶ Tertio cū diete ordinatiõe
debita: put cpibꝰ eiꝰ conuenit: ¶ Quarto cū accñtiū corre
ctione doloris ⁊ alioꝝ q̃libꝫ ſi oꝫ. ¶ Cõe maturatiuū ipſiꝰ
℞. ſe. almaru. triti: pſilij: añ. ℥. i. lactꝫ fici. ℥. iij. fenugreci: ſe.
lini: añ. ʒ. v. fermenti acetoſi. ℥. i. olei. ℥. i. ⁊. ſ. decoq̃nt in la/
cte ⁊ admiſtrent qm̃ maturat ⁊ aperit. Jngt dyaſ. fermen
tū de faria frumenti qñ decoquit cū ſale maturat clauos
⁊ aperit os. Et ſimiliter naſturtiū emplaſtratū.

¶ Ca. vi. δ carbone ſeu pruna: ⁊ igne: pſico ⁊ medicis eiꝰ.

Arbo ſeu pruna ⁊ ignis pſicꝰ pprie ex apãribꝰ par
c uis ad formaꝫ. ⁊ q̃titatem lupini male morigera
tionis ſunt ⁊ vētoſis pducentibꝰ ad defectionem:

⁊ ſincopis veſicam: ⁊ in principio: ⁊ eſcaram faciẽtes ⁊ par
ticulaꝫ corrũpẽtes ſeu putrefaciẽtes ipſaꝫ cũ fetore plimo
ↄnigrãte: qꝛ dcm̃ ẽ carbo ſeu pruna. Et deiceps ẽt ãbulãtes
de gñe carbũculoꝝ dĩntes ab eis. qḋ ẽ. qꝛ i illis ẽ mã ſan
guis groſſus aduſtiõe malus: i iſtis vo mã ẽ ſanguis ſubtil
coleric⁹: aduſtus vel col'a aduſta mixta melie ꝑpe gñata
ex ſanguis ſubtilis ⁊ calidi corruptiõe ſic i peſtilẽtia qñqꝫ
ↄtingit. Differt ẽt i añceſſiõe ⁊ colore. qꝛ hic antecedit pru
rit⁹ ⁊ color ẽ niger vt carbo. Illi vo nõ ꝑcedit prurit⁹ ſemp
⁊ color nõ ẽ ſp niger: ſꝫ qñqꝫ rube⁹: qñꝫ citrin⁹: qñꝫ viridis
⁊ iter ſe ſũt dĩntes cũ colera dñat melie i tali aduſtiõe dr
ignis pſic⁹. Et tũc videbis nigredinẽ i eo cũ quodã ſplẽdo
re: ⁊ ẽ cõburẽs ſupficiẽ ⁊ cutẽ magis ãbulãs ⁊ corrodit eã:
⁊ corroſio ei⁹: et mot⁹ ẽ velocior ad moduꝫ eriſipile ⁊ for
mice. Cũ vo melia dñat col'e: color erit niger pſſus cũ ſicci
tate mẽbri ad modũ carbonis: qr ſic noiat⁹ ẽ: ⁊ ei⁹ cõbuſtio
⁊ corroſio ẽ ꝓfundior. qꝛ i carne nõ tm̃ i cute: ⁊ ẽ tardioris
mot⁹: ⁊ ſũt hñtes iudicia ex pte diſpõnis: ſeu nãe mẽbroꝝ.
Nã q̃ accidũt i carne velocioris ſt reſolonis: q̃ vo i neruis
tardioris: ⁊ accidũt qñqꝫ cũ peſtilẽtia: qñqꝫ ſine ea. ⁊ qñqꝫ
ſumunt cõiter ad carbũculũ ⁊ eriſipilã vlceroſaꝫ comeſti
uã: ⁊ ambulãtẽ. Ex qb⁹ cãe ⁊ ſigna ſũt manifeſta. Et cura
ei⁹ eſt ꝓrima cure carbũculi cũ eũone vẽ ꝑcedẽte flõmia
educẽte ſanguinẽ colericũ aduſtũ multũ vſqꝫ ad ↄfectõeꝫ
cũ tolerat virt⁹ ⁊ etas. ⁊ cũ eũone ptis apate: ⁊ mãe icunea
te i ipſa. Cõplet aũt cũ ſcalpellatõe ꝓfunda donec egredia
tur ſanguis malus venenoſus cõſtrict⁹ i ea ꝑpe: ⁊ i pruna
ei⁹ mã ẽ ꝓfunda i carne vel ſupficiali: vt i pſico igne. dein
de cũ miniſtratiõe i pncipio medicinarũ nõ repcuſſiuarũ
frigidaꝝ i pncipio fortis ſtipticitatis ne mãꝫ venenoſaꝫ re
pellãt ad iteriora ⁊ pncipalia: nec ẽt mollificãtia fortis rſo
lutiõis q̃ pticulã calefactã magis iflãmẽt ⁊ mãꝫ: ac magis
trahãt ⁊ icitẽt ad currẽdũ: imo oꝫ vt admiſtres medicias
exiccatiuas i qb⁹ ẽ ifrãtio ⁊ reſolo cũ calitate tpata vt ei⁹
fritate calitas ptis: ⁊ mãe alteret. ⁊ remittat: ⁊ cõfortet ⁊
defendat: ⁊ cũ calitate reſoluãt: nõ repcutiãt. Qualia ſũt
q̃ dcã ſunt arnogloſſa emplata: ⁊ gale cũ aceto vini deco
cte. ⁊ lẽtes cũ pane qd furfuris hñte. nã hmõi panis ſubti
lior ẽ in ſuba ſua diuiſim vel iſimul emplate: vel alia ſilia
i antidotario nro ſũt ſcripta. Et ex approꝑatis ſunt que hic
ſubſcribuntur: ⁊ cum regimine ⁊ accidentium correctiõe
vt ſupra. ¶ Emplaſtrum conueniens ⁊ efficax ⁊ expertũ.
℞ecipe granata acetoſa integra: ⁊ infundantur ⁊ coquan
tur cum aceto donec diſſoluantur. ⁊ deinde terantur: ⁊ po
nantur ſuper pãnuꝫ ⁊ ſuperponat. Ipm̃. n. cõueniẽs eſt in
omni ora: ⁊ eradicat hanc egritudinẽ in pncipio ⁊ ſtatu.
¶ Aliud emplaſtrũ ad idẽ. ℞. nucẽ recentẽ ⁊ folia eius ſa
uich ordei paſſulaꝝ caricaꝝ equales ptes terant ſil' ⁊ ↄfi
ciant cum vino ⁊ oleo papaueris nigri. ¶ Medicia cõue
niens in pncipio cũ nõdum vlceratũ eſt. ℞. acacie dragan
ti opij corticũ granati. añ. ʒ. i. floris eris. ʒ. i. ſe. iuſqami al. ʒ.
ʒ. cõfice cũ vino. Medicamẽ ↄueniẽs huic cũ ẽ vlcerat⁹ ⁊
ẽ medicamen qḋ paꝝ exiccat q̃l' ẽ audacon ⁊ trociſci. iiij. ⁊
ex dragãto cũ vio dulci ⁊ rob. qḋ. n. fortiter exiccat addit i
malitiã egritudis. Opꝫ aũt vt ſubuenias ptib⁹ adiacẽtib⁹
loco cõbuſtiõis ne putrefiãt ⁊ corrũpant: ⁊ illud fit cũ bo
lo armeno ⁊ aceto ſuperiũctis: vel aqua ⁊ reliqs q̃ ifridãt
⁊ repercutiũt. Et id qḋ eſt ꝓpinqu⁹ illo cũ lana yſopi iſuſa
in vino. cũ ergo qeſcit inflatio: ⁊ remanent vlcera curent
cũ eis q̃ ſunt ſic empla de merdaſengi ⁊ empl'm de diabu
tiro ⁊ cũ reliqs q̃ ſunt ↄueniẽtia vlcerib⁹ corroſiuis ⁊ frau
dulentis. Et nux antiqua vnctuoſa eſt conueniẽs igni per
ſico in hac hora.

¶ Capl'm. vij. de vena egrediẽdi ⁊ medicinis eius.

c Ontingit aliqñ: vt eueniat ſup aliq̃ particula cor
poris qdem feruor: deide veſica vel ampla: deide
rumpit ⁊ egreditur ex ea quoddaꝫ decliue rubeum ad ni
gredinẽ: deide ꝓlongari nõ ceſſat ⁊ eſt vena. Et fortaſſe ẽ
ei motus voluntari⁹ ſub cute ac ſi eẽt aĩalis ⁊ in veritate:
q̃ſi ſit: qḋ gñat in eo ⁊ extimãt qdam ꝙ ſit ramus vili ner
ui per vehemẽtiã groſſitudis ⁊ extenſiõis ipſi⁹. Et plimũ
qdẽ accidit in crurib⁹. Et Abo. dixit ſe. vidiſſe ſup latus ⁊
manus ⁊ multiplicat ſup ifantibus vtrũqꝫ. ⁊ qñ extendit
vel ſcindit magnificat ei dolor ⁊ labor. Et cã eius eſt ſan
guis calid⁹ malus mlic⁹ aut flic⁹ aduſtus cũ vehementia
ſiccitatis ↄplexiõis. Et fortaſſis gñant eã quedã aq̃ ⁊ olea
cũ ꝓprietate q̃ eſt in eis: q̃lia ſũt cal'a ⁊ ſicca acrimonialia
⁊ multiplicant in aliqbus regiõib⁹ calidis ⁊ ſiccis ac ſi ſit
morb⁹ vndimic⁹ vt in egypto. ⁊ alijs ẽt regiõib⁹ calis ⁊ ſic
cis: ⁊ in corporibus ſilib⁹ ⁊ minorat euent⁹ in corporibus
hũidis ⁊ aſſuetis vio cũ mẽſura. ¶ Signa ſunt ex dcis ma
nifeſta. ¶ Cura. H. vero dixit. cũ nõ ſit cõprehenſuꝫ ex ei⁹
cauſis aliqd manifeſtũ ſup qd ſit initendũ eo ꝙ nõ vidit
eum oio: ⁊ in his vltramarinis regiõib⁹ ꝑpe qbus fuit.
Abo. vo ⁊ alij ſequaces. H. cũ multotiẽs illic viderint curã
eius ↄprehẽderũt in. v. in abſciſiõe cãe pmitiue cũ regimi
ne ⁊ correctõe aeris illi⁹ regiõis in q̃ accidit: ⁊ rectificatõe
aq̃ ⁊ ciboꝝ regiõis vel dimiſſiõe coꝝ oio ⁊ miniſtratõe hu
mectantiũ ⁊ balneoꝝ ⁊ oia regis hũectatiui noti. In abſci
ſione cãe añcedẽtis cũ flõmia oppoſite ptis ⁊ cũ mundifi
catõe ſanguis: ⁊ illud cũ medicis ex mirab. epithimo: ſene
fumo terre polipodio. ⁊ ſilib⁹ educẽtib⁹ hũores aduſtos.
⁊ cum cõpoſitis vt cũ pillis cochys ⁊ trifera cõfecta cũ ſe
ne ⁊ fumo terre. ¶ Tertio cũ eũone cãe cõiuncte cũ parti
cularibus medicis. Et illud cũ appõne ſanguiſugaꝝ ſuper
locũ: deide cũ repercuſſiuis ex ſandalis cãphora cũ ſucco
herbaꝝ fris notis ſupra: aut mirta pſilij: lac dulce: qm̃ non
repellit ad pncipia eo ꝙ ꝑcedẽs aſſecurabit eũo. Nõ aũt
talia fra ſup vlcus ponant: ſꝫ circa ipm̃: qm̃ frm vlcerib⁹
mordax dixit hyp. in affo. ꝙ ſi nõ ſpargat reſoluat nõ cũs
valde calidis: qm̃ ex eis pueniet fortaſſe ad eſtiomenum
ꝙ ſi nõ reſoluat ſaniet: deide aperiat ⁊ mũdificet ⁊ regu
tur vlcerũ cura q̃ ifra dicet. ¶ Et q̃rto cũ correctõe acci
tium vt exeuntis vene. Cũ ergo ampula rũpat ⁊ vena ad
exeundũ feſtinat: oꝫ vt eger in die pma. ʒ. ʒ. ſcda die. ʒ. i. ⁊ i
tertia die. ʒ. ij. de aloe bibat: ⁊ loc⁹ eius ẽt epithimet cum
aloe. Ex hoc. n. nocumẽtũ eius oio delet. poſtq̃. n. qḋ exie
rit: qḋ ex ea fortis apparet ſup arũdineꝫ paruã ex plumbo
factã: cui⁹ põdus ſit vni⁹. ʒ. iuoluendũ: ⁊ cũ pdicta cãna li
gandũ: ⁊ vt pendeat dimittendũ. nã ex ipſi⁹ grauedine ici
piet deſcẽdere ⁊ citi⁹ egredi ⁊ cũ ex ea aliq̃ pars exiſtit cir
ca plumbũ voluat ⁊ liget. Si aũt qḋ iã egreſſum eſt lõgũ
fuerit icidat: ⁊ qḋ remanſit iuoluatur: ⁊ donec radicet ob
ſtruat ꝙ eſt obſeruandũ: qꝛ ſi ſic factũ fuerit attrahet ⁊ i
trahit cãnã ⁊ poſtea putriduꝫ vulnus magnũ gñabit: qua
propter huic egritudini blãdiẽdo eſt ſubueniẽdũ ⁊ paula
tim vena eſt extrahẽda donec oio egrediat ⁊ nihil ex ea i
corpore remaneat. Si aũt ipam oio intrare ↄtingat i ipſi⁹
foramie ponat radius ⁊ i longũ ſcindat ⁊ bñ aperiat: do
nec qcqd ex ſua mã ↄtinet euet: butiruꝫ quoqꝫ ꝑ aliquos
dies ſuperponat: donec putreſcat. ⁊ ei⁹ cõſumat mã: dein
de cum his q̃ carnẽ generant curet. ¶ Et quinto cuꝫ regi
mine qḋ ſupra in carbũculo dictum eſt.

¶ Capl'm. viij. de panaritio ⁊ medicinis eius.

p Anaritiũ eſt apa calidũ rubeũ in circuitu vnguiũ
naſcẽs ⁊ ardens ⁊ dolorẽ iferens ⁊ fortiter pulſãs
ex quo plurimũ accidit febris ⁊ pertingit dolor vſ
qꝫ ad loca q̃ ſunt ſub aſſellis ⁊ iguine ⁊ finaliter ꝑducit ad
caſum vnguis: ⁊ qñqꝫ ad corroſionẽ digiti. ⁊ cã ei⁹ eſt ſan
guis coleric⁹. ¶ Cura vo ei⁹ conſiſtit in trib⁹. in eũone vẽ
cũ flõmia: ⁊ maxie ſi diu eſt ꝙ patiẽs nõ fuit diminut⁹. in
particulariũ remedioꝝ approximatõe cũ ſedãtib⁹ dolorẽ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0488-2
DFG

calorē ⁊ pulſuꝫ ex apocruſticis: ⁊ ꝑmo ī ꝑncipio cū ſubmer
ſiōe digiti in aceto calīo: vt iuſſit. G. deide cū emplo de cā
phora aut mucilagine pſilij ꝯfecta cū aceto: deide ſi expe
dit ꝑꝑ dolorē cū epithimatiōe digiti ex aceto: ⁊ opio diſſo
luto in eo donec ſup locū groſſuꝫ fiat epithima: deide ꝯtri
te galle: aut cortex granati vel grana mirte cuꝫ aceto ⁊ aq̄
cōquaſſata: ⁊ ſupponat̄ ēt pānus ſup ipꝫ aq̄ niuis īfratus:
q̄ꝛ ipm refrenat multotiēs ſi fiat cū frequēti īnouatiōe ⁊
ꝯfirmationē eius ꝓhibet. ⁊ ſilr̄ ſordes auris cū litio ꝓhibꝫ
a ꝓprietate illiꝰ collectionē. Qꝫ ſi pulſus in loco fuerit ve
hemēs ꝑdicta medicia vel aliud ſibi ſiīe ꝑ dieꝫ ītegrā ap
proximare curabis: deiñ ſi pulſus adhuc ꝑdurat ſignū ma
turatiōis erit. Quare opꝫ vt aliqđ emploꝝ q̄ in cura fleg
monis ordinauimꝰ: ⁊ hoc ſupponas: ⁊ ꝓprie ſemē almari:
⁊ pſiliū cū lacte donec ad ſuppurōnē deueniat. deide apia
tur ⁊ qđ in eo ꝯtinet̄ educat̄ ꝓprie cū emplo: ex farina lu
pinoꝝ cū melle: deide cū curātibꝰ vlnera locū rege ⁊ ꝓpe
cū aloe. Et deide cū vnguēto ð ceruſa ⁊ ſarcocolla ⁊ ſuppo
nat̄ pānus madefactꝰ in fine. Et ſi ī ꝑncipio vnguis ꝑuritꝰ
acciderit vnguis cadet. ſi ergo ceciderit digitꝰ ab oī motu
ledēte cū obuiatōe rei ꝯq̄ſſantis: cauēdus ē ne vnguis q̄ re
naſcit̄ fortis egrediat̄ ⁊ aſper: ⁊ in regie q̄le eſt dcm̄ in fleg
mone. Cōſiſtit etiā cura eiꝰ ex ſimplicibꝰ appropatis eis
vt ſuc. mirte ꝑiectus ſup eū ⁊ epithimatus acacia cū albu
mine oui: ſordicies balnea olibanū qꝛ īcarnat radix penta
filon decocta cū aceto: ⁊ emplāta ſuccꝰ ⁊ radix ligritie: ſu
mach: ſires: aloes: cū melle. ficus cuꝫ penidijs ponit̄ ſupra
panaritiū ad maturādū ⁊ reſoluēdū cū aq̄ cineris ligni fi
cus: ⁊ in augmento cū cortice granati. Et ſanat illud acetū
⁊ folia oliuaꝝ ſiluestriū. Abo. ingt. nec oꝫ vt ſtetur ſup in
frantia. nā ipſa qñ ꝑtranſit hora ꝑncipij īſpiſſant cutē ⁊ ob
ſident māꝫ ⁊ vehemētior dolor fit ⁊ nō illud qđ ſentit̄ de
calitate: q̄uis ſit ſicut ignis: imo reſoluat̄ ⁊ exiccet̄ cū ſub
merſione in oleo calīo. ⁊ in medio terat̄ olibanū ſup ipſum
aut nigella trita ⁊ adeps mucilagines leniētes: ⁊ bona ſor
des aur̄. Et dixit quoqꝫ fortaſſe. cū. n. eſt timor corroſiōis
neceſſariū eſt miniſtrare emplꝫ ex arſenico: ⁊ dragāto cal
ce: ⁊ flore eris: qm̄ exiccat: neqꝫ eſt meliꝰ eo. Et q̄ñqꝫ īcipit
currere ex panaritio vlcerato ſanies ⁊ tunc cauteriçet̄ ⁊ in
cidat̄ vt nō perambulet malitia in digito toto. ¶ Emplm
℞. aloes: balauſti. olibani: ⁊ galle: conficiant̄ cū melle ⁊ ad
miniſtrent̄. ¶ Emplꝫ qđ dixit paulus. ℞. dragāti vſti: thu
ris. añ. ꝑtes eq̄les floris eris: ꝑtē. 5. terant̄ ⁊ conficiant̄ cuꝫ
melle ⁊ liget̄ ne tangat locū. adde vero oleum.

¶ Cap. ix. de apoſtematibꝰ paruis ſeu puſtulis illius gene
ris vt ſunt morbili ⁊ variole ⁊ ſere ⁊ medicinis eorum.

q Uia ſupra prima particula ſectiōis huiꝰ locuti fui
mꝰ de cura variolaꝝ morbiloꝝ ⁊ paſticū: q̄ ſunt ex
āpatibꝰ ſanguineis paruis nūc de ſere loquemur
qꝛ ex illoꝝ genere ē. Eſt inqꝫ ſere puſtula parua lata ſicut
veſica ad aliquā tendēs rubedinē: ⁊ ē ꝑuritū faciens ⁊ an
guſtiā. ⁊ eſt veniēs ſubito plurimū. Et accidit vt currat ex
ea humiditas q̄ fortaſſe ē ſanguiea ⁊ plurimū fit vehemēs
in nocte ⁊ in eis ēt anguſtia fit fortis cū triſtitia. Et cā eius
eſt vapor calidus eleuatꝰ in corpore ſubito aut ex ſangui
ne colerico aut f̄late ſalſo baurachio: ⁊ ſanguinea quidē ē
vehemētioris rubedinis caliditatis ⁊ vehemētioris aptio
nis. Et f̄latica eſt minor in oībꝰ illis. ⁊ cū ſere īuadit locuꝫ
amplū ⁊ ītrinſecū ſi non fiat flōmia timet̄ febris tertiana.
oꝫ ergo vt fiat flōmia in ſpatio qđ eſt inter ꝑncipiū ⁊ ſtatū
¶ Cura vero ſere in quatuor rebꝰ conſiſtit. In euōne cau
ſe antecedentis cū flōmia ſi ſanguis fuerit vincēs: deinde
cōſequenter cū ſolōne colere: ſi tolerat virtus qꝛ ſit ex dua
bus ꝑtibus mirabolanoꝝ citri. ʒ. i. ſere cuiꝰ doſ ſit. ʒ. iij. cū
iuleb: ſeu ſyrupo acetoſo. ſecūdo ꝯſiſtit in ſedatione angu
ſtie ⁊ inflāmationis. Et ꝑmo cū tamariſcis de aqua fructu
um ⁊ de infuſione criſomilloꝝ ⁊ ſucco duoꝝ granatoꝝ ex
preſſoꝝ cū pulpis ſuis in q̄ŧitate lib. 5. aut cū ſucco. grana
ti acetoſi. Et de his q̄ ſedāt eā eſt īfuſio ſumach colata cū
ex ea ſumunt̄ in potu. ʒ. iij. ⁊ detur in ſyrupo de nuce in die
multotiēs: ē eniꝫ ex his que multū ꝯferunt ei ⁊ lenit nām.
Et de appropriatis ei eſt vt ſumat̄ crocus ortulanꝰ ⁊ tera
tur ⁊ cōcutiat̄ cū aceto ⁊ ſumat̄ aqua mirte ſeu aqua vrcei
noui. Et ſi humor fuerit f̄laticus baurachius educat̄ cuꝫ
mirob. chebu. ⁊ citri. cum turbit de quo ſit q̄ŧū eſt media
ꝑs illoꝝ ⁊ ſit potio eoꝝ. ʒ. iij. ⁊ det̄ ī ſyrupo ð nuce: cipſſi hu
midi. ℥. i. cū aloes. ʒ. i. ⁊ ſumat̄ crocꝰ ortulanꝰ. Et ex ill' ē vt
ſumat̄ cubebe. ʒ. i. cū. ʒ. iij. çuccari ⁊ ſe. agni caſti: ī lacte dul
ci. ¶ Tertio ꝯſiſtit in regimine ⁊ eſt vt regat̄ cū cibis fris
⁊ acetoſis abſterſiuis. ¶ Quarto ꝯſiſtit in particulariū re
medioꝝ approximatiōe ad particulā patientē cū reſoluē
tibꝰ tempatis ⁊ humidis dictis ſupra in cura flegmonis: ⁊
cū ſaniantibꝰ ſi expediat ⁊ alijs q̄ illa ſequuntur.

¶ Cap. x. de terminatōe apoſtematū quot modis poſſunt
terminari: ⁊ ē ſmo gnālis in termiatōibꝰ āpatum.

o Mne āpa vbicūqꝫ ſit corpis terminat̄ ſꝫ. G. alte
ro ſex modoꝝ qbꝰ ad finē ſalutis vel mortis ꝑdu
citur eger. Qui aūt ſint ⁊ q̄les qꝛ boni mali ⁊ me
diocres ⁊ q̄ eoꝝ ſint ſigna ſupra in huius ſectionis ꝑncipio
dictū ē. Sed qꝛ ſcias āpata regulare vt ad bonū ⁊ optimū
ꝑueniant terminandi modū in finē ſalutis ipmqꝫ cū expe
dit valeas adiuuare ⁊ malis obuiare: nūc oꝫ adicere ⁊ mō
ſtrare qd ſit. ſ. vnuſquiſqꝫ. ⁊ qbꝰ cauſis fieri habeat vel me
dicinis ⁊ cui cōpetat q̄libet ⁊ cui nō: ⁊ qđ ſit regimē obſer
uandū in eis. ſupra. n. in caplo generali dcm̄ ē q̄liter nocu
menta apocruſticoꝝ ⁊ diaforeticoꝝ cū accidāt corrigant̄.
hic aūt dicendū q̄liter ſit ne accidāt obuiandū. Sciendū
ergo qꝛ reſolutio āpatū ⁊ cuiuſcūqꝫ alterius malis morbi
eſt vt humores q̄ ſunt mā eius ſubtiliati: ⁊ in vaporē cōuer
ſi aptis poris īſenſibiliter expellant̄: vt. G. oſtēdit. Fit aūt
illud a nā ⁊ arte. ꝯpletur vero calitate: ⁊ humiditate tēpe
rata nāli medicinaꝝ q̄rundaꝫ ꝓprie ſimpliciū ⁊ ꝯpoſitaꝝ
que humiditates corporis ponant ſubtiliatas ⁊ in vaporē
ꝯuerſas: ⁊ poros cutis rarificatos vt facile expellat̄: vt eſt
ſemen lini: aneti: ſenugreci ⁊ ſilīa. differunt aūt ⁊ variant̄
in q̄litatibꝰ dictis ſecundū plus ⁊ minus ſcđm diuerſitatē
māe ⁊ mēbri ⁊ aliaꝝ reꝝ ītrinſecaꝝ ⁊ extrinſecaꝝ que no
te ſunt qbꝰ iudicia apte ⁊ īepte reſolutionis hn̄t. Coadiu
uant aūt ad reſolōnē apoſtematis recurrere faciētia ꝑmiſ
ſa vt dicat̄ āpa reſolui: cuius ꝑs recurrit ⁊ ꝑs inepta recur
rere ꝓprie reſoluat̄ vt non ꝓcedat amodo ſꝫ deſiſtat. Cuꝫ
ergo mā āpatis recurrere nō ſit apta: qꝛ tā aggregata eſt ⁊
īcuneata in cupo. ſꝫ reſolutioni potiꝰ: vt qꝛ calꝫ ſit: ſangui
neū vel colericū vel ex vtriſqꝫ mixtū: ⁊ ꝯplo corporis calīa
⁊ ꝯpō rara: qđ expiratio virtus ⁊ liquoris declarat q̄ in em
pl̄is quotidie īuenit̄. ⁊ maxie qꝛ dolor febris ⁊ alia accñtia
remittant̄ cito ſi non ſufficienter agat ſunt reliquie. Si ve
ro nō: vt qa tepide ſe gerat iuua ipſaꝫ cū tēperatis ꝑdictis
ſi ꝑdicta non ſufficiāt vel ꝑꝑ medicinaꝝ ineptitudinē ꝑꝑ
nām ⁊ poſitionē eius vel caloris membri debilitatē ⁊ ꝯpō
nis demſitatē ꝯfortabis illa cū alijs ſubtiliātibus ⁊ cale
faciētibꝰ magis vt eſt ſpica abſinthiuꝫ: ameos: baurach: ⁊
ſilīa que īfra: xp̄o auxiliante dicent̄ nec illis fortibꝰ abſqꝫ
neceſſitate ꝑdicta vtaris. fortia. n. caliditate ſua ⁊ ſiccitate
ſubtile quodā impetu reſoluendo a groſſo diuidunt: ⁊ illō
ſchliratū dimittunt qđ difficilius reſoluet̄ q̄ꝫ ꝑus ⁊ etiā ſa
nabit̄. Et rege patientē cū extenuatiua dieta ſiti ⁊ fame.
fames eni exiccat corpus. ſaniatio vero āpatū eſt adequa
tio māe ⁊ diſpō eius apta ad euōnē per eruptionē. Cū eniꝫ
in vacuo mēbri ſeu cupo āpatis iā tota mā ſit collecta ſcā
qꝛ ſit exitura tunc cū non poſſit apte repelli quia iam exi
uit a vijs ⁊ venis nō reſolui qꝛ incuneata ibi exiſtit ⁊ com

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0489-0
DFG

pfecta expedit vt p ptem patientē ſenſibiliter educatur eo
q̄ preter nāž exiſtit ⁊ illud p̄ eruptionē: vt ergo abſq̄ grā
di nocumēto nāe ⁊ mēbri poſſit expelli: oꝫ maturare ipſaꝫ
⁊ in ſanīē ꝯuertere vt p eruptionē facile expellat̄: aut.n.ſi
niteris eūare deſtrues loca ſana egritudini reſiſtētia. Dixit
hyp. Sit aūt a nā ⁊ ab arte cū medicis cal'is ⁊ hūidis cū eq̄
litate viſcoſe ſube q̄ cū caliditate eq̄li ſubtile a groſſo non di
uidunt reſoluēdo ſicut diaforetica ⁊ ꝓprie fortes: ſꝫ agūt
in eis vtrūq̄ ſil' decoquendo ⁊ pmiſcendo ⁊ ſue viſcoſitate
ſube vtrūq̄ retinet opilando nec pmittunt expirari ſubti
le ⁊ ꝓhibendo trāſpirationē cal'itatem ꝓpter nām acq̄rūt
in loco aqua pmixta cū nālis ſanies generat̄ in tali mā ad
bonū ⁊ ad malū mediocriter ſe habēte: vt dixit. G. debent
ergo eē tales medicine cal'e in ꝑncipio pmi gradus vl' in fi
ne ipſi⁹ vel vſq̄ ad mediū ſecūdi gradus q̄ īfra dicentur: ⁊
hoc ꝓpter diuerſitatē ꝯplōis corpoꝝ qb⁹ approximant̄
⁊ etiā māe ſaniande. Jnqt.n.G. Medicina ſanīē generans
dꝫ eſſe cal'itatis ſeu ꝯplōis ſil'is ꝯplōni corporis in quo ſa
nies generat̄ ⁊ etiā mēbrū: vt dixit Auer. hñt autē exiture
iudiciū ex pte nāe ipſi⁹ māe. Et corporis ſeu mēbri in quo
ſunt: ⁊ q̄tū ad ſaniationem ⁊ q̄tuꝫ ad eruptionem in quo
mā eſt diffuſa aptaꝫ ⁊ facilē ineptā ⁊ difficilē ⁊ bonā ⁊ ma
lam ſeu laudabilē ⁊ illaudabilem. Quantū ad ſaniationeꝫ
quidē. nā que eſt in materia cal'a ē ⁊ in mēbro cal'o carno
ſo ⁊ corpore fortis caloris in quo mā eſt diffuſa. Et poſita
extra ml'te eminētie ⁊ tumoris piramidalis vel caloris ru
bei cū pulſatione prompte ſaniatur: ⁊ eſt bona. Que vero
ex mā fra in mēbro fro q̄ꝛ neruoſo ⁊ ſimili ⁊ in corpore ca
loris debilis inepta eſt difficilis ⁊ illaudabilis: ⁊ maxime
ſi in membro iuncturali vel propinquo exiſtat in quo nec
apte fit exitura nec ſaniatio ꝓpter mucilaginitatē ipſarū.
Et māe ⁊ ꝓpter amplitudinē vacuitatis ipaꝝ q̄re mā i eis
nō eſt bene aggregabilis in vnū: nec retinibilis gn tranſpi
retur ſicut exitui expedit ⁊ ſaniatōi niſi grādis cā exiſtat
in eis. Sil'r q̄tū ad eruptionē: nā in pma ē ꝓmpta eruptio
⁊ abſq̄ piculo. in ſcda eſt difficilis ⁊ ꝑnicioſa. Et qdē cū hꝫ
duob⁹ fieri modis: vt p nāꝫ ⁊ artē ſi fiat p nām eſt melior
⁊ ſecurior: ⁊ ſi fiat ad extra laudabilis: ſi ad ītra illaudabi
lis: ſi vero ad vtrūq̄ magis. Et ſi quidē: qđ erupit egredit̄
albū ⁊ lene ⁊ equale carens malo odore laudabile eſt. Si
vero citrinū rubeū eſt ⁊ liuidū ⁊ cenoſum malū ſicut hyp.
in ꝓnoſticis dixit. cū ergo vides a̅pa aptū ſaniationi ꝓlon
gat: ⁊ ſit ſcḿ exitura dolor ⁊ fe. nō minuit̄ nec pulſatio nec
appet humiditas aliq̄ expirari: imo tumor manet vel au
geri non ceſſat: ⁊ maxime q̄ꝛ ſanguineū vel fl'aticū ſeu mi
xtū ex eis fuerit a̅pa non colericū nec ml'icū. humor.n. cru
dus ⁊ caro matura mā ſunt ſanici. col'a vero inepta eſt ei ⁊
reſolutioni potiſſime apta: vnde hyp. in eriſipilla putredo:
aut ſanies malū. Et ſil'r mel'ia ſi nālis ſit maturatiōi ſi pre
ter nām ſit corroſioni cui maturatiua non cōpetunt cū pu
tredinē augeant ⁊ corroſioneꝫ. Unde hyp. in affo. cal'm ſa
niationē faciens non in oī vulnere optimū eſt ad ſaluteꝫ.
Et ſi potes īpedire ⁊ reſoluere in hoc q̄tuꝫ potes īſtabis: ⁊
illud ſepe ad meliorē terminādi modū reducas: ⁊ illud fa
cies auferendo ſaniātia ⁊ dietā extenuatiuā miniſtrando
ac reſoluētia q̄ aperiendo poros māꝫ trāſpirabilē reddāt
⁊ ſubtilē ei⁹ partē a groſſa diuidāt reſoluēdo. illa.n. ſola pu
treſiunt corpora que cal'a ſunt ⁊ humida ⁊ īcranſpirabilia
perſeuerant: deinde cū adminiſtratiōe ſtipticantiū ⁊ exic
cantiū: vt folioꝝ mirte balauſtie: ⁊ galle ⁊ hmōi: q̄ ſi euita
re non potes: q̄ꝛ nā ſit ad ſuppurōnē ītenta ſi qdē p ſe ſuffi
ciens ſit multū apta ⁊ nāe obediēs: q̄ꝛ ſi cal'a in eodē loco
vehemētioris exit⁹ ad exteriora cū maioris tumoris emi
nentia ⁊ acuitioris capitis cū rubedine ac pulſatiōe relinq̄
ipſi nāe. Dixit.n.G. Medicaminū auxilio nō indiget niſi
cū morbo magnificato nimis dn̄ari negerit. Si vero p ſe

non ſufficiat: ꝯfortabis illā cū medicinis predictis: ⁊ ꝓprie
cū mā eſt inepta ⁊ p̄dicta ꝯtraria. Cū vero ſanies fit tūc cō
ſiderabis an loc⁹ eius: ſit in mēbro carnoſo: aut in mēbro
arterioſo: ⁊ neruoſo: ⁊ ꝓprie qđ iuxta iūcturas exiſtit: ſi eni
fuerit generatio eius in loco carnoſo arterys ⁊ panniculis
carente ⁊ neruis vt ſunt nates ⁊ adene nō apias exituras
donec tota mā ſit ꝯplete ſaniata niſi ml'ta ⁊ ſuꝑflua in q̄
titate exiſtat: de quo mēbri corruptio timeat̄. Melius eni
digerit̄ in ſimul dimiſſa q̄ꝫ ſi euacuaret̄ in pte. tunc.n. ma
gis ītranſpirabilis pſeuerat ⁊ q̄ꝛ pmixta qđ ex ea tangitur
a putrido aptius putrefit. Si vero in mēbris alia ꝯditio ſi
at ante pfectā ⁊ ꝯpletā ſaniationē totius ſi nā non aperiat
ſtudeas aperire. Sanies.n. diu retenta ac virus dicta mē
bra ſua acuitate corrodet: qđ plerūq̄ ad ſpaſmū adducet.
Cūq̄ artificialis aptio duob⁹ modis hꝫ fieri vt per farma
ca cauſtica q̄ infra ānuente xp̄o dicent̄. ⁊ p īciſionē cū fer
ro: vel ſectionē. ſitq̄ in eis dubiū ne ſubiecta mēbra lede
rent̄: expedit vt fiat ꝯditiōib⁹ debitis obſeruatis ⁊ maxi
me in exitura tal: exiſtēte in neruoſis vēoſis ⁊ arterioſis
mēbris. ſi enim ſint in mēbris carnoſis ſine periculo īcide
tur vel ſecabit̄ etiā ſi ꝓfunda fiat vt dcm̄ eſt. Cōditiones
aūt debite obſeruande ſunt q̄daꝫ ex pte cirugici opantis:
vt q̄ ſit ſciēs ⁊ ꝓprie in arte anothomica ⁊ expt̄us ī ſectio
ne. ſitq̄ hn̄s manus leues ⁊ habiles ad ſecādū ⁊ ſecū defe
rens inſtrā apta ad illā vt nouaculam vel lanceolā molli
ficantia ⁊ dolorē ſedantia que in ſolutione neruoꝝ dicen
tur ⁊ ꝯſtringentia ſanguinē: qualia ſunt plura. Ex qb⁹ ē me
dicina. G. que ex pilis leporis tela aranee ⁊ ouoꝝ albumie
ꝯmiſcetur ⁊ feramēta qbus cautericet̄. Quedā vero ſunt
ex parte corporis in quo īciditur: q̄dā ex pte loci: quedā ex
parte q̄titatis ⁊ forme ſeu figure: q̄daꝫ ex pte ligature. Ex
pte qdē corporis vt ſi forte tumeat. ⁊ ſi ſit ſenſibilis valde
ꝓut Abo. docuit in vino loly aquā ponas aut ſumach: aut
fumiterre: opy: ⁊ iuſqami. añ. ℥. ſ. nucis muſ. gallie muſca.
⁊ ligni aloes crudi. añ. ʒ. i. ſextā: aut iuſqamū nigrū: cū cor
ticib⁹: mandragore in aq̄ coq̄nt̄: donec rubefiat ⁊ cū vino
admiſceat ⁊ ꝓbibat. Ex pte qdē loci ē vt fiat vbi ſanies ag
gregata rumpit̄ q̄ꝫ mollities tactu iuēta in loco cū digitis
iudicat ⁊ albedo ſeu alius color puris: lꝫ q̄nq̄ pp groſſiciē
ſui non maturet̄ vel ꝓfunditatē loci: vt hyp. dixit in affo.
quo caſu calorē oꝫ attēdere ⁊ pruritū. fiatq̄ in loco ſubte
riori remoto ab arterys ⁊ neruis quo ſanies meli⁹ poſſit ef
fluere ⁊ expelli vt ſi qdē ſit exitura pineal'is extra eminēs
⁊ acuta in capite ſui fiat. ibi eni cutis pp ſaniem attenuata
eſt magis. Si vero ſit ſpacioſa ⁊ lata fiat ī parte ſubterio
ri p quā melius poſſit eūari vt ſi expediat in locis ei⁹ duo
bus vel trib⁹ īcides. Ex pte figure vt fiat ſcḿ ꝓceſſus ru
garū vel lineaꝝ cutis niſi in illis mēbris in qb⁹ poſitio vi
loꝝ nō currit ſm̄ curſum rugaꝝ vt eſt frons ⁊ palpebre in
qbus ſi ſcḿ rugas cutis ipſaꝝ īcides ſil'r ⁊ neruū ſeu vilū
ei⁹ q in longitudine currit īcides caditq̄ ſuꝑciliū ⁊ palpe
bre. ⁊ breuiter fiat ancilinus cirugica arte exptus ⁊ in ano
thomicha doct⁹ īſinuauit qđ īfra ponet̄. Ex pte q̄titatis ⁊
forme vt ſi ſint in ſuꝑficie poſita fiat ſuꝑficialis. ſi vero in
ꝓfundo ꝓfunda ⁊ lata vt carne adiacēte ei⁹ labia nō clau
dantur. Et ꝓinde ad cautelā tētaꝫ aliquo liqdo iunctam
īpones prius expreſſa ſuauiter ſanie ⁊ paulatim nō ſubito.
ſi.n. ſubito expellat̄ ⁊ exitura ſit magna. ⁊ ml'ta collecta ſa
nie ꝑducet ad mortē ſubitā maxie ſi ītrinſeca fuerit. Un
de hyp. ī affo. Quicunq̄ empici aut idropici vruntur aut
īciduntur ſanie aut aq̄ ſubito ⁊ multa fluēte repēte moriun
tur. Cū ergo qđ p ſe effluit fuerit paꝝ ꝑus īpoſita tēta ſuꝑ
empl'etur ouuꝫ ꝯquaſſatū cū ambabus ptib⁹ ſuis cū ſtupa
ad ſedandū dolorē ⁊ reſtrigēdū ſanguinē ex venis inciſis
fluētē: vel ſpōgiā in vino ſtiptico īfuſaꝫ. vt docuit Abo. Et
empl'm de calcāto nō valde frꝫ ne mordeat vlcus ⁊ ſupli

gabis modo quo oꝫ q infra dicetur abſq; multa cõſtrictio-
ne ne doleat magis: ⁊ ſic dimittes vſq; in diẽ ſequentẽ. Ex
tunc vero ſolue ⁊ mundifica vlcus cũ melicrato vel cũ vi-
no ⁊ ĩpoſitione tente ex filis tele antiq̃ vel ſtilo ſi fuerit in
ꝓfũdo: ſupani caput ſit pãn⁹ abſterſiu⁹ ⁊ exiccatiu⁹ ſaniei ⁊
puris. Cũq; aliqd remãſerit ſaniãdũ illõ ſaniabis miſcẽ-
do mũdificantia ⁊ ſaniãtia in emplr̃is. Et cũ mundificaue
ris neceſſe ẽ vt ſuccurras ad ꝯglutinandũ cutẽ cũ carne vt
nõ rũpať: ⁊ ĩdureſcat ⁊ fiat taliter: vt nõ cõglutineť quare
fiat ſinus: vel burſa q̃ non ceſſat ĩpleri ⁊ redeat ſilis exitu-
re p̃me. Et quotiẽs mũdificabis nõ moreť gn ĩpleať cãne
ne fiat de genere fiſtulaꝝ. Ad h ergo complẽda fcã ĩciſiõe
⁊ mũdificatõe: ſi ea q̃ ĩ circuitu ĩciſiõis ſunt ſine ſl'one fue-
rint replebis vlcus puluere ſiccãtiũ ſeu ſtipticãtiũ farma-
coꝝ ẽt mordãtiũ. Qualia ſunt oſtraca aduſta: ⁊ q̃le eſt cõ-
poſitũ farmacũ ex fermẽto ⁊ eis q̃ ꝑ chalchitez. Si v̾o gd
eius qđ in circuitu ſl'onat id qđ per oleũ ⁊ chalchitẽ lique-
facies qñ infrabiť ducens in olla mollificare manib⁹ opꝫ
de vino fundendo vt noſti: vtile.n.ẽ in multis hoc tale far
macũ. ⁊c. Deiñ ꝯſerues cũ ligatura debita: quã infra dice-
m⁹ ãnuẽte xp̃o: vt nec aq̃: nec oleũ: nec pil⁹ cadat: nec aliqd
qđ hũectet ſordidet ⁊ ꝯglutinatõz retardet. Et deĩde ĩcar
nantia ⁊ ꝯglutinantia miniſtrabis ⁊ finaliter ſigilãtia. Qꝛ
ſi ex errore ſin⁹ acciderit ſeu burſa quaz. H. colpinis appel
lauit meli⁹ eſt: vt dixit ad mũdificatõem puris ⁊ ichomis
ſine qua ĩcarnatio ⁊ ꝯglutinatio opportuna eſt ĩpoſſibilis
ꝙ habeatur cãnale ꝑforatũ ſm rectũ ex ere vel coriũ p̃pa
ratũ. ea vero nõ exiſtente hẽatur inſtrm̃ puris mũdifica-
tiuũ hñs amplexũ cãnalez hẽaturq; farmacũ ꝑ cartã com
buſtaz ꝯpoſitũ ex eo parũ mixtũ multo rodino .i. oleo roſ.
Et hunc cãnalez ꝑ orificiũ vlceris ſine ĩmittere: ⁊ deinde
ĩuoluto licinio claude orificiũ ⁊ tã diu ĩ eo dimitte donec
mũdificatus ꝑfecte ſit ſin⁹ ⁊ carnoſat⁹ qđ abſente tumore
⁊ dolore ꝑtis ſinus a ꝯſtrictiõe ac ſiccitate ipſi⁹ cognoſces.
ꝙ ſi in ore pus benignũ ⁊ paucũ videris magis ſpez carno
ſari: ⁊ ꝯglutinari hẽbis culpaz ꝓpter ꝙ ſupponis ſpongiaz
madefactã ⁊ acetoſaz: galľ. oleo ſupꝑ ligans: vt infra diceť
⁊ ſuppones emplm̃ ⁊ tentã ex eo iunctã ⁊ dimittes vſq; in
ſecũdaz diẽ vel tertiã. Qꝛ ſi tunc ligatura ſoluta liquor gs
ſubtilis externať ex culpo ne a ꝯglutinatõe deſperes mul
totiens.n. ſuppoſita farmaca patiẽti particule virt⁹ expri-
mit ex cuti ipſa violẽter ⁊ carne ſibi ſubiecta humiditatez
ſubtilẽ: ⁊ maxime ſi corp⁹ humidũ ſit ⁊ dieta humida ⁊ ſu
perflua vſum fuerit qua expreſſa ꝯmẽſurate ſicce fientes
regiones cõglutinanť ꝓmpte. ꝙ ſi ſcđm tertiũ vel quartũ
diẽ abſoluens iuenies liquorẽ ĩdigeſtũ per hoc ſcias nõ cõ
glutinatũ eſſe culpuz: ⁊ ꝓinde expedit vt ſuprapona ť par-
ticule farmacũ fortis exiccatiõis abſq; mordacitate qua-
le ẽ farmacũ nr̃m flauũ ꝑ metallica farmaca ſiue cera cõ-
fectũ ⁊ oleo galle ⁊ acetũ ſanguinolentoꝝ veteroꝝ vlcerũ
⁊ neruoꝝ ẽ ꝯglutinatiuũ ⁊ corporis inſtãtis exiccatiuũ: q̃
cunq; aut emplr̃a ſint farmaca liquata rodino ſi in hmõi ſi
nus ĩmittimus ꝑ cãnale non trãſeant. ſed in his conuenit
veſicã accipientẽ porcinã apponere ante liſtũ ꝑforatũ ſm
rectum oꝫ eẽ acriora farmaca q̃ licinoſis ĩponunť noiatis
q̃lia ſunt viridia colore ⁊ ꝓpterea pauco rodino ꝯmixta cõ
menſuratio vero ſupꝑ ĩcarnato ſinu ꝯglutinatoꝝ aliqđ far
macoꝝ ſupponať vel ſi recẽs ſeu ſanguineuz curares vul
nus: mľta.n. ſunt talia q̃lia ꝑ butiꝝ litargiꝝ ⁊ eruginẽ eris
⁊ alia metalica farmaca ex qb⁹ qñq; flauũ farmacũ reſul-
tat: cũ amplius fuerit cocta: ⁊ qñq; violaceũ cuz ad modi-
cũ fuerit cocta. Scire oꝫ.n. ꝙ oĩa metalica farmaca lepto
mera ⁊ ſicciora fiunt vſq; ad plurimũ cocta: ⁊ ꝓinde in col
pis ꝓfundis magis opatiua cũ ad ꝓfundũ oporteat ꝑue-
nire coꝝ virtutẽ. que vero recẽtia: ⁊ ſanguinolẽta ſunt vul
nera facile ꝯglutinam⁹ ⁊ ſi vnus ex his exiccent vt ſunt q̃
ſupra dcã ſunt. de qb⁹ multa enũerauim⁹ qb⁹ ſcripta ſũt. ſi
milr̃ mľta foramina ⁊ lõga hñtia multã ſordiciẽ. ¶ Ad-
uertendũ aũt ꝙ ſi aliqd culpis in ſupꝑiori fuerit regione. ⁊
ſilr̃ ſi vuln⁹ fuerit ꝓfundũ: os vero eius in corporis mani
feſto ĩferi⁹ facile per os effluat liquor ſi ſolã cuſtodias cõ-
ueniẽtẽ figurã patiẽtis particule vt ſi fuerit culpis in cru-
re: orificiũ vero eius iuxta genu tendẽte deorſuz: orificiuz
vero ei⁹ ſurſuz: liquor manebit int⁹ ⁊ corrodet ꝯtinuas par
tes neq; effluet: vt nec carnoſeť ⁊ ꝯglutineť: vt expedit: ni
ſi ſubincidas ĩferius ad ſuffuſionẽ icoris ipi⁹. Et ſi illud in
vulnere ꝓfundo nequeat fieri iuueť cõueniẽti figura ⁊ ex
preſſione verſus orificiũ tẽdẽte. in farmacys trahẽtib⁹ de
ꝓfũdo cũ exiccatõe forti donec ichores ꝑfecte fuerit exic
cati: qđ ex p̃dictis ſignis cognoſces certe: ⁊ ex tunc ablua ť
cũ iniectione melicrati qđ in hoc meli⁹ ẽ ad maiorẽ mũdi
ficationẽ. deĩde ĩcarnãtia miſtreneť: deĩde vero ablues cũ
v̾io mediocriter ſtiptico ⁊ etate medio tepido ⁊ cõglutinã
tia ſuppones. Et ſpõgiã mollẽ q̃; magis poſſibile ẽ mõ pre
dicto madefactã ⁊ exp̃ſſo circũpones: ⁊ ſupꝑligabis bindã.
Sit aũt ei⁹ ſupꝑligatio vt a fundo culpis ĩcipiat. termieť ãt
verſus os: ⁊ circũpones vero othomoris bendaz: ſtringant
qdẽ indoloroſe fundũ culpis: paulatĩe vero exſoluať vſq;
ad orificiũ: vt illic laxã ſupꝑligatõez hẽat ⁊ ea benda q̃ ſupꝑ-
poniť extrorſuz ſupꝑ orificiũ cũ emplr̃o cũ forficibus exiſte
ĩciſa vt effluere poſſit ichores ab orificio. culpi quoq; ali-
quo ſcđm id ſuppoſitoq; emplr̃o vt ad ſupꝑſolutionẽ quã in
tertia die facies auferẽs ab eo id qđ velut epithima circũ
iacet. adhuc aũt ſi dñiũ coꝝ. q̃ ad ſaniẽ deuenerũt ꝯpatũ
ĩciſio fiet tarde vel ꝓpter ĩperitiã medici vel timorẽ infir
mi neceſſe ẽ in tẽpore corrodi cutẽ a ſanie ⁊ ſubtilez fieri ⁊
diſrũpi vndiq; ad modũ diſlaniati pãni vt fiat vlcus a me
dicis noĩatũ rancoſuz ⁊ dilaniatũ ſeu dilaceratũ. Eſt ergo
cutis hui⁹ difficile ꝯglutinabilis ⁊ maxĩe ſi qs ſiccũ ſuper-
ponat ꝯſiſtẽtia farmacũ. ab his.n. adhuc magis rancoſior
fiet ⁊ ſicca cutis ſilr̃: ⁊ acutis gũmis exiccãtib⁹ ſilr̃. quare
ad cõglutinationẽ ei⁹ vti oꝫ aliquõ humido ꝯſiſtẽtia far-
maco: virtute vero ſicco ⁊ effectu q̃le ẽ farmacũ ꝯpoſituz
ꝑ litargiꝝ: ⁊ pigũedinẽ porcinã veterẽ ⁊ calchicẽ hñtibus
vel oleũ veterinũ. meli⁹ cõit opabiť ſcđz has diſpõnes qñ
nõ valde duꝝ nec certiſſime molle ꝯficiť. cõglutinatiuuz
.n. oĩuz ẽ vlceꝝ ⁊ ſanguiolẽtoꝝ imiſſuz ꝑ oleũ vet⁹: deiñ ꝑ
vinũ vet⁹. deiñ poſitis in circuitu hmõi diſpõnũ: itriſtãter
.n. eas ꝯſolidauit multotiẽs. ꝯfert in lacertoſa cute: Nihi
lominus mel vſq; ad ꝯſiſtẽtiã coctũ emplr̃atũ vt neq; ſit
ita duꝝ vt ledat cutẽ ⁊ ĩſtabile ſit: neq; ita hũidũ vt circũ-
fluat a cal'o corpe ⁊ ſiccã reliq̃t bendã: ⁊ ſic nihil ꝓſit: qm̃
aũt mẽſuratio coctonis vix perceptibilis ẽ ĩ eo meli⁹ ẽ em-
plr̃are puluerẽ mirte vel aloe vľ olibani: vel oĩa ſilr̃: ⁊ maxi-
me qñ ĩ benda vnctũ hũidũ appeat. Sit aũt ſubtilr̃ ꝓlue-
riçata ⁊ bis vel ter cribellata ⁊ ſi ſupermiſceať decoctioni
mellr̃ p̃dcã opabunť meli⁹ ſi magn⁹ ⁊ ꝓfund⁹ fuerit culp⁹
Ad hoc ãt ſbtiliſſima ẽ ⁊ expꝰtiſſima cẽtaurea. ẽ.n. mirabi-
le farmacũ ĩ vtilitate ei⁹. deiñ ſiſicũ .i. plãtago aptiſſimuz.
deiñ ireos ⁊ abſinthy radix ⁊ poſtea oroboꝝ faria. Sit ãt
ſubtilr̃ cribellata ⁊ linita. mixta aũt mellis decoctio ſcđm
illõ tp̃s qñ; vtiq; ab igne auferẽdũ. deiñ ſupꝑ tere baculo:
vel miſcula vt miſceanť ipa hñ melli. Meli⁹ aũt ẽ ꝑauſe-
rẽtes ollaz ab igne emplr̃ari oĩa huius. deĩde diligẽter mo
uere. donec mel vtiq; fiat tepidum vt ſuperponi poſſit ei
que curatur particule. Cum aũt exitura ĩtrinſeca fuerit lꝫ
de ea in p̃ma ſectiõe particulariter dictũ ſit. ⁊ ad cirugicũ
nõ pertineat: ſed ad phiſicũ magis: tñ regat eã cirugicus in
abſentia phiſici velut manualr̃ opato in eo cũ miſtratiõe
euacuatiõis minus ne ſubtractiõe humiditatis impedias
maturatiõem. ſed ſi quidẽ ſanguis qui ĩuẽtus eſt malus: ⁊
corruptus exiſtat qđ vt plũnũ eſt ꝓpter cõpaſſiõem q̃; ꝑꝑ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0491-0
DFG

aliciuius euōnez cū flōmia cognoſces mūdificabis eū ꝓut ſupius dictū eſt. Si vero bonū videbis nō euacuabis niſi mult⁹ fuerit:minutio.n.ipedit ſaniationē ſubtrahēdo humiditatē ⁊ minuendo calorē miniſtrabis maturātia exgſite que ſunt medicine ſubtiliatiue ex ſimplicib⁹ ⁊ ꝯpoſitis. Ex ſimplicibus vt mirta:cinamomū amomū:⁊ reliq̄ ſpēs cū ꝯſecutione vini ſubtilis:declinātis ad albedinē paulatim bibiti. Et ex ꝯpoſitis eſt tyriaca ⁊ metridatū: ⁊ omorūſia. Et fcā maturatōe ſi ꝑ ſe non rūpat̄ miniſtrent̄ rumpētia eis approꝑata:deīde mūdificantia ⁊ vltimo ꝯglutinantia que ex ꝑdictis in ꝑma ſectiōe ſunt nota. Et oꝫ vt regas patiētez hmōi exituras extrinſecas:⁊ cuꝫ maturat̄:tendat ad calitatez ⁊ humiditatē temperatā. Cū vero erumpitur ⁊ fit dubellati:oꝫ vt regas virtutē ne cadat ſubito: ⁊ ſincopiçet:⁊ moriat̄: ⁊ ꝓprie vſti multa ⁊ ſubita ſeqtur euō:⁊ illud cū cibis bonis:⁊ potib⁹ iuriū carnium:⁊ vini ſubtilis ⁊ odoriferi:deīde cū his in qbus eſt abſterſio ⁊ mūdificatio vt chiſt ordei:aq̄ ei⁹ ⁊ cicerū aq̄:mellis: ⁊ cappares:carice: paſſule ⁊ ſiles:deīde cū hn̄tib⁹ virtutē ꝯglutinatiuā:vt ſūt extrema aīaliū neruoſa ⁊ viſcoſa que ſua q̄litate generant ſanguinē viſcoſuꝫ ꝯglutinatiōi cōueniētem.

⸿ Cap.xi. de appropriatis aꝑatum ſecundum diuerſitatē membrorum in quibus fiunt.

l Apidatio vero apoſtematis nō talis a ꝑncipio exiſtentis. vt melancolicus eſt ⁊ cōuerſio eius in ſcliroſim ⁊ duritiē accidit dupl'r. aut ex natura materie ipſi⁹: vt q2 fuerit hetherogenea ſubtilis groſſa ⁊ viſcoſa:cuius ſubtile reſoluit̄ ꝑ ſe: vel actione nāe q̄ reſolui itendens ſubtile euaporari fecit: groſſuꝫ vero dimiſit negens illud reſoluere ꝓpter ieptitudinē ſuā ꝙ īduratū remanſit ſequeſtrato ab eo ſubtili ⁊ humido leniēte ⁊ mollificante. Alio modo accidit ex errore medici in curōne: vt q2 volēs ipm reſoluere reſolutiua diſproporcionata miniſtrauerit ⁊ ſupflua ab humiditate ꝑuata. vel q2 a ꝑncipio apocruſtica fortiora q̄ꝫ oportuerit apponi miniſtrauerit. cūq; videbis aꝑa aptū hui⁹ terminatōis ꝑ ſigna que ſupius habuiſti ⁊ ꝑ duritiē a tactu iuentū poſt duritiē vel maiorē ⁊ ꝑ ſigna aptitudinis māe eius ad illā obuiabis cū regie humectante:⁊ miſtratōe humectantiū it⁹ ⁊ extra abſq; reſol'one ⁊ cū euōne humoꝝ groſſoꝝ ⁊ viſcoſoꝝ. ⁊ ꝙ ſcliratū induratuꝫ fuerit curabis ⁊ reges. Cura ꝓpria ſcliroticoꝝ ⁊ melancolicoꝝ:q̄ infra ponet̄. cōuerſio vero ⁊ ꝑmutatio aꝑatis ī putredinez fetentē ⁊ corruptionē eſt trāſmutatio totalis materie ei⁹ putrefietis ⁊ calore nō nāli extīcto eius nāli. hec ē nā putredinis dixit. H. ⁊ in hoc differt a ſaniatiōe ipſius:q2 in materia ⁊ efficiēte. ibi.n. materia iter bonū ⁊ malū ſe habebat ⁊ calor efficiēs ex calore nāli: ⁊ ꝑter nāꝫ erat mixt⁹. hic vero ⁊ mā ⁊ cā efficiēs preter nām totaliter eſt effect⁹. Cuꝫ ergo corrūpitur aꝑa fortaſſe putrefaciet ⁊ corrumpet membrū ⁊ fortificabit ipm. Qualiter aūt hoc fiat ⁊ q̄liter hoc curandū ſit ⁊ regēdus, ſit patiēs ſupra dcm̄ e in caplo generali:⁊ infra in eſtiomeno ⁊ cancrena dicem⁹. Apertio aūt ſubita ꝑiculoſa eſt ⁊ ſuffocatiua:ſi iterior ſit ⁊ in membris nobilib⁹ ⁊ aīalib⁹ vel ſpūalibus magis vel eis vicinis vt q̄ in cerebro eſt ⁊ panniculis eius gutture: vel pulmone vel pleura q̄ vicinat̄ cordi. Et ſi qdē aꝑa vel exitura nō ſit matura:illud cōtingit a multitudine māe ⁊ acumie ei⁹ diſrumpēte vel vlcerāte particulā cōtinēte ⁊ ex teneritate ⁊ ſubtilitate ipſius vel aliqua cā exteri⁹ adiuuāte vt eſt ꝑcuſſio ⁊ caſus. Si vero ſit matura ⁊ ſuppurata iaꝫ ⁊ apiat̄ ſi ſubito fiat:cā erit multitudo ſaniei ⁊ acuitas ipſi⁹ cū tenuitate mēbri vel vtraq;. Quare ſi qdē in predictis locis fiat mortē ſubitā portendit plurimuꝫ q̄ ꝓpter curſuꝫ cū multitudine ⁊ malitia ad cordis ⁊ cerebri vētriculos:⁊ ꝓprie cū eruptio facta ſit in parte ipſi⁹ poſteriori:tunc eni cū nō habeat: vnde expiret eius ſpūs ſuffocabit̄. Si vero in membris nutritiuis fuerit talē mortē ſubitam nō portēdet niſi cū in epate fuerit: vel cū mā deferat̄ ad illa cuꝫ aꝑa vel ad exituraꝫ aptā cū hoc videris ex ſignis magnitudinis aꝑatis vel exiture ⁊ multitudinis māe eius ⁊ ipſi⁹ malitie obuiabis vt tua intereſt dn̄te hyp. in ꝓnoſticis nōne illius eſt vt futuꝝ ꝑiculū vel oīo ꝓhibeat: vl' vt ſaltē ꝯpetēti āminiculo tollerabilius fiat:⁊ illud qdē facies regendo patientē cū euōnibus totius ſi expediat ⁊ ꝑtis cū ſanguiſugis ⁊ caraſationib⁹ dimiſſis donec ſanguis ſufficiēter exeat ⁊ etiā deriuationib⁹ attractionib⁹ materie ad exteriora ⁊ ignobilia cū ventoſis ⁊ alijs ꝑnarratis ſupra ⁊ obtundentib⁹ acuitatē māe ſiue humor ſit ſiue ſanies:ac cū reſolutiōe materie aꝑatis ſeu exiture ⁊ cum dieta tenui ⁊ ſiti ⁊ fame ⁊ alijs māꝫ minorātib⁹. Et ſi expediat cū eruptiōe feſtina ex his q̄ eruptionez hn̄t facere in iterorib⁹ que dicent̄ cū ꝯfortatiōe mēbroꝝ ꝑncipaliū ⁊ virtutū in eis ex odoriferis ⁊ ſtipticis ex his q̄ in ꝑma ſectōe ſunt dicta in cura cordis ⁊ cerebri. Permutatio aꝑatis ē vt q2 mā ei⁹ de mēbro in quo extitit aggregata transferat̄ ad mēbrū nobilius ad ignobilius itrinſecū vel extrinſecū ſupremū vl' īfimū vt eſt dcm̄ ⁊ illud dupliciter eſſe pōt nāliter ⁊ vi ſinthomatis nāliter qdez. vt q2 potētia nāe nō abſoluta mā ſbtiliata ſit ⁊ poris mēbroꝝ ſeu iter medijs venis ad aliud expellat̄ ignobili⁹ extrīſecū ⁊ īfimuꝫ vt cū tranſit de apoſtemate pulmonis ī aꝑa cruris vel pedis ⁊ de nobilib⁹ ad emunctoria eorūdē in īfimū:qd nō eſt poſſibile:ēt ſi iter mēbra nulla manifeſta appareat via. Jngt.n.H. nāe forti nihil ē impoſſibile in expellēdis nocētib⁹. trahit.n. ſaniē ꝑ mediuꝫ oſſis. Et regimē tūc eſt tale vt ſinas nāe nihil agendo vt in aꝑo. docuit hyp. Si vero vi ſinthomatis fiat eſt: vt q2 mā ſua multitudine ⁊ ſubtilitate ſube ac acuitate q̄litatis ſue grauādo: ⁊ moleſtāte nō poſſit ꝯtineri ī mēbro:ſ3 effluēs ꝑ poros ei⁹ venas reingrediat̄ ⁊ trāſeat ad aliud ⁊ maxie ſi ſit ei ſubiectū ſitu ⁊ virtute:ſicut cū trāſit pleureſis ⁊ ſquināţia in periplōniaꝫ. Cū ergo aꝑa ad talē ꝑmutationē videris aptus ſit ꝑ ꝑuationē ſignoꝝ terminādi ꝑ aliū modū ⁊ aptōēꝫ doloris ⁊ caloris in alio mēbro ⁊ maxie ſibi vicino ⁊ ligato vt matrici vbera alligant̄ ꝑ venas ⁊ ſtomac⁹ cerebro ꝑ paria neruoꝝ cū ꝑmanētia ei⁹ in ſua diſpōne ꝑma. ⁊ ſi talē ꝑmutatōēꝫ ꝯiecturaberis bonā vt dcm̄ eſt ſine eā ⁊ iuua ſicut ī flōme dcm̄ ē. Si vero malā ipedies eūando trahēdo ⁊ deriuādo exiccādo ꝯpigēdo ⁊ ſubtiliando regimē: vt ſupius aptiōe eius vt dcm̄ eſt. Ex reſoluētib⁹ aꝑata q̄dā ſunt ſimplices q̄dā ꝯpoſite q̄s ſupra narrauim⁹ in ſectōe ꝑma ⁊ ꝓprie in egritudinib⁹ iūcturaꝝ. ⁊ ex approꝑatis in hoc loco ē oē calm̄ tempatū ⁊ reiteratū ſuꝑ mēbro cū fricatiōe mēbri tēperata ⁊ vaporatōe faciēte illud in q̄ ē humiditas calida: vt eſt aq̄ calta ſimplex vel decoctōis floꝝ camomille mellilotī:aniſi:⁊ ſiliū embrocata: vel catapl'ata cū ſpōgia ⁊ reiterata multotiēs cū ſuppoſitōe aliaꝝ medicinaꝝ:ſimpliciuꝫ ex qbus ſunt carice:paſſule:mel:oleū antiquū: terbentina:thus:⁊ maſtix:⁊ vinū:⁊ fortioris:ſicut ſinapis:ſtercus auiū:calx cardumeni:piretrū:gluti: alboti: ⁊ maſtix ⁊ oleū antiquū. oꝑꝫ aūt vt a lenientibus nō expoliētur: ⁊ ex ꝯpoſitis ē medicamen de marcheſita:cui⁹ hec ē deſcriptio ℞. lapidis:marcheſite.ʒ.vij. armoniaci tātūdē farie fabarū.ʒ.vi. miſceant̄ cū reſina humida ⁊ liniat̄ ſupra ſaniataꝫ exiturā donec cadat ꝑ ſe. ⁊ oꝫ vt adminiſtret̄ ſtati:qm̄ exiccat̄ multotiēs. ⸿ Aliud. ℞. armoniaci ꝑtē.i. bedeguar. q̄rtaꝫ ꝑtē ꝑtis:vni⁹ ⁊ miniſtrent̄. oꝫ aūt vt nō ſpolient̄ a leniētibus ⁊ mūdificātibus notis q̄ infra dicent̄ ne ſua forti reſolutōe ad ſcliroſiꝫ ꝑducat̄ exitura ⁊ alijs q̄ in nr̄o antidotario ſerioſe notauim⁹. Et ex maturātib⁹ ſūt medicie in q̄bus calitas ſilis exiſtit calitati corporis humani ⁊ ēt mēbri in quo fieri hꝫ ⁊ eſt vt ſit calm̄ ⁊ humidū cū latitudie q̄ eſt a ꝑncipio ꝑmi gradus vſq; ad mediū ſecūdi in finē ei⁹

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0492-6

quãdoqꝫ cũ ſubſtãtia viſcoſa.⁊ de illis ſunt ſimplices ⁊ cõ
poſite ⁊ ex ſimplicib⁹ ſunt q̃ ſunt cal'e tales in p̃mo gradu
vt eſt embꝛoca cũ aq̃ tepida ⁊ faria tritici vel oꝛdei ⁊ oleũ
dulce:⁊ triticũ maſticatũ ꝓꝑ illud qđ ↄtinet de caloꝛe nãli
coꝛpoꝛis eſt meli⁹.Et panis cera croc⁹ malua: ⁊ biſmalua:
radix laudani butiꝝ:yſopus hũida adeps poꝛci:radix lily
al.domeſtici:ſe.lini:fenugreci:carice: pingues: melli oti: ⁊
vue paſſe.Et ex foꝛtioꝛib⁹ ẽ yſop⁹: glutẽ albotĩ:frumentũ:
radix cucumeris aſinini:⁊ ex cõpoſitis ſunt q̃ ↄponunť ex
eis ſcđm neceſſitatẽ.¶ Medicamẽ ↄpoſitũ ↄueniẽs ma-
turatiõi.⁊ ẽ Abo. ℞.vuaꝝ paſſulaꝝ:ſtoꝛacis:galbani:mir-
ti laudani:reſine:maſticis:butiri:yſopi humide:radicis cu
cumeris aſinini.añ.ꝑtes eq̃les:Emplm̃.S.ad idẽ de cher-
ua:⁊ emplm̃ de thimo: ⁊ emplm̃ baſilum. Et de bonis ad
hec eſt empl'z de marcheſita cũ armoniaco cũ deſuꝑ poni-
tur donec ꝑ ſe cadat:⁊ alia q̃ in nr̃o antidotario dixim⁹.Ex
farmacys vero eruptionẽ faciẽtib⁹ in exituris ⁊ collectio-
nib⁹ apparentib⁹ ꝑ̃ter dicta ſupꝛa in ſectiõe p̃ma in apati-
bus mamillaꝝ ſunt q̃ illud agũt attrahẽdo foꝛtiter rube-
faciẽdo ⁊ adurẽdo.⁊ ex eis ſunt q̃ illud agũt intriſecis q̃ ſu
ꝑa in cura pleureſis dixim⁹ ſectõe p̃ma.⁊ ex eis ſunt q̃ illđ
faciunt in extriſecis.de q̈bus nunc ſmo ẽ ex q̈bus q̃dã ſũt
ſimplicia:q̃dã ↄpoſita:ex ſimplicib⁹ ſunt fermẽtũ ſpẽs gũ-
moꝝ ⁊ ꝓꝑie galbanũ:⁊ eufoꝛ.⁊ arſeni.naſturtium:vrtica:
ſqlla:flamula:calx ſinapis:nux rancida:cantarides:coꝛdu-
meni:ſal gẽma baurach:piretrũ:⁊ ſtercoꝛa auiũ calarũ:vt
columbi anatis:⁊ anſeris accipitris falcõis:tapſia: ⁊ ſilia:⁊
maciane ru.trice cũ coꝛticib⁹ ſuis vel herba alcãna cocte ⁊
emplãte.Et ↄpoſite ſunt q̃ ex his ↄponũť ⁊ ↄficiunť cũ ſuc
cis eoꝝ vel gũmis diſſolutis in eis vel cũ melle:vel cũ ſter
coꝛe auiũ p̃dictaꝝ vel capitello.i.leſiuio foꝛti ⁊ coloꝛ bal-
neantiũ.Et talia ſunt ex rũpentib⁹ ⁊ cũ exiccãtib⁹ ſaniẽ cũ
eruptõez voluerim⁹ euitare.Et ex ↄpoſitis erũpentib⁹ eſt
empl'z qđ fit. ℞.radicẽ narciſci buliat cũ aq̃ ⁊ oleo de lilio
⁊ melle.deiñ empletur. Rũpit eni oẽ prauũ. ¶ Aliud foꝛ
tius.ſumanť cantarides teranť ⁊ ponanť ſuꝑ oleũ vetus ⁊
decoquanť ſuꝑ pꝛunas donec totũ ↄgeleť:deide terantur
cũ melle anacardi ⁊ ſtercoꝛe colũbino ⁊ empletur. ¶ Em
plm̃ exptũ per Abo. ℞.medule granoꝝ coti:nucis rãcide:
fermẽti:caules:⁊ cepe decocti ſinap.⁊ fimi colũbini ⁊ fiat
emplm̃. ¶ Empl'z exiccãs ⁊ reſoluẽs ſaniẽ ſine eruptione
℞.baurach:ſalis ar.ſinap.ſtercoꝛis auiũ:arſenici: calx coꝛ
dumeni:miſceanť thus:⁊ glutẽ albotĩ: ⁊ maſtix ⁊ aggrege-
tur trita cũ aceto ⁊ oleo antiquo. ¶ Linimẽtũ ad idẽ. ℞.
marchaſite:armoniaci.añ.ʒ.xy.farine fabaꝝ.ʒ.vi.miſceã-
tur cũ reſina hũidaꝛ liniant ſuꝑ cutẽ ⁊ ſaniez donec cadat
ꝑ ſe:oꝫ aũt vt ſtatĩ miſtreť:qm̃ cito exiccať. ¶ Linimẽtũ
quo apiunť apata matura. ℞.liquoꝛis anacardi: picis liq-
de.añ.ꝑtes eq̃les ſumanť in coclearĩ ferrea ↄmixte teran-
tur donec fiãt vnũ:de eo pone ſuꝑ quẽ locũ volueris apire
⁊ dimitte ꝑ mediũ diẽ.ꝙ ſi cũ p̃dcis nõ aperiať nec ſanies
exiccet oꝫ vt apiať ⁊ icidať ferro ⁊ modus eſt quẽ in mem
bꝛis ſingulis Antil⁹ magn⁹ cirugic⁹ ⁊ expt⁹ inſinuauit di-
cens.ſi exitura fuit in cape ſectio ei⁹ ſit ſectio eq̃lis:⁊ ſit cũ
radice natiuitatis pilloꝝ.nec ſit tranſuerſa in eo vt coope-
riant pilli ⁊ nõ appareãt cũ ſaniabiť ⁊ cũ ẽ loc⁹ occult⁹:tũc
eius apꝛio ſit lata.⁊ ſi accidit in naſo tũc ꝑfoꝛabim⁹ eũ eq̃-
lẽ ſcđꝫ q̃titatẽ lõgitudinis naſi. ⁊ ſi fuerit ꝓꝑe ꝑfoꝛabim⁹
ꝑfoꝛatione ſili capiti lune noue ⁊ ↄficiem⁹ toꝛtuoſitatẽ in-
feri⁹.ſi aũt accidat in mãdibulis ſecabim⁹ eã ſectiõe equa-
li:qm̃ ↄpoſitio hui⁹ loci eſt eq̃lis ſicut illud ex coꝛpoꝛib⁹ ſe
num:poſt aures vero ꝑfoꝛabimus eã ſectione eq̃li:qm̃ cõ-
poſitio hui⁹ loci ẽ eq̃lis.bꝛachia vero ⁊ cubitos ⁊ manus ⁊
iguina oĩa ꝑfoꝛabim⁹ in lõgitudinẽ.Et ſi fuerit ꝓꝑe coxã
ꝑfoꝛabim⁹ eã ꝑfoꝛatione rotũda. Et ꝑfoꝛatio q̈dẽ rotũda
ẽ q̃ appꝛehẽdit cũ appꝛhẽſiõe ſua de lõgitudĩe coꝛpoꝛis ali-
quid de latitudine ei⁹ qm̃ cũ locus ille nõ ꝑfoꝛať rotunde
poſſibile ẽ vt aggregenť in ea mãe:⁊ fiant fiſtule.⁊ ſilr etiã
ꝑfoꝛať qđ ẽ ꝓꝑe anũ ꝓꝑter locũ humiditatis que aggrega
tur in eo.⁊ in latere coſte ꝑfoꝛanť apiendo.in teſticulis vo
⁊ virga eq̃liter.Et ſim⁹ ꝓmpti ſemꝑ vt ↄſutũ ſit ↄñs figu-
rã loci:q̃to plus poterim⁹ ſupꝛa ipm̃. Coſſe vero ⁊ adiuto
riũ ſecanť in lõgitudĩe ⁊ obſerua:vt nõ ledant neruos. Et
dixit ſcias ꝙ ꝑfoꝛatio diuerſificať ſm̃ loca: ⁊ qñ eſt apud
oculũ tũc ꝑfoꝛatio fit lata ſilis ſitui oculi.Aures vero non
ꝑfoꝛenť eq̃liter ⁊ in bꝛachys crurib⁹ coſſis ⁊ virga totum
eq̃liter fit in longitudine.⁊ ſilr in lacertis vẽtris ⁊ doꝛſo:
⁊ in inguinib⁹ ⁊ ſub aſſellis penes ꝑfoꝛationẽ eã accipien-
tẽ ex latitudine etiã ne fiat in ea ſin⁹ q̃ fiat fiſtula. Et teſti
culis ⁊ virga eq̃liter in longitudine ⁊ latere ⁊ coſtis accipe
in latitudĩe:ne etiã ſit trãſuerſus: qm̃ ſitus coſtaris ẽ ſilr.
⁊ ſil' caro q̃ eſt ſuꝑ eas. Jnq̈t qm̃ ꝓꝑter ſituꝫ carnis ⁊ vilos
lacertoꝝ:qm̃ nõ ſum⁹ ꝓmpti niſi ad hoc vt ꝑfoꝛemus niſi
cũ imutatione vt nõ ꝑueniat icidio.⁊ ſit locus incarnatõis
bon⁹ ⁊ nõ groſſus.Et ſit in oĩ diſpõne igeniũ tuũ ne icidas
arteriã neqꝫ venã magnã exiture aut neruum aut vilos la
certi.Et ꝑfoꝛatio ſit ſecũdũ magnitudinẽ exiture.ſ. ſi fue-
rit parua ⁊ currit qđ in ea ẽ ex loco vno ſeca eã ĩ loco vno.
⁊ ſi fuerit magna tunc perfoꝛa. deide ĩtromitte digitũ tuũ
indicẽ ſiniſtrũ in ea:⁊ ꝑfoꝛa iterꝝ eã:vbi ꝑuenerit caput ei⁹
deide ĩtromitte etiã in foꝛamine ſecũdo.⁊ ſecũdũ hoc do-
nec venias ſuꝑ eã.⁊ ſi exiture fuerit locus ſufficiẽs ex quo
ſit poſſibile exire qđ eſt in ea ꝑfoꝛabim⁹ ipſaꝫ in loco illo:⁊
fuerit rotũda:aut fuerit ei ſin⁹ ne egrediatur qđ in ea ẽ ex
ꝑfoꝛatione vna ꝑfoꝛabim⁹ etiã eã in ĩferioꝛi ꝑte ſui in duo
bus locis aut trib⁹ ſm̃ q̃titatẽ quaꝫ ſis ꝙ oẽ qđ aggregať
ex ea currit in hoꝛa. Jnq̈t vbi ſit exitura cõiuncturalis aut
membꝛum nobile:aut membꝛuꝫ ꝓpinquuꝫ oſſi aut pan
niculo feſtinabimus in perfoꝛatione eius anteqꝫ cõfirme-
tur eius maturatio ne pus coꝛrũpat aliq̃d de mẽbꝛo illo:⁊
multot' ẽs cutis ꝑfoꝛať ꝑfoꝛatõe aliq̃ aut accidit de ea ali-
quid aut poſtponať ſuꝑ eam eruptionẽ faciens vt ſit ei ꝓ-
fundatio incarnantia ⁊ cõglutinãtia ⁊ ſigilãtia infra que-
rantur ꝑticula tertia.capitulo p̃mo.

¶ Capitulũ.xy.de cancrena ⁊ eſtiomeno.

C Ancrena ⁊ eſtiomenũ eſt cũ apa ſit ꝑducens mẽ-
bꝛuꝫ in quo eſt ad coꝛruptionẽ ⁊ moꝛtificationeꝫ:
tunc.n.coꝛrumpiť membꝝ:cũ ad moꝛtificationeꝫ
ꝑducitur tunc q: coꝛruptũ erit cũ fuerit moꝛtificatuꝫ.coꝛ-
ruptio.n.eſt mutatio de ente in nõ ens.⁊ viuere viuẽtibus
eſt eſſe: vt ariſtotiles dixit: tũc diceť coꝛrũpi vel coꝛruptũ
eſſe cũ ĩ moꝛtificatõis ſit via vel iã moꝛtificatũ exiſtat.cũ
ꝙ in via coꝛruptõis exiſtat:q: coloꝛ ei⁹ in liuidũ vel viridẽ
ĩcipiat manifeſte mutari minoꝛať ei⁹ ſenſus ſi ſenſibile ſit
⁊ in p̃ncipio ſit talis coꝛruptio ⁊ mutatio a fl'one ꝓꝑe dice-
tur cancrena.Cũ vero ꝓcedit ⁊ deſtruať ei⁹ caro ⁊ q̃ ipꝫ ſe
quunť ⁊ putreſcat ⁊ coꝛrodať vſqꝫ ad os:dř aſcachilos.cũ
vero putrefactio p̃ceſſerit ⁊ ꝑuenerit ad coꝛruptionẽ ꝑfe-
ctã vt iã ſit moꝛtificatũ mẽbꝝ ⁊ coloꝛ ſit mutat⁹ ad nigre-
dineꝫ ⁊ ſenſus ei⁹ totaliter ſit deſtruct⁹ diceť eſtiomenus.
Et cã coꝛruptõis ⁊ moꝛtificatõis ipius mẽbri ẽ deſtructio
ↄpl'onis vel calitatis nãlis ⁊ ſpũs ei⁹ ⁊ ſupacquiſitio calita
tis p̃ter nãꝫ. Cui⁹ cã ẽ duplex:ĩtriſeca ⁊ extriſeca.itrinſeca
rõne apatis:đ q̃ ẽ ſmo ad pñs : ẽ duplex.ſ.ex ꝑte ipi⁹ apatꝫ
⁊ ex ꝑte erroꝛis ↄmiſſ⁹ ꝑ medicũ ĩ ei⁹ cura.Ex ꝑte q̈dẽ apa
tis tripl'r:vel q: ſit magnũ:⁊ ml'te ⁊ groſſe mãe de gñe fl'o-
nis:q: ſuffocat caloꝛẽ nãlẽ ⁊ ſpm̃ in mẽbꝛo oppilãdo vias
trãſit⁹ ei⁹ de p̃ncipalib⁹ ad ipꝫ ꝓhibeat illũ venire ad euꝫ:
vel q: ſit male mãe putride putreſcentis vel vlcerãtis de
gñe herpetis vel venenoſe de gñe antracis vel ignis ꝑſici.
vl' q: ſit ml'to ⁊ magis ſil' de gñe fl'onis eriſipillati ⁊ foꝛmi-
ce vlceratiue cãcri ⁊ lepꝛe.Ex ꝑte vero erroꝛis medici ĩ cu

ra: ſʒ ad extrinſecaʒ cāʒ ꝑtineat multiplr̄ vel qꝛ in ꝑncipio fortiora apocruſtica miſtrauit ⁊ fridiora q̄ꝫ oportuit: ⁊ diutius. qr̄ calitatē nālēʒ ⁊ ſpm̄ extinxit in illo vt ſupra in gn̄ali capitulo dcm̄. vel qꝛ effuderit oleuʒ in vlcerib⁹ ꝓfundis: qr̄ ſordidat̄ caro ⁊ putrefit: vel qꝛ putrefactiua ⁊ ſaniatiua fortia diuti⁹ miſtrauerit: necnō ⁊ ſaniē in mēbro diuti⁹ permiſerit q̄ꝫ oportuerit vl̄ qꝛ corroſiua ipoſuerit i ipʒ iā vlceratū cauſa corroſiōis carnis male addite: ⁊ diu permiſerit vel pluſq̄ꝫ oʒ aut abſq̄ꝫ cā: vt qꝛ voluerit doloreʒ in mēbro augere cā extirpatiōis pecūi e: qḋ q̄n medici irrōnabiliter agūt ⁊ vltra ſtatutū eis ꝑciū pl̄s exigūt: vl̄ qꝛ ligaturā magis ſtrictā q̄ꝫ oportuerit fecerit ꝓpe cū ſteletis. qr̄ oppilatꝫ vyꝰ ꝓhibet̄ calor ⁊ ſpūs trāſire ad mēbꝝ. ⸿ Cā exterior ē frītas aeris ꝯplēs. iciſio vl̄ ꝑcuſſio caſus morſus veneno ſoꝝ aīaliuꝫ vinū ſumptū calm̄ vel ſua ꝓꝑetate corrūpens cū auxilia ꝓꝑa nō fuerint miſtrata: ⁊ hec oīa ſunt manifeſta. Cura cācrene ⁊ eſtiomeni iā dcm̄ ē in ꝑcedēti caplo q̄liter ꝓhibeat̄ apa ⁊ corruptio mēbri ne fiat nūc dicere volum⁹ q̄lr̄ acciderit cū ſit curāda. ⸿ Sciēdū āt ꝙ cācrene in ꝑncipio eſt cura poſſibilis. cū vō ꝓceſſerit: vt ꝑueniat ad aſchachilos nō certa ē ſpes ſalutis. decliat. n. pl̄s ad corruptionē vel mortē: q̄ꝫ ad vitā. Gal. vero exēplificauit in corruptōe ſanguis loq̄ns in vīo qḋ corrūpit̄. d. cū ergo ſanguini corruptio ꝯtingit. Idē fit qḋ in vīo ſolet fieri qꝛ cū vinū in acetū ſolet mutari ⁊ in ꝑfectū acetū ꝑuenerit: nō pōt in vinū āpli⁹ redigi. ꝙ ſi paꝝ mutet̄ ⁊ nō ad acrediēʒ ducat̄ plīmū ad nāʒ vini vertet̄. Idē in corruptōe ſanguis ⁊ mēbri ē itelligere. ⸿ Cura vō oēʒ ei⁹ ꝯprehēdēs diſpōneʒ eſt v. res. ꝑma ē putrefactōeʒ ꝓhibēs. ſcḋa ē putrefactū abſcidēs. tertia ē ꝓhibēs ne putrefactio ſpargat̄ vlteri⁹. q̄rta ē corrigēs accn̄a. q̄nta eſt regimē. ⸿ Prima ꝯplet̄ hoc mō: qꝛ cū videbis colorē mēbri apati ⁊ ꝓꝑie in apate flonico magno alterari ⁊ ꝑmutari ad liuidū: qꝛ i via putrefactiōis ⁊ corroſiōis exiſtat: tūc oʒ vt ſubuenias cū eo qḋ a ꝓꝑetate: ⁊ ꝯplōne adiuuāte ꝓhibeat ei⁹ putrefactōeʒ q̄lis ē bol. ar. terra ſigillata: cū aceto: linita ſup ipʒ. Si vō illō nō ſufficit nō iuenies excuſatōeʒ q̄n facias ſcalpelatōeʒ ꝓfundā diuerſoꝝ modoꝝ in locis: vel ponas ſanguiſugas: ⁊ flones venas ꝓximas ei paruas vt euomat̄ oīs ſanguis cū cautela malus q̄ circūdat locū ⁊ ponat̄ ſup locū ipʒ ſcalpelatuꝫ qḋ ꝓhibeat putrefactōeʒ ex his q̄ dcā ſunt ſuplinita vel ꝯ̄trys in ꝯplōnē ea in q̄b⁹ ē ꝓfundatio fortior ſicut faria ordei cū ſyrupo acetoſo ꝑmixta aut cū farina fabaꝝ ⁊ ꝓꝑe ꝑmixta cū ſale. Et de his q̄ ſupliniūt̄ ē aſe. ſemē vrtice ⁊ ſuccus folioꝝ acori: vt de vnoquoq̄ꝫ ſit ꝑs vna: floris eris. ꝑ. ß. terant̄ cū aq̄ donec fiāt ſʒ ſpiſſitudinē mellis: de quo liniatur man⁹ i circuitu ei⁹ attēdēs mēte ad corp⁹ laborātis i talib⁹ auxilys miſtrādis vt forti ⁊ duro vt ruſtico fortia miniſtres: debili vō ⁊ molli vt puero ⁊ mlieri ⁊ viro coloris al. ⁊ mollis carnis: mollia miſtrabis. Et de medicis ꝓhibētib⁹ corroſionē ē vt ſumat̄ floris eris mellis ⁊ alumis. an̄. ꝑtes eq̄les ⁊ liniat̄ cuʒ eis. ꝓhibet. n. eas ⁊ facit cadere qḋ putrefactū ē: ⁊ ſuat id qḋ ſeq̄tur ipm̄. Si āt ꝑtrāſeat diſpō diſpōnē apatis ⁊ diſpōnē corporis ei⁹ vel coloris ⁊ incipiat deuenire in mollitiē mēbꝝ ⁊ humectet̄ parūper tūc hec ē iceptio ei⁹ in putrefactōe: qr̄ oʒ: vt puluericet̄ ſup ipm̄ ariſtol. ro. ⁊ gall. an̄. eq̄lis partis: ⁊ exiccent̄ ēt dragāti ⁊ colcotar ſunt bona ⁊ ꝓꝑe cū aceto. ⁊ folys nuc. ipʒ calcātū ru. pl̄uericatū ſolū ⁊ ſil̄ cucumer aſi. ⁊ ſuc⁹ ei⁹ epithiat⁹. ⸿ Secūda res ꝯplet̄. ꝙ ſi ꝑs carnis icipit corrūpi vt iā ꝑuenerit ad aſchachilos icide eā: aut fac eā cadere cū trociſ. de arſenico: aut de calcāto q̄ ſūt fortiores illis. Cūq̄ꝫ feceris cadere cancrenē fac currere cū butiro vel alys q̄ īfra duce xp̄o dicem⁹: ponēdo deſup. deīn fac cadere eſcarā ⁊ non ceſſes donec ꝑuenias ad carnē ſuā: ⁊ cuʒ mēbꝝ totū: q̄ſi putrefactū ē vt ſit ſcm̄ eſtiomenū: oʒ ꝙ icidat̄ ne corruptio trāſeat ad vicinū. Ingt. n. G. qḋ tāgit̄ a putrido putrefit. ⸿ Cūq̄ꝫ icideris illud vel ꝑtē ei⁹ oʒ vt exerceas rē tertiā ꝓhibēdo ne ſpgat̄ adhuc putrefactio ⁊ corruptio. ⸿ Cōplet̄ enī cū cauteriçatione partis vel mēbri remanētis cū igne: aut cū farmacys cauſticis ⁊ adurentib⁹: ⁊ ꝓꝑe in mēbris facile ſuſcipiētib⁹ putrefactōeʒ ꝑꝑ ſuā calitatē: ⁊ qꝛ ſupfluitates calide approximent̄ eis vt teſticlus ⁊ anus. efficit. n. cauteriçatio iuuamētū: qḋ abo. oñdit cū iq̄uit. Cauteriçatio ē medicamē valde vtile ad reſoluēdū māas corruptas in mēbro reptas ⁊ ad ꝓhibēdū ne corruptio ſpargat̄ ⁊ ad ꝯfortādū mēbꝝ cui⁹ ꝯplōnē volum⁹ rectificare ⁊ ad reſtrigēdū ſanguis fluxū. q̄b⁹ hic oīb⁹ idigem⁹. Cū ergo cauteriçatione ſit eſcara facta in loco oꝑʒ vt ſic agas ꝙ eſcara cadat cito. cōplebis aūt illō miniſtrādo ⁊ deſup ponēdo panē cū idromelle: coctū aut cū farina ordei vel cū eo miſcere fermētū ⁊ q̄cūq̄ꝫ ad ſuppurōnē ſunt aptiſſima idonea ſibi ad decīſionē aduſtionū ⁊ panis ex apio trit⁹ ⁊ baſilicon tritus corrūpit ⁊ ſedat vſtiōes ab humidis. Et ex ſimplicib⁹ eſt ireos radix cū melle vel panici farina vel ariſtol. vel acori in duris corpib⁹. in mollib⁹ vō ſufficit butix: vel oroboꝝ farina cū melle. Cumq̄ꝫ ceciderint vſtiōes ⁊ eſcare: carnoſent̄ ⁊ ꝯglutinent̄ finalr̄ de q̄b⁹ dicet̄ i ſeq̄nti ꝑticula ſi de⁹ āuuat. Accn̄tiū vō correctio ē vt cū magnificari appeat apa in circuitu putrefacti tūc corrigat̄: ⁊ ſuccurrat̄ cum emplō ex ſauich: ordei cū ſucco iuſq̄a. al. vel nō approꝑietur ſupra ꝑtē putrefactā ſʒ i circuitu ei⁹ vt ab illa repellat. Regimē vō ē vt regat̄ cū frīs ⁊ ſiccis. ⁊ alys ꝓhibētib⁹ putrefactiōeʒ. q̄lia ſunt acetoſa: ⁊ acetū ⁊ ſalita ⁊ amara cū ex eis fiāt pille ⁊ ſumant̄ quolibet die ex eis. iy. cū his q̄ mūdificant aꝓꝓꝑetate vt ē cinamomū xiloaloes ⁊ ſilia.

⸿ Cap. xiy. de moro ⁊ medicinis eius.

m Oꝝ ē apa molle ex cāne addita accn̄s i carne rara ⁊ ꝑlīmā in ea q̄ in ano vulua ⁊ capite virge: ⁊ q̄nq̄ꝫ eſt effundēs humiditatē rubeā ad modū aquoſi ⁊ q̄nq̄ꝫ eſt ſaluū ⁊ q̄nq̄ꝫ ē malignū ⁊ doloroſuꝫ ⁊ cura ſaluī ē cū aſperſiōe pulueris corticū granati acetoſi. Ei⁹ vō qḋ eſt malignū curatio ei⁹ ē cū ſedātib⁹ dolorē ex corroſiuis farmacis: deīde cū glutinoſis. Et decoctio ficus ⁊ ꝓꝑie allium ꝯfert ei ⁊ fel aſini ſiluestris eradicat ipſum.

⸿ Seq̄tur ſūma ſecūda ꝑticule ſecūde ſectōis ſecūde ⁊ ē de medicinis apoſtematū colericoꝝ ⁊ mixtoꝝ ⁊c̄.

Sequitur ſumma ſecunda particule ſecūde q̄ ē de medicis apatū colicoꝝ ⁊ mixtoꝝ ꝯtinēs capl̄a. iiy.

⸿ Cap. ꝑmum de eriſipilla.
⸿ Cap. y. de formica.
⸿ Cap. iy. de herpete.
⸿ Capi. iiy. de flegmone eriſipilla: ⁊ alys ex ſanguine cō mixtis ⁊ colera

⸿ Capitulum primum de eriſipilla.

e Riſipilla ē apa colicū ex col̄a rancta nālr̄ ſe hūte extracta de corpe in epe ⁊ ciſti fellis ad cutē: ibiq̄ꝫ collecta ꝑꝑ groſſitiē ⁊ ml̄titudinē ac dēpſitatē cutis. qr̄ in tumorē eleuat̄ ⁊ ſupcaleſcit in flonis mōꝫ ꝯuenit. n. ei ⁊ dr̄t ab ipſo. ꝯuenit q̄dē i tumore ⁊ calitate. vtrobiq̄ꝫ. n. tumor ⁊ calor ē. dr̄t aūt ab ipſo i q̄to ipoꝝ: nā i flone tumor maior ē: calor vō mīor. i eriſipilla vō tumor mīor ⁊ calor maior ſiue acutior. ⁊ dn̄t ēt in mā: qꝛ in flone mā ſanguis ē. in eriſipilla vō col̄a. in loco ēt. nā i flone ſanguis mā in ſubcutaneis ꝑtib⁹ ē vt in carne ⁊ muſcul. in eriſipilla vō col̄a in cute ē colica: cal̄a. n. ⁊ ſubtilis ē cū ꝯſiſtētia qr̄ ipulſa mouet̄ de ſui nā ad ꝑtes circūferētiales corpis apte ⁊ ꝑtrāſiēs carnes ⁊ raras ꝑticulas corpis deuenit ad vltimaꝫ cutē quā cū nō poſſit ꝑtrāſire factā dēpſaꝫ: vl̄ qꝛ groſſitiē aliq̄ꝫ acq̄ſiuit colligit̄ in ea ⁊ facit apa. Si. n. ſubtilis eēt ⁊

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0494-8
DFG

cutis rara: vt in corpe nāliter ſe hn̄te exiſtit ptrāſiret vtiqꝫ ipſaꝫ ⁊ ↄſpirando īſenſibil'r efflueret de corpore vel ſenſibiliter cū ſudore: queadmōꝫ ſcōꝫ vnāquāqꝫ die videm⁹: ⁊ ppe in balneatoꝝ abſterſis ſudorib⁹ color flau⁹ appet q̄lis col'e ē. Dn̄t quoqꝫ ī accn̄tib⁹ vt in colore cutis: ⁊ leſiōe ei⁹ ⁊ pulſu. in flōne. n. color cutis rube⁹ ē ⁊ cutis de ſe illeſa cū pulſu. in eriſipilla vō flau⁹ vel mixt⁹ ex flauo ⁊ rācto ſine pulſu vel cū miori. ⁊ qdē cū ipa colera dimiſit mēbꝝ qd ē ſup eā cutē excoriaṫ ⁊ tpe ad pfundū vadit vt vlceret totam cutē vſqꝫ ad ſuppoſitā carnē: vt hec tota diſpō eriſipille varieṫ duplicē hn̄s drīam ſeu ſpēm qꝛ vel ſine vlcere vel cū vlcere fiēs. pmā. G. herpetē noīauit. ſcōaꝫ herbeſtiomenū vt īnuit ad glaucomē. lꝫ videanṫ ex dicto capitulo q cū vlcere fit ⁊ aſchachilos. itē pulſus ē ſinthōa magna flōnis: ⁊. n. ī pfundū fit vbi arteria fit. eriſipilla vō in cute vbi arteria nō ē: lꝫ ipſaꝫ orificiū ramuſculoꝝ ei⁹ attigat. Eriſipilla quoqꝫ iudicia hꝫ ex loco ī quo īcipit. Si. n. icipiat a leroze naſi ⁊ ē plurimū: augmētaṫ ⁊ expādiṫ in facie tota capite ⁊ ē min⁹ malū: ⁊ qn̄ꝫ icipit a ſtrictura oſſis ⁊ ſub cute ⁊ eſt mai⁹ malū. Ex qb⁹ cāe ⁊ ſigna eriſipille ſunt manifeſta.

¶ Cura ei⁹ ē. iiij. res. abſciſio an̄cedētis cāe. euō cāe īfluxe ⁊ īcuneate ī poris cutis. correctio accn̄tiū. ⁊ rgis ordiatio ī ſilitudinē flōnis. Queadmodū. n. flōni eriſipilla cōuenit ⁊ dfṫ: eodē mō in cura ↄuenit ei ⁊ dfṫ. ¶ Cōuenit qdē in euōne ⁊ īfratōe: eo q vtrobiqꝫ tumor ī cā ē. ¶ Dfṫ vō in q̄ntitate euōnis ⁊ īfratōis ſic in q̄nto dfebāt tūoris ⁊ caloris: ī flōne. n. qꝛ tūor ſupat calorē. ītētō quoqꝫ euandi pualebit īfrīdādi itentōi. in eriſipilla vero infrigidandi intentio preualebit ſeu ſuperabit euandi ītētiōeꝫ. ⁊ qꝛ mā īfluēs ⁊ an̄s in eriſipilla erat col'a pura: in flōne ſanguis pur⁹ vel paꝝ mixt⁹: erit toti⁹ euō in eriſipilla col'e: queadmodū in flōne toti⁹ euō ſanguis. ¶ Cōplebiṫ āt colagogo aliquo ſic ī flōne euō ſanguis cū flōmia. Et ſi qd pauca ſit paſſio ſufficiet cliſtere cū acri. nō. n. ↄuenit ī tali flōmia. Cū. n. ſanguis ſit frenū colere vbi nō ſupabūdat: ſi euetur col'a fiet effrenis. vn̄ G. īfelices ex col'a nō ſunt flōmādi q ſi colera ſupabūdet pmittēda ē flōmia ſꝫ nō minorativa. ¶ Euō vō apatis ſeu ptis eriſipillate duplr ↄpleṫ. pmo p apocruſtica ⁊ repellētia ad pticulas alias. ſcōo p diaforetica. ⁊ qꝛ nō q̄ntitate cōtriſtat pticulā: ⁊ a magnitudīe deficere fac ab eo qd ēm naturā vt flōn: ſꝫ q̄litate ⁊ īflatiōe magis īfrantibus repcuſſiuis apocruſticis fortiorib⁹ īdigebit q̄ꝫ flōn. Et qdē talibus nō piculoſū ē vti cū repellāt de inobilib⁹ exteriorib⁹ ad interiora nobilia niſi toti⁹ euō pceſſiſſet: queadmodū in flōne. nec quoqꝫ ſine ea repulſio māe bono mō fieri poſſꝫ p illa ad circūadiacētes ptic'as: ⁊ totū corp⁹ nec diſſoreſis ēt. Ingt. n. G. plenū exn̄s corp⁹ nō recipit qd ipelliṫ ⁊ ſi aggreſſi fuerim⁹ trahem⁹ p calorē ampli⁹ in ptē q̄ꝫ diaforeſiꝫ faciam⁹ ad hec vtraqꝫ ↄplēda ⁊ euitādū piculū repulſionis ad pncipalia ⁊ ad ↄplēdā opatōeꝫ repcuſſionū ⁊ diaforeticoꝝ quoqꝫ approximādoꝝ pticule ad euōnē cāe coniūcte ↄpatis icuneate in ea. pmittēdū ē ī eriſipilla colagogū ad euōnē toti⁹ ſic ⁊ flōmia ī flōne: deīn ad euōnē ptis accedere ⁊ colere in cute collecte. Et pmo cū repcuſſiuis ampliorib⁹ ⁊ fortiorib⁹ q̄ in flōne dixim⁹. Qualia ſunt lactuce ſēperuiue: portulace: lēticule aq̄: mucilagies pſilij: iuſqam⁹ ⁊ virga paſtoris emplāta ⁊ ſilia ⁊ cū ſuba acepta vel cū ſuccis eaꝝ ſuppoſita ⁊ aq̄ fra īfuſa quā hyp. ī affo. cōmēdauit in non vulnerata: ⁊ tādiu: donec trāſmutatio fiat caloris: certiſſime. n. īuenies eriſipillas curatas cū talib⁹. repellūt. n. qd īfluit ⁊ eriſipille cā fit ⁊ ſil' inflatōeꝫ extiguunt ⁊ ſedāt dolorē pticule q trahēdo influxionē colere adiuuat vt eriſipille pſtet augmētū ⁊ ſic eriſipillaꝫ phibeāt. Et quoqꝫ qd in pticula ↄtineṫ: ēt cū appropinquātes expellāt pticulas pp ipi⁹ ſubtilitatē curatā: iā facte eriſipille auxilia exiſtit. ¶ Scōo ſi aliqd in pte adhuc remāſerit ſua groſſitie repelli nō valēs expedit qn̄ feruor iā ei⁹ abierit ad diaforetica deuenire auxilia: q̄lia ſunt tpata in caliditate: ⁊ humiditate ⁊ medicaie ⁊ cataplaſmate eis vel cal'a ordeacea farina ⁊ croco: vel cōdro vel alio. adhuc. n. ſcōm vtrūqꝫ mōꝫ ↄferūt ſic pdcā. nā in eo q ſedant dolorē ⁊ ēt caliditatē remittūt augmētationē eriſipille fieri phibēt. inq̄ntuꝫ vō qd iā īfluxū reſoluūt ſananṫ q iā eriſipille fcm̄ eſt: ⁊ ſic puiſio ſt ſil' ⁊ cura. nec expedit ad ſaniatōꝫ ei⁹ pcedere. in eriſipilla. n. ſanies mala ē vt hy. dixit ī affo. ¶ Correctio vō accn̄tiū. ſ. doloris ⁊ īflāmatōis ex pdcis eſt nota. vlceratōes vō ipſi⁹ corriges pſcarificans ēplaſtrādo ordeaceā farinā. deīde ipꝫ ⁊ excoriatōeꝫ cū vnguēto al. de ceruſa: qd in nr̄o antidotario dcm̄ ē: ⁊ ē vnguētū ſeriſcinū. ¶ Regis ordiatio ē vt ↄuertaṫ regimē in oib⁹ reb⁹ nō nālib⁹ ad frm ⁊ humidū q̄ ſupra in cura febriū nota ē. ¶ Medicina Abo. ad excoriationē eriſipille. ſcoria plūbi in vino pontico buliat cū ſicle folijs: ⁊ cū eo euaporeṫ: deīn cureṫ cū eo in quo ē reſolutio fortis cū īfratōe q̄le ē. ℞. lane veteris aduſte nō lote ʒ. xv. ſcorie ferri: plūbi. ana. ʒ. ix. ſepi caprini veteris abluti cū aq̄. ʒ. xv. olei mirti. ʒ. v. ⁊ vtaṫ. ¶ Aliud lenitiuū leui⁹ illo. ℞. ſcorie plūbi. ʒ. x. ſucci ſicle. ʒ. ij. olei ⁊ cere qd ſufficit.

¶ Cap. ij. de formica.

Formica ē apa cutis colericū ex colera aduſta paruū icipiēs ſic puſtula vna vel plures cū punctiōe ad modū punctiōis formice: qr dcm̄ ē formica. deinde fit apa paruū ⁊ ambulat paulatī: ⁊ qn̄qꝫ corrodit ⁊ vlcerat pp groſſitiē colere: ⁊ fit vlcus putridū: ⁊ qn̄qꝫ reſoluitur cū ē ſubtile: ⁊ ē veſicās tm̄ ſeperās ⁊ excoriās ⁊ qdā ei⁹ ē miliaris: eo q hꝫ puſtulas plures ⁊ puas ſil'es milij: ⁊ eſt ſpēs formice. ¶ Signa qdē ſunt formice qd ē. qꝛ icipit ſic puſtula ⁊ ei⁹ eſſentia ē rotunda ⁊ diſpō vt audiuiſti ⁊ color ei⁹ eſt ad citrinitatē decliuis cū īflāmatōe grādi hn̄s radicē latā. ide ē q noīatur miliaris. ¶ Cura formice ↄſiſtit ī illis in qb⁹ ↄſiſtit cura eriſipille. ſ. in euōnib⁹ toti⁹ ⁊ ptis: cū alteratōe ⁊ īfratōe ⁊ reliqs. veꝝ oꝫ q colegogū ei⁹ ī euōne vli ſit ex educētib⁹ colerā aduſtā q̄lis eſt aq̄ caſei cū foliculis ſene ⁊ fumo terre ⁊ ſilib⁹ ⁊ cū additōe ſcamoñ. ſi expediat. deīn miſtrabis ſup apa īfrantia q̄ ſunt dcā in eriſipilla niſi fuerit corroſiua: qm̄ tūc hūida: lꝫ ſint fra. nocēt: ⁊ ſimiliter diaforetica: qr oꝫ vt miſtrenṫ ea ī qb⁹ ē ſtipticitas cū fritate ⁊ calitate pua: vt eſt rub⁹ ligua canis: ſolatrū lentes plātago ⁊ ſilia q̄ dcā ſunt ſupra in cura carbūculi ⁊ carbonis: an̄. n. purgatōeꝫ pdcāꝫ ſi incipias infrare retinebis māꝫ ⁊ maxie ſi ſtiptica ſint fra: qr corroſio poſt corroſionē non ceſſabit augeri. Et poſt pdcā miſtrabis ſauich ordei: ⁊ coeticē granati: ⁊ ramos vitis. cū vō termineṫ corroſio: ſuper eā miſcebis cū iſtis infratiuis aliqd mellis: aut farine thuris cū ace. ⁊ aq̄: q̄ currit ex ligno vitis hūido cuꝫ aduritur: ⁊ ſterc⁹ ouinū: cū ace. ⁊ ficus: cū aſſungia porcia ſuppoſita nō ſinit eā dilatari. Cū ergo appet corroſio ⁊ vlceratio tūc admīſtra trociſcos andoronxū vīo ſtiptico aut aceto ↄmixto cū ſucco cucumeris aſi. ⁊ ſal: ⁊ fel irci: ⁊ rutā cū thure: ⁊ pip nigrū: cū vrina pueri. G. aūt ↄueniēs eſſe dixit vt ſumaṫ aliqd ſic ē bucha extremitatis pēne aut alia res cui⁹ extremitas ſit acuta quā poſſibile ſit deglutire formicā. deide penetret formicā in circuitu ei⁹ vſqꝫ ad pfundū cū acuitate ſua: deīn eradiceṫ cū ea formica ex radice ſua.

Illius aūt formice q̄ pura ē cura ⁊ deſtructio eſt cū itromiſſiōe in balneū mſte aq̄ qm̄ nocet ei aer. deide egrediatur velociter ⁊ vngaṫ. cū oleo ro. ⁊ aq̄ ro. Ei⁹ quoqꝫ q̄ ē miliaris ſil'is ē huic. veꝝ cū ei⁹ cauſtico ſiue colagogo fit virtus farmaci educētis fl'a ſic turbit ⁊ educētis meliam ſic epithimū ⁊ ſilia. qm̄ neċe ē illic ⁊ mliaꝫ ⁊ fl'a colere ee mixta pp groſſitiē ei⁹. deīn ſumanṫ galle. ⁊ fruct⁹ tamariſci ⁊ corticū granati: ⁊ boli ar. an̄. ⁊ aggregenṫ oia cū aceto: ⁊ aq̄ ro. mixta tali mixtiōe ne mordeāt ⁊ liniātur deſup cū pen

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0495-4

na.⁊ lac dulce vehemēter ē ꝯueniēs huic egritudini. Cūqꝫ
trāſit ꝑncipiū tūc curet̄ cū medicis ex capite piſcis aduſto
cū vino pōtico:⁊ forti⁹ illo ē qn̄ exiccatio vltia nec̄aria ē ⁊
ſumant̄ folia albedorogi:⁊ ponant̄ in eis cal'is:⁊ miſtrent̄
Et forti⁹ hoc ē:vt ſumat̄ flos eris:⁊ ſulfur citrinū aduſtū:⁊
fiat ex eis linimētū cū vino:aut aq̄ vitis ꝑdcā.aggrega.oli.
cū aceto:⁊ oleo mixtū ⁊ linitū i ꝑncipio formice aufert eā.

¶ Capitulum tertium de herpete.

Aplin de herpete ꝓpoſitū ptractare ex cap'lo eriſi
c pille notū ē.Q̄z.n.hyp.eriſipillā nominauit.H.her
petē dixit:dixit.n.ad glauconē.ſic̄ colera xācta: cū
gdē ſui ipſi⁹ nāz ꝟuans cū ſanguīe vbicūqꝫ ferat̄ corporis
ictericia paſſio noīata fuit.ſola āt extracta ⁊ ꝟꝫ aliquā pti
culā ſtāte herpes noīat̄.Si gdē deniqꝫ groſſa fuerit totaꝫ
vlcerat vſqꝫ ad ſuppoſitā carnē cutē ⁊ vocat hos hyp.her
petes eſtiomenos. Si v̄o ſubtilior fuerit ea v̄o q̄ i ſupficie
ſolā q̄ſi ſupuexerit:⁊ hui⁹ gn̄is aduſte nūcupatōꝫ ⁊ ſine ad
ditōe herpes noīat̄.hoc aūt nihil aliō ē:q̄ꝫ eriſipilla vlcera
ta ⁊ n̄ vlcerata vt ex dc̄is pꝫ ⁊ ex cura ei⁹ quā ibi poſuit.H.

¶ Capitulum quartum de flegmone

J v̄o ex ſanguīe ⁊ xācta colera ꝟꝫ nāz ſe hn̄tib⁹ mi
f xtū fuerit reūa aut nō in ſolā cutē effundit̄. ſꝫ etiā
ſuppoſitā carnē tāgat nō flōn nꝫ eriſipilla ſolū fit.
ſed q̄dā mixta diſpō ex flōne ⁊ eriſipilla fit.cūqꝫ ſupet mi
xtiōe ſanguis colerā flōn eriſipilleos dicet̄ ⁊ ſinthomata
dn̄abunt̄ flōnis.Si v̄o col'a dn̄et̄ eriſipilla flōnides nūcu
pat̄ hūoris ꝑdn̄antis ꝓpoſito ſemꝑ noīe ſubſtātio ⁊ ſintho
mata colere dn̄ant̄.Si v̄o neuter obtieat ꝑdn̄iūꝫ ſꝫ eq̄les
appeant flōn ⁊ eriſipilla mixta dicent̄ ⁊ ſinthōata erūt cō
fuſa ⁊ ꝑmixta:nā cal'ior ml't̄ū flōne ⁊ flauior ē videre: nec
adeo vt eriſipille ꝯueniēs ē:⁊ ſi tetigerit facile ſb̄decurrit
ſanguis:⁊ rurſus ſupfluit ſubtilis ſil'r ⁊ rube⁹ certe apparēs
nō tn̄ ē doloroſus ſil'r huic flōni ꝟꝫ vllā ſpēꝫ flōnis.nꝫ ēt pl'
ſationē:neqꝫ ꝯpſſionē neqꝫ tēſionē ſil'eꝫ ifert: ſꝫ ē q̄dā i co
valde moleſtatio tpatꝫ.Eodē mō ꝯmixta eē reūa poſſibi
le ē ex colera xācta ⁊ flate:⁊ eriſipillā vndīmie ꝯmiſceri ⁊
moll'ē eriſipillā noīari:⁊ ſi gdē pp frm ſupfluū ſclirotiçata
pticula fuerit dura nūcupat̄ eriſipilla.¶ Cura.oſtēſio cu
ratōis in talib⁹ ſibi inicē ꝯplicātis erit ꝯpoſita qō vl'e i cau
ſis morbis ⁊ ſinthōatib⁹ ſemꝑ ē ⁊ ſupra in febrib⁹ memini
m⁹ faciēdū.hētur aūt ex cura ſimpliciū vt ibi ē dcm̄.Et ſi g
dē ineq̄les i mixtōe fuerit apparentes ſanguis ⁊ col'a ꝑmo
ad euōnē toti⁹ ⁊ an̄cedētis cāe ⁊ dn̄ante ſanguīe ꝑmittet̄
flōmia.colegogū v̄o aut flagogū ſeq̄tur.eꝫ v̄o ꝑmittet̄ co
lagogū vel flagogū ſeq̄tur flōmia. Eq̄liter v̄o apparētib⁹
ꝑmittēda tn̄ flōmia ſeq̄t̄ colegogū vt flagogū.nequnte v̄o
patiēte tolerare flōmiā pp timorē vel ſuſpitōꝫ vel pp aliā
cāꝫ ꝑmittere poteris colegogū: q̄le ſupi⁹ in febrib⁹ dcm̄ ē
leue:qō leniēdo vl' lubricādo educat colerā abſqꝫ ꝯmotio
ne ſanguis ⁊ turbatōe abſqꝫ moleſtia. Jngt.n. i epidimys
hyp.cū aūt minutio nec̄aria fuerit ⁊ vētris ſol'o a forti me
dicīa icipere nō debem⁹ nec a minutōe forti.Si.n.medici
na ſit nec̄aria fortis:vt ell'is ⁊ violēte medicine: vt q̄z hu
mores vel mel'ici cū ſanguīe mixti ſint ⁊ ꝑmittat̄ ebulitio
nē in ſanguīe ⁊ turbatōeꝫ iducet:ac in nāꝫ moleſtiā.q̄r ſan
guinē iflāmabit ⁊ ad turbationē mouebit: ſi quoqꝫ fortis
minutio ꝑmittat̄ viſcoſitatē ⁊ groſſitiē augmētabis in eis
vel ſi colerici ſint hūores reddet effrenes. Ad hec aūt oīa
particularia euitāda ad ſūmū in tali neceſſitate ē opandū
cū leuib⁹ minutionib⁹ medicis.Aduerſantib⁹.n.ꝑdcis hu
morib⁹ in ſe iuicē ⁊ cāis eoꝝ neutrū poſſibile ē ſibi multū
excedere eā q̄ ſcōꝫ nāꝫ ē moderātia vt ⁊ forti minutōe: vl'
ſolutōe ſit opus:⁊ maxīe ſi cū ſanguīe colera ſit excreſcēs
Si ergo hūores fuerit eq̄les leuis miūtio ꝑmittat̄.⁊ ſi po
ſtea aligd abūdauerit medicīa ſoluat̄. Q̄z ſi eq̄les non fue
rint in ꝑmis ſupdn̄ans cū leui medicīa ſoluat̄ donec equē
tur.poſtea minuant̄ ſꝫ ſi gdē leuis medicia nō ſufficiat vt
q̄z hūores groſſi ⁊ viſcoſi ſint valde ⁊ in remotis poſt parti
b⁹ ⁊ ꝓfundis ex aliquo regīe diſtinctim multiplicata a ſan
guine ꝑmittēda erit ſolutio leuis ⁊ minoratiua cū reitera
tiōe cū iuuamētū auferat̄ abſqꝫ nocumēto ꝑdicto.violēta
v̄o medicina nocumētū ꝑdictū faciet:qō ē maius iuuamē
to:ſi qō iducet.¶ Scōo ad euōneꝫ pticularē apatis ⁊ cāe
aggregate in eo oꝫ accedere.⁊ ꝑmo cū repcuſſiuis fr̄is for
tiorib⁹ ſi eriſipilleos fuerit flōn q̄ꝫ in ſolo flōne ſc̄m plus ⁊
minus vel mediocriter ꝓut col'e diuerſa mixtio exigebat:
nec tn̄ fortiorib⁹ ſic̄ in eriſipilla certa.ꝓuocabunt.n.in tali
diſpōne cutē pticule in nigredinē vel liuorē: ⁊ in ſcliroſim
apa adeo ꝙ calaſtica ⁊ catapl'ata ſalutē minime ꝑficiūt:q̄r
rōnabili⁹ ē vt a fortiorib⁹ paꝝ vtaris ⁊ ꝑus ab ifratiōe cel
ſes q̄ꝫ repcuſſaꝫ particulā poſt occupet ⁊ nigredo coloris i
nato infrato in ea.Ceſſante v̄o ebulitiōe cataplaſmare oꝫ
particulā cū ordei polline.i.farina ordei ⁊ ſemīs lini:⁊ ane
ti:⁊ fenugreci.Et ſi vndimie mixta fuerit eriſipilla vt vn
dimioſa ſeu mollis dicat̄ miniſtrāda erūt in ꝑncipio apo
cruſtica:minus fr̄a magis vero ſtiptica ⁊ remiſſa ⁊ magis
calida ⁊ ſtiptica q̄lis ex dictis ſupra ⁊ dicēdis in cura vndi
mie ſcies ꝯponere. ¶ Tertio v̄o ad correctōꝫ accn̄tiū ⁊ ſi
ex ſupfluitate ifratōis liuor vel nigredo i pticula apparue
rit fomētabis cū aq̄ marīa vel dulci cal'a aq̄ decoctōis ca
momille abſinthy ⁊ reliquoꝝ ꝯfortare hn̄tiū calorē i mē
bro.Et deīn̄ ſi expediat ſcarificabis.deīn̄ catapl'abis luto
ſigillato ⁊ armeno cū aceto ⁊ cal'a aq̄ vt ſupra pl'ies dcm̄ ē.
ſupcalefactōeꝫ.n.ex tali diſpōne pticula ifrare expedit nō
calefacere:nō tn̄ ex repcuſſiuoꝝ ſupflua approxiatōe fue
rit i diſpōnē ꝯriā ꝑmutata qō liuor ei ſupacq̄ſit⁹ vel nigre
do declarat. Regimē iter illa mediū obtinebit eq̄le inter
extrema:vel ad vnū eoꝝ vel ad aliud declinandū.

¶ Jncipit ſūma tertia pticule ſcōe ſectōis ſcōe de medici
cinis apatū flaticoꝝ ⁊ eoꝝ q̄ illi⁹ generis illa ſequunt̄.

Sequitur ſumma tertia

pticule ſcōe ſectōis ſcōe q̄ ē de medicinis
apatū flaticoꝝ ⁊ illoꝝ q̄ illoꝝ gn̄is ſunt ⁊
illa ſequuntur ꝯtinēs capitula .ix.

¶ Ca.i.ō vndimia ⁊ ē apa flaticū molle.
¶ Cap.ij.de ſcliro ⁊ ē apa ſcliroticū durꝫ.
¶ Cap.iij.de ſcliro ſplenis.
¶ Cap.iiij.de ſcliro epatis.
¶ Cap.v.de glandulis ⁊ earum q̄ illius generis ſunt ⁊ pu
ſtulis glanduloſis.
¶ Cap.vi.de nodis.
¶ Cap.vij.de apate vētoſo qō inflatio dicitur.
¶ Cap.viij.de apoſtemate aquoſo.
¶ Cap.ix.de dubelati frigidis cōprehendētib⁹ hūores vi
ſcoſos gipſeos ⁊ lapideos ⁊ capilares ⁊ arēoſos ⁊ alios.

¶ Cap.i.eſt de vndimia ⁊ eſt apa flegmaticū molle.

Ndimia ē tumor flic⁹ alb⁹ mollis:fr̄us ⁊ idoloro
v ſus.Eſt aūt vn⁹ g in idropicoꝝ ⁊ ptiſicoꝝ pedibus
accidere ſepe ſolet toti⁹ corpis cachochimia ⁊ cō
pl'one fcā:⁊ hec talis i corpib⁹ tumor nō apa fit de quo hic
loqmur:ſꝫ qōdā ſinthoma ꝯn̄s egritudīes dcās g dict⁹ eſt
cacesia ali⁹ dict⁹ ē tumor apoſus ꝑ ſe veniēs ⁊ morb⁹ ex his
dict⁹ vndimia:⁊ ē apa lapſū.Cā cui⁹ duplex ē:iterior ⁊ exte
rior.iterior vndimioſi apatis ē ſupfluxus flatici hūoris in
pticulā aliquā ex extremitatib⁹ corpis:vt neruos pānicu
los ⁊ iūcturas penes ei⁹ diuerſitatē variat̄.⁊ q̄to groſſius
hūor ē tāto ad duritiē ⁊ frig⁹ ē magis decliue lꝫ ab apatib⁹
ml'icis differat pp paucitatē duritiei ⁊ obfuſcatōis. Cā v̄o
vndimioſi diſpoſitionis ⁊ caceſie que illarum egritudinū
eſt ſinthoma plurimum eſt vapor flegmaticus eleuatus
ab ea ⁊ nutritis mēbris ⁊ quanto eſt ſubtilior ⁊ magis ma

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0496-0
DFG