le imature ⁊ mirra balauſtie neſpila ⁊ ſimilia ꝯtrita: ⁊ decocta cũ vino põtico cũ cipo ac gallia ad redolẽdũ. Et ex illis ſũt cortices pini.ʒ.iiij. aliis ptes.ij.cipi ptẽ.i. decoquãť in vio põtico: ⁊ odorifero: ⁊ madefiat ĩ ipſo pãnus lini ⁊ ſuppõnať vice pꝰ vicẽ: ⁊ eſt bonũ medicamẽ faciẽs acqrere ꝟginitatẽʒ. Et qdã illud agũt ꝯglutinãdo: ⁊ ſũt nota ſupra ĩ cura fluxꝰ ſanguis nariũ vomitꝰ ſanguis vlceꝝ renũ ⁊ veſice: quedã illud faciũt trahẽdo hũores ad labia ⁊ ad pietes vulue ⁊ repellẽdo q̃re tumẽt labia ⁊ via media coartatur. ⁊ ſũt medicĩe rubificãtes ⁊ calefaciẽtes: ⁊ ex eis ꝓpriũ ẽ cordumeni: ⁊ ſi buliat cũ gallia ⁊ muſco cũ vino ⁊ epithimeť. Ex pſtãtibꝰ delectationẽ vtriſqꝫ ẽ retentio ĩ ore cum melle emblicoꝝ cubebaꝝ ⁊ aſſe ⁊ zinziber ⁊ pip cũ melle multiplicat ſaliuã que pſtat vtriſqꝫ delectationẽ ex q̃ etiã ſi inungať caput virge nõ ẽ malũ cũ p̃ma delectatio coitꝰ ĩ fricatiõe exiſtat. ſcda ĩ emiſſiõe ſpmatis. ⁊ qꝛ mulier emittit ſpma: ⁊ recipit: maiorẽ delectatõeʒ recipit cũ emittit viro emittẽte cũ ea. vñ. G. dixit. ĩ ſenſuvo genitaliũ mẽbroꝝ qdã vtꝰ ẽ ꝓpria fortis. ſ. exiſtẽs que ĩ viris ẽ expulſiua ĩ feminis ĩ teſticulis ⁊ vaſis ſpmatis. In vulua. n. fortis ẽ vtꝰ appetitiua. qꝛ nã fortitudinẽ hꝫ virtutis ĩ eiciendo: ⁊ ſuſcipiẽdo ſpma cũ nimio deſiderio ⁊ delectatione.

¶ Incipit ſumma quarta quarte particule ſectionis prime de curis egritudinũ membrorum generationis in mulieribus continens capl'a. xviij.

ATulimus hucuſqꝫ ſermonẽ in mẽbris in gñatõe: in maribꝰ: vt ſcitis nãis iuuamẽtis ⁊ actionibꝰ nãlibꝰ coꝝ: ac diſpõnibꝰ p̃ter nãm eiſdẽ ꝯtingere poſſibilibꝰ medicinas adducamꝰ ſalubres. deĩde afferemꝰ ſermonẽ in iſtrumẽtis gñationis in mulieribꝰ ſimilẽ. ex ꝯueniẽtia. n. vtroꝝqꝫ ꝓpriiſſimis iſtrumentis hꝫ gño ꝓprie fieri: ⁊ eis mutatis a ſanitate quomõlꝫ ĩpediri. Sũt aũt duo mẽbra organa generatõis ĩ mulieribꝰ nãlr creata. ſ. mřix q̃ faċ ad eẽ: ⁊ vbera que ad ꝑmanẽtiam faciũt gñari pꝰ ortũ. Eſt ãt mřix mẽbꝝ figure ꝯcaue receptionis eiꝰ ⁊ ꝯſeruatiõis grã ex ſubã neruoſa: non qꝛ ex neruis a cerebro procedentibus ſit contexta: ſed potius eius ſubſtantia ſimilis eſt neruis. quia alba viſcoſa: extenſa panniculoſa: licet nerui aliqd adueniat ex qbus ſentit. Et eſt cõpoſita ex duobꝰ pãniculis ſeu tũicis ad meliꝰ ꝯſeruãdũ: q̃rũ iterior eſt aſpa ad modũ lingue bouis ad meliꝰ ꝯtinẽdũ: ⁊ venoſa hñs pl'es venas ꝑetas ⁊ pulſatiles ramificatas ex venis porte qbꝰ ꝯtinuať cũ epe mamillis ⁊ corde q̃rũ orificia figuňť ĩ ipſa ⁊ vocanť foramia mřicis ſeu quotilidones qbꝰ ꝯtinuanť pãnicnli ẽbrionis vt ex ſanguie currẽte ĩ eis embrio nutriať ⁊ eiꝰ ſpũs ⁊ calor euẽteť ĩtitate eiꝰ: ⁊ tunica exterior plĩmũ eſt neruoſa: ⁊ nõ ſunt tales niſi vt dilateňť apud ꝯceptũ ⁊ magnificationẽ embriõis ⁊ apud ptũ ꝯſtringanť ad expſſionẽ ipſius. Et q̃titas mřicis ſeqť corporis q̃titatẽ. ſic mamille. In puell'. n. mior eſt veſica eaꝝ plurimũ. In augmentatis vo eiꝰ q̃titas eſt cõpleta ſič vbera occupans ſua magnitudine oẽ id qð eſt iter ꝓpinqtatẽ vmbilici vſqꝫ ad meatuʒ vulue: poſtremũ ad quẽ ꝑuenit collũ eiꝰ. Et figura eiꝰ ẽ extenſa arcuata: in cꝰ extremitatibꝰ hꝫ duo oua. ſĩlia teſtibꝰ viri nuda nõ coopta vt illi: ⁊ queadmodũ viri hñt vaſa ſpmatis iter duos teſticulos ⁊ expulſoriũ radicis ꝟge: ſic mulieres hñt vaſa ſpmatis iter duos teſticulos ⁊ expulſoriuʒ ad ꝯcauitates mřicis: hꝫ. n. duas ꝯcauitates mřix ipa ĩ hoĩbꝰ. ⁊ ĩ aliis aĩalibꝰ ſm nũerũ papillaꝝ: nõ ꝙ ſit nũerꝰ ẽbrionũ ſm nũerũ ꝯcauitatũ tãtũ vt aſſerũt qdã. In ipſa. n. mřice in ꝯcauitatibꝰ eiꝰ gñanť qñqꝫ qnqꝫ ⁊ ẽ maior nũerꝰ: ad quẽ ꝑueniũt nati ꝑut albucaſis: ⁊ ioãnes ſerapiõis ⁊ ariſto. viiij. de aĩalibꝰ ait. Et qꝛ duas hꝫ qñʒ pl'es gñanť ⁊ plimuʒ duo ſũt: ⁊ ſi eaꝝ nũero ꝯſeqňť ⁊ ipſa apud retẽtionẽ menſtruoꝝ ĩgroſſať: ⁊ cũ mẽſtruať extenuať ⁊ mũda remanet vt exinde meliꝰ ꝯceptõi ſit apta. Et expoſita iter veſicã a pte anteriori ⁊ iteſtina a poſteriori: vt ſit ei a duobꝰ lateribus obſtaculũ ⁊ ſtatꝰ eiꝰ ſit in tutela ſil' in embriõe. Et ligať mř cũ dorſo ligamẽtis plibꝰ fortibꝰ. ⁊ ad ptes ſumis ⁊ veſice ⁊ oſſi lato pectinis exeũtibꝰ de gñe neruoꝝ venaꝝ ⁊ arteriaꝝ. Et collũ eius ẽ neruoſũ ⁊ lacertoſũ: rugoſũ fricationi aptũ: qð in coitu ingroſſať ⁊ ĩpinguať. Et eius lõgitudo eq̃lis eſt iter. vi. digitos vſqꝫ ad noueʒ: ⁊ qð ẽ iter illud. Et qñqꝫ elonganť ⁊ abbreuianť ꝑ vſũ coitꝰ ⁊ dimiſſioneʒ ipſiꝰ. Et qñqꝫ aſſimilať in q̃to in figura ꝟge: cũ q̃ coire cõſueuit. ⁊ eſt hñs meatꝰ duos: vnuʒ in extremitate vulue: ⁊ dř os mřicis extrĩſecũ in quo ſũt pãniculi cõtexti ex venis ligañtis ſbtilibꝰ valde ortis ex oĩbꝰ ptibꝰ eiꝰ: quos deſtruit violatio: ⁊ currit qð in eis ẽ de ſanguine. Et cũ coit mřix vſqꝫ ad illud os trahiť q̃ſi ꝓcedẽs ad illud deſiderãdo attrahere ſpma ꝑ ſuã nãm ⁊ formã: ⁊ meatꝰ colli veſice per quẽ extra vrina educiť eſt iuxta ipam a parte ſuprema: vt alia mẽbra trãſeũdo ꝑ ea nõ ledat. Et ĩ aliqbꝰ mulieribꝰ collũ cadit ad ſiniſtrũ: ⁊ in aliqbꝰ eaꝝ ad dextrũ. Aliuʒ in ꝓfundo iuxta os mřicis: ex quo deglutit ſpma. ⁊ cũ deglutiuit ꝯcludiť ꝙ puncta acus nõ poſſet igredi: ⁊ eo apto dei p̃cepto pariet fetũ. Et in collo iuxta os ipſiꝰ ſũt orificia venaꝝ per q̃ mẽſtrua exteriꝰ expellunť: qbꝰ ſupfluitates corporis totius purganť nõ veniẽtes ad eiꝰ cõcauũ ne inficiatur cõcauũ cõtinẽs ⁊ ꝯtentũ. Ex qbꝰ manifeſte colligi pñt actiões vl'es ſiue nãles cãe ⁊ egritudines matrici euenire poſſibiles. cãe. ſ. eaꝝ ⁊ loca ⁊ nocumẽta actiõis ipſiꝰ. Actiones vo nãles ſunt mẽſtruare gñare ꝯcipere ĩpregnari ⁊ parere. Egritudĩes aũt poſſibiles euenire ſũt ꝓpe ⁊ ex cõitate. Et ꝓpe ſunt ſimplices ⁊ ꝯpoſite. ſimplices vt mala cõpl'o ſimplex vel cõmixta pura vel ĩpura. mala cõpõ: ⁊ ſolo cõtinui. Et cõpoſite vt apatũ gña. Ex cõitate vo ſũt vt cõiet ipſa ⁊ cõpatiať mẽbris aliis: ⁊ maxĩe ſupioribꝰ p̃ncipalibus. ſič alia cõpatiunť eidẽ ꝑut accidit in ſuffocatõe matricis. ⁊ multiplicatis egritudibꝰ in mřice debilitať epar ⁊ diſponiť vt fiat idropiſis: nocumẽta actionum ſũt pl'a ſm pluralitatẽ coꝝ q̃ ĩfra ponenť. Ex q̃rũ ꝯſideratiõe ꝑueniře oʒ ad cognitionẽ egritudinũ p̃dcãꝝ ⁊ ex exeũtibus mẽſtruis ⁊ aliis q̃litate mutata dolore ⁊ tumore circa vẽtreʒ apparẽte. ¶ Et ſm hec: h ſũma. iiij. ꝯtinebit capl'a. xix.

¶ Capl'm. i. de menſtruis ⁊ eorum indiciis.
¶ Capl'm. ij. de cõceptiõe ſeu ĩpregnatione nãli.
¶ Capl'm. iij. de regimine p̃gnantis ⁊ fetus ⁊ concipientis maſculum ⁊ gemellos.
¶ Capl'm. iiij. de partu nãli qbus tantũ ſolummõ ꝓcedemus: q̃tum ſpectat ad ĩdigõnem coꝝ: vt per coꝝ noticias cãs ꝯſeruatiuas ⁊ nocumẽta ipoꝝ ſi q̃ eueniant cognoſcamꝰ ⁊ eiꝰ ꝓuidentiã vel curã faciamus.
¶ Cap. v. de mala ꝯpl'one mřicis ⁊ cura eius.
¶ Cap. vi. de egritudibus eius ex qbus eſt oppilatio.
¶ Cap. vij. de ſuſpenſiõe mřicis ⁊ de aſcẽſu eiꝰ ⁊ de declinatione ipſiꝰ ⁊ deſcenſu ſeu p̃cipitatione.
¶ Cap. viij. de p̃focatione matricis ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. ix. de ſpẽbus ſolõnis ꝯtinui mřicis ex qbꝰ ſũt vulnera corroſiones ⁊ putrefactiões ragadie ⁊ fiſtule.
¶ Cap. x. de apoſtematibus hũoralibus matricis.
¶ Cap. xi. de nocumẽtis in actione mẽſtruãdi. ⁊ p̃mo de cura fluxus menſtruorum.
¶ Cap. xij. de cura retentionis menſtruorum.
¶ Cap. xiij. de curſu matricis ſeu fluxu ⁊ aqua.
¶ Capl'ꝫ. xiiij. de nocumẽtis in actiõe ꝯcipiẽdi ⁊ ĩpregnãdi. ⁊ p̃mo de ſterilitate: ⁊ difficultate ĩpregnationis.
¶ Capitulum. xv. de mola matricis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0387-1
DFG

¶ Cap. xvi. de nocumētis ꝑtus ex qbꝰ eſt difficultas.
¶ Cap. xvij. de cura accidētiū q̄ ſequunt̄ partum.
¶ Cap. xviij. de retentōe ⁊ extractōe ſecundine.
¶ Cap. xviiij. de aborſu ⁊ accidentibꝰ q̄ ſequunt̄.

¶ Capl'm p̄mum de menſtruis ⁊ eorum iudicijs.

Enſtrua ſunt a ſanguīe ſupfluēte in mulieribꝰ ſic
m ſpma ex ſupfluo eiꝰ in viris: al'r tñ ⁊ al'r ꝑut Ariſ.
nono de aīalibꝰ dixit. tal'. n. ſanguis in mulieꝝ cor
poribꝰ aggregat̄ quotidie ꝑ idigōnis modū ꝑꝑ lapſuꝫ nāe
ipſaꝝ ad frm ⁊ hūidū ex decidētia ſexꝰ cū ſit femia maſcu
lus occaſiōatꝰ. hꝰ tñ ē diuīa ſapia ordinātexꝰ grā eaꝝ illu
ſtrata nā emittit talē ſanguinē in mr̄icis ↄcauū vltra illū
quē in ſuba eiꝰ emittit ꝑ nutrimēto ipſius grā geneologie
ſeruāde: vt ſiqdē purū i eo ſit cedat in nutrimētū: ⁊ augm̄
tuꝫ corpis embriōis iā ex ſeie mulieris ipiꝰ māliter gñati.
qd̄ vo ipuꝝ aut ſupfluū de corpore expellat̄: queādmodū
eſt videre in plātis hūidis ex qbꝰ ſpēs gūmoꝝ emanāt: qd̄
menſtruū dr̄: ſeu flos mulieris. Et qꝛ corpꝰ ipſiꝰ gñatōi eſt
aptū ⁊ cū ꝯpletū fuerit ⁊ ꝑfectū dn̄te pho: tūc vnūqdq; ꝑ
fectū eſt cū tale q̄le ipm̄ ē gñare pōt. ſāguis ille ad mr̄iceꝫ
nō mittet̄ nec mēſtrua apparebūt doec cōpletū ⁊ augmē
tatū fuerit cū ꝑus in nutrimētū ⁊ augmētū mr̄icis trāſeat
oīs ſāguis gñatōi ſit aptꝰ. hoc aūt tp̄s ꝑfixit nā i. xiij. ānis
cū in maribꝰ in. xiiij. limitaſſet. ⁊ hoc ꝑꝑ defectū nāe mu
lieris: qꝛ i vtero tardiꝰ cōplet̄ ⁊ citiꝰ ꝑficit̄ extra ipꝫ: qd̄. n.
debile ⁊ frm eſt tarde venit ad terminū: ⁊ cū ꝑuenit parū
durat. Sicq; mora ⁊ ſtatꝰ i cōplemēto ē breuis: ⁊ ex tc̄ mē
ſtrua ꝯplete ꝑuant̄ ex ſiccitate corpis cooperāte rōne eta
tis. In illo aūt itermedio gñatōe fiēte ille ſāguis totꝰ reti
net̄ ⁊ purū eiꝰ ꝑꝑ nutrimētū ēbriōis: atq; augmētū ⁊ car
nis gñationē imittit̄ i mr̄icē ꝑ ꝑte ad vbera: vt lac fiat nu
tritiōi eiꝰ opportunū poſt eiꝰ ortū: ipurū vo ꝑtiꝫ reſeruet̄ i
venis ſcōine ⁊ vacuo eiꝰ. Et tūc auxiliet̄ ſua lubricitate vt
facil' fiat exitꝰ embriōis. Et ꝑinde cū an̄ ꝑtū mēſtrua ſup
ueniāt in q̄ītitate ꝯſueta fetū ſignificat egrū vel debilē vt
dixit hyp. niſi in muliere ſāguīea valde i q̄ītitate miori cō
ſueta. Gñatōe vo nō fiēte i muliere ſana puꝝ eiꝰ retinet̄ i
mēbris ⁊ eā ipinguat: vt ē māifeſtū: qd̄ vo ipuꝝ ē ad mr̄icē
tāq; totiꝰ ſentina ipellit̄: vt ab ea extra corpus vt ſupfluū
educat̄. queadmōꝫ ꝑ emoroydas exiēs: q tñ i alijs aīalibꝰ
refuat̄: vt in additamētū ſuīꝰ corpis ꝯuertat̄: nec tñ quoti
die educit̄: lꝫ quotidie aggreget̄ ne quotidie abomial' iſe
ctio eiꝰ ⁊ deturpatio iſeq̄t̄: imo paulati aggregat̄ q̄ídiu ſu
perfluētis fuerit q̄ītitatis quā nā expulſiua ſui corpis ne
queat tolerare. ⁊ ꝑinde ad eiꝰ moueat̄ expulſionē. Hec āt
tēpora vā dei ſapia cōpēſauit: vt tp̄s aggregatiōis eiꝰ eq̄le
eſſet mēſis vniꝰ: ⁊ plꝰ ⁊ minꝰ ſm nāe tp̄is ⁊ regimīs varie
tateꝫ. ⁊ dr̄ tp̄s iterpolatōis ipſoꝝ. Et ſil'r tp̄s appitōis ipoꝝ
i fine mēſis coadiuuat̄ iſluētia lune ⁊ ꝑdurationis ipoꝝ vt
eq̄le ſit illud qd̄ iter vnū diē ē ⁊ ſeptimanā ⁊ eſt tp̄s dierū
triuꝫ: lꝫ in aliqbꝰ ſit latiꝰ ⁊ i aliqbꝰ breuiꝰ ꝑꝑ cās ꝑdictas. ⁊
ſil'r q̄ītitas ⁊ q̄litas. cū. n. ꝑ idigōnis modū aggreget̄ talis
ſāguis in corꝑe mulieris in q̄ digō fortior ē vt i muliere vi
ragine pauci cibi ⁊ maioris exercitij ꝯcurrētibꝰ alijs circū
ſtātijs ſil'ibꝰ q̄ītitas minor erit. In q̄ vo digō debilior vt i
lapſa ⁊ molli ⁊ multi cibi ⁊ ocij circūſtātijs ēt ſil'ibꝰ ꝯcurrē
tibus maior erit. ꝑꝑ eādeꝫ cām color cōis i plibꝰ ipaꝝ erit
ſubrubeus ad albedinē tēdēs ad modū ſāguīs arietis no
uiter iugulati. In puellis ſāguis in ꝑncipio. In mlīcis vo
rubeꝰ obſcurus. i colericis aūt rubeꝰ clarꝰ. i ſāguīcis rubeꝰ
roſeus. i fl'aticis ad albedinē ml'tū tēdēs. Cū ergo mēſtrua
ſūt tpata in q̄ītitate q̄litate ⁊ tēpore ſuo ꝯcurrēte ſꝫ ꝯſue
tudinē ſuā nālē in oī ſpacio ſūt cā ſanitatis mulieris ⁊ mū
dificatōis corporis eiꝰ i oī nociuo i q̄ītō ⁊ q̄li ⁊ faciūt ipaꝫ
acqrere caſtitatē ⁊ paucitatē deſiderij: ⁊ euentꝰ ipoꝝ erit
ſuauis cū bona tolerantia ⁊ abſq; aliquo accn̄te prauo: nā
. n. mulierū diſpēſans corꝑa eaꝝ ꝑ mr̄icē ex menſtruis ve
lut ꝑ renes ex vrinis ſtati videt̄ expurgari vt. G. ait. Cum
ergo alterant̄ a diſpōne ſua nāli veniunt cū prauis accn̄ti
bus. ſ. dolore capitis: faſtidio: caſu appetitꝰ: debilitate cor
dis: dolore dorſi ⁊ renū: lūboꝝ ⁊ anchaꝝ grauedie q̄ euētꝰ
ipſoꝝ ſūt ſigna: ⁊ ſūt cā egritudinū plīmaꝝ. Et ſiqdē alte
rent̄ in colore vl' tpe cā egritudis idicat neccariā ꝑuiſionē
dicēte hyp. in affo. Mulieri mēſtrua ſine colore aut nō ſꝫ
ſe ſꝑ fcā purgōne idigere ſignificāt. Si vo in q̄ītitate fiunt
egritudinū cāe vel morbi. ingt. n. G. ſanitatē eē tēperamē
tū ⁊ eq̄litatē. exiens aūt tēperamētū ꝑculdubio venit i i
firmitatē: ⁊ ſi paꝝ cā morbi fit. ſi vo multū morbus appel
lat̄. vñ hyp. Mēſtruis plīmis veniētibꝰ: ⁊ nō eueniētibꝰ a
nā accidūt egritudies ac egritudies accn̄tes ex ſupfluita
te ipſoꝝ ſūt egritudies ianitōis ꝑncipal'r. ⁊ ꝑ ſe: q̄ ſūt note.
ꝑ accn̄s vo ⁊ ꝯūter ſūt egritudies repl'onis: ex qbꝰ idrops
eſt plīmū. Egritudies vo accn̄tes ex retētōe ipſoꝝ ſimpl'r
vel in ꝑte ſūt repl'onales. ⁊ ꝑ ſe ⁊ ꝑpe. Et q̄dā haꝝ ſūt ꝑpe
corpori: q̄dā matrici ⁊ q̄dā cōes vtriq;. Corpori aūt ꝑprie
egritudines fiunt cū anteq̄ ipellat̄ ad matricē gñatꝰ ſan
guis ex quo mēſtrua fieri deberēt. corrūpat̄ i venis ⁊ feb.
accēdat: ⁊ colligat̄ in aliquo membro ad apoſtema vel ad
ꝑter nāꝫ al'r diſponat̄. Matrici ꝑprie fiūt ex quo ad mr̄i
cē miſſus ē vt retieat̄ ibidē: nec extra expellat̄. vtriq; aūt
cum ſuffocatio mr̄icis fiat ex eo: ⁊ he ⁊ alie egritudies oīs
gñis dr̄ntes inter ſe ſꝫ diuerſitatē ꝯpl'onis: nā ſi fuerit co
lerica generant̄ in ea egritudines col'ice. ſi mel'ica mel'ice:
⁊ ſi fl'ica fl'ice: ⁊ ſi ſanguinea ſanguinee. Per accn̄s vo ⁊ ſe
cūdario fiūt egritudines inanitōis: vt fluxꝰ vētris: fluxꝰ ſā
nariū: vōitꝰ ſāguis: emoroides: ⁊ ſil'ia eiꝰ mām ꝯriuāte nā
vt hy. ait i af. ml'ieri mēſtruis ꝯficiētibꝰ ſā. ex naribꝰ bonū.

¶ Capitulum. ij. de ꝯceptione ſeu impregnatione nāli.

Onceptio gñō ⁊ ipgnatio ꝯſignificāt idē gñal'r ſu
c ꝑte: ſpāl'r āt ꝯceptio ē ſeis a mr̄ice apphēſio ⁊ ꝑor
gñō ē ēbriōis ⁊ ꝯñs. Impgnatō vo ē ml'ierꝫ: ⁊ v'ltio
apparēs: q̄ſi vna alteri ſit diſpoſita. imiſſo. n. ſeie i mr̄ice
vtroq; exn̄te gñatiōi apto ⁊ bn̄ diſpoſito. vt qꝛ ſemē viri ⁊
mulieris nō ſit alteratū nec corruptū: nec aliquo mō nota
bil'r iſectū ſeu debilitatū: imo ꝑfectū ⁊ ſanū vt ſupra ꝺ ſp
mate ē dcm̄. In mr̄ice ēt tēperata qd̄ hy. ait cū dixit. Que
cūq; fridas ⁊ dēſas mr̄ices hn̄t nō cōcipiūt. Sil'r ⁊ i mari
bꝰ hn̄s gñō ſperatur maxie cōcurrēte iteriori ipreſſiōe ſu
periorū ꝑncipaliū. vt qꝛ i eo ſit deſideriuꝫ illaritas ⁊ volu
ptas. Et exterioꝝ ſupceleſtiū corpoꝝ iſluētia: ⁊ aliaꝝ rex
regie ꝯdecēti. Sic. n. videre ē i ſeie ꝑiecto i terrā: qꝛ tūc ſē
perat̄ germiatio cū ꝑdictꝫ ꝯſilia adſint: cū vo idiſpō ſit ex
ꝑte coꝝ alteriꝰ vel amboꝝ germiatio ipedit̄ vl' ānulatur.
ſuſcepto. n. ſeie i mr̄ice nō adhuc gñō erit certa niſi ſemen
viri mixtū fuerit cū ſeie ml'ierꝫ q̄tenꝰ ꝯtēperent̄: ⁊ iuicē agāt
ꝯueniēter in mā gñonis dicēte pho. Semē. n. niſi mixtuꝫ
fuerit ex duobꝰ nō gñabit̄ al': ſicut nec caſeꝰ niſi cōmiſceat̄
coagulū lacti. Vñ. G. oīs virtꝰ ocioſa ē carēs mā ꝑpa quaꝫ
attigat: tc̄ aūt bn̄ mixtū erit ex duobꝰ ſemē cū i coitu ſimꝉ
ambo ſpmata emittet̄ ꝯuēiētibꝰ voluptatibꝰ ⁊ appetitibꝰ
q eas ipellāt adiuicē iter ſe. mālis. n. cū appetit formaꝫ ⁊
ecōuerſo ſibi occurrūt ipulſa adiuicē ⁊ meliꝰ cōmiſcent̄ ⁊
temperantur. Cūq; tale ſpma mixtum fuerit i mr̄ice tali:
nec aliud ipediēs ſupueniat ex ꝑte regimīs ⁊ cauſaꝝ q̄ ſūt
cāe aborſus ꝺ quo īfra xpo dāte dicemus. ⁊ mr̄ix colliget̄
ſup ipꝫ tal'r vt nullū iteruenīat ibi vacuū. ⁊ os ſuū itriſecū
ēt tal'r claudit. vt nec pūcta ſtili vel acus ingredi poſſit. vt
G. dixit: cōceptio tunc fcā eē dr̄. ⁊ ex tūc ſpma manet i for
ma lactis ꝑ ſex dies. deinde alterat̄ potētia vtutis genera
tiue exiſtentis i n ſpermate viri: que alterat ⁊ ꝑmiſcet par
tes ſpermatis mulieris donans vnicuiq; membro generā
do ꝯpl'onem propriaꝫ. ⁊ tūc ꝑma diſpō q̄ accidit ē duplex.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0388-7
DFG

Prima eſt ſpumatio ſpermatis mulieris ex operatiõe vir
tutis iformatiue ex viri ſcie ꝓcedentis. Alia eſt cõpoſita
ſubtilis cuiuſdã membri ex ſupflua parte ipſius ex v̓tute
ſpermatis viri ſcḋz .H. vel ex calore matricis vel vtriuſqꝫ
ſpermatis mulieris magis: ⁊ viri minus ſecũdum alios.
¶ Circa pmã nãe itentio eſt vt gñet tres veſicas: que ſint
minere ſpũs vital' nãlis et aĩalis in virili ſpmate ꝯtenti in
qbus figanť ⁊ exerceãt: qḋ vnicuiqꝫ ꝓpriũ ẽ. Et ꝓinde pri
ma veſica ſit ꝓfunda i medio hũiditatis: vt ḋeť loc⁹ cor
di: ḋeide fiunt ex latere ei⁹ ſupmo ⁊ dextro due veſice ra
mificate ab illa ꝯfuſe iter ſe nõ bñ diſticte ſtati: ḋeiñ ſepa
ranť abiuicẽ poſt horã ⁊ diſcernunť ⁊ fit ſupm⁹ loc⁹ id ex
quo creať cerebꝝ: ⁊ dextrũ id ex quo creať epar. Et ipleť
illa dextra ſanguie ad albedinẽ decliui: ⁊ penetrat ad exte
riorẽ ꝑtẽ hũiditatis poſt duas veſicas vẽtoſitas mãdãs ⁊
extendẽs vt recipiat reſtaurationẽ a mřice ⁊ ſpũ: ⁊ ſãgui
ne tracto v̓tute virilis ſcĩs ab ipſa vt creeť vmbilicus. Et
ḋeide fiũt lineatões opatõe v̓tutis illi⁹ ⁊ informanť reliq̃
mẽbra radicalia ex reliquo ſcie mulieris ordĩe ⁊ certorũ
dieꝝ ſpatio ĩfra diſtinctoꝝ. Et circa diſpõnẽ alterã nãe itẽ
tio ẽ vt gñet pãniculũ quo ĩnoluat embrio ⁊ a mřice diſti
guať queãdmodũ cruſta in pane ex calore aſſante clibani
gñať i quẽ pãniculũ penetrẽt ⁊ figanť orificia venaꝝ mři
cis ex qb⁹ v̓tute viri ſcĩs ſãguis trahiť ad mřicẽ ⁊ ad locũ
cõcauũ gñatõis: vt ex eo embrio nutriať ⁊ mẽbra ei⁹ tam
modica cũ ſint ex modico ſcie ꝓcreata debitum recipiãt
nutrimẽtũ. Et mẽbra ſanguica gñanť: ⁊ tũc ꝓpẽ cũ mẽbra
ei⁹ creata ſũt multo ĩdigẽt nutrimẽto ⁊ ĩdurat⁹ eſt pãnicu
lus ille q poſt ſpaciũ diuidiť i pãniculos tres pp cãz iferi⁹
aſſignãdã. cũ añ gñationẽ pãniculi puo ĩdigẽte embrione
nutrimẽto nõ nutriať ab illo nec foramib⁹. Jnqt .n. H. ge
nerať v̓o qḋ nõ eſt: nutriť aũt ⁊ augmẽtať qḋ eſt. Ordo ãt
⁊ ſpaciũ tẽporis in gñatõe mẽbroꝝ ꝓut rõabil' antiquoꝝ
ꝯiectura iſinuat: ⁊ experiẽtia antiq̃ talis ẽ. nã in pmis ſex
dieb⁹ q ſunt a pncipio ꝯceptõis format v̓tus informatiua
ẽbrionẽ nõ petẽdo aliḋ ex mřice. Et poſt illḋ appetit ⁊ fit
iceptio alaꝝ i pectore i alijs duob⁹ dieb⁹ poſt illud: ⁊ ſunt
dies octo a pncipio: ḋeide in alijs .v. dieb⁹: ⁊ ſũt .xiij. a cõce
ptiõe penetrat ſãguis a toto: ⁊ fit illud: vñ creať cõplete.
Et ḋeide nouẽ alijs dieb⁹ poſt illos fit hũiditas ſanguĩca
caro: ⁊ iã diſcernunť fruſta carnis ⁊ diſcernunť mẽbra pn
cipalia tria manifeſte: ⁊ iã ſeparanť alia a cõtactu alioꝝ: ⁊
extendiť hũiditas nucee: ⁊ ḋeiñ poſt in alijs nouẽ dieb⁹ ſe
parať caput ab hũeris ⁊ extremitatib⁹ ⁊ laterib⁹ ⁊ vẽtre.
Et diſcernunť ſenſus organa: ita vt ſentiat poſt illud in q̃
tuor dieb⁹ cõpletis .xxxv. dieb⁹ a pncipio ꝯceptiõis: qḋ pꝫ
in embrione aborſo: ⁊ in aq̃ poſito ſm diſtictos dies in q
bus manifeſte adſũt ꝑdiſtincta mẽbra ⁊ oĩa in q̃draginta
dieb⁹ aborſo ⁊ in aq̃ poſito. Hoc .n. eſt tp̃s eq̃le ⁊ medium
ad iformatõez ⁊ breui⁹ eſt .xxx. ſm aliquos: ⁊ lõgingus ⁊
magis extẽſuz ẽ q̃dragita qnqꝫ. nã vt qdã dñt nõ iueniť in
aborſo maſculus cõplet⁹ añ trigita dies cũ ei⁹ ꝯpõ ſit ve
locior q̃ꝫ femie vt ariſto. dixit. Et cãz ſupi⁹ aſſignauimus.
Et gñatio embrionis tũc fcã dignoſciť. ⁊ tũc apparet ipre
gnatio .i. vẽtris plenitudo. Et cũ ꝑuenit ad iformatõez p
duplũ tẽporis in quo iformať embrio moueť. ⁊ cũ ſupue
nit motui duplũ ei⁹ in quo moueť ꝑuenit ad augmẽtũ ei⁹.
⁊ naſciť ſi ĩpediẽs nõ iteruenat: aut ex pte mřicis: aut ex
pte embriõis: qꝛ ifirmi fuerint. ⁊ ex pte regis. ita ꝙ ſi iffor
matio fiet in trigita dieb⁹ ſm illos naſceť in vi. mẽſib⁹ ⁊ ẽ
rarũ nec eſt veꝝ: qꝛ ſi eẽt nat⁹ in .vi. viueret qḋ ẽ ſlm. ſi v̓o
in trigita qnqꝫ dieb⁹ iformatio ꝯpleať naſceť i. vij. mẽſib⁹
⁊ eſt plũmũ. ſi v̓o i .xxxx. dieb⁹ iformatio ꝯpleať naſceť in
mẽſib⁹ nouẽ: ⁊ eſt freq̃nter. Et cã triplicatiõis pãniculi in
quo voluiť fet⁹ quã nã itendit ẽ: vt in pmo pãniculo exte
rius poſito ſecũdina vocato terminenť vene pulſatiles ex
trãſuerſo a q b⁹ p vmbilicũ euẽtatõez ſpũs recipit embrio
⁊ non per os: q̃ diuidiť in duas: ⁊ aliã getã venã ⁊ vocatur
billes ⁊ eſt iuolut⁹ embrio ibi vt effundať ex eo ſãguis ⁊
colligať ad ipm fet⁹ vrina ex effuſorio vmbilici nõ ex v̓ga
vſqꝫ ad horaꝫ part⁹ ⁊ dř alchas: ⁊ eſt vt retineãt ſudorem.
¶ Tertius eſt pãnicul⁹ ſubtilior alijs vt aggreget hũidi
tatem limoſaꝫ ex embrione: ⁊ nõ ledat cũ ſui ſubtilitate ⁊
duricie: queãdmodũ ledit ſecũdina cũ ſit ſupficies tenera
embrionis. ſič vlcera ꝯſolidata: q̃ nõ ſunt f rma. Juuamẽ
tũ aũt in retentõe illaꝝ ſupfluitatũ eſt vt ſepet iter ipſum
embrionẽ ⁊ mřicem ⁊ ſupfluitates ⁊ hũiditates. ⁊ hoc ne
ſua acuitate ⁊ mordicatiõe vrina ⁊ ſudor lederẽt embrio
nẽ. ⁊ q̃rtũ vas in colligẽdo ſupfluitatẽ ſiccã egõnis nõ fu
it in eis neceſſariũ cũ in eo quo nutriť nõ ſit groſſa ſupflui
tas neqꝫ fex cũ ſubtile exiſtat. Cũqꝫ ſpma viri calĩn fuerit
⁊ digeſtũ ⁊ ſpiſſum ⁊ grãdinoſũ ⁊ abũdãs ⁊ potẽs ſup fri
tatem ⁊ idigõnem ſpermatis mulieris: ⁊ cuꝫ hoc ꝓceſſit a
dextro teſticulo ſumaturqꝫ: ⁊ trãſeat ex rene dextro altio
re ꝓpingori epati: ⁊ ꝓinde calidioris. ſuntqꝫ ꝯueniẽtia coi
tus poſt mũdificatõꝫ mřicis ⁊ ceciderit in dextrũ mřicis.
⁊ ſilr ſpma mulieris cũ ꝓpetatib⁹ ꝯſilib⁹ gñabit vt pluri
muꝫ maſculos: ad qḋ adiuuat aer regio tẽpus frꝫ ⁊ vent⁹
ſeptentrionalis. ⁊ ſilr etas adoleſcentia nõ puericia pp i
ꝯplemẽtũ nõ ſenect⁹ pp ḋfectũ: ⁊ ꝯ̃ria ſi adſint gñabiť vt
plũmũ feĩa. Et dñt qdã prudẽtes ſi currat ex ḋxtro i ḋxtrũ
mřicis maſculiat. ſi v̓o ex ſiniſtro i ſiniſtꝝ femiat. Et ſi cur
rat ex ſiniſtro ad ḋxtꝝ ei⁹ erit feĩa maſculina: ſeu virago: ⁊
ſi ex ḋxtro i ſiniſtrũ erit maſculus femie⁹. Porro cũ ſpma
cõmixtũ abũdãs fuerit i q̃titate vt diuiſũ i ptes icidat in
duas ꝯcauitates mřicis cũ potẽtia v̓tutꝫ rẽſuãde i vnaqꝫ
fiet gñõ gemelloꝝ diuerſi ſex⁹ plũmũ: ⁊ qñꝫ eiuſdẽ: ⁊ parũ
ſaluãť. nec ẽ icõueniẽs cũ i q̃lꝫ pte ei⁹ gñatie potẽtia itegre
reſeruetť queãdmodũ i vnaqꝫ pte diuerſi ſpeculi ỹis rep
ſentatiã imagis: ⁊ illḋ ẽ plũmũ. Et qñꝫ eoꝝ gñõ a duob⁹ ſp
matib⁹ i duob⁹ coitib⁹ ꝓcedit: ita vt ſit ĩpgnatio ſup ĩpgna
tionẽ: iter q̃s nõ mlťũ iterſecat tp̃s. ⁊ tũc raro ſaluãť reſpeũ
gñonis vni⁹. nã cũ accidit i mlierib⁹ fortib⁹ mlťe caliditatis
⁊ ſãguis. ⁊ mlťo ꝝpilloꝝ i qb⁹ mřices ſũt fortes: nec abortiũt
cũ mẽſtruis ſemel aduẽiẽtib⁹: nꝫ bis: tũc caſus litigij: ⁊ ꝯten
tiõis ſup ãbos: qḋ plũmũ ꝑduč ad febrẽ ⁊ alias egritudĩes
eueniẽtes: ⁊ vt alter abortiať ipoꝝ. Qꝛ ſi cadat ĩpgnatio ſup
ĩpgnationẽ nõ i valde forti: ⁊ i ea q̃ nõ ꝯcipit niſi pp aptio
nẽ ſue mřicis: nõ pp fortitudinẽ ei⁹ tieť ꝙ fili⁹ pm⁹ ſit ḋbi
litat⁹: qꝛ ꝯcipiť ſcḋs. Et cã ḋbilitatꝫ ẽ. qꝛ ḋfect⁹ ẽ ſãguiei nu
trimẽti. Quibuſdã v̓o viſũ ẽ ꝙ ĩpgnatio ſup ĩpgnationẽ fie
ri nõ poſſit eo ꝙ p⁹ ĩpgnatiõeꝫ ꝯcludiť os mřicis: ſič hy. di
xit nec nõ cũ ex mřice ſpma nõ currat: ex quo hũit qḋ opta
uit pp ꝙ ſpma currit. Sꝫ ſcḋꝫ v̓itatẽ apḋ ĩpgnatiõeꝫ ꝯclu
diť os ipi⁹. ñ tñ i recipiẽdo: ſꝫ i cuſtodiẽdo bñ ꝙ auide ꝯce
pit ne ꝑdat: ⁊ ſi p ſpma a mřice ẽt tũc nõ currat veꝝ ẽ exẽ
plũ: ſꝫ nihil ꝓhibꝫ ipꝫ currere itra cũ mẽſtrua illic currãt:
⁊ ſi ḋlectatio adeſt i ſc̃o coitu nõ erit magis ad recipiẽdũ q̃ꝫ
imittẽdũ: nã ſi recipit ꝙ formale vt gñet iteꝝ imittet etiã
mãle vt ꝯpleat cũ abũdat. Et dũ ĩpgnať puella q̃ ñ ꝯſueta
ẽ i .xij. ãnos ꝯpletos: lꝫ ſit raro tieť ei⁹ mors pp ꝑuitatẽ mři
cis. Et cũ mř ẽ ſana ⁊ bõi regis: ẽbrio vt plũmũ ſan⁹ ẽ. cũ er
go ifirmabiť mř i toto corpe: qꝛ febriat. vl' i aliquo mẽbro
⁊ ꝓpe i mřice neĉe ẽ ipꝫ pati: ⁊ magis ſi mali regis fuerit: ⁊
ſi qḋ fe. aliq̃ acutaꝝ fuerit l'apa ca lꝫ i mřice mortale ẽ: vt
dixit hy. ¶ Signa ꝯceptõis ⁊ ĩpgnatõis ſũt plã. ⁊ ipoꝝ q̃dã
ſũt ſigna ꝯceptõis: q̃dã maſcl'ine: q̃dã feĩne: q̃dã gemelloꝝ
q̃dã ſinglarꝫ: ⁊ q̃dã ſane: ⁊ q̃dã egre: ⁊ ex cõceptiõis ſignis:
q̃dã ſũt ſũpta ex diſpõib⁹ ꝑceptꝫ a mliere i ſe ipa: q̃dã ex ꝑce
ptis ⁊ ꝯſideratꝫ a medico circa ipaꝫ. q̃dã iueſtigata expim
tatis i ipa. Priora v̓o ſũt ꝑceptio ꝯueniẽtie emiſſiõis duoꝝ
ſpmatũ ⁊ cũ velocitate i q̃ caput v̓ge ſiccũ fit: ⁊ cũ ſuctõe
adunatõis oris mřicis caute abſqꝫ duricie: vt ipꝫ igredi ñ
poſſit ſtil⁹ ſm hyp. ⁊ .H. i affo. ⁊ hoc pp ſiccitateꝫ ex ſuctiõe

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0389-5

anida ꝛ forti: vt nō īueniaꝶ būectatio loci poſt coitū: ꝛ cū
eleuatōe ei⁹ ad ſupiora ꝛ anteriora ꝛ retineꝶ mēſtrua vſqꝫ
ad tps pt⁹ ꝛ poſt mēſez aut mēſtruaꝶ paꝝ ꝛ accidit dolor
puus i eo qȯ eſt iter vmbilicū ꝛ receptatōez. ꝛ qñqꝫ fit dif
ficultas vrīe ꝛ accidit vt aborreat coitū: ſꝫ pgnās maſculi
magis aborreat. ꝛ ſi coiꝶ cū ea ñ emittit ſpma: imo dolet ſb
vmbilico poſt ipꝫ ꝛ anxietates iſūt: nauſea ꝛ abomīatio vt
hyp. dixit ī affo. qȯ eſt: qꝛ ī ↄceptu ori ſtōi noceꝶ ſm ꝙ. H.
ſubiūgit: ꝛ ex illis ē vtigo dolor capitis: tenebroſitas oclo-
rū: ꝛ pulſus cordis. Que aūt a medico īſpiciūꝶ circa ipaz
ſūt ↄmotio appetit⁹ mali: ꝛ illȯ poſt mēſez: aut duos: vt ſu
pra i ſtȯ dcm̄ eſt: ꝛ citriaꝶ albedo oculoꝝ ei⁹: ꝛ pfundatio
palpebraꝝ mollificatio ipaꝝ qñqꝫ ꝛ acuiꝶ aſpect⁹ ei⁹ ꝛ mi
noranꝶ ei⁹ pupille ꝛ igroſſaꝶ coꝝ albedo: ꝛ nō citrinaꝶ ſꝫ
multitudinē: ꝛ neċaria ē alteratio coloris ꝛ euent⁹ ipreſſio
nū egrediētiū a nā cꝫuis ſint i pregnāte ex maſculo min⁹
qñ ipgnatio ſedat dolores dorſi ꝛ anchaꝝ: pp qȯ calefaꝶ
ea mrix. ꝛ ppē cū ↄcepit maſculū ꝛ cū parit redeūt: ꝛ qñqꝫ
alteraꝶ corp⁹ ei⁹ ab eo qȯ fuit: qꝛ dilatanꝶ ꝛ citrianꝶ vene
ei⁹ ſup ipꝫ ꝛ virides fiūt. ꝛ i plib⁹ pgnātib⁹ accidit, vt i mol
lificatōe eaꝝ corpora i pncipio retētōis mſtruoꝝ ꝛ ex ſup-
fluitate ei⁹ qȯ reſtat ex cibatōe ipſi⁹ cū pauco īdigeat pp
ðbilitatē ꝛ puitatē ſui. diñ cū magnificaꝶ embrio totū trā
ſit i magnificatōez ei⁹: qꝛ redeūt ad nālitatē ſuā. Que vo i
ſpecta ſūt extra ipaz ſūt ſigna q̄ iſpiciūt i excūtib⁹ ab ea: ꝛ
ppē i vrīa. in pncipio. n. ipregnatōis vrīa ē clare ſube ꝛ co-
loris yrini. i. varij. qꝛ citrini ad ſubalbedinē tēdētis: ꝛ ſup
ipſi⁹ ſupficie ſube ꝛ coloris yrini ē ſić nebula: vt i medio ei⁹
ſit ſić cotū carmiatū vel diſpſum pp diſpōnes aīs digōnē
māc pcedētis: a mēbris quoꝝ calor ↄfortat⁹ ē ex ipregna
tōe. ꝛ ppē ſi maſcul⁹ fuerit ↄcept⁹: ꝛ ī eo ſūt velut grana q̄
deſcēdūt ꝛ aſcēdūt: ꝛ cū moueꝶ nō turbaꝶ: i fine vo ipgna
tōis lȯci ei⁹: qȯ appuit i pncipio ſubalbedis appebit rube
do ꝛ turpedo: qꝛ eſt ſić malū vinū rubeuꝫ. i. corruptū ꝛ aq̄
ciceꝝ: ꝛ cū moueꝶ turbaꝶ: parietis vo ſꝫ plurimū nigra ē ꝛ i
fūdo ei⁹ ē ſić attramētū ꝛ ſordes. Que vo ſumunꝶ ex expi
mētatis i ipa ſūt vꝫ puta ſꝫ ꝙ hyp. dixit i affo. Mulierē ſi
vis ſcire ſi ↄcepit qñ dormitura ē mellicratū da bibere. i.
ydromel qȯ ex mell'. ʒ. ij. tantūmō: ꝛ aq̄ pluuiali tātūdez ꝛ
cū expergeſit ſupineꝶ. Et ſi qdē torſiões hūit cōcepit: ſi vo
nō mīme. Et ē expimētū cērtū: niſi ī ↄſuetis bibere illud.
Et iterū i alio dixit affo. mulier ſi nō ↄceperit in vtero: ve
les aūt ſcire ſi ↄcipiet. i. ſi ↄcipere apta ſit ſup. Et laboret i
die ieiunio ↄtegēs eā veſtib⁹. ſ. i ſero ꝛ ſuffumiga eaz deor
ſum arōatib⁹ p traiectoriū. ſ. ꝛ ſi qdē odor videꝶ trāſire p
corp⁹ ad os ꝛ nares cognoſce: qm̄ ipa nō ex ſe nō gñat: ē āt
culpa viri qȯ lꝫ i cognoſcēdo mulieris aptitudinē ad ↄce-
ptū ꝛ ieptitudiez ab hyp. ſit itroductū: tñ eadē rōne ad co
gnoſcēdā ↄceptionē ſiſtētē vel nō: pōt aſſumi. Et ſilr expe
riꝶ ſupponēdo aleum ꝛ ſup dormiēdo ꝛ ↄſiando ſi ſapor ꝛ
odor aſcēderit ad os ꝛ nares. ꝛ ſuppōiꝶ ariſtologia cū mel
le vt ifra dicem⁹. Et ex ſignis ↄceptōis maſculine q̄dā ſu-
munꝶ ex pte diſpōnū vtroꝝqꝫ gñantiū: ꝛ q̄dā ex pte diſpō
nis pgnātis: tñ ex pte gñantiū maſculi. ſ. ꝛ femie diſpōnūꝫ
maris qdē: qꝛ c⁹ vis eſt fortis corporis eq̄l' carnis i duricie
ꝛ mollicie ꝛ multi ſpmatis ꝛ cal'i. ꝛ qꝛ eſt magnoꝝ teſtiū ꝛ
magnaꝝ venaꝝ fortis deſiderij quē nō debilitat coit⁹ ex
c⁹ dextro excidaꝶ ſpma. Et mod⁹ eſt vt reſtrigaꝶ teſticul⁹
ſiniſter apud emiſſionē ſpmatis ꝛ effundaꝶ ex dextro. ſić
ruſtici faciūt cūqꝫ adoleſcētis pus iflaꝶ teſticulus dexter:
tūc ipſe erit maſculinās ꝛ ſiniſter tūc erit feminās. Et ſilr
ille ad quē cito feſtinat polutio nō a nocumēto. ſꝫ a ſpma-
te eſt faciēs maſculū. Et ex expimētis eſt vt colligaꝶ ſpma
ꝛ ſi eſt ſpiſſū ꝛ piectū in aq̄ rotūdeꝶ ꝛ deſcēdat ē gñatiuūꝫ
maſculi. Et ex ſignis mulieris ē vt mulier ſit eq̄lis forme
ꝛ corpis ſolide carnis nō mollis ꝛ mēſtrua ei⁹ ſint digeſta
ꝛ ſpiſſa: ꝛ nō cruda ꝛ ſubtilia: nec aquoſa nec aduſta nec ð
bilia i ſe: ſꝫ reſpcū ſpmatis viri: ꝛ c⁹ os mrīcis vulue oppo-
ſitū eſt: ꝛ c⁹ digō fortis ē: ꝛ c⁹ vene ſūt apparētes ꝛ manife-
ſte: ꝛ c⁹ ſenſus ꝛ mot⁹ ſm ꝙ oꝫ exñt: nec hꝫ vētris ſolones
nec ↄſtrictōꝫ aſſiduā ꝛ ocli ei⁹ ſꝶ ðclines ad fuſcedinē abſ
qꝫ ſubalbedie: ꝛ eſt gaudēs ꝛ aie lete. Et puelle viri poten
tes in pncipio cū coeūt ſūt velocis ipregnatōis pp fortitu
dinē caliditatis eaꝝ ꝛ puitatē adipis mrīcū ipaꝝ ꝛ hūitatū
eaꝝ. Et ille qb⁹ velociter eueniūt mēſtrua digniores ſunt:
vt ↄcipiāt maſculos: ꝛ ſpaciū mūdificatōis ē breue: qꝛ vſ-
qꝫ ad. xxxij. dies nō vſqꝫ ad. xxxx. qbus vo eꝫ īueniunꝶ vt
plimū ſūt gñanꝶ femias. ⸿ Signa vo ſumpta ex ↄcipien
te ꝛ pgnāte tātū ſūt. nā pgnās i maſculo eſt bñ colorata ꝛ
mūdioris faciei vt hyp. dixit. Et plīme lenitatis ꝛ agilita-
tis ꝛ ſanioris appe tit⁹ ꝛ getationū accñtiū: ꝛ ſentit graue-
dinē i latere dextro. vñ hyp. mares qdē i dextro: femie vo
in ſiniſtro gñanꝶ: ꝛ pinde cū moueꝶ fet⁹ ſentit motū in la
tere dextro. ꝛ cū mamilla icipit augmētari augmētaꝶ dex
tra ꝛ alteraꝶ papilla dextra i albedinē vel in rubedinem:
nō in nigredinem: vel fuſcedinez: ꝛ ab ipa currit lac pus: ꝛ
qȯ currit ex ea eſt groſſum viſcoſum nō tenue ꝛ aquoſuꝫ:
ita ꝙ diſtillat⁹ ſup ſpecl'ꝫ ꝛ expoſitū ſoli rēanet. ſić fruſtū
grāi: vl' margarite: ꝛ ſi trahaꝶ gutta lactis ex ðxtra pte ei⁹
ꝛ cadit i aq̄ deſcendit per eādem cām ꝛ ſit pulſus ðxter ve
hemētior plen⁹ ꝛ freq̄ns. Et dixerūt qdā ꝙ cū ipa moueꝶ
a ſtatiōe ſua mouet p⁹ pedē ðxtrū ꝛ oculus e⁹ ðxter leuior
ē: mot⁹ ēt leuiores: ꝛ moueꝶ poſt mſes tres erit maſ. femia
p⁹ q̄tuor. Quib⁹ vo ſꝶ ↄria portāt feiaſ ſꝫ plimū. Et ex expi
mētis ē vt ſumaꝶ ariſto. aur. i. teraꝶ ꝛ ↄficiaꝶ cū melle: ꝛ ſup
pōaꝶ cū lana viridi ð māc vſqꝫ ad meridiē i ieiūio: tē ſi dul
ceſcat ſaliua e⁹ ē ↄcipiēs maſculū: ꝛ ſi ē amara: tē ē feia: ꝛ ſi
nll'o mō altereꝶ: ñ ē pgnās: ꝛ h idiget pſcrutatōe. Et ſignū
gemelloꝝ ē vt ↄſidereꝶ pgnātis vēter: ꝛ ſi qdē nō iuciaꝶ i
eo ruga: nꝫ nod⁹: tē embrio erit vn⁹. Si āt iuciāꝶ ruge ꝛ no
di: tē nūer⁹ fetuū erit ſm nūeꝝ rugaꝝ: ꝛ ppē cū i vno late
re ſentiꝶ mot⁹ abſqꝫ altero: ꝛ ecōuerſo. Et ſigna ſanitatꝭ fe
t⁹ ſꝶ ſāitas mrīs i toto ꝛ pte: ꝛ ppē i mrīce ꝛ bōitas mrīcis
ꝛ ꝙ moueꝶ fet⁹ ðbito mō ↄſueto. Et ſigna egritudis ei⁹ ſꝶ
eꝫ: ꝛ cū accidit flux⁹ vētris vl' mēſtrua ſupuenerit mō icō
ſueto: ē ipoſſ'e fetū eē ſanū: vt hy. dixit. Et apitio lactis ma
mille i pmo mēſe ꝛ cū expmiꝶ ꝛ emulgeꝶ fetuꝫ ſignificat
debilē: ꝛ tēpoꝝ diuerſitas ſeu mutatio idicat fetus egritu
dinem: quēadmodum hyp. in affo. iij. parti. dixit.

⸿ Ca. iij. ð rgie pgnātꝫ: ꝛ fet⁹ ↄcipiētꝫ maſclos ꝛ gemellos.

r Egimē pgnātis: ꝛ fet⁹ ē duplex gñale. ſ. ꝛ ſpāle. gña
le ē tres res. pma ſanitatē coꝝ ↄſeruat ꝛ ↄpleꝶ ad-
miſtratōe ſex reꝝ nō nāliū ðbita: ꝛ ē vt degat i ae
re tpato: ꝛ occupeꝶ exercitio tēpato: ꝛ motu ſuaui: ꝛ ðlecta
bili. Et cib⁹ ei⁹ ſit panis mūd⁹: ꝛ carnes facil' digōis ꝛ boni
nutrimēti q̄ note ſꝶ: ꝛ vinū ſit ſubtile ꝛ odoriſeꝝ: ꝛ vet⁹ ꝛ ni
grū mediocriter ſtipticū ꝛ lipbatū aq̄ ferrea: ꝛ i ſn mēſa ſu
mat paſſulas: citōia dulcia: ꝛ pira excitātia appetitū: ꝛ ma
la muça: ꝛ granata. Et ſōn⁹ ei⁹ ꝛ qes ſit tēpat⁹: ꝛ vigilie ſilr
ꝛ aſſiduet lenificātia ſuā nāꝫ: maxie ſi ↄſtrigaꝶ valde: ſint
āt ex lenificātib⁹ cū eq̄litate ſić ſꝶ fruct⁹ lubrici: ꝛ herbe q̄
ex eſtate vegetāꝶ. vt pruna damaſcena exiccata: ceraſa: ꝛ
ſilia: ꝛ tamaridi: ꝛ māna: ꝛ herbe molles: hyeme vo carice
repl'ōnē tpatā cibi ꝛ pot⁹ aſſueſcat: ꝛ gaudijs tēpatis: ꝛ leni
ficātib⁹ inuꝫtiaꝶ. Et aerib⁹ alterātib⁹: ꝛ aborſuꝫ puocātib⁹:
ꝛ h obmiſſiōe ꝛ euitatiōe oīs rei pmutātis ſanitatē coꝝ ꝛ
q̄ aborſū ducere pñt: q̄ ifra diceꝶ. Et vſu mediciaꝝ ↄfortā
tiū mēbra pncipalia: ꝛ ſtōi ꝛ mrīcis ex qb⁹ ſꝶ: ella: vnctōes
ꝛ ēpla: q̄ h ifra diceꝶ. ⸿ Scōa res ē q̄ accñia ſupuēiētia ip-
gnatōi corrigit ꝛ emēdat q̄ ꝛ aborſū pducē pñt. Ex qb⁹ ſꝶ do
lor vētrꝭ: difficltaſ vrīe: ꝛ aboīatō ꝛ diſtillatō: ꝛ nauſea cor
ruptō appetit⁹ dolor ſtōi ꝛ vōit⁹: dolor capis ꝛ vtigo. ꝛ tene
broſitas ocloꝝ: ꝛ pliſus: ſeu tremor cordis: iflatō pedū mol
lificatio: aptio mēſtruoꝝ: de qb⁹ oīb⁹ ſupi⁹ dcā ē cura pter

curſuȝ mēſtruoꝝ. ⁊ hec regula in ea obſeruāda tacite ſub/
iungeť ⁊ ē cū leuiorib⁹ ſi poſſibile ē ⁊ exteri⁹ applicādis ꝑ
cedam⁹ in ṗmis maxie tribus menſib⁹ ⁊ vltimis. Jngt .n.
hyp. ꝑgnātes ſi purgare cōuenit a q̄ttuoꝛ vſqꝫ ad ſeptē mē
ſus vero has. Et in curſu mēſtruoꝝ ꝯmēdatū ē ſiloniū ꝑ
ficū valde ⁊ exptū ē vt bibat vinū pōticū cū aq̄ aluminis
nigrū. qm̄ ꝓhibet vomitū ⁊ cōſuat fetū in m̄rice: ⁊ ſedeat
in aq̄ decoctōis gallaꝝ: balauſtiaꝝ: corticū granatoꝝ: gal/
laꝝ: cipſſi: mirtiloꝝ: ⁊ hmōi tepida. Et ſumat mane vinuȝ
toc. de terra ſigillata cū ſucco mirtio ſb mamill' abſqꝫ ſca/
rificatōe ṗus oib⁹ apponanť vētoſe ⁊ vnganť venter ⁊ re/
nes: cū hac vnctōe. ℞. boly: maſticis: ſan. ora. terre ſigilla/
te: thuris. añ. ʒ. ij. ſumach berberis: nucū: cipſſi: ypogſtidos
acacie. añ. ʒ. ij. colofonie: farie ſiligis. añ: ʒ. i. ꝯfice cū ſucco
plātagis ⁊ v̄ge paſtoris. Ad vomitū expt⁹ eſt ſirup⁹ ō agre
ſta acetoſitas citri. Ad mollificatōeȝ expta ē tiriaca ādro/
maci: cū vīo ōcoctōis ſaluie. H. n. mollificatōȝ ⁊ ob dormi/
tationē tollit mēbroꝝ hūiditates m̄rices exiccat ⁊ cōſu/
mit: ⁊ ꝯſuat fetū: vt ait Abo. ❡ Ad pedū iſlatōes dimiu
tio pot⁹ ⁊ ſubtractio viriū ⁊ fomētatio in ſalſa: vl' maris: ⁊
ēpl'm de folys cauliū aſſoꝝ ⁊ ꝯmixto eoꝛūdē. ❡ Alr̄ȝ exp
tū ad ꝯfortatōȝ fet⁹ ⁊ ꝯfortatōȝ ipi⁹ ⁊ m̄ris. ℞. doronici ç
doarie margaritaꝝ vtriuſqꝫ coꝛalli vtriuſqꝫ been al. ⁊ ru.
gallaꝝ ſpody aſſe odoriferē gal. muſ. cardamōi: mioꝛis ci/
namōi pōtici. añ. ʒ. i. boli armēi terre ſigil. añ. ʒ. ſ. ſirupi ro.
⁊ ſaci v̄ge paſtoris: qð ſuffic̄. doſ. ʒ. ſ. H. n. rectificat diſpōnē
m̄ricis eaꝝ. ⁊ ſtōi. ⁊ iteſtinoꝝ ⁊ coꝛdis ⁊ cerebri. Et diābre
ꝯfectio fac̄ illð ſubtractis muſco. ⁊ ſpica: ⁊ ciamomo ſit pō
ticū ⁊ addat ypogſtidos ⁊ ſpodiuȝ ⁊ fruct⁹ rubi: cū ſumac
ꝓficit itentōeȝ. ❡ Empl'm exptū ad ꝯfortatōeȝ ſtōi ipaꝝ
⁊ retentōeȝ vōit⁹ ⁊ flux⁹ vētris ē empl'm nr̄ȝ de gallia itē/
tiōis caliтatis ꝯ̄ frītatē. ⁊ ſi mūdificatōe idiget mūdificeť
cū geleniabi cū aq̄ polipody ſicci. Jnūctio bona ꝯfortās
ligamēta. ℞. oli mirtini. ʒ. iij. diſſoluať in eo thuris albi ⁊
maſt. añ. ʒ. i. ⁊ iunganť renes vel ex olo maſti. cū puluere
terre ſigillate. Spāle regimē ꝑgnātis ē triplex: vnū qð cō
petit hn̄ti maſculuȝ. alið qð cōpetit hn̄ti gemellos: ⁊ aliud
qð ꝯuenit hn̄ti debilē ⁊ ifirmū. ❡ Primū ē duplex. vnuȝ
ē diſpoſitiuū. aliud ꝯſeruatiuū. Et diſpoſitiuū ē qð diſpo/
nit marē ⁊ feminā ad maſculi ꝓcreatōeȝ ⁊ ipregnatōȝ: ⁊ ē
vt ambo calefiāt cū cibis ⁊ potib⁹ ⁊ ſūptōe mitridati. ⁊ cū
ſuffumigatōib⁹ arōaticoꝝ ꝑſſarib⁹ cliſterib⁹ vnctōib⁹: et
ꝑp̄e cū arōatib⁹ calīs ⁊ ꝯfortātib⁹ matrē: ⁊ diſpōnib⁹ ꝯce
ptū ⁊ ꝑp̄e cū muſco croco xiloaloes mundo ⁊ crudo atqꝫ
cāphoꝛa: ⁊ cū ꝯfortatōe v̄e ⁊ gallia muſcata. ⁊ ſtudeant: vt
vtriuſqꝫ digō ſit ꝑfecta ⁊ duitēt oīa actu frā: vt poma ⁊ po
tū aq̄: ⁊ vt dimittāt coitū ad tp̄s nō oio. q2 coꝛrūpit ſpma:
vt diximꝰ iuuāt in gaudio ⁊ decubēt i domo leta in q̄ ſint
picture maſculoꝝ ⁊ cogitēt in maſcul': ⁊ firmēt meditatōȝ
ſuā i maſcul' foꝛtib⁹ ⁊ melioꝛis foꝛme ⁊ pulchrioꝛis figure
⁊ coeāt. Cōſeruatiuū v̄o eſt triplex. ṗmū vt hn̄ti maſculuȝ
ꝑdcā exhibita declinēt ad cal'm paꝝ cū itermiſſiōe frōꝛū.
ſcðm vt cib⁹ ⁊ potus ſit multe q̄litatis ⁊ pauce q̄ntitatis.
tertiū eſt qð īfra ſpecificabim⁹ i aboꝛſu ſi xp̄s voluerit q
ſit bn̄dict⁹: ⁊ hn̄ti gemellos ſilia ꝯpetūt ⁊ cib⁹. Ex his aūt
q̄ cū ꝓp̄etate opanť hoc ē lutū creticū ſuſpēſuȝ ſup ꝑgnā/
teȝ. ꝓſeruat. n. eas ab aboꝛſu ⁊ aleuiat ptū. ❡ Alr̄m ad ven
toſitates q̄ fiunt ꝑgnātib⁹ ⁊ ſolōnes nāe ⁊ noiať cōſeruās
ſm Jo. ſapiōis. ℞. caſtoꝛei nu. muſ. çedoarie doꝛōiti oiuȝ
añ. ʒ. v. ameos. ſe. apy. añ. ʒ. i. ſe. iuſqami al. margaritaꝝ: nō
ꝑfoꝛatarū. añ. ʒ. ſ. çuc. duplū oiuȝ miſceanť. ⁊ ſit potio. ʒ. i.
cū vino. ❡ Aliud ꝑgnātib⁹ ⁊ vētoſitatib⁹ m̄ricis ⁊ ꝯſuat
embrionē. ℞. çedoarie doꝛonici. añ. ʒ. ij. margaritaꝝ non
ꝑfoꝛataꝝ bdely coꝛalli karabe ⁊ ſete cocte: ⁊ crude. ana. ʒ.
ʒ. ij. caſtoꝛei. ʒ. i. ſ. vſnee ſpice. ana. ʒ. ſ. heil croci gar. añ. ʒ. i.
mell' q̄ntū nec̄e ē. doſ. ſit. ʒ. i. cuȝ vino ꝑmixto: aut miſceať

cū çuc. ⁊ deť. Jngt abo. ad ꝑgnātes ⁊ ꝯſeruatōeȝ fet⁹ tiria/
ca ꝯſeruat fetū. ſ. S. ⁊ andromaci: q̄ diateſeron v̄o fac̄ aboꝛ
ſum hoc ſapiōis fili⁹ dixit. Juuamēta ad apata accñā i pe
dibus ꝑgnātiū ſūt papir⁹: qñ īfundiť cū aceto ⁊ poniť ſup
ipſos ⁊ ol'm ro. qñ miſceť cū aceto ⁊ ꝯcutiť: ⁊ iungiť cū eo
pes. Et ſal tritū ēt cū aceto ⁊ chimolea ⁊ ē marmoꝛ īuētū
in luto viridi qñ poniť cū aceto ⁊ liniť. ⁊ cinis ⁊ ſal friſſuȝ
qñ teriť cū oleo ⁊ liniť tritū in aq̄ caulis ⁊ aloes ⁊ fauſel: ⁊
ſandalus ruber: qñ liniť cum aqua ſolatri.
❡ Capl'm q̄rtuȝ de partu nāli: de q̄bus ſolūmō ꝓcedam⁹
q̄ntum ſpectat ad indaginē eoꝝ ⁊ ꝑ ipſoꝝ notitia cās con
ſeruatiuas ⁊ nocumēta ipſoꝝ ſi q̄ eueniāt cognoſcam⁹ vt
eis ꝓuidentiā faciemus ⁊ curam.

P Artus nālis eſt cū fet⁹ moueať ad exitū: q2 iā cō/
pletus i vtero fuerit. Sicqꝫ nā ſeu itentiōis fineȝ
adepta velut in māifeſtū ducere: qð patrauit ⁊ ꝑ
inde m̄ŕ nāe oꝛganū i hoc actu mouet ipȝ deſiderās expel
lere nociuū ⁊ ipi⁹ cā ē coartatio ei⁹ ⁊ ðfect⁹ ſāguis ⁊ aeris
ſibi ꝓueniētis a m̄rice ad ei⁹ alimētū ⁊ ſpūs ei⁹ euētatōeȝ:
q̄re recalcitrādo moueť q̄rēs exire locū ſue coartatōis: vt
qð ſibi defic̄ ſuppleať poſt ptū. Et tūc m̄rix ſuſcipiēs nocu
mentū ei⁹ clauſa tā lōgo exn̄s tp̄e mox apiť ⁊ cōprimiť ad
ei⁹ expulſionē mō quodā mirabili. Vñ. S. ait. q̄d. n. vtiqꝫ
nāe exiſtit mirabili⁹ q̄ꝫ mēſib⁹ q̄dē totis nouē clauſiſſe os
m̄ricis diligētiſſime: vt nȝ ꝑis malus. i. acumē graffy ſuſci
piat: ꝑſcō v̄o ꝯcepto diſtātiā hȝ tāqꝫ magnā: vt totū al' exe
at ꝑ illð. Jllð t̄n diuio ꝑcepto ꝓcedit: hȝ āt inditia ptis nāl'
ex pte tp̄is: ex pte figure exit⁹ fet⁹: ⁊ exeūdi mod⁹. Ex pte
v̄o tp̄is: vt tp̄s ei⁹ ꝯpl'onis ipi⁹ ſit coꝛrn̄dēs tp̄i creatōis ei⁹
⁊ mot⁹: vt ſupi⁹ ē dcm̄. Et ſi accidat i v̄e meli⁹ ē. q2 nā ē foꝛ
tioꝛ ⁊ diſpō mēbroꝝ ad dilatōeȝ aptioꝛ. Et ꝓīde tp̄s nāle
ptus duplex erit pl'imū ꝯtigēs. ṗmū erit mēſiū nouē ꝯple
toꝝ: vl' dimiutoꝝ i ſeptīana vna ſic̄ i ml'iere q̄dā vidim⁹ ex
expto: lȝ illð raro accidat. ❡ Alið tp̄s ⁊ raro ꝯtigēs i ſeptē
mēſiū ꝯpletoꝝ. i octauo v̄o mēſe rari⁹ ē: ⁊ cū ē min⁹ ſaluať
nat⁹. Jn decio v̄o rariſſime licet vt pl'imū ſalueť reſpcū il/
li⁹: qð eſt: q2 nat⁹ i octauo aut nō eſt cōplet⁹ q̄re moriť aut
ſi eſt cōplet⁹ q2 creat⁹ in. xxxv. die fuerit. ⁊ tunc cū petierit
exitū in ſeptimo mēſe ⁊ laboꝛauerit: q2 nō exiuit remanſit
ðbilitat⁹. cū ergo i octauo mēſe exit iteꝝ ðbilitať. q̄re mo
riť niſi in locis meridionalib⁹ al' ſeptētrionalib⁹ in q̄b⁹ ſūt
mulieres viragines ſm Ap. ⁊ Auer. in ptib⁹ ſuis hiſpanie.
Cꝫ ſi ptrāſeat octo tardet exitū vſqꝫ ad nouē: q2 geuit i oc/
tauo mēſe ⁊ reſumēs vires egrediť ꝯfoꝛtatis. viuet ſil'r ſi
nat⁹ i decimo mēſe cōplet⁹ fuerit i nono: ſȝ tūc tractās exi/
tū ⁊ nō potuit ſi exeat in decimo accidit ſicut accidit nato
in octauo: qꝛ ſi cōplemētū hūerit i octauo mēſe accidet ei
ſic̄ nato in nono: cui⁹ cōplemētū extitit i ſeptimo mēſe: licȝ
paꝝ accidat vt tātū tardēt ⁊ v̄tutis debilitatē ſignificent.
Ex pte aūt figure part⁹ ē nālis ſi egrediať fet⁹ ſupra caput
ſuū ſcðȝ rectitudinē oꝛis m̄ricis abſqꝫ iclinatōe manib⁹ ei⁹
extēſis ſup coxas. ⁊ eꝯ. ē nō nālis ⁊ q̄s ſit īfra diceť. Ex pte
v̄o modi vt ſit velox facilis: q2 abſqꝫ accn̄tib⁹ foꝛtib⁹. ⁊ tūc
vt pl'imū exit. ❡ Signa nālis pt⁹ ſūt vt cū ꝓuenit ꝑgnās
ad mēſē vltimū ſm ſuā ꝯiecturā ⁊ ſenſerit grauedinē ſub
vmbilico ⁊ doloꝛē i doꝛſo ⁊ iguine ⁊ cal'itatē in vētre iſla/
tionē i oꝛe m̄ricis magnā ⁊ humectationē ei⁹ tc̄ iā apparēt
ſigna ptus ꝓping. Cūqꝫ mollificať ei⁹ cauda ⁊ iflanť igui/
na ei⁹ ⁊ iplētio eoꝝ ſit foꝛtioꝛ: tūc ptus erit ſtati: ⁊ ꝓprie ſi
aquā emittat. Et ſigna facilis ptus ſūt vt ſentiat doloꝛē añ
ptū i anterioꝛib⁹ ⁊ ðcliet ad pectē. cū v̄o ad poſterioꝛa ðcli
nat ē ðbil. ⁊ regimē ei⁹ ē vt dimittat nāe obſtetrix. ⁊ nihil
agat: ſȝ ꝯfoꝛtet parietē cibis bōis: ðōec piat: diñ cibet eā ci
bis facil' digōnis bōi nutrimēti m'te q̄litatis ⁊ pauce q̄nti/
tatȝ ⁊ vinū odoꝛiferꝝ potȝ: ⁊ ſtudeat i mūdificatōe ei⁹ ꝑfcā
q̄ i maſclo ṗmo tēdiť vſqꝫ ad. 30. i fēia v̄o vſqꝫ ad. 40. dies.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0391-4

Imperfecta.n.mūdificatio eſt cā oīs praue diſpōnis q̄ ei
accidere poſſūt q̄ multiplex ē:ſʒ q̄ i difficili ptu plimū ac/
cidere ꝯſueuit dicere differem⁹ de cāis ad capl'ʒ illō vbi:
de oī praua diſpōne ipaꝝ itēdim⁹ lati⁹ dicere dāte deo.

❡ Caplm.v.de mala cōplexione matricis ꝛ cura eius.

Ala cōplexio matricis ē ſimplex ꝛ cōpoſita ꝛ vna
m q̄q3:aut eſt pura aut ipura ꝛ cuiuſlʒ qdeʒ cā aut p
vicinitatē:ꝛ ppe ei⁹ cure ꝛ cāe pcatartica aliq̄ cāꝝ
q̄ ſunt note:ꝛ cāe p cōitatē ei⁹ ad epar ꝛ renes calidos vel
fr̄os vel totū corp⁹. Cā vō ipure ꝛ eſt plurimū aut ē ppa ꝛ
eſt hūor coadunat⁹ ꝛ colect⁹ aut a ſupiorib⁹ miſſus vta to
to corpore vel dcis mēbris. ❡ Signa male ꝯplōnis mr̄i/
cis q̄dā ſunt cōia oī male ꝯplexiōi ei⁹:ꝛ ſūt defectio actōis
ppe.ſ.cōcept⁹ ꝛ ſterilitas. Ingt.n.hyp.q̄cūq3 fr̄as ꝛ dēſas
hnt mr̄ices ꝛ calās ardētes vel ſiccas vel hūidas valde nō
cōcipiūt. Quedā vō ſunt ppa calide ꝛ ſūt iflatio pcepta in
ptib⁹ vulue ꝛ mēbris adiacētib⁹ ꝛ cōicātib⁹ illi pruritus ꝛ
pūctio ꝛ deſideriū coit⁹ forte velut papiſm⁹ ꝛ fortis attra
ctio ſpmatis:et vlcera mr̄icis multitudo piloꝝ pectinis.ꝛ
diſpō menſtruoꝝ:q2 paucitas: qm̄ ipm cōſūpſit aduſtio ꝛ
color ipſoꝝ q in pāno in nocte ſuppoſito pōt cognoſci:ꝛ p
prie cū exiccari pmittat in vmbra.nā color appꝫ vehemē
mētis rubedīs ꝛ nigredīs ꝛ citrin⁹ ꝛ odor eorum grauis ꝛ
acutus ꝛ anticipatio tpis. Et tictura aq̄ ꝛ ſiccitatis oris:et
velocitas pulſus ꝛ regimē pcedēs calidū. Et fr̄e ſigna ſūt
pdictis ꝯria ꝛ conceptio difficilis. Et ſigna humide ſunt
tenuitas menſtruorum ꝛ cauſa ſue humiditatis eſt abor/
ſus facilis. ꝛ ſicce ſunt illis contraria ꝛ difficilis partus.
❡ Cura eius ex dcis in cura male cōplōnis renū veſice ꝛ
teſtiū eſt mainfeſta:ꝛ eſt tres res.pma abſcīdit cām ſi ad/
ſit.ſa alterat diſcraſiā.tertia corrigit accn̄tia: vt debilita/
tem ꝛ dolorē ei⁹ de q̄ ifra dicet. ❡ Confectio penſary fm
raſim aſs calefaciēdū mr̄icē ꝛ adiuuat ad ipregnandū. ℞.
caſtorei ſtoracis galbani:euforby oppoponaci carpobalſa
mi:granoꝝ been coſti:bdely:ſpice.an̄.ptes eq̄les reſoluā/
tur cū vino ꝛ fiat penſariū noctib⁹ plurib⁹ ꝛ ſumat i potu
oī die diamarte:deiū ſuffumiget cū eis ꝛ approxiet ſocio.

❡ Cap.vi.de egritudib⁹ mr̄icis ex qb⁹ eſt oppilatio.

Ppilatio mr̄icis aut ē i collo aut i ꝯcauo ei⁹:q̄ vō ē
o in collo aut i orificio ei⁹ ē exteriore occurrēte vul/
ue:aut imeatu:aut i orificio iteriori ꝯcurrēte mr̄i
cis ꝯcauo:qō os mr̄icis itriſecū dcm̄ ē:aut ē in orificys ve
naꝝ mēſtrualiū. Que vō ē in ꝯcauo ei⁹ aut ē in meatu va/
ſoꝝ ſpermatis aut i orificys cotilidonū. Et cā ei⁹ q̄ eſt i ori
ficio exteriori aut ē ſoliditas pānicu li q̄lis ē i v̄ginib⁹ aut
res carnoſa ibi velut v̄ga nāliter ꝯcreata:aut apa duꝝ ibi
dē pter nām eueniēs.aut icarnatio vlceris emoroydes i/
flate moꝝ claui veruce ꝛ qlʒ ē carnoſa. Cā ei⁹ q̄ in meatu
ꝯtigit plurimū ē carnoſa. Cā vō ei⁹ q̄ ē in orificio iteriori:
qō os mr̄icis dcm̄ ē:ſilr ē carnoſa vel pīguoſa pter nāʒ gra
ſis:ꝛ cā eius q̄ eſt in orificio venaꝝ mēſtrualiū plimuʒ eſt
coartatoria ꝛ raro ē attenuatoria rari⁹ carnoſa. ꝛ cā ei⁹ q̄
eſt i meatu vaſoꝝ ꝛ orificys cotilidonū ſilr exiſtit. ❡ Si/
gna q̄dā ſunt cōia q̄dā ppa cōia ſunt: nā qlʒ ipaꝝ ſi fortis
eſt fit cā ſterilitatis.ſi vō debil' cā erit difficilis ipregnatio
nis ꝛ pt⁹: Cū.n.pāniculus ille nālis pcreat⁹ nō ſit ſolidus:
lʒ nō rupt⁹:ſʒ foramīa hēat plura p q̄ mr̄ix poſſit de ſpma/
te ēt pycere extra ipaʒ ꝛ in faciē ei⁹ vel i exteriori loco ca/
lido tpato:puta balneo in quo ſua calitas ꝯſeruet ſuo orifi
cio occurrēte trahet aliqd deſiderio ſui cū ſit paꝝ conce/
ptio fiet:ꝛ tn̄ cū difficultate vt phūs ponit:lʒ ſupra i capi.
de ſpmate a.h.alr ſit dcm̄. Sʒ ſigna ppa diſtictiua ſpērū
ꝛ cāꝝ ipſaꝝ ſūt.nam q̄ ē i orificio exteriori ē manifeſta.q2
ſubiacet ſenſui:ꝛ ē phibēs vel ipediēs coitū. Ea vō q̄ eſt i
meatu ꝛ orificio iteriori ē occulta ꝛ cognoſcit per ſterilita
teʒ. Alys vō cāis exn̄tib⁹ eis q̄ ifra dicere dʒ. Sʒ iter eas
diſtinguit pō:vel itromiſſio digiti obſtetricis. Cū.n.nō in/
ueniat duricīē coartantē meatū oppilatio erit in orificio
iteriori.ſi vō iueniat ibidē oppilo erit in meatu exteriori.
ꝛ ſine dolore eſt carnoſa.ſi vō cū dolore erit apoſa. ꝛ eſta/
te plongat:hyeme abbreuiat: ꝛ fortaſſe erit vtrobiq3.ca
vō q̄ in meatu eſt cū carnoſa exiſtit.ſilr digiti ipō illud oñ
dit:et dolor pceptus in coitu. ❡ Signa vō eius q̄ in orifi/
cys venaꝝ mēſtrualiū ſūt retētio ꝛ puatio mēſtruoꝝ cuꝫ
ſignis dn̄y hūoris groſſi ꝛ viſcoſi:ſʒ ſiqdē ſit in ꝯcauo ꝛ in
meatu vaſoꝝ ſpmatis ſūt mr̄icis pfocatio: niſi aliud ꝯdi/
cat.ꝛ ei⁹ q̄ ē in orificys cotilidonū ē poſt ipregnatōēʒ abor
ſus velox deficiēte fetui ſanguis alimēto: lʒ illud q̄nq3 ex
toti⁹ corpis cōitate ꝯtigat:q2 ſiccū ꝛ tenue ſit put hyp.di/
xit i affo. ❡ Cura ei⁹ q̄ eſt exterioris orificy polis ē ꝛ facil'
Et ſiqdeʒ ſit carnoſa.cura ē due res.pma ē abſciſio carnis
addite.ſa eſt regn̄atōis phibitio. ❡ Prima ꝯplet dupl'r
.ſ.cū corpis diſpōne ꝛ mō. Et eſt vt ſedeat corā limie cuꝫ
pauco ſubſtentaculo ad poſteriora:ꝛ eleuatis coxis crura
faciat adherere eis: ꝛ brachia ligent fortiter ſuper eis:ꝛ i
curuatura ſuoꝝ poplitū:deide cuʒ ſciſiōe auferant. Et ſit
illud: aut cum ligatura ſtricta donec putrefiat ꝛ cadat:
vt non accidit fluxus ſanguinis:vt dictum eſt in emoroy/
dibus:aut cum corroſiuis farmacys: aut cū inſtrumento
ferreo acuto tal'r. vt ō addita n̄ remaneat aliqd:nec aliqd
de radicali tangat. Deide regat cū ſtipticis exiccātib⁹ me
dicinis. Et q̄nq3 in accidētib⁹ medicinis q̄ note ſunt:ꝛ q̄n/
q3 cū corroſiuis. Si vō fuerit pānīculoſa cura erit ēt due
res.pma ē apertio.ſcda aptiōis ꝯſeruatio. Pria cōplet cū
ſciſura pmo mō. Scda cōplet dupl'r pmo mō cū iterpoſi/
tione pille ex lana iſuſa i oleo ꝛ vino.ſcdo cū ꝯſolidatione
labioꝝ ſciſuraꝝ.ſit aūt cū ſtipticis ꝛ cicatriçātib⁹ medicis
q̄ note ſunt:q̄s ſequat cōcubit⁹ frequēs. Sʒ ſi qdē ſit inte
rioris meat⁹ ꝛ carnoſa cura ē q̄tuor res. pma eſt extractio
cāe ſi poſe ē cū vncinis.ſcda ē abſciſio ei⁹ cū iſtrumēto:ſed
fiat cū cautella: vt paulatim icidat nō ſubito:ꝛ in mlta q̄/
titate ne frāgat veſica:vel aliqd de matrice:ꝛ icurrat ſpa
mū ꝛ cuçeç. tertia erit vt iciſio tegat in pncipio cū lana i/
fuſa i vino pōtico adherēti iciſiōi. ſcdo cū vnguētis liniti/
uis ꝯſolidātib⁹ vlcera vētris ꝛ ſuppoſitis cum naſcali ſint
actu oīa calida:ꝛ a frigore pſeruent. q̄rta ē accidētiū cor/
rectio. vt ē dolor q oꝫ vt ſedet cū medicis mollificātibus
dictis ſupra i tenaſmone ꝛ fluxu ſanguis:cui⁹ regimē ſupe
ri⁹ habuiſti. Ei⁹ vero q̄ i orificio iteriori exiſtit cū carnoſa
fuerit cura ē ipoſis. Sʒ ei⁹ q̄ ē i orificys venaꝝ mēſtrualiū
ꝛ vaſoꝝ ſpmatis ꝛ cotilidonū:ſi coartatoria ſit cura ē im/
poſis. fiat aūt cū icidētib⁹ ꝛ ripticis farmacis: put i cura
retētionis mēſtruoꝝ dicem⁹. Et ſi fuerit carnoſa ē ēt ipoſ
ſibil'. Si vō attenuatoria fuerit hec vt i ipa accidit i ꝯſum
ptis curabit rehumectatiōe vlī toti⁹ cū regimie hūectati
uo ꝛ pticulari partiū ipoꝝ cū balneis ꝛ fexionib⁹ i eis ꝛ vn
ctiōib⁹:ꝛ humectātiū reꝝ: q̄ note ſunt. Et ex appropriatis
ſunt medule laudabiles ſuppoſite:ꝛ carnobite:ꝛ myrra le
nit duricīē coartātē:ꝛ oleū de lilio:ꝛ vinū ꝛ bdeliū eſt ꝯue
niēs. Si vō apoſtemoſa fuerit q̄cūq3 ſit iuuabit cū molli/
ficātib⁹ ꝛ reſoluētib⁹ tēperatis i modū enchatiſmatis ap/
propriatis cū iniectionib⁹ vnguētoꝝ pēſarys ex eiſdem in/
unctis reliq̄s pticulares opatiōes cirugico dimittēdo. Et
i cura emoroidarū mori:ꝛ aliorū cura ipoꝝ i virga ꝛ ano
ſuperi⁹ dcā ē nota. Et ex appropriatis ſimplicib⁹ i aptione
oppilationū matricis ē vehuen ꝛ bdeliū vtrūq3 ſpodium
aperit os matricis: mūdificat eā.ꝛ puocat mēſtrua: oleuꝫ
maiorane calefaciendo ꝛ ſubtiliando confert coartationi
oris matricis perducentis ad prefocationem:ꝛ oleuʒ nar
ciſci aderit coartationem: ꝛ confert doloribus eius:ꝛ ole/
um abrotani: emen vrtice cum vino bibitum aperit os
mr̄icis ꝛ galia ꝛ medicamia ꝯpoſita ſūt q̄ ex his ꝯponunt.

¶ Capꝫ. vij. de ſuſpenſione matricis: ⁊ aſcenſu eius ⁊
declinatione ipius: ⁊ deſcenſu ſeu precipitatione.

m Atrix moueť de ꝓpo loco: ⁊ qñꝫ ſubleuať ⁊ ſuſpē
diť. ⁊ qñꝫ declinat ad alteꝝ lateꝝ dextrū.ſ. vel ſi-
niſtrū. Et qñqꝫ dſcēdit ⁊ ꝑcipitať adeo vt qñꝫ ex-
tra egrediať: ⁊ qñqꝫ vtriſqꝫ motibꝰ ſil' moueť. Cā aūt ē du
plex. vna ꝑter nām: ⁊ alia nālis: ꝑter nām cā ē ipiꝰ motꝰ di
ſtincti. ⁊ plūimū ſm G. ē ſpaſmoſa ꝯtrctio ꝯcatenationū ipiꝰ
ꝑꝑ replōnē vēaꝝ ipiꝰ orificiis venaꝝ abſtractis. cū.n. ꝯca-
tenatōes ſupiores repleanť apoſe vel nō apoſe: ⁊ eis ꝯtris
ſubleuať matrix: ⁊ ſuſpēdiť: qñqꝫ cā illiꝰ ē vētoſitas ſuble
uās: cū vō lateral' declinabit ad alterā pteꝫ: cuiꝰ cōcatena
tio ē ꝯtcta reliq̄ extēſa: ſeu mollificata. Et qñꝫ cā i ea ſť hu
mores groſſi ⁊ viſcoſi collecti in ea. Sed ſi ꝯcatenationes
vtraſqꝫ nō ſpaſmari: ſꝫ mollificari ꝯtigat: ⁊ extēdi nečc eſt
deſcēdere ipam. Cā aūt mollificatiōis eſt aňs: ⁊ eſt hūidi-
tas viſcoſa mucilaginoſa aggregata in eis. Et qñqꝫ ē ꝑmi-
tiua vt friditas ſubitrans ex aere fro balneo fro: ⁊ ſeſſione
ſup lapidē frm. Cā vō extēſiōis carū ē ꝑmitiua. vt caſus ⁊
ꝑcuſſio. curſus fortis: vt tuſſis ⁊ vociferatio: aut ſternutatō
vehemēs: aut terrefactio ex ſtrepitu nō iꝯſtū retrabit: ſed
inꝯſtū tractū calorē ⁊ ſpūm ſubito extiguit ⁊ ifridat: ⁊ ſic
paliticū fač: aut difficultas ptꝰ: ⁊ grauitas. aut magnitudo
virilis virge. Aut labor obſtetricis i extrahēdo fetū ⁊ ſcdi-
nā: aut exitꝰ eiꝰ ſubito: aut putrefactio ꝯcatenationū ⁊ li-
gamētorum. Cā nālis ē cā vtriuſqꝫ motꝰ ipius ⁊ ſimulta-
nei cū ſucceſſiōe mō ſupra: mō lateralr: mō ifra: ⁊ ē vt exti
mo quā. G. aſſeruit affirmās platonē. cū ingt vētriculi q in
vulua dicunť cū ſint q̄ſi aiati ꝯcupiſcunt filios ꝓcreare ſi
diu ꝑmāſerint: q fructū nō afferāt: anguſtianť ⁊ nequeūt
vno loco manere. ꝑ corpꝰ.n. motiuias ſpūs oppilāt anheli
tū ēt corrūpūt: qr diuerſa ⁊ magna accñtia in mlierib ſť.
¶ Signa gdē ⁊ accñtia: q̄ ſubleuatōe eiꝰ ꝯtigūt: ſūt dolor
⁊ grauedo ſup vmbilicū: ⁊ ſenſus rei rotūde: vl' ſic manus
appħēdēs ibidē: anhelitꝰ corruptꝰ timor: ⁊ triſticia aboia
tio: faſtidiū: dolor capitis: v̄tigo: ſcotomia: ⁊ diſcreta mlier
ſentit illā. ⁊ eructuatio: ſi cū vētoſitate fuerit. Declinatōeꝫ
eiꝰ ⁊ accñtia comitanť.ſ. dolor: grauedo: alteratō lateꝝ: re
motō oris mřicis ab oppōe rcā ꝑ quā i ipaꝫ imittiť ſpma:
qr ꝯceptō ipediť. ⁊ obſtitrices cognoſcūt ꝑ tactū cū digitꝫ
ꝑtē dcliatōis: ⁊ cognoſcūt: aut ſi replōne apate: aut ꝑ duri
ciem in ꝯſtrictōe iuētā. ⁊ qñqꝫ accidit ꝑfocatiua: ⁊ ꝑpe cū
dcliat ad ſiniſtꝝ: ⁊ idrops: ⁊ mola ꝑpe: ⁊ cū dcliat ad dxtꝝ.
Deſcēſuꝫ vō eiꝰ comitāť accñtia ⁊ dolor renū ⁊ lateꝝ: ⁊ in-
guinū tenſiuus: ⁊ in pectine grauatiuꝰ ſpaſmꝰ. ⁊ tremor ⁊
ſenſus rei rotunde in pectine in egeſtiōe vrine difficultas
ex eo q matrix deſcēdēs cōprimit meatus fecis ⁊ vrine q̄
erit alba in colore ⁊ ſpiſſa in ſuba liuens ſupius cū reſolu-
tionibus cunoidalibus flaui coloris ⁊ nigri multe adherē
tie reſidentis in fundo ⁊ apud vuluā ſentit rē deſcendētē
leuis tactus ꝓpter eius cōnexionē ⁊ cū egreditur magis ⁊
eſt manifeſta. Et ſigdē in cā ſit res preter nāꝫ puta reple
tio venaꝝ cū obſtructione orificioꝝ ipſaꝝ indicat eā retē
tio mēſtruoꝝ. Si vero ſit cā mollificans antecedēs regi
mē ⁊ exitus mucilaginis appoſitōe coliriȷ. ⁊ hūiditatꝫ mł-
tiplicatio in nā cū aliȷs circūſtātiȷs cōſiſibus: ⁊ ſi ventoſi-
tas ē ibi ſonitus ⁊ rugitꝰ. Si vero ſit ꝑmitiua ē manifeſta.
Si vero cā fuerit nālis indicat eā ꝯſuetꝰ conceptꝰ nec ꝑ-
natus cū ſanitate fortitudine: ⁊ ilaritate corporis ⁊ bonita
te regiminis. ¶ Cura eius q̄ preter nām ē ex repletōe eſt
gnqꝫ res. ꝑma ē euō. ſecūda eſt ipiꝰ matricis reductio. ter-
tia eſt ipſiꝰ reducte ꝯſeruatio. q̄rta cōueniēs regimē. gnta
correctio accñtiū: ⁊ ſilr: q̄ a mollificatōe ꝓcedit. Euō vero
duplex ē. vna repletiōis venaꝝ. alia humoris groſſi ⁊ viſco
ſi eaꝝ orificia obſtruētis: vel mollificātis cōcatenationes
⁊ ligamēta. ¶ Primā rē cōplent flebotomia ſaphene in
ſcēdēte ⁊ in declināte ex oppoſito pedē ⁊ in deſcēdēte ex
baſilica. ¶ Secūdā cōplent farmaca ꝓpria ꝑmiſſa ꝑpara
tione educētia a toto corpore ſi cacochimia ſit in eo iſluēs
illi ⁊ ꝯria parte mota eius ⁊ fomētatōes ſeſſiones: vnctio-
nes ⁊ naſtalia appropata in educēdo illos ex matricis par
tibꝰ q̄ infra in cura retentionis mēſtruoꝝ diceť. ¶ Se-
cūdū ē retractio eꝰ ad oppoſitū: ⁊ reductō ad mediū loci ⁊
q̄litatē. cōpleť aūt i ſubleuata eius tractio cū ſternutatōe
ex obteranico retinēte anhelitꝰ ⁊ vētoſis in ambobus in-
guibꝰ ⁊ pectie ⁊ coxis applicatis ⁊ doloroſis ligaturꝫ i cru-
ribꝰ ⁊ pedibꝰ. ⁊ in declinatōe ad alteꝝ cū caꝝ appoſitione
in oppoſitis tñ. ⁊ ſilr ligatura: ⁊ cubitꝰ ſup oppoſitā partē
⁊ in deſcēdēdo cū appoſitōe caꝝ ſupra dorſuꝫ renes ſupra
vmbilicū ⁊ latera ⁊ ligaturis manuū: ⁊ cū applicatōe odo-
rabiliū vel fetidoꝝ circa nares. os ⁊ vuluā. delectať.n. ma
trix q̄ſi aiata exiſtens odoribꝰ: ⁊ triſtať fetoribꝰ vt currat
ad illos: fugiat vero fetidos: nō qr mentē ⁊ itellectū hēat
vt aial: ſed a ſui ꝓprietate q̄ docuit ipſaꝫ nā: ⁊ ꝑinde in ſub
leuata fetida naribꝰ ⁊ ori applicēť odorabilia vulue: ex q-
bꝰ ꝓprie eſt galia ſuffumigata. h eni deſcendere facit ma-
tricē prefocatā ⁊ declinantē ad alteꝝ latus. Silr ecōtra in
deſcenſu eius reductionē adiuuabit obſtetrix poſt balneū
ventrē manibꝰ ſecernēdo ⁊ cū itromiſſiōe digitoꝝ in vul
uā inunctoꝝ adipe galline vel anatis ⁊ ad ꝓpriū locū ſub
leuādo ⁊ coequando ⁊ ad rectitudinē reducēdo cū appoſi
tione vētoſe magne in medio ſuminis in vmbilico ⁊ in me
dio dorſi. ¶ Tertia ē ꝯſeruatio ipſiꝰ iā reducte q in remiſ
ſione accñtiū ⁊ relatione obſtetricis cognoſcere poteris: ⁊
illud cuꝫ gete ⁊ decubitu ſupino ⁊ ſtipticis applicatis itus
⁊ extra cū embrocis ex vino ſtiptico decoctionis vnctioni
bꝰ ⁊ emplis ⁊ ꝑ oēm modū approximatis. ex gbꝰ ſunt ꝑpa
ex pte ſimplicia: ⁊ ꝯpoſita q̄ ifra diceť. ſimplicia ſūt mir-
tus acacia cortices granatoꝝ ⁊ roſe ſquinanti ⁊ herba que
oritur ſuper lapides cū ſť in aq̄ ⁊ faciūt lubricare pedes: ⁊
lētes ⁊ breuiter oia ſtiptica odorifera. ¶ Quarta res ē re-
gimē cōueniēs ⁊ ē vt regať in aere tēperato declināte ad
frigidū. Hyp. ingt motꝰ a caliditate ē ecōtra frigidū pali-
ticū faciēs: vitet oēm motū aie ⁊ corpis ⁊ oēs ſupiores no-
minatos repletionē ciboꝝ ꝓprie viſcoꝝ groſſoꝝ frigidoꝝ
ventoſoꝝ ⁊ ſalſoꝝ: vtať vero bonis ⁊ ſtipticis. ⁊ potus ſit
fre aq̄ ⁊ ſtiptice groſſe ⁊ luminoſe diuerſoꝝ: ⁊ ianiať cliſte
ribꝰ vel vomitibꝰ vt ſupius dictū ē. vtať quiete ⁊ ſomno.
¶ Quinta res ⁊ vltima eſt accñtiuꝫ correctio: ⁊ ex medici
nis accñtia predicta corrigētibꝰ: quedā eſt cōis ⁊ illa ē bal
neū ex aq̄ dulci decoctōis anodinoꝝ mollificātiū: q̄dā ſť
ꝑpe q̄ ex dictis ⁊ dicēdis i ꝓpriȷs caplis colligere pōt pru
dēs. Si vō cā fuerit nālis cura erit altera duaꝝ reꝝ vel cō
ceptōis ⁊ gñationis ꝓcuratio ſi poſſibile ē: vl' cū viro ſi ho
neſta: vel cū alio ſi ihoneſta vel libidinis extictio ſi vidua
ſit. vel virgo vel virū abſentē hēat ⁊ hāc ꝯplent ſpma extic
cantia q̄ dcā ſť in cura gonoree polutiōis ⁊ coitꝰ exubera-
tiōis. Abo. dixit in deſcēdēte reſupineť mulier ⁊ apiat qō
ē iter crura ſua: ⁊ aſſume lanā ex lenibꝰ veleribꝰ. ⁊ made-
factā adherere fac mřici. Deiñ accipe lanā aliā ⁊ infunde
eā in acacie ſucco: aut in vino in quo diſſolutū ſit aligd ſti-
pticū ⁊ pone ſup os mřicis ⁊ redit cū facilitate ad iteriora
deiñ accipe aliā lanā ⁊ eā cū aceto pone ſup vuluā ⁊ ꝑcipe
mulieri vt iaceat ſup latꝰ vel dorſuꝫ ⁊ adunet crura ſua ⁊
ſeruet lanā vt ē tēperata in ea ne cadat. Et pone vētoſas
ſup radicē ſuminis eius ⁊ ſup dorſuꝫ ⁊ fac eā odorare odo
res bonos valde. ¶ In declināte deť i potu oleū de cher
ua ⁊ ſiſia educētia f'licos chimos ⁊ vētoſitas ⁊ enchatiſ-
ma cū decoctōe ſpice cōfert lubricitati mřicis. ¶ Abo. ēt
dixit. folia vrtice recētia reddūt matricē exeuntē loco em
plaſtri cōtrita ⁊ ſuppoſita: ⁊ bo uinū ſtercꝰ ſuffumigatum
G. dixit. cū mř egrediť armoniacū diſtēpatū cū ſucco ab-

ſinthy:⁊ ide iungat̃ vẽter cũ pẽna:poſtea accipe caſtoreũ
rutã arthemiſiã equaliter.in vino coquant̃ cũ cõſumptõe
duaꝝ partiũ ⁊ tertiã da in potu.Et in ſũma conuenit cura
ei⁹ cũ cura mollificationis ⁊ exit⁹ ani.⁊ dixit ſi mater late
raliter moueat̃ vt tortionẽ ⁊ rugitũ ſentiat qđ idicat ven/
toſitatẽ iterclaſaꝫ:apiũ.fenugrecũ.⁊ ruta in vĩo dabit̃.vel
coctũ cũ melle vł dozonigi.⁊ ſgnãtũ ⁊ ariſtologia rotũda.
¶ Itẽ accipe agaricũ:aſpaltũ:ſemẽ plãtagis ⁊ ſaturegie
⁊ puluerizata cũ vino cocto.Itẽ ariſtologia ⁊ ꝑꝑe cocta cũ
oximelle ſtiptica vẽtoſitati mr̃icis ẽ ꝓꝑa:⁊ ſtõi atq̃ ſplcis
Itẽ itromitte ĩ balneũ ⁊ poſt ipm̃ fac empl̃ꝫ de ſucco rapi
ſtri ⁊ faria ordei:⁊ appone vẽtri ⁊ vulue. Itẽ ad exitũ mr̃i
cis cã virilis virge ſternutatõis vel alteri⁹ cãe ꝑmitine li/
ne pãnũ lini cũ pice vel aliquo oleo pulegio. vł muſtelino
⁊ ipꝛie vulue ⁊ liga.quouſq; mr̃ ꝑ ſe reſideat ⁊ cal̃a fcã ſit.
Si v̄o friditatẽ recepit balneet̃ ĩ aq̃ decoctõis folioꝝ lau
ri:pulegy:abrotani:⁊ enule:⁊ arthemiſie.deĩn ſuffumiget̃
cũ muſco:ambra:⁊ galia.ĩ aſcẽdente balneet̃ cũ aq̃ cicute
qñ ſubleuat ⁊ ſedat dolorẽ ⁊ ſuffumiget̃ cũ capillis ł ſcar/
pis vel aſa.⁊ iungat̃ vẽter cũ oleo ſambucino vel de enu/
la vel nardio anetino de lilio ⁊ rutaceo.¶ Syrup⁹ ad di/
gõnẽ humoꝝ flſcoꝝ mollificantiũ ligamẽta mr̃icis. aut ſi
deſcẽdat ⁊ obſtruãtur orificia venaꝝ q̃re retinẽt ⁊ ꝯhun/
tur ⁊ fiũt cã ſuſpẽſionis ⁊ declinatõis. ℞.artemiſie radicũ
ireos:enule.radicis lily:camedreos:camepiteos:thimi:ri
goꝝ:roꝛ̃ marini:radicũ ireos:⁊ bugloſſe:radicũ capilli ve
neris:adiãtos.ã̃n.M.i.aniſi maratri: epithimi: floꝝ viri/
uſq; ſticados:petroſelini:ſeminũ ſpagi.ſpice celtice ſgnãti
ligritie mũde.ã̃n.ʒ.i.zuccari.lib.iy.vini mali granati.libꝛ.
ſ.fiat ſyrup⁹ de quo vtat̃ mane ⁊ ſero cũ aq̃ pluuiali.¶ Di
geſta mã purget̃ cũ his pill̃. ℞.theodoricõ anecardinũ be
nedicte.ã̃n.ʒ.i.ſ.agarici.ℨ.i.eſule.ℨ.y. fiãt pill̃e ⁊ p⁹ ter/
tiũ itret balneũ iſtaꝝ herbaꝝ. ℞.arthemiſie:radicis ireos
lily:altee:bugloſſe.ã̃n.M.i.oĩa bulliãt ĩ aq̃ ⁊ fiat balneũ
ꝑ dies duos:⁊ tertia die p⁹ balneũ fłomet̃ de baſilica.qb⁹
expeditis fiat hec ſuffumigatio ꝑdicta ⁊ erit efficax ſi xp̃s
voluerit. ¶ Et cũ matrix ad ꝓꝑuꝫ locũ redierit apponat̃
hoc empl̃ꝫ ſup ſumẽ:⁊ renes. ℞.maſticis:thuris albi : opo
ponaci: terbentine:galbani:ſerapini:reſine:ſtoracis ligde:
coloſonie.ã̃n.ʒ.i.cere rubee.ʒ.ix.fiat cerotum.

¶ Capl̃ꝫ.viy.de ꝑfocatõe mr̃icis ⁊ medicinis ei⁹.

P Refocatio matricis ſiue ſuffocatio ſiue anhelit⁹
ablatio dicat̃ in ꝑſenti capl̃o oſtẽdere eſt intẽtio.
paſſionẽ.n.mr̃icis cũ ſignificãt q̃dã q̃ a ſuis accñti
b⁹ ſortita ẽ nomẽ ꝯmixtis ex ſpaſmo ⁊ ſincopi:q̃re Abo.eã
dixit modũ eẽ q̃ndã epil̃e:⁊ ſincopis.⁊ ex ſenſus ⁊ motus
ablatõe atq; anhelit⁹.q̃r.H.eã ſuffocatõeꝫ dixit. ¶ Cã v̄o
ipſaꝝ ẽ paſſio.ſ.cordis cerebꝛi ⁊ alioꝝ ꝑncipaliũ nõ ꝓpria
tñ:ſꝫ ex colligãtia ad mr̃icẽ ꝑncipal̃r patientẽ mediatione
velamĩs ⁊ venaꝝ pl̃iatiliũ ⁊ getaꝝ ex mẽſtrui:vel ſpmatꝫ
diuturna retẽtõe.q̃re matricis ſuffocatio dicta ẽ.Et mod⁹
ẽcũ.n.mẽſtrua retinẽtur mr̃icẽ neceſſe ẽ pati ml̃tipl̃r ꝑus
hyp.dicẽte ĩ affo.Mẽſtruis pl̃ib⁹ veniẽtib⁹.⁊ nõ venienti
b⁹a nã accñt egritudĩes.talis aũt ꝯſtat oĩs gñis eẽ male cõ
plexionis repletõis receptaculoꝝ ⁊ venaꝝ ipſi⁹ extẽſiõis
⁊ ſol̃onis cõtinui male cõpl̃onis fr̃e pl̃is cũ mã fr̃a ſit ⁊ ml̃
ta ⁊ qñꝫ cal̃e ſi putrefiat.augmẽtũ ẽt ſi ex nutrimẽto cal̃o
ſit infridato ⁊ ſeq̃tur niſi ex eo accidat putrefactio.quẽad
modũ.n.putrefactio ex caliditate:ita ex putrefactiõe cali
ditas accidit:ait ꝑnceps.Abo.necnõ ⁊ qñq; a̅patũ ei⁹ nã ñ
potẽte mãꝫ extraducere ꝑꝑ obſtructõeꝫ meatuũ.q̃re ſpar
git in ſubaꝫ mr̃icis ⁊ a̅patis coopãte dolore ꝓuocãte alia
mẽſtrua ſup ipſa:necnõ ⁊ mãꝫ aptã trahi ſi q̃ ĩ corꝑe fuit
aut q̃ꝛ ex egritudinib⁹ ꝓꝑa ꝑueniũt accñã.⁊ ꝑꝑ colligãtiã
ad ꝑncipalia ĩſurgũt alia totũ corꝑ⁹ vexãtia. ¶ Proinde
ex repl̃one ꝑdictoꝝ mr̃icis mot⁹ ꝑter nãm ꝑdictis accidit
cũ ſuis ꝓꝑijs accñtib⁹ ſupius diſtinctis.Extẽſiones vero
ei⁹ doloꝛes fortes adeo vt mulierẽ torq̃re faciãt vndiq; ⁊
caput genib⁹ ĩplicari vt reſol̃onis ſincopis ꝑuenit:malicia
fr̃e ꝯpl̃onis obſtructõe meatuũ ⁊ poroꝝ ipi⁹.q̃re mã coar
tat̃ ⁊ coartata ĩfrigidabit̃:⁊ putrefiet:⁊ fumũ emittet ꝑꝑ
ſui maliciã venenoſaꝫ nãe ml̃ieris ⁊ calori ei⁹ innato a ſpẽ
tota ꝯriũ.⁊ cũ nõ hẽat ſpiracula qb⁹ extra cop⁹ poſſit exclu
di ẽ nec̃e ſurſũ aſcẽdere ad ſtõꝫ ⁊ cũ ꝑuenerit ibi nauſeã gi
gnit võitũ ⁊ oẽꝫ ei⁹ actũ ꝑturbat:⁊ ad diafragma ĩfridan/
do ꝓhibꝫ ei⁹ motũ.q̃re anhelitũ corrũpit vel tollit aſcẽſuꝫ
lꝫ aliq̃s ſit nec̃ari⁹ q̃ꝫdiu viua exiſtat. Et maxie q̃ꝛ vlteri⁹
aſcẽdẽdo ad coꝛ colorẽ nãlẽ in eo tãq̃ꝫ in ſuo ꝑncipio ſic de
bilitat extiguẽdo q̃ magna ſenſibili euẽtatõe nõ eget. ſic/
q̃ꝫ igit̃ nec̃itate diminuto ⁊ orgão ĩpedito anhelit⁹ adeo ſẽ
ſu ꝑuat⁹ aſſiſtit q̃ ablat⁹ total̃r videt̃:ad cui⁹ idagationeꝫ
lanã ſõtilẽ carmiatã hñ iter nares:⁊ os talib⁹ antiq̃ mãda
uerũt apponi:vł ciffũ plenũ aq̃ ſup ſtõi orificiũ.exiſtẽte.n.
anhelitũ q̃ꝫtũlibꝫ diminuto ea mouet̃:⁊ eis nõ cõmotis ꝑua/
to ãhelitu mortua iudicat̃ ꝓꝑrie cũ ex tali fumo coꝛ ſic ẽt
ꝯſtrigat̃ vt neq; ſpm̃ ꝑ arterias emittat:q̃re pulſus ibi au/
ferat̃ neqꝫ calorẽ ⁊ ſanguinẽ ꝑ venas:q̃re corꝑ⁹ ĩfrigidat̃ ⁊
palid⁹ calor appet viuido occultato mortal̃.Et ẽt ſincopis
accit vlterius aſcẽdendo petit ⁊ cerebꝝ attingẽdo ſpaſmũ
gignit ⁊ ei⁹ ꝯctõe ĩ ſe:q̃r ꝯhet̃ vl̃r ꝑ⁹.Et deinde ſup occupa
to cerebro ſenſus ⁊ motus auferet̃ ĩ toto.qbus ablatis fm̃
actũ ⁊ hitũ ꝯcludit̃ vera mors.Que accñtia ex retẽtõe ſp/
matis magis ac fortiora ⁊ terrẽda euenire neceſſe ẽ. Res
tñ q̃ꝫto purioꝛ ẽ ⁊ magis nãe ꝯformis maioris ẽ iuuamẽti
q̃ꝫdiu cum nã cõſiſtit.ſ.q̃ nãle ⁊ peioris ꝯuerſiõis atqꝫ ma
licie cũ ĩ ꝯriũ ſue nãe v̄tat̃ magis circa nãe vigorẽ ꝑdẽdo
Et ꝓinde lꝫ ex ſanguie ſpma ſit gñatũ:tñ q̃ꝛ ẽ ex eo ꝑ alte/
rationẽ depuratũ:⁊ coagulationẽ ꝓpinquũ ꝑ nãꝫ ad ꝯſer/
uatõeꝫ ſpẽi ſollicite reſeruat̃ mẽſtruũ ex eo vt ſupfluũ ſeq̃
ſtrat̃ cũ in ꝯriũ ſue nãe vertat̃ deterioris ꝯuerſiõis.q̃ꝛ per
ꝯgelatiõeꝫ vł putrefactõeꝫ malitiã veneni acq̃rat:maxie
ſi ex mala mã fuerit ⁊ peiorꝫ ĩpſſiõis.q̃ꝛ accñtiũ terrẽdoꝝ
q̃ꝫ ſãguis cũ õſierit eẽ ſãguis:qđ clare pꝫ ĩ lacte:qđ cũ ex ſã
guie gñet̃ ſic maioris erit iuuamẽti q̃ꝫ ſãguis cũ in ꝓꝑa nã
exiſtat ꝑꝑ eãdẽ aſſignatã cãꝫ:⁊ cũ ĩ ꝯriũ nãe v̄tat̃ vt ꝯgela
tionem vel corruptionem in ſtomaco fit peioris cõuerſio/
nis q̃ꝫ in naturaꝫ veneni:⁊ maioris impreſſionis atqꝫ mali
tie:q̃ꝫ ſãguis ſi a ſua natura ꝓꝑa ꝑmutet̃: ꝓut ſupꝛa ĩ ſtõ ẽ
mõſtratũ.Quãobꝛẽ arbitramur ſerapionẽ extiaſſe ex ſolo
ſpmate õbere cãri:qđ eq̃dẽ arguit.q̃ꝛ viduatis meſtruatis
ẽt accidit:⁊ cõiugatis ẽt ill̃ retẽtis nõ ꝯtigit:q̃ſi voluerit di
cere ex mẽſtruoꝝ retẽtõe nõ ꝯtigat:q̃ꝫdiu ex ſpmatis retẽ
tiõe:nec ita praua.Quapp ei⁹ euẽt⁹:lꝫ ſit rari⁹:plimũ tñ ac
cidit ĩ ſanguieis ml̃ierib⁹ viripotẽtib⁹:⁊ adoloſcẽtib⁹.⁊ ſp/
mate abũdãtib⁹ libidinoſiſq; coire ꝯſuetis nõ viduatis ⁊
ꝯſeruãtib⁹ caſtitatẽ:⁊ qb⁹ mẽſtrua retinẽt̃ ⁊ autumni tp̃e.
Uexꝝ qñqꝫ accidũt huic egritudini ꝑiodi:ſic ĩ epilia:cũ ap
propiq̃t ꝑiod⁹ accidit õbilitas ꝯſily:⁊ pigritatio cogitatio/
nis õbilitas cruriũ ⁊ citrinitas faciei diſnia: pl̃ſus cordis ⁊
doloꝛ capitis:⁊ qñqꝫ ſitis.Cũ ergo firmat̃:accidit ſubet:vł
ꝑmixtio rõis:õſtructio ſẽſuũ:⁊ õſtructio vocis:⁊ ſpaſm⁹ cũ
rubedie maxillaꝝ: ſincopis ⁊ ſtridoꝛ dẽtiũ. Et cũ appropi
q̃t hora reſolutiõis ei⁹ ĩcipit apꝑere:hũiditas q̃dã ad ꝑteꝫ
receptricis:q̃ ad tactũ ſentit̃ ⁊ redeũt ſẽſus eaꝝ ⁊ ĩtellect⁹
⁊ q̃ ex mr̃ice ſit cũ retẽtõis mẽſtrui vel ſpmatis ſignũ ẽ q̃
ẽ q̃ꝛ accidit ĩ ml̃iere ſana boni regimĩs vidua cui⁹ mẽſtrua
nõ defecerũt.¶ Sꝫ ſigna ei⁹ q̃ ẽ ex mẽſtruis:ſt q̃ꝛ ꝑceſſit
retẽtio mẽſtruoꝝ quã indicat qñq; gñatio lactis ĩ mamil
lis.hypo.dicẽte in affo.Si ml̃ier q̃ neq; ꝑgnãs ẽ neq; gña/
uit lac hꝫ:ei⁹ mẽſtrua defecerũt. grauedo corꝑis õbilitas
ſenſuũ ⁊ alia ſigna retẽtõis ipſoꝝ q̃ capl̃o ſuo dicent̃.Et ſt
diuerſa fm̃ diuerſitatẽ hũoris vicentis in ſanguie quẽ co

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0394-2
DFG

loꝛ męſtruoꝝ oñdit. Cũ ergo in eo vincit melĩcus accidit
melĩa ꝛ mania: ꝛ loq̃tur ſola pp cerebꝛi ꝯmunitatẽ ꝛ ſinco
pis foꝛtis pp cõmunitatẽ coꝛdis: ꝛ deſtructio anhelit⁹ pp
cõmunitatẽ amboꝝ ꝛ diafragmatꝫ. ꝙ ſi flĩcus erit grauio
ra ꝛ q̃rioꝛa hẽbit accñа. ꝛ ſi colĩcus erit acut⁹ ꝛ icolumis.
Signa ei⁹ q̃ eſt ex ſpmate ſũt. nã incipit cũ nocumẽto ãhe
litus ꝛ magnificaꝫ timoꝛ cũ obmiſſiõe coit⁹ ꝯſueti męſtru
is nõ retẽtis. Et accit mltotiẽs ꝙ cũ obſtitrix tãgit mr̃icez
ei⁹ ſpaſmoſãꝫ accit cõmotio ꝛ deſideriũ q̃liter deſcẽdit ſp
ma groſſuꝫ ꝛ ſanaꝫ ꝛ qñq; deſcẽdit illud ex ꝯtactu ſui ipi⁹
ꝛ inuenit regez. Sꝫ nũq̃d accidat ſuatib⁹ caſtitatẽ ꝑuoca
tio ſĩc mulierib⁹: q̃ cũ nõ accidat videꝫ arguere ꝙ nõ ex ſp
mate ſꝫ ex męſtruis accidat ſolũ cui⁹ ꝯriũ Rapio dixit: cui
G. rñdit ꝙ viris ĩ retẽtiõe ſpmatis lõga accña accidũt mlꝫ
ta praua q̃ ſupꝛa caplõ ð illo quẽ dimiſſio coit⁹ ledit hũiſti.
nõ tñ ſic frequẽter: eo ꝙ laboꝛib⁹ ꝛſoluiꝫ ꝛ nõ ꝯgregaꝫ. nec
tã grauia moleſta ꝛ terrẽda cũ nõ ſit ex tã mala mã ĩ viris
ſĩc in femĩs. Eſt. n. in eis ex generatiõe ſanguis męſtrui qð
melĩcuꝫ ẽ ꝛ ſupfluuꝫ niſi ſit coartatũ ĩ ꝓfundo coꝛpis ſĩc ĩ
muliere. qꝛ ſilr̃ pñcipalia nõ leduntꝫ qð declarat qꝛ mulier
in tali paſſiõe moꝛtẽ frequẽter incurrit maſcul⁹ võ nũq̃.
Et q̃liter nõ accit in ꝑgnãtib⁹ ĩ q̃bus męſtrua diutius reti
nentꝫ. qð q̃dez ꝯtingit q̃a lꝫ in eis męſtrua retinẽꝫ: ex purio
ri tñ coꝛ pte ẽbꝛio nutriꝫ ꝛ augmẽtaꝫ: ꝛ qð ſupfluit ex eis
vtiliter a nã ꝑtui reſuaꝫ: ſicq; ne putrefiat vel ꝯgeleꝫ ſtu
dioſe interclusũ ĩ ſecũdine paniclo ꝯſuaꝫ ex quo matrix ñ
patiꝫ ꝛ fum⁹ ẽt ad ſupioꝛa pñcipalia nõ aſcẽdit niſi grãdis
ſit cã ꝛ illõ ẽ raro. Preterea cur ſenſu ablato ſpaſm⁹ ꝯtigit
cũ dicat phs: ꝙ ſenſus ꝛ mot⁹ adeq̃ntꝫ: ꝛ ẽt G. ꝙ ſentiꝫ pati
ẽ. ꝙ ẽ min⁹. moueri võ agere qð ẽ mai⁹. Jtẽ ſi ablato ſẽſu
motus rẽanere ñ debeat qũo ablato ſenſu ꝛ motu ſpaſm⁹
q̃ eſt mot⁹ ſequeꝫ. Quib⁹ dicẽdũ ꝙ ſpaſm⁹ motus eſt ꝑter
nãꝫ. nec ẽt incõueniẽs ẽ ſenſũ ꝛ motũ nãlez amitti actualr̃
ꝛ cũ q̃ ꝑter nãꝫ eſt accidere dicẽte hyp. in affo. Si iebꝛiat⁹
q̃s fuerit ꝛ repẽte ſine voce fiat ſpaſmo innato moꝛiꝫ. Et
ſi q̃dez ſenſu ꝛ motu nãli obmiſſo ꝑter nãm mot⁹ q̃ ſpaſm⁹
ẽ accidat mlto magis ſolo ſẽſu ablato tal' mot⁹ ꝑter nãꝫ cõ
tigere poterit. Et qð dicit. G. vitatez hꝫ ĩ ſenſu ꝛ motu nãli
vl' vbi ꝑ eundẽ ſũt neruuꝫ. ꝑterea ſi ſimilis ẽ epilĩe ſpaſmo
ꝛ ſincopi appoplexie ꝛ litargie eo ꝙ oĩb⁹ ĩ ſupꝯdictis accñti
bus ꝯuenit in quo a ſingulis differt. Differẽtia vero eſt du
plex inter eaꝫ ꝛ ꝑdc̃as. vna ẽ ſpecialis alia generalis. gene
ralis eſt namq;. qꝛ lꝫ ĩ ea ſint accñtia ꝑdictaꝝ: ſũt tamẽ ĩ ea
nõ ſingularia ꝛ diſtincta ſꝫ oĩa confuſa ꝛ mixta. Specialis
ẽ qꝛ epilĩa ſit abſq; męſtruoꝝ retentõe ꝛ in cocũtibus ma
gis ꝛ os ſpmatis in ea q̃ difficilis ẽ ꝛ ex cerebꝛo: nec narrat
q̃ acta ſꝫ epilẽthica cũ euadit a parraxiſme ſĩc faꝫ ꝑuocata
niſi ꝑuocatio maxia ſit ꝛ imoderata nec ſẽtit aliq̃d eleuari
ſurſũ vſq; ad os ſtõi ꝛ deponi. necnõ ꝛ in alys q̃ dc̃a ſũt ac
cidentib⁹ epilẽſie. Preterea ĩ epilĩa ſenſus ꝛ mot⁹ ĩtegre
ẽ ablat⁹: in hac võ nõ ĩtegre. Preterea iter ĩpam ꝛ litargiã
diſtiguit febꝛis ꝯtinua q̃ litargiã ꝯcomitaꝫ: ꝛ pulſus vndo
ſus plen⁹ ꝛ pñcipiũ doloꝝ ĩ cape in ꝑuocatõe diuerſus. Sꝫ
iter cã ꝛ ſpaſmũ diſtiguiꝫ ſꝫ. G. qð ẽ. qꝛ ſpaſm⁹ ex repletiõe
accidit ꝛ inanitõe paulati. ꝑuocatõ ſubito ꝛ ex repletõe ſo
la. ⸿ Cura hui⁹ paſſionis ẽ tres res. Pꝛima mr̃icis egritu
dinẽ tollit q̃ ipſi⁹ ẽ cã. Scða oꝛdinat regimẽ. Tertia coꝛri
git accñtia q̃ lꝫ tertia ſit ĩ numero pp erroꝛez tñ aliquoꝝ ꝛ
ꝑicula patiẽtis fiet poꝛ in oꝛdine. ꝑma ꝯſiſtit in duob⁹ ſim
pliciter. ſ. in cãe abſciſiõe ꝛ in moꝛbi ſiq̃s fact⁹ ſit curatiõe
Cauſe võ abſciſio ꝯplẽ cũ ꝓuocatõe ſanguis męſtruoꝛũ
vel ſpmatis ꝑter nãꝫ retẽti. ⸿ Jnq̃t. n. Abo. Cũq; ventris
ꝯſtrictio q̃ fluere ſolebat aliquã egritudinẽ poſſidere fece
rit ipſi⁹ euõnis reuerſio ſꝫ plurimũ ipaꝫ medicãtib⁹. dixit
ſꝫ plurimũ vt q̃diu retẽtiõi ꝓpoꝛtionata fuerit. nã ſi ſup
flua põt eẽ moꝛtis cã: ſĩc alibi poſuit cũ dixit. Cũ retẽtio ſo

lutõis ꝯturbat: e⁹ ſolõ facit acgrere trãq̃llitatẽ: ꝛ ẽ moꝛtalꝫ.
hoc aũt ꝑ ei⁹ abũdãtiã ꝛ exceſſus ẽt ſi febꝛis ſit eradicata
ꝓut dixit in alio quodã loco: q̃ võ minoꝛ ſit nõ ilico medi
cabiꝫ. Fiat aũt talis ꝓuocatio cũ his q̃ euacuãdo trahũt
ſanguinẽ a mr̃ice. vt ẽ fl'omia ſaphene: ꝛ ꝑpe q̃ ẽ ſub popli
te: ꝛ in piguib⁹ cũ vẽtoſis ſup loco ſaphene ſcarificatõe pre
cedẽte. vel cũ ſanguiſugis pp occultationẽ vene. deide cũ
purgatõe hũiditatis viſcoſe q̃ opilãdo venas retẽtiõis eſt
cã. Et cũ yerapigra: ꝛ yera colloquitida ꝛ ruſina. Et pillĩs
de tapſia ꝛ fetidis: ꝑparatõe ꝑcedẽte cũ oximelle ſq̃llitico
ꝓpe: ꝛ aq̃ diureticoꝝ caloꝝ ꝛ ꝓpe rubee: tinctoꝝ: nigelle
q̃nq; radicũ: enule ꝛ ſiſiũ: q̃b⁹ ſꝫ oẽm modũ vtẽdũ ex ſim
plicib⁹ ꝛ ꝯpoſitis ĩ via medicie ꝛ cibi. ſcib⁹ ex apitiuis ꝛ diu
reticis vt ẽ fenugrecũ: anetũ: ſemẽ lini: ꝛ ſanſuc⁹ ꝛ abꝛota
nũ. ſiſimbꝛiũ: ſauina: ruta: vrtica: ꝛ alia q̃ ſubtiliãdo ſangui
nẽ reddũt ipm acutũ. Et apiunt ꝛ cũ balneis termaꝝ pro
pꝛys ꝛ collirys ꝛ ꝓuocãtib⁹ menſtrua q̃ ſtati dicenꝫ in ſuo
caplõ. ꝛ ꝓpe ex coꝛdumeni: pipe: ꝛ euſoꝛbio qð ẽ foꝛte faci
ens deſcẽdere męſtrua ſtati ꝛ cũ ſuffumigys ex cipo: ſtoꝛa
ce ligda: ſpica: ꝛ nigella. ꝛ cũ cõmotõe oꝛis mr̃icis ꝛ ꝑtium
ei⁹ appoſitis digitis obſtitricis iunctis cũ aſſungia galline
ꝛ oleo de lilio vel de been: nardino vel anatino. ipſa. n. ꝯfe
rũt ſiue retẽtio ſit męſtruoꝝ ſiue ſpmatis. faciũt. n. declia
re mr̃icẽ ꝑuocatã ad ĩferioꝛa ꝛ redire ad eq̃litatẽ. ꝛ parant
męſtrua ad ꝓuocationẽ. Et cũ exhibitõe ĩ potu caſtoꝛei ꝛ
mirre cũ aq̃ mellis ꝛ ſagenea dyacimino ꝛ ſerapinũ cũ aq̃
ciceꝝ aut faſcoloruꝫ rubeoꝝ: ꝛ caſtoꝛeo. ꝛ nigellã: cũ rub.
tinctoꝝ in oximelle ſq̃llitico puluericata ſũt vltia aut ace
tũ ſq̃lliticũ: ꝛ oximel ei⁹ ꝛ opoponaci. ℈. i. Et almãſoꝛ: cuꝫ
ex eo ſumiꝫ ĩ potu ẽ ĩ eo ſanitas. ꝛ ex his q̃ trahere hñt ſan
guinẽ ad matricẽ: eſt appõ vẽtoſaꝝ ſup renes: deide ſuper
coxas ꝛ iguina: genua ꝛ crura: ꝛ cauiculas pedũ: ꝛ fricatio
ipſoꝝ ꝛ ligatura cũ iſtitis doloꝛoſa ꝑ hoꝛã dimiſſa. Calefa
ctio cũ fomẽtis feruẽtib⁹ ꝛ cũ cliſterib⁹ acutis vnctiõib⁹ ꝛ
ẽplĩs ex rb⁹ rubificãtib⁹ notꝫ q̃ ſãguiez ſbtiliẽt atq; trahãt
ꝛ oĩb⁹ alys ꝓuocãtib⁹ męſtrua q̃ in ſuo loco dicenꝫ. Si võ
retẽtũ fuerit ſpma: tũc oꝫ vt ĩpetu tribuaꝫ ꝛ vſq; ad illã ho
rã vtaꝫ exercitio ꝛ exiccatiuis ſpmatis vt ẽ agn⁹ caſt⁹: ru
ta: calamẽtũ. ſicla: ſciñ almaryꝫ: ꝛ dyaciminũ cũ diureticis
vt ẽ decoctio ð radicib⁹. Et oꝫ vt ĩtromittat obſtitrix ma
nũ iunctã vt ꝑdictũ ẽ vt faciat cõmotionẽ delectabilẽ: ita
ꝙ cũ ꝯmotione accidat doloꝛ. ipſa. n. foꝛtaſſe expellet feti
dũ ꝛ ſaluabiꝫ: ꝛ ſilr̃ cũ ſupponunꝫ res moꝛdicatiue cõmo
tionẽ facientes ſicut ſal gẽma: cũ oleo laurio: ꝛ ſicut cinci.
ꝛ piper. coꝛdumenũ ſunt mirabiles in hoc. Et caue in hac
diſpõne fl'omiaꝫ q̃m ĩfrigidat. imo admiſceas ea que exci
tãt caliditatẽ. ꝛ ſunt mulieres q̃ ĩgenianꝫ coire cũ eis cũ ĩ
ſtro in modũ virge virilis ex q̃ delectanꝫ ꝛ ꝯfert. Moꝛbi
vero curatio ſci ex retẽtione illoꝝ vt ẽ mala ꝯplõ frida. ꝛ
hui⁹ curatio ex dictis ꝛ dicẽdis ẽ manifeſta. ⸿ Scða res
q̃ eſt regimĩs oꝛdinatio ẽ vt abſtineat ab oĩb⁹ multiplicã
tib⁹ ſpma ſĩc ẽ vinũ: lꝫ ſincopis illõ peteret ꝛ carnes ꝛ vtaꝫ
exiccãtib⁹ ſpma que ſupꝛa in cura pollutionis dicta ſunt.
⸿ Tertia res. ſ. coꝛrectio accñtiũ que verẽda ſunt vt ẽ ſin
copis alteratio ſenſus ꝛ mot⁹ atq; anhelit⁹ doloꝛ foꝛtis ex
ſpaſmo ꝛ hui⁹ ꝑmittẽda ẽ. fiat aũt cũ expgefaciẽtib⁹ ꝑmo
puta fumigatõe ex fetidis approximatis narib⁹ ꝛ oꝛi. q̃les
ſꝫ pecie ꝯbuſte. pili: ꝛ pẽne cõbuſte: ꝛ coꝛnu aſſa fetida ca
ſtoꝛeũ: ruta: armel: ꝛ hui⁹ obtalnicha ꝛ vigilãtia ꝛ cõſilĩa:
cũ ligaturis ĩ extremis fricatõib⁹ ꝯpſſiõib⁹ doloꝛoſis: con
tractũ capilloꝝ ꝛ auriũ ꝛ nariũ ꝛ clamoꝛib⁹ ꝛ vocatõib⁹ ꝛ
alys q̃ dc̃a ſꝫ ĩ cura litargie. appoplĩe ꝛ eplĩe ꝛ ſincopis. ꝛ
fac eã ſternutare tenẽdo os ꝛ nares: vt hyp. dixit ĩ affo. Et
applica vẽtoſas anchis ĩguinib⁹ ꝛ coxis: ꝛ fomẽta cũ rubi
ficantib⁹: ꝛ emplã cũ eis ꝛ euſoꝛbio ĩguina: ꝛ ſuppone col
liria ꝑdicta ex acutis ꝛ odoꝛiferis. vt ẽ gallia: foliũ: gariof.

⁊ ciperū: ⁊ lauꝝ. Et cliſteria educētia vētoſitatē ex aniſo:
feniculo: ariſtologia: ſpica: ⁊ ſilib⁹ donec redeat. Et ſi in p̄-
dictis ſenſus ⁊ mot⁹ redeāt nec anhelit⁹: tunc neceſſariū ē vt
fundat̄ oleū ferueñs ſup caput ei⁹. Sit aūt aliq̄d ex aroma
tib⁹ ꝯfortātib⁹ cerebꝝ ⁊ calefaciētib⁹ valde q̄le ē nardinū
de balſamo ⁊ de been. aut cautericetur ſinciput eius ſi nō
ē excuſatio ide. Et q̄n̄q꜆ euadit cum ſ̄loia ⁊ redit. cū ergo
redierit anhelit⁹ tūc curabis ſincopi cū his q̄ cor ⁊ cerebꝝ
cōfortāt: ⁊ ꝯfert ad huiuſmodi ⁊ alia accn̄tia. Et ē ex ſim
plicib⁹ ſ̄apinū: gariof. ⁊ ex ꝯpōitꝭ ꝯfectio noīata ꝯfectio iu
uamēti ⁊ ē mirabil̄. ſagenea: mitridatū: medicamē de mu-
ſco ⁊ tyriaca. ⁊ ſi times ex metridato ⁊ dyamuſco ꝺ cōmo-
tiōe ſp̄matis. ꝯfortatio tn̄ nāe ⁊ cordis ex eis ip̄ellēdo illō
⁊ reſiſtēdo illi ē maioris iuuamēti: ⁊ cū alijs ſupra ī capl̄o
enarratis int⁹ ⁊ extra: ⁊ p oēꝫ modū adminiſtratis. q̄ hn̄t ce-
rebrū cor ⁊ totū corp⁹ ꝯfortare. Deiñ oꝫ redire ad p̄dcā. ex
adminiſtratōe. n. p̄dictoꝝ ceſſāt egritudīes ⁊ alia accn̄tia
leuiora: niſi ſit ſol̄o ꝯtinui vel apa. ¶ Cū ergo accidit illō
oꝫ vt curet̄ cura ſol̄onis ⁊ apatis cū his q̄ ꝯueniūt ei p̄foca-
tiōi q̄lr̄ ē in apate. ℞. piguedis anatis: ⁊ gallic. an̄. ʒ. iij. ce-
re bone: croci: myrre: amōi: maſticis. an̄. ʒ. i. olī balſami: olī
lilij celeſtis. an̄. ʒ. iij. terant̄ ſicca: ⁊ liq̄fiāt hūida ⁊ admini-
ſtrent̄ in peſſario. ¶ Aliō iuuatiuū ⁊ exptū. ℞. ſtoracis. ʒ.
iij. thuris: pipis. an̄. ʒ. i. ʒ. cere albe. ʒ. vij. piguedis anatis ⁊
anſeris. an̄. ʒ. iiij. piguedis gallie. ʒ. iiij. olī balſa. olei lilij al
bi: ⁊ lilij celeſtis: ⁊ olei de ſpica. an̄. ſ̄ꝫ q̄ꝫtitatē neceſſitatis.
¶ Si āt vis vt ſit forti⁹ tūc adde ī eo. ʒ. iij. cordumeni: ⁊ ſe.
vrtice. aur. iij. miſceant̄ ⁊ adminiſtrent̄. ¶ Oleū qō lenit
⁊ calefacit ⁊ ꝯuenit ad dolorē m̄ricis ⁊ p̄focatōꝫ. ℞. belka.
libach: olei maſticis: ⁊ ſpice: olei laurini. an̄. ʒ. v. olei lilij ce
leſtis: ⁊ aneti. an̄. lib. i. ſedenegi: ⁊ bdelij: ⁊ piretri. an̄. ʒ. iiij.
mellilot: caſſief. ⁊ nigelle: ⁊ calamēti cāpeſtris aut fluuia-
lis. an̄. ʒ. i. terant̄ medicīe ſicce ſ̄ic̄ pulu̇is: ⁊ liq̄fac alchech
cū oleis: ⁊ miſceant̄ oīa ⁊ vngat̄ cū eis qō ē ſubvmbilico ⁊
pectīe anche ⁊ pedes. ¶ Jnq̄t fili⁹ ſ̄apiōis. Si euēiet egri
tudo. ſ. hec mulieri q̄ ē p̄gnās: tūc nō oꝫ vt adminiſtret̄ ſ̄loia
aut vētris ſol̄o. imo ꝯtēti ſum⁹ vnctōe cū oleo excepto ex
oleis calefaciētib⁹ ⁊ reſoluētib⁹: ſ̄ic̄ ē oleū ꝺ lilio: ⁊ de been
⁊ q̄ ſ̄t ſ̄ilia. Et aduertēdū ꝙ dixit ſi euenerit: q̄ſi dicat ꝙ
raro accidit pp cāꝫ ſup̄i⁹ aſſignatā. ¶ Jtē iq̄t ⁊ ad vltimū
dico ſ̄monē abſcindentē. q꜆ oꝫ vt curent̄ m̄lieres q̄b⁹ acci
dit hec egritudo ⁊ nō ſūt p̄gnātes ſ̄ꝫ q̄ꝫtitatē ꝯp̄lonis eaꝝ
⁊ hūiditatē corpis eaꝝ: ⁊ ſiccitatē eaꝝ. nā illā ex eis quarū
corp⁹ ē lene albū hūidū: curam⁹ cū medicis debilib⁹: ⁊ ex
illis q̄ ſunt ſ̄ꝫ ꝯriū illi⁹ donec ſit eaꝝ corp⁹ ſiccū neruoſuꝫ:
curant̄ cū medicis fortib⁹. ⁊ ſ̄ꝫ hūc modū curant̄ vetule ⁊
ille q̄ ſentiūt īſ̄lationēꝫ ex vētoſitatib⁹ īſ̄latiuis cū his q̄ re-
ſoluūt vētoſitates. ⁊ illis q̄ ſentiūt grauedinē dāntur ea q̄ ī-
cidunt ⁊ ſ̄btiliāt: ⁊ ille q̄ ſentiūt acuitatē curant̄ cū his ī q̄-
b⁹ ē virt⁹ extictiua. ¶ Suppoſitoriū Abo. educēs ſangui
nē mēſtruū. ℞. ſtoracis liq̄de. ʒ. iij. pipis. thuris. an̄. ʒ. i. adi-
pis anatꝭ. ʒ. iiij. ſe. vrtice. ʒ. iiij. fiat ex eis liciniū ⁊ ſuppōat̄.

¶ Capl̄m. ix. de ſp̄ebus ſol̄onis ꝯtinui m̄ricis ex q̄b⁹ ſunt
vlcera corroſiōes putrefactiōes ragadie ⁊ fiſtule.

Vlcera m̄ricis q̄dā ſunt ſimplicia ⁊ mūda: q̄dā cō-
poſita ⁊ cū putredīe. ⁊ q̄n̄q꜆ ſunt corroſiua: ⁊ q̄n̄q꜆
cū apate: ⁊ q̄n̄q꜆ cū p̄fundatōe: ⁊ q̄n̄q꜆ nō p̄funde
⁊ q̄n̄q꜆ p̄ueniūt ad fiſtulā: ⁊ q̄dā ſūt in collo: ⁊ q̄dā ī ei⁹ con
cauo. Et cā vlceris q̄dā ē iterior ⁊ q̄dā exterior. Jnterior ē
curſus humoꝝ acutoꝝ q̄ ſi paulatī ꝯgregati ſūt ī ea erit p̄-
pria. ſi ſ̄bito ꝯfluāt ex toto aut aliquo mēbro erit ex cōita-
te aut dubellati vlceratū aut plaga vlcerata ⁊ ē ppa. Exte
rior ē caſus vel p̄cuſſio: aut difficilis ptus. aut vuln⁹ inſtri
īcidētis: aut ex medicamīe acuto ſuppoſito: aut groſſicies
virge deuirginātis: ⁊ illud ē nō p̄fundū ſ̄ꝫ in collo ei⁹ tātū
⁊ ſ̄ilia. Et cā putredis ē qō ē q꜆ vlcera ſunt p̄funda q̄ non
euacuant̄ ab hūiditatib⁹ p̄l̄imis egrediētib⁹ ad p̄fundus
ei⁹ in quo retinent̄ ⁊ nō mūdificant̄. Et ex eis ē q̄n̄q꜆ cor-
ruptio embriōis m̄l̄tiplicātis putredinē. Corroſionis ipſo-
rū cā ē acuitas ⁊ aduſtio hūiditatis ⁊ putredis coꝝ: q̄r cor
rodit velut cācer. Et cā fiſtulatōis ipſoꝝ ē p̄longatio ipſo-
rū. q꜆ cū p̄prijs nō recipiūt curā: q̄re p̄longant̄ cū putredi
ne multa corroſiua: ⁊ cōcauant̄. ¶ Signa vlcerū ei⁹ ſunt
exitus puris ⁊ ſanici ⁊ ſanguinis corrupti ⁊ virulēti: ⁊ hūo-
ris diuerſi coloris ⁊ odoris: ⁊ nocumētū ex medicis mol-
lificātib⁹: ⁊ iuuamētū ex medicis mūdificātib⁹ ⁊ ſtiptica-
tib⁹. Et ſigna putredis coꝝ ⁊ ſordicici ⁊ tabiditatis ē mul-
titudo hūiditatū corruptaꝝ fetentiū: ⁊ ē ſ̄ic̄ aq̄ carnis. Et
ſi ē cū corroſione illud qō egredit̄ ē nigrū cū ardore vehe
mēti ⁊ pulſatōe ⁊ circūfluitōe piloꝝ vt dixit hypo. in affo.
Et d̄ria inter corroſionē ⁊ cancrū ē q̄m̄ cū corroſione nō ē
grauitas nec duricies ⁊ ſeq̄tur cā q̄es in horis quibuſdā ⁊
p̄p̄e poſt exitū ei⁹ qō egredit̄: ⁊ nō eſt plurima longitudo
t̄pis ī curatiōe. Cācer v̄o ē aſſidui doloris ſi in p̄ncipio ſit.
Si v̄o ī p̄ceſſu erit cūꝫ p̄ūctiōe ſenſus: ⁊ ē cū pulſatiōe lōgi
ſpacij. Et ſignū mūdificatiōis vlceꝝ p̄cedēs ſanitatē ē. q꜆
qō egredit̄ ē ad groſſitiē ⁊ albedinē ꝺcliue: ⁊ leue abſq꜆ do
lore vehemēti: fetore: ſeu ardore: ſeu mordicatiōe. Et q̄ nō
ſ̄t p̄fūda ſ̄t ſenſui māifeſta: p̄fūda v̄o ſ̄t occulta ſenſui. Et
cū ſūt cū apate: ſūt cū p̄dictis ſignis apatis. ex q̄b⁹ ē orripi-
latio ⁊ fe. Cūq꜆ vlcera m̄ricis ſ̄ūa putredīe ⁊ corroſiōe ptrā
ſeūt carnē: ⁊ p̄fundāt̄: ita ꝙ vicinū aliq̄ō ex mēbris vlcere
tur ⁊ corrūpat̄ os pectinis ⁊ collū m̄ricis putrefiet adeo ꝙ
q̄n̄ꝫ p̄ueīat ad radēdū pilos pectinis: ⁊ īcedit vſq꜆ ad ptes
ani: ⁊ lacertoꝝ ei⁹. Quedā ſūt ī pte manifeſta: ⁊ q̄dā in pte
occulta: ⁊ declinātia ad latera ei⁹ ſūt ſ̄ilia. Et ragadie m̄ri-
cis ſ̄t ex gn̄e ſol̄onis: ad modū ſciſſuraꝝ ꝯtigētiū ex ſiccita
te ei⁹. q̄r nō pōt recip̄e debitā apō coitū: vl̄ apud ptū extē-
ſionē abſq꜆ ſciſſura. Et q̄n̄ꝫ cā abſcidēs ē magnitudo apa
tis: q̄r apparēt ragadie: ⁊ p̄p̄e cū tāgit̄: ⁊ q̄n̄ꝫ igroſſāt̄ valde
⁊ q̄n̄ꝫ fiūt ſ̄ic̄ veruce: ⁊ igroſſat̄ loc⁹. Et ſi ſūt ī collo ei⁹: aut
ī cōcauo ei⁹ it⁹ ſenſus cū obſtitricis digitis cognoſcet̄. Et ſi
gn̄a fiſtulaꝝ ſūt āticeſſio vlceꝝ q̄ nō ſanāt̄ cū curatōib⁹ p̄-
prijs. ⁊ p̄lōgat̄ ſpaciū coꝝ cū putredīe m̄l̄ta: ⁊ curſu viris ⁊
doloris attrahētia. deīde dolores illi fiunt ſicut dolores
cācri. ⁊ cognoſcit̄ loc⁹ ei⁹: vbi p̄ueīt̄ cūꝫ eo. ⁊ ſcit̄ ſtatus ei⁹
an ſit cū carne adhuc: aut ptrāſeat vſq꜆ ad os p id qō ſentit
extremitas radij de lenitate ⁊ mollitie: aſpitate ⁊ duricie.
Et ragadiaꝝ ſigna ſūt dolor apud coitū ⁊ exit⁹ v̄ge ſangui
nolēte. ⁊ poſ̄e ē vt p̄ueniat̄ ad ꝯſiderationē ipaꝝ per pōnē
ſpeculi ſub muliere: ⁊ aptōe vulue ſup ip̄m. Cura vlcerū
ſimpliciū ⁊ puroꝝ ē: ꝯſolidatio tn̄ difficil̄. Jnq̄t. H. Jnciſio
vulue difficulter ꝯſolidat̄: ipoꝝ v̄o ꝯpoſitoꝝ cū putredine
ſordicie: ⁊ ſi cū corroſiōe fuerit: vl̄ apate: mūdificatio: ꝯſo-
lidatio: accn̄tiū correctio: ⁊ ꝯueniēs regimē. Mūdificatio
nē ꝯplēt aq̄ mell̄ vl̄ paſſulaꝝ iiectio cū iſtro: vl̄ aq̄ ꝺcoctio
cū yereos. ⁊ ordeo. vl̄ cū aliquo ex mūdificātib⁹ vnguētis
habētib⁹ mūdificare ſordiciē ⁊ putredinē: l̄ hn̄tib⁹ mūdifi
care corroſionē: ⁊ rectificare ipaꝫ. aut cū ſanatiuis apatū
dicturi ſum⁹. Cū ergo mūdificata fuerit vlcera curent̄ cū
ꝯſolidatiuis: ex q̄b⁹ ſūt vnguēta puluēres. ⁊ ſ̄ilia. Et ex vn
guētis q̄dam ſunt q̄ ꝯferūt in p̄ncipio rei cū nondū naſcit̄
caro. ℞. litargiri: ceruſe: ſarcocolle. ana partes eq̄les. fiat
ex eis cerotuꝫ cū oleo ro. Et ſi fuerit in ill̄ ſordes miſceat̄
cum eis paꝝ mellis. Cū autēꝫ caro īcipit naſci extimatio-
ne debita curet̄ cū hoc vnguento. ℞. tucie ablute: partes
ij. climie: argēti: ceruſe: ſarcocolle: oīm. an̄. ptē. i. fiat ex eis
cerotū cū oleo roſ̄. ⁊ cera ⁊ miſtret̄ cū tēta: aut ex eis fiat
puluis. Et ſi q̄dē ſit p̄funda ⁊ ī collo ei⁹: ſ̄ic̄ ī deuirginata a
groſſicie virilis mēbri: oꝫ vt fortes dolores q̄ adſūt mitigē
tur ſedēdo ī vio ꝺcoctiōis ſtipticoꝝ: ⁊ adminiſtret̄ cerota le
niētia ꝯſolidationē p̄hibētia. alienet̄ ꝯcubit⁹. deiñ redeāt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0396-4
DFG

ad ip̄m paulatim: ⁊ in tp̄e medio regat̃ cū cerotis p̄dcis ⁊
admiſceat̃ cū eis terra ſigillata ⁊ ſilia. Correctio accñtiū
eſt vt ſi q̄dē ardor adſit vlcera curent̃ cū his que ardorē
mitigāt ⁊ calorē ſi mitigātia ſint. ſīc mucilago pſily: ſemē
citoniorum: ⁊ aq̄ intubarum: ⁊ ſeueſten: ⁊ aq̄ ordei. Si vero ꝯſo⸗
lidantia ſint ſīc ſucc⁹ ſolatri: arnogloſſe: oleū roſ. albarum: al
bumē oui: lac: ſucc⁹ portulace. dragag. ⁊ dem⁹ ad bibendū
catarticū de iuiub. ſemē papa. ⁊ mirte: ⁊ dolores fortes mi
tigent̃ ſeſſionib⁹ in aq̄s ⁊ vinis ex ſtipticis ⁊ anodinis: vt ē
fenugrecū: balauſtia: lētes ⁊ ſilia. ¶ Regimē ꝯuēiēs ē vt
tp̄e mūdificatōis vtat̃ ptiſana ordeacea: aq̄ cicerum: hedorum
gallinarum: ⁊ lacte aquoſo. Tp̄e aūt ꝯſolidatōis gn̄antib⁹ ſā⸗
guinē groſſum ⁊ viſcoſum vt ſūt extrema aialiū: miliū: riſum:
panicū: ⁊ ſumat lac ⁊ ſilia groſſa ⁊ ſtiptica oīa. Illa occul
ta fiſtula q̄ ex eis ē in occulto ⁊ ꝓfundo nō curat̃ ⁊ ꝑp̄e ſi
venit̃ ad veſicā: reliq̄ v̓o ab ea curant̃ ēt ſi difficiles ſit̃ ⁊ ꝑ
uenerūt ad abradēdū pilos ⁊ ꝑforauerit os foramīe puo.
Et q̄dē cura duplex ē: vera: ⁊ poſſibilis. Uera cura ꝑ abſci⸗
ſionē ⁊ ꝑforationē fit q̄ ꝑiculoſa ē ꝑꝑ neruoſitatē mēbri. ti
met̃. n. ex eo ſpaſm⁹ ꝑmixtio rōis ⁊ ꝑmixtio vocis ⁊ mors.
q̃r nō ē poſſibilis niſi i ea q̄ ē in māifeſto ⁊ cui⁹ carnē mor⸗
tuā oꝫ icidere. Cura vero poſſibilis ē vt mūdificet̃ corp⁹ ⁊
m̄rix exiccet̃ ⁊ ꝯfortet̃. ¶ Ingt. n. hyp. in affo. Si matrix
in vertebro poſita fecerit ſaniē: neċe ē cōmotū fieri ⁊ hoc
q̄z v̓a cura ē ipoſſibilis iuxta mandatū ei⁹ in alio affo. Qui
buſcūq̄z cācri abſcōditi fiūt: ⁊ ex eis q̄ ꝯferūt valde ē cau⸗
da eq̄na ſꝫ oēꝫ modū admiſtrata. Ragadiarum v̓o matri⸗
cis cura itriſecarum ē due res. mitigatio accñtiū: ⁊ ꝯſolidatō
ragadiarum. Cōplet̃ aūt cū ſuppoſitorijs penetrātib⁹ ⁊ diſtil
lationib⁹: iniectis ex aq̄s ſtipticis ꝑmixtis cū vnguētis re⸗
ctificātib⁹: ſicut vnguentū factū ex climia ⁊ plūbo aduſto
⁊ vnguētis ragadiarum ani. Accñtium correctio ē: vt ſi cū cu⸗
ratōe ſentiat mordicationē miſceat̃ cū eis ſicut vnguentū
baſilicon cū adipib⁹ ⁊ ꝑp̄e ſi indiget maturatione. Et ſi q̄⸗
dē cū ragadijs fuerit groſſicies quaꝫ ſignificat longitudo
ſpatij ⁊ puitas receptōis curōnis. adminiſtret̃ vnguentum
de cartis cū oleo roſ. Si v̓o nō tollerat illō ponat̃ cum eo
oleū de lilio: ⁊ glutē balimbar. Cū aūt hec geuerint curan
tur cura ragadiarum purarum: ⁊ ꝑp̄e q̄n vlcerant̃. ⁊ q̄nq̄z indi⸗
gent eis q̄ ſt̃ ſīc cortex eris aut dragantum optīe tritū aut
galle: aut illis aggregatis. Intriſec⁹ vero ſufficiēs puluis
tucie cū vitellis ouorum ⁊ vnguentū de ceruſa ⁊ ſilia. ¶ Cli
ſtere. ℞. aq̄ paſſularum. lib. i. diſſoluant̃ in ea mellis ro. ℥. ij.
⁊ colet̃: ⁊ adde olī amigdalarum amararum. ℥. i. Yſaac ingt. Si
vene ſint vt corroſe. dem⁹ ſanguinē draconis: mirtā: thus
bolū: ariſtologiā: de q̄b⁹ oīb⁹ fiat cliſtere: vel cū licinio ap⸗
ponant̃ pluericata iīcta in aq̄ arnogloſſe vel accacie. Li⸗
ciniū valēs ad pruritū vulue ⁊ priapiſmū mulieris ⁊ pur⸗
gat putredinē corroſionē ⁊ ſaniē. ℞. crocū: cāphorā: litar⸗
girū: bacarū lauri: albumen ouorum: oleū roſ. fiat naſtale vl̓
cliſtere. Et ſanguis dra. cū ſucco plātagīs iiect⁹ valꝫ. Dya⸗
ſcorides dixit faria fenugreci: cū ſanguine anſeris valꝫ ad
duritiē m̄ricis. Ualꝫ ēt lac ficuū: cū vitell̓ ouorum fiat inde
naſtale.

¶ Caplꝫ. x. de apatib⁹ m̄ricis humoralib⁹.

Poſtemata accidūt m̄rici ſīc in p̄dicis mēbris ſꝫ
duplicē modū ꝑ viaꝫ ꝯgōnis ⁊ fluxionis. Et cā ca⸗
rū ſufficiēs ē duplex. iterior ⁊ ē ipſi⁹ diſpō vt debi
litas ⁊ retētio mēſtruorum in ipſa m̄aꝫ aggregās. Et exterior
duplex iprimens vt caſus ꝑcuſſio ⁊ multitudo coit⁹ ⁊ ꝑp̄e
h̄ntis virgā groſſam: aut diruptio facta ab obſtitrice cū re
cipit fetū: aut inciſio cū inſtr̄o ꝓuocans reuma ⁊ faciens
ip̄m in regiones ei⁹ itermedias ⁊ vacuas ſbintrare. Et co⸗
adiuuās eſt frītas aeris ꝓhibēs reſolui m̄aꝫ. Cā vero ma⸗
terialis ē ex q̄ ē antecedēs repl̓o vl̓is toti⁹ vt hūores. iiij.
vētoſitas aquoſitas viſcoſitas penes quos ſpecificantur ⁊
ab inuicē diffnt curatōe: ⁊ ꝑiculis ipſius matricis. mā ꝑp̄a
eſt ex ſanguine mēſtruo non ex ſꝑmate lꝫ ad illā imittat̃ ⁊
aggreget̃ in vaſis ſeminarijs eius: ſꝫ i ꝯcauū mittit̃. aggre
gatū quoq̄z in vaſis ipſius ꝓprijs nō i corpus ſui a penetrat:
ſed in cōcauo continet̃: ſanguine vero menſtruo in venis
ei⁹ exiſtente diffuſo ex quib⁹ poſſibile ē ſubītrare reſidās
vacuas regiōes ipſi⁹ vt faciat apa. Cā vero m̄alis ſub. ecti
ua eſt ipſa matrix ſuſcipiens ſ̄m aliquā ſui partiū. q̄nq̄z. n.
fiunt in ore ei⁹: q̄nq̄z i concauitate: q̄nq̄z i altero laterum an⸗
te ⁊ retro: ⁊ deterius eſt ꝙ ꝑ plures ei⁹ occupat̃ ptes. Cā fi
nalis eſt vt m̄a expellat̃. ⁊ ſi nō extra ſaltē ad ipſaꝫ deriue
tur: ⁊ deīde extra ducat̃ ꝓut poſſibile ē. q̄re q̄nq̄z reſoluit̃
q̄nq̄z ſaniat̃ ⁊ dubellat̃: ⁊ q̄nq̄z ꝯuertit̃ ꝑ reſolōnē ptis ſbti
lis ad duritiē. Et cū adurit̃ ad cācrū. ⁊ q̄nq̄z ad fiſtulam ⁊
q̄nq̄z iterficit. ¶ Signa q̄dā ſūt coīa oī ſpēi: q̄dā cuilꝫ ꝓp̄a
Ex coīb⁹ q̄dā ſumunt̃ a nā mēbri. ſ. m̄ricis patientis: q̄dā
ab alijs mēbris cōicātib⁹ ipſi. Ex nā mēbri vt ē dolor gra⸗
uedo in vtero: groſſicies ⁊ coartatio: ita vt non ſit exitus
vētoſitatis ⁊ īflatio pectinis ⁊ almirach. Que v̓o ab alijs
ꝑ cōitatē ſumunt̃ ſunt vt dolor ſtōi: ſubuerſio: nauſea: ſin⸗
gultus: ⁊ defectio operationū ei⁹ dolor capitis ⁊ ceruicis ꝑꝑ
cerebri cōitatē ⁊ ꝑp̄e in ſincipite radicib⁹ oclorum: ⁊ colli ei⁹
extēſio i dorſo toto corpe. ⁊ vſq̄z ad extrēa: mollificatō cru
riū ⁊ manuū: d̄bilitas pl̓ſus ⁊ ſilia totū corp⁹ vexātia. Pro
pa v̓o aiali cuilꝫ ſpēi ſūt. nā cū apa fuerit calidū dolor erit
acut⁹ cū pulſatōe horripilatio. ⁊ febris iflāmata. ⁊ ſiccitas
⁊ ligue nigredo. Cū v̓o ē frīꝫ ſigna erūt ꝯria. ⁊ ſi q̄ō ſit aquo
ſum vel vētoſum alia hꝫ ꝓp̄a ſigna. q̄ īfra dicent̃ caplo d̄ cur
ſu ⁊ molla. Et ſi q̄dē apa ſit i aliq̄ ſui pte dolor idicat ptes
illi⁹. nā ſi ē i pte poſtrema dolor erit i dorſo. ⁊ retinet̃ ſter⸗
cus ꝑꝑ coartationē iteſtini rci. Et ſi i pte añriori: dolor erit
i illis: ⁊ ſeq̄t̃ diſtillatio vrine: vel difficultas: q̄n veſica vel
collū ei⁹ coartat̃ ex apate. q̄n apoſtemant̃ latera matricis
extēdūt̃ ⁊ dolēt iguina: ⁊ grauat̃ coſſe: ⁊ dolet v̓tebrū ptis
apatis lateris: ſꝫ cū apat̃ ꝯcauitas dolor ē i vmbilico: ⁊ q̄n
apat̃ os ei⁹: tūc ptes añriores dolēt: ⁊ ille q̄ ſūt ſtricte: ⁊ q̄n
tāgit̃ cū digitis obſtitricis iuenit̃ durum ⁊ clauſū. Cūq̄z mio
rant̃ accñtia: ⁊ dolor delet̃: reſoluet apa. Cū aūt tūor rema
net dur⁹: ⁊ grauedo tunc cōuertit̃ i duriciē ſine dolore: ⁊ ſi
ē magnū ꝯphēdit̃ tactu. Cū v̓o augeat̃ fe. ⁊ dolor ſignificat
ꝯuerſionē i ſaniē: ⁊ cū mioꝛat̃: dubellat̃. Cū v̓o accña forti
ficāt̃ p̄dcā: ⁊ accidit ſudor frid⁹. ablatio vocis. ſincopis. ⁊ i⸗
flatio almirach ſignificāt augmētū apatis. ⁊ iterficit: ⁊ cū
euadit: ꝓlōgat̃: ⁊ cū rodere icipit i cācrum ꝯuertit̃: ⁊ ꝑp̄e cū
apa durum nō ē eq̄lis figure: a quo ꝓcedūt ſīc varices ⁊ ma
li coloris d̄cliuis ad rubedinē ſſucitati cōmixtus: ⁊ plūbei
tatē ſi ſubiacet ſenſui. ꝙ ſi nō. ſignificat ipaꝫ grauitas ⁊ ſeſ
ſio placida. ⁊ dolor: ⁊ cōicāt pectē: renes dorſum: ⁊ iguina.
Et cū vlcerat̃ currit hūiditas acuta virulēta: d̄cliuis ad vi
riditatē: ⁊ q̄nq̄z ſanguis pur⁹ ꝑꝑ corroſionē vene. ¶ Cura
apatum m̄ricis ē tres res. euo: accñtiū mitigatio: ⁊ regīs recti
ficatio. Euo duplex ē: vl̓is ⁊ ꝑticularis: vl̓is ē toti⁹ corꝑis
vel mēbri mittētis. q̄z ſit repletum. Cōplet̃ āt cū p̄miſſione
flōie d̄ baſilica vt fluēs m̄a ꝑ antipiſtaſiꝫ educat̃. deīde cū
ꝯſecutōe flōie d̄ vena ſaphena. vſq̄z ad d̄fectionē: ſīc iuſſit
hyp. vt q̄ fluxa ē expellat̃: ⁊ ꝓuocatio mēſtruorum maxie ſi
p̄ceſſit eorum retētio ē cōueniēs: ⁊ fortaſſis eā totalr̄ reſoluit
vl̓ q̄z ſit cacochimū. Cōplet̃ aūt cū farmacia vomitia ap
ꝓꝑatū hūorē educēte: ac p̄miſſiōe d̄biti digeſtiui q̄d ē no
tū: l̓ ſeceſſiua: ſīc ex lēib⁹ q̄ ñ igerāt m̄aꝫ: diſſoluāt ⁊ ꝓuocēt
ad curſū ſuꝑ apatū locū queādmōꝫ ſuꝑ i cura ſtōi dixim⁹.
Euo āt ꝑticl̓arꝫ ꝯſiſtit i ꝑticularib⁹ opatōib⁹ exercēdis cir⸗
ca apatū locū q̄s diuerſitas tp̄uꝫ morbi variat ⁊ diſponit:
atq̄z diſtiguit. Si ergo apa ſit calꝫ i p̄ncipio ei⁹ opaberis
cū adminiſtratōe repercutiētiū m̄aꝫ: q̄lia ſūt ex ſimplicibus
roſ. lētes excorticate: cortices granatorum: balauſtiarum: cime
vitis: arnogloſſe: ſolatrū: endiuia: ⁊ v̓ga paſtoris: ſucc⁹ por⸗

tulace ꝛ pſiliū qḋ extinguit īflatiōez: ſempuiua: raſura cu
curbite. farina ordei. ꝛ ſilia. ſit aūt eoꝝ miſtratio cū ſeſſiōe
ī aqs dulcib⁹ ḋcoctōis ipaꝝ. ꝛ embrocatis: ꝛ epithiatis: em
plr̄atis: cliſteriçatis: iunctis: ꝛ ſuppoſitis. Et emplz̄ ḋ papa
uere diſſolutū ī ḋcoctiōe cū oleo onfancino vel roſ. aut de
pomis ī hac hora ꝯueniēs ē. Cū vō ꝑuenit ad augmētū ad
miſcebis ꝑdcis q̄ mollificāt ꝛ rſoluūt: ſic̄ fenugrecū: altea:
mellilotū: camomillā: anetū: crocū: maluā: puluerē molē
dini: ꝛ ſilia: ꝛ ī ſtatu augebis q̄ reſoluūt. ī ḋclinatiōe vō mi
niſtrent̄ q̄ reſoluūt tm̄: vt ē aq̄ ſiſimbri: ſanſuci: laur⁹: polli
podiū: ꝛ ſilia. ꝛ laudanū ſuppoſitū reſoluit ipm: ꝛ ꝓprie ea
q̄ ꝯueniūt apatib⁹ frīs: ſic̄ armoniacū: bdeliū: ſtoraꝝ: galba
nū: ꝛ cera: ꝛ medule oēs: ꝛ piguedies oēs: ꝛ olea q̄ reſoluūt
ꝛ ꝓp̄e oleū ḋ enula. Or ſi apa nō reſoluat̄ ꝛ ꝑueniat ad ag
gregatiōez ſanici miſtrabis maturātia q̄ dcā ſūt: gb⁹ admi
ſcebis q̄ ſūt fortioris caliditatis q̄z ipa. Cū ergo ꝓlōgabit̄ ma
turatio ſanici cōfert in velocitate maturatōis ei⁹. emplm
ḋ fenugreco: farina ordei ḋcocta cū aq̄ ficuūz mixto cū eo
aliquo ḋ fimo colūbio: ꝛ fermto ad apiēdū ipz: vel emplz̄
ḋ iſopo: adipe anatꝫ: ꝛ anſeris: ꝛ vacce: ꝛ medule cerui. ꝛ bu
tiro ꝛ ſilib⁹. ꝛ ex eis pēſariū fcm̄ ꝯtinuo admiſtret̄. Cū aūt
dubellatū fuerit ꝓpīquū ori mr̄icis. poſſis erit ſectio ſm̄ ḋ
bitū modū. Si vō ī iteriori pte ei⁹ fuerit opz q̄ eruptio ex
ſpomet fiat: vel ex arte cū naſturcio: vel ſucco ſcabioſe ſū
pto ꝛ iiecto: ī his q̄. ſ. ī epe dcā ſt̄. Cū vō aptū fuerit: tē pli
mū egrediet̄ pus ei⁹ ex vulua: qr̄ oz vt mūdificātia miſtrē
tur: q̄lia ſt̄ q̄ dcā ſūt ī ꝑcedēti caplo iiecta. Et vnguētū baſi
licon min⁹ cū oleo ro. cliſteriçatū ē ꝯuēiēs: ꝛ cū butiro vac
cio recēti: ꝛ ꝓp̄e cū ſpiſſa eſt. ꝛ ſi ſubtilis fuerit fedi odoris
cliſteriçabis cū his in gbus ē ſtipticitas plus. Et q̄nq̄z egre
dit̄ ꝑ veſicā. qr̄ oz vt admiſtres potū lactis ꝛ pſiliū: ꝛ ſemē
melōis cū ſirupo ro. q̄m ꝓhibēt vlceratiōez veſice. Et q̄nz
rūpit ex iteſtinis: qr̄ oz vt cliſteriçet̄ cū aq̄ ordei. balauſtys
ḋcoctis ī ea. ꝛ oleo ro. ꝛ çuccaro ro. deīde curat̄ ꝑfcā mūdi
ficatōe cū medicamīe icarnatiuo iniecto ꝑ cliſtere. ꝛ det̄ ī
potu trociſci ḋ charabe: ꝛ ponat̄ vnguētū icarnatiuū: c⁹ vt⁹
ꝯfūdet̄ ſuꝑ locū ī quo fit dolor. Or ſi fiſtlet̄ curet̄: put ſuꝑ
dcm̄ ē. Si vō frm̄ fuerit ꝛ ſ̄licū curet̄ cū reſolutiuis exiccā
tib⁹ ꝛ ſtipticis q̄ ī cura apatū alioꝝ mēbroꝝ nūerauimus.
Si vō ī duriciē ꝯuertat̄ cū one. mlie nālis ꝛ ſ̄latis groſſi cu
rabit̄. deīde cū localib⁹ ex mollificātib⁹ reſoluētib⁹ notis
ſupra in cura ſplēis ꝛ renū. Et cū in cācꝝ mutat̄: nō curat̄.
vt hy. dixit in aſſo. ꝛ ꝓp̄e ſi fuerit vlceratū: ſꝫ cōmotū opz
tm̄ fieri cū mūdificātib⁹ virulētiā ꝛ putredinē corroſiuā:
ꝛ ſoluētib⁹ colerā nigrā per ꝯueniētia exhibitis iterualla.

Accn̄tiū vero mitigatio ꝯpletur cū his que dolorem ꝛ ar
dorez mitigant. Ex quib⁹ ſunt ſeſſiones in aquis ꝛ iniectio
nes: naſtalia ꝛ embroce ꝛ emplr̄a ex anodinis. quaꝝ quedā
ſt̄ calida quedā frigida. quib⁹ vti oportet ſm̄ neceſſitatē.
Calida ſunt vt fenugrecū: ſemē lini: mellilotū: camomilla
altea: vitellū oui: malua: ꝛ ſilia. Cōpoſitū vt cerotū fcm̄ ex
fece olei dimiſſi in vaſe eris cū cera citrina ꝛ inunctū exte
ri⁹. Frā vero ſunt emplr̄a fcā de papauere cū coriādro: ſola
tro: ꝛ oleo roſ. ꝛ albumīe oui: ꝛ illud qḋ reſoluit̄ ex plūbo
adinuicē fricato aq̄ coriādri ꝛ iteꝝ ḋcoctio lētiū cliſteriça
ta: ꝛ lac aſine: ꝛ ſucc⁹ arnogloſſe. ꝯiuncti vel ſigilati. Et ſi q
dē ex vlcere fluat ſanguis miniſtrent̄ q̄ ſanguinē fluentē
detinēt ꝛ ſimplicia ꝛ ꝯpoſita ſupius noīata. Et ſilr̄ ſi debi
litas ſtōi mitiget̄ cū ꝓprys ꝛ cordis ꝯpaſſio ꝑducēs ad ſin
copim: ſudorē frm: ꝛ vocis ablationē: cū ꝯfortātib⁹ cor ꝛ ce
rebrū regat̄. ℂ Regimē ꝯueniens ē vt regat̄ in domo bo
ni ꝛ tpati aeris redolētis ꝛ qeſcat ꝛ vigilet: ꝛ ꝓhibeatur vel
mīoret̄ cib⁹ in dieb⁹ ſuis ꝑmis vſq̄z ad tres dies: ꝛ ꝓhibea
tur aq̄ penit⁹ in die ꝑmo vtat̄ vōitu ꝛ ſoīone facili. ℂ Cō
fectio ſuppoſitory ad apoſtema durum mr̄icis ꝛ dolorem
frigidum. ℞. thuris: been lily: iudaici: galbani. an̄. ℥. ij. cere
opoponaci armoniaci. an̄. ℥. i. maſticis: caſtorei: ſtoracis li
quide: olei de bdellio. adipis anatis: olei camomille. ana.
℥. iiij. gūmi cūz vino ꝛ melle ꝛ eliquent̄ adipes ꝛ aggregen
tur oīa ꝛ fiat ſuppoſitoriū ꝛ adminiſtret̄. ꝛ ē Raſis. ℂ Cō
fectio decoctionis q̄ ſedat̄ dolor mr̄icis. ℞. ſanſuci: balſa
mite: ſcia abrotani caulis: fenugreci: ſemē lini: camomille:
melliloti. an̄. ptes eq̄les ꝛ ſedeat̄ in eis. ꝛ ē Raſis. ℂ Con
fectio ad dolorē matricis ex apate. ℞. ſeis lini ꝯtriti cū. ℥.
v. vitelli oui elixati: croci. an̄. ℥. ij. opy: ſeis iuſqami. an̄. ℥. i.
ℂ Cōfectio ſuppoſitory ſedātis dolorē matricis. ℞. cere:
camomille: adipis anatis: opy. an̄. eq̄liter: ꝛ ſupponat̄ cū la
na ꝛ ē fily Sapionis. ℂ Cōfectio ſuppoſitory ſedātis dolo
rē matricis cali. ℞. roſ. ſiccaꝝ. ℥. iiij. ſemis lactuce: ꝛ amili
an̄. ℥. i. terant̄ ꝛ cribellent̄ ꝛ ꝯfice cū violis ꝛ oleo roſ. ꝛ la
cte mulieris vel aſinino cū lacte miniſtret̄. Idē ait. ꝛ oz vt
caueas ꝛ obſerues q̄n ꝑueniūt apata ad ſtatū miſtrare ali
quid ex eis q̄ excitāt ꝛ ꝓuocāt ſanguinē mēſtruū. In hora
vero declinationis poſtq̄z ſedant̄ apata paꝝ ſi indiges vt
ꝓuoces ſanguinē menſtruoꝝ: tūc oz vt fiat illud.

ℂ Capitulum. xi. de nocumentis in actione menſtruali. ꝛ
primo de cura fluxus menſtruorum.

Inquit hyp. mēſtruis plurimis euenientib⁹ accīt
egritudies: ꝛ nō eueniētib⁹ a nā accīt egritudies:
ex gbus inuit ſana eē: ſi fuerit moderata vt ſupi⁹
de menſtruis dctū ē. Ut ergo ad moderantiā reducant̄ ſi
īmoderata ſint: cās īmoderātie iueſtigare oz: ꝛ eaꝝ ſigna
q̄. ſ. ſunt occulta: q̄s iueſtigās. G. ait. plurima venire vel nō
venire totaliter vel ī parte cū ſint ꝯria ꝛ ex ꝯrys cāis ſiūt.
plr̄ima. n. ſunt aut ex aptiōe ſupflua oris venaꝝ aut ex pec
cato ſanguinis in q̄li in ſba ꝛ q̄tto. q̄z calus ſbtilis vel mul
tus exiſtat gbus ꝯtētiua deficit ꝛ expulſiua iuuat̄: q̄re plu
rima erunt ꝛ ſupfluent. ꝛ hoc aut ī mr̄ice aut epate vel cor
pore toto cōitate matricis ad illa a gb⁹ ſupfluitates ſangui
neas ꝑ menſtrua ex matrice nā iſtituit expurgari: ſic̄ alibi
dixit. Ecōtrario aūt oppilatiōe matricis aut friditate aut
groſſicie aut paucitate ſanguīs detinent̄ totaliter vl̄ ī pte:
gb⁹ ꝯfortat̄ retentiua ꝛ deficit expulſiua ſꝫ varietatē ipa
rū ī q̄tto. Cā oiūz duplex ē: iterior ꝛ exterior. Interior in
apertōe oris venaꝝ matricis epis ꝛ toti⁹ corpis ſanguis in
ſlāmatōe ꝛ ſubtiliatiōe plurimū ē mala ꝯplr̄o calr̄a ꝛ hūida
dilatās: ꝛ q̄nq̄z ſunt vlcera: corroſiōes: ragadie: fiſſure: fra
ctura venaꝝ matricis ꝛ menſtrualiū: ꝛ ꝓp̄e aptio apatis ꝛ
ſilia q̄re ꝯtētiuā deficere ē nec̄e vbiq̄z. Exterior āt duplex
eſt. aut aliq̄ reꝝ nec̄ariaꝝ: aut nō nec̄aria accn̄talis. nec̄a
riaꝝ qdē vt aer calus ꝛ hūidus mot⁹ fortis iſlāmans ꝛ nō
reſoluens corporis vel matricis venas apiens inflāmans
ꝛ ſubtiliās ſanguinē in matrice ꝛ corpore toto: cib⁹ mult⁹
ꝛ pot⁹ calid⁹ ꝛ humid⁹ generās ſanguinē ſubtiliās ꝛ inflā
mās vel multiplicās in eo humorē acutū: debilitās nām
corpis in digerēdo: cōuertēdo cibū. ꝛ expellēdo ſupfluita
tes ei⁹ via alia ꝯſueta. q̄re mā fluit educenda: inde vigilie
multe. ſomn⁹ diminut⁹: repletio ꝛ ꝓp̄e ex calidis humori
b⁹ ꝛ ſubtilib⁹: inanitio frigidoꝝ ꝛ groſſoꝝ atq̄z inanitionis
ſeu euōnis ſanguinis ꝯſuete retētio: ꝛ ſanguinis fluxus ex
narib⁹ vel emoroydib⁹ ꝑ vomitū: ſeceſſum vel vrinā: ꝓua
tio cōſueti ſudoris: puſtulaꝝ: vlceꝝ: ſcabiei: apatū: ꝛ ſiliū
quoꝝ māz nā ꝯſueuit ꝑ ꝑdictas regiones expellere: nunc
vero retētā conat̄ ad mr̄icē expellere. exinde expellendū
ira: ſollicitudo ꝛ gaudiū īmoderatū aperiēs ora venaꝝ: in
flāmans ꝛ ſubtilians ſanguinē: ac diſponēs ad motum de
epate vel de toto corpore ad matricē ꝛ de matrice ad flu
xū īmoderatū ad extra. Cā vero nō nec̄aria ē balneū cali
dū ꝛ humidū: vt hyp. ait: q̄cunq̄z infridata ſunt calefacere
oz exceptis his gb⁹ ſanguinē emanare futuꝝ eſt: fricatio
mſta: iſlāmās nō reſoluēs. Accn̄talis ē artificialis euōnis
ꝯſuete obmiſſio ꝛ ꝓp̄e ſanguīs: ſudoris: vōit⁹ ꝛ flux⁹ ven

tris:puſtulaꝝ:vlceꝝ:ſcabiei:vel apatū ⁊ ſiſiū ꝓuatio.quo-
rū mãꝫ nã ꝯſueuit ꝑ ꝑdictas regiones expellere:nūc vo re
tentã ad matricē conatᷣ ipellere vt exīde extra ducat.Et ī
oppillatōe venarum ⁊ ſanguis ſupradicte diſpōni ꝯ̄ria tã
īterioꝛ qꝫ exterioꝛ ecōtrario ē ſumēda. Interioꝛ nãqꝫ ē ma
la ꝯplō ſicca vel fra vel cal'a ſupfluēs:ſimplex vl' ꝯmixta
pura ꝯſtrigēs ⁊ attenuãs oꝛa venaꝝ:vel cū mã coartans ⁊
eſt pl'imū qᷣ ꝯfoꝛtatᷣ ꝯtētiua ⁊ expulſiua debilitatᷣ in mrī
ce ēpe ⁊ coꝛpe toto:ſanguis diſpō obtūditᷣ īſpiſſatᷣ atqꝫ mi
nuitᷣ:lꝫ diſpō aliq̄ carnoſa lꝫ raro eueniat vel apoſa. Exte
rioꝛ ex nec̄arijs ē aer frid' ſicc' vel cal's ſupfluēs:qes mul
ta īfrans ⁊ in ſpiſſans.ſ.motꝰ paucꝰ:⁊ cibꝰ paucꝰ:⁊ potꝰ fri-
dus atqꝫ ſiccꝰ:ſanguinē minutū frm atqꝫ ſpiſſuꝫ gñans:ac
groſſuꝫ ⁊ viſcoſuꝫ hūoꝛē in eo m'ltiplicãs:vel ēt ſi ſit mltꝰ:
nã tū coꝛpis mlieris foꝛtis exiſtit in digerēdo pl'imū ꝯuer
tēdo ⁊ ſupfluū expellēdo via occ'lta vel ſenſibili ad modū
viroꝝ vel ꝯuertēdo in groſſiciēꝫ atqꝫ pilos ſic̄ aīalia bꝛuta
in eis ⁊ additamentis coꝝ:queãdmodū ē videre ī mulieri
bꝰ viraginibꝰ q̄ neruoſe ſūt ⁊ lacertoſe: eaꝝ anche ſunt foꝛ
tioꝛes pectoꝛibꝰ ⁊ piloſe ⁊ exercitij multi vel ī graſſis valde
qᷣ ex cibo vel potu nil vel paꝝ ſupfluit expellēdū: ſomnꝰ
multꝰ:vigilie pauce:replō froꝝ ⁊ groſſoꝝ hūoꝛuꝫ inanitio
acutoꝝ pigritia mētis: triſtitia timoꝛ gemitus oīſaria de-
ſes.i.pigritia. Ex non nec̄arijs vero cã erit balneū frꝫ ⁊ ſic-
cū nãle vel artificiale:fricatio multa reſoluēs ⁊ exiccãs to
tius coꝛpis vel mrīcis. Accñtales ſūt ſic̄ euōnes īconſuete
artificiales educētes ex coꝛpe mãꝫ q̄ꝯſueuit ꝑ mēſtrua ex
mrīce excludi. ſupaduentꝰ alicuiꝰ euōnis nō ſolite vel deri
uãtis mãꝫ ad aliã regionē ⁊ exīde educētis. ¶ Signa mē-
ſtruoꝝ fluxꝰ pl'imꝰ lꝫ mulieri ſit notꝰ: ⁊ ſil'r retentio ⁊ ꝓua
tio:medico tñ ſufficiēti ex ſe ⁊ abſqꝫ mulieris relatu dꝫ eē
ꝓprijs ſignis notꝰ. Sūt aūt ſigna ipſoꝝ egritudīes que ex
ipſis accidūt:q̄s ſupra de mēſtruis ⁊ ꝓfocatōe diximꝰ:q̄rū
q̄dã mrīcis ſunt ꝓpe:q̄dã alijs mēbꝛis nãlibꝰ ⁊ vitalibus
⁊ aīatis ꝑ cōitatē accñtes:⁊ alia toti coꝛpi q̄ obmittãtᷣ H.
Idē.n.in quolibꝫ loco repetere non niſi alienatio ē frm.H.
Sūt quoqꝫ ⁊ accñtia alia q̄ ſequūtᷣ:vñ.H.ait. Si mēſtrua
ceſſauerit alia accñtia ſequuntᷣ.ſ.doloꝛ ī femoꝛibꝰ collo ca
pite ⁊ carne ⁊ oculoꝝ vaſis ⁊ acuta febꝛis vrina nigra viri
dis ⁊ eruginoſa ſilis loture carnis ⁊ cardonuꝫ ⁊ nonnullis
nã ꝯſtringitᷣ. Accidūt quoqꝫ pluries accña ante ꝓductio
nē ipſoꝝ cū duriter ꝓuocantᷣ. Qꝫ ſi fluxꝰ vltra modū exti
terit ſequetᷣ coꝛruptio coloꝛis:tumoꝛ pedū ⁊ totiꝰ coꝛpis.ī-
digeſtio ⁊ deſideriū:⁊ oīa accña fluxui cōicantia apparēt.
¶ Signa vero caꝝ que occulta ſunt h ſūt. In fluxu.n.ma
le ꝯplōnis cal'e ⁊ hūide ſimplicis ⁊ cōmixte pure vel īpure
mrīcis hic ſupra habuiſti ⁊ ēpis ⁊ totiꝰ coꝛpis ſupra vbi de
ēpe dictū fuit. ¶ Signa īflationis ſubtilitatis ⁊ multitu-
dinis ſanguinis in matrice ex q̄litate ⁊ q̄ntitate menſtruo
ruꝫ ꝑcipies ⁊ ex ſignis repletōis venaꝝ ⁊ partiū adiacētiū
vt vētris pectinis renū ⁊ coxaꝝ. Et ſil'r in epate ⁊ coꝛpe to
to ex ſignis repletionis vl'is que nota ſunt. ¶ Signa quo-
qꝫ vlceꝝ coꝛroſionis ragadiaꝝ fiſſure fracturaꝝ venaruꝫ
mrīcis aptionis apatuꝫ ⁊ ſimiliū ſupra ſunt dicta. In ꝓua-
tione quoqꝫ ſigna ecōtrario colligēda ex ꝑdictis ſunt nota
caplis: ⁊ eo.vꝫ. de oppilatiōe mrīcis ꝓprie.illuc ergo redi.
¶ Cura plurimi fluxꝰ ⁊ ꝓuatiōis mēſtruoꝝ ex cura fluxꝰ
ſanguinis ex naribꝰ ⁊ emoꝛoydaꝝ gñaliter nota eſt. In ea
enī duplex erat ītentio:generalis ſiue vl'is ⁊ particularis:
vl'is equidē in qnqꝫ ꝯſiſtebat rebꝰ:q̄rū q̄ttuoꝛ ꝑme fluxui
ꝯueniunt huic plurimo q̄s ex illis colliges ⁊ ad ꝓpoſitū re
duces cū īuitabit neceſſitas reſtringēdi ⁊ eſt cū defectio ī-
cipit apparere vt ſup̄ de emoꝛoydibꝰ fuit dictū. In ꝓuatio
ne vº ⁊ retētiōe tres ex eis ſᷣt opportune: ſed tertia dimit-
tatᷣ ⁊ q̄rta:⁊ eaꝝ ꝯ̄ria procuretur:.⁊ eſt vt ſanguis retentꝰ
qui ad matricē ꝯſueuit tranſmitti nō deriuetᷣ: ſꝫ ad ipſam
quoquō ꝯueniēti trahatur niſi aliud ꝯ̄dicat: vie nō ꝯſtipē
tur ſꝫ dilatentᷣ. Tractioneꝫ vero ꝯplent ea q̄ ſupra in cura
ꝓfocationis ex menſtruoꝝ retentiōe ſunt dicta. Dilatatio
nē vero diuretice medicine calide ⁊ ꝯpoſite interiꝰ ⁊ exte-
rius ⁊ ꝑ oēm modū approximate ꝯplent que īfra dicentᷣ ⁊
ſuperius ibidē aliq̄ nota ſunt. Particularis poꝛro intentio
verſatᷣ circa particulares ītentōes in mrīce ꝯ̄ diſpōnes ea
rū cū localibꝰ exercēdas. Eſt aūt triplex eaꝝ diſpō.aut.n.
fluebãt ſupflue:aut diminuebantᷣ in toto aut ī parte: ⁊ ſic
incōplete fluebãt.⁊ addebatᷣ ſupra caplō de mēſtruis. q̄r-
ta.qꝛ cū prauis accñtibꝰ ibi enumeratis retenta vl' fluen-
tia erant. Sic eq̄dē in duobꝰ talis ꝯſiſtit ad pñs ītentio in
rectificanda diſpōne ⁊ accñtiuꝫ coꝛrectione. Et qꝛ nã mē-
bꝛi lꝫ non variet localia remedia h ⁊ ibi: ſꝫ diuerſa diſpoſi
tio tantū oꝫ hic alia remedia que matrici in hac ſua diſpō
ne ſunt ꝓpria lꝫ aliqua ſint eis cōia que ibidē ſunt dicta:
enarrare ſimplicia:deīn ꝯpoſita. ¶ In pl'imis itaqꝫ ⁊ ſup-
fluentibꝰ mēſtruis q̄litercūqꝫ ſiue reſpectu ꝯplōnis ꝓprij
coꝛpoꝛis:etatis:regimīs:⁊ hītudinis:diſpōnis ſiue ꝯſuetu
dinis ſintomatice:ſiue cretice nō reſpectu tpati reſpectu
cuiꝰ huius ſupfluitatē hꝫ. Si cū nō diminuta ⁊ pauca cuꝫ
defectio īcipiens appuerit:aliqua foꝛte ꝑmiſſio flōie baſi
lice:aut nigre:vel purgatio hūoꝛis ſanguinei acuētis ꝑſer-
uat ea ꝑmiſſa:⁊ deriuatiōes ſanguis cū deriuãtibꝰ notis:⁊
ꝓpe cū ſuctijs magnis appoſitis ſub mamillis abſqꝫ igne
cū ſuctiōe foꝛti:vel ēt cū ſufficiēti flãma:vt iuſſit hyp.⁊ ſu-
pra doꝛſuꝫ:⁊ īter anchas ⁊ ſpatulas. Rectificatio quoqꝫ
regiminis:cū his q̄ cū ſtipticitate ſanguinē laudabilē gignūt
qꝛ groſſuꝫ ⁊ frm:⁊ ꝑcedēte alteratōe coꝛpis ēpis ⁊ hūoꝛuꝫ
cū fridis ſtipticãtibꝰ:nec nō coartatōe viaꝝ ⁊ ductuū que
īter renes:pecten.⁊ inguina ſūt:⁊ vltra ꝑ q̄s ad mrīcē ꝺ ſu-
perioꝛibꝰ ſanguis fluit cū fridis ſtipticis ꝯglutinãtibꝰ no-
tis ſupra de ꝯſolatiōe medicinaꝝ cū ſupfluens catarticuꝫ
docuimꝰ retinere in canonibꝰ vl'is ītētiōis ꝯtētis igeniabi
mur aptionē venaꝝ mrīcis:vel fiſſuraꝫ vel fracturã ꝑclu-
dere:⁊ ſupfluētē ſanguinē retinere:⁊ ebibitis pulueribus:
⁊ iniectiōibꝰ encatiſmis:colirijs: ⁊ ēplis: ⁊ vnctiōibꝰ ex eis
q̄ illō hñt efficere a ꝯplōne:vt friditate:ſtipticitate:ꝯgluti
natiōe:cauſticitate:vel a ꝓprietate:quoꝝ q̄dã ſimplicia ⁊
ꝯpoſita ſunt cōia hic ⁊ ibi in ꝑdictis caplis enarrata:⁊ ī cu
ra fluxꝰ vētris. Quedã huic ſpāl'r ſubueniētia ex ſimplici-
bus:aut aptiōe fiſſure ⁊ fracture:quedã cōia ſunt ſicut ar-
nogloſſa:cui nulla herbaꝝ ē par ī cura fluxꝰ ſanguis acuti.
ꝯfert.n.bibita ⁊ iniecta:⁊ crōico ⁊ nō cronico: ⁊ albaſce ſū-
pta ī potu ⁊ cãphoꝛa.lac.n.coctū cuꝫ ferro ignito: ⁊ ſcoꝛia
ferri bibita ⁊ īiecta cū ſirupo mirtio:l' aliquo ſtipticoꝝ: vt
ē ſuccꝰ glãdiū:⁊ coꝛticū granatoꝝ:cauda eq̄na ꝯſolida lin
gua yrcia:⁊ cauda pecoꝛia: ſemē ⁊ radix nenufaris: herba
coriãdri rob.⁊ ſemē eiꝰ ex plãta cicute cum ſuo ſeīe ſuppo-
ſita ⁊ emplata q̄ retinet ⁊ ꝯfert doloꝛibꝰ mrīcis:⁊ anthera
⁊ ſolatrū ſuppoſitū ⁊ empl'atū:⁊ ē expꝫtū virga paſtoꝛis ſu-
mach viola ſaracenica coꝛigiola qualꝫ die ſupta ī q̄ntitate
ʒ.iij. Et ſcoꝛia ferri ſūpta cuꝫ rob: ⁊ ſuppoſita:eſt.n.vltia lꝫ
ꝓhibeat īpregnationē gūmi arabici ⁊ dragagãti. Et ſemē
lini toꝛrefactū cū aqua cal'a ferrea aluminoſa:⁊ ē ꝓpe bibi
ta ⁊ encatiſmata ⁊ aq̄ pluuialis:acetū epithiatū cū panno
ſupra pectinē īguina ⁊ renes retinēt īpm potēter nabach:
grana pini:charab:nabatia comeſta:⁊ ſuppoſita:⁊ mixta:⁊
fructꝰ eiꝰ acetoſitas citri ꝓprietate ſua citonia ꝯarur:⁊ oēs
fructꝰ pōtici. Et ſi q̄dē ꝓpter vlcera mrīcis:apertio venaꝝ
tal' exiſtat:miniſtrabis ea.q̄ mūdificãdo ꝯſolidant vlcera
⁊ ſūt galle aduſte exiccate ī aceto:carte cōbuſte: obſtraca
ꝯbuſta:⁊ coꝛnu cerui aduſtū. ⁊ alie medicie ſil'es illis etiã
ſi ex aptōe apatis fuerint. Si vº ex coꝛroſiōe fcã in matri
ce miſtrabis medicinas alias:ſic̄ thus:⁊ ꝓprie coꝛtex eiꝰ ⁊
aloes ſan.draco.⁊ coꝛrallū: mirrã:charabe ⁊ lutū menite

amillū: ⁊ ceruſaʒ: ⁊ merdaſen.achoꝝ: colcotar: terra ſigil
lata: bolū armenū: ⁊ que illis ſunt ſiles. oportet tamē vt ꝑ
dictoꝝ quolibʒ pulueriçato ſicut alchobol diureticuʒ ali
quod admiſceatur cuius virtute ad ꝓfundū matricis cito
valeat penetrare. Et ſiquidē ſupfluat ꝓpter tenuitatē ſan
guinis curabit̄ cū aquoſitatis euacuatiōe vt cū ꝓcuranti
bus ſudorē ꝓprie ⁊ alijs que infra in cura curſus matricis
dicemus. Ex ꝯpoſitis vero ꝓprijs ſunt trociſci de ſpodio
cū camphora trociſci cū terra ſigillata noſtri. trociſci ꝺ cā
phora. trociſci de charabe. Si ꝓprie ſit ex acuitate ſangui
nis ⁊ coriandrū ⁊ alia ſanguinē ingroſſantia ⁊ obtūdentia
Et ſilr̄ trociſci de ſcoria ferri electuarium eius ⁊ triffera ⁊
filoniū perſicū eſt vltimū ⁊ alia opiata: vt eſt ꝯfectio arte
miſie tyriaca noua dyaolibanū ⁊ ſilia: oportet aūt vt ſumā
tur cū aliquo ſtipticoꝝ vt aqua granoꝝ mirte ⁊ aqua roſ.
Et ſiquidē fluant ſine īterpolatione ꝯtinue adminiſtrent̄
cū reiteratōe. Si vero adſint peryodi in hora peryodi ſtu
deas ad ſedandū: obſeruet̄ tñ hora quietis ne tūc aliquid
ꝓuocatiuū ſumat̄. Sʒ qñ eſt neceſſariū peryodū ꝓuenire
⁊ illud eſt ante tēpus peryodi ꝑdicta euacuentur ⁊ mundi
ficantia miniſtrent̄. Sint tñ leuia que non agitent trahāt
⁊ ꝓuocent: ſed mundificando retineāt ⁊ ꝯfortando mem
bra ſupiora ductibus ⁊ vijs coanguſtationē acquirāt. qua
lia ſūt ex mirobalanis: reubarbaro: fumo terre: ſucco bar
be hircine: roſ. vel agari. ⁊ cuſcute. educūt eniʒ colerā vel
aquoſitatē ex ſanguine cū retentiōe ⁊ mūdificant matri
cem ⁊ ſilibus. Deinde matrix mūdificet̄ ⁊ ꝯfortet̄ vt nō
recipiat ſupfluitates egredientes a neceſſitate. Et illud ēt
cū temperatis. q̄lia ſunt ex mundificantibꝰ: feniculū: ſiſa
mū: ⁊ fenugrecū: ⁊ altee folia: ⁊ radix decocta in aqua: ⁊ bi
bita cū melle ⁊ ſuppoſita. Et ſilr̄ laudanū in forma glādis
amigdale ſuppoſita ⁊ lac ficuū cū vitello oui: ⁊ ſuffumigiū
cū ameos: grana pini: ⁊ ſeſſio in decoctiōe ſua: ⁊ ſuppoſitio
cū gallia ad ꝯfortandū matricē ne recipiat ſupfluitates ⁊
menſtrua: ⁊ ſunt ſumach: naboli: ſpica: rubꝰ: ⁊ flos eiꝰ: pro
prie galle ⁊ decoctio fructꝰ mirte ſcḋm oēm modū admini
ſtrationis exhibita oīa ſupradicta. Cōpoſita alia īfra dicē
tur. In ꝓuatione vero ⁊ retentōe ipſoꝝ oīoda vel in parte
econtrario eſt agendū: premiſſis enī rebꝰ trahentibꝰ ⁊ mo
uentibus ſanguinē ad matricē ⁊ alijs ꝓut vlis ītentio indi
cabit elaborabimꝰ circa apertionē orificioꝝ ipſaꝝ venaꝝ
menſtrualiū ab his que apiunt ſanguineʒ ⁊ acuūt ⁊ reddē
do ſubtilem faciūt poros facile penetrare. Ex quibus ſunt
bibita ⁊ pulueriçata in aqua mellis ſumpta ⁊ ſuppoſita ⁊
iniecta ſeu encatiſmata ſuffumigata ⁊ emplāta ⁊ iuncta ꝓ
ut in cura ſuffocatiōis eſt dictū. Et ſunt ſimplicia ⁊ cōpo
ſita. Et ſimplicia in opilatione ſiquidem coartatoria fue
rit ſunt triplicia: q̄dā leuia vt abſinthiuʒ mercurialis flos
ſquinanti: marubiū: artemiſia: laudanū: amigdale ⁊ nuces
aloes: ⁊ enula ⁊ decoctio eius radix iunipi: yreos: decoctio
faſeoloꝝ rubeoꝝ: ſemen aniſi: feniculi petroſelini: ⁊ ſanſu
ci: ⁊ caſſie lignee: agni caſti: ſeueſtē: ⁊ ē coriandrū putei: vl̄
capillus veneris: batheca: acorus: ſparagus: andacoca: fe
nugrecū: ſiſamū: granū viride: amigdale: radix altee: ⁊ ꝓ
prie vbi fuerit attenuatoria: quo caſu ſuppoſita iungat̄ cū
adipe galline: anſeris vel anatis: ⁊ oleo de lilio: vl̄ amigda
lino ⁊ ex illis eſt carica īuerſa in ydromelle īfuſa ⁊ ſuppo
ſita: cuſcute virides herbum caulis meri ⁊ mel. Quedam
ſunt mediocria vt camedreos: camepitheos: balſamum
ſumptum: ⁊ ſuppoſitum cum coſto ſtorax: aſſarum: gen
tiana: polium: vtrunq̄ʒ cynamomuʒ: daucis ypericon: dya
capparis: apiū: lubne: angul: pullegiū: vrtica: ruta: piper: ſa
uina: ſerapini: oppoponaci: aſſa: vtrūqʒ caſtoreū: cordume
ni: rubea tictoruʒ ſunt fortia. Et ex illis que ſupponūtur ē
opoponacuʒ ⁊ fructus eius ⁊ radix brionie: ⁊ ciclaminis ⁊
ſerpentarie: ⁊ pionie: ⁊ coſti: ſuccus cucumeris aſinini: cen
taurea: pulpa: colloquintide: ellebor9: gummi oliue ſilue
ſtris: cordumeni: ⁊ cuʒ ſupponitur euforbiū ſuper coſtum
ſtatim prouocat ⁊ mirra ⁊ petroleū ſuffumigatū ⁊ ſpecies
gummorū ⁊ pulpa colloquintide ſola. Si vero fuerit car
noſa curā nō habet. qꝫ ſi cōpelleris ad curādū eā: tūc opor
tet vt cū lenientibꝰ ⁊ aperientibus in ea procedas: ꝓut ſupra
in oppilatōe epatis eſt dictū. Si vero apoſtemoſa curabi
tur cura apatis dicta. Ex cōpoſitis ſunt trociſci mirte dya
cucurma ſagenea dyaltea dyalaca dyalcamītū yera pigra
⁊ ſimilia. Accidentiuʒ vero correctio que ex retentiōe proue
niūt iam ſuperius in cura ſuffocatiōis ſunt nota plurimo
rū: vlr̄ aūt cura vniuſcuiuſqʒ eſt vna cū his que ſanguinē
ꝓuocāt ⁊ oppilationē aperiūt ſcḋm oēm adminiſtratōis ſu
pra dictū modū. Eoꝝ vero que ex ſupfluentibus imediate
accīt cura vlr̄ ē cū his q̄ retinent ⁊ cōfortāt: Eoꝝ vero q̄ ꝯti
ter ⁊ mediate cū alijs que ī proprijs dicta ſunt ⁊ dicentur
caplīs. ¶ Cōfectio medicīe vltimi iuuamenti ad ſupflua
mēſtrua. ℞. terre ſigillate: boli armeni: aluminis: gallarū
ſanguis dra. añ. ptes eq̄les. fiat puluis de quo recipiat̄. ʒ. i.
cāphore. ʒ. ij. ⁊ galle ſextā. ʒ. i. ⁊ totū diſſoluat̄ ī ſyrupo mir
tino ⁊ det̄ ⁊ ē Abo. Itē expta ē ſpongiola q̄dā alba maria ī
littoribꝰ marꝫ īuēta ⁊ minutati ſciſſa ⁊ exhibita ⁊ ꝯmixta cū
ſuc. roſ. ⁊ ē ex īuētiōe nr̄a: ⁊ viola ſaracenica. ¶ Confectio
cliſteris ad fluxū excoriationū mr̄icis. ℞. colcotar: draga.
acacie: cortic̄. thurꝫ: ātimōij: añ. ptes eq̄les. ⁊ fiat ex eis tro
ciſcus aur. i. ⁊ boli armeni: gūmi arabici: charabe: añ. ʒ. i. po
nant̄ ī. ʒ. ij. ſucci ſtiptici: aut aq̄ alumis: ⁊ cliſteriçet̄ ī ea ma
trix. Et ſi fuerit ibi dolor fortꝫ adde iuſqami ⁊ opij: aut ſe
cicute qꝺ ſufficit: ⁊ ē Abo. ¶ Suppoſitoriū bonū: ⁊ ꝓprie
ad corroſiōes ⁊ vlcera. ℞. teſtas furni: ⁊ ſuccū barbe yrci
ne: grana agreſte: cartā de pāno cōbuſtā: ſandalū al. corti
cē thuris: terrā ſigillatā: capita granatoꝝ: vel foliuʒ: ſcoria
ferri: coriādrū ſiccū: ⁊ ſupponat̄ ex eis pulueriçatis. ʒ. ij. cū
his ībibita aqua mirti: ⁊ teneat tota nocte. Et de tinis con
ferentibꝰ ei ē enchatiſima in decoctōe roſ. cū ſtipitibꝰ myrte
et corticibꝰ granatoꝝ viridibꝰ gall. ⁊ gallaꝝ cipſſi: balau
ſtiaꝝ: ⁊ barbe yrcine: ⁊ quidā addūt radicē vlmi: filicum
⁊ fructuū pōticoꝝ. Itē de epithimatibꝰ eiꝰ eſt alcāna iun
cta ſup ſumen. ⁊ ptē mr̄icis cū oleo ſtiptico fortis ſtiptici
tatis. Ex naſtalibꝰ ⁊ ſuppoſitorijs ꝓprijs ē lana vel cotū ī
tinctū in ſucco ꝯſolide vel galle viridis cui ſit ſupaſpſus
puluis trociſci de balauſtijs: vel de terra ſigillata deſcri
ptōis nr̄e. Et ex vltimis ē naſtale qꝺ ℞. collofon: e: cāpho
re: ſcorie ferri. ꝯfice cū ſucco ſolatri ortulani: ⁊ ſuppone cū
coto. ¶ Filij ſerapiōis. Cōfectio medicaminis retinentis
ſanguinem. ℞. ſedenigi: ſan. dra. draganti: charabe: coralli:
aluīs iameni: balauſtiaꝝ: boli ar. terre ſigillate. ſe. portul.
añ. ptes eq̄les: terāt̄ ⁊ cribellēt̄: ⁊ dent̄ ex ea. ʒ. ij. cū aq̄ ſu
mach: ⁊ ſe. apij: aut cū aq̄ anthimonij ꝯtriti qꝺ ſit īfuſū die
ac nocte ī aq̄ arnogloſſe. ¶ Cliſtere. ℞. ſucci vḡe paſtoris
℥. ij. ꝺcoctiōis corticū granatoꝝ. extremitatis mirti. nucis
cipſſi: gallaꝝ: ro. ⁊ balauſtiaꝝ: añ. ℥. ij. miſceat̄ ⁊ inijciat̄ cū
cliſteri. S. vō ait cū curaſſet tabē fluxū cū medicis iteriꝰ ⁊
exteriꝰ approxiatis: cū ñ ꝯtuliſſet cū ſucco ſolo arnogloſſe
cliſteriçaui ⁊ dedi illō ꝑ os: ⁊ ſanata extitit. Et ſi talibꝰ ſuc
cis aliq̄d ex retinentibꝰ ſanguinē ꝯglutiatiōe ſua miſceamꝰ
opportunū ē ⁊ ꝓpē ſi cū ſolone l' vlcere fuerit. ¶ Peſariū
℞. gallaꝝ īmaturaꝝ: alumē iamēi: acacie: farie thuris: añ.
ptes eq̄les. tere ⁊ cribella: ⁊ ꝯfice cū mirta hūida. ⁊ ſuppo
ne cū coto. ¶ Aliō retinēs ſan. valde. ℞. cornu cer. ꝯbuſti
carte ꝯbuſte: galaꝝ ſiccaꝝ: ramic: troci. ꝺ lacca: ſandal. al.
aluīs ia. obſtracoꝝ: figuli ouoꝝ: licij: galaꝝ aduſtaꝝ extin
ctaꝝ ī aceto: ſā. dra. calcadis: calcātū vide: nā qñ antiq̄t fit
calcadis: colcotar ātimonij friſi cū olō ſūac: ſedenegi: ſpō
gie ꝯbuſte extīcte ī aceto. obſtracoꝝ aduſtoꝝ corticū thu
ris: oiuʒ: añ. ptes eq̄les: tere ⁊ ꝯfice cū aq̄ ſūac: aut arnogl.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0400-9

aut, vge paſtoris. ¶ Suffumigiū retinēs ſan. mēſtruū ef
fluētez ſupflue. ℞. maſt. colofonie: boli: ſanguis dra. an̄. ar
gilla ſicca bis ponatur ſupra prunas: ⁊ recipiat fumū ꝑ em
botum. ¶ Syrupus ad idem. ℞. ſucci plantaginis. faſio
larie: corrigiole: pētafilon: viol. ſaracenice: an̄. ℥. vi. bis ſuc
cis depuratis ⁊ colatis addat̄ lib. ʒ. ſirupi roſ. ⁊ çuccari al.
lib. i. in fine decoctōis irrorent̄ aqua ro. vel nenufaris: lib.
i. in qua ductus ſit lapis ematbitis: ⁊ in pecia rara buliant:
ſan. dra. boli ar. terre ſigillate: an̄. ʒ. i. doſ. ℥. i. cū aqua mirte
⁊ eſt ex itētione nr̄a. ¶ Cōfectio ſyrupi ꝓuocātis retenta
mēſtrua. ℞. calamēti agreſtis: ⁊ calamenti pulegij: radic̄.
enule cāpane ⁊ yreos: matricarie: redic̄. iuniperi: ipericon
ana. M. i. rubee tictoꝝ: nigelle: çedoarie: ⁊ dorenigi: radic̄.
dauci: ſpodij: praſſij: ſgnāti: an̄. ʒ. iiij. oīa coque in lib. vi. aq̄
vſq ad mediū: ⁊ cola: ⁊ pone feces in lib. iij. aque ⁊ coq̄ vſ
q ad medium: ⁊ cola. Et aduna vtraq calamēta: ⁊ pone
mellis lib. ij. ⁊ coq̄: ⁊ in initio coctiōis pone ſpice. caſſie: ga
riofil. aſari: cinamōi: maſticis: croci. an̄. ʒ. ʒ. ſubtilr̄ pulueri
ꝣata in pāno lini: ⁊ mitte aceti ſqllitici. ℥. iij. ſi nō ꝓhibeant
alia. educit. n. mēſtrua ex cā frā: ⁊ coartatoria retēta: ⁊ eſt
ſanū ⁊ exptū. doſis. ℥. ij. in aurora cū calida. ¶ Pille poſt
ꝑdictā ꝑparationē educētes hūores oppilātes ⁊ aperiētes
obſtrictionē venaꝝ menſtrualiū ſunt pille de yera pigra:
pille fetide: ⁊ de gūmis: ⁊ de tapſia: ⁊ alie ſupius dicte. En
chatiſma ꝓuocās mēſtrua aperiēdo ora venaꝝ mr̄icis ſan
guinē trahēs ad iteriora ipius ſubtiliās ⁊ aperiēs vt faci
li⁹ egrediat̄. ℞. ſauine: pulegij: calamēti: apij. feniculi: acri
monie: filipēdrie: pitarie: abſinthij: rute: matricarie: an̄. ꝑ
tes eq̄les buliāt in aq̄ dulci: ⁊ ſedeat̄ ī ea calīa. ¶ Itē ſuffu
migatio poſt ꝑdictū enchatiſma. ℞. galie mu. aſſari: gūmi
edere. ſpice: croci: muſci: ambre cētauree: puluericent̄ ⁊ po
nant̄ ſup prunas: ⁊ cū emboto ſuffumiget̄ pānus eā tegen
do dorſum. ꝓuocāt. n. hec mēſtrua. vt ait hyp. cū igt. Mu
liebria educit ex aromatib⁹ calefactio ſi nō capitis graue
dinē facerent. Et ex eis ſūt ſuffumigatio cū altero hoꝝ. ſ.
collognitida: aſſa: ſerapio: oppopōaco. ⁊ cordumeni: ⁊ ēt cō
mixta. ¶ Cōfectio ſuppoſitorij efficacis. ℞. mirti: calamē
ti amboꝝ: an̄. ʒ. iiij. ſanſuci. ʒ. viij. rute ſicce. ʒ. x. paſſularuꝫ
enucleataꝝ. ʒ. xx. Cōficiant̄ cū felle taurino ⁊ fiāt pēſaria.
Oleū de ſpica: ſambucinū: de lilio: yreos: amigdal. amara
rū: oleū de narciſco: de iunipero ꝓuocat ſuppoſitum.
¶ Aliō pēſariū. ℞. caſtorei: muſci: ambre: mirre: croci: an̄.
ꝑtes eq̄les. Cōfice cū oleo de been: ⁊ fiant penſaria.
¶ Itē ſuccus papaueris: rufi: ſucc⁹ matricarie: abſinthiū
dauci: radicū apij: ⁊ petroſilini: paritarie ꝓuocat. Aloes ſū
ptus ⁊ ſuppoſitus ꝓuocat mēſtrua. Ex ꝓprijs ⁊ exptis me
dicamībus ad accidētia ꝑdicta ex retentōe mēſtruoꝝ in
ſurgētia cū accidūt mulieri an̄ ꝓruptionē ipoꝝ eſt: vt per
tres dies an̄ tp̄s cōſuetū ipoꝝ comedat mulier: matricem
ceruē ⁊ capre elixatam: quolibꝫ trium dierum mane ⁊ ī ie
iunio de vtraq comedendo.

¶ Capitulum. xij. de curſu matricis ſeu fluxu aque.

c Ontingit quibuſdā mulierib⁹ ꝙ currāt ex earum
matricib⁹ nō mēſtrua de q̄bus dcm̄ eſt: ſed hūidi
tates alie alteri⁹ gn̄is. Ex eis eni ſunt aquoſe: eru
ginoſe: rubee: vel citrine: ꝓprijs colorib⁹ ⁊ ſubijs deſigna
te. ſicut ex eaꝝ relatōe habuim⁹ ⁊ īſpeximus in pānis ⁊ va
ſis collectas: quaꝝ euentus eſt ex ſupiorib⁹ corporis in qui
bus talis mā generat̄: quaꝫ nā ex eis imittit periodice ad
matricē tanq̄ nauis ad ſentinā: per quā totū corpus i mu
lieribus ſtatuit expurgari ipſa nullū malū habēte. ſic inu
it. G. cū dixit. Item cōtingit fluxus ſanguis vulua nihil in
firmitatis habēte. cā. q2 nā totum corpus per vuluā. ſicut
per renes vel nares mūdificat ꝙ plurimū ſit flegmaticuꝫ
⁊ teneꝝ. ¶ Porro qȯ egredit̄ eſt eruginoſum rubeū citri
num vel aquoſum q̄ oia a menſtruis differunt. q2 veniūt
a remotis in q̄bus diſpōnem aliquā ꝑter nām percipiunt:
vt grauedinē ⁊ tumorem malitiā anhelitus ⁊ digōnis ſub
alia ſpē q̄ adueniat mēſtruis. ſunt. n. de collo mr̄icis. ſic ō
flomia exiēs ſanguis mēſtrualis. Sed qȯ aquoſū eſt ī de
bilitatis getis: teneris ⁊ flegmaticis currere ē ꝯueniēs vt
dicamus a nā permoti. In ꝯrijs vero eruginoſum rubeuꝫ
⁊ citrinum peccato exiſtēte vtrobiq digōnis epatis ⁊ ve
narum ex frigiditate ea maiori q̄ mēſtruis cā eſt. vel cali
ditate ſuperflua generātibus tales ſupfluitates in eis. Cu
ius ſigna ſupra in epate ſunt mōſtrata: vel cum febre acu
ta: vlcere ſeu apoſtemate in mēbris quoꝝ materias natu
ra per matricem expurgat.

¶ Capitulum decimumtertium de cura retentionis
menſtruorum.

As non opꝫ retinere cum nā repellat illa ꝑ conue
b nientē regionē ⁊ idoneā niſi ſinthomatice dum
modo regulet illas: ſed nāe ꝓuidētie dimittere ſi
cretice vel q̄n̄q ſinthomatice: nec valēs ea ꝯtinere dimit
tit exinde ꝓrumpētia. ſed vt ex matrice periodice educā
tur ſtudioſius operari. ita q̄dem vt cōpetenti q̄titate non
deficiant neq fluant cū in ſuperioribus magnū: q2 ſintho
ma ⁊ nāe defectionē quo caſu ſunt retinēda: vt ifra dicet̄:
ſed ſufficiant ⁊ eaꝝ ꝓportionent̄ gn̄ationi. Ueꝝ q2 tales
hūiditates ꝓdeuntes: lꝫ mulierib⁹ talibus in ſe ſint vtiles
⁊ ſi moderate ſint: tamē q2 ſunt ex eiſdem in ſua dignitate
⁊ indiuiduitate: ⁊ quolꝫ modo turpes: faſtidiū generātes
ipſis: ⁊ viris facientes ſemē lubricare vel corrūpentes. ⁊ ꝑ
inde genologiam ⁊ gn̄ationem quā nāliter appetunt ꝓhi
bentes expedit quoquomō ꝓhibere eas ne generent̄: cuꝫ
nāliter in corpore ſano generari nō debeāt idonee regula
to. ⁊ qȯ de eis iā generatum eſt a mēbris corporis debite
expurgari: ⁊ ne ad matricē veniant cōuenientib⁹ auxilijs
deriuari. ¶ Cura ſic equidē eſt tres res. p̄ma eſt ꝓhibitio
generatiōis ipſarum. ſcd̄a eſt eius qȯ generatū eſt ⁊ quoti
die generabit̄ donec ꝓhibitio fiat expurgatio: ⁊ ne ad ma
tricem fluat deriuatio. tertia eſt accidentium correctio.
¶ Primam rem cōplent rerū nō nāliū debita ordina
tio ad ſiccitatē tendens: ⁊ medicinaruꝫ conueniēs exhibi
tio malitiam complexionis epatis ⁊ venarum alterantiuꝫ
prout digeſtioni complende epatis: ⁊ ipſaruꝫ expedit que
ſupra in epate ſunt monſtrate. hec enim nō ſunt ſoluꝫ ꝓſer
uatiue: ſed ēt curatiue. ¶ Secundā reꝫ complent ea que
ſuperfluitates aquoſas ⁊ colericas habēt educere per po
ros ſenſibiliter ⁊ ꝓprie per ſudorem vt ſudorem ꝓuocan
tia. Inquit eni Abo. Sudor eſt aquoſitas ſanguis cui pus
colericum eſt admixtuꝫ. Aut per vrinā vt diuretica ⁊ che
meſir: qȯ eſt ſpecies oppoponaci: ſed dicit Auer. ꝙ eſt for
tius ⁊ nō hꝫ partem in reſoluendo ſaniem ⁊ aquoſitateꝫ.
vel īſenſibiliter: vt exercitiuꝫ ⁊ ſepelitio in arena: fames:
ſitis: ⁊ abſtinētia ab hūidis ⁊ brodialib⁹. ⁊ alijs ī cura idro
piſis denotatis vel fluxu vētris ſiq̄dē eruginoſe fuerit: vl
flomia de baſilica vel nigra ſi rubee fuerit: vel vōitu ſi co
lerice: de q̄bus oībus in cura flux⁹ vētris plene dcm̄ eſt.
Et ſi ex mā febris acute apatis vel vlceris exeant cura il
lorum ꝓprie ipſaꝝ eſt cura q̄ in ſuo q̄rat̄ loco. Et ſiq̄dē ſu
perfluant cū ꝑdictoꝝ reiteratiōe agendum eſt: ⁊ ēt cū hiis
q̄ in ſuperfluētibus mēſtruis dicta ſunt ſupra. Inq̄t hyp.
Omnia ſm rōnem facienti ⁊ nō euenientibus ilico ſꝫ rō
nem nō trāſire ad aliud opꝫ manente dato qȯ viſuꝫ eſt a
ꝑncipio. Agens. n. ⁊ ſi nō in breui ꝑp idiſpōnē ſubi īprimit
in longo tn̄ tēpore iprimēdo ꝓcedēs ꝑficiet ⁊ manifeſtaꝫ
faciet actionē. ¶ Tertia res. ſ. correctio accidentiū eſt: vt
mitigent̄ dolores: alleuient̄ grauedies ⁊ pūctōes vt ſupra
in mēſtruis eſt notatū. Ordinatio artificialis balnei exic
catiui aquoſitatū poſt nāle. ſic eſt termaꝝ ⁊ ꝓprie ſudato
riūꝫ eſt multiplex. Uno mō ſic ſemicupiū fiat bn̄ cooper

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0401-5
DFG

tum: vt non expiret vapor vel fum⁹. ꝛ ſi ſit in medio eius tabula pforata i mltis locis: ꝛ de ſubtus pōat aq̄ maris calida ſimplex: vł decoctiōis exiccātiū medicinaꝝ vt baurac: ſpume maris: nitri: ſulfuris. Et herbaꝝ vt ſticados: folioꝝ camōille: roriſmarini: ꝛ foliū ꝓut neccitati tibi videbit̄ expedir̄. Et deſup ſituet̄ corpus vt fumus ipꝫ bene attingat. Et cū tepeſcere icipit habeant̄ lapides molares igniti: vel lateres ꝛ ꝓyciāt̄ i aq̄: ēt iteꝝ fumū recipiat: qm̄ mltū exiccat. Aly vō alr̄ faciūt: caldariā magnā de ere bn̄ coopertā vt ex ea null⁹ fum⁹ expiret: ↄſtruūt ſup ignē: i q̄ ꝓdcā iponūt ꝛ faciūt ea buliri: ꝛ ꝑ manicā q̄dā: ſeu canale ꝺ ea i tinā ꝓtēſaꝫ i q̄ bn̄ coopta ſtet corp⁹: ꝛ fumū recipiat: donec bn̄ ſudatū fuerit. Et ex tūc egrediat̄ ꝛ qeſcēs i lecto: iteꝝ ſudet ꝛ reiteret q̄tū fuerit nece. Hoc.n. balneū nō ſolū ſupfluitates tales derivādo educ̄ ꝛ exiccat: ſꝫ ēt diſcraſiā fraꝫ ꝛ humidā corpis ꝛ mēbroꝝ ipas gn̄antiū alterat ꝛ emēdat: vt cū bono ꝑmiſſo regie nō vlteri⁹ gn̄ent̄ digōne ↄfortata: cuius gn̄at̄ debilitate: ꝛ qꝺ ē i mr̄ice iā fluxū ꝛ ↄtētū ↄſumit. Et balſam⁹ bibit⁹ ꝛ euaporatus exiccat hūiditates ei⁹. Et vt ↄſum̄ ī: ꝛ vlteri⁹ mr̄ix nō recipiat eas ſedeat i aq̄ aluminis: vel granoꝝ rubi ꝛ mirte. Et iteꝝ poterit ſuffumigari ꝛ ſupponi ex eis: q̄lia ſūt ſandaraca: ſpōgia maris: alumē: ſpica: ſcoria: ſal nitrū: ſpuma maris: baurach: ſulfur: ſtoraꝝ ſicca: furni fuligo: tela aranea: ſcarpa: alcāna: ꝛ ſilia. Et cliſterizentur ſtiptica ex aquis ꝛ ſuccis iam dictis in menſtruis ſupra.

Cap. xiiij. de ſterilitate ꝛ difficultate ipregnationis.

STerilitas ꝛ ipregnatiōis difficultas drn̄t ſic ablatio ꝛ diminutio. Cōueniūt.n. in ſpē: ſꝫ in q̄to drn̄t ꝛ ſilr̄ in ſpēb⁹ cauſaꝝ: ſꝫ in q̄to ipaꝝ: cū.n. ſunt fortes cā ſunt ſterilitatis. ſi vō debiles fuerit ſunt cā difficultatis. Et q̄dē cāe ipaꝝ ↄ̄rie ſunt cāis ↄceptiōis ſupi⁹ ꝑdiſtictis q̄ ſunt ex ꝓpings ꝛ imediate operātib⁹ vt vno ↄphendant̄ caplo ordinate. dicim⁹ aūt ꝙ in corpore itegro ſuis mēbris: etate ꝑfcā: ꝛ apparēte i ſe ſano: aut ſūt ex cāis iterioribus ꝑncipalr̄: aut ſī ex cāis exteri⁹ iprimētib⁹. ꝑmo mō aut ſūt ex ꝑte viri: aut mlieris: aut vtriuſq;. Ex ꝑte ſeis: aut i ſe. q̄ ſit ex aliq̄ mala mā gn̄atuꝫ: q̄ a ꝓꝑetate hꝫ vt ſpma gn̄et infecūdū. vt dixit Egidi⁹: ꝛ Archydia. vel qualitate diſtinctū vel ifectū aliquo malo hūore: vel corruptū lōga retētione ꝛ debilitatū ſiue iperfectū in ꝑncipalib⁹: vel leſum alioꝝ cōitate mēbroꝝ. vel toti⁹ corpis. q̄ febriēs: aut tpe diminutū: vel ſua ꝓꝑetate ſicut diſpō arboris nō fructificātis: vt dixit almāſor. aut alys accn̄tib⁹ cāis: vel qualitercunq; ineptum fuerit vt ſupra de ſpermate dictū eſt. Ex parte vō inſtri ſeu virge: q̄ fuerit nimis longa vel breuis recipiēti nō ꝓportionata: vel debilis mollificata: vł in erectiōe deficiēs. vel mō quolꝫ leſum in cā nocumēti erectionis ꝛ in ſpmate ſupi⁹ ꝑdiſtincto. Ex parte mulieris cā eſt multiplex. aut.n. erit in ei⁹ ſpmate: aut in loco a nā gn̄ationi ei⁹ deputato vt in mr̄ice. Cā vō in ſpmate ei⁹ ſilis eſt cāe ei⁹ in ſpmate viri iā dicte. Cā vō in mr̄ice aut erit i orificio ei⁹ ꝛ collo: q̄ ſit tortū vel oppilatū: vt ſupra in ꝓprio caplo ē dcm̄. Quare ſemē trahere nō valebit nec ↄcipiet ſic hyp. i affo. dixit cū ingt. Queccūq; vō ꝑter nāꝫ groſſe nō ↄcipiūt his pinguedo os mr̄icū obturat: aut in mr̄icis cōcauo: ꝛ tūc aut q̄ ſit a diſcraſia aliq̄ debilitata: q̄r ſemē nō attrahit ſi fra fuerit: aut nō retinet ſi fuerit hūectata: vel madefacta lubricat ꝛ egredit̄ ſemē: aut q̄ ſit feta ꝛ imunda ipm corrūpēs: aut cōgelās ipꝫ ſi fra fuerit: qꝺ eſt plurimū vel nimis cal'a ipm adurēs ꝛ ↄſumēs: aut ſicca vt terra arida ꝛ arena: ꝛ eſt q̄ nō ſolū ſemē exiccat: ſed ēt alimentū ſanguis imiſſum a toto corpore ↄſumit: vel q̄ ſit i vys eius vel ipoꝝ vaſoꝝ ſpmatis dēſata ꝛ oppilata: q̄r ſpma i eius ↄcauū nō diffundit̄: nec ſāguis ad alimētū imittit̄: vł ſi imittit̄: nō eſt bon⁹: q̄r nō trahit̄ in mr̄icē nec nutrit. Inquit. H. cib⁹ nutritiu⁹ oīs qualitatis exceſſu vel fortitudie dꝫ carere: quā ſi hēat ipm alteret nā. vt ſupra in ſuo caplo dcm̄ eſt. Vn̄ hyp. dixit in affo. Queccūq; fras ꝛ denſas hn̄t mr̄ices nō ↄcipiūt: ſilr̄ ꝛ in marib⁹ ſubiungēdo. Aut q̄ ſit aliqua ꝑdcārū egritudinū gn̄ata vel accn̄te qualꝫ leſa i ſe: vel cōitate ad mēbꝝ aliqꝺ ꝓpinquū vel remotū vel totū corpus: q̄ fuerit febriēs. Ex ꝑte vō vtriuſq; multiplr̄: aut q̄ nō fuerit cuꝫ amore ꝛ deſiderio debite copulati: aut q̄ coeūtes nō ↄuenerūt in emiſſiōe ſpmatis: vt debitā ſemia recipiāt mixtionē: vel ſi ↄuenerūt ventoſitas ſepauit iter ea: vt nō ꝑmiſcerent̄ adinuicē. aut q̄ ꝑmixta nō fuerit cōtemperata ꝛ diſtēperata: nec iter ſeinuicē vel cū mr̄ice cōtēperantiā receperūt: qꝺ declarat: q̄ ſcꝺ̄ diuortio ꝛ copulatiōe: cū alys gn̄abit vterq; ꝑ ↄ̄riā cām. Cāe vō exterius iprimētes: q̄dā ſūt ex neceſſarys. q̄dā ex nō neceſſarys: ex neceſſarys ſūt q̄dē vt aer. et hoc aut ſua v̄tute māifeſta: q̄ fuerit nimis calidus vel frigid⁹ vel corrupt⁹. q̄ fuerit peſtilens ꝛ reſoluat vel cōgelet ſemia vel corrūpat v̄tute occulta: vt q̄ a ↄſtellatōe ifluēte in corpora alic⁹ regiōis ſterilitas eius accidit: qꝺ eſt māifeſtū. Videm⁹.n. aliquas regiones bn̄ ꝓducētes male ↄſeruātes: ꝛ aliq̄s ſolū ↄſeruantes bene: ꝛ aliq̄s in vtroq; nulla cā manifeſta: in terra vel aere vel regimie. ꝛ exercitiū laborioſum ſubituꝫ: ꝛ cū ſaltu plurimo ad poſteriora: qm̄ faciet deſcēdere ſperma: ꝛ cuꝫ ſternutatiōe maxie ꝛ ꝓprie imediate poſt coitum. Quies multiplicās ſupfluitates ificientes ꝛ corrūpentes ſemina. Cibus ꝛ potus ſupfluus malus ꝛ iordinatus multiplicans mucillagines facientes lubricare ſemē ꝛ ꝑſtantes alia nocumenta. Silr̄ ſuperflu⁹ ſomn⁹ ꝛ vigilie: ſunt.n. motui ſimiles: ꝛ qeti vt dixit Abo. Superflua inanitio. ſ. ſanguis ꝛ alioꝝ ſuperfluoꝝ humoꝝ: nālis vel accn̄talis: occulta vel manifeſta: vomitu vel fluxu ꝑducēs ad diminutionē māe ſeminis vel ſanguis mēſtrui. Et ſupflua repletio ſuffocatiua ſeminū: ꝛ aie accidētia: vt gaudiū ſubitū imoderatū: timor eueniēs ſubito: dolor ꝛ triſtitia. Et ex nō neceſſarys: ſunt vt balneū frigidū vel calidū reſolutiuū oī tēpore: ſūptio rei ꝓhibētis cōceptionē: vt bibitio multa cāphore: ꝛ emplaſtratio teſtiū cū iuſqamo nigro. ꝛ ſilia q̄ infra in difficili partu dicem⁹. Signa. ſterilis cognoſcit̄ mulier ꝑ effectuꝫ. oī ꝑmiſſa cura ꝛ igenio nunq̄ ipregnat̄ cū ꝓprio vel alio: vel ſi viro gn̄anti cū alia copulet̄. Et ſigna ꝛ ꝓꝑetates viraginis ſunt in ipſa. Et ſilr̄ vir ſterilis cognoſcitur per effectū. Et ſigna. q̄ ſpanus. i. ſine pilis in barba. Difficultas vō ipregnationis cognoſcit̄: q̄ tarde ꝛ raro ipregnatur: ꝛ nō niſi cum aliq̄bus curis premiſſis ꝛ igenys quos infra dicemus ſm̄ Ariſto. in de generatiōe aīalium. Quedā habēt a diſpōne naturali mulieres: vt ꝑma etate nō concipiant: ſed ſcꝺa ꝛ tertia ſic: q̄dam nec ꝑma: nec ſcꝺa. ſed tertia ſic. Vidimus eni q̄dam dominā medici filiam q̄ nūq̄ concipere potuit niſi ad q̄nquageſimū annuꝫ. ꝛ ꝑmo tēpore fuit paſſa mollam: deinde āno ſequenti fuit impregnata vere. Quedā prima ſic ꝛ ſcꝺa ꝛ tertia nō. acquirit̄ eni q̄dam diſpō vel indiſpoſitio ipſi⁹ ad ipregnationē mutatione etatis cum ꝓportionat̄ ſuo compari vel diſproportionetur vere. Et ſigna cāruꝫ ſunt q̄ indicant an cā ſit ex parte viri aut mulieris: ſicut ea q̄ hyppo. in ſuis affo. cū dixit. Mulier ſi nō conceperit in vtero: velis autē ſcire ſi concipiet: tege eam veſtimentis ꝛ ſuffumiga eam deorſum aromatibus. Et ſi q̄dem odor per corpus ad nares ꝛ os peruenerit cognoſce: qm̄ ipſa nō ex ſe nō ↄcipit: eſt āt culpa viri. Aly aūt dixerūt. Supponat̄ alleū ꝛ cōſideret ſi ꝑuenit odor ad os: aut nares aut nō. Si.n. nō peruenerit oppilatio in poris ꝛ ductibus matricis oſtenditur que ꝓhibet ipregnationem vel mala cōplexio eius cōſumens vapores calida ꝛ ſicca vel cōgelans ꝛ inſpiſſans vt non penetrēt ſi frigida ꝛ hūida fuerit: ſꝫ hoc ſignū ē ſup ꝑticularem cām

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0402-1
DFG

ſterilitatẽ:nõ ſup oẽꝫ cũ alie cã ei⁹ ſint m̃lte ꝑter oppilõnẽ
⁊ malitiam qualitatis ipſi⁹. Alij vero alia dixerũt q̃ in ali
quo nõ verificant̃ niſi ſigna iueſtigent̃ ꝓpa. Signa defe/
ctus in mã ſeis ſunt cibi mali ⁊ pot⁹ vel pauci ꝑaſſumptio
vel ipſi⁹ aſſiduatio ⁊ digõnis malitia. Signa ṽo malitie q̃
litatis ⁊ vaſoꝝ ſunt:qm̃ ſi cal'ꝫ ſit cito emittit̃ ⁊ ſentit mu/
lier apud emiſſionẽ ei⁹ acuitatẽ ⁊ ardorẽ: ⁊ cũ recipit̃ ex/
tra appet color decliuis ad rubedinẽ vel citrinitatẽ ⁊ odo
ris acuti ⁊ ſubẽ tenuis vel ſpiſſe:ſi aduſtio nõ ꝑuenerit in
genitalibus.ſigna calitatis ꝑcipies.⁊ ſil'r vrĩe ticturã.ſi ṽo
fr̃a ꝯria appebũt.ſi ṽo ſicca paucũ erit ⁊ groſſuꝫ: ⁊ corpus
erit ſil'r ſiccũ.ſi ṽo hũidũ ꝯria apparebũt. Signa iꝑfe/
ctõis ipſi⁹ ſunt:q2 ſit aquoſuꝫ ⁊ idigeſtũ:⁊ eſt cũ paſſiõe te
ſtium vel alic⁹ mẽbroꝝ ꝑncipaliũ.Signa ṽo ieptitudinis
ipſi⁹ ex ꝑte toti⁹ corporis vel aliaꝝ cãꝝ ſenſui nota ſũt et
manifeſta in viro cõiter ⁊ muliere. Spma qdẽ ꝑfectuꝫ ſa
nũ ⁊ gñatiuũ:eſt albũ ſplendidũ: viſcoſuꝫ:⁊ vnitũ ſic̃ gran
do ⁊ odoris pallee:vel floris ſambuci ⁊ poſitũ in aq̃ deſcẽ
dit.ſicut in de gñatõe aĩaliũ dixit Ari. ❡ Signa ṽo cãruꝫ
ꝓcedẽtiuꝫ ex m̃rice:vt q2 in orificio ſit oppilata vel collo:
aut tortuoſa in ipo:ex caplõ oppilõnis ipi⁹ ſũt mãifeſta ſi
ſit in via vaſoꝝ ſpmatis vel ſãguis ad alimẽtũ imixto.Et
ſiqdẽ defect⁹ ſãguiei alimẽti cõitate toti⁹corꝑis fuerit ari
ditas ⁊ ſubtilitas corporis demr̃abit.ſi ṽo ipſi⁹ malicia q̃li
tatis ipi⁹ ⁊ ſubã ꝑcollecte.Sed ſigna male q̃litatis cõcaui
ipi⁹ m̃ricis hñt̃ ex tactu quẽ ꝑcipit apõ coitũ ṽga viri:vt
ſiqdẽ cal'a fuerint ꝑueniũt ad caput ei⁹ ſenſus tact⁹ calita
tis.ſi fr̃a ſenſus fr̃itatis.ſi hũida hũiditas abundãs detur
pãs ac coitũ idelectabilẽ opans ⁊ curſuꝫ m̃ricis.Si ſiccus
eꝫ.hñt̃ ẽt ex diſpõne genitaliũ apparẽtiũ mẽbroꝝ. ⁊ alijs
exeũtib⁹ in vrĩa ⁊ toti⁹ cõitate. Si ṽo ſit aliq̃ ꝓdcãꝝ egri/
tudinũ grauata:ꝓñtia illi⁹ oñdit:⁊ ſil'r ſi alic⁹ mẽbri cõita/
te vel toti⁹ corꝑis.Si ẽt plenitudo ex mucillaginib⁹ coti/
lidonũ ex regiẽ ⁊ corꝑis itẽperamẽto ꝑcipies ⁊ grauedies
ſenſu circa renes ⁊ iguia.Signa cãꝝ ex ꝑte vtriuſqꝫ exiſtẽ
tiũ experĩẽto ſũt mãifeſta:⁊ ꝓꝑe mulieris rerõne. Et ſigna
intẽperãtie ipoꝝ iter ſe ⁊ ipoꝝ cã m̃ricis ſũt õfect⁹ aliarũ
cãꝝ.⁊ q2 fcõ diuortio ⁊ coplõne cũ alio:gñabit vterqꝫ vel
alter. Cãe ṽo alie exteri⁹ iprimẽtes ſunt ſenſui mãifeſte.
❡ Cura.in cura ſterilitatis duplex ẽ itẽtio:gñal'.ſ.⁊ ſpãlis.
gñal' eſt adeq̃tio maris ad mulierẽ.ſic qdẽ ꝙ in oĩb⁹ q̃ ad
gñationẽ ꝑtinẽt maxie ⁊ mediate ⁊ ex ꝓpinquo:q̃ ſũt dcã
iter eos fiat ꝓportio ⁊ tẽperies:ex ꝯtẽperantia.n.eoꝝ iter
ſe gño ꝓuenit ⁊ hũiſti. Uex talis apõ medicũ difficil' eſt ⁊
q̃ſi ipoſſis et penit⁹ ignota vel difficil' ⁊ laborioſa.cognitio
eq̃biliũ:maxie ſi ieq̃litas nãliter adſit. Et ꝓinde ſi agam⁹
aliqd ad ipm ꝓcurãdũ iter eos attẽtius pergram⁹ ſiue ſte
rilitas ſit ex nãli diſpõne ſiue accñtali.Et ſi ex diſpõne nã
li:aut erit ꝑpetua aut tẽporal' ſm̃ variã diſpõnẽꝫ etatis:vt
dixit phũs.ſi ꝑmo mõ dimittẽda ẽ vel alteri ſociãda. ⁊ ſic
ecõuerſo.nã.n.coopante vana ſũt oĩa dixit hyp. ſi ṽo ſcõo
mõ:ſil'r dimittẽda:vel cũ leuib⁹ diſponẽtib⁹ ⁊ ꝯfortãtibus
⁊ curis ſm̃ ſapiam ꝓcedẽdũ.q̃ ſi nõ ꝯferãt: q2 nõ bñ appro
ꝑient̃ ꝑꝑ difficultatẽ cognitõis nõ noceãt ꝑꝑ gñandi ma/
litiã ⁊ nãlẽ diſpõnẽ ꝑmutẽt.ex hoc.n. q̃ aliq̃ etate diſpoſi/
ta erat fiet idiſpoſita ſemꝑ.Si ṽo accñtal' fuerit agẽdũ eſt
caute ſil'r ne cũ fortib⁹ ⁊ periculoſis ac irrõnabilib⁹ fiat vt
ſtolidi agũt ⁊ iꝑiti cũ qb⁹ nõ equãt:ſꝫ diuerſificãt:nõ cõ
temperãt:ſꝫ diſtẽperãt magis: ⁊ in prauas diſpõnes adue/
niũt.⁊ ſic gñationẽ nõ ꝓcurãt:ſꝫ iterẽptõꝫ magis: vt ergo
caute ⁊ tute agam⁹ ſpãlẽ in adequãdo eos ſic ꝓſeq̃mur i/
tentõeꝫ. Cõſiſtit aũt in trib⁹ reb⁹.in cãe ſterilitatis abſci
ſſiõe.in ſeminũ vtriuſqꝫ ꝯfortatõe.⁊ in apti modi coeundi
ad gñatõeꝫ opportuni iuẽtõe. Spãlis itẽtio eſt quã ex di/
miſſiõe gñal' accipiẽtes in actũ deducim⁹ cũ ſpãlib⁹ ⁊ pro/
ꝓrijs medicis. ⁊ eſt vt ſi qdẽ ſterilitatis cã in ſeie viri affue
rit abſcindat̃ varijs auxilijs ſm̃ varietatẽ cãꝝ:vt q2 ſi fue
rit ex mala mã ꝓcreatũ abſcindam⁹ iuuãdo digõnẽ mini
ſtrãdo cibaria ⁊ pot⁹:ſil'r cal'a ⁊ hũida q̃ bonũ faciũt ſãgui
nẽ ⁊ ſpma ſuperexcreſcere. vt eſt ſupra ḋe ſpmate dcm̃. ſi
ṽo q2 fuerit iꝑfectũ i teſtib⁹:⁊ alijs ꝑncipalib⁹ ſuꝑiorib⁹
ſtudebim⁹ ipa ꝑncipalia corrigere ⁊ ꝯfortare cũ alteranti
bus eoꝝ diſcraſiã arõaticis eoꝝ ſpũs ꝯfortãtib⁹ ⁊ m̃ltipli/
cãtib⁹:vt ſup̃ i cura nocumẽti erectõis ẽ dcm̃: nec nõ ⁊ ipꝫ
tꝑe ꝯpetẽti mãdabim⁹ retineri ⁊ raro coire:vel alias eoꝝ
paſſiões auferre:cũ his q̃ ſup̃ i ꝓprijs caplĩs ipaꝝ ſũt ſerio
ſe deſcripta.Sil'r ſi aliq̃ praua affectũ fuerit q̃litate altera
tiõe ꝓdcõꝝ ãboꝝ ſtudebim⁹ illã cũ diureticis notis cal'is
vel fr̃is alterare.Si quoqꝫ ẽ aliquo malo hũore ĩfectũ cũ
mũdificãtib⁹ ſãguinẽ ⁊ purgãtib⁹ abſcindem⁹.Sil'r ſi cor
ruptũ fuerit ex lõga retẽtõe mãdabim⁹ coire freq̃nti⁹:nec
nõ ſi ex cõitate alic⁹ mẽbroꝝ vicinoꝝ teſtib⁹ ⁊ vaſis con/
tigerit vel corporis totius ꝓcuratione ⁊ rectificatione il/
lorum corrigetur ⁊ in rectificatione regimĩs:nec nõ acci/
dẽtiũ exterioruꝫ ⁊ cãruꝫ amotione.ſi ex illis cõtingat.Sꝫ
ſi ex ꝑte iſtr̃i cã ſterilitatis ꝯtigat.q2 ṽga fuerit lõga vl' bre
uis curã nõ hꝫ: ⁊ ꝓꝑe nimis longa. breui.n.vt dcm̃ ẽ ſupra
occurrit vſqꝫ ad vulue orificiũ m̃rix:⁊ cũ õſiderio nãli tra
hit ſpma ſic̃ trahit ipꝫ ꝑ rectũ ibidẽ i nõ violatis. vt ſupra
dcm̃ fuit i oppilõne m̃ricis:⁊ q̃nqꝫ trahit̃ cũ aſſuefactõe ꝓ
iectiõis vẽtoſaꝝ i iguinib⁹:⁊ alijs niſi breuis ſit adeo ꝙ õ/
lectationẽ aliq̃ꝫ nõ iducat:q̃ tñ i aumaſtica etate correctio
neꝫ hꝫ.Si ṽo q2 mollificata ſit:cura paliſis corriget̃. quã
ſupra dixim⁹ i cura neruoꝝ. Porro ſi cã fuerit in m̃rice.q2
ei⁹ collũ fuerit tortuoſuꝫ:vel ei⁹ orificiũ ſtrictũ admiſtret̃
ꝯtinue radij de ſtanno q igroſſent̃ paulatiꝫ: ⁊ iungant̃ adi
pib⁹ lenitiuis:⁊ oleis:⁊ itret balneũ hũectatiuũ: ⁊ ꝯfert in
hoc caſu cõctio cauliũ:cimini:aniſi:apij:⁊ ſiliuꝫ.Et ſi fue/
rit carnoſa nõ curat̃.Et ſi cã oppilõnis fuerit hũor: eũone
cũ yeris cliſterib⁹ ⁊ colirijs:⁊ ꝑticularib⁹: ⁊ ꝓprijs educet̃
Sꝫ ſi qõ fuerit ex m̃ltitudĩe adipis curabit̃ exercitio reſo
lutiuo:⁊ cũ extẽuatiua ⁊ exiccatiua dieta. Balneũ quoqꝫ
exiccatiuuꝫ ẽ ꝯueniẽs:⁊ poſt ipꝫ antidota cal'a exiccatiua.
vt tyria.⁊ theodoricõ:⁊ cliſteria ⁊ ſuppoſitoria exiccatiua:
⁊ vnctiões ex melle albo:⁊ oleo õ ſpica ⁊ lilio. Et ſi fuerit
mala ꝯplõ i ei⁹ ꝯcauo:⁊ fr̃a vel cal'a:ſicca vel hũida:vel q̃li
tercũqꝫ ꝯmixta curet̃ cura malitie ꝯplõnis ipi⁹ ſuꝑi⁹ dcã i
caplõ ꝓpõ.Et illõ cũ dietis balneis enchatiſmatib⁹: cliſte
rib⁹:ſuffumigatiõib⁹: ⁊ ſuppoſitorijs õclinãtib⁹ ad q̃litatẽ
quã diſcraſia exigit.Qꝫ ſi cã ei⁹ fuerit hũor coadunat⁹ i eo
ꝑcedẽte dieta purgabit̃ cũ purgatiõe corꝑis ꝑcedẽte cũ cli
ſterib⁹ ⁊ ſuppoſitorijs q̃ ĩfra dicẽtur. Etiã ſi vẽtoſitas i eo
collecta fuerit ꝓhibẽs a õbita ſpmatũ mixtiõe:curabit̃ cũ
educẽtib⁹ mãꝫ ei⁹:⁊ extenuãtib⁹ vẽtoſitatẽ:vel educẽtib⁹
cã ex ꝓpõ loco ⁊ regiẽ extenuatiuo.Et ex illis ſũt ea q̃ ĩfra
dicẽt̃ in molla ex vẽtoſitate. Et ex ꝓprijs ẽ ariſto.ro.Et ſi
oppilõ fuerit i vijs vaſoꝝ ſpmatꝫ vl' alimñti.curabit̃ ꝑut.ſ.
i cura oppilõnis ẽ dcꝫ.Qꝫ ſi cã fuerit ex ꝑte malitie alimñti
q2 ſã. ſit malus:rctificatõe curabit̃ ⁊ dieta.Et ſi õfect⁹ fue
rit ex ꝑte corꝑis m̃lieris. q2 ꝑter nãꝫ tẽuis fuerit: r̃gie hũe
ctatiuo ꝓdicto emẽdabit̃:⁊ ipinguatiuo qõ ſuo loco xꝑo ꝑ
piciãte dicet̃. Nec nõ ⁊ ſi aliq̃ egritudinũ vl' accñte aliquo
fuerit grauata:cura illi⁹ ꝓpa medicabit̃ q̃ ex dcĩs vl' dcĩs
ẽ colligẽda.Si ãt ex malitia regis:cottilidõcs ꝑlẽi mucila
gie fuerit:⁊ grauati rectificatõe regis ad cal'ꝫ ⁊ ſiccũ ꝑmu
tatiõe curabit̃:aut eductiõe ipoꝝ cuꝫ colirijs ⁊ ſimilibus.
Cõfortatio vero ſeminũ que eſt ſcõa ſpãlis ꝯpletur cũ his
quecũqꝫ digõnes hñt ꝑfectas: ⁊ ſanguinẽ gignũt eq̃lẽ q̃ ſu
ꝑi⁹ i cura ſtõi hũiſti:⁊ mẽbra gñonis ꝑncipalia maxie i ſua
ſolita ⁊ õbita eq̃litate ꝯſeruãt q̃ i ꝓprijs ſũt dcã caplĩs.Si
ergo cãꝫ abſcides. ⁊ cũ talib⁹ ⁊ ſpmata ꝯfortãtib⁹ ꝙ i vno/
quoqꝫ acgrat̃ tẽpies:⁊ ex mixtiõe tẽpatoꝝ maioꝝ tẽperies

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0403-7
DFG

fiet. vl' ſi nō poſ'e fuerit pp īdiſpōnē nāꝝ ſexuū vl' etatuꝫ: tēpieꝫ fieri ī coꝝ quolꝫ ſit diuerſitas ī eis.ꝛ ieq̄litas reſer/uet.qd' ex emiſſiōe vtriuſq; adiuicē reſultat eq̄litas q̄ gēo nis ē cā. Et q2 plīmū diſpō frā ī viris.ꝛ ī mulierībꝰ hūida vl' vtraq; ſterilitatis ē cā.ꝛ plīmū recipiēs curā.abſcīdētia ipā ꝓīde calā erūt:ꝛ ſicca q̄ dicēt īfra ſimplicia ꝛ cōpoſita Cōfortātia quoq; ſemē talia erūt q̄ ſua calitate frītatē al/terēt:ꝛ ſua v̄tute ēt hūiditatē expurgēt ꝛ ſiccēt ſua ꝓpeta/te ꝯfortādo iſtrā gēonis ꝛ ſpmatis ꝯceptū:ꝛ īpgnatiōeꝫ ꝓ/curēt. Et ex cōpoſitis q̄ ſine nocumēto expurgāt ſunt ye re exhibire:cliſteriçate:ꝛ ſuppoſite.Et ex ꝯfortātibꝰ ſt' an/tidota ꝛ ꝯfectōes magne vt mitridatū:diamuſcū tiriaca ñ ois. vt Rapio iqt.q2 nō dyateſerō. vt abo.iqt.de aborſus re gimīe.ſꝫ galiēi vl' andromaci:q̄ cōiter hn̄tur ī vſu.q̄ ñ ſolū īpgnatiōem ꝓcurāt:ſꝫ ēt fetū ī mrīce ꝯſuāt:vt pōit abo. ꝺ medicis approꝓatis loq̄ndo.Et ex ill' ē theodoricū:ꝛ medi camē alchechēgi:vt ſupra ī cura nocumēti erectōis ē dcm̄ Et ex approꝓatis ſimplicibꝰ ſt':vt mulieri det' v̄ria elephā tis:nā ē mirabil' apō ꝓpīgratē coitꝰ ꝛ hoꝛa eiꝰ ꝛ raſura ebo/ris bibita ē pn̄tis iuuamēti cū oſſe ꝺ coꝛde cerui: ꝛ ſemē ſi/ſeleos expťū ē:ꝛ dat' pecudibꝰ feis ꝺ eo:vt ml'tiplicet eaꝝ gēo:ꝛ oleū ꝺ balſamo bibitū euapoꝛatū ꝛ ſuppoſitū: vl' de been ī pēſario ſuppoſitū:ꝛ oleū ꝺ lilio :ꝛ pēſariū ꝺ napta ni gra: coſto:ꝛ adeps anſeris ī lana: ꝛ cū ſingul' aromaticis.ſ. muſco:ſpica:cipo:aneto:origano:ameos:iſopo: bdelio:ꝛ te ſticul' vulpis:ꝛ darſeſebraꝫ ē mirabilis.ꝛ nux cipſſi:ꝛ bace lauri:galia:amomū:cordumēi. Et ex oi calefactio ꝛ ſtipti co ꝓpe. ꝛ ſuppō coaguloꝝ:ꝛ ꝓprie coaguli leporis cū oleo viol.pꝰ mūdificationē adiuuat ad īpgnādū:aut ſuppō ſter coris:ꝛ ꝓpe gagelli maſculi:ꝛ ꝓpe ſi pōat' cū eo aliq̄d teſti culi vulpis: ꝛ ſuppō fimi eiꝰ: vl' fellis adib: vel leporis:vel leōis ī pōder.℈.i.Et ex ꝯpoſitis ſūt q̄ īfra dicēt.¶Seqꝫ ſpecificatio:ꝛ ad actū deductio tertie rei q̄ ē īuentio modi coeūdi ad cōcipiēdū apti.Fiet āt ꝛ cōplebit talit' vt eligāt aptioꝛ hoꝛa:ꝛ ē poſt mūdificatiōeꝫ mēſtruoꝝ.ꝛ tā diu ſtēt ſepati ꝙ gēo ſeiuꝫ fcā ſit bōa ꝛ pfcā vt pfert: nec tñ tm̄ ꝙ corrūpat a frō pp lōgā retētionē:quo caſu oꝫ coire.ꝛ iterū abſtinere moderate.Cū ergo extiatū ē ꝙ ipa gēo fcā ſit vt oꝫ:foueāt ſe ambo cū vſu ꝯfortatiū pdcōꝝ:ꝛ mulier apud itroitū loci poſt fomētatōeꝫ loci cū aq̄ calā ꝺcoctiōis mrī carie:folioꝝ citri camōille:ꝛ ro.fumiget p traiectoriuꝫ cū arōaticis nō valde calidis:vt ē gallia ꝓpe ꝛ ꝯfectio nere. Et vir ablutis pedibꝰ cū calida pdcā aromatica ꝛ inuncta virga cū his q̄ delectationem habent inducere ſupradcis. deueniant ad v̄ba venerea ꝛ excogitādo in actu venereo cum deſiderio mutuo intrent lectum: ꝛ cuꝫ oſculis ꝛ am/plexibus adhereāt iter ſe tāgēdo mutuo vbera ꝛ pectinē: peritoneonē atq; v̄gā. Cū ergo deſideriū cōe coeūdi vtri/q; ꝓcedit valde: ꝯmiſceant ſe ꝯmixtōe nō va ꝛ ꝯpleta: de inde ſe retrahāt ꝛ tāgat qd' eſt iter anū deſup ꝛ vuluā. Eſt .n.ille locus ꝺlectatōis ꝓuocās ipaꝫ:ꝛ alliciēs in oſcul' pla cidis nō ceſſet regrere eā.Cū ergo aduenit hora deſiderij ꝛ vehemētie adherētie vtriuſq; ꝛ icipiūt oculi mutari in rubedinē:anhelitꝰ eleuari:in v̄ba balbutire:ꝛ tāgēdo vul uam iueniēs os aſperū ex ꝯcurſu mrīcis ad ipaꝫ deſiderā/do ſpma:tūc imitāt v̄gā eleuatis coxis cōpleat imittēdo ſperma oppoſitū ori mrīcis:q2 al'r pderet.Studeāt aūt ꝙ in emiſſione ſpmatis ambo ſil' eueniāt in hora. Sit aūt i/miſſio eiꝰ nō cū multa dilatatōe oris ipſiꝰ ne aer īgrediāt ꝗ corrūperet ipm.Et ꝓinde ſugant ambo iſtra añ vt ſtrin gant ꝛ adhereāt meliꝰ iter ſe.Et in emiſſiōe iter ſe adhere ant fortiter ne ſil' cū ſpmate īgrediat aer.Et ſi apud emiſ/ſionē ipiꝰ ſentiat vir mrīcē ꝯcurrere ad caput v̄ge ꝛ ipſam ſtringēdo ſugere eſt maximū ſignū ꝯceptōis ſꝫ.H. Quare tūc oꝫ:vt nō extrahat eā:ſed eā itus dimittat donec ceſſet anhelitꝰ iſpiſſatio:deiñ ſe paulatie retrahat ab ea:ꝛ muli/er ſtringēdo crura leniter in vuluā dimittit:deīde dormi at cruribꝰ ſtrictis ꝛ odoramētis poſitis naribꝰ q̄diu ē poſſe ꝙ nā cōſueuit appetere vel iaceat ꝛ cū expgefcā fuerit.ſi adhuc appetat ſup coeat ꝛ geſcat. Deinde ſurgat ſuauiter abſtieatq; ab oibꝰ q̄ ꝓcurāt aborſū q̄ īfra dicent.¶Ex cō poſitis v̄o medicis ꝛ expꝉtis eſt.confectio ſirupi ꝑparatiui mā̄e frē īpediētis ꝯceptū ad purgōnē. ℞.mrīcarie:pulegij calamēti:radicū enule:acori:radicū enule.altee: feni.ꝛ dā dan'.añ.ʒ.ij.cuſcute.ʒ.ſ.melliſſe:praſſij:ameos.añ.ʒ.ſ.cor ticū citri.ʒ.i.paſſulaꝝ enucleataꝝ:liq.ana.ʒ.i. ciceꝝ:ꝑtē.i. ſuc.lib.i.aceti ſq̄llitici.ʒ.ij.mell' roſa.ʒ.iij.ī pecia rara bul/liāt gallie.ʒ.i.ſpice.ʒ.ſ.Doſis mane.ʒ.ij.cū aq̄ gariofiloꝝ Deide purget' vterq; ſi īdigeat cū yera ꝛ agarico:vl' cū pil/lulis fetidis:ꝛ hn̄dcā:terbentina ſi mā fuerit groſſa valde poſt purgōnē balneet' in aq̄ ꝺcoctōis folioꝝ lauri:menta/ſtri.ſaluie:origani:pulegij: ꝛ ꝑmiſſo ſufficiēti exercitio ex/ercitet'.ꝑmiſſa mūdificatōe corpis vniuerſi mrīcis fiat ex purgatio ſiue mūdificatio:calefactio:exiccatio:ꝯfortatio: mūdificet' ſi expediat:ſꝫ fiat pͦ cliſtere:deiñ ſuppoſitoriū. ¶Cliſtere ſit tale. ℞.pulpe collognthide.ʒ.ij.bulliāt in aq̄ maſt.ꝛ in eiꝰ q̄ntitate.ʒ.iij.diſſoluant' yere gal.ʒ.ij.vl' collo gnthide ꝛ iniciat'.pēſariū. ℞.macis:bdelij:gallie muſ.añ.ʒ. ij.pulpe collognthide.ʒ.i.pulue. yere.ʒ.i. ꝯfice cū laudāo ꝛ fiat pēſariū lōgū:ita ꝙ ꝑueniat ad mrīcis ꝯcauū: ꝛ aliq̄ ad dūt euforbiū.Calefactio exiccatio atq; ꝯfortatio fiet cuꝫ vnctōibꝰ pēſarijs atq; ſuffumigijs ꝛ ꝯfectōibꝰ. ¶Unctio talis ſit ꝛ ē efficax ꝛ expꝉta. ℞.radicis enule cāpane mūde ꝛ trite lib.i.radicis brāce vrſine lib.ſ.ſil'r raſe ꝛ trite q̄ bul/liāt in lib.vij.vini odoriferi albi ſufficiēter cū lardi veteris ꝯtriti lib.ij.mrīcarie.ʒ.i.deide colet':ꝛ colatura ponat' ī ol la noua.ꝛ fac bullire:ꝛ mitte thuris albi:maſt.añ.ʒ.ſ.cere noue.ʒ.vi. Et ex quo ꝑdcā ſūt liq̄facta depone de igne ꝛ ī/mitte puluerē haꝝ ſpēꝝ. ℞.ciamōi:gallie:gariof. fuſticel/li nu.muſ.macis:galāge:ſpice xin.añ.ʒ.ij.croci.ʒ.i.ꝛ aggre ga bn̄ cū ſpatula:deide fac coagulare:ꝛ tūc videbis ꝙ ſup natabit vnctuoſū coagulū ꝛ reſidebūt ſpēs: ꝛ ī medio erit vinū.Utat' ergo eis ſic ꝛ ītret balneū ꝛ balneet totū corpꝰ ſuū cū aq̄ decoctōis folioꝝ lauri:ꝛ iungat totū corpꝰ de ꝑ/te illiꝰ vini ꝛ vētrē ex ſpēbꝰ ꝛ īduat ſe ꝛ recedat.Seq̄ntibꝰ aūt diebꝰ dōec durabit ītret balneū ſil'r:nec lauet ſe: ſꝫ ſu/perungat crura ꝛ brachia ꝛ coxas ꝛ nates ex v̄io. dorſū v̄o ꝛ pectꝰ ex vnctuoſo.Totū v̄o epichaſtrū ex ſpēbus nec co eat cuꝫ ea vir oibꝰ diebꝰ:ſꝫ q̄lꝫ die cū egredit' de balneo. ¶Ad calefaciēdū v̄o ꝛ ꝯfortādū ſumat de trifera hac cū vino.ʒ.ij. ℞.gariofi.ʒ.i.ſiſeleos.ʒ.ſ.raſure eboris çinçi.na/ſturcij:aſſari.añ.ʒ.ij.aniſi:ameos:baucie:karui.ana.ʒ.iij. mellis ēblicoꝝ:ſucci hūani gn̄is: ꝛ mrīcarie: ābre.ana.ʒ.i. mu.ʒ.ſ.Ex his fiat trifera vel vtat' ꝯfectōe dyābre.¶Ca lefactio exiccatio ꝛ ꝯfortatio ēt fiat cū ſuffumigio tali. ℞. ligni aloes:caſtorei:caſſie lignee:ſtora.cala.arōa.gallie.añ ʒ.ij.muſci ābre.ʒ.ſ.ꝯfice cū ſucco cimaꝝ lauri ꝛ ſuffumige tur cū eo. Deinde vero abluat ſe bene.ꝛ coeat vir cum ea mō ꝑdcō:ſꝫ vtat' quolꝫ die iteriꝫ el'rio tali. ℞.ſecacul albi mūdi ꝛ exiccati in aq̄ ſatirionū quoꝝ aq̄ ſit li.i.teſticuloꝝ vulpis.ʒ.vij.radicū rafani.ʒ.ij.baucie.ʒ.ij.pineaꝝ purga taꝝ.ʒ.i.fiſticoꝝ.ʒ.iij.granoꝝ ſiſami.ʒ.ij.çinçi.been albi ꝛ rubei.añ.ʒ.ij.naſturcij:cina.pipis:ſcheille lōgi.añ.ʒ.ſ.ſuc. lib.ſ.olei ſiſami.ʒ.ij.oleū balſami bibitū ꝛ euaporatū ꝛ gal lie fac deſcēdere ꝑfocatā ꝛ mellinatā:ꝛ ꝯfert frigori:ꝛ mū dificat ꝛ exiccat hūiditatē mrīcis : iuuat ad īpregnādū ſꝫ Abo.¶Pēſariū Abo.educēs hūitates mrīcis calefaciēs ꝛ exiccans. Recipe alleuꝫ ſiccum ꝛ humidum ꝛ fundatur quantum ipſa ſunt de oleo roſa. decoquatur donec in eo diſſoluat' ꝛ recedat aquoſitas ab eis:ꝛ ſupponat' cū lana ꝛ eſt mirabile:Suffumigatio ſm̄ eū ad idē fiat ex trociſcis ℞.mirte:ſtoracis , bacaꝝ lauri: ꝛ omni die ſuffumigetur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0404-3
DFG

¶ Alius ſapiõis. Sumat̃ medicia vomitꝰ ⁊ eſtimo ꝙ ſit nux vomica: ⁊ inuoluat̃ i lana ⁊ ꝯburat̃ ⁊ ſupponat̃. Jpa. n. abſcidit hũiditatẽ m̃ricis exñtẽ in tota m̃rice ⁊ mũdificabit valde. ¶ Jdẽ. cliſter̃ ad mlierẽ q̃ hũectat̃ ad ꝯcubitũ. ⁊ nõ ipꝛegnat̃ mũdificat m̃ricẽ ⁊ ꝯfoꝛtat ꝯfoꝛtatõe bona. corticũ thuris: cipi ꝯtriti. añ. ℥. 30. myrre bone. ℥. x. decoq̃ntur in li. iij. aq̃ vſqꝫ ad vnã. ⁊ colet̃ ⁊ cliſteriçet̃ ex ea oĩ die lib. vniꝰ tertia diebꝰ tribꝰ cõtinuis. Si v̾o ſterilitas ex alia cã q̃ꝫ ex humiditate ⁊ frigiditate fuerit: curet̃ cum ꝯrijs: q̃ ex dictis ſunt eligenda.

¶ Caplm̃. xv. de mola matricis.

m Olla a mollon pſice vel grece dcã ẽ: qđ eſt multe carnis ꝑturitio. Latine v̾o ipꝛegnatio ẽ mẽdoſa in q̃ accidũt: ſꝫ raro mulieris diſpõnes ſiles diſpõibꝰ v̾e ipꝛegnatiõis: q̃s hyp. in ſuis rettulit affo. in retẽtõe mẽſtruoꝝ. ſ. ex alteratõe coꝛpoꝛis. ⁊ cãu appetitus ex cõctõne oꝛis m̃ricis. ⁊ deĩde ĩflatõe mamillaꝝ ambaꝝ ⁊ tũoꝛe ventris q̃ auget̃ quotidie vſqꝫ ad q̃ntitatẽ ẽbꝛiõis velut idrops in quo ſentit motũ ſilẽꝫ motui embꝛiõis ⁊ mouet̃ per cõpreſſionẽ dextrã ⁊ ſiniſtrã ⁊ remanet vſqꝫ ad tps nãlꝰ ptꝰ: ⁊ tũc accidit doloꝛ ꝑtus ⁊ anguſtia. ⁊ nõ parit: imo extendit̃ vltra vſqꝫ ad ãnos q̃tuoꝛ: vel qnqꝫ: ⁊ qñꝫ vſqꝫ ad finẽ vite: nec recipit curationẽ: ⁊ qñqꝫ emittit ac ſi pareret aliqđ: qđ eſt diuerſaꝝ ſubaꝝ. qñqꝫ. n. eſt ſic fruſtũ carnis cui eſt foꝛma multaꝝ ſpẽꝝ inaĩati coꝛpis: ⁊ qñqꝫ eſt vẽtoſitas tm̃: ⁊ qñqꝫ ſũt ſupfluitates aggregate aquoſe ⁊ mixte cũ ſãguine plimo ⁊ detumeſcit vẽter. Et cã in gñatiõe haꝝ ſubaꝝ eſt duplex. vna exñs in mã: alia v̾o ĩ efficiẽte. Jn mã qdeꝫ ẽ multitudo mãcĩ ſãguĩee effuſe ⁊ tracte a multa calitate ⁊ ſiccitate m̃ricis poſt coitũ in q̃ m̃rix ꝯpꝛehẽdit ſpma mulieris tm̃. Jn efficiẽte v̾o ẽ duplex. vna ꝑ modũ ꝑuatiõis ⁊ eſt defectꝰ v̾tutis virilꝰ ſpmatis: q̃re nõ gñat vel ꝯcipit hominẽ. Et cã ðfectꝰ ẽ. qꝛ aut nõ ĩteruenerit ſpma virile: nec fuerit admiſſũ in coitu: vt ꝯpꝛehẽderet ipſꝫ m̃rix. ſic ꝯphẽdit feminũ. ſic accidit ĩ ouis vẽti quoꝝ gñatio ẽ abſqꝫ coitu ex calitate m̃ricis trahẽtis ad ſe ſpma mulieris cũ mẽſtruo: qđ ꝯpꝛehẽdit. ⁊ ſilꝰ extendẽdo gñat oua vẽti: aut qꝛ ĩteruenit vt emiſſũ ĩ coitu. ⁊ comp̃hendit ipſꝫ m̃rix cũ ſpermate mulieris ſꝫ fuit ĩefficax ⁊ ĩperfectũ vel ex ſe: vel ex tpe. qꝛ nõ ſilꝰ ĩcidit in m̃ricẽ: nec fuit ſilꝰ cõp̃hẽſuꝫ vt eẽt ex duobꝰ ſpmatibꝰ mixtũ: nec fuit defectꝰ ipiꝰ rõne obiecti: ⁊ mãe. qꝛ ſic mõſtruoſum generaſſet aĩal: nec ratione matricis: quia ſic ſperma muliebꝛe nõ comp̃hendiſſet. Alia eſt per modũ põnis. ⁊ ẽ mlta m̃ricis calitas q̃ ſpma mulieris ꝯpꝛehẽdẽs extẽdit cũ mã illa: ⁊ ðficiẽte dcã v̾tute ĩfoꝛmatiua virilꝰ ſcis nõ ĩfoꝛmat hoĩem. ſꝫ dẽſat in carnis fruſtum ſua foꝛtitudĩe duꝝ adeo: vt ferro nõ leuiter diuidatur. ſic calitas ignis ſuo exceſſu ĩ argillã in latere: nãli ſua eq̃litate coagulat ſãguinẽ ĩ carnẽ bonam tenerã: ⁊ tũc qđ egredit̃ eſt ſilẽ fruſto carnis nullã aĩalꝰ hñs ſilitudinẽ. Cõtingit tñ in meridionalibꝰ ⁊ auſtralibꝰ regiõibꝰ ĩ mulieribus multi ⁊ praui ſãguĩs ex malitia nutrimẽti ſup̃ conceptũ veꝝ qđdã fruſtũ carnis a p̃dcã mã gñari poꝛtãs ⁊ hñs ſpẽm aĩalis. ſ. bubõis vel arpe viuẽs: qđ mulieres ferã appellant: q̃ qñqꝫ embꝛionẽ opp̃mit: perimit ⁊ ĩterimit: ⁊ qñqꝫ cũ eo ĩ ꝑtu emittit̃: ⁊ vt aſſerunt tãte ꝓpꝛietatis exiſtit ⁊ malitie ꝙ ſi cadẽs ĩ terrã hoꝛa ptꝰ moꝛdeat embꝛionẽ ſtatiꝫ moꝛit̃ ferꝰ. Cuiꝰ aĩalꝰ foꝛma ⁊ vita nõ exiſtit a v̾tute ſpmatis viri ꝑmi: ſꝫ erroꝛe ipiꝰ cũ iã aĩal ⁊ hoĩem ĩfoꝛmauerit: ſed ſcđi in coitu ſo emiſſi: cꝰ erroꝛ ꝓcedit ab ĩfluentia ꝯſtellatõis ſeu v̾tutis celeſtis vt Ari. xviij. ð aĩalibꝰ dixit. ⁊ qñꝫ accidit ꝙ illa calitas illã mãꝫ nõ cõdẽſat in ſãguinẽ ꝑ multitudĩe ſui: ſꝫ illaꝫ nã cooperãte digerẽdo diſſoluat ⁊ ꝯuertat in aquoſitatẽ vel vẽtũ qđ emiſſum cũ egredit̃ erit ſic aquoſitas ſanguini mixta vel vẽtꝰ vt dixit Auer.

¶ Signa. Ex ſignis aũt q̃dã ſũt diſtiguentia ĩter mollã ⁊ verã ipꝛegnationẽ. ⁊ q̃dã ĩter eã ⁊ ydropẽ. ⁊ q̃daꝫ ĩter ſpẽs molle. ¶ Diſtinguẽtia v̾o ĩter mollã ⁊ verã ipꝛegnatõꝫ ſt̃ mãifeſta: ſꝫ errẽt in eis prudẽtes in aliqbꝰ: ⁊ ꝓ̃pe ĩ magnatibꝰ. Qm̃ in molla res illa nõ mouet̃ hoꝛa ĩ q̃ ðꝫ moueri: imo nõ mouet̃ oĩo: niſi hoꝛa q̃dã. ⁊ vno tactu: ⁊ ꝓpꝛie ꝑ cõpreſſionẽ ⁊ motũ coꝛpoꝛis: ⁊ alr̃ nõ mouet̃. Jn v̾a v̾o ipꝛegnatõe poſt tres menſes mouet̃ ferꝰ motibꝰ diuerſis ⁊ plibus abſqꝫ ꝯpꝛeſſione ⁊ motu coꝛpoꝛis. Preterea duricies vẽtris in molla vehemẽtioꝛ ẽ duricie v̾e ip̃gnatõis ꝑꝑ cãꝫ p̃dictã: ſꝫ nec ſentit̃ coꝛpꝰ foꝛmatũ in m̃rice. Et ſentit̃ multotiẽs doloꝛ i molla ſilis colice ⁊ apati m̃ricis ꝑꝑ conſtrictionẽ oꝛobi. Et ſt̃ mulieris pedes molles valde cũ minoratõe. ¶ Signa v̾o diſtiguẽtia ĩter ydropẽ ⁊ mollam ſũt: qm̃ duricies in molla ẽ maioꝛ vſqꝫ ad tps: cũ v̾o ꝯuertit̃ ĩ aquoſitatẽ vel vẽtũ illa mã ſenſus cõmotõis vẽtoſitatis ⁊ aquoſitatis eſt mioꝛ i molla q̃ꝫ in aſclite. Et vẽter ꝑcuſſus nõ reſonat ſic in tympanite: qm̃ aq̃ ⁊ vẽtoſitas in m̃ricis ꝯcauo exiſtit recluſa ⁊ ſtricta ⁊ tumẽt pedes in ydrope generaliter: ſed in molla minoꝛant̃. ¶ Diſtinguentia vero inter ſpẽs molle ſũt. Nã ĩ molla cuiꝰ mã ẽ carnis fruſtuꝫ: ẽ duricies maioꝛ q̃ꝫ ĩ alijs: ⁊ grauedo. Et ſilr̃ grauedo maioꝛ ĩ ea: cuiꝰ mã ẽ aquoſitas. ĩ ea v̾o cuiꝰ mã ẽ vẽtoſitas minoꝛ: ⁊ tũoꝛ maioꝛ. ¶ Cura molle ẽ due res. Pꝛia ẽ ꝑfecta euo eiꝰ. qđ p̃ter mãꝫ ĩ m̃ricis ꝯcauo ꝯtinet̃: cũ magis moleſtet. Scđa ẽ diſcraſie m̃ricis: q̃ ipiꝰ cã ẽ alteratio. Jnq̃t. n. G. Nõ ẽ poſſe aliq̃ꝫ diſpõeꝫ curare finalr̃ adhuc manẽte faciẽte eã cã. ¶ Pꝛimã rẽ ꝯplẽt duo. ꝑmũ ẽ qđ mãꝫ ad euonẽ adeq̃t ⁊ diſpõit. 2ᵐ qđ ipaꝫ educ̃. Diſponẽtia ſt̃ regimẽ cũ dimiſſiõe exercitij: ⁊ ꝓpe ĩferioꝝ ꝑtiũ: ⁊ ĩ reſupiatiõe in doꝛmiẽdo: ⁊ eleuatõe ĩferioꝝ cũ euonibꝰ. ſ. flõia ⁊ võitu: ⁊ ſoſone cũ pilꝰis feridiſ: ⁊ ꝓpe cũ ſuptõe aq̃ ðcoctõis: ſenugreci. dactiloꝝ ⁊ ſiliũꝫ: ⁊ cũ yera logodiõ euapoꝛatõe cũ pãnis vlꝰ ſpõgijs ĩfuſis ĩ aq̃ v̾tutẽ hñtiũ apiẽdi: ⁊ mollificãdi ſup̃ vẽtrẽ applicatis. Tũc empl̃a embꝛoce ⁊ vnctiões ex illꝰ: ⁊ breuiter cũ his q̃ ꝑtũ facilitãt q̃ ſũt nota: ⁊ dicet̃ ſuo loco. H. n. nõ ſolũ euonẽ diſponũt: ſꝫ ẽt accũtia mitigãt. Educũt v̾o ipaꝫ q̃cũqꝫ foꝛtiter mẽſtrua ꝓuocãtia dcã ſũt: ⁊ q̃ ꝓcurãt dicẽda in aboꝛſu. Ex qbꝰ ſũt antidota magna: vt dyamarte: dyacurcuma magna: tyriaca: ⁊ dyateſſeron ⁊ ſimilia. Qꝛ ſi ꝯtẽtũ fuerit aquoſum educet̃ cũ diureticis: ⁊ vrinã ꝓuocãtibꝰ notꝭ: ⁊ cũ regie exiccatiuo iã noto ĩ cura idropis ⁊ curſus m̃ricis: ⁊ hamecſir nõ paꝝ hꝫ ĩ reſoluẽdo aquoſitatẽ: ⁊ euãdo ipaꝫ ⁊ ſaniẽ: ⁊ educẽdo fetũ moꝛtuũ vlꝰ fruſtũ carnis. Si v̾o vẽtoſũ cũ regie extenuãte: ⁊ educẽtibꝰ vẽtoſitatẽ. ⁊ ꝓpe ex m̃rice: vt ẽ ariſt. ro. ⁊ ꝓpe oleũ ð cheruia ⁊ dactuli ĩdi: q cũ H ꝙ extrahũt molã doloꝛẽ ſedãt colericũ. ¶ Scđaꝫ rẽ ꝯplẽt. q̃ malã ꝯplõnẽ m̃ricis calꝰam ⁊ ſiccã alterãt ĩ ꝓpo dcã caplo. Ex qbꝰ ſũt r̃gimẽ ĩfratiuũ notũ diuretica fra. Tũc euapoꝛatões: ⁊ ẽpl̃a cũ vnctiõibꝰ cũ f̃ris ⁊ hũidis naſcalia ex mucilagibꝰ f̃ris: ⁊ ex pigu̾edibꝰ: ⁊ oleis f̃ris: ⁊ ꝓpe q̃le ẽ oleũ alchechẽgi: ẽ. n. ĩ hoc vehemẽtis iuuamẽti. et exꝑtũ ad educẽdũ ferã ẽ comeſtio radicis poꝛroꝝ cũ placẽtulis: ⁊ ſuccis radicũ: rapiſte bibitis ⁊ radices.

¶ Cap. xvi. de nocumẽtis partus: ex qbꝰ ẽ difficultas.

q Uid ſit ptꝰ nãlꝰ ſupiꝰ hũiſti. Et qdẽ ipe plimũ ẽ facilꝰ: ⁊ qñqꝫ difficilꝰ. facilꝰ ẽ q cirꝰ ẽ: ⁊ cũ leuibꝰ accñtibꝰ. difficilꝰ v̾o ẽ illi ꝯriꝰ. Et ẽ: aut ex cãis ĩtrinſecis ⁊ eẽntialibus: aut extrinſecis: ⁊ accidentalibus. Pꝛio modo eſt duplex: aut ex parte parientis: aut ex parte embꝛionis. Ex parte pariẽtis multiplr̃. Aut. n. erit ex pte matricis ĩ ſe: aut vicinãtiũ mẽbꝛoꝝ cõitate: aut coꝛpis totiꝰ. Ex pte m̃ricis. qꝛ ſit ꝑua. qꝛ ꝯcepit añ duodecimũ ãnũ: vt dixit Abolicꝫ illud rariſſime ſit. Aut qꝛ eſt ꝯſtricta ĩ collo: ⁊ oꝛificiũ eius naturaliter vel accidentaliter. quia ĩteruenit aliqua cauſarum oppilationis eius non recipiens curam. Et ex his q̃ ſuo loco ſunt dicta: vel ſiccitas vel ap̃a: vel ſunt vlce

ra ꝑcreata ragadie ⁊ emoroydes: coãguſtatões colli ⁊ ori/
ficia: vt nõ recipiant dilatationẽ abſqꝫ dolore graui. Ex p/
te vicinantiũ mẽbroꝝ: vt qꝛ fuerit veſica apata: vlcerata:
vel ſciſſa: cꝰ cõpaſſiõe nõ valet mrix ſuã opationẽ ꝯplere:
vel ẽt iteſtina ſint ſilr paſſa: aut qꝛ fuerit in ano vlcera: ra/
gadie: ⁊ emoroydes gbꝰ mrix ꝯpatiť: v repleõ iteſtinoꝝ
ex fece ſicca ꝯprimẽte: aut qꝛ ſint lacerti ventris tenues ⁊
debiles in iuuãdo fetꝰ ex mrice expulſionẽ. ſic iuuãt expl
ſiones fecũ ⁊ vrine maxĩe cũ ſint pauci vt. H. ait in iteriori
bus. Ex pte aũt totiꝰ corporis: vt qꝛ ſit debil. vel rõne cõ/
plonis: qꝛ ſit nãe frẽ q̃ hꝫ defectas opatões ex neccitate vt
H. dixit: vel rõne etatis: qꝛ puella multũ: vel antiq̃ ⁊ dura:
vel hitudis: qꝛ ſit tenuis ſicca valde vel pinguis: vel rõne
ꝯſuetudis: qꝛ fuerit iſueta ⁊ pmo pariẽs ⁊ timida ⁊ parue
tolerãtie. q̃re eſt ingeta: ⁊ vehemẽtis pmutatõis pducen
tis ad alteratõeꝫ figure ĩfantis ad icõueniẽtiã expulſiõis
ipſiꝰ. Sꝫ ſi ex pte embriõis. hoc erit dupl: aut ipſius in ſe
aut pp ſcdinã. In ſe ãt pp ſexũ. qꝛ fuerit ſemineus: vel p/
pter quãtitatẽ aut cõtinuam quia fuerit magnꝰ valde vel
puus carẽs bona ꝯplone: aut diſcretã: qꝛ fuerit multi nũe
ro diſticti: vel qꝛ vnꝰ plã mẽbra hñs ⁊ ꝑpe capita: vt mon
ſtruoſus: vel pp q̃litateꝫ: qꝛ fuerit lenis valde. qr effugit a
ꝯpreſſiõe: vel p modũ ⁊ ieptã figurã egrediẽdi: vt cũ egre/
diť ſup pedes ſuos: nec manꝰ eiꝰ ſũt plicate ſup coxas ⁊ iũ
cte: aut ſup vnũ pedẽ aut ſup latus eiꝰ ⁊ ẽ deterior modus.
Uel pp icõueniẽtiã tẽporis: vt qꝛ itempeſtine moueať ad
exitũ: vel añ tps ꝺterminatũ: ⁊ ꝑpe in tribꝰ mẽſibꝰ medys
gbꝰ ligamẽta ſũt fortia ſm. H. aliq̃ cã cogẽte ex his q̃ abor
ſum faciũt: vel poſt tps: vt qꝛ accidat ei aliq̃ ex debilitanti
bꝰ cãis vel mors: qr defiĉ alter mouẽtiũ. Propter ſcdinaꝫ
vͦ aut eſt: qꝛ ſit dura ⁊ groſſa nõ recipiẽs fetꝰ. aut qꝛ ſit te
nera cito diſruptõeꝫ patiẽs. qr egrediant hũiditates ⁊ aq̃
añq̃ fetꝰ egrediať. qr hũiditate lubricãte carebit. Porro
q eſt ex pte extriſecꝰ accñtiũ erit ex pte regis in. vi. rebꝰ ñ
nãlibꝰ. Ex gbꝰ eſt multa frĩtas ⁊ ſiccitas aeris conſtrigẽtis
mẽbra ptus. ⁊ accidit ĩ regiõibꝰ ⁊ vẽtris ſeptẽtriõalibꝰ: ĩ pi
bꝰ ⁊ ꝯſtellatõibꝰ vt hyp. dixit ĩ ſuis affo. cũ ingt. Et multa
calitas reſoluẽs vtriuſqꝫ ṽtutẽ: ⁊ ꝯſuetudo ciboꝝ põticoꝝ
⁊ potuũ ſtipticoꝝ: ⁊ balneatio in aqs aluioſis ⁊ frĩs. ⁊ accñ
tia aĩe: vt triſticia: dolor vel egritudo ṽtutẽ debilitans: fa/
mes ⁊ ſitis ⁊ inanitio: vigilie ſupflue deyciẽtes ṽtutẽ. ⁊ ſi/
milia. Et ex ill obſtitricis error ĩ pcurãdo. Et ex hoꝝ ꝯtra
rys ꝑuenit facil ptus. Et qdẽ cũ cãe ſũt fortes ĩ ꝓhibẽdo
ptũ ⁊ corpꝰ debile ĩ ſuſtinẽdo moritur ptꝰ ⁊ pariẽs: lꝫ vt q/
dã dñt poſſit viuere ptꝰ ſi ſtati mr in vtero icidať ⁊ extra/
hať: cũ adhuc poſſit hre ſpũ euẽtatũ aliq̃diu: qᷓ inuit. H.
de iteriorıbꝰ ſexto. loquens de hedo tracto ex vtero mrĩs
paccipiẽte lac vino a nã ꝑmoto nõ docto. Et q̃nqꝫ viuit p/
tꝰ ⁊ moriť mr: vtplimũ tñ moriť ptꝰ ⁊ viuit mr: q̃ñ mlto
tiẽs difficultas ptꝰ pduĉ ad rupturã vene ĩ mrice: qr acci/
dit ſãguis fluxꝰ. Et q̃nqꝫ ĩ pectore ⁊ pulmõe. vñ fit ſputuꝫ
ſãguis ⁊ ptiſis. Et q̃nqꝫ ad iciſioneꝫ neruoꝝ ⁊ lacertoꝝ pp
vehemẽtiã tenſiõis: qr accidit ſpaſmꝰ. Et q̃nqꝫ ad fiſſionẽ
mirach vẽtris ⁊ ꝑpe in puis ⁊ teneribꝰ. qr accidit ruptura
Et q̃nqꝫ hocrũ pp retẽtionẽ anhelitꝰ: nõ exprimẽdo iflatõꝫ
iflãmãtẽ ⁊ trahẽdo mãꝫ cũ cõdẽſatiõe eiꝰ ĩ gulã. Ob quã
rẽ aliq puiſiõe vtẽtes conati ſũt ꝓhibere pgnatõꝫ ĩ talibꝰ
⁊ ꝑpe puis ⁊ antiqs debilibꝰ. ꝯſãtes meliꝰ fore pdere fi/
liũ ꝑcreãdũ q̃ ꝑcreatũ ſil ⁊ mreꝫ. Et hꝰ cũ obmiſſiõe for
me ipregnatõis ĩ caplo de cura ſterilitatis dcẽ: ⁊ miſtratio
ne oĩs cãe ſterilitatis: cꝰ ipreſſio ſit emẽdabil in tpe ꝯſecu/
tiõis augmẽti ⁊ fortificatõis adepte. ⁊ hoc ne oĩ tpe ſteril
pſeueret. Et de ꝓhibẽtibꝰ a ꝓprietate q̃da ſũt: q̃ approxia
ta añ coitum illud faciũt: vt cãphora ſũpta plima: ⁊ empla
tio teſtiũ cũ iuſqamo nigro ⁊ ſuppõ alkitrã: ⁊ iunctio virge
cũ eo. Suffumigatio cũ corticibꝰ edere poſt mẽſtrua: ⁊ olꝫ
balſami cũ ceruſa: ⁊ mẽta ſcoria ferri. Quedam ſũt q̃ poſt
coitũ approximata illud agũt: vt pip ſuppoſitũ ⁊ ſtercꝰ ele
fantis ſuffumigatũ aq̃ albedarogi ſumpta ⁊ ꝑpe ĩ debili.
Quedã añ ⁊ poſt mẽſtrua illõ opanť: vt pulpa granati: alu
mẽ: ſũmitas caul ⁊ ſemẽ eiꝰ apud mũdificatõꝫ. Et poſt coi
tũ eſt ĩ hoc fortis ⁊ ꝑpe q̃ñ poniť ĩ alkitran ⁊ ſubmergiť ĩ
calamẽto. Et ſuppõ folioꝝ alhurab poſt mũdificatõeꝫ ⁊ p
prie q̃ñ ſunt ſubmerſi in aq̃ coꝝ. Et ſilr pulpa collogntide
⁊ albegueſtẽ ſcorie ferri: caul ⁊ ſemẽ eiꝰ: ſcamõce añ. eq̃liũ
ptiũ ⁊ aggregatãꝝ in chitrã ⁊ ſuppoſita. Et multotiẽs ptꝰ
difficultas pduĉ eas ad alias diſpõnes ⁊ accñtia: quoꝝ ĩ fi
ne faciemꝰ h ſmonẽ. Et multotiẽs ptũ nãlẽ ſeqť fluxꝰ ſan
guis ⁊ retẽtio eiꝰ: q̃ illiꝰ ẽ cã. ⁋ Signa ex his ſũt ſigna diffi
cultatis ipiꝰ. ⁊ ſigna facilitatis. Et ex ſignis difficultatis q̃
dã ſũt bona: q̃daꝫ mala. ⁋ Signa vͦ difficultatis ex cãis
pdcis pcipies ex anguſtia ⁊ ãxietate: ⁊ ſi dolor fortis ſit añ
ptũ nõ declinãs iferiꝰ. ⁊ ſi declinat eiꝰ dcliatio ẽ ad poſte/
riora. Et ſi difficulter parere ſit ꝯſueta. ſigna facilitatis ſt
ꝯria: ⁊ ſũt vt apõ ptuꝫ ſentiať dolor puꝰ ⁊ declinet iferius
ad añriora: ⁊ ꝯſueta fuerit faciliter pareř ⁊c. Signa quoqꝫ
bona ĩ difficili ptu q̃ faciũt acgreř ſecuritatẽ ſũt ingetudo
⁊ motꝰ fetus: dolor declinãs ad inferiora: ⁊ anhelitꝰ bonꝰ
cum virtutis potentia. Signa vero mala econtra ſunt in/
telligenda. Et cum pducunt ad ſudorem frigidum: pulſus
frequentiam. debilitatem ⁊ ſincopi ſunt peſſima: ⁊ mortis
feſtine pua. Signa vero cãꝝ ſũt nota ex p̃ñtia ſeu antecel
ſiõe ipſoꝝ ⁊ regiminis ꝑcreantis ipſas: Signa gemelloꝝ et
hũiſti. Signa vͦ mortis ipiꝰ ſũt puatio motꝰ ꝯſueti: nec ex
ſe moueť ſꝫ motu pgnãtis. ⁊ ẽ ſiĉ lapis q moueť de latere ĩ
latꝰ apõ decubitũ: ⁊ iſſať ſumẽ exñs añ caſm. Et detume/
ſcũt mãmille ſiĉ hyp. dixit. et q̃ñꝫ currũt hũitates virulẽte
fetide ex mrice: ⁊ ꝓfũdãť ocli pgnãtis: ⁊ coꝝ albedo fit fu
ſca. Et fit ifratio extrẽoꝝ: ⁊ diſpõ ypoſartica. ⁋ Cura. ĩ dif
ficili ptu duplex ẽ regimẽ necariũ. Unũ añ horã ipiꝰ. aliõ
in hora. Ante horã qdeꝫ ẽ oĩs cãe exterioris ablatio: ⁊ inte
rioris ex pte patiẽtis q̃ pter nãꝫ ẽ ipediẽs ipm ablatio ſi q̃
poſſibilis ẽ: ſi nõ ſit poſſibilis: vt qꝛ nãlis ſit diſpõ habilita/
tio ipiꝰ quoquõ vt ptus facilis ſõſeq̃ť. Abſciſio qdẽ cãꝝ cõ
pleť cũ ꝯrys q̃ in ꝓprys dicta ſũt caplis: de cura mrĩcis ve
ſice ⁊ inteſtinoꝝ ⁊ ani. debilitatis neruoꝝ ⁊ totius corpis.
Diſpõ vͦ ⁊ habilitatio oĩ cãe ẽ ꝯueniẽs ⁊ cõis. Cõpleť aũt
cũ apiẽtibꝰ ⁊ mollificãtibꝰ reddẽtibꝰ mẽbra tractabilia ⁊
ad extẽſionẽ ⁊ ꝯpſſionẽ apta ⁊ ꝑpe in pua ⁊ antiqua ⁊ no/
uiter pariẽte: q̃lia ſũt cala ⁊ hũida ⁊ leniẽtia ⁊ lubricãtia ſũ
pta iteriꝰ ⁊ iniecta ⁊ exteriꝰ p omnẽ modũ approximata vt
ſũt iura pĩguia carniũ ⁊ ꝑpe gallinaꝝ iuuenũ ⁊ pinguiũ ⁊
olea leniẽtia ſũpta ⁊ mucilagĩes ſeminũ citonioꝝ ⁊ lini da
ctiloꝝ ⁊ ſimiliũ. Et via matura liphata nõ frĩa valde: ⁊ oẽ
regimẽ humectatiuũ pter qᷓ ipinguat valde. Et iterdican
tur ſtiptica ⁊ põtica ⁊ hoc p mẽſeꝫ añ. Cũ vͦ appropinq̃ť ho
ra qꝛ incipiat ſentiř aliq̃s grauedies ⁊ dolores approximẽ
tur tũc ſeſſiões ⁊ euaporatiões cũ ſpõgys pãnis ⁊ alys ap
propriatis frequẽter ex aqs decoctiõis altee ⁊ malue folio
rũ fẽugreci camõille corone regis ⁊ capill veneris. balnea
aũt vlia raro. ſũt. n. ex reſoluẽtibꝰ ⁊ debilitãtibꝰ frequẽter
approxiata: Et pꝰ ipſa vnctiõeꝫ de pinguedibꝰ ⁊ oleis ⁊ mu
cilaginibꝰ ⁊ medulle: ⁊ cerotaria: ⁊ ex illis circa dorſum vẽ
trẽ ylia renes ⁊ coxas. Et iniectiões cũ cliſteribꝰ eorũdem
cũ reſupinatiõe deiectiõe capitibꝰ ⁊ cruribꝰ ⁊ ꝑpe vbi ſic/
citas mrĩcis ſit cã ⁊ etiã corpis vniuerſi. Et ex illis ẽ coitus
frequẽs ⁊ ſuffumigatio cũ arõaticis vt muſco ãbra ⁊ gallia
vt vulua deſcendat ⁊ mũdificatis inteſtinis ꝯfortetur ci/
bis bonis multe qualitatis ⁊ pauce quantitatis ⁊ potibus
vini odoriferi ⁊ exerciteť plus ſolito. h. n. addũt in neceſſi
tatem attrahendi aerẽ ⁊ diminutioneꝫ nutrimẽti ẽbriõis
⁊ deſcenſum ipſiꝰ: q̃re ad exitũ pparať. Regimẽ vͦ horã

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0406-4

ptus ⁊ eſt cū ſentiat grauedies ⁊ dolores ⁊ hūitates aliq̄ i/
cipiūt apparere: eſt duplex: vnū eſt igeniatiuū ad deſcēſū
facilē ⁊ egreſſuz: cāꝫ ꝗꝫ ex pte embriōis abſcindēs. Aliō ē
mitigatiuū accn̄tiū. Primū eſt vt cū talia appareāt p̄cipia
tur mulieri: vt ſedeat hora vna: deinde ſurgat ⁊ ambulet
ſaltando ⁊ aſcēdat grad⁹ ⁊ deſcēdat grauādo ⁊ clamet vel
teneat anhelitū fortiter ⁊ p̄mat ylia ſua ⁊ des lentē ad bi/
bendū amarā: qm̄ facit deſcēdere ipm: deiñ cū ſentiat os
mr̄icis aperiri ⁊ hūiditates ampli⁹ emanare ſedeat i ſella
pforata poſito puluinari poſt ipam: obſtetrixꝗꝫ ſtet coraz
ipa: ⁊ iſpiciat diligēter embriōis motū ⁊ pariētis act⁹ quos
regulet ſuis manib⁹ vnctis oleo ſiſamio de lilio vel amig/
dal' dulcib⁹ itus in vuluā itromittēdo ⁊ tangēdo ſuauiter:
put ſua docuit experiētia lōga: patiētēqꝫ dirigat ⁊ cibis et
potib⁹ ac v̄bis pſuaſiuis ⁊ de cito ptu ſalubri ⁊ maſculino
ꝯfortet. Qꝫ ſi mulier fuerit piguis nō ſedeat: ſed iaceat ſup
ventrē ſuū ⁊ ponat caput ſuū ſup petrā ⁊ genua ſua curua
ta ſub vētre vt cōp̄mat̄ mr̄ix ⁊ piguedo aſcēdat: ⁊ nō deſcē
dat ad os mr̄icis: ⁊ ꝯprimat os ei⁹ ⁊ pariat i forma q̄drupe
dū: cūqꝫ nō pariēt: ⁊ accn̄tia itendant̄. ⁊ ſic pt⁹ fiat difficil':
oꝫ vt reiteret̄ regimē p̄mū: qm̄ facilitabit ⁊ mitigabit ac/
cidentia ⁊ dolorē: ⁊ fac eā fortiter ſternutare vt hyp. dixit
ore ⁊ narib⁹ cōprehēſis. fortaſſe. n. pariet. Qꝫ ſi nō ſufficiāt
tūc ſuccurre cuz iſtro quo os mr̄icis apit̄ ⁊ ſuppoſitorys ⁊
ſuffumigus ⁊ medicis ex pillis: ⁊ alys alleuiātib⁹ ptuz q̄ i/
fra dicem⁹. Cūqꝫ aptū eſt os ei⁹ ⁊ appet ſcōina ſcit̄ ꝙ fet⁹
exitus appropinq̄t. Qꝫ ſi tardat ſiccā ſcōine: qꝛ cito ſcin/
dat̄ ꝯprimat ſe pariēs vt ſil' cū exitu aquoſitatis exeat fe/
tus. Qꝫ ſi nō p⁹ linitōib⁹ ⁊ iiectiōib⁹ ex leniētib⁹ ⁊ lubricā/
tibus adiuuet̄ ⁊ alys. Qꝫ ſi nō ſcindit̄ pp groſſiciē ſuā opꝫ
ꝙ ſcindat̄ vnguib⁹ obſtetricis vel forficib⁹ aſſūpta ex ea i
digitis aliq̄ pte eius ne fetū attingat ⁊ ledat. qꝛ ſi fet⁹ nō ē
ꝯplet⁹: ⁊ tūc ſua fortitudie nō egrediat̄ ſciſio nocebit: qm̄
exitu aquoſitatis ſiccabit̄ mr̄ix. q̄re fet⁹ nō poterit lubri/
care. ſicqꝫ elōgabit̄ pt⁹: ⁊ embrio ñ curabit̄ ⁊ pibit. nec ſuc
currere poterūt iunctōes ⁊ cerota ſupradcā. Porro ſi cā
tarditatis fuerit embrio ſua q̄ntitate: qꝛ fuerit magn⁹ ⁊ p/
prie caput ſuū: iuuet obſtetrix in dilatatōe vulue colli mr̄i
cis ⁊ oris ei⁹ iponēdo manū ſuā ſuauiter oleis ⁊ cerotis di
ctis: ⁊ oñdis calefactis iunctā. Et ſil'r ſi femina fuerit ⁊ ge
melli. Qꝫ ſi pp ineptū modū ⁊ figurā iceptā egrediendi. pu
ta: qꝛ egrediat̄ ſupra pedes ei⁹ manib⁹ ⁊ brachys nō adhe
rētib⁹ coxis quo caſu habilitāde ſūt man⁹: ⁊ brachia ēbrio
nis cū vnctōib⁹ ⁊ cerotis ⁊ ſuaui obſtetricis tractiōe ⁊ pa/
riētis forti exp̄ſſiōe. Sed ſi ſup alteꝝ pedē egrediat̄ oꝫ vt
nō ſedeat: ſꝫ iaceat crurib⁹ eleuatis ⁊ deiecto capite: obſte
trixꝗꝫ manu ſua reponat pedes ſuauiter: deiñ reuoluat̄ pa
riēs reuolutōib⁹ p̄l'imis: donec ēbrio reuoluendo ſe caput
ſuū iclinet iferi⁹ ad portaz egreſſiōis: ⁊ ex tūc ſedeat. Qꝫ ſi
nō ſit illud poſſe ſubtili igenio pedē itromiſſū iuuat cū al/
teratōe ſi poſſe eſt: ⁊ vtrūqꝫ ſil' app̄hēſuz manu iuncta cuz
olo yrino trahat ſubito: ſꝑ piētē ꝯfortādo poēz modū. Qꝫ
ſi nō ſit poſſe. ⁊ p̄moriat̄ extrahat̄ put ifra dicet̄ i mortuo.
Et ſil'r igeniādū ſi ſup latus ipꝫ egredi ꝯtigat. Qꝫ ſi diffic'
tas accidat cā mortis: p̄miſſis p̄dcis facilitabim⁹. ſi ñ egre
diat̄ ſuſpēdat̄: cū vncinis extrahat̄: ⁊ feſtina i hoc añq̄ꝫ in/
flet̄ ⁊ pariēs debilitet̄ ⁊ ſincopiçet̄. ꝙ ſi itegre trahi nō poſ
ſit icidat̄ ſi poſſe ē: ⁊ fruſtati extrahat̄. ꝙ ſi nō ſit iciſio poſ
ſibil' ꝯq̄ſſet̄ manu ⁊ rūpat̄ vt facile extrahat̄. Et ātiquoꝝ
q̄dā igeniati fuerūt ad iueniēdū regimē i extrahēdo illuz
alio mōꝫ⁹ nos relōnē dimiſim⁹ pp puitatē fiducie in ipo.
Et nitit̄ ad medicias q̄ꝝ vſus ſalubrior eſt. Et ex medicis
trahētib⁹ fetū mortuū: q̄dā ſūt ſimplices: q̄dā ꝯpoſite. Ex
ſimplicib⁹ v̄o ſūt kemeſir: qō eycit fetū v̄tuoſe: nec hꝫ paꝝ
in hoc ſic ē in educēdo aq̄ꝫ. ⁊ ſeñ thimi qō eycit fetū mor
tuū: armōiacū: balſamū: oppoponacū: caſtoreū: gētiane ra
dix: darſeſehan ſuppoſitū: ⁊ gūmi: oliue: ariſto. vtraqꝫ bibi
ta cū myrra ⁊ pipe extrahit ēbriōnē: ⁊ naſturciū ⁊ totū: qō
eſt cicere medietas: lachryma: almuſech: ſuppoſita extra/
hit fetū camedreos: ⁊ thurides ⁊ laudanū ſuppoſitū i peſ
ſario extrahit fetū mortuū: meſcatrameſir ſuffumigatū ⁊
bibitū ⁊ myrra. Et cū ex narciſco bibunt̄. ʒ. iy. cuz aq̄ mell'
eycit̄ fet⁹ mortu⁹ ⁊ viu⁹. oleū yrinū: arthanita rubea. pip:
radix ſil'r cū bibit̄. ʒ. i. ⁊ ſupponit̄ extrahit fetuz. Cētaurea
coſt⁹ ⁊ galbanū ſuppoſitū: ⁊ cuſſus ſuppoſit⁹: abrotanū: ro
ba ſuppoſita: ablutio cū athaleo ⁊ ſucc⁹ eius qñ ex cortice
ſerbim fit ſuffumigatio extrahit fetū: lactuca aſini bibita
⁊ ſuppoſita: ablutio cū athaleo: ⁊ iunctio vētris ⁊ yly ex eo
⁊ ſucco ei⁹ eycit fetū fortiter. Et hermodactil⁹ vt in p̄cedē
ti caplo dcm̄ ē: nō hꝫ ptē in educēdo ipꝫ fetū mortuū ⁊ mē
ſtruū. Cōpoſita ſūt q̄ ex his ꝯponunt̄ ⁊ i ſūma oēs medici
ne educētes v̄mes ⁊ aſcarides ſupi⁹ nūerate fetum extra/
hūt ⁊ educūt. Ex facilitātib⁹ v̄o ptū: q̄dā ſūt ſimplicia q̄dā
ꝯpoſita. ⁊ ex ſimplicib⁹ q̄dā ſūt talia a nā ⁊ a ꝓpetate: q̄dā
a propetate ſolum. Prima ſunt vt cortices caſſiefi. pulue
riçate date cū vio: ⁊ ē exptū bonū ⁊ efficax: ⁊ ē ſumere i po
tu aſſā ⁊ caſſiā: ⁊ ē bonū ⁊ vltimū: ⁊ ſil'r cinamomū: qm̄ al/
leuiat ptū ⁊ accn̄tia. Et iteꝝ d̄coctō folioꝝ altee romane ī
aq̄ ⁊ ſeſſio i ea fac illa. Et aq̄ fēugreci faſeoloꝝ: ⁊ capil. ve.
ꝯtritoꝝ ⁊ diſſolutoꝝ i ſyrupo roſ. ⁊ aliq̄ꝫtulo oleo yrino. ⁊
datū i potu croc⁹ ⁊ ſiſeleos facilē faciūt ptū i oīb⁹ aīalib⁹.
Scḋa ſunt erugo ferri: lutū creticū ſuſpēſum ſup p̄gnātes
conſeruat pregnātes ⁊ tenere in manu ſiniſtra magnetem
⁊ linitio eius cuz cinere vngule aſini: ⁊ equi eſt vltimum
⁊ ſuffumigatio cum ea: ⁊ ſuffumigatio cum oleo piſcis ſali
ti: ⁊ ſuſpenſio lapidis aquile ſuper coxam eius: aut matri/
carie affricane facilē efficit ptū: ⁊ ſine dolore. Et ex his ſūt
v̄ba ſcā: ⁊ ſunt ex his q̄ ꝓcurāt ipꝫ ſcitū: ⁊ illō vt i vno ciffo
d̄ vitro ſcribat̄ exteri⁹ pſalm⁹. Miſerere mei d̄s a p̄ncipio
ei⁹ vſqꝫ ad v̄ſuz. Dñe labia mea apies excluſiue cū pēna ⁊
attramēto: deide lauet̄ cū aq̄: ita ꝙ oēs lr̄e ſint ablute cuz
ea: ⁊ det̄ ad potādū ei tota: Itē i aure d̄xtra ipi⁹ dicāt̄ h̄ ver
ba. Memēto dñe filioꝝ edon in medio Jeruſalē qui dñt
exinanite cū Pr̄ nr̄ ter. Et ſt̄ alia q̄ faciūt facilē ipm ⁊ ſe/
cuꝝ. ⁊ illō ē vt ſcribat̄. Dixit dñs dño meo: vſqꝫ ad tecum
p̄ncipiū icluſiue i carta ñ nata: ⁊ cū filo d̄ lana p v̄ginē cuz
ter pr̄ nr̄ ſuſpēdat̄ ad collū piētis. ¶ Ex ꝯpoſitis v̄o q̄daꝫ
ſt̄ ēchatiſmata: q̄dā ſuppoſitoria: q̄dā pill'e: q̄dā ſuffumiga
tōes alie. Enchatiſma i q⁹ ſedet̄ ad difficilē ptū. ℞. pulegy
folioꝝ altee: maluaꝝ: fenugreci: ſe. lini lēticulaꝝ amaraꝝ:
vl' herbe ipaꝝ capil. ve. añ. M. i. buliāt i aq̄: ⁊ ſedeat in ea.
¶ Suppoſitoriū ad idē. ℞. ſucci mēte i quo buliat pulpa
collogntide: ⁊ iſuſa lana ſuppōat̄. ¶ Aliō. ℞. ariſto. cū bo
chor mariē: aut ſtaphiſagria: ⁊ miſtret̄. ¶ Aliō fiat ex ell'ō
oppopōaco: ⁊ felle taurino cū melle. fac. n. d̄ſcēdere viuuꝫ
⁊ mortuū. ¶ Suffūigatio bōa. ℞. mirre ſoli⁹ vl' ipi⁹ cū gal
bano ⁊ caſtoreo ꝯfectoꝝ cū felle taurio: ⁊ ſuffūiget̄ aur. i.
¶ Aliō. ℞. ſul. citrini: mirre rub. fell' vaccini: oppo. gal. añ.
ſuffūiget̄ cū eis: ⁊ ſuffūigatō cū ſpolys ſpēt̄ꝫ: ⁊ ſtercore acci
pitr̄ꝫ. ¶ Pill'e facilitātes ptū. ℞. ſauie ptes. y. aſſe arino.
rub. añ. ʒ. ʒ. ꝯfice cū ſuc. vitis. ⁊ da. y. Alie. ℞. ariſt. lō. pipis.
mirte: añ. ptes eq̄les. ꝯfice cuz ſuc. ſiſimbri. ⁊ da. iiy. oi die
cū aq̄ lupioꝝ: ſt̄. n. aborſū faciētes ptū alleuiātes ⁊ mūdi
ficātes mr̄icez fortiter. ſi xp̄s voluerit. ¶ Alie idē opātes
℞. bdely ſ galbidi: mirre: ſauie: ⁊ fiāt pill'e cū caſſiaf. ⁊ mel
le: ⁊ da. v. ¶ Cōfectō ad idē cui nō adeq̄t̄. ℞. mirre: ſtorac
caſtorei. ana. ʒ. i. cina. ſauie: añ. aur. ʒ. ꝯficiant̄ cū melle. da
aur. y. cū vio. Et ex eis ē ēplꝫ: ⁊ cerotū. ⁊ epithīa: qō ℞. pul
pe collogntide. ⁊ ſucci ei⁹ que hūida ē: ⁊ miſce cū ſucco ru
te: ⁊ adde myrre: ⁊ inungat̄ pecten: vſqꝫ ad vmbilicū. Re
gimē āt correctiuū accidētiū p̄dictoꝝ ⁊ alioruꝫ q̄ ꝯtigere
pn̄t ex dictis ⁊ dōis in ꝓprys caplis eſt manifeſtū.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0407-0
DFG

¶ Caplm.xvij.de cura accidentiũ q̃ ſequunt̃ partum.
Liquoꝝ tamen q̃ vtplurimũ ĩſequunt̃ partũ ſa/
a nationẽ afferamꝰ hic ſpãliter:ex qbus eſt febris:ĩ
flatio vẽtris:⁊ doloꝛ eiꝰ ⁊ mr̃icis:⁊ motus eiꝰ: quo
rum cã plimũ eſt ĩperfecta ſanguis mũdificatio poſt ptũ
vt ſupra de nãli partu eſt dcm̃.⁊ de illis eſt debilitas ⁊ ca/
ſus virtutis:cꝰ cã ſanguis fluxꝰ plimꝰ vlceratio ⁊ ruptura
mr̃icis vel vene eiꝰ:doloꝛ ani ⁊ exitꝰ eiꝰ.Sanatio eiꝰ iper/
fecte mũdificatõis eſt ſanatio dcã ſupra caplo de retẽtio/
ne mẽſtruoꝝ.⁊ hic q̃ntũ nece eſt dicimꝰ ⁊ eſt q̄ ſtudeamꝰ ĩ
ꝓuocatõe ⁊ pfecta eiꝰ mũdificatõe cũ diureticis calis q ſã
guinẽ acuãt ⁊ attenuẽt ductus ⁊ vias aperiãt q̃ ſupius no/
ta ſũt:⁊ cũ ĩpellẽtibus mãz ad ĩferioꝛa. Ex qbꝰ eſt ſternu/
tatio ⁊ retentio anhelitꝰ:⁊ cũ trahẽtibꝰ ad ĩfima:vt cũ vẽ/
toſis ⁊ cũ trahẽtibꝰ ⁊ alienãtibꝰ ſimĺ vt ſũt ſuppoſitoꝛia ⁊
ſuffumigatões ſupra dicte. Et ſuffumigatio cũ oleo piſcis
ſaliti cũ cinere vngule aſini.Qꝛ ſi h̃ nõ excuſãt ⁊ debilitas
nõ ꝓhibeat.flomia ſaphene eſt neceſſaria:qm̃ educ̃ ⁊ pro
uocat.Fluxꝰ ẽt ſanguis plimi ſanatio ſupiꝰ dcã eſt de cura
ſupfluentiũ mẽſtruoꝝ.h̃ aũt addimꝰ q̄ cũ appet oꝛ q̄ ex/
trẽa vittis ligent̃ ⁊ ꝓpe manꝰ ⁊ brachia : ⁊ nõ pedes ⁊ ſub
mamilĺ vẽtoſe ⁊ pãni ĩfuſi ĩ aceto ſupponãt̃ vẽtri.Et ſup/
ponant̃ colliria ex põticis vt balauſtys karabe ro. thuris
gallis ⁊ vino põtico.Et ſuſpẽſio ſtercoꝛis vaccini in lana ĩ
coxa eiꝰ ⁊ coꝛtex citri retinet ipm. Sanatio eiꝰ eſt duplex
cũo eius quo retiet̃ ſãguis.⁊ h̃ cũ pdcis ⁊ ꝓpe flomia ve
ne q̃ eſt ſub poplite vel ſaphene:⁊ ẽ alteratio febris. Et ad
illud qdẽ ꝯueniẽs eſt aq̃ oꝛdei alterãs ⁊ mũdificãs vel aq̃
ciceꝝ cũ ea vel ſeia cõia diſſoluta ⁊ granata dulcia ⁊ mu/
ça ⁊ potus aq̃ lactis ⁊ tamarindoꝝ ⁊ mãne:qm̃ alterando
leniũt vẽtrẽ q in eis plimũ ꝯſtipat̃.Et iura gallinaꝝ ⁊ pru
noꝝ decoctio idẽ opant̃ ⁊ nutriũt.Sanationẽ võ ĩflatõis
ventris facimꝰ cũ aqua ciceꝝ ⁊ puluerꝝ cimini ⁊ vini puri
cũ dyamãte vel alkechengi vel ſapino ⁊ origani cũ maſti
ce.Et cliſtere ex attenuãtibꝰ vel naſtale.ẽ.n.ꝯueniẽs ex ari
ſtologia rotũda ſqnãte ⁊ ſtoꝛace liqda cũ doꝛõigi ⁊ çedoa/
ria ſumpta. Doloꝛẽ vẽtris ⁊ mr̃icis cũ enchatiſmatibꝰ ex
anodinis maluis ⁊ fenugreco:ſemĩe cimini ſiſamo radice
altee floꝛibꝰ camomille mellilotí ⁊ cicuta ⁊ vnctõe cũ olo
ſiſamino amig.dul.⁊ vio.⁊ cũ comeſtione tiriace ⁊ trifere
magne cũ vino matricarie vel folioꝝ reſine. Et ſuffumi/
get̃ cũ thure ſtoꝛace:⁊ ſeĩe racemoꝝ rubi añ ſup carbões
⁊ motꝰ eiꝰ ſanatio ſupᷓ dcã ẽ.Ulceribꝰ võ ꝓuidemꝰ cũ his
pmo q̃ mũdificãt ⁊ ſedãt doloꝛes:vt ẽ ſuccꝰ moꝛelle ⁊ plã
tagĩs cũ oleo ro.iniecti vel ſuppoſiti vel albumẽ oui cũ la
cte mulieris ⁊ ſucco poꝛtulace ſedeat in aq̃ ſtipticoꝝ ⁊ põ/
ticoꝝ pdictoꝝ:deide vngat̃ cũ vnguento albo.⁊ alys q̃ in
vlceribꝰ nervoꝝ laudant̃.Et cũ exhibitõe in potu boli ar
meni terre ſigillate:⁊ ſãguis dra. ſucco plãtagis ⁊ iniciat̃.
Doloꝛem ani ſilr curamꝰ: vt ſupra: ⁊ exitũ eius ſilr.Et ex
ꝓprys eſt vt abluat̃ in vino decoctiõis põticoꝝ ⁊ ſupaſp/
gat̃ puluis coꝛnu cerui vſti:⁊ reponat̃ ⁊ qeſcat ⁊ vtat̃ ſtipti
cis:deide leniẽtibꝰ.Sꝫ ſi ſunt vlcerate ⁊ putrefacte notã/
dum q̄ qbuſdã fit vnũ foramẽ ex ano ⁊ vulua pariẽtibus
⁊ matrix ꝓgredit̃ foras.Cuiꝰ cã eſt puitas mẽbroꝝ ⁊ tene
ritas magnitudo fetus ⁊ obſtetricis defectꝰ. ⁊ hoc mulie/
ribꝰ eſt occultũ qbꝰ ſic ſubuenimꝰ.Ab experto conſulimꝰ
vino calo abluat̃ matrix in quo butirũ ſit diſſolutũ ⁊ fom̃
tet̃ diligenter donec mollificet̃.⁊ ex tũc ſuauiter reponat̃
deide ruptura ſuat̃ in q̃tuoꝛ locis filo ſerico:deiñ pãnus li
neus vulue ĩponat̃ ad vulue q̃ntitatẽ:deinde pice liqda li/
niat̃.hoc aũt facit mr̃icez recreari ⁊ teneri pp̄ ſui rupturã
⁊ mũdificãdo cõſolidat.Et collocata ſit in lecto p.xl.dies
talr vt pedes ſint altioꝛes ⁊ abſtieat ab oi motu coꝛpoꝛis
⁊ animi ⁊ balneo.Et q̄ ne talis ruptura cõtingat in partu.
ſic ꝓuideamꝰ.pãnũ in modũ pille oblõge poni facimꝰ ſub
ano ad hoc vt quolibꝫ conatu expellẽdo puer firmet̃ ĩ il/
lo ⁊ illud cõpꝛimat vt nõ fiat pertineon ſolo talis.

¶ Caplm.xviij.de retentõe ſecũdine ⁊ extractõe eius.
Ecundina qꝛ plimũ ſcdo poſt partũ dcã eſt: ⁊ qñꝫ
b ſil cũ fetu.⁊ qñꝫ inuoluta:qñꝫ expoliata. ⁊ qñꝫ
poſt partũ retinet̃.Et cã eſt aut in vtute parientis
q̃ remãſit poſt partũ debilis: aut in ſcdina.qꝛ ſit ĩ ꝓfundo
matricis foꝛtiter alligata ⁊ fixa. ⁊ coadunata in modũ ſpe
re ac cottilidonibꝰ foꝛtiter alligata vel emiſſa aquoſitate
ſicca in matricis angulo remãſit,lubꝛicitate ꝓuata: aut in
oꝛe mr̃icis.qꝛ poſt partũ ſit adunatũ ⁊ hũoꝛibꝰ ꝯcurrẽtibꝰ
pꝛe doloꝛe cõcluſuz.⁊ foꝛtaſſe oẽs cãe ſil cõcurrũt.¶ Si/
gna cauſaꝝ ĩparũ ſũt manifeſta:vbi cã ſcdine .cuius ſigna
ſunt.qꝛ difficilis partꝰ pceſſit:⁊ grauedo in ſupioꝛibꝰ ⁊ digi
toꝝ motio nihil attingit ex ea. Cura extractiõis ſcdine ad
ipius extractionẽ eſt feſtinãdũ.pduc̃.n. retẽta ad pꝛecipi/
tationẽ enixã:vt hyp.dixit.⁊ hoc.qꝛ retẽta coꝛrũpit̃ facile
de ſui nã nõ habẽs regimẽ ⁊ vapoꝛes ex ea mali aſcẽdunt
ad ſtomacũ coꝛ ⁊ cerebrum: qꝛ accñtia pfocatiõis mr̃icis
eã ĩcurrere eſt nece. In extractione aũt eiꝰ eſt duplex regi
mẽ neceſſariũ.vnũ ad habilitãdũ extractionẽ quã ſola nã
facit.aliud ad accidẽtiũ coꝛrectionẽ. Regimẽ ad habilitã
dũ eſt qd ſupiꝰ eſt dcm̃.in cura difficultatis partꝰ.Et com/
plet̃ cũ cibis ⁊ potibꝰ ex confoꝛtãtibꝰ: ex iuribꝰ carniũ coꝛ
dialiũ collati ⁊ non collati:vitellis ouoꝝ:⁊ vino odoꝛifero
⁊ medicinis q̃ ſunt dicte ibidez ⁊ in cãis aboꝛſus dicent̃:⁊
alys extrahẽtibꝰ dicent̃:quoꝝ rememoꝛationẽ facimus
vt ſimpliciũ ⁊ ꝯpoſitaꝝ. Quedã os mr̃icis aperiũt.q̃dã ſe
cũdinã leniũt:⁊ matricez.q̃dã ligamenta coꝛrũpũt ⁊ fran/
gũt:q̃dã ſecũdinã deſcẽdere faciũt. ⁊ ad canalem dirigũt
⁊ ad os mr̃icis educũt:vt exinde cadat.Ex aperientibꝰ:p/
ut ſupra de oppilõne mr̃icis eſt dcm̃ ſunt vcbuen ſuppoſi
tũ ⁊ ſuffumigatũ.oleũ lily ⁊ maioꝛana ꝯfert ad coartatio/
nẽ mr̃icis pducenti ad pfocationez.oleũ de narciſco:⁊ ſpi
num.Scdario valꝫ pꝛefocationi oꝛis mr̃icis:iuniperꝰ:⁊ ſi/
milr galbanũ cũ vino bibitũ calefactũ:cotũ ſinapis:⁊ aga
ric̃. gãgates:⁊ ſemen vrtice cũ vino bibitũ: ⁊ oleum abꝛo/
tani calefactũ aperit os mr̃icis. ⁊ oia diuretica calida. Et
ex exptis que aperiũt ⁊ dſcendere faciũt eſt vinũ dcoctio
nis pulegy bibitũ ⁊ enchatiſmatũ: ⁊ enchatiſma factũ ex
aqua dcoctionis feniculi ⁊ vſnee:⁊ predictoꝝ.⁊ ex illis eſt
inſtrm aptionis oꝛis mr̃icis.Ex lenientibꝰ võ bdeliũ viri/
dꝫ ſuppoſitũ ⁊ ſuffumigatũ:⁊ myrra:⁊ medulle galline:an
ſeris:⁊ anatis:⁊ medulle canabiti:oleũ de lilio ſuppoſita ⁊
inuncta exteriꝰ ⁊ interiꝰ: ⁊ iniecta:⁊ encatiſma cum folys
malue ⁊ altee:brãce vrſine:furfuris ⁊ ſiliuz.Et ex coꝛrũpẽ
tibus ⁊ frãgentibꝰ ligamenta eſt ſuffumigatio cũ ſulfure
vel arſenico:⁊ gũmi: ⁊ folys edere vel naſturcy ⁊ concarũ
Et ex facientibꝰ deſcendere ſecũdinã eſt lens amara cum
vino bibita:gallia ſuppoſita: odoꝛata ⁊ euapoꝛata fetida:
naribus applicata:retentio anhelitꝰ:ſternutatio vehemẽs:
cõpꝛeſſio ylioꝝ.Et ex dirigentibꝰ ad canale ⁊ trahẽtibꝰ ad
os matricis ⁊ faciẽtibus eã cadere eſt vnguẽtũ baſilicum
ĩmiſſum:poſt illud admiſtrat̃ oleũ ro. puluerizata deſup
altea:⁊ ſumptio ſtercoꝛis accipitris ĩ potu.Et ex illis ẽ ma
nus obſtetricis prudẽtis ⁊ expte ex aliquo lubꝛicantiũ in/
uncta ⁊ ĩpoſita:ita vt inuncta ipaz trahat ſi per ſe nõ appa
reat.Cũqꝫ ceperit apparere:tũc tẽdat̃ facilr ⁊ ſine laboꝛe:
vt nõ ſcindat̃ ⁊ abſcindat̃ ſtringat̃ tractũ cũ coſſa mulie/
ris:⁊ conet̃ in ſternutatõe:⁊ deide cõmoueat̃ leuiter vt ſe
paret̃ a ꝓfundo ⁊ cadat:⁊ ſuccurre cũ faciẽtibus aboꝛtire
ex ſuppoſitoꝛys ⁊ ſuffumigatõibꝰ q̃ dicemꝰ ibidẽ. Et qdã
antiquoꝝ locutꝰ eſt de extractiõe ſecũdine ſmones vt di
xit Abo.quẽ obmittamꝰ gr̃a bꝛeuitatis. Regimẽ aũt ad
accidentiũ coꝛrectionẽ ſubſcribemꝰ deinceps: et eſt ſicut
ſtõs coꝛ ⁊ cerebꝛũ cũ cõfoꝛtantibꝰ defendant̃ ⁊ ꝓpꝛietatẽ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0408-6
DFG

bn̄tibus in obtuſione ſenſuū: que ſupra in cura ipoꝝ ſunt
narrata. ſine quoqꝫ ad oppoſitū ⁊ circūferētias: put oꝫ tra
bāt: ⁊ illō cū fricatiōib⁹ extremoꝝ: ⁊ fomētatiōib⁹ coꝛūdē
q̄ ſūt ex gn̄e acutaꝝ. Cū ergo his p̄miſſis nō cadat elabora
re cū talib⁹ nō oꝫ. qm̄ talia aromatica freq̄nter approxiata
grauedinē ⁊ doloꝛē capis faciūt ſꝫ hy. ⁊ anguſtiā coꝛdis: ⁊
ſtōi defectionē: ſed dimittat̄: qm̄ poſt paucos dies ſoluet̄
coꝛrupta. ⁊ lubꝛicabit in modū aquoſitatis vel cadet.

℄ Capi. xix. de aboꝛſu ⁊ accidētib⁹ q̄ ſequunt̄ eū.

a Boꝛſus ē ꝯcepti ēbꝛionis p̄ter nāꝫ ⁊ an̄ ōbitū tps
oꝛt⁹. Et illō q̄dē q2 qn̄qꝫ tpe iformatōis: qn̄ꝫ p⁹: ſꝫ
an̄ motū: ⁊ an̄ ꝯplemētū. ⁊ qn̄qꝫ p⁹ ꝯplemētū ꝯ nāe ōbituꝫ
ē emiſſus. ⁊ qn̄qꝫ viu⁹: ⁊ vt plimū moꝛtu⁹. Et cā ei⁹: aut ē i-
terioꝛ: aut exterioꝛ. Interioꝛ q̄dē: aut ē i m̄rice: aut ē in ꝯce
ptu. ⁊ ſi i m̄rice: aut i ſe: aut ex cōitate. Et cā i m̄rice: aut ē i
oꝛificio ſui: cū fuerit nāl'r amplū nō valēs debite coartari:
aut accn̄tal'r. ex h̄uiditatib⁹ m̄ricis ꝯcurrētib⁹ ⁊ mollificā-
tib⁹ illō: aut i ꝯcauo ei⁹: q2 ſit diſtrictū aliq̄ mala ꝯplōne ⁊
h̄uiditate repletū ⁊ relaxatū nō valēs colligi ſupra embꝛio
nē ad ei⁹ retētionē ōbitā. vl' q2 ſit aliq̄ egritudinū poꝝ ſpē
grauatū: vel q2 i vēis ⁊ cottilidōib⁹ ſint mucilagies aggre
gate oꝛa caꝝ oppilantes. q̄b⁹ ſanguis ad alimētū mittit̄ vl'
ſua grauedie illos rumpēs. vel q2 ſit vētoſitate repletū il-
los ſua extēſiōe frāgēte. q̄ ex mucilaginib⁹ illis plimū ge-
nerat̄: q̄r aboꝛſus ſcdo vel tertio mēſe ſequit̄. Ingt. n. hy.
i affo. Quecūqꝫ coꝛpa moderate h̄ntes ꝯcipiūt ⁊ aboꝛtiūt
ſcdo aut tertio mēſe: his cottilidones mucilagie pleni ſūt.
q̄pp nō pn̄t p̄ grauedie ꝯtinere fetū: ⁊ aboꝛtiūt. Ex cōitate
vo: aut ad aliq̄ mēbꝝ grauiter paſſuꝫ vicinū ex q̄b⁹ ē an⁹
cū patiat̄ tenaſmonē. Vn̄ hy. i affo. ſuis. Mulieri in vtero
h̄nti tenaſmon ſupuēiēs aboꝛtire fac̄. Uel remot⁹ ꝑpe ſi
p̄ncipale exiſtat q̄ catarriçās: ⁊ tuſſiꝫ iducat: aut ēt totuꝫ
coꝛp⁹: q2 p̄gnātis coꝛp⁹ valde fuerit ꝯceptu ꝯſūptū: ⁊ atte-
nuatū. vn̄ hy. i affo. Quecūqꝫ p̄ter nāꝫ tenues exn̄tes ꝯci-
piūt: aboꝛtiūt: p̄uſq̄ꝫ graſſe fiāt: aut eūōne aliq̄ inanitū. ⁊ ꝑ
pe ſanguis vel ſpōtanea: puta cū mēſtruis. vn̄ hy. i affo. Si
mulieri i vtero h̄nti mēſtrua ſupuenerit: ipoſſe ē fetū eē ſa
nū: ⁊ iō ſeq aboꝛſuꝫ ē poſſe. vel artificiali: ⁊ ꝑpe cū flōia: vn̄
hy. i affo. Mulier flōmata aboꝛtit. ⁊ magis cui fet⁹ maioꝛ
eſt. vel alterius humoꝛis cum fluxu ventris. vnde hyppo.
in affo. Mulieri in vtero habenti ſi venter multum fluat
ē ſuſpectio aboꝛtiēdi ne a defectu nutrimēti fetū adducat
Uel vōitu vn̄. Abo. Ampli⁹ faciēdū ē ne p̄gnās vomat qm̄
ſupfluitates cū eo egrediunt̄. Et vōit⁹ ⁊ laboꝛ cā ad exte-
nuatōeꝫ p̄ducūt ⁊ foꝛtaſſe ad rupturā ligamētoꝝ ⁊ cū ſup
fluit ad inanitionē. Aut vehemēti fame debilitatū vel ali
qua acutaꝝ egritudinū captū: vn̄ hy. In vtero h̄nti ab ali
qua egritudinū acutaꝝ accipi moꝛtale. aut vehemēti reple
tiōe ⁊ nauſeatiua ſatitate grauatū ſuffocatiua fet⁹ ⁊ alimē
ti ipſi⁹ coꝛruptiua. Sꝫ cā in ꝯceptu aut ē in ipſo aut i pan-
niculo ſecūdie. In ipſo q2 fuerit grauiter ifirmat⁹ vel debi
litat⁹ aliq̄ cāꝝ debilitātiū itrīſecaꝝ: vel extrīſec⁹ accn̄tiuꝫ
vel q2 ex ipſis fuerit ad moꝛtē adduct⁹. q̄r nā expellere ni
tet̄ cū grauata. ⁊ q2 h̄uiditate currēte ex ea virulenta moꝛ
det̄ ⁊ moleſtat̄. Et qn̄qꝫ ex laboꝛe in exitu reſolut⁹ moꝛit̄
⁊ qn̄qꝫ ſuffocat̄: q̄b⁹ nō exn̄tib⁹ emittit̄ viu⁹. In p̄aniculo
vo vt q2 fuerit fract⁹ vel debilis fuerit creat⁹ pp tenuitatē
ſpmatis in ſua radice aut q2 aliq̄ cā rupt⁹. Et effuſa h̄uidi-
tas labēdo ⁊ lubꝛicādo m̄ricē icitat ⁊ iuuat ad fet⁹ expul-
ſionē. Et cā exterioꝛ ē ex p̄mitiuis aliq̄ vt ē f̄ritas m̄lta ae-
ris moꝛtificādo q̄ſi in regiōib⁹ valde f̄ris ⁊ ſeptētriōalib⁹
multiplicat̄ aboꝛſus: aut multa cal'itas reſoluēdo: ſic̄ ꝯtin-
git in meridionalib⁹. Et ex his ē balneatio multa in f̄ra vl'
cal'a aq̄. p̄ducit. n. ad reſolōnē v̄tutis vtriuſqꝫ mollificatio
nē ligamētoꝝ apriōnē duct⁹ ⁊ receptaculi dilatationem ⁊
necītate augmētata fetū facit ꝑperare ad exitū aerē f̄ru-
dū appetēdo. Et ex illis ē mutatio tpis p̄ter nāꝫ vt cū p̄ceſ-
ſerit hyēs auſtralis ⁊ ſōſeq̄t ver boꝛealis: vt hy. dixit i affo.
Et ex illis ē mot⁹ coꝛpoꝛe⁹ vehemēs ⁊ exercitiū laboꝛioſū
⁊ ſalt⁹ vehemēs ⁊ ꝑpe ad poſterioꝛa poſt coitū: qm̄ fac̄ de-
ſcēdere ſpma ⁊ fetū aut caſus ⁊ p̄cuſſio aut coit⁹ ſupfluus
Et ex illis mot⁹ a farmaco p̄ducēs ad ligamētoꝝ rupturā
ꝑpe mēſib⁹ trib⁹ p̄mis aut aiālis vt ira foꝛtis timoꝛ ⁊ tri
ſtitia gaudiū magnū ⁊ ſbitū. Et accn̄tia q̄ aboꝛſus ſt̄ dolo
res foꝛtioꝛes q̄ꝫ in nāli p̄tu: qm̄ h̄ violēt⁹. ⁊ ille nālis exiſtit
Et ex illis ē flux⁹ ſanguis imoderat⁹ ex quo ſp̄us deficere
ē necē: ⁊ exīde m̄rem ſil' cū fetu p̄ire. ℄ Signa aboꝛſus q̄-
dā ſūt ſuſpicātia ipm futuꝝ: q̄dā idicantia ipm ꝑpinquū ⁊
ꝑmptū: p̄ma ex ꝯſuetudie ⁊ h̄itudine coꝛpis toti⁹ ſumunt̄
vt q2 fuerit valde gracile vel pinguoſum ⁊ aboꝛtire ꝯſue-
uit. Et ex diſpōne mamillaꝝ vel ipſaꝝ q̄ıitate vt cū fuerīt
p̄us tumeſcētes ⁊ ſolide ſbito molles fiant ⁊ graciles ꝑut
hypo. dixit i affo. Et ex q̄ntitate cāꝝ p̄dictaꝝ. Cū. n. nō fue-
rint valde foꝛtes illū ſuſpicandū verendū poꝛtēdūt. Cūqꝫ
foꝛtes valde illū ꝑmptū demōſtrāt. Cūqꝫ doloꝛes foꝛtes
accidūt i m̄rice ⁊ laxitudo rubet facies ⁊ accidit rigoꝛ ⁊ ꝑ-
peie in febꝛe ⁊ doloꝛ in capite ⁊ in radicib⁹ oculoꝝ tunc in-
dicāt ipꝫ ꝑmptū ⁊ p̄ſentē ⁊ ꝑpe cū mēſtrua ꝑrūpāt. Et ſi-
gna q̄dē cāꝝ itrīſecaꝝ q̄ occulte ſunt ex dcis ſūt nota: ⁊ pl'i
me ipſaꝝ ſunt manifeſte medico vl' p̄gnāti ex relatōe ipſi
us. Cūqꝫ cāe et ſigna apparēt ipſi⁹ aboꝛſus. alteꝝ duoꝛuꝫ
igeniū ē ſumendū: aut enī ſūt debiles aboꝛſuꝫ p̄cēdētes: ⁊
tūc vt ꝑuideat̄ cautela ⁊ p̄uiſione vidēdū. aut ſunt foꝛtes
ipꝫ fetū ꝑmptū m̄rantes ⁊ ineuitabilē ⁊ tūc auxiliuꝫ quo
fiat tollerabilioꝛ ē miniſtrandū. ℄ Ingt. n. hyp. Nō. n. illi
us ē cui⁹ futuꝝ p̄iculū oīno ꝓhibeat vel ſaltē compētēti
āminiculo tollerabili⁹ fiat. P̄reuiſio ꝯſiſtit in abſciſiōe cā-
rū. Cautela vero in ꝯſeruatōe p̄gnātis ⁊ fet⁹. Abſciſio cāꝝ
ꝯplet̄ cū ꝯ̄rys vnicuiqꝫ caꝝ ꝑprys: vt ſi q̄dē os m̄ricis fue
rit nāliter amplū ꝯſtringat̄ ſtipticis: farmacis: illinitis: em
plaſtratis ⁊ ſuppoſitis ⁊ ſuffumigatis q̄ ſupra in retētione
mēſtruoꝝ ſunt dicta. Sil'r ſi accn̄taliter ex humiditatib⁹
in ꝑfundo currentib⁹ cura curſus m̄ricis tollat̄. Sic quo-
qꝫ ſi ſit humefacta matrix: ⁊ humiditate repleta: vel muci
laginib⁹ cottillidones grauantib⁹ vel mēſtruis retētis an-
te ipregnatōis tps q̄ poſſent pre lōga retentiōe coꝛrupta le
dere fetū. cū mūdificātib⁹ omnimō ⁊ exiccātib⁹ notis ibi-
dē leuioꝛib⁹: necnō ⁊ ſi ſit vento repleta etiā cū extenuan-
tib⁹ i molla m̄ricis ſupius dictis: etiā ſi aliq̄ p̄dictarū egri
tudinū ſpē ſit grauata cura ipſaꝝ ꝑpria medicet̄. Sil'r ſi pa
tiat̄ ex cōitate ad aliq̄ mēbꝝ vel coꝛpoꝛis toti⁹. Q ſi pre
ſui macredie fit aboꝛſus: regie humectatiuo ⁊ ipiguatiuo
vtendū q̄ dicem⁹ ānuente xp̄o. ℄ Et ſi inanitū fuerit cū
retinentib⁹ fluxū q̄ ſupius habuiſti. vel q2 aliq̄ egritudinū
acutaꝝ ſit captū cura ꝑpa vnicuiqꝫ q̄ ex dcis ⁊ dicēdis ē
nota. ⁊ ſi fame reſumptiōe cū tēperamēto: ⁊ ſi repletū ve-
hemēter: euōne paulatiā ⁊ abſtinētia coꝛrigat̄. Ingt hyp.
ſm multū ⁊ repente euacuare vel replere aut quōlibꝫ coꝛ
pus mouere fallax ⁊ nāe inſuaue: paulatiꝫ vo meli⁹. Cōple
bit̄ aūt repletionis euō ſi q̄dē ſit ſanguinis flōia modera-
ta q̄ embꝛionē ad nutrimēti defectū nō adducat: ſꝫ tm̄ ſup
fluū ſuffocatiuū vel malū ſanguinē ei⁹ coꝛruptū. Si vero
aly h̄uores colagogo lenioꝛi mūdificet̄. vt ē reubarbaꝝ:
mirob. citrini: ⁊ chebuli idi. in menſibus medys: pꝛimos ⁊
vltios tres verēdo. vt hyp. docuit. aut cū ſena ſi humoꝛ re
plens fuerit aduſtus nō pill'is ⁊ yeris vt aliq p̄ſumpſerūt:
necnō cū leniētib⁹ ⁊ ſanguinē mūdificantib⁹ vt melle caſ
ſia: tamarindi: ⁊ manne ſucci roſa. lupuli: boraginis: ⁊ bu-
gloſſe: ⁊ floꝛib⁹ earundē: fumiterre: ⁊ aq̄ lactis ⁊ ſil'ib⁹: qui
bus in trib⁹ p̄mis mēſib⁹ ⁊ vltimis vti pōt. Et ſi cā fuerit
i cōceptu auferat̄ ⁊ cōfoꝛtet̄: ꝑut ifra dicet̄: ⁊ ſi moꝛtuus
fuerit: extrahat̄: ꝑut ſupra i difficili p̄tu dcm̄ ē. ⁊ igēio q̄

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0409-4
DFG

dicemus. Si vo fuerit in pāniculo: quo inuoluitur auxilio ſuccurrat͂ qḋ īfra dicem⁹. Et ſi cā exterioꝛ appuerit: amoueat͂: ꝛ ī ɔtrariā diſpōnē adducat͂. Jngt.n.G. correctio oīs īmoderatiōis per contrariā īmoderationē ē fiēs. Cautella vo ɔſiſtit ī ɔfoꝛtatiōe mulieris pgnātis: ꝛ fet⁹. Et ɔplet͂ cū regiē ipoꝝ ſuperi⁹ pnoīato. ꝛ medicis ppꝛys q̄ narrabim⁹. Auxiliū vo vbi cāe pualeſcēdo ipꝫ pꝛoptū demrant: ꝛ īeuitabilē ē duplex. vnū ɔſiſtit ī habilitādo vt facile ꝛ cito embꝛio expellat͂. retētio.n. ipi⁹ piculi ē: ꝛ mꝛīcis ē cā. Aliō ɔſiſtit ī accñtis correctiōe: ne moꝛtis piculo adducat͂. Habilitatio ei⁹ ɔplet͂ cū ill' q̄ difficili partui ſuccurrēdo facilitāt ipꝫ. q̄ ſūt ſupꝛa dicta. Correctio vo accñtiū ibidē extitit nota q̄tū ad doloꝛē remittēdum: ꝛ retētionē ſupfluitatis ſanguinis: etiā colligere potes ex dictis in retentione ſupfluitatum menſtruoꝛum. Amen.

¶ Incipit ſumma quinta particule quarte ſectionis p̄me continens capitula. iij.

SEquitur ſumma quinta q̄rte pticule: ſectōis p̄me finalis ꝛ vltima. Que ē ḋ medicis egritudinū mēbꝛorum apparētiū. ꝛ priū vētris q̄ ī ſupfluoꝝ expulſiōe ſūt adiuuātes. ¶ Sciēdū tn̄ ē q̄ p̄mū qḋ nobis ḋ vētre occurrit ē cutis deīde ſub ipa ē pāniculus p̄m⁹ ꝛ noīauit ipm. G. mēbꝛanū ꝛ eoꝝ duoꝝ aggregatio ē mirach: cui⁹ iuuamētuꝫ ē ſile iuuamēto lacertoꝝ. q ſequunt͂. ide ſunt lacerti. viij. duo p̄mi occurrētes lōgitudīales ptēſi ab oſſibus pectoꝛis: vſq̄ꝫ ad oſſa pectinis exītes de gn̄e carnoſoꝝ. Et ſub eis ſūt q̄tuoꝛ trāſuerſales: quoꝝ vn⁹ ptēdit͂ ad extra coſtaꝝ falſaꝝ ſupꝛa extremitatē eaꝝ ad ſiniſtꝝ īferi⁹ circa femur ꝛ anchā ꝛ aly a ſiniſtra pte coſtaꝝ falſaꝝ ꝛ extremitate eaꝝ ad dextrū īferi⁹ circa femur ꝛ anchā q̄ ex multa ptēſiōe de carnoſa ſuba deſinēte ī medio in coꝛroſaꝫ: deīde in pāniculo ſam ſubaꝫ ḋuenerit extrema: ſub qb⁹ duo aly latitudinal' exiſtūt pāniculū vētris ꝗ ſiphac dr̄ īmediate tāgētes carnoſe ſbe ptēſi ḋ ylys ptis ſiniſtre ad ylia ptis ḋxtre. quoꝝ iuuamētū ɔſiſtit ad ɔtinēdū ꝛ calefaciēdū īteſtina ꝛ ſtōm ad expellēdū qḋ ī mꝛīce ꝛ veſice expellēdū exiſtit. vt eoꝛū ɔpſſiōis auxilio facile expellat͂: ꝛ ad ſuſtinēdū dyafragma cū adeſt exſufflatio q̄ ēt ſua ɔſtrictōe adiuuāt. Deinde ē adeps q̄ pīguedo lacertoꝝ dr̄ q̄ ex frītate neruoſitatꝫ ꝛ coꝛdoſitatis ipoꝝ: ꝛ ipi⁹ ſiphac ibidē ex vnctuoſitate ſanguis gn̄ata multiplicat͂. Juuamētuꝫ eius eſt vt ſua raritate colligat caliditatem. ꝛ ſua viſcoſitate conſeruet eam que reflectitur ad inteſtina ꝛ ſtomacuꝫ iuuande digeſtionis gratia. deinde eſt ſiphac pāniculus vocat⁹ beriteron cui adheret pinguedo valde. Cui⁹ iuuamentū eſt vt ɔtineat oīa inteſtina ꝛ viſcera ꝛ liget cū doꝛſo ꝛ ſuo ppo loco ɔſeruet ea tenendo firma ꝛ iuncta. Et eoꝝ ſit tutamen ꝛ diſtinctio inter lacertos ꝛ alia viſcera ne turbent͂ opatiōes ex eoꝝ motu. Et ad exprimēdū ſupfluitates cū lacertis ꝛ mirach cōcurrendo. Et ipe eſt p̄ncipiū a quo oīs pāniculus coꝛpoꝛis hēt oꝛtū. Cū enim aſcēdit ɔtinuat͂ velamini ꝛ fit eius īferioꝛ tunica vna triū ipſi⁹. Et ex ea cū penetrat orit͂ pāniculus tegens pect⁹. Cū vero deſcēdit ꝛ cōtinuat͂ duob⁹ ylys adueniūt ibi ei due vie vocate didimi in qbus penetrant vene ꝛ ſuſpēſoꝛia teſtiū. Ex qb⁹ fiunt due ciſtes ꝛ folliculi teſticuloꝝ. Deīde eſt çirb⁹ adipin⁹ q eſt pāniculus ſubtilis ex eo qḋ ſupfluit a duob⁹ laterib⁹ ſiphac: ꝛ ex eo qḋ deſcēdit apud ſtōꝫ ꝛ duodenū: ꝛ ex eo qḋ deſcēdit apḋ pectinē ē ramus duaꝝ venaꝝ pulſatilis ꝛ non pulſatilis extenſus ſupꝛa ſtōꝫ ɔtextus. Et ſuſpenſio eius eſt ex ſtō ꝛ ɔtinuatur pectini ꝛ eſt ɔpoſitus ex duob⁹ pāniculis quoꝝ vn⁹ capit aliū īter quos ſunt acies pinguedinis plurime ꝛ vene pauciores in eis ad modū rete ꝛ ē ſic͂ ciſtis vel ſacc⁹ in quo aliq̄d retinet͂ ſi apponat͂ ꝛ eſt īteri⁹ ſic͂ īterioꝛ pann⁹ ſiphac ꝛ ſic͂ exterioꝛ ſtōi ꝛ ē additus ab anterioꝛi pte extenſus ſuper oīa viſcera in hoīe: q̄ꝛ eſt magis īdigens auxilio in digeſtione per ɔparationē ad aliā. ſuā enim ſpiſſitudine comprehendit caliditatē ꝛ ſua viſcoſitate pinguedinē illā conſeruat quā reflectit cōtinue ſup ħ. ꝛ hoc eſt iuuamētuꝫ ſui. Jn ſumma iuuamētū oīum ꝛ cōe in continēdo viſcera defendendo ꝛ exprimēdo ꝛ calefaciēdo. Et in medio vētris eſt ſumē q eſt locus vmbilici cui⁹ foꝛma ē admodū īteſtini quo trahit īfans ſanguinē a cōcauo ſecundine ad ſui nutrimentū: ꝛ mediantib⁹ venis q̄rū oꝛificia in ea ɔcurrunt diſtributione coꝛpis toti⁹. Deīde ſunt īteſtina ꝛ alia viſcera quoꝝ anothomiā pꝛemiſim⁹ xp̄i omnipotētis gratia: qui ſit per cuncta ſecula benedict⁹. Ex qb⁹ egritudines ei euenire poſſibiles cōpꝛehēdere poteris gn̄aliter: ꝛ eſt doloꝛ ꝛ ruptura qua oēs opatōes ꝛ iuuamēta ledunt͂ ꝛ dr̄ crepatura quā ramex hernia ꝛ ſpēs eius ſequunt͂. ꝛ q̄n̄q̄ꝫ eminētia vmbilici ſuis capitulis pdiſtincta. Cauſas quoq̄ꝫ extrinſecas ꝛ iterioꝛes eaꝝ ppꝛias ꝛ cōes ꝛ ſigna earū. Et ſm̄ hoc iſta quinta ſumma tria capitula continebit.

¶ Capitulum primum de crepatura ꝛ ſpeciebus hernie ꝛ medicinis eius.

¶ Capitulum. ij. de augmento vmbilici.

¶ Capitulum. iij. de doloꝛe ventris ꝛ yliorum.

¶ Caplꝫ. i. de crepatura ꝛ ſpēbus hernie ꝛ medicīs eaꝝ.

r **R**Uptura eſt ſolutio ɔtinui mēbꝛo paniculoſo aduenīēs: ei⁹ diuiſiōes vl' ɔphendēs q̄ ſi paniculo cōtinēti inteſtina q dr̄ ſiphac accidat vocat͂ ppꝛie crepatura. Accit aūt ei in loco iuxta ſumē ꝛ raro q̄ꝛ ille loc⁹ ſuſtentat⁹ ē lacertis: ꝛ cū accidit minoꝛis ē eminētie: eo q̄ grauātia inteſtia inferi⁹ tēdūt: ꝛ ē deterioꝝ accñtiū lꝫ ī pn̄cipio doloꝛē nō faciat: q̄ꝛ egreſſa in ea ſūt inteſtia minuta q̄ egreſſa coartant͂ qbus coartatis coartāt fecē ꝛ vomunt eā. Et q̄n̄q̄ꝫ accit in ſumie: q̄re ſeq̄tur ei⁹ augmētū ꝛ vmbilici. ꝛ q̄n̄q̄ꝫ ſub eo ꝛ circa ipm: ꝛ eſt pue additiōis. ꝛ q̄n̄q̄ꝫ accidit inferi⁹ circa inguina ꝛ ē plurimū q̄ꝛ ps illa grauedine īteſtinoꝝ magis extēdit͂ niſi ſuſtentet͂ lacertis vt ſupioꝛ ps ſed extremitatib⁹ lacertoꝝ ꝛ ē maioꝛis doloꝛis pp magnitudinē ei⁹ qḋ extitit ɔpꝛehēſum ꝛ maioꝛis additionis q̄ꝛ ſequit͂ deſcenſus ei⁹ qḋ extitit ɔpꝛehēſum ante illi⁹ rupturā vt īteſtinoꝝ ꝛ ppꝛie monoculi: q̄ꝛ nō eſt circūuolutū ꝛ ligatū vt alia aut çirbi aut vtroꝛūq̄ꝫ cū ē magna in burſaꝫ īteſtioꝝ: q̄r tumet ꝛ īflat͂ ꝛ vocatur ppe hernia ſeu ramex.

Et in mulierib⁹ tumēt iguina ad modū tumoꝛis oſſei. Et tn̄ vt pter rupturā ei⁹ deſcēſus taliū accidat vt cuꝫ puenit dilatatio in vys īferioꝛib⁹ ptis ei⁹ abſq̄ꝫ ruptura. Et dilatationis cauſa eſt effuſio hūiditatū glutinoſaꝝ aquoſaꝝ collectaꝝ in ſpatio vētris ad modū aq̄ ydꝛopicoꝝ. Et q̄n̄q̄ꝫ tumet oſſeū ꝛ īflat͂ pp effuſionē hūiditatū pter nāꝫ ī ipꝫ aut aggregationē ipſaꝝ in ipſo pp frīditatē ꝛ ɔuerſionē ipſaꝝ in aquoſitatē q̄r replerent͂ aquoſitate. Et q̄n̄ꝫ īflat͂ pp cōuerſionē ipſaꝝ hūiditatū in vētoſitatē aut caſuꝫ vētoſitatis ī illō. Et accñt ſpēs hernie īpꝛop̄e ꝛ abuſiue dcē. ſ. aquoſa ꝛ vētoſa. Et q̄n̄ꝫ tumeſcit ꝛ īgroſſat͂ oſſeū pp hūiditateꝫ ſanguineā feculētā deſcēdētē ad ipuꝫ: aut ex apate duro: aut pīguedīe ita vt aſſilet͂ ramici ꝛ vocat͂ hernia carnoſa. Et q̄n̄ꝫ īflant͂ tn̄ vene ei⁹ ex illa ꝛ vocat͂ hernia varicoſa. Et q̄n̄ꝫ mollificat͂ mollificatōe vehemēti abſq̄ꝫ ruptura: q̄r plōgat͂ ꝛ ſilat͂ hernie. Et harū deterioꝛ ꝛ difficilioꝛ eſt vtraq̄ꝫ nā. ſ. īteſtinalis ꝛ çirboſa q̄ꝛ ē cū ruptura vl' dilatatiōe. Aliaꝝ vo deterioꝛ ē carnoſa ꝛ varicoſa: q̄ꝛ mā ē fixa. lenioꝛ vo aquoſa ꝛ vētoſa: q̄ꝛ pfoꝛatōe ſola: euacuat͂ mā ꝛ detumeſcit oſſeū. Et cāꝝ rupture ſiphac q̄dā ſt̄ īt̄riſece: q̄dā extriſece. Jntriſece ſūt hūoꝝ coꝛroſio ꝛ replo tēdens vētoſitas extēdēs ꝛ mot⁹ ſup replōne: vox foꝛtis ꝛ ſternutatio expſſio ptis ꝛ apatis aptio. Extriſece ſūt vt ignis adu

rēs:⁊ ꝑcuſſio enſis penetrās:aut aīal'morſus ⁊ ſilia.Cā vo
dilatatōis viaꝝ ē debilitas ipſaꝝ ⁊ effuſio hūiditatū mol/
lificantiū ⁊ relaxātiū ad ipas coadiuuāte motu forti ꝑcuſ
ſiōe ⁊ caſu:aut retētio ſpmatis moti ⁊ ꝓhibiti ab expulſio
ne:aut aſcēſio mulieris ſupra viꝝ:aut labor in coitu ſupra
replōnē aut ſatietatē:⁊ aggregatio vētoſitatis ⁊ egōnis in
vētre:⁊ labor anhelitꝰ in ipſo:q ēt pōt eē cā rupture ipſaꝝ.
¶ Signa.Ex ſignis q̄dā ſūt rupture ꝯueniētia q̄dā dilata
tōi viaꝝ:q̄da hernie.Signa ꝯueniētia rupture qbꝰ ipſa co
gnoſcit̄ ſūt appens additio ſb mirach ſbito cū dolorē ⁊ tu/
more q addit̄ apō motū retētōeꝫ anhelitꝰ ⁊ exp̄ſſiōeꝫ:⁊ di
ſtiguit̄ diuerſitate locoꝝ:⁊ ſi ſit iferiꝰ circa iguina tumore
burſe fit hernia eꝰ nec ꝯfert exiccatio nec ſtipticitas.Et di
latatōis qdē ſignū ē tumor ⁊ additio i oſſeo paulati appa/
rens abſq; dolore ⁊ preter motuꝫ ſbitum ⁊ laborioſum vo
ciferatōeꝫ ⁊ alia q̄ ſūt cā rupture ꝑcepta. Et ē hernia folli
culi teſticuloꝝ nō burſe ⁊ oſſei imediate ⁊ ꝯfert exiccatio
⁊ ſtipticitas.¶ Signoꝝ vo ꝯueniētiū hernie q̄dā ſūt her/
nie ꝑꝑ deſcēſuꝫ iteſtini ⁊ ſūt magnitudo eiꝰ ⁊ redditio eius
velox cū reſupiatōe ⁊ ſenſibilitas rugitus cū ꝑmit̄ ꝓprie.
Quedā ſūt ꝯueniētia hernie ꝑꝑ deſcēſuꝫ çirbi ad ipaꝫ:⁊ ſt̄
tumor mior in ꝯpatōe ad illō ⁊ euētꝰ paulati lꝫ minꝰ q̄ꝫ i di
latatōe:nec ſentit̄ rugitꝰ in illa lꝫ ſit ſilīs illi in tactu molli
⁊ difficl'tate curōnis ⁊ facili reductōe. Et ramex qdē aquo
ſa cognoſcit̄ ꝑ tēſionē oſſei cū ſplēdore ⁊ tactꝰ mollicie ⁊ le
nitate.Et quidē ipſa nō redit nec igredit̄ ⁊ ꝓp̄e ſi ibidē ſit
aquoſitas gn̄ata nō ifuſa mā.Et vētoſa cognoſcit̄ i iflatio
ne oſſei abſq; grauitate ⁊ dolore cū tēſiōe ⁊ reſiſtētia ipreſ
ſioni:⁊ ē facilis igreſſus ⁊ reditꝰ i oī ſitu.Et qn̄ꝫ accn̄t in ea
dolores fortes:qn̄ extēdit oſſeū ⁊ teſticl'os ꝯp̄mit.Et car/
noſe ſignū ē q̄ nō ē mā intꝰ oſſeū ut i p̄dcīs:ſꝫ in eiꝰ ſba dif
fuſa iuiſcata ⁊ adherēs:⁊ ē cū groſſicie ⁊ duricie ⁊ ineq̄lita
te.Et ſi ē ex apatē duro cognoſcit̄ ꝑ p̄ceſſionē ſignoꝝ eiꝰ ⁊
dī̄ duris. Hernia vo varicoſa ex venis repletis cognoſcit̄
tēdētibꝰ ad nigredinē ꝯtortis ⁊ ꝯplicatis:⁊ mollificatōe te
ſticuloꝝ:⁊ ꝓhibitōe ipſoꝝ a curſu ⁊ motu . Et ſi ē i arterys
oſſei tactus comprehēdit ipaꝫ: ſi vo i venis nutriētibꝰ illa
mēbra cū ſint ꝓfunde:tactꝰ nō ꝯphēdit illas.¶ Cura.i cu
ra rupture itētio patiētis lꝫ pꝰ iſpiciat accn̄s.vꝫ. herniā:q̄
ab eo ꝑceptā magis moleſtātē ⁊ in actōibꝰ ipediētē attra/
hētē ipudicitiā ipiꝰ opis:medicātis:executio tn̄ v̄tit̄ ad eꝰ
cāe ablationē p̄us.Eſt aūt cāe ipiꝰ ablatio duplex:vna cā ē
cōis oībꝰ hernie ſpēbꝰ:alia vnicuiq; ſpēi ꝓpa. Cōis cā ipiꝰ
ablatio ꝯplet̄ regie qō i ſex reꝝ nō nāliū debita miſtratōe
ꝯſiſtit.⁊ ē vt degat i aere tpate calo ⁊ frō d̄clināte ad ſicci/
tatē:vitet extremitates q̄litatū eiꝰ ⁊ ꝓp̄e hūiditatis: vtat̄
cibis ſiccis:⁊ vitet hūidos ⁊ brodiales ⁊ vētoſos: ac replō/
nē ⁊ potū mltū ⁊ ꝓp̄e aq̄:geſcat ⁊ dormiat tpate: vitet oēꝫ
motū corpis ⁊ aīe vlēꝫ ⁊ ꝑtialē quo totū moueat̄ corpꝰ.vt
ē ſternutatio: tuſſis:ꝯp̄ſſio:retētio anhelitꝰ atq; ſingultus:
vomitꝰ ⁊ coytꝰ ⁊ balneatio ⁊ ꝓp̄e pꝰ replōneꝫ: nec ſtet nec
ambulet ſupra cibū valde:⁊ breuiter fugiat oēs cās ruptu
re dilatatōis ⁊ effuſiōis mediciaꝝ p̄dictas i q̄rū ꝯ̄ria inita
tur.¶ Propa vo ſpēbꝰ hernie ⁊ ablatio cāe q̄dā ē q̄ appro
priat̄ veris:q̄dā nō veris.abſciſio vē cāe veraꝝ ſpēꝝ her/
nie vt inteſtinalis ⁊ çirbalis:imediate rupturā ſiphac vel
dilatatiōeꝫ viaꝝ eiꝰ reſpicit.ablatio ergo eiꝰ ē vt h̄ vniant̄
⁊ ꝯſolident̄:illa vo coanguſtent̄:neutra vo ipſaꝝ fieri pōt
medio ſtāte qō deſcēdat in burſam. vt ergo h̄ fiāt expedit
p̄us qō deſcēdit iteſtinū.ſ.aut çirbū ad locū ꝓpriū reduce/
re:deīn̄ rupturā vnire ⁊ ꝯſolidare:vel dilatatōeꝫ viaꝝ de
bite āguſtare. Reductio aūt eiꝰ ꝯplet̄ cū balneis cataplaſ
matibꝰ ⁊ ifuſiōibꝰ reꝝ mollificātiū ⁊ dolorē ſedātiū deco
ctaꝝ in aq̄:q̄les ſūt malue folia ⁊ biſalue:⁊ brance vrſine:
viol'.ſemē lini:⁊ fenugrecū in q̄rū aq̄ ſit pānꝰ vel ſpōgia i/
fuſa ⁊ ſupra locū imiſſa donec locꝰ molleſcat ⁊ dilatet̄.de/
inde reſupinatōe corpis fcā ⁊ cruribꝰ eleuatis cū ꝯpreſſio
ne tēdēte ſupiꝰ reducant̄ iteſtīa vel çirbꝰ vel vtraq;:poſtq̄ꝫ
ſeq dꝫ rupture vnio ⁊ ꝯſolidatio vel dilatatōis coagulatio
ſeu coanguſtatio. vnio aūt ⁊ ꝯſolidatio ꝑ iteriꝰ ſumpta po
tiones ⁊ dietā:⁊ exteriꝰ approxiata ⁊ emplāta:⁊ nō pōt fie
ri q̄ꝫtūcūq; ſit in cōglutinatōe ⁊ ſtipticitate fortiſſima niſi
ēt ifrīdantibꝰ tn̄ cū ꝑtes rupte nō poſſint vniri ⁊ ad debi
tū ſitū reduci arte vel igenio ꝑꝑ magnitudinē vulneris:
ieptitudinē ⁊ ꝯp̄ſſionē mēbri qō ſubtile ⁊ iſanguieū ē. Ex/
pedit ergo ad aliqō ꝓportionabile illi ꝯfugere ſaltē vt illā
ꝓhibeat ab augmento ⁊ ꝓp̄e apō corpis motū : donec tp̄s
adſit miniſtrādi cirugicū opꝰ qō i ꝯſolidatōe ipſiꝰ efficaciſ
ſimū ē ⁊ ꝓbatū.¶ Proportiōale vo ē ligatura cū bracha/
li hn̄te eminētiā ꝑpendicularē ad clipei formā in loco re/
ſpiciēte iguina vbi ruptura exiſtit ⁊ faſſia deſcendēte ſub
coſſa:cū q̄ in locū poſteꝝ ligata ſtrigat̄ : ⁊ ē nota.Et modꝰ
opatōis cirugici ē vt pꝰ obſuato p̄dcō regie corpa purgēt̄
ſi cachochimia ſit appēs:l' flomet̄ ſi replōnis ſt̄ ſigna ⁊ ſic
mlta:vt nā imittēdo hūores ad locū magni doloꝫ redda
tur auara. deīn̄ ſ locū iguinis r̄cipiētē rupturā:quā ex trā
ſitu iteſtini l' çirbi d̄ſcēdētis ⁊ redeūtis cogſces ⁊ ꝑcipies
cū ipoſitis digitꝫ apponat̄ ruptoriū:⁊ euitet̄ ferꝝ oīo:ſit āt
p̄mū leue:⁊ nō faciat ſubitā cōmotionē ⁊ dolorē fortē:ſed
facile tolleret̄ q̄les ex nitro cuꝫ calce abluta:vel ex arſeni
co cū calce mixto:⁊ ſilibꝰ.deīde apponat̄ fortiꝰ vt arſenicū
ſblimatū:⁊ tādiu imoret̄ i loco:dōec rūpēdo ⁊ corrodēdo
ꝑueniat vſq; ad didimū.Caueat tn̄ ne tāgat iteſtina:vl' ad
ea ꝑueniat v̄tus eius qn̄ vlcerabit nec ꝯſolidabunt̄ ⁊ ꝓp̄e
ſi gracilia fuerit.⁊ morit̄ eger:vt i quodā notabili vidimꝰ
ab expto.⁊ adhuc euitandum ſtati expedit vt toto tp̄e cu
re rupture faciende iaceat ſupinꝰ i lecto anchis ⁊ cruribus
eleuatis:⁊ a ꝑte ſupiori vbi ſūt iteſtina iterpone̅t̄ aliqō qō
d̄fēdat ea:vt peciola olō ro.iticta:⁊ vitet replōnē ⁊ iflatio/
nē:⁊ locꝰ quotidie regrat̄:⁊ plīcs.Caueat ēt ne corda ligās
crus cuꝫ oſſe pectinis q̄ ſub vlceris loco exiſtit attigat:qn̄
ſeq̄ret̄ ꝯ̄ctio ⁊ ſpaſmꝰ: ⁊ vtplīmū mors. Et modꝰ cautelle
ē q ē dictꝰ.Cū ergo ꝑuenerit ad didimū: tūc iſpiciat̄ vlcus
ſubtil'r:⁊ igrat̄ vtrū didimꝰ ſit dilatatꝰ vel ruptꝰ.Si vo di
latatꝰ ſit ꝯprehēdat̄ acu:⁊ fortiter cū filo ſerico reſtrigat̄.
⁊ deīde vlcꝰ ꝯſolidet̄.Si vo ſit ruptꝰ:nec ꝯphēdi valeat:vt
liget̄ ruptoriū repetat̄ cū mora:donec ꝑtrāſierit ipm vſq;
ad os:tūc vo auferat̄ ⁊ applicent̄ ſigillātia ⁊ icarnātia cuꝫ
ſtipticitate.deīde repleto carne vlcere applicent̄ ſigillātia
⁊ icarnātia q̄ ſūt pōtica:⁊ exiccātia fortia q̄le ē puluis gal/
le:cortex thuris: ſandaracha ⁊ ſilīa: ⁊ patiēs nutriat̄ viſco
ſis ⁊ duris. Cōſolidatio in ifantibꝰ: ⁊ coāguſtatio dilatato
rū ductuū ⁊ viaꝝ q didimi noīant̄.Cōplet̄ cū ꝯſolidātibꝰ
iteriꝰ ſūptis ⁊ exteriꝰ applicatis ſtipticis ex balneis ⁊ ēplīs
vt ſūt glutinoſa ⁊ viſcoſa: q̄les ſūt ſpēs ꝯſolide:corrigiola:
mumia:terra ſigillata: grana naſturty:millefoliū d̄coctio
nucis cipſſi:⁊ hypogſtidos ꝓp̄e cū balauſtia:⁊ ſilīa. Ex ci/
bis ⁊ potibꝰ: ⁊ ex decoctiōe eiꝰ ſūptis:⁊ exteriꝰ approxiatis
⁊ emplātis ſimplicibꝰ dictis:⁊ alys vt ēcētaurea:cui ieſt ꝓ/
p̄etas vniēdi fruſta carniū qn̄ cū eis ſil' d̄cogt̄. Et ex eis ſt̄
ꝯfectiōes ⁊ ēpla ꝯpoſita q̄ ifra dicēt̄ cū ligatura ⁊ ſtrictōe
forti.Et qn̄q; ſuffic̄ ſola ligatura in dilatatōe ifantiū. Qr ſi
ruptura.ſ̄.vel circa vmbilicū affuerit reductio fiat iteſtio
ruꝫ:vel çirbi fiat facile.q̄ ſola reſupinatiōe ifirmi ⁊ manꝰ
ꝯp̄ſſiōe.Qr ſi addat̄ i ruptura: ⁊ icipiat̄ i deſiccādo illō qō
dilatatū ē ꝑꝑ hūiditatē adunādo qō fixū ē:⁊ igeniet̄ i ꝯſo
lidatōe eiꝰ:⁊ regat̄ vt.ſ̄. Et q̄dā nitunt̄ i hoc dilatādo fim
brias ſuas: ⁊ coꝝ efficaciſſima cura gn̄aliçādo ſupiꝰ i ſupe/
rioribꝰ oībꝰ cū nō videat̄ poſſibile niſi i cura ifantiū exn̄/
te pua.Et illō ē apponere ſupra in loco rupture ēplꝫ ex ru
bificātibꝰ ⁊ trahētibꝰ ſanguinē ad locū p̄mū. Quale ē ꝓ/
p̄rie qō fit ex paſſulis nigris enucleatis caricis ⁊ vio nigro

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0411-1
DFG

pōtico añ.ꝛ bullitoꝝ ſil' in olla ad īſpiſſationē. deiñ cū mi/
niſtratiōe emplꝛoꝝ ex ſtipticis ꝛ ponticis ſanguinē illū tra/
ctū īſpiſſantibꝰ ꝛ ſcliroticātibꝰ q̄ ſua groſſicie ꝛ duricie ob/
turabūt. Quale ē ꝓpe fcm̄ ex gipſo ꝛ lapide marmoreo ce
ruſa gallis luto ſigillato ꝛ ſilia ꝛ qđ ſcribit̄ īfra. In abſciſio
ne vō cāe ꝓpe ramicis aquoſe aut vētoſe due res ſūt neca
rie.ſ.extractio eiꝰ qđ ī oſſeo ē ꝯtētū ꝛ mãei ꝓhibitio regña
tiōis ꝛ multiplicatōis eiꝰ. Extractio aūt fiet cū reſolutōne
vel īciſione vel pforatōe eius cū ferro vel cauterio ad mo
dū extractōis aque aut vētoſitatis ydropicoꝝ. talē aūt cō
plentia ſunt dicta ſupra in cura ydropiſis: ꝛ ſunt ex empla/
ſtris ſuffumigys ꝛ balneis ſiccis ꝛ vnctionibꝰ reſoluētibꝰ.
Inciſio aūt cōplet̄ cū ferro ꝛ cū medicis acutis adurenti
bꝰ ꝛ exiccātibꝰ ꝛ ꝯſtrigētibꝰ illud qđ ruptū vel dilatatū ē
ex ſiphac ꝛ foraminibꝰ eiꝰ ne vlteriꝰ deſcēdat ꝛ trāſeat. Et
modus pforatōis vl' īciſiōis cū ferro ē vt reſupinet̄ patiēs
in lecto vel ſcāno ꝛ ſedeat poſt ipʒ aliqs q extendat virgā
eiꝰ ad ſupiora: ꝛ eleuent̄ teſticuli ad ſupiora pectinis ꝛ elō
gent̄ ab oſſeo ꝛ pforet̄ cū flebotomo oſſeū a pte dextra vl'
ſiniſtra recedēdo a ꝯmiſſura. deīde ſtude in euōne totius
aquoſitatis ꝛ egreſſiōe vētoſitatis. Et modus apertionis
cū cauterio eſt vt ſumas ferrū ſubtile in quo ſint vncini: ꝛ
igniat̄ ſic ignit̄ cauteriū: ꝛ ſepa teſticulos q̄tuʒ poſſibile ē
a loco cauteriçatōis ꝛ reuolue cauteriū ab oſſeo: ita vt nō
īueniat teſticulū ꝛ īueniat oſſeū ꝛ alberiteron: ꝛ ꝯſtringat
ꝛ calefaciat ipʒ vt nō egrediat̄ poſt ipm aq̄ poſt illud. ē.n.
meliꝰ q̄ cōſtringat meatū: deiñ īcidas cruſtā ꝛ ꝯſolida. Et
fortaſſe īcides ex alberiteron aliqđ ꝛ cauteriça: ꝛ pone ſup
ſciſſurā ſtiptica: ꝛ ꝓhibe egrū potare aquā. Probibitio ge
neratōis mãe multiplicantis eā fit cū euōne ꝛ equatōe ci/
bi ꝛ potꝰ. Et regimē in vētoſa eſt regimē īflationis ſtōi vel
timpanitis qđ ſupius dcm̄ ē. Regimē vero carnoſe ꝛ vari
coſe ē regimē duroꝝ apatū: ꝛ illud ē cū mollificātibꝰ ꝛ re/
ſoluentibꝰ alternatī approximatis. Mollificātia ſunt pin
guedies: medulle: olea: mucilagines. Reſoluētia ſunt gra
noꝝ ſpēs vt reſina: terbētina: bdelliuʒ: aloes: ſtorax liqda:
armoniacū: ꝛ ſilia: yreos: crocus: ꝛ camomilla: ſpica. ꝛc̄.
¶ Cōpoſita ſunt. ex eis eſt emplm̄ baſilicon: cerotū yſopi
ꝛ ſilia. ¶ Emplm̄ leue ad crepaturas īfantiū ſʒ grecū. ℞.
corticum thuris: maſticis: ſarcocolle: draganti. ana. teran/
tur ꝛ aggregent̄ cū vino de paſſis diſſoluta in eo munia. ꝛ
aliq addunt aloeʒ: ꝛ gluten piſciū: ꝛ aliq ſolū faciunt ex ba
lauſtys: pſilio: ꝛ radice lily ſilueſtris: ꝛ lenticulis aq̄. ꝛ for/
taſſis ſufficit vt liniat̄ locus cū bdellio diſſoluto ī vino thu
re ꝛ cholophonia. ¶ Aliud fortiꝰ oribaſy. ℞. balauſtiaꝝ:
granoꝝ naſturcy: granoꝝ granatoꝝ: gallaꝝ īmaturaruʒ:
añ. ʒ. v. decoquant̄ cū vini ſtiptici. ℥. viij. decoctione vehe/
menti. Et reductis īteſtinis ad ſupiora embrocet̄ locus cū
frō ꝛ apponat̄ emplʒ nec remoueatur donec p ſe cadat.
¶ Aliud efficax ſʒ Joānitiū. ℞. aloes: diſſoluat̄ gluten in
aceto vini ꝛ aggregent̄ medicine cum eo ꝛ fiat ex eis em/
plm̄. ¶ Emplaſtrū pape Joānis ad crepaturā exptuʒ. ℞.
litargiri: opy: lapidis emathitis: ſang. dra. ſanguis hōis re/
cētis: galbani: maſticis: thuris: coſti: boli armeni: iſculi: mu
mie: armōiaci. añ. ℥. iiij. picis naual': collofonie: cere albe ꝛ
rubee. añ. ℥. ſ. myrre: cardamomi: aloes. añ. ℈. v. collognti
de: palme marie aduſte' gallaꝝ: balauſtiaꝝ: ariſtol. lon. ra/
dicū cōſolide maioris ꝛ minoris. añ. ʒ. i. viſci q̄rcini. ℥. i. fac
decoq pellē hedulinā ī aq̄ donec tota pellis diſſoluat̄ dei/
de colet̄ cū expſſiōe. Et cū colatura illa tere q̄ ſunt terēda
ꝛ liq̄fac q̄ ſunt liq̄faciēda: īcorporēt̄: ꝛ iſculi bñ cōtriti ī vi
ſco fortiter miſceāt̄ cū pdcis donec mixtū reducat̄ ad mo
dū ēpli: ꝛ pcedēte balneo cū aq̄ pluuiali decoctiōis balau/
ſtie: mirte: corigiole: ꝯſolide: ꝛ radicū lini: apponat̄ ꝛ ſupli
get̄ brachale: ꝛ portʒ p. iij. mēſes ſuato pdcō regie. ¶ Pl/
uis quo vtat̄ cū cibis. ℞. nucis muſca. ʒ. ſ. gario. ʒ. iiij. cina

momi dulcis. ℥. ſ. boli armeni. ʒ. ij. ſe. naſturcy. ¶ Itē aliō
emplʒ ſʒ iudeū. ℞. picis: yere: cere rubee. añ. ℥. ſ. litargiri:
armoniaci: galbani: maſticis: terbētine: ꝯſolide maioris ꝛ
mioris. añ. ℥. i. viſci q̄rcini: gipſi: mirte: olibani. añ. ℥. i. aloes
ariſtol. lon. ꝛ rotūde. iſculi. añ. ℥. i. boli armeni. ℥. i. piloꝝ le/
poris minuti īciſcoꝝ tātundē. cōficiātur cū melle ꝛ appli/
cet̄. trabit. n. ſanguinē ad locū ꝛ cū ſtipticis cōſecutiue ap/
poſitis cōdēpſet̄ in lapidē ꝛ opilet̄ ruptura. ¶ Aliō ad idē
℞. picis naualis lib. i. collofonie lib. ſ. galbani: ſerapini: ar/
moniaci: opopo. añ. ℥. ſ. cere. ℥. iij. aceti. lib. ſ. fiat aūt ex eis
cerotū ī ſtagnata liq̄factis: ꝛ q̄ liq̄ fcā fuerit pars de ipa ī aq̄
fra īponat̄ ꝛ cū ſe tenuerit: pix greca puluerīçata cū maſti/
ce: ꝛ thure: cū pdcis īcorporet̄ ī ſtagnata: ꝛ cū ſpatl'a ſemp
agitādo bñ īcorporet̄. fac decoq ꝛ cū cocta fuerit adde ter
bētie. ℥. i. deiñ ſup aq̄ frāʒ cola: ꝛ manibꝰ inunctis oleo lau
rio collige ꝛ fortiꝰ malaxa vt aq̄ īde exeat: ꝛ fac magda/
leōes: ꝛ cū vīo eoꝝ ēpl'a. ¶ Linimētū ad crepaturā aquo
ſaʒ ꝛ vētoſaʒ. diſſoluat̄ bdelliū ī oleo ſambucio: apl'oꝝ vl'
nardīo: ꝛ vīo ātiquo ꝛ addito caſtorei pl'uere: ꝛ ordei pl'ue/
re vel mily fiat. ¶ Capitulū. ij. de augmēto vmbilici.

Contingit vt egrediat̄ vmbilicus ꝛ emineat extra:
ꝛ illud ē in īfantibꝰ ꝓprie. Et cā eius eſt aut ꝓpter
rupturā in ipo nata ſupius pueniētē. vʒ. ex planta
vel ortu. q2 egredit̄ çirbꝰ vel īteſtinū: ꝛ īflat̄: ſic ēt ꝯtingit ī
oſſeo. aut ex cā hidropiſis: ita vt mollificet̄ ꝛ aggreget̄ ī eo
aquoſitas vel vētoſitas ꝯtēta in ꝯcauo vētris replēs ꝛ ex/
tēdēs ipm: aut pp curſuʒ ſupfluētis ſanguis ad ipm ex ap/
tiōe vene ꝛ arterie ipiꝰ: q̄re cutis eleuat̄ ī altū. Signa cāe
pme ſt: qm̄ calor nālis nō mutat̄. Et ē locꝰ diuerſitatis ali
cuiꝰ: ꝛ ꝓpe vbi egrediunt̄ īteſtina: ꝛ ē cum dolore aliquo:
ꝛ tumor cū mollitie ꝛ occultat̄ cū p2emit̄. Et qñq3 ī occul/
tatiōe rugitꝰ pcipit̄ ꝛ adminiſtratiōe mollificantiū ex bal
neis ꝛ vnctiōibꝰ ꝛ motus augmētat̄. Signa eiꝰ q̄ eſt ex ag
gregatiōe hūiditatis ſūt q2 cū ꝯpſſiōe cedit: ꝛ ē leue reſpcu
precedentis colore cutis non mutato: ꝛ etiam ſi ex vento/
ſitate fiat: ꝛ ē leuiꝰ ꝛ magis reſiſtēs ꝯpreſſiōi ꝛ ſonitꝰ ī eoꝝ
vox exiſtit ſi pcutiat̄. Signa vō tertij ſūt mutatio coloris
cutis ad colorē ſanguineū: ꝛ nigreſcētē. Et ſignū ē q2 ex ad
ditiōe carnis nate aut apatis ē. q2 ē graue durū: qđ ꝯpſſio
ſicut alia nō occultat. Cura aūt eiꝰ ē ꝓxima cure rupture ꝛ
ſpēꝝ hernie ſupradicte. Et modꝰ eiꝰ ī pueniēte ex ruptura
ē duplex: vnꝰ cū ꝯglutinātibꝰ ſtipticis īteriꝰ ꝛ exteriꝰ ex em
plaſtris approxiatis poſ'is ī īfantibꝰ ꝛ in egrediētibus poſt
partū cū ligatura quā faciūt obſtetrices: ī qbꝰ ex aptiōe ve
naꝝ ꝛ arteriaꝝ ꝯtigit. ¶ Aliō eſt īciſiōe ſutura ꝛ ꝯſolida/
tiōe cirugica ī corpibꝰ duris ꝛ augmētatis. Cōglutinātia ꝛ
ſtiptica: qbꝰ pmꝰ ꝯplet̄ modꝰ ſūt charabe: thus: balauſtie:
glās: galla: antimoniū: acacia: alumē: terbētina: terra ſigil/
lata: ꝛ ſilia ſil' ꝯfecta vel diuiſim applicata cū ligatura ſtri
cta: ꝛ qñq3 addit̄ ceruſa ſm̄ mēſurā vniꝰ illoꝝ. Et ſimile ē
ſi ſumat̄ tēta: ꝛ īuoluat̄ ſupra ipam pānꝰ: ꝛ accipiat̄ minu/
tū thuris: ꝛ ꝯficiat̄ cū albumine oui ꝛ liniat̄ cū eo ſup vm/
bilicū. ꝛ repleat̄ eo. Modꝰ vō īciſionis ē talis. pcipiat īfir/
mo: vt ſter ꝛ tēdat vētrē ſuū: ꝛ ꝯtineat anhelitū donec ap/
pareat q̄tū poſ'e ē ipiꝰ augmētū. Et tūc fac ī circuitu hꝰ cū
attramēto ſignū diſtictiuū. deide ꝯprehēde: qđ exciat̄ cuʒ
vncino ſupra mirach ſolū: ita q2 nō accipias qđ ē ſub eo de
çirbo vel īteſtino. deide fac reſupinare cū ſupra collum. ꝛ
deide liga cū filo ſub vncino ita q2 cadat ligatura ī ſigno.
nec ꝯphēdat aliqđ ex eo qđ ē ſub mirach: ſʒ ſolum ipm: ex
tūc vō īcide cutē: ꝛ ſue locū deſcriptū cū filis duris extēſis
adīuicē: ꝛ ſtrige ipm ſupra vētrē: ꝛ dimitte cutē. ꝛ cōſolida
pus lacertos: deide ꝯſue cutē: ꝛ ꝯſolida ſic oꝫ. Reliquaruʒ
vō cura cū exiccātibꝰ ꝛ leniētibꝰ ac reſoluētibꝰ notis ꝯplet̄
¶ Ad exitū vmbilici fiat emplʒ ꝓbatuʒ īfantibꝰ qbꝰ acci
dit magis. ℞. granoꝝ lupioꝝ. m. i. peciā vnā pāni linci cō

dure q̄ ↄficiēs cū vīo nigro ꝛ pōtico ꝛ bulliāt donec īſpiſſa tur ꝛ īticta ſpōgiā liga ſupra locū poſtea in aceto ꝛ aq̄ roſ. ꝛ in eo īuolue ſtuppas ꝛ applica ſupra vmbilicū ꝛ eſt raſis. ¶ Aliḋ forti⁹. ℞. aluis aur. xv. gallarꝫ: aur. iij. terant̄ ꝛ cōficiant̄ cū vino calabrēſi nigro: donec īſpiſſent̄ ꝛ īfunda tur ſpōgia: p⁹ in aceto ꝛ aq̄ ro. Itē ponat̄ ſup aliquē pannū gluten de corijs ꝛ tepidū vmblico applicet̄ ꝛ ſupponat̄ puinar de bōbice: ꝛ pāno lineo ꝛ liget̄ cū faſſia. ¶ Itē aliud ℞. aq̄ȝ aluis: vinū calabrēſe. an̄. in q̄b⁹ bulliāt roſe: ꝛ ſpongia inticta ſupponat̄. ꝛ ſi vis efficaci⁹ bulliāt cū roſ: galle: maſtix: thus ꝛ īfaſſia. ¶ Itē ad ei⁹ exitū aquoſuꝫ vinū ī cinere īfunde ꝛ ex eo ſup ēplā. valꝫ ēt ad vētoſuꝫ: ꝛ ↄfricatio cū ↄpſl̄ ōe ex ſaliua ieiuni ꝛ famelici curat eā ſi ex leui fuerit cā.

¶ Capitulū. iij. de dolore ventris ꝛ yliorꝫ.

Dolor ventris ꝛ yliorum ex dictis in dolore inteſtinorꝫ in pte notus ē. qn̄ accidit ex cā exn̄te ītus mirach lacertis ꝛ pāniculis vētris. Et qn̄qꝫ ex cōītate ſuperiorꝫ. vt dyafragmatis. pleure. pulmōis: ꝛ aliorꝫ: vel ſubteriorꝫ mēbrorꝫ vt ītestinorꝫ vel aliorꝫ mēbrorꝫ ꝓfundorꝫ correſpōdētiū illis vt ſtōi: ēpis: ſplēis: renū ꝛ ſiliū. Signū diſtictiuū ē qn̄ cū paſſio ē ꝓpa in mirach dolet cōtinue apō tactū: ꝛ qn̄ꝫ alterat̄ color ꝛ tumor ſi adſit ꝛ ſeqt̄ lacertorꝫ figurā. Cū āt paſſio ē ex cōītate īteriorꝫ dolēt ꝑ tactū: nec ſemꝑ appet tumor niſi cū apa ī eis fuerit magnū ꝛ ē pter lacertorꝫ figurā: nec color cutꝫ mutat̄ ꝛ addit̄ ꝛ diminuit̄ additōe ꝛ dimiutōe paſſiōis illorꝫ q̄ ꝓceſſit. ¶ Cura ē. nā ſi q̄dē ex ꝓpa paſſione fuerit ꝛ ex malitia ↄplōnis fra q̄ ē plimū ex cā exteri⁹ accn̄te: aut ex vētoſitate īterclu ſa cū caleſcōrijs balneis ꝛ elijs ex dyacimino: dyatrion: ꝛ alijs calis: ꝛ ꝓpe ſtichados med cet̄. Et ex medicis appropriatis ei ſimplicib⁹ ē armōiacū bibitū vel epithimatū cū melle aut aq̄ ordei: ꝛ albaſce cocta ꝛ trāſglutita cū melle: ꝛ malabeb: ꝛ cipuꝫ: ꝛ fenugrecū: ꝛ ſem̄ lini: ꝛ ſticados: ꝛ abſinthiū ꝛ reliq̄ anodina. Yyp. v̄o dixit. Quibuſcūqꝫ dolor circa ypocūdria ſine flōne fuerit: febris ſuperueniēs curat egritudinē. Attēdēdū tn̄ q2 dicit ſupueniēs. vt q2 ſpōte vł caſualr̄ ꝓuocata ſit. veniēs v̄o artificialr̄ prouocata ſꝑ niſi corpe mūdo ꝛ ↄſūptōi ſepto. Alr̄ aūt diſpoſito ſi ꝓcurabis fortaſſe accidet tibi ac ſi necꝫ ꝛ te fortiorem introduxeris domū tuā hoiēꝫ te adiuuādi grā. q cū īuenerit aliq̄d ex cōtinētib⁹ vel ↄtētis cui nitat̄ firmabit̄ in codeꝫ nec poteris ipſum expellere cū volueris: ſed fortior ex̄n̄s expellet te ita vt q̄ḋ vocaſti ī auxiliū: in nō auxiliū ↄuertet̄. Sꝫ ſi fuerit ex ſolutōe ↄtinui cū exhibitōe mumie ſūpte ꝛ cū ↄpſſione iūncte ꝓcedēte flōia curet̄ ꝛ granis naſturcij: ꝛ ſucco citoniorꝫ: ꝑnutritis nō fractis: ꝛ cū ēplō ex ↄſolidātib⁹ notis ꝛ ↄueniēti regie. Et ſi q̄dē ex apate fuerit curet̄ cura reliquorꝫ apatū q̄ īdicatōꝫ a patiēte ꝑicula nō ſuſcipiūt. Et ſi q̄dē ex cōītate ad ſupiora fuerit vel ſubteriora mēbra ꝛ ꝓfunda curet̄ cura doloris pectoris ꝛ pleureſis vel cura doloris ēpis vel ſplenis ꝛ ītestinorꝫ dcā. Et ex ſimplicib⁹ medicis ↄueniēs ꝛ exꝑtū ē betonica cū terit̄ ſic ē ꝛ ēplat̄ aufert. n. dolorē ꝛ īflatōꝫ vētris. Et ſūpte ex ea. ʒ. iiij. cū aq̄ dolorē ēpis: ꝛ cū melle ꝛ aceto dolorē ſplenis ſedat. Et abſinthiū ēplatū cū olō ḋ alchāna fcō cerotō: aufert dolorē ſtōi ēpis ꝛ yliorꝫ. ¶ Et ex ↄpoſitis ē h̄ q̄ḋ ſedat dolorē vētris ꝛ yliorꝫ in īfantib⁹ ꝛ ꝓbatis. ℞. ſucci paritarie: ſucci herbe fenicli. an̄. guttas. iij. ꝛ cū lacte ī coclearī da ei p⁹ balneū ī aq̄ decoctōnis ipi⁹ paritarie. ¶ Aliḋ. ℞. feniculi: granorꝫ naſturcij: ſe. apij: ameos: ꝫinꝫi. ciamo. an̄. ptes eq̄les ſerapini ad pond⁹ oīuꝫ: fiāt ex eis pille vt auellane ꝛ miſtrent̄.

¶ Incipit particula quinta ſectionis prime finalis ꝛ vltima que eſt de medicina egritudinum iuncturarum continens ſummas quattuor.

Subſequitur particula q̄nta ſectōis p̄me finalis ipſius ꝛ vltia de medicis egritudinū iūcturarꝫ: ↄtinēs ſūmas q̄ttuor. q̄rꝫ p̄ma ē de medicis doloris ipſarꝫ. ſc̄a ḋ medicis diſlocatōis. tertia de medicis ſolutōis ꝛ ſeparatiōis. quarta de medicinis apatū carūdē. ¶ Prima vero ſūma eſt preſentis ↄſiderationis continēs capitula decē.

¶ Capitulū. i. ē ꝓhemiale ꝛ eſt ſ̄mo gn̄alis ī iūcturis ꝛ diſpōnib⁹ ꝛ dolorib⁹ earꝫ cauſiſqꝫ ꝛ ſignis ipſarꝫ.
¶ Cap. ij. eſt de medicis iuncturarꝫ ꝛ cura dolorꝫ ipſaruꝫ in generali vt artetice cōmune.
¶ Cap. iij. de dolore ipſarꝫ in ſpeciali ꝛ p̄mo de dolore humeri ꝛ ſpatule ꝛ medicinis eius in ſpeciali.
¶ Capitulum. iiij. de dolore dorſi.
¶ Cap. v. de dolore anche ꝛ ſciatico ꝛ medicis eius.
¶ Cap. vi. de dolore podagrico ꝛ medicis eius in ſpeciali.
¶ Cap. vij. de medicinis diſpōnis ꝛ accn̄tiū q̄ dolorib⁹ iūcturarꝫ inſurgere cōſueuerūt.
¶ Cap. viij. de his q̄ ꝓſeruāt a dolorib⁹ iuncturarum.
¶ Cap. ix. de varicibus ꝛ medicinis earum.
¶ Cap. x. de elephantia ꝛ medicinis eius.

¶ Cap. i. ꝓhemiale ꝛ eſt ſermo gn̄alis in iūcturis ꝛ diſpōnibus earꝫ ꝛ dolorib⁹ cauſis ꝛ ſignis earum.

E ſcire oꝫ q dolor iūcturarꝫ ē nociu⁹ ſenſus ipsarꝫ: ꝛ ē recipiēs diuiſiōes penes ſuas cās eēntiales ipſarū. atqꝫ accn̄tales q̄b⁹ variat̄ ſua diſpō atqꝫ cura. Cāe v̄o eēntiales doloris ſt̄ duplices: res ꝑcipiēs: ꝛ res iprimēs. nihil. n. aliḋ ē dolor q̄ ↄriū ipſiorē ſubito ſentire vt dixit Abo. Penes cām ꝑcipiētē q̄ ē mēbꝝ iūcturis ſpecificationē recipit: ꝛ diuiſionē hoc mō. ¶ Sciēdū p̄mo q iūcture paſſiue ſūpte oſſiuꝫ mēbrorꝫ corpis extremitates alternatiꝫ adiuicē ſūt ↄiūcte. Actiue v̄o ptes extrema ipſorꝫ ↄtiguatorꝫ ad ſeiuicē ↄiūgētes: ꝛ ex ligamētis ḋ extremis ad extrema oſſiū ꝓtēſis: ꝛ cordis lacertorꝫ ī eorꝫ circuitu alligātib⁹ ↄpoſite ꝛ ↄmixte venis ꝛ arterijs ſupcurrētib⁹ atqꝫ cute a nā ordiatis. Ut ꝑ eas mēbra flexionē ꝛ reflexioneꝫ recipiāt eorꝫ opatiōib⁹ ꝛ motib⁹ opportuna. Que oēs ſenſibiles valde ſūt. q2 nervoſe dure ne ī motu eorꝫ. q̄ſi ↄtinuo rūpant̄: ꝛ ne calefiant fre: ꝛ ꝓinde debiles vtreqꝫ ipſarꝫ. q2 a p̄mo p̄ncipio ſt̄ remote iter ſe ↄcauitatē: ꝛ cauernoſitatē hn̄tes: vt colligāt ꝛ ↄſeruēt hūiditatē ne exiccet̄ ī motu: q ſi n̄ ↄtigat ī q̄tro l' q̄li excedere eas exiccari ꝛ calefieri ē neceſſe ac ↄbilitari magis: vēas quoqꝫ ꝛ vias ad ipſas ex mēbris ꝛ corpe dilatari: q̄ ꝑꝑ ſupfluitates ꝛ hūores corpis trahere ad ſeipſas īfluxas recipe: ꝛ illas ↄſeruare ꝑꝑ ſpiſſitudinē ꝛ fritatē. Et ꝓide egritudīes oīs gn̄is īcurrere ꝛ plimū reumaticas: ꝛ dolorē ꝑꝑ cām īferi⁹ aſſignādā q̄b⁹ egritudinib⁹ nūc ꝓtermiſſis tanqꝫ ad ſectionē ſcōaꝫ ꝑtinētib⁹ q̄ de medicis egritudinū vl'iuꝫ tractat tn̄ de medicis doloruꝫ ipſarꝫ: hic dōm q gn̄alib⁹ oīb⁹ egritudinib⁹ ē ſinthoma ſibi ꝓiudicās ſanatōēꝫ ſua fortitudine iter oēs ꝛ curā ipſarꝫ vl'r ↄphēdēs: nec nō a mēbro ſeu iūcturis ḋnoiationē recipiēs ſ̄m gen⁹ ꝛ ſpēm variato. ¶ Dolor. n. iūcturarꝫ: aut eſt vl'is oīb⁹ iūcturis: ꝛ ſic artetica nūcupat̄ ab articul' dcā q gn̄alr̄ iūcture dr̄: aut aliq̄b⁹ ꝓprijs: ꝛ hoc ſ̄m varietatē iūcturarū: varie noiat̄. q2 variā ab eis ꝓꝑetatē aſſumit. vt īfra patebit. iūcturas. n. ī vētre ſūt bifarie varietatis. Quedā. n. ſt̄ corpis: ꝛ tales ſpōdiliuꝫ dorſi eē noſcunt̄ q̄ḋ baſis ē corpis vniuerſi: ſic carina nauis: q̄dā ſt̄ mēbrorꝫ extremorꝫ ḋ corpore ꝓdeūtiū: ꝛ h̄ diſtiguūt̄ dupl'r: q̄dā. n. ſūt ſupiorꝫ extremorꝫ: vt manuū gn̄alr̄ acceptarꝫ: q̄dā īferiorꝫ vt pedū ſilr̄ gn̄ali mō ſuptorꝫ. Et vnaq̄qꝫ ipſarꝫ totidē recipit ſectiones quotideꝫ ī ſe ↄtinet iūcturas a q̄rū q̄lꝫ ꝓpriā denoiationeꝫ recipit q gn̄alr̄ iūcturarꝫ dolor dr̄: ꝛ ꝑꝑ nāꝫ earꝫ variam ꝛ