¶ Capłm.ix.de mollificatiõe ani ⁊ egreſſiõe eius.

Ollificatio ani ⁊ egreſſio eiꝰ eſt nota. Et eſt aut a
m nā ſeu īfantia vel ꝑter nām dilataꝰ ⁊ egreſſus nõ
congregeť ⁊ retrahať nāli ⁊ debito mõ: ſed rema
neat extra ⁊ caput ſeu extremitas recti īteſtini cū eo: ⁊ qñ
qꝫ paꝝ qñqꝫ in q̄titate palmi vniꝰ ⁊ plus: put in quodam
vidimꝰ iauenēſe. Et qñqꝫ egreſſio eiꝰ eſt cū volūtate ⁊ ē mi
nus malū. ⁊ qñqꝫ eſt ꝑter volūtatē: ⁊ magis malū: ⁊ qñqꝫ ē
cõſenſu ⁊ eſt meliꝰ. ⁊ qñqꝫ ꝑter ſenſum ⁊ eſt peiꝰ. ⁊ qñqꝫ eſt
egreſſio fecū inuolūtaria ⁊ eſt peſſimū. Et cā eiꝰ ē aut ma/
la cõplexio paliticata frigida ⁊ hūida iterioꝝ cū mā ſub/
tili ībibita ī neruo latitudiali ꝯgregāte: ⁊ neruis lõgitudi/
nalibus retrahētibus ipm ⁊ īteſtinū cū eo. ⁊ qñqꝫ eſt mix/
ta cū calītate inuāte ipam ad penetrādū ⁊ ibibendū. Et
qñqꝫ eſt apa in ano ſua grauedine trahendo īferiꝰ coadiu
uans. Et qñqꝫ eſt exteriꝰ veniēs puta ex aq̄ frigida: cū bal
neať: vt fullonibꝰ ⁊ nauigātibꝰ ſepe accidit vel aere frido
cū ei coacti exponunť aliq. Et qñqꝫ eſt ꝑꝑ emoroidarū li/
gationē icīſionē vel corroſionē in medicis cadētem ſupra
neruos ſeu lacertos ꝑdictos: q̄re abſcindimur ⁊ eius cura
erit ipoẛis. Aut ꝑꝑ caſum ſupra dorſum aut ꝑcuſſionē diſ/
locantē ſpõdiles a qbꝰ nerui ꝑdictoꝝ lacertoꝝ egrediun
tur: q̄re nerui cõprimunť vel diſrumpunť. ¶ Signa eius
q̄ a cõplexiõe mala palitica eſt ſūt ꝙ eſt. q꜠ paulati accidit
⁊ ꝑceſſit regimē multiplicās talē mām: ⁊ eſt ſine ſenſu pli
mū: ⁊ accidit vt egrediať egō iuoluntaria ⁊ ſi eſt cū calita
te ſenſus declarat ⁊ tactꝰ ⁊ ſi eſt a cā exteriori ⁊ frigore ſi/
militer. Que vō ꝑꝑ alias cās eſt ſubito veniēs. ⁊ ē cā mai/
feſta abſqꝫ aliquo alio malo regimie ꝑcedēte: ⁊ accidit do
lor ꝑꝑ illud qđ accidit in neruo cõſtringēte vel retrahēte
de leſione. ¶ Cura eiꝰ q̄ eſt a mala cõplexiõe paralitica i/
teriori cū mā fria vel calitati cõiuncta eſt ſilis cure pruri/
tus ani ab hūore facti. Cū ergo ꝑceſſerit corporis purga/
tio ab hūoribꝰ ꝑdictis veniētibꝰ cū ꝑceſſiõe digõnis cū ꝑ
prys ⁊ regimē fuerit declinās ad calꝫ ⁊ ſiccū: nec̄e ē vt hu/
morē illic ībibitū reſoluas abſtergas ⁊ exiccas: ⁊ hoc cum
cliſteribus lauacris collirys empl̄is vnctōibꝰ cū pulueri/
bus. Cliſteribꝰ qdē ex aq̄ marina ⁊ euforbio vel ſerapino
vel yeris magnis vel agarico ⁊ ol̄o rutaceo. Lauacris cū
aqua maris ſulfuris baurach felle nitro ⁊ aqs termarum.
Collirys ex melle aloe ⁊ collognide. Unctiōibus ex oleo
nardino coſtino ⁊ laurino: vel cerotis vel vnguētis appro
priatis q̄ in antidotario nr̄o diximꝰ. Empl̄is ex armõiaco
ſerapino: ſtafiſagria aceto ſqlle ⁊ cera ⁊ melle. Deinde ſiq/
dem retrahať ⁊ reducať vtaris ſtipticis lauacris ꝑdcis ī/
tenaſmone. Qz ſi nõ retrahať ⁊ reducať per ſe oꝫ vt laueť
cū vino nigro põtico vel aq̄ alumis decoctiõis gallaꝝ q̄r/
cus ⁊ cipreſſi ⁊ copulaꝝ glādiū mirte: ⁊ balauſtie: ⁊ deide
aſpergať puluere thuris merdaſegni: ceruſe plūbi gallaꝝ
⁊ antimony: ⁊ deide reducať ⁊ reſtringať ⁊ qeſcat: ⁊ vēto/
ſa ſupra alchatim reducit ipm. Qz ſi anus non reducať ꝑꝑ
tumorē ⁊ apa in ipo: tunc oꝑꝫ vt mollificetur ſedendo in
aquis calidis decoctionis mollificātium ꝑdictoꝝ ī tenaſ
monis cura cū ol̄o camomillio bdelio. qñ reduceret: dei/
de cureť cū eis q̄ dcā ſūt ī cura apatis: deide cū reſoluenti
bus ⁊ ſtipticis ꝯſtrigať. Qz ſi nõ reducať ad hec ſupra cau/
dā a duobꝰ lateribꝰ eiꝰ cauteria applicenť. Et ſi ē a fridi/
tate exteriꝰ ꝓcedēte cureť cū calis: put in tenaſmõe dcm̄
eſt. Et ſi eſt a cāu vl̄ ꝑcuſſiõe ſupra dorſū cureť diſlocatio
ſi poẛe eſt vt ī ẛa ſectõe deo duce dicemus. Puluis cornu
cerui ſupaſperſus poſt ablutionē cū vīo ⁊ reductionē cõ/
fert. ¶ Medicamē exptū ybernici ad exitū ani. ℞. kara
be cornu cerui buſti balauſtia. thuris ātimony acatie thu
ris minuti terant ⁊ pulueriçenť ſup anū ⁊ vmbilicū ⁊ re/
nes cū petroleo ⁊ vitello oui aſſa. ¶ Aliud medicamē ad
exitū ani ⁊ emoroidas ſup lapidē molarē calīn: folia porri
ꝯtrita ipõe: ⁊ acetū ſupaſꝑge: ⁊ fac patiētē ſedere ſup eū ⁊
anche eiꝰ ⁊ renes inungant melle ⁊ puluere: ſemis naſtur
cy: ⁊ ſup liga. ¶ Itē aliud. ℞. abſinthiū pātariā ⁊ menta/
ſtrū ſine aliquo liquore calefactū ⁊ ſuppoſitū multū valꝫ.
Itē ſpõgia marina calefacta ī aceto in quo cocte ſint radi
ces granatoꝝ ⁊ mirtꝰ ſupponať. Itē muſceleon calꝫ ſūptū
multū valꝫ: ⁊ qñ vadit ad ſellaꝫ ⁊ ſurgit ab ea recipiat fu/
mū colloſonie thuris ⁊ pineaꝝ. Et ad dolorē ani paritari
am bñ decoctā. ⁊ ꝑ mixtā oleo: ⁊ deide cocta applicet.
¶ Itē aliud ad dolorē ⁊ īflāmatõeꝫ. ℞. ſtercꝰ galline ſic/
cū vel recēs diſſolue cū ol̄o īteſta cal̄a ⁊ ſup peciaꝫ extēde
⁊ loco dolēti appone: ⁊ oleū decoctiõis ſcarabeonū balnei
cū cinbalaria facit idē. ¶ Medicamē. S. ꝯferēs ad molli
ficationē ani ⁊ exitū eiꝰ. ℞. fructꝰ q dr̄ arabuſti gallaꝝ ce
ruſe de plūbo acatie barbe yrcine corticis pini q̄ dr̄ fantis
thuris ⁊ myrre oīuꝫ. aā. aur. iiy. pulueriçenť ſicca ⁊ poſtq̄
abluiť anus cū vino pontico ſuperaſperge.

¶ Incipit ſūma ſcđe ꝑticule ſectiõis ꝑme: ē ad medici
nis egritudinū īſtrumētoꝝ vrine ꝯtinēs. xv. capl̄a.

Sublimis deus renes

creauit. eoſqꝫ dotauit vtute ſpecifica q̄ ſu
perfluitatē aquoſaꝫ ⁊ traherēt ex venis.
vt vtute epis ipellētis in ſimul a ſanguie
ſeq̄ſtreť: ex quo iuuamētū mixtiõis ipiꝰ
extitit ꝑfinitum. Et coagulauit eos ī ſub
ſtātia dura ex ſanguine ne ab eiꝰ acuitate mordicanti q̄ſi
continue grauiter lederentur. Et cõbinauit eos. vt ſi vni
accideret nocumentum alius in operatione complenda
ſubſiſtat fecitqꝫ proinde vnumquodqꝫ plurimarum diui
ſionum ſicut in boue non vniꝰ ꝯtinue ſubſtātie ſic ī porco
vt cū nocumētū alicui ex ꝑtibꝰ eiꝰ accideret ſtaret ī opera
tiõe tā nec̄aria cū plurimo eiꝰ ab illa ꝑte diſtictō. Incūbit
eni nāe tā grandis nec̄itas trāſcolatõis aquoſitatis ex ve
nis a ſanguie vt nõ minor ſit nec̄itate mixtiõis ipiꝰ cū eo
queadmodū. n. nutrimētū trāſire ad mēbra ſine aquoſita
te nõ põt: nec eis diſtribui ⁊ appon̄: ita ſine eiꝰ ſeq̄ſtratiõe
nõ valꝫ illis diſtributū vniri ſic ex primo defectu accidat
atrofia: ita ex ſcđe ꝓueniat hidrops vl̄ cacexia. Hāc āt ne/
ceſſitatē nā ꝑcognoſcēs illos alligauit dorſo neruis ac liga
mētis explātatis: ab eo ⁊ iuxta venā ſupra ipm extēſam: ⁊
hic ide lateralr̄ collocauit vt a vena ipa emulgēti vocata
abiliꝰ trahēt illā. Collocauit illos ſeorſuꝫ ī hoīe: dextrum
qdē ſupiꝰ ꝓpinquū epi donec penulā eius tāgat: ⁊ hoc vt
abiliꝰ ab eo illā traheret q̄tū poẛe ē. Siniſtrū vō īferiꝰ. vt
q꜠ qđ trahiť ex illa nõ attrahit ex ꝑmo foramine qđ hꝫ ad
venā. imo a dextro vt attrahať: ⁊ qđ ꝓpiquiꝰ ꝑmo ⁊ ad lõ
ginquiꝰ: ſcđo ſicqꝫ trāſcolatio meliꝰ ꝯpleať ob quā poſita
ē in īferiori ſeu itrīſeca coꝝ ꝑte ꝯcauitas ad quā trāſmit/
tiť ꝑmo ⁊ aq̄ ipelliť īferiꝰ ad veſicā: ⁊ ī medio corꝑe renes
qđ de ſanguine aſſociať aquoſitati: trahēdo purificāt me/
liori mõ quo pñt ab ea: vt nutrianť ab eo: ⁊ aquoſitatē tā/
q̄ inutilē ad veſicā ipellāt. Aquoſitas. n. nā ordinante nõ
ſic a ſanguie purificata ꝺ epe trāſferť ad renes qn ad ſan/
guis mixti ad modū loture carnis recētis hāc quo nutriā
tur renes q̄ſi ī ſeq̄ſtrādo nec nutrianť ex illo ꝺficeret vri
na rediret ſic lotura carnis recētis codē q̄ſi modo. quo ſi
epar debilē nõ diſcernat quā ipellit eis aquoſitatē a ſan/
guie: put oꝫ. Et ex reībꝰ aduēit neruꝰ paruꝰ quo excreanť
pāniculi ipos a mēbris alys diſtiguētes: ⁊ circa venā flectē
tes ⁊ dorſuꝫ. Aduēitqꝫ eis vēa illa magna ab epe ⁊ arteria
ex arterys q̄ aduenīūt epi. Poſt quoꝝ creationē creauit
veſicā: queadmodū. n. deꝰ ad expulſioneꝫ ſicce ſupfluita
tis q̄ digõni ꝑme īſeq̄tur: ordinauit q̄dā mēbra ad ſeque
ſtrādū ipam a chilo vt ſupiora inteſtina gracilia maxime:
q̄dā ad colligēduꝫ vt monoclū: ⁊ quedā ad complendum

vt colon q̄dam ad extraducendum vt inteſtinum rectuꝫ
propter cauſam ſuperius aſſignatam. Eodemq; modo ad
expulſionē ſupfluitatis aquoſe q̄ ſcḋe iſequit̄ digōni deus
mēbꝛa iſtituit q̄dā: hic vō ad ſeq̄ſtrādū vt renes q̄dam ad
colligendum ꝛ complendum: vt veſicam quadam ad pro/
ducēdū ipam extra. vt virgā pp eādē ſilr cām: ꝛ vritides
vt viā p quā trāſiret de renibꝰ ad veſicā. Sicq; creauit eā
ꝛ neruoſaꝫ ꝛ paniculoſaꝫ vt eēt ſuſceptiua extēſiōis i colli
gēdo illā: ꝛ duoꝝ pāniculoꝝ: ſeu tunicaꝝ vt fortis eēt i cō
tinēdo ꝓide fuerūt pāniculi ipi ex ligamētibꝰ neruis ꝯte/
xti: quoꝝū iterioꝛ ē duplo groſſioꝛ exterioꝛi ne ab acuitate
vrīe cui obuiat offendat̄. Et vt colligat̄ i ea ſubtilr igēiatꝰ
ē. vt ſic eā itraret ꝙ p viā itroitꝰ quoquomō nullatenꝰ re
trocedere poſſit ꝙ ſi poſſet nāe piculū atq; faſtidiū pate/
ret ſic̄ ſcroſus ꝓide vritides poꝛos ꝓtēſos a renibꝰ ad ipaꝫ
diſpēſauit vt attigētes eā i ꝯcauo eiꝰ ꝛ iuxta collū icederēt
iter duos pāniculos eiꝰ exterioꝛē tunicā pfoꝛādo pꝰ: ꝛ hoc
p ſpaciū hñs q̄ntitatē: deīde diſrūpēt iterioꝛē pāniculū. vt
aquoſitatē i eiꝰ ꝯcauitatē trāſfundāt. ꝛ cū ipleta fuerit ea
ꝯprimēte iterioꝛē pāniculū eiꝰ exterioꝛē ſubintrātes iter
eos vritides clauderent̄ ꝯpreſſi. quo minꝰ ex eis regredia
tur vrina q̄ntūcūq; ēt exteriꝰ comprimāt. Ait. n. G. ſi. n. ad
quā ptē claudit̄ feneſtra eā ipellēdo ſtudeas apire magis
eā firmabis: ꝛ vt collecta i ea teneret̄ p volūtate nec exi/
ret p eiꝰ collū qḋ ad eiꝰ oꝛdinauit expulſionē i volūtarie:
ſicut in patiētibꝰ vrine diſtilationē ꝯtigit. Procreauitq;
ipm carnoſuꝫ plurimoꝝ afractuū: ꝛ i eo lacertū latitudīa
lē iuoluit ꝯtractiōe cuiꝰ ꝑcluſuꝫ ad modū marſupij vrinā
retineret p velle ꝛ tādiu ꝙ vnctuoſitateꝫ ſanguis q̄ iſicit̄
trahat qua nutriat̄. deīde eo mollificato vrina ꝓcedit ad
virgā vt extra ꝓgrediat̄ p circūtractionē ꝛ ꝯpreſſionē vil
loꝝ eius ſubē ſi mltā exiſtat vrina. ꝛ ſi pauca exiſtat i ea p
circūtractionē ꝛ cōpreſſiōeꝫ: lacertoꝝ ēt vētris oꝛdinatoꝝ
ad coadiuuādā ēt taliū ſupfluitatū expulſionē. Et ꝯtinua
tur vnicuiq; lateꝝ eiꝰ neruꝰ q̄ntitatē hñs ꝛ vene quiete ꝛ
pulſatiles. ꝛ mltiplicati ſūt i ea vt ſentiat̄ cui initit̄. ꝛ ad q̄
extēdit̄. Ex qbꝰ maniſeſte colligit̄ ꝙ ſic̄ egritudines eius
poſſe tpalr euenire atq; curabiles ꝓprie ꝛ ex cōitate. ꝛ ꝓ/
prie ſūt gnīs malitie ꝯplōnis ſimplicis ꝛ cōmixte plīmuꝫ
ꝛ pure: ꝛ cū mā pluriū pp illud qḋ de humoꝛe aduenit eis
cū ſupfluitate aquoſa ꝛ gnīs male ꝯpōnis vt oppilō i coꝝ
venis ꝛ poꝛis ac replō i cōcauitatibꝰ eoꝛūdeꝫ ex ſanguine
humoꝛe vel lapide. ꝛ gnīs ſolōnis ꝯtinui. vt ſunt vlcera ꝛ
coꝛroſio in coꝝ ſubā ꝛ abſciſio venaꝝ: ꝛ aptio eaꝝ. Et gnīs
apatis ex qbus debilitant̄ accītalr veſica ꝛ renes in coꝝ
opatiōe ꝑdicta cōi. ꝛ cū multiplicat̄ debilitat̄ epar donec
ꝑueniat res ad hidropiſim. ſi nō alr reſiſtat̄ dolēt quoq; ꝛ
alia ſinthomata patiunt̄. Et ſignificatio ſupꝛa tales hētur
ꝓprie ꝛ potiſſime ex ꝓpō doloꝛe: ꝛ tactu ꝛ diſpōne mēbꝛo
rū vicinoꝝ ꝯpatientiū eis imediate: vt eſt doꝛſū ꝛ alia vri
nalia mēbꝛa imediate vt eſt epar ſtōs coꝛ cerebꝝ. ꝛ ēt to/
tum coꝛpꝰ. Vñ aboali mēbꝝ cōpatit̄ alteri mēbꝛo: q̄ ter/
tio mēbꝛo aſſociat̄ ſic̄ cerebrū aſſociat̄ reni ppea. q̄ vnū/
qḋq; aſſociat̄ epati: ꝛ exeūtibꝰ cū vrina q̄ ſi ſana ſint ꝛ ap/
petitus nō ſit leſus ſitq; cū alijs ꝯtentis pter nāꝫ ſanitatis
epis īdicat ꝛ egritudinē renū. Si doloꝛ inˀ lūbis exiſtat vt
abo. dixit. ꝛ per ipam nō ſanā puta groſſā ꝛ reſidētē multā
eoꝝ egritudines reſoluunt̄ qbꝰ plīmū paucitas vrīe aſſo/
ciat̄. Et ſm hec hic ſūma ſcḋa q̄rte particule ſectiōis. pri/
me q̄ eſt de medicis egritudinū iſtorū vrine capl'a ꝯtiet
xv. Et q̄ renes ꝛ veſica in cāis egritudibꝰ ꝛ accidentibꝰ
ꝯueniūt plīmis queādmodū ꝛ i actu vt ex ꝑdictis appaꝫ
plīmū ꝛ in cura ꝯueniēt ꝛ medicis qbꝰ hꝫ cōpleri drūtibꝰ
tū in vtute potētia eltalis ꝛ ſpecifice pp ipſoꝝ drīam i nā.
p tāto de cura egritudinū plurimaꝝ ipſoꝝ ſil' loq̄mur cā
breuitatis cū dei noīs in vocatōe q ſit bn̄dictus.

Capitulum primum de medicinis male complexionis
renum ꝛ veſice.
Capitulum ſcḋm de oppilatione renum: ꝛ veſice ex la/
pide: ꝛ medicinis eius.
Capl'm tertium de oppilatōe renū ꝛ veſice ex ſanguīe
vel alio humoꝛe ꝛ medicinis eiuſdem.
Capl'm. iiij. de diſlocatōe renū ꝛ veſice ꝛ medicis.
Capl'ꝫ. v. de ſolōne ꝯtinui i renibꝰ ꝛ venis coꝝ ꝛ coꝝ vl
ceribꝰ ꝛ ſcabie ac reliquoꝝ mēbꝛoꝝ vrīe ꝛ medicis coꝝ
Capl'm. vi. de apatibꝰ ꝛ veſice ꝛ medicinis.
Capl'm ſeptimum de doloꝛe renum ꝛ veſice prouenīē
te ex eo: ꝛ medicinis eoꝛum.
Capl'm octauū de debilitate renū ꝛ veſice ꝛ diſtinctōe
nocumentoꝝ contingentiuꝫ in actione vrinandi.
Capitulum nonum de diminutione ſeu paucitate vri/
ne ablatione ꝛ priuatione ipſius.
Capitulum decimum de diabete.
Capitulum vndecimum de fetoꝛe vrine.
Capitulum duodecimuꝫ de diſſuria ꝛ iuoluntario exi/
tu ꝛ diſtillatione vrine.
Capl'm. xiij. de ſtranguria ꝛ difficultate vrine.
Capitulum. xiiij. de ardoꝛe vrine.
Capitulum. xv. de multitudīe ꝛ mictu in lecto.

Cap. i. de medicis male cōplexionis renū ꝛ veſice.

m Ala cōplexio renū. ꝛ veſice ſpēs eiꝰ cāe ſigna ꝛ cu/
ra ex his q̄ dicta ſūt in epe ſūt manifeſta: ꝛ īfra ca/
pitulo de debilitate dicemꝰ. Oppilō i renibꝰ ꝛ ve
ſica: ꝛ alijs iſtrīs vrine plīmū ē coartatoꝛia pp illud qḋ de/
ſcēdit ad ea de ſupfluitatibꝰ cū vrina: ꝛ ſi ex hūoꝛe ē iplen
te ꝛ oppilāte aut erit ex mltitudīe ſanguis ꝛ ſigna eiꝰ ſunt
ſanguīea vrīa cū doloꝛe grauatiō i eis ꝛ doꝛſo. Vñ aboali
ait. eſt aūt cū in egritudibꝰ acutis ſanguīeis vrīa ſic̄ ſāguis
ipſe emittit̄ apertōe vene nō exn̄te i renibꝰ ꝛ ſignificat re
plōnē ſupfluā in venis quā ꝯhit ꝛ oñdit in renibꝰ eſſe do/
loꝛ grauatiuus ptiū ꝑdictaꝝ adiunctꝰ illi: ꝛ ſignificat eā ta
ctus calitatē inueniēs ſupꝛa renes ꝛ doꝛſū ꝛ ſitis q̄nq;: ꝛ re
gimē vſe: ꝛ alie cōſiles circūſtātie iuēte in eo cū iuuamen
to a frigidis: ꝛ q̄nq; erit ex ꝯgelato ſāguīe in veſica de q̄ i
fra de ſolōne dicet̄. Aut erit ex alijs hūoꝛibus groſſis ꝛ vi
ſcoſis. Et ſigna eiꝰ ſunt vrīa cū hipoſtaſi groſſa ꝛ ꝯglobata
ꝛ cū ampullis ſup natātibꝰ vt hyp. dixit in affo. Cū maioꝛi
grauedīe ſeu doloꝛis grauatiui renū additōe nō ſolū pp id
qḋ oppilat: ſꝫ ēt pp id qḋ ex oppilatōe retinet̄: ꝛ aggregat̄.
Et eſt in ea retētio vrīe q̄nq; vt īfra dicet̄. ꝛ tactꝰ iueniēs
frigiditatē ſupꝛa renes ꝛ regimē ꝑcedēs multipl' cās tales
hūoꝛes ꝛ alie cōſiles circūſtātie cū iuuamēto ex calis. Et
q̄nq; eſt cū vētoſitate groſſa coartata i eis generata ex ꝑ/
dictis hūoꝛibꝰ calefactis vel cibis. Et ſigna eius ſūt ſigna
ꝑdicta cū extenſiōe ꝑcepta ſeu tenſiōe ꝓpe cū mouet̄ ꝛ i/
clinat̄. Et q̄nq; ē ex hūoꝛibꝰ mediocriter alteratis puta ſa
nie groſſa ꝛ viſcoſa coartata in coꝝ ꝯcauitate ꝛ poꝛis q̄ā
nā expellit p venā adoꝛti maioꝛē a ſupioꝛibus mēbꝛis ad
mēbꝛa vrine ſic̄. G. ꝛ Abo. dixit. Et ſigna ſunt añceſſio apa
tis dubelati in ſupioꝛibꝰ mēbꝛis vel vlcera ꝛ ꝓpe in epe. ꝛ
ſpūalibꝰ mēbꝛis ꝛ vrīa ſanioſa ꝛ ardoꝛ. Et ſignuꝫ cōe in oī
cā eſt ſtupoꝛ iferioꝝ mēbꝛoꝝ: eo ꝙ ſpūs ſenſibil' ad ea bo/
no mō trāſire nō valet cū qbuſdā ꝑdictoꝝ ſignoꝝ. ſ. dolo/
re grauatiuo: ꝛ ſenſu calitatis ſupꝛa renes aut erit ex lapi/
de de quo ſtatiꝫ dicet̄. Cura eiꝰ q̄ eſt ex ſanguīe eſt eua
cuatio cū flomia ex baſilica vſq; ad lippotomiaꝫ: deīde ſi
expedit cū flomia ſaphene vel aptiōe venaꝝ emoꝛoida/
lium ꝛ cū regimie extenuatiuo vel ifrigidatiuo ex diureti
cis frigidis. Et cura eius q eſt ex hūoꝛe groſſo ꝛ viſcoſo eſt
cura oppilatōis epis ex hūoꝛibꝰ groſſis talibꝰ. Et ē i ſūma
tres res. Pꝛia ē regimis ſubtiliatio. Scḋa ē ad eq̄tiō māe.
Tertia eſt euacuatio ipſius. Pꝛima res nota ē. Secunda

etiam. Tertia ex premiſſis ibidem. cōplet tamē quādoqꝫ
cum ſoluētib⁹ cū deriuatiōe vt ſunt vomit⁹ cliſteria ⁊ far
maca vētris ſolutiua ex qbus ꝓpriū ⁊ ſimplex agaricū et
galbanū ſemē vrtice yreos aſſarū ſapinū cū hidromelle:
⁊ vterqꝫ elleborus. Et cōpoſitū eſt yera. oꝫ āt ne ſit ſolutio
laborioſa ne hūores effūdant ad renes qñqꝫ cū ſoluētib⁹
ab deriuatōe vt cū diureticis calis ex qb⁹ ꝓpria ſunt ſpica
foliū caſſia lignea fu. ſicca aq̄ cicerū nigroꝝ: ⁊ capil. vene.
meu. ⁊ vinū in quo reſederit ſpica. ſoluūt. n. vrinā in hūori
bus groſſis ⁊ alia q̄ ꝓuocāt cū v̄tute ⁊ extrahūt ſupfluita
tes groſſas q̄s īfra dicem⁹ ī cura oppil'onis coꝝ ex lapide
⁊ difficultate vrine niſi reumatic⁹ fuerit quo cāu diureti
ca fortia nō ꝯueniūt niſi p̄us purgato corpe mā ceſſauerit
fluere: vnctōib⁹ ex oleis reſolutiuis ⁊ cerotis ⁊ emplis et
balneis reſoluētib⁹ nāliter vel artificial'r ordiatis. Et ſiq
dē ſit cū vētoſitate cura eſt īflatiōis ſtōi epis ⁊ ſplenis ſu
peri⁹ dcā. Si v̄o coꝝ oppilatio ſit ex ſanie ei⁹ cura eſt du
plex regimē. Primū eſt regimē apatis dubelati ⁊ aperti
ſeu vlceꝝ ſuperioꝝ mēbroꝝ. 2m eſt ſanici mūdificatio vt
nō noceat. p̄mū habitū eſt ſupi⁹. 2m ēt vbi de cura apoſte
matum dictum fuit.

¶ Ca. ij. d̄ oppil'one renū ⁊ veſice ex lapide ⁊ medicis ei⁹.

Apis in qnqꝫ partibus corporis ſm. G. gñari pōt.
1 In pulmone. ſ. ⁊ ītestinis de qb⁹ ſupra dictū eſt: ⁊
illud eſt raro: ⁊ in renib⁹ ⁊ veſica de qb⁹ nūc dōm
eſt ⁊ eſt plimū ⁊ ēt ī iuncturis de quo dicet īfra ⁊ ē medio
criter ſe hñs. Et vbicūqꝫ gñatur cōem ī gñe hꝫ cāꝫ. Et hi
de qb⁹ eſt ſmo in cā ꝯueniūt: ſed in ei⁹ q̄to differūt. Cōue
niūt inqꝫ ī cā. ſ. māli ⁊ efficiēte. Mālis qdē eſt plimū hu
mor groſſus ⁊ viſcoſus in corpe gñat⁹ trāſlat⁹ ad illas par
tes renū ⁊ veſice ibiqꝫ retent⁹. ⁊ qñqꝫ apans. Hic āt hūor
plimū eſt flatic⁹ cū ſit ꝓprie ꝯdēſabil' nō ſic ſanguis: ſꝫ qñ
qꝫ ad illas ꝑueniāt: q2 nec groſſus eſt nec viſcoſus. ſꝫ cōſi
ſtētia tēperat⁹: ⁊ cū ꝑuenerit ad illa ꝯuerſus ī malā q̄lita
tē venenoſā queādmodū hypp. dixit nō poterit ibi ꝯtie
ri: ſꝫ extra expellit a nā. Nec mlia. q2 pp ſiccitatē ei⁹ ptes
nō adherēt vt cōdēſent: ſꝫ īcinerant potius. Nec coſa: q2
nō groſſa viſcoſa. Et cā gñatōis talis hūoris flici: ē debili
tas digōnis aut ex parte v̄tutis caloris īnati. q2 debilis vt
cōtingit in ſeniorib⁹. Aut ex pte cibi. q2 groſſi ⁊ viſcoſi de
gñe panis ⁊ paſte azime ⁊ carniū groſſaꝝ vt aīaliū magni
corporis vt boūi bubalaꝝ ceruoꝝ ⁊ porcoꝝ ⁊ ſilueſtriū ⁊
antiquoꝝ ⁊ nimis iuuenū ſalitarū ⁊ auiū palludeſtriū ⁊
piſciū magnoꝝ ⁊ lactinētiū: ⁊ lacticīoꝝ ⁊ leguminū ⁊ alio
rū ſiliuꝫ. Aut potus aq̄ turbide ⁊ ꝓprie lacunal' ⁊ ſtagni ⁊
vini groſſi ⁊ turbidi. Aut ex pte mali regis ī alijs attendē
dis cōditiōib⁹ circa digōnis ꝑfectionē vt ī pueris ⁊ gulo
ſis adoleſcētib⁹ de qbus ſupra dictū eſt in caplo debilita
tis digōnis. Cā v̄o trāſlatōis eſt v̄t⁹ expulſiua ſupioꝝ mē
broꝝ fortis epis. ſ. ⁊ venaꝝ ꝓprie cū amplitudīe viaꝝ ipa
rū ⁊ debilitas renū. Cā v̄o retētiōis illi⁹ in ipſis eſt debili
tas v̄tutis expulſiue ipoꝝ: in ipſis nāl'r vel ex egritudīe cū
ſtrictura viaꝝ expulſiōis ⁊ groſſicie hūoris ⁊ cōcauitatis
aptitudīe ī colligēdo ⁊ retinēdo q̄ꝫdiu ꝯdenſet: q̄re extra
corpus expellere illū hūorē nō valꝫ: ſꝫ tardat tpe longo ⁊
euāt qđ ſubtile eſt ⁊ claꝝ cū vrīa paulatiꝫ ⁊ groſſū ⁊ terre
ſtre remanet ī eis ⁊ ꝯdenſat. Iſaac. n. dixit. per cānalē ſtri
ctū nō trāſit liquor groſſus. Si. n. v̄t⁹ fortis exiſteret ⁊ via
apta totū hūorē paulatī ſic aggregat cū ſui groſſicie expel
leret cū vrina groſſa vnctuoſa ⁊ turbida. q̄re gñatio lapi
dis nō ſeq̄ret ſic in plib⁹ talē vrinā mingētib⁹ ſepe vide
mus. Cā vero efficiēs lapidis ē calitas ab eq̄litate egreſſa
illoꝝ mēbroꝝ agens in talē hūorē retentū ibi ⁊ cōdēſans
ipm qñqꝫ in pilos rubeos lōgitudis vni⁹ palmi vl' brachy
ſm hyp. ⁊ G. qñqꝫ in lapidē queādmodū eſt videre: ī bal
neis termaꝝ ⁊ vaſis in qbus aq̄ calefieri ꝯſueuit. in qbus
groſſum aq̄ in lapidē duriſſimū pp agentē calorē denſat.
Aduenit āt illis mēbris tal' calitas aut a cā ītriſeca aut ex
triſeca. ⁊ ītrinſeca aut ꝓpria aut ex vicinitate. ꝓpa aut nā
liter aut accñtal'r ex humore colico ad illa trāſlato a ſupe
rioribus mēbris: epate. ſ. ciſti ⁊ venis apate vel nō apate.
Ex vicinitate ⁊ ꝓprie ad epar ſupcalefactū. Et extrinſeca
per ſe. ⁊ per accidēs calefaciente. per ſe qdem vt cibis ⁊ po
tibus calis forti motu peditādo vel eq̄tando in aere calđ
balneis calis ⁊ forti ſtrictura lūboꝝ ⁊ alijs. Per accñs vt
ex frigore aeris: vel balnei ꝯſtrigente poros ⁊ īflāmāte ca
liditatē ipſoꝝ nec eſt friditas per ſe cā ei⁹ cū talis frigidi
tas cōgelans in corpore ſtāte vita nō poſſit eē. Et ſi in gña
tiōe flatis vitrei ſit in vētre dōꝫ q̄ eſt mior ea q̄ cōdēſant
illi lapidē: ⁊ tñ dicit ꝯgelās reſpectu cāe aliaꝝ ſp̄eruꝫ fla
tis. ¶ De aūt cāe: lꝫ cōes ſint eis ambobus: ī lapide tñ ve
ſice ſunt fortiores ꝓpter ipſi⁹ nām. Eſt. n. mēbruꝫ īferius
poſitum ad qđ humor q̄ eſt mā lapidis ꝑuenit trāſcolat⁹
⁊ ſubtiliat⁹: per vritidū trāſeundo ſtricturā. q̄re nō ē apt⁹
cōdēſari vt groſſus q̄ ꝑuenit pri⁹ ad renes cū ſua viſcoſita
te ⁊ groſſicie ꝓpa. Eſt ēt mēbꝝ neruoſuꝫ pauci ſanguis et
frīn: q̄re ipi⁹ calitas nō ē potēs ꝯdēſare: ſic ī renib⁹ ſangui
neis: ⁊ naturaliter calidis. Adhuc locus retentionis in ve
ſica eſt amplior. Et via compulſionis apertior ꝓpter largi
tatem colli eius: ⁊ breuitatē: ⁊ in mulierib⁹ maxīe: quare
lapidis gñatio ī ea ē difficilior: ⁊ ꝓide mior: ⁊ cuꝫ gñet pp
fortitudinē cārū maior erit ad curādū rebelior: ⁊ ſcđꝫ hy.
ī affo. ꝑiculoſior. Gñatio quoqꝫ ipoꝝ ꝯueniētia: ⁊ diſcō ue
niētia p̄dictoꝝ cāꝝ diuerſaꝫ aptitudinē hꝫ ī etatib⁹ diuer
ſis. vt hyp. dixit ī affo. ī ſexibus quoqꝫ ⁊ nāis diuerſis cor
poꝝ ⁊ mēbroꝝ. ī qb⁹ gñari hñt. ⁊ hitudinē ēt. Nā in p̄ma
etate q̄ ꝓcēdit: vſqꝫ ad dētiū plātatiuā nō ē gñatio lapidū
apta cū hūores ſubtiles nō viſcoſos hēant: nec groſſis vtā
tur reb⁹ nō caloreꝫ acutū. nō ſtricturā viaꝝ: ⁊ ſi hēant pp
ꝑuitatē: tñ pp hūiditatē ꝯplōnis recipiūt extēſiōeꝫ. q̄r nō
retiet vt ī lapidē ꝯdēſet. In etate āt q̄ ē dētiū plātatiua q̄
ē vſqꝫ ad. vij. ānos ꝯpletos: ⁊ vſqꝫ ad. xiiij. ī quo īchoat pu
bertas. q2 mālis cā deficͤ nāl'r gñatio taliū lapidū ī eptavi
det pp māles hūores: cū ī eis adhuc ſic ſubtiles: nec ſunt
groſſi ⁊ viſcoſi pp debilitatē digōnis cū hēant illā fortē.
Accñtal'r āt cū māꝫ hēant pp ipoꝝ guloſitatē ⁊ malitiā re
gimis ī alijs d̄bilitātes digōnē: q̄re tal' m'tiplicet hūores
adſit: q̄ cā ī ea efficiēs. q2 caloriā fact⁹ potēs nō obtuſus ꝑ
manens ī p̄dicta etate: ſit etiā viaꝝ ꝯuenientia. q2 mēbra
duriora fcā nō ſic fuerit extenſibilia. q̄re ī ea ipi⁹ lapidis
gñatio apta eſt. ī veſica tñ ſcđꝫ hyp. qm̄ fortitudo ſupioꝝ
expellit ad illaꝫ quā colligit ipa: ⁊ retinet. ⁊ nō expellit pp
friditatē. Oē. n. mēbrū frīn ꝯplōnis fride: actōes d̄fectas
hꝫ ex nec̄itate: dixit. G. In pubertate aut adoloſcētia: ⁊ iu
uētute hic: nec ibi gñatio lapidis apta ē pp d̄fectū māe. q2
hūores hñt ſubtiles. nec ſūt guloſi vt p̄ores: ⁊ eligere inci
piūt dietā bonā: quare hūores tales nō gñant: nec trāſfe
runt ad īferiora ibiqꝫ retinent: ſꝫ pp v̄tutis pororū ⁊ via
rū largitatē expellunt extra: lꝫ cā efficiēs ſit ī eis ītēta.
In ſenectute v̄o lꝫ ſit mā: vt hūores pp digōnis d̄bilitatē
multiplicati ī eis: ⁊ viarū ſtrictura pp ſiccitatē corrugātē
⁊ ī vltima ꝓprie. q2 tñ defic̄ ī ea cā efficiēs q̄ ē ī gñatiōe po
tiſſima lapidis gñatio: ⁊ nō exiſtat ī veſica. ſ. ſꝫ ī renib⁹ tm̄
pp corū calitatē. Et ī mulierib⁹ nō in veſica. q2 ibi deficit
calitas non ſic: aut ī renib⁹. d̄fic̄ quoqꝫ viarū ſtrictura. q2
vias hñt amplas. q2 colluꝫ veſice ī eis amplū ē ⁊ curtū. nō
ſic aūt ī renib⁹: vt hyp. ī p̄ncipio lib2i d̄ aere ⁊ aqua locut⁹
mā quoqꝫ ad renes ꝑuenit plus non trāſcolata ſic ad ve
ſicā deſcēdit. In nāis quoqꝫ diuerſis vniuſcuiuſqꝫ gene
ratione diuerſa ⁊ in habitudinibus quoqꝫ. In hūida. n. nā
⁊ habitudine pinguefit gñatio ipſi⁹ ī renib⁹ ꝑemptore: ⁊ ī
ſicca in veſica ꝓpter cām predictam. lꝫ aut hic diuerſitas

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0359-7
DFG

perueniat rõne aptitudis ad cauſas eius ꝯgregandas vel
nõ: In nãli cõplexione etate ſexu habitudie ⁊ diſpõne mẽ
broꝝ accidẽtalr: tñ põt vtrobiqꝫ lapis in omni etate com
plexione ⁊ ſexu ⁊ habitudie generari. Cũqꝫ antiquat̃ gene
ratio lapidis vt eius cãe perdurẽt ⁊ habituent̃ nõ ꝓhibe
tur: nec ſanat̃: lꝫ remediũ hẽat quoquo mõ ⁊ ꝓpe i ſenio-
ribus. Uñ hyp. in affo. Nefretici ⁊ circa veſicã dolores la
borioſe ſanant̃ i ſenibꝰ: nec poſt. l. ãnos. vt. iiij. epidimiaꝝ
dixit. ſed cõtinuat̃: ⁊ tranſit ad heredes. Et cũ nõ eſt habi
tuata: ſed diſpoſita ⁊ noua ſm augmẽtũ ⁊ diminutionem
cãrũ fit ſuãs qñqꝫ periodos mẽſis vniꝰ vel pluriũ. ❡ Si
gna oppilatiõis renũ ⁊ veſice ex lapidibꝰ: ⁊ alioꝝ mẽbroꝝ
vrinaliũ diſtiguentia ipſam ab hũoroſa ſunt ſigna lapidis
q̃ in hũoroſa nota ſũt. Et ſignoꝝ lapidum q̃dã ſunt cõia q̃
dam ꝓpria. Cõia qdem ex vrina ſumunt̃ dolore ⁊ exeũti
bus cum vrina. Et ſũt nã cũ videbis vrinã quã conſueuit
mingere patiẽs turbidã ⁊ groſſam clarificari ⁊ attenuari:
tũc extimabis lapidis: gñationem ⁊ cũ addit̃ dolor: vt qꝛ
ſentiat patiẽs dolorẽ in partibꝰ vrine mẽbroꝝ: tũc certifi
cata erit extimatio tua: qꝛ mã iaꝫ aggregata eſt in mẽbris
illis ad lapidis generationẽ: deĩde ſi vides aliud arene re
ſidentis ei aſſociari: tũc tua extimatio erit cõpleta ⁊ maxi
me ſi mãm videas retineri. ❡ Notãduꝫ ãt ꝙ lapis ſi me
diocris ſit retinet vrinã totalr̃: qꝛ põt ſubintrare meatum
vrine ⁊ occupare. Magnꝰ aũt ſubĩtrare nõ valet. ⁊ ſi op-
ponat ſe orificio meatꝰ de facili remouet̃: paruꝰ võ ſi ſub-
intrat nõ occupat totũ vt poſſit totalr̃ retinere: ⁊ cũ tãges
illas: ⁊ iuenies molles lapis eſt in fieri. ſi võ duras lapis iã
factus eſt. Propria võ ex qualitate nãe doloris ⁊ exeun-
tium cũ ipſa ſumunt̃ hoc mõ. Nã in lapide renũ vrina eſt
cũ rubedine dolor eſt in lũbis ⁊ fortis adeo ꝙ fit qñqꝫ ſi-
milis colico ⁊ ĩtendit̃ tp̃e inanitiõis: ſumpto cibo remitti
tur. ⁊ eſt eũ getis dolor eſt ibi fixus ⁊ cũ mutant̃ ad veſicã
ĩterpollant̃ ⁊ minuit̃: ⁊ ĩ hylys auget̃: ⁊ ꝓprie apud replo
neꝫ ĩteſtinoꝝ ꝑꝑ coartatione poroꝝ vritidũ. ⁊ cuꝫ ꝑuenit
vſqꝫ ad ĩguia ⁊ emũctoria: tũc iã ꝑuẽit ad meatũ veſice. ⁊
cũ ſedat̃ dolor eius: tũc iã ꝑuenit ad veſicã vt ſuperiꝰ dcm̃
eſt. ⁊ arenoſa reſidentia ſũt rubea cũ cõſuetudie ꝓcreatio
nis eiꝰ. In lapide vero veſice vrĩa eſt alba: ⁊ arenoſa ſilr̃
alba vel cineritia. Uñ hyp. Quibꝰ in vrina arenoſa ⁊ alba
ſemia ſubſtãt his veſica lithiaſiꝫ hꝫ dolor quoqꝫ accidit ĩ
pectine ⁊ pitoneon ⁊ mĩor: ⁊ qñqꝫ lapis veſice tenet̃ in lo-
co amplo ⁊ ſpacioſo: ſed in renibꝰ eſt coartatꝰ in ſtricto: et
plurimũ retinet vrinã. Et eſt maior q̃ꝫ lapis renũ ꝑꝑ maio
rem extẽſionẽ quã recipe põt in veſica ⁊ durior ꝑꝑ lõgio-
rem morã quã trahit in ea q̃ꝫ ĩ renibꝰ faciat. cũ ergo cadat
ſui grauitate in collum veſice: qꝺ ĩferius tẽdit ſua magni-
tudine ĩtegre oppilabit ⁊ retinet̃ vrĩa: ⁊ ẽ ſignificatio for-
tis ſuꝑ lapidẽ ꝯfirmatũ: ⁊ tũc cũ hoc eſt pruritꝰ cõtinuus ĩ
pectine ⁊ in canali virge: q̃re ꝯfricat eã ꝯtinue ⁊ ꝓprie ſi ẽ
puer ⁊ accidit erectio aſſidua. ⁊ quãdoqꝫ mollificatio vl-
tra modũ ⁊ perducit ad exitũ ani. Et cã in pruritu eſt exa
ſperatio veſice ex lapide duro ⁊ cõmoto in ſpacio veſice ⁊
maxime cũ ſũt plures ſiue ſint in ea gñati ſiue a renibꝰ de-
ſcenderint ad ipam: q̃re exaſperãt ⁊ ĩducũt pruritũ ⁊ cuꝫ
vrina tũc emittunt̃ furfures. ⁊ qñqꝫ ſanguis ꝓpter abra-
ſionem. Et accidit lapis veſice in regionibꝰ ſeptẽtrionali-
bus magis ꝯſuetis ⁊ in ĩfantibꝰ ⁊ corpora illoꝝ ꝑlimũ ſũt
extenuata: qꝺ ẽ ecõtra ĩ lapide renũ. ❡ Cura lapidis ẽ q̃-
tuor res. Prima eſt abſciſio cãe. Scꝺa eſt ipſius eductio.
Tertia eſt regimẽ. Quarta eſt correctio accidẽtiũ ex qbꝰ
eſt dolor: vrĩe retentio: ⁊ vlcerũ ĩpreſſio q̃ qñqꝫ eſt ꝑor. ꝓe
magnitudine enĩ accidẽtiũ ĩterdũ oꝫ peruertere ordineꝫ
cure. ❡ Prima eſt cãe abſciſio. In abſciſiõe nãqꝫ eiꝰ conſi
ſtit ꝓuiſio q̃ lapidis gñatio ꝓhibet̃. ⁊ q ẽ ĩ fieri ĩpedit̃. ⁊ q
factus eſt nõ auget̃: ſed educit̃ ⁊ ꝓprie ſi ſit paruus. Et cõ

pletur tribus modis. ❡ Primo cũ ꝓhibitiõe gñationis
mãe. ſ. hũoris groſſi ⁊ viſcoſi: ⁊ illud cũ ordinatõe regiminis
in cibis ⁊ potibꝰ ſubtilibus ⁊ euchimis ⁊ in alys debite di
geſtionẽ cõplendo. Scꝺo cũ eũone ipſiꝰ humoris iã gene-
rati ex epate ⁊ venis ſi adſit: ⁊ ẽt cũ deriuatõe a partibꝰ il-
lis. puta cũ vomitu cliſteribus. ⁊ alys ſolutiuis farmacys
ſumptis ⁊ in eũone eius de partibꝰ renuꝫ ⁊ veſice ſi ſit ibi
detentus ⁊ coartatꝰ: vt in lapidẽ cõdenſet̃. ⁊ hoc cũ diure
ticis tẽperate caliditatis q̃ cãm efficientẽ. ſ. ipſoꝝ calidita
tis nõ augeant ⁊ ĩtendãt: qualia ſũt ex cibis. Ut ſunt car-
nes auiũ montanaꝝ paruaꝝ pauce pinguedĩs ⁊ calĩtatis:
⁊ herbe diuretice vt baucie recẽtes ⁊ apiũ petroſillinum
feniculus endiuia ⁊ ſparagꝰ. Ex legumibus: vt chiſt ordei
⁊ aqua ciceꝝ nigroꝝ ⁊ ex fructibꝰ vt ficus hũide ⁊ ſicce ⁊
amigdale ⁊ vua alba. Et ex potibꝰ vt eſt vinũ ſubtile cla-
rum albũ cũ aqua dulci ⁊ clara limphatũ parũ. Et ex me-
dicinis vt ẽ decoctio poly gnqꝫ radicũ cõmuniũ capil. ve.
⁊ radicis altee ſqnanti: ⁊ ſcolopẽdrie. ⁊ ſimiliuꝫ. oĩa. n. hec
ꝓhibẽt gñationẽ lapidis. ⁊ paruũ frãgũt educũt: ⁊ ſecania
bin cũ aceto ſqlle. Et inunctio illaꝝ partiũ cum oleis mũ
dificantibꝰ ⁊ abſtergẽtibꝰ illas partes vt eſt oleũ de amig
dalis amaris de lilio: ⁊ de apio. Et cuꝫ cerotis vel emplr̃s
ex abrotano fece cõbuſta ⁊ nitro. ❡ Tertio cuꝫ alterãti
bus ipſoꝝ qualitatem membroꝝ que eſt cauſa efficiẽs et
illud cum diureticis frigidis: qualia ſunt bathece ⁊ ſemen
eius ⁊ ſemen citruli cucurbitaꝝ ⁊ cucumerũ ⁊ aqua lactis
aqua melonis indi: ⁊ vnctiões ex ſuccis ⁊ oleis ipſoꝝ: ⁊ cũ
alienatiõe omnis calidi ĩflãmantis ĩterius ⁊ exteriꝰ mini
ſtrandi. Et ſi ſit cũ effuſiõe humoris colerici purget̃ cum
ꝓprys: ex qbus eſt aqua lactis ſeminũ cõium ligricie mel
lis caſſiefiſtule. ⁊ ſolatrum ortulanũ eſt ꝓprium oi cauſe.
⁊ ſirupus de ſucco vio. ⁊ ſimilia ⁊ ſi fuerit cũ ĩflãmatione
vel eriſipila ſeu apate duro. ❡ Eductio eiꝰ tripliciter fieri
hꝫ. Uno modo cũ dilatantibꝰ membra ⁊ ductus ac etiaꝫ
leniẽtibus ductuuꝫ ſuperficiem atqꝫ lapidis ⁊ ꝓprie cum
eſt paruus ⁊ cõplet̃ cũ admiſtratõe balnei ⁊ fomẽti ex aq̃
dulci decoctiõis melliloti calamẽti: altee: maluaꝝ camo-
mille yreos radicum fenugreci: ſemis lini: aneti: ⁊ ſimiliũ.
Et cum vnctõibus illaꝝ partiũ. ſ. alchatiꝫ hilioꝝ inguinũ
pectinis ⁊ peritoneonis ex oleo de altea de fenugreco de
aneto de alcãna. de lilio amigdalaꝝ dulcium ⁊ amararũ
⁊ de lino. Et cum ebibitis in lapide renũ vel iniectis in la
pide veſice ex iuribus carniũ vnctuoſis: ⁊ mucillagis ca-
ſieſi. dragaganti pſily: ⁊ olei amigdalarũ ⁊ vio. gũmi. feni.
açarur ⁊ decoctio malue campeſtris cũ butiro ⁊ melle de
qua ſumat̃ res plurima ⁊ grana pini. ⁊ ſimiliũ. Scꝺo cum
cõminuẽtibus lapidem ⁊ educẽtibus ⁊ ꝓprie cuꝫ eſt ma-
gnus ⁊ durus q calidis: ⁊ humidis nõ diſſoluit̃: quoꝝ q̃dã
ſimplicia ſunt q̃dam cõpoſita. Et ſimplicia quedaꝫ cõmi-
nuentia a cõplexione q̃dam a ꝓprietate ⁊ quedaꝫ vtroqꝫ
modo: ⁊ a cõplexione cõminuentiũ q̃dam ſunt debilia tã
tum in renum lapidibus ĩpꝛimẽtia: qualia ſunt amara ab-
ſterſiua q̃ ſunt fortis inciſionis ⁊ temperate caliditatis vt
eſt radix ſpine q̃ grece nominat̃ ſpergos: ⁊ radices ſentice
herba caſtracan ⁊ polium: lapides nomiati grece adhata:
⁊ acetum ſqlle ⁊ reliqne medicine ſimiles iſtis: vt betoni
ca pentafilon. ⁊ capil. veneris grana ſolis: ſaxifragia ⁊ fo-
lia ſaxifragie: qui frangens lapideꝫ ĩterpetrat̃: ⁊ radix ſco
lopendrie ⁊ aqua ſicle. harum aũt impreſſio nõ eſt niſi in
lapide renum ⁊ pertranſeuntia vſqꝫ ad lapidẽ veſice qua
lia ſunt cicer nigrũ ⁊ aqua eius radix coſti bdelium. ⁊ ſimi
lia. Quedam fortiora impreſſionem facientia in lapidẽ
veſice tanq̃ꝫ in duriori obiecto. lapis enĩ veſice difficilior
eſt ad cõminuendum ꝓpter eius magnitudinẽ ꝓpter du
riciẽ maiorẽ ac lõgingtatẽ ⁊ ꝓꝑea cõminuẽtia oꝫ cẽ fortia
⁊ nõ tãtum ſimplicia: imo ꝯpoſita: ⁊ ꝓpterea ſi cõminuũt

lapidē veſice cōminuunt lapidē renū ſaltē cū ad illū per/
ueniant p̄us ⁊ nō ecōuerſo vt dixit aboali. Cōpoſita vero
īfra dicentur Sed talia ſimplicia ſunt radix ſqlle allea ⁊
tribuli ⁊ grani nucū: apiū montanū:calamentū:pullegiuꝫ
yrci vel cerui radix citroli vel cāpeſtris: ⁊ eſt cucumer aſi/
ninū radix balſami ⁊ ptes ei⁹ ſemē rafani ⁊ aq̄ radicuꝫ ei⁹
ſemen ciperi egyptiaci ſcordeon radix lauri: ⁊ prepucia vi
tis alie ruta agreſtis baurach atramētū piꝑ pulueriçatuꝫ
ex quo factus ſit trociſcus ⁊ dauc⁹ cū aq̄ fiſtici facit deſcē
dere lapidē ⁊ oleū eius fex adbuſta ⁊ nitrū adbuſtum. Et
ē ſanguis yrci ſꝫ artē collect⁹ ⁊ reſeruat⁹ in trociſcis de q/
b⁹ in hora doloris det̄ vn⁹ cū vino aceti aut aq̄ apy mon/
tani: ⁊ eſt mirabile. A proprietate vero cōminuentia ſunt
vt puluis ſcorpionū ⁊ oleū eius ſolatrū ortolanū ⁊ lapis q
īuenit̄ in ſpōgia: marina ⁊ iudaicus ⁊ cinis leporis decola
ti ⁊ lūbrici tereſtres exicati cinis epatis aſini in lapide re/
num ⁊ gramē vtriuſq̄. Quedā cōminuunt vtroq̄ mō vt ē
nitrū albū ⁊ clarū adbuſtū ⁊ pulueriçatū ⁊ fex adbuſta: ⁊
cinis corticū ouoꝝ ⁊ ſcarabei ⁊ ſemē geneſtre: qḋ frangit ⁊
educit ⁊ ꝓhibet generari. ⁊ auis parua q̄ notat̄ grece yera/
golidurcos ⁊ ſuꝑ alias eius ſunt penne auree ⁊ ſuꝑcauda
eius ſunt pūcta alba ⁊ frācigene noiant eā ſafuriēgi adbu
ſta ⁊ cinis ei⁹ cū aq̄ mellis extrahit p̄ceteris lapidē magis
⁊ fimus colūbinus ⁊ fim⁹ galli. Et mod⁹ vtēdi talib⁹ ē:
vt medicie q̄dā ꝑmiſceant̄ iſtis medicis ꝯminuētib⁹ lapi
dē: quaꝝ alie ſunt iuuātes ad penetrationē velocē: vt piꝑ
callamentū ⁊ cinamomū: ⁊ cū hoc opiant̄ ad cōminuēdū
lapidē. Et alie ſunt q̄ ꝓuocant cū virtute ⁊ extrahere hūt
ſuꝑfluitates groſſas: vt ſemina nota ⁊ ꝓprie fenugrecū ru
bee radix dauc⁹ meu: fu. aſaꝝ accorus ⁊ ameos cheiſim ſi
ſeleos ſemē agni caſti ſquinantū ⁊ cordumeni ⁊ cātarides
ſunt in hoc potētiſſime cū impreſſione in lapidē. Sed opꝫ
miniſtrare cū cautela ne vlcerent veſicaꝫ. vt. H. dixit niſi
cū rectiſicātib⁹ in q̄ītitate tēperata ſumant̄ ſic̄ ſtafiſagria.
Alie vero ſunt alteratiue digōneꝫ faciētes ei⁹: qḋ alie mo/
uent: ⁊ faciētes morari donec ille opationē ſuā ꝑficiāt cuꝫ
pinguedine ⁊ viſcoſitate ſua vt gummi feni ⁊ alie ſunt cuꝫ
aromaticitate ꝯfortātes mēbꝝ apud diuerſitatē īpreſſio/
nis ⁊ modū ſuꝑ ipꝫ: ⁊ ſunt medicie aromatice: vt ſpica caſ/
ſia ⁊ ſilia: ⁊ alie ſunt ꝯfortantes in qb⁹ ē ſubtilitas cū ſtipti
citate: vt eſt radix rubi ⁊ rob fructuū vt ꝯſeruēt mēbrum
a nocumēto illoꝝ: ⁊ eſt v̄ga paſtoris. Et ex illis ē been ari/
ſto. liliū: ſuccū: ⁊ ſemē agni caſti ⁊ roſe balauſtiaꝝ ſquinā/
tū: ⁊ ſandali: ⁊ medicie ſedātes dolorē cū ꝓprietate. vt ſūt
anodine nuces ⁊ auellane ⁊ q̄ ſedādo dolorē retardāt cuꝫ
ꝑmiſcētur iſte medicie ex eis vna cōpoſita fiat nā ſapiētiſ
ſima iter eas diſcernit ⁊ vtit̄ eis ꝓut oꝫ ordiate: ⁊ hy duo
p̄dicti modi ſunt cōes ambob⁹ lapidib⁹. Terti⁹ modus ē
cū īciſione ⁊ abſtractione ſi primo nō ſufficiāt q in lapide
renū ē incōueniens ⁊ mortalis ꝑꝑ ꝓfunditatē lacertorū
⁊ oſſiuꝫ: magna venarū ⁊ aertiaꝝ. Sꝫ in lapide veſice poſ
ſibilis ⁊ timoroſus ꝑꝑ circūiacentiā lacertorū venaꝝ ⁊ ar
teriarū ⁊ neruoꝝ quoꝝ iciſione dolor fortis ſeqtur ⁊ ſpaſ/
mus ⁊ ſincopis ⁊ apa: ⁊ mors plimuꝫ: ⁊ q̄n̄q̄ foramē ꝯuer/
titur in fiſtulaꝫ ⁊ currit ide ꝯtinue vrina. Sunt tamē aliq
q p̄ſumūt ſuꝑ illā. Caueant tamē vt nō niſi magna neceſſi
tate cogente ex dolore ⁊ retentione vrine īfeſtantib⁹ val/
de īfirmū nec in quolibꝫ corpore illā agant niſi in forti ⁊
ꝯſtāti ⁊ preeuacuato: ⁊ cū cautela ab errore q̄ ſi tales nō
ſint dimittant illā ⁊ ad remediū currāt vt docet. H. ſ. trāſ
poſitionē lapidis vel ſanguis cōgelati ex lapide pūgente
fluētis ab orificio ⁊ collo veſice ⁊ vrīa libere effundatur.
eius eni retentio eſt ꝑiculoſa ⁊ mortalis. fit aūt tribus mo
dis vt infra dicet̄ ⁊ in lapide renū quoquō ſilr̄ puta vomi
tu violento ⁊ forti quo lapis ſuꝑius trahit̄ atq̄ ventoſa ſu
per lūbos poſita ſicvt ecōuerſo trahit̄ īferius forti motu

agitatio ⁊ ſaltu ⁊ hanelitus retētione ac cōpreſſione ⁊ fri/
catione renū ⁊ yliorū trahentiū ad īferiora ⁊ vētoſa pau/
latim mutata a renib⁹ ad īferiora ⁊ ex illis ſunt clamores
⁊ cliſteria cōueniētia ⁊ inferiorū calefactio cū fomentis ⁊
alys calefactorys. hec eniꝫ trahūt lapidē renū: vſq̄ ad ve
ſicā paulatim ⁊ q̄n̄q̄ extra de veſice collo ꝑ virgaꝫ expel
lunt vel mlīerū naturā. Inciſionis aut mod⁹ ⁊ regimen
talis ē vt nō fiant niſi in īfantib⁹ ꝑꝑ facilitatē ꝯſolidatōis
⁊ tempamētū cōplexiōis ⁊ humorū q̄ nō ē in iuuenib⁹ ⁊ ſe
nib⁹ ⁊ in ꝯſtantib⁹: in tollerando dolorē lapidis: ⁊ ſint pre/
euacuati ne humores currāt ad locū ⁊ apoſtemēt ⁊ fecib⁹
ītestinoꝝ: q̄m dolorē minuit ⁊ ſint ꝯtēti ſubtili dieta. ⁊ ſit
dies clara ⁊ tp̄s tēꝑatū ⁊ q̄etū ⁊ locus ⁊ ſit tēperata ꝓinſtra
īſtite ⁊ faſſie ⁊ medicie appropriate ⁊ retētōe ſanguis ema
nātis ⁊ ſedatōe doloris q̄ ſint ex plib⁹ dcis ī cura emoroy
daꝝ ex retētōe ſanguis ⁊ ex ſedātib⁹ dolorē q̄ īfra dicent̄:
ligaturis qb⁹ p̄miſſis iaceat eger ſupin⁹ retractis crurib⁹
⁊ detēt⁹ ſit a circūſtātib⁹ firmiter. Et cyrugic⁹ digitū ſuuꝫ
īdicē ī anū īfantis vel mlīeris v̄ginis: vl̄ ī vuluā de virgia
te īmittat donec ꝑueniat ad lapidē: ⁊ cū peruenerit: ipm
in collo veſice teneat firmū ⁊ īpellēdo ſemꝑ a veſica ver/
ſus collum eius: tunc quia ſignet atramento vbi īciſioneꝫ
faciat ſitq̄ iter v̄gā ſeu burſaꝫ ⁊ anū: ⁊ iuxta ꝯmiſſurā ſeu
filū: nō ī ea ſꝫ iter eā: ⁊ cruris plicaturā: ita q̄ īciſio cadat ī
collo veſice nō in eius cōcauo: tūc q̄ꝫ īcidat ſubito inſtru
mēto bene acuto: ⁊ tm̄ quantū ꝯueniat magnitudini lapi
dis. deīde extrahat illū faciliori modo quo p̄t. Et magni/
tudo oui ſi impediat exitum opiaculis confrangantur:
deinde vitellum cum albumine ouorum ⁊ puluere ex re/
ſtringentibus ſanguinem cum plumarys vlceri applicet̄.
deinde cura vlceris regat̄ ⁊ ſuperueniētib⁹. deīde accidē
tibus: ex dolore apo. ſanguis cōgelatione in veſica quem
vehuem cū hidromelle ſumptū collo eius ⁊ virge: ⁊ alys
ſubueniat̄. ꝓut oꝫ cū his que ex dictis ei dicēdis ſunt no/
ta. Silr̄ ⁊ ſi peruenit lapis vſq̄ ad collū virge: nec poſſit
exire: quoquō īcidas ſub ea ſi expreſſiōe educi nō poterit
nec retro pelli cū īmiſſiōe ſiringe: vt vrina egrediat̄. deī/
de cura vlceris eſt regēdū. Et ſunt qui īgeniant̄: ⁊ ponūt
cānulā in angulo īciſionis: vt vrina inde trāſiēs egrediat̄
extra vt vlcus nō tāgat ne mordeat: ⁊ ꝯſolidationeꝫ ꝓhi
beat. ¶ Alius modus ē q cirrugicis dimitat̄ expertis.
At modo ſeqtur q̄rta res que eſt correctio accidētiuꝫ de
q̄ dicēdū ē: ex quo de re tertia ī re p̄ma eſt dictū ſuccicte.
⁊ primo de dolore qui ſi fortis ſit: opꝫ ſedare priuſq̄ p̄di/
ctoꝝ aliqḋ ītētare cū poſt īciſionē maxime ꝓuocet apa: ⁊
hoc cū balneis cataplaſmatib⁹ epitimatibus emplaſtris
vnctionib⁹ ⁊ iniectionibus ex anodinis ⁊ mollificantib⁹
ſuperius notis ī cura tenaſmonis: ⁊ emoroidarū ⁊ ſi ex/
pediat cū ſtupefacientibus ebibitis ſicut filonis medica
mine de mādragora ⁊ tiriaca noua: que ēt vētoſitateꝫ re
ſoluit que cū cauſa doloris ē: cū hoc qḋ ſtupefacit: ⁊ ꝓuo/
cat vrinā inūctis vel emplaſtris. Et ſunt q talia ſtupefa/
ctiua approximāt ante īciſionē: ⁊ poſt p̄parationeꝫ corpis
ad illa dādo ea mixta cū vino. vt docuit Abo. vt doloreꝫ
īciſiōis nō ꝑcipiet īcidēdus. Et ſunt q opiū in forma troci
ſci ſuꝑ locū īcidēdū ligāt: ⁊ detinēt ligatū q̄diu ibi ſenſus
ſtupefiat quo dolor īciſiōis vel aduſtiōis: ⁊ corroſiōis: cau
ſtici: farmaci: vel ignis nō ſentiāt vel ſentiat̄: iterq̄ ēt vi/
det̄ in numero ypo. cū dixit. Quicūq̄ dolētes aliqd cor/
poris plurimū dolorē nō ſentiūt his mēs egrotans: q̄ſi di
cat ſi vis vt cā doloris magni corpi. ſ. applicata n̄ ſentiāt
fac vt corpis ſenſus egrotēt. Sedatio. n. vel doloris mino
ratio a timore futuri apo. ⁊ mortis alleuiat ipꝫ. ⁊ ex eis q̄
operant̄ ad idē eſt vt in circuitu īciſiōis aliq̄ ſtiptica mi/
niſtrent: ⁊ ꝓpriū eſt ſumac ipꝫ eā appropare ꝓhibet apa:
⁊ terra ſigillata cū oleo ro. iuncta lutū armenū cuꝫ ſucco

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0361-4

myrte ⁊ ſil'a. Et ex illis eſt flebotomia: ⁊ cibi ⁊ pot⁹ dimi/
nutio: ⁊ alia ſupradcā. Si vō ex lapide retineat̄ vrina. qꝛ
oppoſit⁹ ſit in orificio poroꝝ vritidū ꝑtenſoꝝ a renibus
ad veſicā vel in eoꝝ ſtricturā coartat⁹ ī tranſeūdo vel qꝛ
fit magn⁹ ⁊ oppoſitus in orificio colli veſice vel coartat⁹
in collo vel canali: vrget qḋ graue moleſtū ⁊ piculoſuꝫ eſt
īfirmo. Ingeniandus eſt vt inde āmoueat̄ anteq̄ȝ ad fra/
ctionē ei⁹ deueniat̄ vt vrina libere egredi poſſit. ⁊ hoc vt
ſi q̄d ſit in renib⁹ retrahat̄ ſupius cū vomitu forti ⁊ violē
to ⁊ vētoſa ſupra renes applicata. Silr̄ ſi iter renes ⁊ vriti
des ſituet̄ qḋ ex dolore fixo ⁊ ꝯtinuo in renib⁹ cognoſcet̄.
Si vero in vritidib⁹ coartet̄ qḋ ex dolore deſcendēte ad
ilia ⁊ ibi durante ſciet̄ trahat̄ īferius cū balneis: ⁊ dilatan
tib⁹ ⁊ mollificātibus ⁊ cū compreſſionib⁹ ylioꝝ ⁊ renū cū
manibus oleo de lilio iunctis vel pinguedie anatis trahē
tib⁹ īferi⁹ cū retentiōe. Danelitus ſternutatiōe: ⁊ applica/
tione vētoſe in ylys īfra renes ⁊ iguina paulatine mutata
īferius ⁊ cliſterib⁹ cōuenietib⁹: ⁊ motu forti: ⁊ ſaltu ⁊: cale
factiōe īferioꝝ partiū. Si aūt ſis oppoſitus lapidis orifi
cio colli veſice īgeniamur ipm vt inde āmoueam⁹. ⁊ hoc
cū cōpreſſione pectinis ſupius vel vt reſupinet̄ lapidoſus
⁊ eleuent̄ anchis ei⁹: ⁊ cōcutiant̄ bn̄ vt lapis remoueat̄ in
de ⁊ redeat ad ꝯcauū veſice ad qḋ cōpreſſio pectinis ver/
ſus ſupius ꝯfert valde: ⁊ tunc vrina egredit̄. Et q̄nq̄ȝ alle/
uiat illud ſi īcuruet̄ ſup genua ſua ⁊ cōmoueat ſua mēbra
adiuicē. Et q̄nq̄ȝ remouetur inde ꝑ itromiſſionē digiti in
anū vel in vuluā de virginate ⁊ q̄nq̄ȝ per alias figuras q̄s
expimētū ⁊ rō adinuenit. Cūq̄ȝ illa nō ꝯferet adminiſtret̄
inſtrm̄. ſ. ſiringi q̄ leuiter iūcta imittat̄: vt lapis inde am/
moueat̄ ⁊ vrina egrediat̄. Et ſiq̄dē ſit in collo veſice vel
in meatu virge cū balneo ⁊ expſſiōe cū manu iuncta oleis
⁊ iniectis ⁊ ceteri⁹ ꝑducat̄. Si vero ex lapide pungente cō
moto exaſperāte vlcera ꝑueniant in renib⁹ ⁊ mēbris vri/
ne regat̄ regimine vlcerū ⁊ ſolōnis ꝯtinuitatis renū qḋ īfra
dō ꝓpiciāte dicem⁹. ¶ Sequūt̄ cōpoſite medicīe. Medi
camē frāgens lapidē renū ſublime ⁊ expertū valde ſm ſe
rapionē. ℞. ſemis bacthec. excorticati mily ſol'iter adhu/
ſti dauci. an̄. ptes eq̄les terant̄ ⁊ cribellent̄ ⁊ det̄ ex eis. ʒ.
iy. cū aq̄ decoctiōis ciceris nigri. ¶ Aliud ſcōm eundē ad
lapidē veſice. ℞. cōdiſi. ʒ. i. fimi colūbini. ʒ. i. ⁊. ʒ. ſcarabeo/
rū dauich. i. ⁊ eſt. ʒ. ʒ. terant̄ ⁊ dentur cū cal'o. ¶ Aliud ad
lapidē veſice ſcōm ymain. ℞. fimi colūbini: ſtercoris gal/
li: ꝯdiſi: oīum ptes eq̄les terant̄ ⁊ cribellent̄ ⁊ dētur in po
tu cū aqua rafani aut cal'a. ¶ Aliud ad lapidē renū ⁊ ve/
ſice ſcōm cōſtantinū: ⁊ eſt ſublime. ℞. ſemis bathec. citro
li. cucumeris: excorticatoꝝ. an̄. ʒ. v. ⁊. ʒ. rafani ⁊ apy ⁊ napi
ſilueſtris ⁊ dauci ⁊ petroſelini. an̄. ʒ. y. ſemis feni. ʒ. iy. gra/
noꝝ nere. i. cereſoꝝ ſilueſtriū. ʒ. iiy. ſtercoris vacce paſcē/
tis iuoluti cū oleo ſambucino. ʒ. v. ⁊ cribellent̄ ⁊ det̄ ex eo
pond⁹. ʒ. iy. cū aq̄ apy: ⁊ rafani. Decoctio ſm filiū ſerapio/
nis ad dolorē renū ⁊ difficultatē vrine. ℞. cimini: ani: radi
cis: liquiritie: ſeminis citroli. ſemis bacthece. an̄. ʒ. iy. pſily
ſe malue. an̄. ʒ. y. ⁊ ī deſcriptione alia loco aniſi abſcinthiū
⁊ loco pſily: chechengi decoquant̄ ī libris aq̄ donec rema
neat medietas: ⁊ dent̄ in potu ex ea. ℥. y. ¶ Alia ad renes
⁊ lapidē ſm eundē cui⁹ ꝑmixtio eſt. ℞. fenugreci: ameos:
ſemis baucie: ſeminis apy. an̄. ptes equales decoquant̄ ⁊
detur in potu cū çuccaro: ⁊ ē ſana ſi deus voluerit. ¶ Aliḋ
medicamē ſcōm alchindū ad lapidē vtrūq̄ȝ. ℞. fimi colū/
bini: ſtercoris galli. an̄. ʒ. y. origani. ʒ. ʒ. çuccari tabarçeth:
q̄ntum oīum ⁊ cū aqua rafani extrahit oēm lapidē: ⁊ quā/
doq̄ȝ ponitur cū eis piper: ⁊ ſal: ⁊ proprie in decoctione pul
legy. ¶ Aliud raſis ad lapidem veſice paruoꝝ balneetur
puer quottidie in aq̄ cal'a ⁊ dabis iſtud medicamē. ℞. oli/
bani nithee radix eſt cuiuſdam herbe. ana. confice cū mel
le ⁊ detur ad modum auellane mane ⁊ ſero. ¶ Ultimuꝫ

ſedans dolorem: ⁊ extrahens lapidē ſecunduꝫ iohanitiū.
℞. apy campeſtris que dicitur ſarrurion. ℥. i. ciperi egy/
ptiaci: ſpice aromatice: ſeminis papaueris albi: cinamomi
caſſie: piperis albi: ſeminis baucie: acori: ſeminis vrtice: ⁊
caulis: ⁊ cardonis. ana. ℥. ʒ. ¶ Conficiantur trita cuꝫ mel/
le: de quo ſumatur admodum auellane cuꝫ uino decoctio
nis capillis veneris. Ruffus inquit plurima balneatio ī
tinis ſulfureis frangit lapidem. ⁊ hec fortaſſe facit proue/
nire ad hoc: q̄ quandoq̄ȝ vlcerant cutem ⁊ ſi infundatur
in eis pannus calidus ⁊ applicetur loco lapidis operat̄ ad
exitum eius cum facilitate ⁊ lubricitate: ⁊ ſimiliter ſi olea
miſceantur mollificantia ⁊ abſq̄ȝ nocumento illo. Ingt
Gal. Scio plures de illis quorum renes egri medicati cū
hoc medicamine ſanati ſunt a ſuis egritudinibus: ⁊ opor/
tet vt aſſiduentur huius medicine pluribus diebus. Eſt
enim medicina ſanans illum qui habet lapide ⁊ qui ha/
bet egritudinē colice: ⁊ egritudinem veſice: ⁊ modus eſt.
℞. auellanarū excorticatarum ⁊ nucuꝫ ſemis cucumeris
ortulani excorticati ⁊ ſemis carui mundati. an̄. aur. iy. ſe/
mis iuſquiami nigri: croci: ſeminis citroli: abiō. ana. aur.
vi. ſeis iuſqami albi: ſeis apy. an̄. aur. xy. Cōficiant̄ cū mel
le ⁊ fiāt trociſci de q̄b⁹ det̄ ī potu. au. ʒ. cū aq̄ mell' tepida ī
q̄ntitate ciatoꝝ triū: ⁊ in alia deſcriptione ponitur armel.
aur. ʒ. Item teſtificat⁹ eſt q̄ lepus cōburit̄ ſicut ſcis: ⁊ cō/
ſeruat̄ puluis eius: ⁊ ſumit̄ in potu de eo dieb⁹: aliqḋ pō/
dus. ʒ. y. cū aqua tepida ⁊ frangit lapidē veſice: ⁊ renum.
¶ Ait Abo. dico q̄ frangit lapidē veſice nō eſt dubiū q̄
frāgit lapidē renū ſed nō ꝯuertit̄ niſi alterutrū cōmuni/
ter hāc reſpectū. Cōfectio ſm eū ꝯferēs: illi q̄ habet lapi/
dē ⁊ ꝓhibet generationē eius poſt ipꝫ. ℞. caſſie aur. y. ſe/
minis apy aur. iy. lapidis fenu maſculi aur. i. ſeminis bau
cie aniſi. an̄. aur. y. ſtoracis. ʒ. iy. radicis lily alozaubi aur.
y. ſeminis papaueris albi aur. y. ſpice tantūdem amigdal'
amaraꝝ accori. an̄. aur. iy. mellis boni q̄ntū ſufficit: ſumat̄
de ea in potu omni die in vino. ʒ. y. vel aur. y. Dixit quoq̄ȝ
medicine cōpoſite ad lapidē ſunt metridatū ipꝫ nāq̄ȝ for
tis operationis eſt in lapide renū ſicut ſagenea ⁊ ſicut ꝯfe
ctio de ſcorpionib⁹ cognita ad renes ⁊ veſicā. Et medica/
men factū de ſanguine yrci qḋ noīatur manus dei pp ſuā
nobilitatē ⁊ medicamen theſauriçatū dictū factū cū oleo
balſami. qḋ eſt mirabile. ¶ Puluis ex iuentione noſtra
frāgēs ⁊ educēs lapidē de renibus: ⁊ ꝓhibēs eū generari.
℞. ſemis geneſtre. ʒ. iy. ſemis ſtaphiſagrie. ʒ. y. granoꝝ ſo
lis. ʒ. i. ſpice. ʒ. ʒ. doſis. ʒ. y. cū aqua fraxi. ¶ Alius ad idem
educēs arenulas. ℞. granoꝝ ſolis bene puluerįçatoꝝ. ℥. i.
ſeminū cōium. ℥. i. çuccari albi. ℥. y. doſis coclear vnum in
vino. ¶ Medicamē expertū ſecundum Abo. ℞. cineris
vitis: cineris ſcorpionū: cineris radicis caulis: nabaty: ci/
neris leporis: ⁊ lapidis ſpōgie: ſanguinis yrci exiccati ⁊ cō
triti: cineris corticū oui de quo pulus egreſſus ē ⁊ lapidis
iudaici: gūmi: nuci: acori: an̄. partes equales petroſil. dau/
cy pullegy gūmi arabici ſeminis altee pipis oīuꝫ. an̄. par/
tis. xv. Cōficiant̄ cū melle ⁊ ꝯſeruētur doſis ſit vſq̄ȝ ad. y.
aur. ⁊ ſupra cū aqua tribulloꝝ decoctoꝝ cum ciceribus ni
gris. ¶ Syrupus ſm itentionē noſtrā quē ſupra de cura
colice nefretice diximus eſt ꝓprius ⁊ ſm Nicholaū iuſti/
nū: ⁊ filātropos. Confectio trociſcoꝝ ſcōm abohali ex ap/
propriatis q̄ frāgit lapidē in renibus: ⁊ veſica. ℞. ſeminis
baucie ſilueſtris ſeminis cucumeris: berberis: aniſi: mir/
te: ſemis apy montani ⁊ ortulani: caſie: cinamomi: ſpice:
an̄. partes. i. tere ⁊ cicotriniça: ⁊ ꝯfice cū aqua pōderis. ʒ. i.
aut aur. i. ⁊ da pmū cū calida. ¶ Syrupus diuretic⁹ ape/
riēs renū oppilōnū ex hūoribus groſſis: ⁊ educens eos: ⁊
ꝓhibēs ipos cōdēſari in lapidē: ⁊ eſt ex īuētione noſtra.
℞. capil'. ve. caſſie li. ſpice: foly meu. fu. ſiccoꝝ: ameos: aco
ri: radix rubee: nigelle: aſari: dauci: cheiſin: ſiſeleos: ſemis

agnicaſti ſquinãti:cordumemi:granoꝝ pini:ꝛ ſemis ſola/
tri:ꝛ feni:ꝛ enule.añ.partes eq̃les bulliãt in aq̃.lib.v. vſq;
ad medietatẽ.deĩde adde çuccari.lib.in geleniabin. lib.ſ.
aceti:ſqllitici.ʒ.iij.ꝛ ſyrupeñ doſis.ʒ.ij:cũ tepida in auro/
ra decoctiõis radicũ gramis. Dixit abobali ſterc⁹ muris:
cũ thure ꝛ aq̃ mellis calĩa. Frãgit lapidẽ ꝛ nigella aliq̃tul'
dieb⁹ miniſtrata cũ aq̃ mellis calĩa frãgit vtrũq;. Et lac fi
cus cũ lacte more cũ ramo ipſi⁹ educit arenulas de renib⁹
ꝛ veſica. Et ſemẽ cẽtrũ galli pulueriçatũ cum vino ſubtili
educit arenulas de renibus tantum.

¶ Caplm.iiij.de diſlocatiõe renũ ꝛ veſice ꝛ medicis ei⁹.

Diſlocatio accidit qñq; in renib⁹ ꝛ veſica plurimũ:
ꝛ ẽ vt a ꝓprio remoueat̃ loco ꝛ declinet ad dextꝝ
vel ſiniſtrũ ĩferi⁹ tẽdet magis. quare vrinãdi actõ
multipl'r ĩpedit̃. Et cã eius ĩmedieta ẽ ſuoꝝ ligamẽtorum
ꝛ ſuſpenſorioꝝ relaxatio vel ruptura:cui⁹ cã ẽ duplex ĩtri/
ſeca ꝛ extriſeca. Intrinſeca ẽ hũiditas cũ frigiditate paliti
cãs ꝛ mollificans ipſa. q̃re mẽbra p̃dicta in loco ꝓprio nõ
regũtur. Extriſeca vero ẽ caſus ꝛ ꝑcuſſio relaxãs vl' rum/
pẽs ꝛ balneatio ĩ aq̃ fra mlta quo ĩteriorez cãz coadiuuat
ſaltẽ. Signa ꝛ ſi qdẽ ſit a ꝑcuſſiõe vel caſu rũpẽte p̃ceſſio
ipſoꝝ cũ ſanguinis mictu declarat. ſi võ nõ rũpente:ſz rela
xãte tñ p̃ceſſio illoꝝ ĩpedimẽto vrinãdi ſola ſufficit ad co
gnitionẽ ei⁹. Si võ nll'a p̃cedẽte ꝑcuſſiõe vl' caſu acciderit
diſlocatio cãz ĩtriſecã ꝯiecturabis mollificatõez.ſ. ꝛ para/
liſiz quã ꝯfirmat p̃cedẽs regimẽ illi ꝓportiõabile ꝛ aq̃ fri/
de balneatio cũ ꝓbatõe ſignoꝝ alioꝝ egritudinũ ĩ eis poſ/
ſibil'r cõtingentiũ q̃ poſſunt in actõe vrinãdi nocumẽtũ p̃
ſtare:quoꝝ ꝓbatio diſſolõnẽ ab alijs paſſionib⁹ diſtinguit/
ꝛ qñq; vria ĩuolũtarie emittit̃ ꝑ cõitatẽ colli veſice ĩ mol
lificatõe. ꝛ qñq; retinet̃ ꝑ oppillatõez expſſiõe ꝛ tortura:
ꝑ declinationẽ vritidũ ꝛ colli ei⁹. Cura ſi qdẽ ei⁹ q̃ a per
cuſſione vel caſu ẽ rũpente forte non curat̃:iuuat̃ tñ cũ re
ductiõe ꝛ ſtrictura cũ medicis ſtipticis ꝛ ꝯglutinãtib⁹ ſum
ptis ꝛ emplr̃atis q̃ dicem⁹ cũ de diſlocationuz medicis loq̃
mur ſi deus ãnuerit:cui⁹ nomẽ ſit bñdictũ. Et ſil'r ſi ex eis
relaxãtib⁹ abſq; ruptura fuerit. Et ſi qdẽ a mã hũida facta
paraliticãte vel mollificãte cauſet̃. Cura ei⁹ breuiter erit
cura paraliſis ꝛ ꝯplet̃ euacuatõnib⁹ ꝛ purgatiõib⁹ deriuã/
tib⁹ ꝓprie:ꝛ trahẽtibus ſurſuz cũ vomitu ꝛ cõpreſſione di
gõnis mãe cũ oximelle ſqllitico ꝛ alijs medicis proprijs ꝛ
expurgatõib⁹ ꝓprijs:ẽ q̃ fit cũ elleboro vt⁹ eſt trãſiẽs vſq;
ad corporis extrema ꝛ trahẽs ꝛ expellẽs cũ vomitu ꝛ exic
cans valde vel agarico:cui⁹ virtus etiã tranſit vſq; ad cor
poris extrema ꝛ ꝯfortat neruos calefaciẽdo ꝛ purgando.
Et cũ ſpẽb⁹ gũmorũ q̃ a ꝓfundo attrahũt ꝛ neruis ꝛ vomi
tu ꝓuocãdo educũt. ¶ Cõplet̃ quoq; cũ reſoluẽtib⁹ ꝛ exic
cantib⁹ ĩteri⁹ ſumptis ex electuarijs ꝛ ꝯfectionib⁹:vt tyria
ca metridato:ꝛ ſilĩb⁹. ꝛ exteri⁹ applicatꝫ ex cerotis emplĩs
cataplaſmatib⁹ euaporationib⁹ ꝛ balneis termarũ ſiccis ꝛ
alijs ꝛ regimine exiccatiuo ꝛ calefactiuo noto.

¶ Caplm.v.de ſolõne ꝯtinui in renib⁹ ꝛ venis coꝝ ꝛ vlce
rib⁹ ꝛ ſcabie ac reliquoꝝ mẽbroꝝ vrine ꝛ medicis eius.

Decus renũ ꝛ alioꝝ mẽbroꝝ vrinaliuz ẽ ſolõ con/
tinuitatis eueniẽs cuz deꝑditione ſubẽ.cuz.n.ſol
uitur qñq; ꝯtinuitas ĩ eis p̃mo ẽ ſimplex. deĩn cuz
ꝑdurat gñatur in eo ſanies q̃ corrodit ꝛ ꝑducit ad ſubẽ de
ꝑdionem vrine trãſitu coadiuuãte ꝑ eius acuitatẽ: ꝛ fit
vlcus. Et qñq; a p̃ncipio ẽ cũ ſubẽ deꝑditõe ꝛ abſciſione
dr̃ vlcus ꝯcauũ:cũ võ ad ſaniẽ deuenit dr̃ vlc⁹ ſanioſũ:ꝛ cũ
corrodit dr̃ corroſiuũ:ꝛ cũ dilatat̃ ꝛ ambulat dr̃ ambulati
uũ:ꝛ nõ ſanat̃. Et in renib⁹ exñs ẽ in corpore renũ aut in
ꝯcauitate ipoꝝ ꝛ venis ꝛ meatib⁹ coꝝ aut ĩ ſuſpẽſorijs eo/
rũ:aut ĩ pãnicl'o tegẽte ipos. Et qñq; ẽ in poris vritidib⁹. ꝛ
qñq; ẽ ĩ veſica: qñq; ĩ vga. ꝛ ſi ĩ veſica aut ĩ ꝯcauo aut ĩ col
lo: ꝛ ẽ ſanabilis ẽt ſi ſit ĩ vga. ꝛ ſi ſit in ꝯcauo aut penetrãs

vſq; in vacuũ ꝛ nõ ſanat̃ vt dixit. Hyp. in affo. aut nõ pene
trãs:ſz vnũ pãniculũ tñ ꝛ ẽ difficile ſanabilis ꝛ q̃z ĩ renib⁹
magis. q2 neruoſa ſbtilis ſĩe ſanguis pauci ſil'r vritidib⁹:
Et cã ei⁹ q̃ ẽ ĩ corpore renũ duplex ẽ ĩterior: ꝛ ẽ apa:aut ex
terior ex ĩciſione ꝑcuſſione vl' caſu:ꝛ ẽ plurimuz:ꝛ ſi quidẽ
ꝑducat ad diſruptõez mortal' ẽ vt abobali dixit:ꝛ ſil'is ei⁹
q̃ ẽ in ſuſpẽſorio ꝛ pãniculo cã ẽ. Ei⁹ võ q̃ ẽ ĩ cõcauo eorũ
meatib⁹ ꝛ venis cã duplex ẽ:ĩterior ꝛ exterior. Interior
ẽ plurimũ ꝛ ẽ aut humor plurim⁹ ꝛ accutus de genere ſan/
guinis ſcindẽs venas vl' colere aut flãtis ſalſi tranſiẽs cũ
vrina per eos ꝛ ſoluẽs ꝛ ſua adherẽtia corrodens vlcerãs:
aut apoſtema dubellatum ꝛ aptum aut lapis acutus tran
ſiens ꝛ ſcindens ꝛ aliquid de ſubſtantia eorum portans.
Exterior ẽ ĩciſio ꝑcuſſio vel caſus diſrũpẽs ꝛ vſq; ĩ ꝯcauũ
eoꝝ ꝑtrãſiẽs. Et ſil'r cã ei⁹ que ẽ ĩ vritidib⁹ poris ꝛ veſica
exiſtit. ꝛ ẽt ĩ vga: ꝛ cũ ex talib⁹ hũorib⁹ fiãt ĩ p̃dictis mẽ/
bris:ꝛ eoꝝ ſupficie puſtule. ꝛ deĩde vlceranẽ: accidit ſca/
bies ĩ eis. ¶ Signa ſolõnis ꝯtinuitatis ꝛ vlceꝝ ĩ renibus
ꝛ alijs mẽbris vrĩe añceſſio cauſaꝝ ei⁹ oſtẽdit. Ingt eniz
Abo. cã ĩ libris medicoꝝ q̃ p̃mo ẽ ex qua ꝓuenit ĩuentio
alicui⁹ diſpõnis vel fixiõis ĩ humano corpore. Et ſi qdem
ſimplex ſit ſolutio vrina ſanguinea:ĩdicabit illam:ꝛ do
lor ĩ ꝑtib⁹ illis. Et ſi qdẽ in hac parte vel illa fuerit diſtin
guet̃:nã ſi ſit cũ vrina ſanguis miſſus ſubito mult⁹ cũ do
lore in eis:ꝛ defectiõe virtutis ſignificat rupturam vene
emulgẽtis in renib⁹:vt hyp. dixit ĩ affo. Et qñz ẽ ex aptõe
vl' rarefactõe vene illi⁹:ꝛ ẽ ſine dolore. ꝛ tũc ẽ ſubtilior:ꝛ
qñz ſint homatic⁹ qñz cretic⁹:ꝛ cũ ẽ ĩ renũ ſba ſãguis ẽ mi
nor. Si võ paulatiz pauc⁹ ꝛ trũboſus ꝛ ſtrãguriã habeãt
ĩ alijs illã ee ſignificabit:ſz ĩ quo ipſoꝝ ex doloris loco ꝑ/
pẽdes. Nã ſi dolor ſit ſub vẽtre:ꝛ ilijs ſolõ ĩ vritidib⁹ erit
ſi ĩ pectĩe: in veſica. ſi ĩ pitoneone: ĩ collo veſice erit:ſi in
vga:ibi ꝑcipiet̃. Et qñqz cũ vrina q̃ſi carniũ fruſta appa/
rebũt cũ ĩ renib⁹ ẽ vel petala cũ ẽ ĩ alijs. vl' ſquame ſi ſit ĩ
veſica vel pellicule que ſi ĩ vritidib⁹ ẽ ꝛ vga. Et ſi qdẽ ad
vlc⁹ ꝑueniat ſanies cũ vrina egrediet̃:ꝛ ſi qdẽ poſt ſaniẽ
ſanguis egrediat̃ vl' ſanguis cũ ea vlc⁹ corroſiuũ ꝛ ꝓfun
dũ ſignificabit. vl' ſi malicioſuz fuerit:cure parũ ꝓderũt:
ꝛ damnũ fiet. Sz ĩ q̃ ꝑte fuerit cognoſcet̃ ex doloris loco
vt p̃dictũ ẽ: et ex ei⁹ ſpẽ. nã ſi ſit dolor ĩ renib⁹ erit graua/
t⁹ ꝑ ſaniei aggregationẽ ꝛ ſupfluitatũ. Si ĩ alijs erit ĩ/
tẽſiuus ardor:ꝛ ꝓpe apõ aduẽtũ vrine:ꝛ ẽt ex exeũtibus
cũ vrina.ſ. fruſtis ꝛ ſanie. fruſtis vt ſupra dcm̃ ẽ. ſanie võ
vt ex colore q̃ntitate ꝑmixtiõe ipi⁹ ꝛ fetore. Colore ꝛ q̃nti
tate. nã veniẽs ex renib⁹ erit min⁹ alba ꝛ q̃ntitatis maio/
ria q̃z ex alijs mẽbris ꝑ eorũ nãm hũidã ꝛ ſanguineam.
Etiã a veſica veniẽs ẽ maioris q̃ntitatis q̃z ab alijs ꝑmi/
xtiõe. nã q̃nto magis a ſupiorib⁹ prouenit magis erit ꝑmi
xta ſanies ꝛ ſanguis. ẽt cũ vria ꝛ veniẽs a veſica ẽ grauio
ris odoris ꝑ ei⁹ friditatẽ ꝛ lõgiorẽ morã ĩ ei⁹ receptaculo
ꝛ cõcauitate veniẽs virga antecedit vrinã. Et ſi quidez
a ſuperioribus vltra renes:ſanies venit ꝛ alia fruſta vri/
na nõ erit mediocris ꝛ ſana. Sz ſi a renib⁹ ꝛ a ꝑtib⁹ q̃ ſũt
ĩfra vria pl'imũ erit ſana:vt hy. ĩnuit cũ dixit. Quib⁹ ĩ vri
na pigui exñti q̃ſi carniũ fruſta:l' ſic pili his ð rẽib⁹ exeũt.
ꝛ qñqz ſana nõ erit cũ epar ꝛ vene ꝯpatiet̃ grauiter patiẽ
tib⁹ ill'. Signa võ ſcabiei ipoꝝ ſũt ſigna puſtularũ añtiuz
ex retẽtõe vrĩe. vt hy. dixit ex exitu puris pauci ꝛ furfurꝫ
ardore ꝛ pruritu ĩ ꝑtib⁹ renũ vl' circa partes veſice cũ ipſa
ſtabit:ꝛ tũc ẽ fetor vrĩe grauior. ¶ Circa ſolõnis ꝯtinuita
tis ĩ renib⁹ ꝛ alijs inſtrĩs vrine ſi ſimplex ſit ex quo ſangui
nis mict⁹ appet ẽ ſil'is cure flux⁹ ſanguis ex narib⁹ ſputi:ꝛ
võit⁹ ſanguis de qb⁹ ſupra ẽ dcm̃. lz hic fortiorib⁹ ſit ꝯplẽ
da q̃z ille ꝛ ꝓprie vomit⁹:ſil'r ſi vlcus ſit ꝯcauũ. Si võ fiat
ſanioſum curabit̃ cura ꝑtiſis: ꝛ recurrere ergo ad illa ꝛ q̃
fortiora ſũt elige tã ſimplicia q̃z ꝯpoſita ꝛ miniſtrabis hic

⁊ variabis in fortitudine maiori ⁊ minori ſcd̃m diuerſita
tē lōgitudis mēbri atq̃ʒ malitiā vlceris ſpq̃ʒ his mēbris
ſūt ꝓpria ⁊ leptonys ſube colligēdo: ⁊ ſm oēʒ modū itus
⁊ extra approximādo ꝓut coꝝ dictat nā: ſicut in cura in
nuim⁹ lapidis. Et ex appropriatis medicinis talibus ⁊ ex
ſimplicibus ſunt ex euacuatiuis flebotomia ſupioꝝ par
tiū ⁊ q̄ ē de baſilica magis ⁊ vomit⁹ ſuauis qñq̃ʒ euacuat
deriuādo a renibus oē qd̄ pōt vlcerare ſanguinē ⁊ vrinā
acuere: qd̄ eſt qñq̃ʒ ſufficiēs tm̄ ⁊ cliſtere lenientiū ⁊ me
dicine laxātes ſuauiter ⁊ leniendo vt eſt caſſia tamarindi
māna ſucc⁹ viol. aq̄ fructuū i colerico. ⁊ aq̄ lactis: ⁊ ſcene
in aduſto. caueat āt a fortibus diſſolutiuis: ſua. n. acuita
te dilatāt vlc⁹: māīm acuūt: ⁊ ēt exaſperāt ſupficiē mēbri.
Et ex alteratiuis remittētib⁹ acuitatē ſanguīs ⁊ colere: ⁊
tēꝑātib⁹ ipos i hac paſſiōe quā ē ſumere aq̄ melōis idi al
chechēgi: lactuce citruli: cucumeris: cucurbite: ⁊ lac ſe. co
rū ⁊ papaueris albi: aq̄ ordei: lactꝫ ⁊ ſyrup⁹ violat⁹. Et ex i
ſpiſſantib⁹ ipʒ ē amilū coriādrū: aqua iuiubarū ſebeſten:
dactilorum. ⁊ lenticularum excorticatarum: riſum: ⁊ fru
mētū: ⁊ fruct⁹ ſtiptici: qm̄ ſtrigēdo vētrē mltiplicāt vrinā
vt ē citoniū: pionia: ſumac glās ⁊ çarur vl̓ q̄ oēʒ fluxū reti
net vt mirra: bi. n. tēꝑādo hūores ⁊ īſpiſſando vrinā ꝓ
uocāt ⁊ lauāt a ſanguine: ⁊ ſanie ſolones ⁊ vlcera: ⁊ ſua ſti
pticitate ꝯſolidāt ipa ⁊ ſigillādo mēbra ꝯfortāt. ⁊ ex mū
dificātib⁹ lenib⁹ ſunt ſc. alchechēgi: ⁊ aq̄ vue vulpis ꝓpe
mōtane ⁊ altee vſq̃ʒ ad feniculi acceptiōes: ⁊ i leni ſūt ca
pil. ve. q̄z ē tēꝑat⁹. ⁊ yreos: ⁊ granū pini: ⁊ fortaſſe i ea cō
ferūt iſop⁹ ⁊ ruta: ⁊ ſimilia. Et ex abſtergētib⁹ aq̄ çuccari ⁊
aq̄ lactis: ⁊ mell̓ cū gbuſdā ſeminib⁹ ex ꝑdictis. Et exicca
tiuis ē faria orobi lēticularū: alumen ſtorax: ſandaracha:
aloes ⁊ ſilia. Et ex ꝯſolidātib⁹ ſt̄ fruct⁹ ꝑdicti. ⁊ ex herbis
cauda egna: barbe yrcine: ſucc⁹ accacia: ſumac ⁊ ſilia. Et
ex ꝯglutinātib⁹ ſt̄ amilū: dragagātū: gūme fre ⁊ ꝓpe pru
noꝝ ⁊ ceraſorū: ⁊ pſily: ſe. citoniorū: mucilago ⁊ cibi viſco
ſi īfra poſiti: ⁊ ꝓpe anguille recētes. Glutinatio. n. ē ex eis
q̄ faciūt vlcera diminuta a corroſiōe ⁊ excoriatiōe corū
q̄ ſup ea trāſeūt acutorū: ⁊ ex eis ē bolū armenū: ⁊ terra ſi
gillata ⁊ ſilia: qm̄ cōglutināt ⁊ ſigillāt: ⁊ i lacte ē abſterſio
⁊ cōglutinatio: ſʒ oʒ q̄ elligat̄ ſubtile: vt aſininuʒ egnū ⁊
caprinū: ⁊ radici ligritie ieſt exicatio: maturatio mūdifi
catio ⁊ ꝯglutinatio: ſedatio ardoris vrīe: ⁊ ſilr̄ flos tabaçe
i. malue: lenit eorū vlcera ⁊ ardorē: ⁊ radix altee: ⁊ adeps
anetis: ⁊ ēt i ſeie lini torrefacto: ⁊ bdelio: methio. Et ex fa
ciētibus naſci carnē ſunt vnctuoſa: vt lacca: maſtix: thus:
yreos ⁊ ſilr̄a. Oportet autē vt talib⁹ glutinantib⁹ ⁊ ſigillā
tib⁹ miſceant̄ diuretica ⁊ ſubtiliantia vt faciāt peruenire
ipa ad loca deſtinata: licet de ſe ſint nociua. oʒ ergo q̄ ſint
ex leuibus q̄ ſunt iuuatiua in hoc ⁊ nō nocent vt ex quib⁹
eſt radix. liquiritie: cap. ve. ſquinantū. ⁊ ſilia. Et quādoq̃ʒ
oʒ vt miſceāt̄ eis narcotica ad mitigatōeʒ doloꝝ. dolor. n.
ꝯſolidatōʒ ꝓhibʒ iflāmādo. n. dilatat ⁊ ꝓuocādo reuma
ſordiciē auget. Et lac gdē ē bōi chimi faciēs exuberare ſā
guinē nutritiuū eq̄ns chimos ſi ſtōs ſumētis ſit tꝑat⁹ ⁊ cō
fortat corp⁹ ⁊ abluit ⁊ qñ bibit̄ cū melle mūdificat vlcera
interiora ab hūorib⁹ groſſis ⁊ maturat ea ⁊ abſtergit ⁊ ſua
carſeitate ꝯſolidat ⁊ icarnat ſāguis exuberātia: ⁊ ſedat do
lorē ſuptū ⁊ iūctū i vlcerib⁹ ⁊ ſcabie veſice ⁊ vḡe. Et ex ap
ꝓꝑatis vlcerib⁹ veſice tm̄ ē nimia ſi ex ea q̄titas chirat̄ʒ
ſumat̄ cū lacte ⁊ ſilr̄ ꝯcoctio cheil: qd̄ ꝓhibʒ ēt tractio ma
terieꝝ ad locū vlcerꝫ deorſū. Et ſi fuerit fraudulēta ⁊ am
bulatia glās rub⁹ decoctio radicis pētaphilō papir⁹ ⁊ lupi
nus ꝯfert oīb⁹ ⁊ ſedat dolorē ipſoꝝ cū farina ordei: vrina
hoīs antiq̄ ⁊ aſini: v̄miculoſis ⁊ teſticlis canis icarnat illa
opoponacū: liciū: olibanū: alumē: cū fece vini ⁊ oīo pōtica
in gb⁹ ē mūdificatio ⁊ abſterſio ſine mordicatōe ⁊ caute
riçantia vt colcotar çimar ⁊ ſimilia ꝓhibētiū corroſioneʒ

⁊ ābulationē cauteriçāda ⁊ fiſtulationē. ⁊ ſi fiāt non curā
tur. ſʒ ꝓhibētiū a corroſione cū mūdificantib⁹ ⁊ exiccanti
b⁹. Et cura ſcabiei iſtoꝝ mēbroꝝ ē cura vlceꝝ leuior tm̄
euacuatōe ⁊ ꝯdeq̄tiōe hūorū corporis cū regimine ⁊ medi
cinis ⁊ cū mūdificātib⁹ ⁊ abſtergētib⁹: deiñ exiccātib⁹ abſ
q̃ʒ mordicatōe ⁊ vltio glutinātib⁹ ⁊ ꝯſolidātib⁹ medicinis
ex gbus ē bolū armenū cū ſucco ligritie eq̄liū partiū in re
nib⁹. ⁊ ſicut mucillago: ſeis citonioꝝ ⁊ pſily cū oleo ro. cuʒ
ē in veſica ⁊ ex cibis dulcib⁹ viſcoſis: ſic̄ ſunt pedes aīaliū
⁊ res pigues ꝑdicte cū oleo amigdalaꝝ: ⁊ frumētū coctuʒ
cū carne auiū ⁊ gñā lactis dicta ⁊ piſces dulciū aquaꝝ: vt
anguille ⁊ ſilr̄es: ⁊ ſint in veſica fortiora q̄ʒ in renibus ⁊ ſint
ebibita iuncta cū exiccātib⁹ ⁊ emplāra in renib⁹ ⁊ in vriti
dib⁹ in veſica v̓o ēt iniecta. Et ex ꝯpoſitis appropꝛiatis ſunt
trociſci nr̄i alchechengi ⁊ trociſci: aſclipiadis: ⁊ diaſcori: ⁊
ſufuf regis. ¶ Cōfectio trociſcoꝝ: aſclipiadis ad vlcera q̄
fiunt in inſtrīs vrine. ℞. granoꝝ pini torrefactoꝝ nūero
xxy. papaueris: albi: dragag. añ. ʒ. y. croci: ſpice: aluminis:
iameni: ⁊ in deſcriptiōe alia loco ſpice: gallie: dauci. añ. ʒ. i.
coſti. ʒ. ſ. fiāt trociſci: cū rob ꝑmixto. ¶ Cōfectio trociſco
rū: diaſcori. ad illū q̄ mīgit ſanguinē de renib⁹ ⁊ veſica. ℞.
alumis: iameni. ʒ. i. dragag. ʒ. y. terre ſigillate: ſeis portula
ce balauſt. añ. ʒ. iy. terant̄ ⁊ ꝯficiant̄ cū rob: mirte ⁊ amini
ſtrent̄. ¶ Cōfectio trociſcoꝝ raſis vtiliſſimoꝝ ad vlcere i
renib⁹ ⁊ veſica in gb⁹ ē ꝯfortatio ⁊ lenitas ⁊ icarnatio vl
ceris ⁊ ſedatio doloris ⁊ ſūt trociſci alchechēgi. ℞. citroli.
ʒ. x. boli: armeni: gūmi arabici: thuris. ſang. dra. ſeis papa.
albi. amigdalaꝝ excorticataꝝ: ſucci ligritie: dragaganti:
amiliana. ʒ. y. grano: ſolatri: ortulani: cui⁹ grana ſūt rubea
alchechēgi. ʒ. iy. opy. ʒ. i. fiant trociſci. x. ⁊ dent̄ in potu qñ
nō eſt acuitas hmōi cū vria ⁊ qñ ē acuitas cū ſyrupo viol.
aut iuleb: fiātq̃ʒ trociſci. ʒ. iy. ¶ Midicamē aboali ad vl
cera renū. ℞. granoꝝ pini nūero. xx. cucumeris. xl. polipo
dy. ʒ. i. ſ. terant̄ ⁊ bibant̄ cū aq̄. lib. i. ſ. in q̄ bullita ſint ſpice
celtice: ſeis apy. añ. ʒ. viy. vſq̃ʒ quo redeat ad q̄rtā. ¶ Aliō
℞. terre ſigillate: ſanguis draco. caſtorei: ſeis meliſſe cucu
meris ⁊ apy: cucurbite: ſucci ligritie: lacce: ariſtol. amigda
laꝝ: pini magne: papaueris: ſeis iuſqami albi. añ. ptes eq̄
les dent̄ in potu cū rob ꝓut exigit̄. ¶ Cōfectio empli: qd̄
ponit̄ ſupra dorſūʒ ⁊ apd̄ ſtricturā medy ⁊ alia loca. ℞. fa
rine ordei: ⁊ ꝯfice cū vino ⁊ melle: iteꝝ fit de roſis ſiccis lē
tibus ⁊ melle ⁊ granis mirti: qm̄ ꝓhibet dilatationē ⁊ vn
gatur cuʒ oleo: de alchana: de maſtice: de citonys ⁊ ſtora
ce: q̄z exiccat ⁊ adeps anatis lenit illa. ¶ Cōfectio vnguē
ti boni ad vlcus veſice. ℞. ſtoracis: liquide. ʒ. i. pīguedinis
anſeris ex. ʒ. vſq̃ʒ ad. iiy. cere albe: ſatirioꝝ. y. ⁊ vngat̄ cō
primēdo ⁊ ꝓpe cū ē corroſio. ¶ Aliud. ℞. dactilos: gallas
paſſulas: ⁊ acatiā: alumen: ypogſtidos: yſopū: ⁊ ſtoracē va
let vt ꝑmū. ¶ Aliud cū nō ē corroſio ⁊ dʒ ꝓcedere illō. ℞.
cere adipis: anſeris: vel anatis: olei roſ. ⁊ āminiſtrēt̄ exic
catiua potādo ⁊ iniciēdo: ⁊ cū nō ē corroſio icarnatiua lac
ca iniecta de gb⁹ ſūma ſūt trociſ. de carta ⁊ trociſci de an
drulis cū aliq̄ntulo merdaſengi: ceruſe: amili ⁊ calcis ablu
te. ¶ Deſcriptio medicamīs cōpetētis ſʒ Andromachū.
℞. terre ſigillate: chimolee: cornu cerui: vſti. añ. partes eq̄
les: ſeis canapis: tertiā ptē vni⁹ opy: pteʒ ſextā vnguēti de
ceruſa ptes. iy. ſarcocolle: ptē. ſ. mirre: thuris: due tertie p
tes aggregēt̄ cū aliq̄ntulo olei ro. ⁊ leni cū eo. Et leui⁹ illo ē
illō qd̄ fit ex ſarcocolla amilo ⁊ ceruſa ⁊ iriat̄ cū lacte. ⁊ ſi
ꝯfortet̄ cū plūbo aduſto ⁊ thure ē forti⁹. ⁊ qñ dolor fit ve
hemēs ſufficit potus lactis ⁊ ſyrupus violatus cū aqua or
dei ⁊ ad hoc faciunt que īfra caplo de ardore dicem⁹. Si
autē mictus ſanguinis affuerit ex appropriatis ⁊ ꝓprie cū
fuerit ex ruptura vene chilis ⁊ eſt ſubitus ⁊ mltus. Eſt ſy
rupus quē ſupra diximus de ſuccis in cura fluxus vētris
ſanguinei. Et trociſcus nr̄ de terra ſigillata cū ſucco plāta

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0364-2
DFG

ginis: lingue ceruine: conſolide ꝛ ſilia. Et ſi ſanguis pre ſui
frigiditate appareat cõgelatus ex anguſtia frigiditate ex/
tremitatũ: malitia hanelitus: pulſus ineq̃litate ſudore fri/
gido ꝛ rigore cũ pcedẽtib⁹ cauſis: ſolutiõis ꝛ mict⁹ ſangui/
nis tũc cura ẽ cura quã diximꝰ de ↄgelatiõe ĩ ſtõ. ʒ raro ſit
euaſio ſm̃ Abohali. Et ex ↄuenientib⁹ in hac ẽ vt ſedeãt
in tina decoctõis herbaꝝ q̃ ſunt ad lapidẽ ꝛ ſumãt in potu
de carpobalſamo. ʒ. ii. aut tãtundẽ ligni peonie vel grano/
rũ ei⁹ ꝛ ↄuchuen: ꝛ ꝑpe cũ aq̃ ei⁹ vel tãtundẽ blacchebicã
tie aut cordumeni aur. i. cũ aq̃ cal'a aut cũ aceto vini: ꝛ olo
onfancino: ꝛ oximel ſqlliticũ. Et ex hñtib⁹ ꝑꝑetatẽ ẽ epar
aſini fel teſtudinis: ꝛ coagulũ leporꝫ: ꝛ lignũ vitis: ꝛ abrota
nũ. ꝛ lac fic⁹ exiccatũ ĩiectũ ẽ ꝑpuʒ ꝛ bibitũ ĩ q̃ttitate. ʒ. ſ.
cũ aliq̃ ex aqs: q̃ ĩ hoc bibunĩ. vt cũ aq̃ ciceris nigri aut al/
baſech. i. rafani ligni fic⁹ ꝛ abrotãi ꝛ decoctõis ei⁹ cũ vĩo.

¶ Capl'ʒ. vi. de apatib⁹ renũ ꝛ veſice ꝛ medicis eaꝝ.

Poſtemata renũ ꝛ veſice ſunt nota ex ꝑdictis. Fi
unt ãt in eis ꝑut in alijs mẽbris ſʒ duplicẽ modũ
ꝑ modũ ↄgõnis. ſ. atq̃ ĩfluxiõis: ꝛ hoc ẽ plimum.
plimũ eni patiunĩ pp hũorẽ q̃ influit cũ ſupfluitate aquo
ſa. ꝛ ſʒ hoc differũt ĩ mã ſeu cã mãli. ſi. n. ꝑmo mõ fiãt pli/
mũ erũt renũ apata ex ſanguĩe groſſo ꝛ veſice ex mſico ꝛ
vnctuoſo. Si vo ſcdo modo erunt ipoꝝ apata ex col'a ſeu
colico ſanguĩe plimũ. hũor. n. q̃ cũ vrĩa euacuat plimũ co
lera ẽ: vt. H. ꝛ Abohali videnĩ ĩnue. e. qd acut⁹ ei⁹ odor af/
firmat: ꝛ q̃nq̃ ſunt aquoſa: q̃nq̃ flatica: ꝛ q̃nq̃ ſunt vento
ſa. Et cã ipoꝝ efficiẽs duplex ẽ. iterior ꝛ exterior. Interior
ẽ mẽbroꝝ ſeu pticulaꝝ diſpõ g̃nantiũ: mittẽtiũ: recipiẽtiũ
caliditate ſupflua pp ſtricurã chilarẽ vel alia. vel dolore
ex vrine acumĩe vl' lapide pũgẽte ꝛ q̃ſſante ſi ꝑ modũ fiãt
ĩfluxiõis ꝛ g̃nantiũ tm̃ ſi ad modũ ↄgõnis ꝑcedãt. Exteri
or vo ẽ ſicut caſus ꝛ pcuſſio ſalutis labor plurimꝰ ambulatio
ſtatio in pedib⁹: ꝛ tollerãtia ſeu ſblenãtia honeris. Et ſunt
hñtia iudicia. nã apata renũ cal'a plurimũ accidũt iuueni/
b⁹: ꝛ colerica ꝛ pueris ꝛ adoleſcẽtib⁹ ſanguinea: ꝛ ſi fr'a ſint
ſenib⁹ ꝛ mulierib⁹. Apata vo veſice plurimũ accidũt ĩfan
tib⁹ cã lapidis. Et diuerſificanĩ ĩ ſitu eoꝝ. nã q̃ renib⁹ acci
dũt ſiqdẽ magna ſint totalitatẽ eoꝝ ↄtinẽt. ſiv̄o pua q̃dã
fiẽt ĩtortione renũ. q̃dã vo ad lat⁹ ↄcauitatꝫ eoꝝ tẽdũt. ꝛ q̃
daʒ ad lat⁹ declinãt ad ſupius verſus venã emulgẽtẽ infi/
rã eis. q̃dã ad ptẽ iferiorẽ verſus vritides emulgẽtes. q̃dã
ad ptẽ iteriorẽ iteſtinoꝝ. ꝛ q̃dã ad poſteriorẽ dorſi. q̃dã in
vno rene. q̃dã in ambob⁹. q̃dã in ſuſpẽſorio. q̃dã in pãnicu
lo velãte eos. ꝛ hec ſunt diſticta ſʒ ↄſiderationẽ quã facit
rõ: nõ tñ ſunt pp mẽbri puitatẽ ꝛ ptiũ ei⁹ ꝑpingratẽ digno
ſcibilia hñ ſignis ꝑprijs diſtictis. Que ẽt in veſica eueniũt
aut tẽdũt ad ptẽ cõcauã ꝛ fundũ aut ad ptẽ colli ei⁹ iferio
rẽ: ꝛ q̃nq̃ ſunt magna totalitatẽ ei⁹ occupantia: ꝛ q̃nq̃ in
vritidib⁹ tm̃ eueniũt. Et diuerſificanĩ in terminatõe eo
rũ. nã q̃nq̃ reſoluunĩ: q̃nq̃ collectionẽ faciũt ꝛ rũpunĩ ꝛ
plurimũ lapidanĩ. Ait. n. Abo. quo. n. mõ nõ lapidanĩ ẽt ſi
cal'a ſint cũ ipſa ſint cã lapidis. Et cũ rũpimur apata renũ
aut rũpunĩ a pte vritidũ ꝛ veſice ꝛ ẽ meli⁹ oib⁹ aut a pte
ſupiori ꝑ modũ reditõis ad venã magnã chiliʒ deſcẽdẽtẽ
ad epar. deĩde ab epe ad meſaycas ꝛ ad iteſtina. ꝛ q̃liter/
cũq̃ fiat niſi ſit ꝑ modũ criſis ẽ mala. q: non ꝑ ↄuenientia
loca ꝛ apta. ʒ fiat a nã. aut rumpanĩ in vacuũ vẽtris: qua
re ĩdiget pforatione vt extrahaĩ ꝑ vẽtrẽ. ꝛ q̃nq̃ collectio
nẽ faciũt: ſed nõ rumpunĩ. ꝛ hoc cũ diureticis opʒ vt curẽ
tur ꝛ cũ aptiõe ex medicis: cũ ferro aũt ẽ piculoſuʒ ꝛ mor/
tale. vt ſupra ĩ lapide dictũ eſt. ꝛ q̃nq̃ cõicant apati cal'o ĩ
renib⁹ apata que in veſica. nã q̃nq̃ rumpunĩ ad pteʒ col/
li ei⁹ ꝛ virge ꝛ eſt bonũ. q̃nq̃ ad vacuũ ventris ꝛ eſt maluʒ
ad partẽ vritidũ vt recedãt erũpi nõ poſſunt pp cãm iã di
ctã. Et apata renuʒ ꝛ veſice ſunt cal'a ꝛ magna cõicant eis
ſupiora ꝑncipalia. ſ. diafragma. cor: epar: ꝛ ſtõacus: q̃re ac/
cidit malitia hanelit⁹: febris: caſus appetit⁹ nauſea. ꝛ deiñ
accidit cõmotio rõnis: eo qꝫ cerebrũ cõpatiĩ renib⁹ ꝛ veſi
ce: ꝑpterea q: vtraq̃ alliganĩ epati ꝛ etiam diafragmati.

¶ Signa apatum in renib⁹ ſunt dolor grauatiuus inſepa
rabilis extenſus ad ſuperiora ꝛ iferiora ꝛ vrina clara pdu
rans ꝛ ſubtilis: ꝛ q̃nq̃ retineĩ ꝑpꝛie ſi eſt tendẽs verſus cõ
cauũ ꝛ conſtrictio vẽtris. q: coartant iteſtina ꝑpꝛie ſi ma
gna fuerit: ꝛ alteratio coloris faciei ꝛ oculoꝝ. Et ſiqdẽ fue
rit cal'a aſſociaĩ febꝛ ꝛ tact⁹ loci calid⁹ ꝛ ſitis abomiatio ꝛ
võit⁹ col'e. malitia hanelit⁹ ꝛ alienatio ꝑ cõpaſſionẽ ſupio/
rũ. ꝛ ſi col'ica fe. erit itẽſa vrĩa fit ignea ꝛ pſeuerat cũ ſbtili
tate ꝛ acredĩe: ꝛ color faciei ꝛ oculoꝝ tẽdit ad citrinitatẽ.
Et q̃nʒ ſãguiea ſĩ cognoſcenĩ. q: fe. ẽ mitior ꝛ võit⁹ ẽ col'ic⁹
ꝛ vrĩa ad rubedinẽ tẽdit. ꝛ min⁹ ẽ ſbtil' ꝛ aliẽatio mior. ꝛ le
dũĩ a diureticis cal'is: acutꝫ: acetoſis: ꝛ ſalſis. ꝛ cũ reſoluũĩ
ꝑdcã accñtia: dolores ꝛ fe. remittũĩ: ꝛ vrĩa ĩſpiſſaĩ. deiñ fũ
d⁹ appʒ. Sil'r ãt ꝛ cũ ↄuertiĩ ĩ lapidẽ: ꝛ tc vrĩa mutaĩ ĩ al/
bedinẽ clarã ꝛ ſubtilẽ: dolor tñ nõ minuiĩ: ꝛ extenuãĩ mẽ
bra iferiora. ꝛ aliq̃ñ ñ curaĩ: ꝛ tñ ẽ ĩ via faciẽdi colectiõeʒ
ſil'is ẽ vrĩa. ꝛ dolor augeĩ ꝛ fe. ſʒ ñ grauitas cũq̃ ĩ apãĩ vri
na fit ſpiſſa: ſanioſa: ꝛ accñtia ſĩ ꝺbilia: ꝛ ꝑcedũt miorãdo
ſi bona ſit eruptio. ſi vero non econtra venire videbis. ſi
vero apoſtemata ſint frigida: ſigna apparebunt predictis
ↄria. ꝛ ſi q̃dẽ ſint mſica vrĩa erit glauca: ꝛ iferioꝝ mẽbroꝝ
extẽuatio atq̃ ſtupor cũ ↄuẽiẽtia ſiliuʒ circũſtãtiaꝝ ĩ mſ/
tiplicãdo melicũ hũorẽ. Si vo fl'ica vrĩa erit alba ſpiſſi/
tudinis pauce cũ ſignis dñy flatis ex pallore ꝛ iflatõe mẽ
broꝝ ſil'i caceſie: ꝛ alijs circũſtãtus cõuẽiẽtib⁹ ad digõnis
malitiã mſtiplicãtis fl'a. Et ꝑ modũ ĩfluxiõis ſi fcã ſint ap
parebũt ſigna repletiõis ĩ toto vel pte: ꝛ caliditas ꝛ dolor
ptis apoſe añs ꝛ eoꝝ factio erit ſubita. ſi ꝑ modũ ↄgeſtio/
nis fiet paulatĩe ñ ꝑcedẽtib⁹ ſignis repletiõis toti⁹: ſʒ ꝺbili
tate ptis tm̃. Et ſi qd ſit ĩ altero renũ ꝺxtro vel ſiniſtro co
gnoſceĩ. q: iacere ſup lat⁹ ẽ facili⁹ q̃ꝫ iacere ſupra oppoſitũ.
Et ſi dolor extẽdiĩ ad ptẽ veſice. tc apa ẽ ĩ ſiniſtro: ꝛ ſi aſcẽ
dit vſus epar ẽ ĩ dextro. ꝛ ſi oia ↄueniũt: tũc apa ẽ in ambo
b⁹. Cũq̃ apoſtema fuerit in ſuſpẽſorio ꝛ pãniculo velante
dolor fit acut⁹. ꝛ augeĩ grauedo ꝑhibẽs erectõeʒ ꝛ ſternu
tationẽ: ꝛ q̃ñ reſuppinaĩ fit dolor leuior: ꝛ cũ iacet ſupra vẽ
trẽ augeĩ ꝑpea q: ſuſpẽdit renẽ. Apatũ ãt ſigna veſice ſũt
eadẽ q̃ renũ ꝑpa: ꝛ ex cõitate vel ↄpaſſiõe ꝑpa. tñ dĩa ſũt
tm̃ in ſpẽ doloris. q: in veſica ẽ acutio pp neruoſitatẽ ſui: ꝛ
in loco q: ẽ ĩ ptib⁹ pectinis ꝛ inguinũ: ꝛ vge: ꝛ ꝑpe cuʒ ꝺcli
net ad colum eius qd ↄiungitur ei: ꝛ eſt cum inflãmatione
ipi⁹ ꝛ retẽtione vrine: aut diſtillatione: nec poſſunt iacen/
do cã mittere niſi ſurgãt ꝛ ſtẽt. Et ſigna ſpãliũ ipoꝝ ſũt ſi/
milia illis q̃ ꝺ renib⁹ dcã ſũt. Et ſigna terminationũ ij oꝝ:
ꝛ ẽt eruptiõis q̃ ẽ plurimũ ad meatũ colli ipi⁹. Et ſi in vri
tidib⁹ fuerint pua ad modũ puſtulaꝝ erũt. ꝛ dolor in ilijs
erit ꝛ in inguinib⁹. ꝛ vrine retẽtio abſq̃ ſignis ꝑdictis ap/
parentibus in membris predictis renum ꝛ veſice. Cura
eorum ſimilis eſt cure apoſtematum illorum mẽbrorum
de q̃ ſupi⁹ dcm̃ ẽ. ꝛ ꝑpe pulmonis: ſtõi ꝛ ſplenis. vtutẽ ĩna
tã ꝛ ifluẽtẽ hñtiũ. ſic renes ipi ꝛ veſice. Conſiſtunt ãt in q̃/
tuor reb⁹. In euõne toti⁹: in euõne ptis: in regimine ꝛ acci
dẽtiũ correctõe: ſil'r ꝛ cura apatũ hoꝝ mẽbroꝝ: ĩ illis qua
tuor reb⁹ ↄſiſtit diuerſitatis: tñ tm̃ in quãtũ natura illoꝝ
a nã eoꝝ diuerſa exiſtit. Primã complẽt fl'oia de baſilica
dextra vel ſiniſtra: ſi ſanguineũ ſit vel ſi ali⁹ humor cũ ſan
guinis peccato ſit. deinde fl'oia de curuatura poplitis. qd
ſi non appet vel timeaĩ pp eius inſuetudinẽ aperiaĩ ſafe/
na. ꝛ ſi ſine ſanguinis peccato euacuatio cũ vomitu ꝛ ma
gis ſi colericus fuerit ꝛ cũ nauſeaĩ faciẽda ꝛ ſol'one vtẽris
cũ cliſterib⁹ vel cũ farmatijs ſumptis appropriatis notis
ꝛ ꝑmiſſio digeſtionis. hec. n. a toto euacuant ꝛ a membro
apoſo deriuant Oportet aũt ne ſolutio ſit laborioſa ꝛ for/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0365-8

tis cõmouens materiam ne magnificeť nocumentum ꝓp
rẽ plurimũ effuſuʒ ad iteſtina vicina renibꝰ.ſ. in ſubiecto
⁊ i iteſtinis ⁊ ano: vt hic ſupra eſt dictũ. Et in caſſiaf. ẽ ma
turatio ⁊ ſolutio cũ facilitate: ⁊ i alijs dictis ſupra in cura
oppilõnis: q̃ lʒ ſint fortia: tñ i q̃ʒtitate diminuta fiũt leuia.
Jngt.n. Abo. Et ſcias ꝙ multotiẽs idigeť medicina forti ⁊
debili. fortis ẽ ex hoc ꝙ ſoluit hoiem viſcoſuʒ: ⁊ ipiꝰ q̃ õbʒ
debilitas ẽ ex eo qd̃ fac̃ aſellare ſemel aut bis: ſed quo mõ
hũorẽ viſcoſuʒ mouet niſi v̾tutis fortitudine. ⁊ ſi tal' ẽ quo
vtiqʒ mõ ſemel ſoluet vel bis de ſe: niſi diminuta ſit q̃ʒtita
te: ⁊ ſi qdẽ i cã fuerit lapis vel acuitas vrine dolorem idu
cẽs: vel alia ꝓprijs remedijs auferanť: ⁊ alie cãe extriſece
iterdicanť ⁊ corriganť. ¶ Scd̃am ꝯplẽt medicie fride et
ſtiptice q̃ repellãt iflueñtẽ mãʒ: ⁊ fluxã trãſmittãt q̃les ſũt
iteriꝰ approxiate. vt aq̃ ordei cũ decoctione roſaꝝ vel cito
nioꝝ: ⁊ ſucci fridi noti. Et approximãde exteriꝰ ſic̃ farina
ordei cũ roſis. Cauẽdũ ãt a mł'tũ fridis ⁊ ſtipticis ne mãʒ
iduret ⁊ ꝯuertãt i lapidẽ ad qd̃ ſũt apta. ⁊ coadiuuãt taleʒ
eũonẽ trahẽtia ad diuerſuʒ apoſe ꝑtis ſi nobiliꝰ illa nõ ſit:
vt ſũt vẽtoſe illi applicate. ⁊ ſili a euacuãtia in mẽbro alte
ri oppoſito ⁊ remoto poſt illõ q̃ ſũt nota. Deide ex quo mã
iã ceſſauit a fluxu: iã fluxã ⁊ collectã i eis ſtudebis eũare d̾
eis ꝑ ꝓpinquãtẽ ꝑtẽ ipis: vel ꝓpriã extrahere ꝑ ꝓpinquaʒ
ꝑtẽ dupl'r: ſenſibil'r eũando vł' iſenſibil'r. ſenſibil'r vt ꝑ ap
tionẽ vene curuature poplitis ſi ſanguĩea fuerit. q̃ ſi nõ ap
pareat aperiať ſafena: vel ſiatica. ſi illa ẽt nõ videať ꝑ ap
tionẽ emoroidaꝝ ſaltẽ cũ ſanguiſugis q̃ eũant de ꝓpiquo
magis. Sʒ ſi aliꝰ hũor ſit cũ diureticis fridis: ſi ſit colericꝰ
vt ẽ aq̃ lactis: ⁊ ſeium cõium vel tẽpate calidis: vel caſſief.
cũ aq̃ capil. ve. ⁊ ligritie q̃ maturãt ⁊ faciũt ſolõnẽ facilẽ. ⁊
vijs vrie ẽ ꝓpa: vel cũ cal'is ſi mã fuerit fra. h.n. nõ ſolũ i
fluxã eũant: ſʒ ꝑ viã ꝯgeſtiõis: aggregatã ẽt ⁊ virulẽtã ab
ſtergũt ⁊ lauãt. Cauẽdũ aũt ne aũ eũonẽ corpis illa mini
ſtres: ꝯuertũt.n. mãm ad renes ⁊ veſicaʒ: ⁊ magis replent
iſenſibil'r: vt per ꝯtractionẽ eius ad lacertos exteriores re
num: ⁊ cutẽ: ⁊ vẽtoſa ſupra renes applicata vel emplaſtris
ex rubificãtibus qdeʒ in veſica nõ eſt bene poſſibile adeo:
cũ a partibus circũſtantibus corporis ſit diſtincta: nõ eis
ſicut renes affixa: ⁊ ſi qdem euacuare perfecte bene ſe ha
bebũt. Si aũt aliquid remaneat cũ ſit cõpacta ⁊ groſſa: oʒ
vt extrahať per ea. ⁊ p̄mo cum diureticis liquefaciẽtibꝰ ⁊
ſubtiliãtibus: ⁊ cũ ſtipticitate que cõfortant iterius ⁊ exte
rius miniſtratis notis. vt ẽ fenugrecũ: cinamomũ: aniſuʒ:
ipericon: mellilotũ: anetũ: crocus: ligritia: ⁊ hmõi: que ſub
tiliant ⁊ reſoluunt: ⁊ ex eis eſt camomilla vel fortioribꝰ vt
ſť ſpica. caſſia lignea ameos. ⁊ alia diuretica fortiora ⁊ eua
porantia ſi groſſior ſit mã. Si v̾o totaliter ſit reſoluta ſa
na remanebũt mẽbra p̄dicta. Si vero ad ſuppuratõeʒ de
ueniat reſolutio inobediens facta maturenť ⁊ matura rũ
panť ⁊ mũdificenť. deiñ conſolideť vlcus vt ſupradictũ ẽ
cũ cõueniẽtibꝰ que ſunt nota ſupius. Et ſil'r ſi in lapidẽ cõ
uertanť mollianť ⁊ reſoluunť cũ oibꝰ que ſupius nota ſũt
in cura apatum predictoꝝ membroꝝ que in iſtis mẽbris
ſunt propria cũ ꝓmixtiõe diureticoꝝ. Sʒ ſi aquoſe fuerit
curenť eod̾ mõ cũ diureticis calidis vt ſlatica: ſi vẽtoſa cũ
eis ⁊ extenuantibꝰ que etiã i cura ydropiſis ſunt dicta. Et
ſi in vritidibꝰ fuerint eodẽ modo curenť. ¶ Tertiã rẽ cõ
plet reꝝ non nãlium debita ordinatio cũ diminutione ci
bi ⁊ potus ꝯrie q̃litatis humori qui eſt mã eius quiete cor
poris: ⁊ motu mẽbroꝝ ſupioꝝ ſomno ⁊ vigilijs tẽperatis
ꝓut cã ⁊ accidẽtia exigũt ⁊ vera inanitõe ſupfluoꝝ digõ
nũ oium. nõ repletione ⁊ oia quieta. ⁊ hec oia in aere tẽpe
rato. ¶ Quartã rẽ cõplent que accñtia ꝓpria remediãt vt
eſt dolor q eſt cã ⁊ accñs grauedo de qbus ſupradictũ eſt
ſufficienter ⁊ vrine retentio de q̃ ifra diceť: ⁊ ventris con
ſtrictio que cũ lenitiuis ſumptis cliſterizatis: vnctis ⁊ em

plaſtratis exteriꝰ corrigať: vt ſupra i cura doloris iteſtioꝝ
eſt dictũ ſufficiẽter. ẽt cũ fe. de q̃ ifra deo coadiuuãte dice
tur. ⁊ võitis de quo ſupra ẽ dictũ ad plenũ. ⁊ ẽt de malitia
hanelitus ⁊ alijs accñtibꝰ ꝓuenientibꝰ ꝑ ꝯpaſſionis viam
de qbus eſt ſupradictũ inqʒ pluribꝰ locis. Medicine com
poſite diceť deiceps. Jngt Serapio. ad vltimũ huiꝰ per
ueniũt aut ad collectõʒ viris aut ad lapideitatẽ. ¶ Cliſteř
gualterij faciendũ in p̄ncipio apatis. ℞. aq̃ ordei: lib. i. ⁊ in
ea diſſolue olei roſati. ℥. ij. ⁊ imitte. Si vero apa ſit frigidũ
adde in decoctione flores camomille. Si vero apa fuerit
in augmẽto fiat cliſtere ex decoctõe altee: lilij: ⁊ florũ mal
ue. añ. M. i. ſeis lini. ℥. i. olei roſa. olei de lilio. añ. ℥. i. ⁊ i par
te diſſoluanť olea ⁊ inicianť. apate v̾o ꝓueniẽte ad ſtatuʒ
fortiora diaforetica miſceanť q̃lia ſunt flores camomile:
aneti: peritaria: ſambucꝰ ⁊ benedicta ⁊ iuſtinum: oleũ yri
num ⁊ nardinũ. ¶ Emplaſtrũ ad apa renũ in p̄ncipio. ℞.
olei roſa. olei malue: aceti paruʒ: farine ordei: ⁊ empla. Cũ
vero ꝓuenerit ad augmẽtũ adde flores camomille: ⁊ oleũ
eiꝰ vel yrinum. tale epithimabis cũ filtro imbibito in p̾e
dicta decoctione. ¶ Et ſil'r cũ ꝓuenerit ad ſtatũ ſtudebis
ꝓ poſſe reſoluere addendo diuretica fortiora. qd̃ ſi nõ re
ſoluať: ſʒ ꝓuenerit ad maturationẽ ⁊ ſaniẽ applic̃eť qd̃ ſeq
tur maturatiuũ. ℞. farine fenugreci vel tritici. lib. ſ. radic̃
altee: camomille: radic̃ lilij. añ. M. i. radices coq̃ntur i aq̃
⁊ in illa aqua colata diſſoluantur adipes anſeris: ⁊ galline
olei: de lilio. añ. ℥. i. ex his fiat empl'm ⁊ actualiter caliduʒ
apponať. ¶ Aliud Yſaac. ℞. caricaꝝ albarum dactiloꝝ
pinguiũ: ⁊ paſſulaꝝ: enucleatarũ: radicũ altee: fenugreci: ⁊
ſeminis lini. añ. ℥. i. decoquanť in aqua: ⁊ cum aſſungia gal
line: teranť ⁊ emplaſtrenť. ¶ Cũ vero ſaniatuʒ fuerit apa
fiat cliſtere ex his que habent ipum aperire. ℞. aque deco
ctionis cauliũ ⁊ limaciaꝝ cũ corticibꝰ ⁊ diſſolue in ea mel
lis. ℥. ij. ſerapini. ℥. q̃rta. fenugre. ℥. i. ſucci paritarie. ℥. i. olei
yrini. ℥. i. ⁊ imitte ⁊ vtere ſternutationibus. Fracto vero ⁊
aperto mundificatiuũ appone ex aqua ordei cũ melle vel
zucca. ſm exigentiaʒ mãe. vel cũ lacte: quod etiã miniſtra
bis in potu. Deinde facta mundificatiõe exhibebis cõglu
tinatiuũ de trociſcis de charabe: ⁊ de luto armẽo cũ lacte
bouino extincto in eo ferro ⁊ empl'abis ex ipſis. Si vero
ad lapideitatẽ peruenerit fiat ſyrupus ex diureticis notis
ſupra mixtis cũ mollificãtibus hic ſupius p̄narratis ⁊ caſ
ſief. donec mã matureť. deide ea maturata qd̃ cognoſces
ꝑ vrine multitudinẽ cũ ſubſtantia groſſa purgabis cũ pil
lulis ifraſcriptis. ¶ Pillı̃e. ℞. benedicte laxatiue. ʒ. iiij. caſ
ſief. ℥. ſ. eſule. ℈. ij. turbit. ℈. ij. zinzi. ℈. i. omnia incorporẽ
tur cũ vino ⁊ fiant pillule. ¶ Balneũ poſt purgationẽ mi
niſtrandũ. ℞. brance vrſine: radicis apij: ⁊ folijs eius: radi
cis yringoꝝ ⁊ yreos: folioꝝ malue: floruʒ melliloti: camo
mille: ſeminis lini. añ. ℥. ij. bulliant in aq̃ ⁊ adde olei amig
dalis. ℥. iij. ⁊ ingrediať vſqʒ ad vmbilicũ. deinde fiat poſt
tertiũ diem flebotomia de alia ſafena ſub cauilla. deinde
emplaſtreť cũ hoc emplaſtro. ℞. folioꝝ paritarie q̃ʒtũ vis
⁊ torrefiant in ſartagine cũ oleis his. ℞. olei anetini: camo
milli: de lilio: de pulegio: olei viol. añ. ℥. ſ. ⁊ iunctis renibꝰ
cũ predictis oleis prius: emplaſtreť cũ ipſa. ¶ Emplaſtꝝ
de mucilaginibꝰ q̃nqʒ ꝑ iterualla applicatũ ẽ optimũ: cui
ſuccedat emplaſtrũ de melliloto noſtꝝ in antidotario tra
ditum: ⁊ yſopi cerotum: ⁊ cerotum dyapente: ⁊ alia conſi
milia ibidem notata.

¶ Capitulum ſeptimũ de dolore renum ⁊ veſice prouc
niente ex eo ⁊ medicinis eorum.

Dolor renũ ⁊ veſice notus eſt. Et queãdmodũ dif
fert loco ⁊ ſpecie qbus dignoſciť. ita in cã cõtingit
cuiꝰ ablatione curať. Loco qdẽ differt. naʒ dolor
renũ circa lumbos ꝑcipitur ⁊ veſice circa pectinẽ. Specie
differt. nã renũ eſt grauatiuus: veſice vero ẽ acutus ꝓpter

nervoſitatem. In cauſa convenit. nam cauſa eius eſt ali/
qua egritudinū pdictaꝝ. ⁊ mala cōplō diverſa cuiuſlibꝫ ge
neris: de q̄ īfra dicet̄: vel vētoſitas: ⁊ qñqꝫ ē añs criſiꝫ per
vrinā: ⁊ cōcomitās eā. ⁊ ſigna eaꝝ: ⁊ cura ex pdictis ſit ma
nifeſta: ⁊ ex dđis ī caplō ſubſequēti. Et cū non īuenis ſeda
tionē doloris cū anodinis exteriꝰ vnctiōibꝰ ⁊ ēplīs cliſte/
ribꝰ ⁊ vētoſis: oꝫ vt narcotica adminiſtres. ⁊ deīde ad cāe
ablationē ꝯuenias cū adminiſtratōe diureticoꝝ: ſꝫ ī admi
niſtratōe narcoticoꝝ ē tīor magnꝰ. ꝯbelitāt. n. ea ī actione
ꝓpa ex q̄ ſeqtur grāde malū. abſtinere ergo oꝫ īquātū poſ
ſibile eſt: ⁊ vti cū cautella maxia: vbi excuſatio nō habet̄.
Similiter āt in diureticoꝝ adminiſtratiōe eſt error. ⁊ ma
xime calidoꝝ ⁊ fortiū: ꝓpter illō qđ de hūoribꝰ ad illa cō/
vertūt: ⁊ maxie vlcerata q̄ mordēt. oꝫ ergo vt nō niſi poſt
euōnē ſufficiētē corporis miniſtret̄: ⁊ in diſpōne vlceꝝ cuꝫ
remittet̄ eoꝝ acumen mixtiōe: vt ſūt diuretica fra. ꝓut di
ctū eſt ſupra. Et ex appropatis ſimplicibꝰ in dolore ipoꝝ
ſūt ſiſeleos ſeia: cū. n. ſunt recētia ⁊ bibunt̄ ex eis tres ami
luſechcū rob. x. diebꝰ: ſanāt dolorē renum: ⁊ ſunt iuuatiua
penitꝰ renū: ⁊ galāga: ⁊ ſpica: amomū eſt ꝓpriū cū ſedatur
in decoctiōe eius. Caſſia ꝯfert doloribꝰ renū ⁊ veſice: ⁊ iu/
iube: q̄ntitas auelane de radice peonie ꝯfert doloribꝰ renū
⁊ veſice. Caro ericy terreni ſalita cū oximelle ꝯfert dolori
renū ꝗniar: q̄ noiat̄ acuchia: ꝯfert dolori renū ⁊ anucubeꝫ
domeſtice lenīēdo nām ꝯferūt dolori renuꝫ: ⁊ aqua deco
ctiōis eiꝰ: ⁊ ſyrupꝰ: ⁊ agaricū purgādo ⁊ calefaciēdo. Hutta
albuſar ꝯfert ⁊ ficꝰ hūida ⁊ ſicca ſi ab vicere nō ꝓcedat.
¶ Et ex ꝯpoſitis ad dolores arboꝝ. Cōfectio hermetis
dyacurcuma. ⁊ ꝯfectio de alchechēgi: nux ꝯdita: ⁊ oleū d̄
ſtorace: ⁊ de pineis: ⁊ de feſticis lētiſcis: de nuce īdica: vul/
pinū: laurinū: ⁊ benedictū eſt vltimū ⁊ mitridatuꝫ: tiriaca
eſdre: ⁊ Abo. pigra: ⁊ alia q̄ ſequunt̄. ¶ Syrupus exptus
ſcđꝫ Jo. caſamiçulā ad dolorē renuꝫ ex cauſa fra vel cali/
da: colera: vel flegmate. ℞. capil. ve. bugloſſe: ſenationum
ſcolopen. filipen: camedre: canepi: acori: ſcariole: cū radice
cicoree epatice: añ. M. i. radicuꝫ feniculi: ſparagi: ⁊ bruſci:
añ. ʒ. ij. corticū radicis celſi. ʒ. iiij. polipodij. ʒ. iiij. aniſi: feni
culi: ameos: ſiſeleos: amōi: dauci: ſe. apij: aſari: meu. fu. epi/
thimi: folicloꝝ ſene: çin. añ. ʒ. ß. ligritie: viol. floꝝ boragis
paſſularū enucleatarū: añ. ʒ. i. prunoꝝ: ſebeſten: añ. xl. tur
bit: hermodactiloꝝ: añ. ʒ. i. pipis lōgi. ʒ. ij. ſeium cōīum: ci/
cerū nigroꝝ: añ. ʒ. ij. ordei: pugilum. i. çuccari: lib. i. çuccari
violati reſidētie: çuccari roſati noui. añ. ʒ. iiij. ſucci roſaruꝫ
lib. ß. aceti. ʒ. ij. ¶ Cōfectio trociſcoꝝ ad dolorem renuꝫ.
Recipe ſeminis apij. ʒ. iiij. cimini: ſeminis myrte: radic̄.
caſtorei. ana. ʒ. vi. fiant trociſci granoꝝ quinqꝫ ⁊ dentur
vnus vel duo cum vino ſubtili ſi nō febriat: ⁊ ſi febrit cuꝫ
tepida. ¶ Vnguētū ad dolorē renū ⁊ nervoꝝ ꝯtionem
contuſſionē ⁊ puncturā. ⁊ valet ad oēs articuloꝝ dolores.
℞. olei maſticini: fenugreci: cere citrine. añ. ʒ. ij. Cōfice cū
mumia diſſoluta in vino. ¶ Emplꝫm ad idē ſcđm Archidi.
℞. maluaꝝ: marubij: apij: farine ordei: ⁊ ſalis: ⁊ calidū ſup
pone. ¶ Pillule experte ad dolorē renū. ℞. ſeminis cipa/
rū albarū: ſemis apij. añ. ꝯficiant̄ cū ſucco fenicli. ¶ Pil/
lule laxatiue ad purgandū renes de humoribꝰ groſſis. ℞.
bñdicte laxatiue: iuſtini. añ. ʒ. ij. hermo. ſarcocolle: interio/
rū: colloquintide. añ. ʒ. ij. turbit. ʒ. i. ⁊ ß. catartici impialis.
ʒ. ij. çinçi. aniſi: feniculi. añ. ℈. i. ſaxifragie: milij: ſalis. añ. ʒ.
i. ſal gēme: diagridij: ſerapini: armoniaci: oppoponaci. ana.
ʒ. ij. Cōficiant̄ cū ſucco apij: doſis. ʒ. i. ⁊ ß. Et ſi fuerit durꝰ
ʒ. ij. poſt pparatōꝫ cū pdicto ſyrupo: ⁊ abſtinētia a groſſis
⁊ viſcoſis. Poſt purgationē ītret balneū aque mixte mari
ne cū dulci eq̄liū partiuꝫ: in qua bulliāt camomille flores
folioꝝ lauri: rute: calamenti: pulegij: oīum. añ. ¶ Deinde
poſt exitū vngat̄ hoc vnguēto. ℞. olei camomille: ⁊ ſemi/
nis lini. ana. ʒ. ij. butiri ſine ſale. dyaltee. agrippe. añ. ʒ. i. ſpi
ce. ʒ. ij. cere: quod ſufficit.

¶ Capitulū. viij. de debilitate renū ⁊ veſice ⁊ diſtinctiōe nocumentoꝝ cōtingentiū in actione vrinandi.

Debilitas renū ⁊ veſice ē nocumētū actionis ipſoꝝ
vel ꝓpria q̄ ē circa nutrimētū ꝓpriū vel cōis q̄ ē
circa expulſionē ſupfluitatꝫ aquoſe: ⁊ dr̄. actio vri
nandi de qua ītendimꝰ quā Gal. dixit ꝯpoſitā: ſicut primā
nālem in q̄ qdē actione nāliter ſe hñte tres actus ſilꝰ dice/
bātur ꝯcurrere neceſſarios ⁊ ordinatos. Primus ē ipſius
⁊ ſanguinis ſequeſtratio. Secūdus ē ipſius collectio ⁊ re/
tentio. Tertius eius expulſio vnica ⁊ volūtaria. pͥmus eſt
renū. ſecūdus veſice ⁊ colli eius cū lacerto latitudinali cir
cūuoluto in ipſo. tertius ē concaui eiꝰ ⁊ virge exiſtentis vt
vie ad extra. ſicut vritidū de renibꝰ ad veſicam. Egritudi
ne igitur adueniēte talibꝰ mēbris ⁊ ꝓprie renibꝰ vel veſice
q̄ ſunt pͥncipalia in actiōe: neceſſariū eſt actū eoꝝ ledi. ⁊ ꝑ
conſequēs actionē vrinandi. Talis eniꝫ leſio multiplex ⁊
diverſa: ⁊ diverſa ſequunt̄ ſinthomata ſcđꝫ diverſitatē mē/
broꝝ ſuoꝝ ⁊ nocumentoꝝ actuū eorundē. Nā ſiquidē no
citus ſit actus renū attrahendi ⁊ ſequeſtrādi: tunc aut erit
debilitatꝰ ⁊ diminutus vt paꝝ attrahent ⁊ ſequeſtrent: ex
quo in actione vrinādi ꝓuenit nocumentū qđ dicitur vri
ne paucitas: ⁊ ſequitur caceſia. Aut erit ablatus vt nihil at
trahatur vel aliquid de quo nō ſit curādū: ⁊ accidit vrine
ſtillatio ſeu ꝓuatio. ⁊ qñqꝫ ydropiſis: de q̄bus ſupius dictū
eſt. Aut erit ſupfluens: q2 ſuperflue trahāt ex quo accidit
dyabetes que multitudo ſeu lienteria eſt vrine. ⁊ ſequitur
ex ea corporis deſiccatio. Aut erit corruptus ⁊ tunc duplr̄:
aut q2 a corruptiuū tribuat. ⁊ tūc accidit fetor vrine. aut q2
corruptum trahit. ⁊ tunc accidit in renibꝰ tremor: ⁊ ſequit̄
tarda mictura. Sed ſi in veſica ⁊ eius collo nocitꝰ ē actꝰ
colligendi ⁊ retinendi aut erit ablatus: ⁊ tunc fit in conti/
nentia vrine ⁊ īuolūtarius exitus ⁊ mictus in lecto: vel diſ
ſuria que vrine diaria dicitur: in qua. G. dixit ablationem
actionis eſſe aialis: q2 lacerti colli veſice que ē ipſius virtu
tis organū. In ſtranguria vero ablationē nālis nō aialis.
nā in eo lacertus iſte ſuā actionē agit: ſꝫ veſice cōcauū nō
valet ꝯprimi: qđ nālis virtutis eſt īſtrumentū. colligit eniꝫ
veſica ⁊ retinet dilatato eius ꝯcauo ⁊ opilato collo eius ꝑ
contractionē lacerti exiſte. itis in eo: quo laſſato vt aperia
tur eius colluꝫ ⁊ concauo eius circumtracto ⁊ vrina ex co
egreditur nāliter. ⁊ qñqꝫ nō circūtracto egredit̄ etiā ⁊ ac/
cidit mictus in loco: aut erit diminutus. ⁊ tūc erit diſtilla/
tio vrine ⁊ paucitas ēt eius ſequit̄. Aut corrupte fiet ⁊ ma
le: q2 cū dolore ⁊ ardore: ⁊ tunc accidit ſtranguria ꝓprie q̄
eſt vrine retentio ⁊ ſtrangulatio: ex quo ſequit̄ dolor in pe
ctinem īflatio ⁊ cito mors ⁊ frequenter. Si vero ſit actus
nocitus in concauo veſice qui eſt cōpreſſiuus lateruꝫ eius
vndiqꝫ vt expellatur vrina: ⁊ tūc accidit difficultas vrine
⁊ ſequit̄ vrine retētio. ¶ Sic itaqꝫ determinatis nocumē
tis que in actione vrinandi poſſunt cōtingere: de vnoquo/
qꝫ dei iplorato auxilio eſt dicēdū. Sic ergo debilitas re/
nū ⁊ veſice ⁊ eaꝝ defectio in actione vrinādi ⁊ cā īmedia
ta eius aut eſt ꝓpria ⁊ eſt aut īprimens in corpore ipſoꝝ
membroꝝ vt eſt aliqua egritudinū pdictarum de quibus
ſufficienter eſt dictum. aut mala ipſorum cōplexio diuer/
ſa vel equalis: de qua nunc dicendum: ⁊ eſt plurimū in re/
nibus calida: in veſica ⁊ in alijs frigida. Singulū. n. mem
brorū ſcđm. G. operatur per qualitatem eius criſim que ex
quattuor eſt qualitatibus: q̄diu. ſ. cuenta fuerit certe pro/
ut membri illius actio expetit. Cuꝫ vero fuerit diſcraſia ⁊
egra neceſſarium eſt ipſam ledi. efficit eniꝫ ſecundū. Gal.
in virtutis eſſentia ⁊ in ſubiecto ipſius que in actione pe/
netrabilis exiſtit cuiuſcunqꝫ generis fuerit: maxime frigi
da diverſa vel equalis. ex ea enim non tantum debilitas
vel diminutio accidit ſcđm diverſitatem eius in ſpecie vel

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0367-9

in gradu quelibet alia prouenit in actione vrinandi leſio
⁊ ſequūt̃ ſinthomata ſupradicta. Nā ſiquidē in renibꝰ fue
rit complexio mala ⁊ frigida valde excedens attrahendi
⁊ ſequeſtrandi aufertur ipſoꝝ actio: ex quo accidit vrine
retentio. non erit valde excedens: ⁊ tunc accidit debilitas
eius ⁊ minorabitur: ⁊ ſequitur paucitas vrine. Aut erit ca/
lida valde excedens: ⁊ tunc ſuperflue trahēt ⁊ accidit dya
betes: ⁊ ſequitur corporis exiccatio. Aut erit ſicca ⁊ eos ex
tenuabit ⁊ debilitabit aut valde humida ſimplex vel cali
ditati parū admixta que ſubſtantiaꝫ renū mollificet ⁊ eo/
rum meatus dilatet ⁊ aperiat ⁊ accidit debilitas renū de/
terior ꝗ̄ ſic. Si etiam ſit in veſica ⁊ collo eius ꝯplexio ma
la ⁊ diſcrata humida cum caliditate ⁊ frigiditate magiſꝗ
mollificent lacertum circumuolutuꝫ in eo: vt nullo modo
poſſit contrahi ⁊ collum eius conſtringere: ⁊ tunc accidit
inuoluntarie vrine exitus ⁊ diſſuria ⁊ ſequitur multitudo
vrine ⁊ mictus in lecto. Si vero non ſit valde excedens
vt parū mollificet ⁊ non conſtringit ꝑfecte: ⁊ tunc accidit
diſtillatio vrine ⁊ ſequitur paucitas eius. Aut erit multuꝫ
humida cū pauca caliditate que teſtullam viloꝝ veſice
rarificat ⁊ relaxat: debilitatē in eis feram ⁊ peſſimā gene
rabit. Aut erit ſicca cum caliditate vt vrinam acuat: ⁊ tūc
accidit ardor vrine: ⁊ ſequit̃ reſolutio ⁊ debilitas. Aut ſic/
ca cū frigiditate: ⁊ tunc accidit ſtrāguria ⁊ ſequitur dolor
in pectine ⁊ inflatio ⁊ mors quandoꝗ. Si etiā ſit in veſice
concauitate mala cōplexio ⁊ diſcraſia frigida ⁊ humida q̄
prohibeat conſtrictionē ipſoꝝ lateruꝫ vndiꝗ vt vrina nō
queat exprimi: accidit difficultas vrine. Etiaꝫ ſi fuerit ſic/
ca vel humida in collo eius que ꝯſpaſmet lacertū ⁊ teneat
circuntractum. Sicꝗ expeditis egritudinibus variatis
ſm̄ plus ⁊ minus: maior ⁊ minor accidit in predictis mem
bris: debilitas ex qua diuerſa poſſunt in actione vrinandi
prouenire nocumenta. Aut erit cadēs ſupra ſubſtātiā ſpi
ritus: vt q᷑ ſit euacuans ipm: vt eſt euacuatio multa hūo/
rum ⁊ proprie ſanguīs ex eis: vel coitus multus: vel reſol/
uens ipm vt mala ꝯplexio eius calida. Aut ſuffocās vt mł̄
ta repletio ex humoribꝰ: lapide ſanie vel vrina. aut extin/
guens vt narcoticoꝝ approximatio. Aut cadēs ſupra vir
tutem vt multꝰ labor reiteratus ipſoꝝ membroꝝ ⁊ ꝓprie
renū: vt in longa ſtatione in pedibꝰ ⁊ ambulatione multa
⁊ equitatiōe ſubita ſine ꝯſuetudine: ⁊ intermiſſione dolo/
re ⁊ percuſſione: ⁊ in veſica multa vrine retentiōe: ardore
⁊ dolore que ēt ſpiritū reſoluendo debilitant virtutē: ⁊ ac/
cidit membris ꝑdictis debilitas ſm̄ plus ⁊ minus. ex quo
eoꝝ actio diminuitur vel aufertur in expulſiōe vrine. Et
quandoꝗ cauſa debilitatis ipſoꝝ eſt ex cōmunitate ad ſu
periora membra nobilia. ſ. epar cor ⁊ cerebrū: cuꝫ enim h̄
patiantur predicta debilitantur membra ex quo nocumē
tuꝫ prouenit in actione ipſoꝝ predicta ⁊ diuerſa vt dictū
eſt accidentia inſequentur. Et cauſe ipſarum egritudinuꝫ
ſigna ⁊ cure ſuperius dicte ſunt. Cauſa vero male comple
xionis ipſorum ſimplicis ⁊ commixte pure vel impure di
uerſe vel equalis que in debilitando eſt peſſima ſeu pluri
ma duplex eſt interior ⁊ exterior et vtraꝗ ex dictis in la/
pide ⁊ vlcere ⁊ in mala complexione epatis eſt manifeſta.
⁊ ſigna eius etiā licet loco ⁊ proprietate actionis leſe ⁊ ex/
euntium quorundam ab eis ſint differentia. per te ergo
conſidera ⁊ appropria illa renibus prout oportet. ¶ Si/
gna vero debilitatis ipſius. ſ. renū ſunt vrine paucitas ⁊ ī
ſubſtantia ⁊ colore ſicut lotura carnis ⁊ quandoꝗ reſidet
cum vene ſunt ſalue ⁊ quandoꝗ remanet ſicut migit̃ nec
reſidet cū non ſunt ſalue. Et extenuatio renū licet non ſit
manifeſta debilitas: in ſtando ⁊ impotentia tollerandi ha
nelitum defectus in coitu debilitas viſus ⁊ dolor capitis.
Sed veſice debilitatis ſigna ſunt defectus in continendo
vel expellendo vrinam: grauitas in pectine ⁊ peritoneo/
ne ⁊ ſenſus acuitatis ⁊ ardoris: lenitas ⁊ aſperitas in loco
⁊ apud emiſſionem vrine maxime ⁊ vrina erit ſpiſſa ⁊ tur
bida propter illud quod deſcendit cum ea quod nō dige/
ritur nec conuertitur ⁊ non expellitur niſi adiuncta com/
preſſione. ⁊ hec de iſtis ſignis. ¶ Cura male complexiōis
talium membrorum ſi pura eſt ſimplex vel cōmixta ⁊ di/
uerſa facile curat̃: licet difficilius cognoſcatur: ſi vero eq̄
lis ⁊ fixa difficilius curatur licet facilius cognoſcatur quē
admodum in alys membris exiſtens vt Galienꝰ dixit. Et
eius ſanatio eſt tres res. prima eſt remotio exterioris cau
ſe. ſecunda alteratio. tertia ipſorum confortatio. Si vero
impura fuerit ⁊ cuꝫ materia ꝯmixta eius ſanatio eſt tres
res. prima ē materie euacuatio. ſecunda alteratio diſcra/
ſie ſi remanſerit impreſſa. tertia ipſorum cōfortatio. Eua/
cuatio completur cuꝫ flebotomys prenumeratis vel me/
dicinis ſolutiuis: prout materia exigit: ⁊ ſumptis ⁊ cliſteri
çatis ⁊ vomitibꝰ ⁊ dyaforeticis exterius approximatis ꝑ
oēm modū: prout in cura oppillationis eoꝝ diximus. Al/
teratio vō ꝯplet̃ cū admiſtratiōe diureticoꝝ calīoꝝ vel fri
gidoꝝ ⁊ exiccantiū ⁊ humectātiū: ꝓut diſcraſia expetit: q̄
oīa ī cura oppillatōis ex lapide vel hūore ⁊ vlceꝝ ſūt nūe
rata. Confortatio vō ꝯplet̃ cū cibis ⁊ medicis ⁊ cibis faci/
lis digōis boni nutrimēti ⁊ diſcraſie ꝯrys. Et a ꝓprietate
cōueniētes ſunt renes aīalium: ⁊ ꝓprie edoꝝ ⁊ porcoꝝ. Et
veſica donule exiccata: ⁊ carnes erity terreni ſalite cum
oximelle: ficus hūide ⁊ ſicce: ſed nocēt eis vlceratis: ⁊ cuc/
carū albuſar: ⁊ lac camellaꝝ: ⁊ ouiū. Et ex potibꝰ vinū odo
riferū pauce ſtipticitatis puri vel mixti: ꝓut ſtomacꝰ ⁊ di/
ſcraſia regrit: ⁊ in hu. valde mollificāte ⁊ relaxāte vinum
paſſum. Et ex medicinis ſimplicibus ⁊ cōmixtis iterius ⁊
exteriꝰ approximatis: ⁊ ꝑ oēm modū ⁊c̄. Et ex appropatis
ſimplicibꝰ ſunt grana ſiſeleos ſumpta in q̄titate duoꝝ al/
muluſech cū rob decē diebꝰ cipeꝝ: bolū armenū: ſed cū la
cte ouino oꝫ vt ſumat̃. Et ex eis ſūt q̄ dicta ſunt ſupra ī cu
ra lapidis. Et ex ꝯpoſitis ſunt trociſci: alchechēgi: ⁊ oleum
de cheruia roſatū de maſtice: citonio: ⁊ alcāna. Et ex mūdi
ficātibus eos ſūt theodoricū mitridatū: anacardinū yera
aboali ⁊ oleū de ambra ad frigꝰ eoꝝ ad mollificationem
eoꝝ yera Galic. trifera de ſcoria ferri. ⁊ alie trifere.

¶ Capitulū nonum de diminutione ſeu paucitate vri
ne ablatione ⁊ priuatione ipſius.

D Iminutio vrine vel paucitas: ſeu priuatio eius ex
ꝑdictis ſunt note: ⁊ in ſpē cārum ꝯueniunt ſꝫ diffe
rūt īquāto eoꝝ quēadmodū ⁊ ipe. Eſt. n. cā eiꝰ aut
ex parte cibi ⁊ potꝰ: vt materie. aut ex parte corpis ⁊ vt effi
ciētis: aut ex parte extrinſecus aduenientiū. ⁊ cooperantiū
ex parte cibi. q᷑ ſit nāliter ſiccꝰ corporis hūiditates ⁊ exic/
cās. vt eſt panis mileacꝰ vel panicy: ⁊ furfuracꝰ ſorbitio
ex orobo ⁊ lēticula: ⁊ fructus pōtici nati ex ſe corporis hūi
ditates exiccātes vł accidētalr̄ velut carnes ſalite vel aly
cibi multū ſalis hn̄tes: panis biſcoctꝰ vel tēporalr̄ vt anti/
quus ⁊ opirus. Ex pte potꝰ. q᷑ ſit paucꝰ ⁊ groſſe aque vel vi
ni ſiłr. ⁊ talioꝝ ſiliuꝫ. Ex pte corpis aut totius: aut mēbroꝝ
operātiuꝫ ī vrinā. Ex parte corporis totius. q᷑ ſit raꝝ reſo
lubile vel multi ſudoris: vel lubricuꝫ ⁊ fluxibile vētris ad
quē humiditas corporis tēdens ⁊ fluens per eū in vys vri
ne deriuat̃. vnde hyp. vrina multa nocte facta modicū ſe
ceſſuꝫ ſignificat: ⁊ ecōuerſo: vel q᷑ ſit multi vomitꝰ. g era
dicādo a ſuperioribꝰ ⁊ ab īferioribꝰ retrahēdo: vt Abo. di
xit diminuere pōt vrinā vł q᷑ aliā ſimilē euonem manife/
ſtā patiat̃: vt fluxū ſanguinis nariū. ⁊ ſimilia. Ex parte mē
broꝝ operantiuꝫ in vrina: aut per modū generationis: vt
epis debilis nō ipellētis ad renes aquoſitatē quā genera/
uit: vnde remanet in venis cū ſanguine: nec trāſit in vrinā
aut per modū tractiōis ⁊ ſequeſtratiōis vt renū debilita/
toꝝ vt in ꝑcedēti caplo dictum eſt. Aut ex parte deferen/

tiũ ⁊ colligẽtiũ. vt vritidũ vel veſice. q2 ſint oppilati vel vlcerati ⁊ pforati: quare vrina lʒ plus trahaṫ cũ ad corp⁹ vacuũ tendit nõ extra vadit. Ex parte aũt extrinſecus accidẽtiuʒ puta aeris. q2 tp̃s vel aeris cõſtitutio fuerit ſicca in aquoſa vel borealis: q̃ corporis hũiditaes ⁊ ſuperfluitates exiccat lʒ per accñs. ſ. ſtringẽdo vẽtrẽ vrinã ꝓuocet ⁊ multiplicet: vt hypo. dixit: vel motus reſoluendo exiccans. vt inanitio fames ⁊ abſtinẽtia que exiccãt per accidẽs ſcõm Hal. ⁊ vigilie q̃ ſunt vehemẽtis mot⁹ ſil'es motui vt Abo. dixit. Et euaporãtes vt Hali. ait. ⁊ anime accidẽtia imoderata que corpus exiccãt vt Hali. i tegni deſcripſit que oẽs ſi debiles ſint minorãt vrinã ⁊ eã paucã reddũt ſi vero fortes auferũt eaʒ ⁊ priuãt. Signa earũ ſunt talia nã ſiqdeʒ ꝓceſſerint a cibo ⁊ potu ſunt manifeſta ex coꝝ aſſumptione ꝓmiſſa. ſi vͦ a cã in corpore toto: q2 ſit raꝝ ⁊ reſolubile duob⁹ declarabiṫ ſignis potiſſime. ſ. ſigno raritatis qḋ eſt piloſitas corpis ſicut hypo. docuit cũ dixit cutẽ rarã declarat pilus ⁊ ſigno reſolutõis ⁊ ẽ duplex: vnũ qḋ Hali. poſuit ⁊ eſt q2 i mł'ta ſumptiõe cũ ꝓuatiõe euacuatiõis ſenſibilis ⁊ egõis paucitate corp⁹ nõ ipinguaṫ: ſed remanet extenuatũ. ℂ Aliud eſt. q2 i laborib⁹ nõ ſubſiſtit: ſʒ cito deficͭ. Si vͦ q2 ſit fluxibile vel alias ſenſibiles eũones habuerit preceſſio illaꝝ. ⁊ relige ipaꝝ remanẽtes oñdũt: ſicut. H. dixit. Signa debilitatis ei⁹ in ſuo loco dicta perpẽdes caceſiam vel ẽt aſclitẽ. Sil'r ſi ex renũ debilitate ſigna d̃bilitatis eorum i ꝓcedẽti caplo dicta videb. Sil'r quoq3 ſi ex pte deferẽtiũ vritidũ ⁊ veſice: vel ẽt virge. q2 oppilenṫ ex ſignis dictis oppilatõis: ex humore vel lapide cognoſcere potes. Et ſtrãguria: ⁊ ẽt ſpaſmi: ac ẽt ex ſignis dictis in caplo ſolutionis vel vlceꝝ. ſi ſoluti fuerint vel vlcerati: quo ventris iflatio ex aquoſitate replẽte ↄfirmat: ⁊ ardor vrine. ℂ Cura dimiutõis vrine ⁊ ablatiõis ei⁹ ſũt tres res. ꝓma eſt regiminis ꝑmutatio. ſcḋa eſt eũonis retẽtio. tertia vrinalium mẽbroꝝ rectificatio ⁊ ↄfortatio. Permutatio regiminis eſt vt altereṫ ⁊ permuteṫ ſcõm quãtuʒ ⁊ quale de exiccatiuo qḋ eius erat cauſa ad hũectatiuũ in cibo ⁊ potu: ⁊ in alijs reb⁹ nõ naturalibus: de quo ẽt ſupra in cura meri ⁊ ſtõ diximus: ⁊ ẽt ipinguatiuum de quo deo dãte dicem⁹ ifra. hoc .n. regimẽ ꝓmã cãm: q̃ vt materia erat abſcidit: ⁊ ẽt tertiã extrinſecus ſubauſert alterat ⁊ emẽdat. ℂ Scḋa eſt eũonis retẽtio occulte ⁊ manifeſte: occulte ⁊ iſenſibilis retentio cõpletur cũ cibis ⁊ potibus humores inſpiſſantibus: ⁊ cum medicinis condẽſantibus poros: de quibus ſupra in ſincopis cura diximus. ⁊ hoc ſupra in cura doloris ⁊ flux⁹. Si vͦ ſenſibilis fuerit ⁊ per ſudorẽ cũ retinẽtibus ipʒ de qbus ibidẽ dixim⁹. Si vero lubricitas ventris fuerit ⁊ naturalis: q2 humiditas ⁊ mollicies in expulſione ſuperfluitatum nãlium conſuetarũ cum ſtipticis cibis vel potibus ꝓmiſſis notis ſupra corrigaṫ. Et cum fricatiõibus balneis ⁊ alijs diuertentibus ad epar ⁊ venas humiditates ⁊ trahentibus ad membra vrine: vt ſũt diuretica. Si vͦ fuerit lubricitas preter naturaʒ mediceṫ: ꝓut de ea ſuperius dictum eſt in cura fluxus ventris. Similiter ⁊ ſi multus vomitus adſit nec non ⁊ ſi fluxus ſanguinis narium curetur prout ſupra in ꝓprijs diximus locis. Et de alijs euacuationibus ſimiliter quoq3 intelligas. ℂ Tertia eſt mẽbrorum rectificatio ⁊ confortatio ⁊ epatis: prout ſupra in cura debilitatis epatis eſt dictum vel renum. ſicut in ꝓcedẽti capitulo habuiſti: vel etiam vritidũ: ⁊ veſice ⁊ cum diureticis vt ibidem eſt dictum: q̃ omnia in fortitudine ⁊ debilitate diuerſa eligenda ſunt ꝓut diminutio vrine ⁊ eius ablatio ⁊ eaꝝ cauſa variatur in quanto.

ℂ Capitulum decimum de diabete.

Diabetes ſm Halie. eſt ꝓpria paſſio renũ raro contingens in qua pot⁹ citius trahiṫ q̃3 opʒ ad eos. ſicut cibus in appetitu canio ⁊ cito egrediṫ cũ vrina. ſicut cibus ⁊ potus in liẽteria cũ egõne. Et cã eius ẽ ſupfluitas. ꝓmo deſideratiue. ſcḋo ↄtentiue ipſoꝝ defect⁹ niſi .n. forer ſupfluitas deſideratiue ipſoꝝ: non ſic velociter traherẽṫ niſi quoq3 deficeret ↄtentiua ipſoꝝ: nõ ſic cito egrederẽṫ. Supfluitatis deſideratiue ipſoꝝ ⁊ attractiue v̄tutis cã eſt ipſoꝝ cal'as vehemẽs cũ m̃ã vel pura magis q̃3 ſunt vltra debitũ in cõtinua tractiõe ⁊ forti a venis emulgentib⁹ ⁊ de eis ad epar extendiṫ: ⁊ de epate ad ſtõm: ⁊ ad oĩa mẽbra. vñ hũiditas ipſoꝝ irrorans ea attrahiṫ ⁊ excitaṫ. ⁊ ſeqͥṫ ſitis vehemẽs q̃ potu nõ ſedaṫ. q2 in ea nõ remanet: q̃re ſiticuloſa ab aliqbus appellaṫ. Defectio ↄtentiue nõ eſt in eis ꝓncipalis ꝑꝑ cõplexiõis malitiã calide q̃ ẽ cã ſupfluitatis attractiue qua nõ d̃ficit ↄtentiua: ſʒ friditate ꝓpe ⁊ hũiditate. ſed plurimũ accidẽtalis ſm. H. ⁊ ↄñs ſuperfluitati attractiue. cũ .n. ſupfluit coꝝ attractia vrĩe pl's trahiṫ q̃3 renes aliquãdiu ↄtiere poſſint ⁊ ipa veſica: q̃r deficiẽte ↄtentiua ipſoꝝ cito ꝓfluit inalteratus per vritides ad veſicã: ⁊ inaleſcente expulſiua ei⁹ egrediṫ cũ vrĩa ſicͭ in liẽteria cibus ⁊ pot⁹ cũ egõne. Et aliqñ eſt ꝓncipal'r ⁊ eſſentialis in ea vt dicit Abo. ꝑꝑ malitiaʒ cõplexiõis pure frigide vel ipure ab ĩtra vel exteri⁹ veniẽtis quã ſequiṫ ſuperfluitas attractiue ipoꝝ nõ eẽntialiter ꝑꝑ ↄrietatem ↄplonis in cãndo. ſʒ accñtal'r ⁊ ex ↄñti. cũ .n. in renib⁹ vrina nõ figiṫ tracta nãliter renes ex ſãguĩe cũ aquoſitate veniẽte nutriri nõ pñt: q̃r remanẽtes ianiti auidi⁹ trahũt: ⁊ ex tũc magis ↄtentiua coꝝ deficit ⁊ q̃to plus deficit magis trahũt: ſicͭ eſt deuenire ad circuitionẽ quẽadmodũ in liẽteria eſt videre. Cã vͦ ipſius caliditatis renũ duplex eſt. ſ. iterior ⁊ exterior vt in lapide eſt dcm̃. ⁊ ſil'r frigiditatis cãs per ↄriũ cõprehẽdas. ℂ Signũ ſi qḋ ſit ex caliditate faciente ſupfluere attractiuũ ſenſus erit ⁊ iuẽtio caliditatis in lũbis ⁊ vrina multa ⁊ in ꝓncipio. ſicͭ lotura carnis recẽtis ſm. H. min⁹ tñ tĩcta ⁊ rubea q̃3 ſi ꝓcedat ex defectiõe diſcratiue ẽpis ⁊ ꝓprie cũ amplitudo meatuũ emulgẽtis vene i ea iuenta fuerit ⁊ ſanguis abũdãtia in venis que q̃to maiora ſunt tanto plus ſanguĩs cũ aquoſitate trãſibit ad renes. Unde vrina ex defectiõe cõtentiue v̄tutis ꝓfluens pl's rubebit. ꝓcedẽte vͦ tẽpore diminuto ſanguĩe ex venis ⁊ ꝓinde reſtrictis mẽbroꝝ meatib⁹ ⁊ exiccatis vrina egrediṫ in q̃litate ſeu colore potus: q2 aqua ſubtilis ⁊ alba. ſi aq̃ ſola bibaṫ q̃ magis deſideraṫ i ea: vel ſit ali⁹ pot⁹ vl' vini ſimplicis vel cocti vel aque cõmixte: vel ẽt ſirupus. Et forte erit alba ⁊ ſpiſſa ꝑꝑ hũiditatẽ mẽbroꝝ vltima extractiõe. vnde vrina reddiṫ ſicͭ lac. ⁊ ꝓinde mẽbroꝝ cõſumptio ſequitur ⁊ mors plurimũ. Si vero ex frigiditate faciẽte deficere cõtentiuã cauſeṫ ſenſus ⁊ iuentio frigoris erit in lũbis ⁊ vrina erit in ꝓncipio: nõ multitudis magne: ſʒ cõſuete: deĩde multiplicaṫ ⁊ erit ſicut lotura carnis: min⁹ tñ tincta q̃3 in ꝓcedenti in qua fortitudo attractiue ꝓceſſit. in ꝓceſſu vero tẽporis ſociata fortitudine attractiue mutabitur ſicut ꝓma. ℂ Cura dyabetis in generali ⁊ ſpeciali eſt quatuor res. ꝓma eſt oĩs cauſe ablatio ⁊ exteri⁹ ꝓueniẽtis ⁊ iterius exiſtẽtis. Interius vt ſiqdẽ ex caliditate renũ ꝓceſſerit fiet ſubtractio ſubtiliũ ⁊ calidoꝝ ciboꝝ ⁊ potuũ ⁊ diureticoꝝ calidoꝝ ⁊ taliũ ꝓueniẽtium. Exteri⁹ vt labor corporis ⁊ ꝓprie renũ ſtricture lumboꝝ: balneatio in calida aqua actu vel potẽtia: mora i ſole: decubitus ſup renes ⁊ ſõnus ꝓfundus: ⁊ vnctiões calide ⁊ emplaſtroꝝ ⁊ aliorũ talium: q̃ renes habeant calefacere epar humores ⁊ membra: ⁊ añcedẽtis ſiue fuerit hũoralis cũ flomia: ſiue fuerit ſanguis cum cliſteri farmacia appropriata leui. Si aũt humor calidus ſit. i. vomitu g in euacuando eſt potiſſimus: quoniam euacuat deriuando ab eis ſiue ſit complexionalis: quia oppilatio ſit in eis cum aperitiuis ſuperius notis: nec nõ ⁊ cauſe cõiuncte que eſt renum diſcraſia calida. Alteretur ergo. ſicut enim talis diſcraſia egritudo vlterius

augmentata quã talis ſequiť paſſio vt ſuperi⁹ dictuꝫ eſt: ⁊
ea mediãte orta alia concomittanť ſinthomata vt ſitis ⁊
ↄſumptio corporis: de quoꝝ correctiõe ĩfra diceť. Jngt.n.
H. palaꝫ eſt morbũ eſſe cãm oĩuꝫ accidentiũ: accidentia
tamẽ alia ſequunť: ſcõaꝫ.n. ſeqtur pmũ: ⁊ tertiũ ſecundũ.
Complebitur vero eius alteratio cum frigidis que non
tm̃ illã alterẽt: ſꝫ ẽt epis ⁊ mẽbroꝝ ↄplõnẽ ↄtẽperẽt ⁊ hũo
res adequẽt: epar.n. ⁊ corpis mẽbra ſi calida ſint eoꝝ calĩ
tate vſqꝫ ad renes extẽſa eoꝝ diſcraſiã ĩtẽdũt: hũores acu
tos ẽt gignũt q̇ vrinã acuũt. vt ipa traſeũdo ad renes eoꝝ
calĩtatẽ iſlãmet. ſi ergo debẽt eẽ talia frã vehemẽter: ⁊ il
la ppe q̃ nõ puocẽt: nec iſtis admixta: ſꝫ leniãt: ita ꝙ ſoluẽ
do nõ puocẽt: ſꝫ miorẽt vrinã. q̃lia ſũt. Ex olerib⁹: lactuca:
ſpinachia: atriplices. ⁊ ſilia. ⁊ ex fructibus iuiube: ſeueſten:
pruna: criſomila: pſica: cucumeres citruli: ⁊ melõcs: cucur
bite: ⁊ ppe carnes ipaꝝ nõ ſcia. q̄ aquoſitatẽ ⁊ vrinã mľti
plicant. ⁊ fruct⁹ more mature ⁊ granata acetoſa: ⁊ muça: ⁊
ex aqs aq̃ vehemẽtis frigoris: ⁊ aq̃ cucurbite: ⁊ aq̃ ordei:
cũ decoctiõe iuiubaꝝ: ⁊ lac acetoſuꝫ a quo extractũ ẽ buti
rũ: ⁊ meli⁹ ẽ ex eo qḋ ẽ ſpiſſius ⁊ groſſius: ⁊ ouũ: ⁊ aq̃ lactis
bouini ſubtracto butiro. Et ex medicinis ſimplicib⁹ ẽ ad
hãc ĩtẽtionẽ mucilago pſilij: ⁊ ſucc⁹ roſaꝝ ⁊ maloꝝ. Et ex
approp̃atis ĩ phibẽdo vrinã ẽ merdaſengi bibitũ: ⁊ ſcorie
ferri ẽ optima vel piectũ ĩ aq̃ eris. qḋ miorat: ⁊ alia q̃ ĩ cu
ra mľtitudinis ei⁹ diceñ. Et exteri⁹ approximãdũ ẽ ſede
re ĩ ſemirupro aq̃ frã pleno: ⁊ renes: ⁊ epar vngere: epitima
re ⁊ emplãre ex frĩs dictis: ⁊ ſuccis: ⁊ eoꝝ oleis: ⁊ ppe ḋ olo
alchecbẽgi: ⁊ ſcorpiõib⁹ de cucurbita: ḋ ſcĩe melonis ſi dila
tatio ductuũ nõ exiſtat in ea donec eoꝝ calĩtas extiguať
⁊ ſitis. Et ex medicis ↄpoſitis ſũt trociſci ḋ cãphora: ḋ ſpo
dio: ḋ balauſtia cũ aqua cucurbite: vľ mucilagine pſilij: vľ
dragãti vľ citruli: prunoꝝ ⁊ ſebeſten: vt leniãt nõ cõſtipãt.
plĩmũ.n. cũ ↄſtipatiõe vẽtris ſũt tales. Et exteri⁹ approxi
mãda ſũt ea ĩ gb⁹ cũ ĩfrigidatiõe ẽ ſtipticitas q̃ ductuũ di
latationẽ ⁊ emplãtionẽ coãguſtẽt: ⁊ retẽtiuã renũ ↄfortẽt:
ſicť emplãtũ ḋ hypoquſtidos: ḋ capolis vitis: vga pa. ⁊ balau
ſtie: ſe. papaueris albi: lactucaꝝ: ſcariolaꝝ: portulacaruꝫ: ⁊
ſpodio ribes cũ aqua agreſte vel myrte: ⁊ ſimiliũ. Et ſicť ce
rotũ nrꝫ. H. ⁊ oleũ de citonijs: ḋ çarur: de balauſtijs: ⁊ ſilia.
Sꝫ ſi ex friditate renũ ↄtigat paſſio taľ: q̃ p tãto nõ euãť
a ſiti ⁊ mẽbroꝝ ↄſũptiõe: lꝫ ſit mior paſſio queãdmõꝫ paſ
ſio mior ẽ: cura ei⁹ ĩ eiſdẽ reb⁹ ↄſiſtet: ⁊ ↄplebiť cuꝫ p̃dictis
ecõtrario ſũptis: ⁊ q̃ renes ⁊ totũ corp⁹ calefacere habeãt
nõ ĩfridare. Et ex calefaciẽtib⁹ ↄueniẽtib⁹ illi ẽ fricatio ex
tremitatũ ⁊ toti⁹ corpis cũ rubrificãtib⁹ mot⁹ vẽtoſatio ⁊
balneuꝫ: ⁊ ſũptio antidoti calĩ. ꝙ groſſe ſbe ſit vt ñ cito pe
netret ſicť ſyrup⁹: ⁊ alia ligda: q̃le ẽ dyacalamẽtũ: dyatrion
tiriaca ãtiq̃ ⁊ mitridatũ: ⁊ vĩa groſſa vľ ſtiptica: vt calabrẽ
ſia. Sicqꝫ ergo cãis ablatꝫ ⁊ abſciſis carebit paſſio taľ. ſ. ve
lox exit⁹ pot⁹. ⸿ Scõa res ẽ vrĩe diutio ⁊ retardatio: ⁊ ex
his q̃ maxie retinẽt ipaꝫ ac retardãt ab exitu ⁊ miuũt vri
nã ẽ vt nõ tm̃ poſt ipa trahẽtia deriuãtia miniſtreñ q̃lia
ſunt q̃ pmiſſa fuerũt: ſed ẽt q̃ cũ retentõe ⁊ deriuatõe eua
cuant ipam vt eſt vomit⁹ p̃dictus ⁊ ſudoris puocatio cuꝫ
frĩs appropatis in cã calã: vt aq̃ ordei ⁊ melonis. Jndiget
vnctõe cutis corporis ⁊ ppe ſpine cũ tẽperatis vt oleo ca
momillino anetino vel vino albo cũ aqua calã. Et in frã
cũ calidis vt eſt pot⁹ calide aq̃ ⁊ ppe apij aniſi calamenti
vel piretri ⁊ vnctiõe corporis cutis: ⁊ ppe ſpine cũ aſaro ⁊
oleo ḋ ſpica vľ ciclaie cũ melle. ⸿ Tertia res eſt regimẽ:
⁊ eſt ↄſeruatio corporis in aere frõ ſtiptico cũ qete ⁊ ſõno
tẽperato ⁊ cibis frigidis ⁊ groſſis plĩmis difficilis iſlãma
tionis ↄuerſiõis in colerã ⁊ aduſtionẽ: gñantibus hũores
groſſos ⁊ ſpiſſos quales ſunt ſorbitões de chiſt ordei de cã
daruſio ſeu cõdro cũ lacte acre vel lentiũ vel carnis boui
ne ⁊ pedes ipſoꝝ ⁊ piſces recẽtes magni cũ aceto: qm̃ ſitiꝫ
mitigat ventrẽ ſoluit. ⁊ ſic vrinã minuit: ⁊ lac ouiũ coctuꝫ
cũ aqua dõec cõſumať: ⁊ aliqua alia q̃ ſupra in dolore ſtõi
diximus: gbus p̃mittẽda ſunt leniẽtia ne groſſicie ſua ↄſti
pent: vt pruna pſica ⁊ pprie dactili pigues ⁊ paſſule q̃ leni
endo vrinã minorãt ⁊ poſt ponẽda ſunt ſtiptica ſeu ponti
ca q̃ cõprimẽdo leniant vt fruct⁹ ſtiptici ſicť pira: ribes ⁊ ci
tonia nõ p̃mittẽda: ne cõſtipãdo puocet vrinaꝫ ⁊ miſcẽda
ſunt vnctuoſa lubricũ faciẽtia: vt piguedies galline ⁊ por
ci capre ⁊ hui⁹: ⁊ cũ potib⁹ vini acerbi cũ multa frẽ aq̃ per
mixtione ſi aquã ſolã nõ tolleret: vel alic⁹ ex robub. ſtipti
cis vt granatoꝝ ribes de citonijs vel macianis: ⁊ ſilia cũ
cliſteribus leniẽtib⁹ feces: quas hñt plĩmũ conſtipatas ⁊
cũ letitia aĩe ⁊ pmiſſione ſalutis cuꝫ auxilio ſpũ oĩpotẽtis
ḋi: q̇ ſolus ſanat lãguores. ⸿ Quarta res ẽ accidẽtiũ ſeq̃n
tium paſſionẽ talem correctio: vt ſitis ⁊ mẽbroꝝ cõſũptio
q̃ multũ ⁊ velocẽ vrine exitũ hui⁹ paſſionis ſequunť. Ob
uiandũ ergo eſt p̃mo ſiti cũ potu cõſueto maiori pp illud
qḋ ex membroꝝ hũitatib⁹ ↄſumiť calĩtate ⁊ ſiccitate tra
hente ⁊ in cã calã ex aliqua p̃dictaꝝ aquarũ ⁊ pprie frigi
da pura quã deſiderat q̃ tranſire morať vt hyp. dixit. vel
permixta cũ aceto qḋ radẽdo ĩteſtina nãm ſoluit: ⁊ cũ ali
quo ex rob ſtipticis qḋ ipam retinet ne cito traſeat ad vri
nam. Obuiandũ ẽt eſt vlceratiõi ipoꝝ mẽbrorum. ſ. renũ
epatis ſtõi: ⁊ reliquoꝝ. Et in cã frigida cũ potibus vini pu
ri groſſi ⁊ alijs calefaciẽtibus mẽbra p̃dicta q̃ ſunt nota.
Membrorum aũt cõſumptiõi obuiamus: deide cũ cibis
laudabilis nutrimẽti ⁊ facilis digõnis ⁊ potib⁹ vini rubei
limphati ↄpetẽter cũ oĩ regimĩe reſumptiuo. ſicť. H. docet.
Et ex his q̃ ſunt laudabilia ⁊ experta cõferẽtia tali paſſio
ni. ⁊ alijs ſtantibus accidentib⁹ eſt vt ſumat patiẽs ex aq̃
frigida in ea q̃ ex caliditate eſt ⁊ in ea q̃ ex frigiditate ẽ vi
num multũ ⁊ poſt horã euomat: vt ex quo extinxit mem
brorum iſlãmationẽ retrahať ad ſtõm ⁊ educať vomitu
ne trãſeat in vrinã: aggregat.n. in ſe v̇tutẽ digerendi ⁊ eua
cuãdi cãm calãm. ſi qua ſit ⁊ cãis extriſecis reſiſtẽdi alte
rando diſcraſiã renum epis ⁊ mẽbroꝝ ⁊ cõtẽperandi hu
morẽ nec nõ mitigãdi ſitim minuẽdi vrine multitudineꝫ:
⁊ phibẽdi ẽt diſſolõnẽ mẽbroꝝ. ⸿ Aboa. p̃cipit trociſcos
ad dyabeten ex caliditate cũ dilatatõe meatuũ renũ ⁊ ve
ne emulgẽtis. ℞. ſpodij terre ſigillate cancroꝝ fluuialiuꝫ
cõbuſtoꝝ. añ. pteꝫ. i. lactis: partẽ tertiã ſe. papaueris. ⁊ ſe.
lactuce. ana. partẽ. i. ſ. ⁊ aggregenť oĩa cũ mucillagine pſi
lij ⁊ ĩformenť trociſci. ⁊ doſis eoꝝ ſit. ſicut videť tibi.
⸿ Cerotum ex ĩuentõe nrã: quo vnguntť renes ⁊ epar ei⁹
q̇ dyabeticã paſſionẽ patiť a caliditate. ℞. vtriuſqꝫ ſanda
li ſpodij. ana. ʒ. ij. ſeminũ frigidoꝝ. añ. ʒ. i. camphore. ʒ. i. la
ctis mulieris lactãtis puellã. ʒ. ij. ſucci ſemperuiue ſucci ſo
latri. añ. ℥. i. aceti. ℥. i. olei de cucurbita ⁊ olei roſati: qḋ ſuf
ficit vnganť ex eo p̃dicta mẽbra cũ inouatione ſepiſſima:
⁊ qñqꝫ ſit per modũ emplĩ cũ eoꝝ ſuba. Et qñqꝫ p modũ
infuſionis ⁊ epithimatis vt facilius penetrẽt per tantos
lacertos ⁊ oſſa ĩtermedios vſqꝫ ad renes. ⁊ ſic eſt finis hu
ius capituli.

⸿ Capitulum. xi. de fetore vrine.

f Etor vrine eſt mala qualitas ipſi⁹ mutata in ſenſu
odoratus: ⁊ eſt vt odor eius ſit debito horribili
or ⁊ que nõ eſt ad ĩprimendum ſm̃ Gali. ſicut alia
duo ſinthomatuꝫ genera vt curã conuertat ad ſe ⁊ medi
cum cogat deſiſtere a cura diſpõnis ⁊ cãe ſue ſicut illa tã
q̃ illam p̃cipuam ſanationem habens: ceſſans ſimul cum
facilitate diſpoſitõis. Sed eſt potius ad ſignificãdũ ſignũ
exiſtens diſpoſitionis vel cauſe quã oportꝫ curare eo mo
do ſicut Abo. dixit cum inquit. Cumqꝫ aũt vrina odorem
hꝫ fetidũ: ⁊ maturatio in ea fuerit erit ipſi⁹ cã ſcabies aut
vlcera in iſtris vrine que ſuis cognoſcunť ſignis. ſ. dolore
percepto in eis: vt in affo. docuit hyp. ꝙ ſi maturatio in ea

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0370-4

non fuerit: poſſibile eſt ꝙ ſit ex hoc ⁊ poſſibile eſt ꝙ ſit ex putrefactione in ſuperioribus mēbris cūq; hic in febrib⁹ fuerit acutis ⁊ cā mēbrorū vrine non fuerit ſignū malū. Cumq; vrina fetidi odoris in ſanis pſeuerat ſignificat febres q̄ ex putrefactōe accidūt aut minorationē putrefactiōis q̄ in ipſis eſt retēta: ⁊ hoc qdē demōſtrabit ſi ilico alleuiationē hūerit. Ex qbus colligit̄ ei⁹ cā ⁊ ſignum. Et.n. cā a qua pcedit duplex: aut īterior corporea aut exterior icorporea. Interior eſt hūor corrupt⁹ aut putrefact⁹ aut ī venis: vt accidit in febrib⁹ febre putrida aut in mēbris corruptis corruptiōe fetēte: aut q2 ſit ex toto gñe pter nāā vt in cadauerib⁹ mortuorꝝ: aut nō toto: ſed ptim: vt in apatibus ⁊ vlcerib⁹: qđ eſt plurimū in hoīe viuēte. ⁊ hoc aut in ſupiorib⁹ mēbris vel ſpūalib⁹ vel in vlceribus pectoris ⁊ pulmōis aut nutritiuis vt epis vlcerib⁹ aut in īferioribus vt in ipis vrine mēbris. Exterior ⁊ in corporea eſt cibus ⁊ ſparagus q ſumptus ⁊ comeſt⁹ facit fetere vrinā. ⁊ ſilia vt attonalia. Et ſigna cāꝝ ex pdictis ſūt māifeſta. Et īterior eſt maioris fetoris. ¶ Et cura ei⁹ eſt due res. Prima ē ablatio cāe exterioris: ⁊ abſciſio iterioris q̄ ex pdictis ſupra ⁊ dicēdis in cura febriū putridarū eſt māifeſta. Scđa eſt aromaticorꝝ admīſtratio q̄ ex diureticis ſic̄ eſt ſpica galāga galia muſcata cinamomū ⁊ cōſimilia ſcitur.

¶ Ca. xv. de diſſuria ⁊ īuolūtario exitu vrīe ⁊ diſtillatōe.

Diſſuria ⁊ diſtillatio vrine eſt flux⁹ ſeu īuolūtari⁹ exitus vrīe cū ipotētia ɔtinēdi. ⁊ ī hoc ɔueniūt in gñe: ſ3 dn̄t in cura. ⁊ ēt mō. In cura qdē dn̄t nō ī eius ſpē. ſed in q̄tō: vtriq; n. īmediata cā eſt de facto cōtētiue virtutis in veſica q̄ in diſſuria maior eſt q̄3 in diſtillatione vrine. In diſſuria. n. vt dictū eſt: ē ablatio cōtentiue. S3 diminutio ei⁹ in diſtillatōe: l3 q̄nq; poſſit ei⁹ cā eē debilitas expulſiue: vt in ſeq̄nti caplo patebit: ſ3 illud ē in pprie. ⁊ ex ɔ̄ñti ex dbilitate. n. expulſiue puenit difficultas vrinādi quā ſeq̄t diſtillatio: vt. ſ. eodē caplo dicet̄. S3 ex debilitate ɔtentiue v̄tutis diſtillatio pprie ⁊ imediate pcedit: vt ſupra caplo gñali dcm̄ eſt. ⁊ ſic ipſe nō dn̄t in ſpē cāe: ſed in q̄titate tm̄. In mō v̄o dn̄t: nā flux⁹ vrine ī diſſuria eſt multus ⁊ ſubit⁹. In diſtillatōe aūt eſt paulatin⁹ ⁊ paucus ad diſtillatōis aq̄ modū. Et q2 in cā ɔueniūt: ⁊ ſpē ɔueniēt in ſignis ⁊ cura in qb⁹ dn̄t ſolū in q̄tō. pinde ſil̄ de eis vnū caplm faciem⁹. Et cā mediata q̄ ɔtentiua deficit in veſica eſt aut īterior corporea aut exterior incorporea. Interior ⁊ corporea aut eſt in mēbro ɔtinēte qđ ē collum veſice aut in ɔtento cū lacerto ei⁹: aut q2 leſio ſit ī co: q2 deficit ɔtentiua ipi⁹: ⁊ tūc aut leſio in collo ⁊ ei⁹ lacerto eſt pncipalis in ſe: q2 ſit mollificās ex humore currēte ad ipm vel ei⁹ cōpreſſus neru⁹. ſic̄ in diſlocatōe ſpōdiliū ɔtingit aut pp cōitatē ad pncipiū. ſ. cerebꝝ vel nuccā apata vl̄ pcuſſa ⁊ ſoluta aut vicina mēbra aut. ſ. concauū ipi⁹: vt q2 ſunt in ɔcauo ei⁹ vlcera: tūc. n. adueniēte vria ad ipa3 ſentit ardorē ⁊ ſtringit. ⁊ ſic̄ vrina expmit̄ ⁊ mollificato lacerto colli pp obedientiā motiue x⁹ organū ad ſenſibilez extra īuoluntarie fluit. Sic̄ ex vlcerib⁹ cōcaui gñat̄ diſſuria ſeu diſtillatio queadmodū ex vlcerib⁹ colli ſtrāguria procreat̄ vt ifra patebit ſequēti caplo cū ad matricē cū repleta eſt fetu magno: q̄ſi cōprimit veſicā vt expellat̄ vrina3 pter volūtatē ⁊ faciat deficere ɔtentiuā: ſic in pgnātib⁹ ſepe cōtingit ⁊ vidim⁹ multas coq̄rentes. Aut ad iteſtia repleta fecib⁹ aut ad ipſa apata pectine3 ⁊ anū ⁊ alia mēbra adiacentia ipi. ⁊ ea ſil̄i mō cōprimētes. S3 recte cōtenti ī ipſo mēbro. ſ. veſica vt vrine recte aut q̄titatis: ⁊ multitudis eius. ſic̄ ɔtingebat ī dyabate in q̄ defectio ɔtētiue veſice nō erat ex ſe: ſ3 ex multitudie vrine pp fortitudinem attractiue renū: aut erit q̄litatis ⁊ acuitatis ipi⁹ moleſtantis expulſiuā. ſic̄. n. multa grauedo fac̄ pncipal̄r deficere ɔtentiuā. vn̄ ex ɔ̄ñti ſupfluit expulſiua. ſic̄ acuta moleſtādo expulſiuā icitat: vt ex ɔ̄ñti faciat deficere ɔtentiuā cedente ſibi: vt ſupra in iteſtis: ⁊ ſtō dcm̄ eſt. Cā vero exterior eſt vt f̄ritas: maxīe ⁊ hūiditas exteri⁹ ɔtingēs mēbra vrine vt aer frigidus ⁊ balneatio īfrigida aq̄ caſus ⁊ percuſſio ⁊ ſilia: q̄ qdem cāe ſi fortes ſint diſſuriā generabūt. ſi debiles diſtillationē vrine. Quaꝝ ſigna ex pdictis ſunt nota. ⁊ ēt ſigna cārum īteriorꝝ q̄ eſt alicui⁹ caꝝ pceſſio vel īuentio cū aliaꝝ puatiōe exterioris vero ſūt manifeſte.

¶ Cura ei⁹ ſūt due res. Prima eſt abſciſio cāe īterioris: ⁊ ablatio exterioris ſi adſit. Scđa eſt mēbri ɔfortatio. Cāe īterioris debilitatē ī ɔtētiua īprimētis ɔplēt abſciſionem medicaīa vnicuiq; cāꝝ ɔueniētia: vt. ſ. ſiqdē cā ſit mollificatio nerui ⁊ lacerti: ⁊ ppa ɔplebūt illā medicie ſupi⁹ bite. Si v̄o ex cōitate diſlocationē ſpōdiliū cōplet ipſorꝝ reductio ſi poſſi ſit. Si ex cōitate ad pncipiū curatio cauſe erit ablatio: ſil̄r ſi ex vicinorꝝ: puta diſpōne: qm̄ illorꝝ rectificatio cāe erit abſciſio: q̄ oīa ex dictis ⁊ dōis ſūt manifeſta. Si quoq; ex ml̄titudine vrie ſit cū medicis dyabetis ɔplebit̄ cura ipi⁹. ſi ēt ī acuitate ɔſiſtāt vrie medicie ardoris erūt explectiue. Et ex pprys ē mucilago pſily cū cāphora ſumpta ɔtinue ſm̄ Joānē ſerapionē. Ablationē v̄o cāe exteriores ɔplēt ſi adſit ipaꝝ mutatio. In ɔ̄riū aūt op3 vt pcedāt curationē īterioris abſciſiōis: tāq; illō ſine quo n̄ val3 illi⁹ abſciſio fieri. eo ꝙ ei⁹ cā exiſtit efficiēs ⁊ ɔſeruās. Et ſi qdē remāſerit īpſſio. q2 mala ɔplo cū tinis: ⁊ ex cal̄is vnctionib⁹ tiriaca curet̄: vl̄ q2 fuerit caſus aut pcuſſio medicias caſus ⁊ pcuſſiōis pcedere o3 d qb⁹ īfra dicet̄: deīde ad mēbri correctionē ɔuenire. Cōfortationē v̄o ɔplet miſtratio mediciaꝝ hn̄tiū ɔfortare neruos mollificatos: ⁊ ppe īferiorē ptiū ⁊ veſice a ppetate retinere vrinā. ⁊ ſūt q̄ dcē ſūt ī cura paraliſis ſimplices ⁊ ɔpoſite. Et ex ſimplicib⁹ appropatis veſice ⁊ collo ei⁹ ī hoc caſu ſūt cal̄e: ſicce: ſtiptice: ⁊ plimū ex eo ꝙ plimū ex cā frida ⁊ hūida tal̄ mollificatio lacerti ī ſe puenit: ⁊ ſūt ciperꝝ ſandaracca: ⁊ th⁹ maſculu3: ⁊ cortex ei⁹: myrra: ſtorax ſicca: piretꝝ: ⁊ enula ſicca: alcāna: mahaleb: ⁊ albaſce: ſe. vrtice: aſſaꝝ: mac̄. anacard⁹: nux muſ. ciminū: origanū: cinamomū: pōticū: galle cipſſi: ſtica. ara. acorus: ⁊ ſilia aſſata ne puocēt: ſ3 ſtipticādo ɔfortēt ⁊ retineāt ɔfortādo. Sūt aūt cū melle cōfecta cocta ⁊ ſūpta: vl̄ cū melle emblicorꝝ. vl̄ mel̄icrato bibita: qđ fit ex vino pōtico factū. Et ex ɔpoſitis ē tiriaca ⁊ mitridatum cōfectio anacardi: trifera maior: ⁊ trifera minor ɔfortata cum anacardo: vel ſagenea mixta aliquibus ſtipticantibus ⁊ ponticis: vt granis myrti. ⁊ copulis glandium: balauſtys: ⁊ ſimilibus. Et experte ſunt pillule de albaſce: piretro. ⁊ dyaciminum quando eius ſemina valde terruntur ſumptum ⁊ inunctum eſt iuuatiuum frigori membrorum vrinalium: ⁊ retinet īuolūtariu3 exitū. Et cū diſtillatio ex ī potētia ⁊ defectu expulſiue pcedit miniſtrāda ſunt puocātia cū ɔfortatione ⁊ pauca ſtipticitate: q̄lia ſunt que infra dicent̄. Et exterius inungēdis in hoc caſu eſt oleū de alcānā de maſtice: de thure ⁊ de cheruа: ⁊ ſilia olea vt coſtinū nardinū: rutaceū de ſticados: de reubarbaro diſſu[...]is ī eis muſco: caſtoreo: vl̄ euforbio. ⁊ ol3 d beē ē fortaſſe valđ bonū. In ea v̄o q̄ ex hūiditate cum caliditate ē: l3 raro cōueniētes medicine in ɔfortando ſūt ſtiptice ⁊ frigide ſimplices ⁊ cōpoſite. Simplices v̄o vt coriandrū ſiccū roſa ⁊ fructus ſtipites eius ſemē portulace pprie grana mirabolanorꝝ coralli camphora bolum ar. ſint aūt ſumpta cū ӡuccaro: vel bibita cum aqua granatorꝝ ſumac citoniorum ⁊ aliorꝝ fructuum ponticorꝝ mixto aliquo diuretico calido. Et ɔpoſita ſunt que ex his que cōponūtur ⁊ infra dicent̄. Et ex vngētis exteri⁹ ē oleū roſ. ⁊ ppe onfacinū mirtinu3 d balauſtys: ⁊ ſilia. Medicie appropate ī reſtrigēdo ⁊ retinēdo vrinā ſūt ӡarur aq̄ aluminoſe. ⁊ aq̄ fride oēs merdaſegni ſi bibat̄: vl̄ pyciat̄ ī aq̄ q̄ bibit̄ retinet vrinā. Fungi

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0371-0

faciũt poſſidere difficultatẽ vrĩe. Uſus comeſtiõis carniũ
ericij fac̃ vt vrĩa cũ difficultate egrediaꝛ̃. Et qꝛ aſſuete vti
tur enula: nõ ĩdigebit vt mingat oĩ hora. Cortex ſcerbĩ bi
bita ↄſtringit vrinã ⁊ ſcoria ferri: ẽ vltima ĩ retinẽdo. Mu
nia mixta cũ farina: ⁊ ſuppoſita vel diſſoluta ĩ ſambucino
⁊ diſtillata ĩ virgã ↄfert paucitati tollerãtie vrĩe lutũ ar.
bibitũ ĩ ouo retinet vrinã. Et oĩa põtica de ſe ſũt cõia diu
reticis cũ ſanguinẽ ĩgroſſent ſicut lẽtes. ⁊ lꝫ p̱ accñs ↄtra/
riũ opanꝛ̃. qꝛ ꝓuocãt reſtrĩgẽdo. illõ tñ p̱ eoꝝ poſt poſitio
nẽ cibo: vl' p̃miſſionẽ alteri⁹ lenitiui tolliꝛ̃ vt ſupra ĩ dyabe
te ẽ dcm̃. Jngt p̃nceps Abo. oĩs q̇ ↄ̃fic̃ ĩ tollerãtia vrĩe iu/
uaꝛ̃ a medicis ↄ̃ſideriũ coeũdi ꝓuocantib⁹ q̃ dicenꝛ̃ ĩfra.

⸿ Cõfectio medicaminis expti ẜꝫ Abo. ĩ fra. ℞. mirob. ke
bu. torrefactoꝝ multuꝫ ſandarache: mirre: olibanis: cipi:
añ. ptes. iij. gariof. ptẽ. ʒ. enule aduſte: granorũ macalebꝛ.
añ. ptes. ij. Cõficiaꝛ̃ cũ melle emblicoꝝ: ⁊ reſ ruẽꝛ̃ ⁊ bibaꝛ̃
doſ. ʒ. ij. ⸿ Aliõ ad fridã. ℞ caſtorei: myrre albaſce: copu
laꝝ: glãdiũ: piretri: añ. ptes eq̃les. Cõficianꝛ̃ cũ aq̃ myrte
b̃ũide: ⁊ ſit doſis. ʒ. i. ⸿ Cõfectio medicamis ad calaꝫ. ℞.
coriãdri ſicci. roſaꝝ ru. añ. ʒ. ij. ſpodij. ʒ. x. ſeĩs lactuce: por/
tulace: añ. ʒ. xv. boli armeni. ʒ. v. cãphore. ʒ. ʒ. gũmi põd⁹. ʒ.
ij. cõficianꝛ̃ cũ aq̃ granati acetoſi. ⸿ Aliõ. ℞. charabe: bo
li ar. mirabolanoꝝ nigroꝝ. medul' glãdiũ: ⁊ lẽtiũ excorti/
cataꝝ. añ. ʒ. ij. coriãdri torrefacti ĩ aceto poſiti. ʒ. i. doſ. ʒ. i.
⁊ oĩa poſt p̃miſſionẽ lenificãtiũ alicui⁹ miniſtrenꝛ̃.

⸿ Aliõ Jo. ſerapiõis ↄferẽs iuuamẽtũ manifeſtũ. ℞. gra
noꝝ myrti: glãdiũ: corticũ: thuris. cimine: carmemi: ⁊ cipi:
añ. ptes eq̃les teranꝛ̃ ⁊ ſit doſ. ʒ. iij. cũ vĩo ãtiquo. ⸿ Aliõ
℞. extremitatũ mirti ſiccis: alumĩs folioꝝ alcãne: thuris:
mirre balauſtie: glãdiũ: añ. ptes. i. Coq̃nꝛ̃ ĩ vĩo: ⁊ deꝛ̃ ex eo
ʒ. i. ĩ mãc: ⁊ ẽ iuuamẽtũ valde ad ſãguinẽ q̇ currit ex rẽib⁹ ⁊
veſica. Dixit ymain q̇ ñ p̃nt ↄtiere vrinã vtaꝛ̃ mẽta ortula
na. qm̃ ↄfortat' plus oĩb⁹ herbis. ⁊ p̃p̃e ſtõꝫ ⁊ caſtoreũ ma
gis ceteris carnib⁹ ⁊ maſtix ceteris gũmis: ⁊ ga lãga oĩb⁹
arõatib⁹. ⁊ Abo. trociſc⁹ ↄferẽs ad diſtillatiõeꝫ ⁊ diaridaꝫ
vrĩe. ℞. caſtorei. ʒ. ij. ſãſuci rute: ſe. iuſquiami albi. añ. ʒ. ij.
granoꝝ granatoꝝ grãna. xl. teranꝛ̃ ⁊ fiãt trociſci ⁊ ſit doſ.
ʒ. i. cũ. ʒ. i. de granis cucumeris mũdi: ⁊ cũ albumĩe oui.

⸿ Cap. xiij. de ſtranguria ⁊ difficultate vrine.

Tranguria ⁊ difficultas vrine in genere ſimul cõ/
8 ueniunt. vtraq̃ꝫ enĩ eſt vrine retentio cũ incõſide
rate potentia expellẽdi. ecõtra diſſuria q̃ eſt vrine
egreſſio cũ in potẽtia retinẽdi: ⁊ tñ cõiter ab antiqs vna ꝓ
alia ſumiꝛ̃ ĩdr̃ñter: dr̃nt v̉o in q̃ꝫto. ⁊ ſpẽ cã: ⁊ loco dr̃nt in
q̃ꝫto ⁊ ſpẽ. eſt. n. ĩ ſtrãguria vrĩe retẽtio maior q̃ꝫ in difficul/
tate: qõ eſt: qꝛ ĩ ſtranguria vrine retẽtio p̃ſuppõit v̉tutis po
tentiã ↄtentiue exñtis in collo qua arguit ſupfluitatis re/
tentiõis aq̃ ꝓcedit cũ põne oppilatõis cãe. Jn difficultate
v̉o vrine retẽtio p̃ſupponit v̉tutis expulſiue defectũ ĩ ve/
ſica ⁊ lacertis coadiuuãtib⁹ vẽtris q̃ꝫ arcet dura expulſio
⁊ difficilis cũ ꝓuatõe oĩs cãe ĩpediẽtis exñtis in collo ei⁹: ⁊
via q̃ ſtatiꝫ diceꝛ̃. Jn ſpẽ vero differunt ꝓp̃e ⁊ eẽntialiter
ſtrãguria. n. eſt oĩs ⁊ abſoluta ĩpotẽtia expellẽdi vrinã. dif
ficultas v̉o eſt in potẽtia facilis expulſiõis vrĩe: ſeu poten
tia debilis dura ⁊ cũ conamĩe ad modũ diſtillatõis vrĩe: q̃
ſic̃ ꝓueniebat vt ſupra ex debili retẽtione: ita ẽt accidere
poſſit ex debili expulſiõe iter q̃ diſtĩguit volũtas in emiſ/
ſione. Et tñ accidit ex debili expulſiõe ⁊ abſtinẽtia ei⁹: tñ
ex debili retentõe. Jn cã v̉o dr̃nt ⁊ loco: nã ſtrãgurie ꝓue/
nit ex peccato ⁊ ſupfluitate cõtentiue pp̱ leſionẽ exñtẽ in
collo veſice ⁊ eius lacerto: vel vl' qꝛ ſit ſpaſmat⁹ ex h̃uore
currẽte vel frigore: vl' pp̱ cõitatẽ ad ſupiora vt ĩ carabito
vel a͞pate nuce: vel in via ei⁹: qꝛ ſit oppilata attenuatorie ⁊
caliditate ⁊ ſiccitate: vt in febrib⁹ adurẽtib⁹ vel ĩ frĩtate vt
algoratis ex aere ⁊ aq̃: vel medicĩs vel exp̃ſſiõe vicinorũ
tumeſcentiũ: qꝛ repletoꝝ vel a͞patoꝝ: vt m̃ricis: recti ite/
ſtini. pectinis: pitoneonis teſticuloꝝ: vel ani. Etiã qꝛ patia
tur tenaſmonẽ ragadias vl' emoroydas doloroſas vl' car
noſe vel coartatorie: qõ ẽ p̃lĩmũ ex h̃uore groſſo ⁊ viſcoſo
ſanguĩe ↄgelato: ſanie groſſa vel lapide vel vẽtoſitate tor/
quẽte: ⁊ repugnãte. Difficultas aũt eſt ex debilitate ⁊ pec/
cato expulſiue pp̱ leſionẽ exñtẽ in collo veſice vel ꝓpriã:
qꝛ alteratũ ⁊ alligatũ p̃lĩmũ vel vlceratũ aut a͞patũ: vl' pp̱
cõitatẽ ad p̃ncipiũ. ſ. epar leſuꝫ vel lacertis vẽtris coadiu
uãtib⁹ ĩpam in expulſiõe ⁊ magis cũ vrĩe eſt pauca vt. G.
dixit patiẽtib⁹ vel in ſe: qꝛ ſint ↄ̃bilitati aliq̃ p̃dictaꝝ cãꝝ:
aut mollificati in ſe pp̱ cõitatẽ ad ſupiora vt cerebꝝ in ſtu
pore vel litargia ⁊ nucã a͞patã vel ↄpreſſaꝫ ĩ diſſolõne ſpõ
diliũ. vñ lacerti illi mollificati exiſtãt. Et q̃ñq̃ꝫ ambe ↄue
niũt in loco: vt ẽ in v̉ga ⁊ via ei⁹: vel in vritidib⁹ eſt oppilõ
aliquo triũ modoꝝ. Et fit difficultas ẽt nõ pp̱ cãm exñteꝫ
in mẽbro tñ vel loco: ſꝫ ẽt pp̱ cãꝫ exñtẽ in locato vt vrĩa:
qꝛ fuerit pauca a c⁹ cõpreſſiõe defic̃ v̉t⁹ expulſiua: aut qꝛ
multa ſupra quã nõ valꝫ: q̃ diu collecta ⁊ retẽta exiſtit ex
duricie ſenſus pp̱ ſõnũ ſopientẽ v̉tutẽ in nocte vel occupa
tionẽ in die diſtrahẽte ĩpam vl' verecũdiã ↄpeſcẽtẽ: q̃re vi
li ei⁹ diu remanẽtes extenſi debilitanꝛ̃ ĩ ↄ̃ctiõe neceſſaria
expulſiõi. ẜc̃. G. dixit. Aut qꝛ fuerit acuta faciẽs dolorẽ cũ
trãſit p̱ vritides ⁊ ꝓp̃e p̱ collũ veſice ⁊ v̉gã maxĩe. ſi ñ fue
rint vlcerata. cũ. n. ſentiant ardorẽ: tũc refugit veſica a cõ
preſſiõe ⁊ ſtrigiꝛ̃ lacert⁹ colli: ⁊ ẽt lacerti vẽtris pp̱ dolorẽ
ceſſant' a ↄſtrictõe: q̃re retineꝛ̃ vrĩa ⁊ difficil' fit exit⁹ vrĩe.
Et cũ ſtridet patiẽs ⁊ in ſe ſtrigiꝛ̃ migit vrinã ⁊ ceſſat do/
lor ⁊ ardor. Et cã eaꝝ exterior in q̃ ambe cõueniũt eſt ſic
pcuſſio: caſus aeri expõ fra: ⁊ vẽtus ſeptẽtriõal'. ſi. n. valde
fortis ſit p̱ ſe egõnẽ retinet ⁊ vrinã ↄſtringẽdo mẽbra: vĩ ĩ
nã cõſumẽdo ꝓfundatõe ſua. ſi v̉o paru⁹ ſit ſtringẽdo ven
trẽ ꝓuocat vrinã. ⁊ ſic p̱ accñs illud fac̃ ⁊ balneatio in fra
aq̃. Ex qb⁹ ſigna diſtictia ĩpaꝝ ſũt mãifeſta. Cũ. n. retẽtio
vrine pp̱ ſtrãguriã ſit. ⁊ cãis ei⁹ retẽtio ⁊ multiplicatio vri
ne in veſica maior erit. ⁊ ſic tũor maior appens ĩ pectĩe cũ
oĩ ĩpotentia expellẽdi q̃ꝫtũcũq̃ꝫ exp̃maꝛ̃ pecten ⁊ patiens
exp̃maꝛ̃. Cũ v̉o pp̱ difficultatẽ ⁊ cãs ipſi⁹ ecõtra. ⁊ ſiq̇deꝫ
ↄtingat retẽtio vrĩe ĩ ſtrãguria ſeu difficultate cõiter ſum
ptis ex oppilõne in collo vel multitudĩe vrĩe pp̱ duricieꝫ
ſenſus ẜm. G. difficil' ẽ cognitio ei⁹. Cognoſciꝛ̃ tñ ex p̃dcis
cãis ⁊ eo. ſ. q̄ p̱ ↄpreſſionẽ pectinis ſi retẽtio fuerit ⁊ mlti/
tudo pp̱ duriciẽ ſenſus vrĩa emittiꝛ̃. ſi v̉o pp̱ oppilõnẽ ne/
quaq̃ꝫ. ſic̃ alibi ĩpe põit: ⁊ maxĩe ſi ſit dura. Et ẽt ſigna cãꝝ
ſũt. nã ſiq̇dẽ retẽtio vrine cũ ĩpotẽtia expellẽdi ꝓuenit ex
cãis ſtrãgurie: vtputa ex cã ĩ lacerto colli veſice: vt qꝛ fue
rit ſpaſmat⁹. ⁊ ex ſpaſmo attenuatoria in eo ꝓuenit oppila
tio. ⸿ Signa diſtictiua iter talẽ oppilõnẽ ⁊ alias oppila/
tiõis ſpẽs ſũt. nã in attenuatoria ẽ p̃ceſſio ⁊ iuentio cauſe
cuiuſlibꝫ: ⁊ iuentio iuuamẽti cũ medicĩs ↄueniẽtib⁹ vni/
cuiq̃ꝫ illaꝝ q̃ dicenꝛ̃. Jn coartatõe ẽt ſilr̃: ſꝫ dr̃nt in graue/
dine: qõ eſt cõe ⁊ gñale ſignũ in oĩ ſpẽ ei⁹: qꝛ in attenuato/
ria p̃lĩmũ grauedo ñ iueniꝛ̃ ſp̱ rõne oppilãtis cãe. dr̃nt ẽt
ĩ tp̱e euẽt⁹. nã coartatoria ẽ q̃ſi coartatorie ⁊ ſubito eueĩat
ſp̱: ſꝫ attenuatoria q̃ñꝫ ſubito: ⁊ q̃ñꝫ paulatĩ. Et ſilr̃ ĩ exeũ/
tib⁹: qõ eſt: qꝛ in coartatoria cũ vrĩa egrediꝛ̃ aliqd mixtũ:
qꝛ h̃uor groſſus vl' aliqd ſãguis, vl' aliqd ſaniei: vel arẽula
q̃ ẽt forte p̃cedere ↄſueuit. Jn attẽuatoria v̉o nil' erit nec ĩ
carnoſa: niſi ex a͞pate fuerit. nã tũc cũ vrĩa q̃ñꝫ egrediꝛ̃ ali/
qd ẜꝫ q̄ ab alijs diſtinguiꝛ̃. qꝛ qõ egreditur virulentũ eſt
cũ eſt in p̃ncipio. ⁊ poſtmodũ fit ſanioſum: ⁊ dolor eſt ve/
hemẽtior: vl' ꝓptere a iuuamẽtũ a medicĩs ĩ carnoſa ẽ in/
uẽtũ nequaq̃ꝫ: ⁊ ꝓprie cũ ex veruca vel cicatrice fuerit: ⁊
fortaſe nõ curaꝛ̃. ⁊ q̃ñq̃ꝫ ẽ p̃ceſſio cãe vl' iuẽtio: vt cũ ex ci
catrice p̃ceſſerit. ⁊ q̃ñq̃ꝫ nõ ẽ: vt cũ ex veruca fuerit. G. v̉o
dixit q̄ iter tales ſpẽs opilõnis ⁊ etiã cãs eaꝝ ĩmiſſio ar/
gallie diſtĩguit. nã ĩmiſſio ei⁹ iuenit reſiſtentiã in carnoſa

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0372-6
DFG

abſq; dolore niſi ex apãte fuerit ĩ alijs vͦo ceſſionẽ ⁊ cũ do
lore maxime ſi attenuatoria ex ſpaſmo fuerit vł apãte vł
vlcere partiũ vicinaꝝ. Et coartatoria ex ſanguine ꝓcedẽ
te ab vlcere ꝯcreato ibidẽ. ꝑterea ĩ coartatoria ceſſio ma
ior ẽ q̃z in illa ⁊ eſt cũ minori dolore niſi cã lapidis fuerit.
Et cãs etiã ipſaꝝ diſtiguit ⁊ ꝓprie coartatorie ⁊ carnoſe.
nã cũ extrahiť ex eiꝰ ĩfectõe q̃nq; viruléta ĩfecta apparẽt:
q̃nq; humore mucoſo q̃nq; ſanguine q̃nq; ſanie ex q̃bus
cãs diſtiguimꝰ. ⁊ q̃nq; mũda ꝑ qͦd diſtiguimꝰ attenuato/
riã a p̃dictis. Et iter cãs attenuatorie hoc mͦ ẽ diſtinguẽ
dũ q̃ ſunt ĩ collo veſice: nã ſi qdẽ fuerit ſpaſmatũ ſpaſmo
hũido ex hũore currẽte: tũc p̃cedẽs regimẽ idicabit: ⁊ eiꝰ
euẽtus ſubitꝰ ⁊ ſiccãtibꝰ ⁊ reſoluẽtibꝰ iuuať: ⁊ diutiꝰ ma/
net. Si vͦo a ſiccitate p̃cedẽs ĩanitio ⁊ febris abſentia illã
faciet manifeſtã: ⁊ paulatinꝰ eueniẽs cũ maiori ꝑdurãtia
⁊ fortaſſe iuuabiť hũidis. Silr̃ ſi ex frigore ꝓcedens cãs
⁊ ſenſus frigoris: ⁊ iuuamẽtũ a calidis cũ vrina ĩ colore re
miſſa ⁊ pallida. Silr̃ ſi ex cõitate ad cerebꝝ: vt ĩ carabi/
to: vł ad nucã apatam p̃cedẽs illoꝝ paſſio hoc mõſtrabit
vł illiꝰ p̃ſẽtia. ⁊ ſi ẽ a cerebro ſpaſmꝰ erit vlis. Silr̃ ⁊ ſi talꝪ
oppiłõ ĩ collo veſice attenuatoria ex quacũq; ſpãli ſit cã
cã oſtẽdet p̃ceſſio cãe cuz iuuamẽto a ſuo ꝯtrario ⁊ nocu
mẽto a ſili. vł ẽt ſi fuerit a repłõne iterioꝝ ĩuentio repło/
nis ipoꝝ oſtẽdit ⁊ iuuamẽtũ eũonis illoꝝ: ẽt ſi apoſtemo
ſa repło fuerit: vł alia paſſio eoꝝ occulta vł manifeſta. Et
ſilr̃ iter cãs carnoſe oppiłõnis ẽ diſtiguẽduz: ⁊ cãs quoq;
coartatorie. vt ex p̃dictis ẽ notũ. Si vͦo vrine retẽtio cũ
ĩpotẽtia expellẽdi ex cãis de difficultate ꝓceſſerit veſice
debilitãtibꝰ expulſiuã cõcauo eiꝰ ꝓprys. q; fuerit altera/
tũ vł algoratũ: qͦd ẽ pl̃imũ: ⁊ tũc ſigna ꝯſiderabis cũ p̃dictis
ſimilis cãe ĩ eiꝰ ꝓueniẽtis collo q̃ ẽ dcã: ⁊ ſi fuerit ſolutuz
vlceratũ vel apatũ. Signa ſołõnis vlceꝝ vł apatũ p̃nar/
rata ſupiꝰ dmrabũt. Si vͦo nõ ex cã ꝓpa ĩ ꝯcauo exñte: ſ;
ex ꝯpaſſiõe ⁊ cõitate ad eiꝰ p̃ncipia: vt ẽ ep patiẽs ⁊ dbile.
ſigna dbilitatis epis vt cacexia ⁊ dorops: vł mittẽtia vt ſt
renes. ſigna dbilitatis ipaꝝ videbis p̃cedere q̃ ſi dcã. Et ſi
cã fuerit ĩ lacertis vẽtris coadiuuãtibꝰ ad expulſionẽ ⁊ ĩ
ſe ipis ſigna dbilitatis ipoꝝ ſũt d gñe male ꝯpłõnis ſolo/
nis: ⁊ eoꝝ apatis q̃ ĩfra diceť ad ee. pria eſtimabis ẽt dbili
tas expulſionis erit ꝓp̃e cũ vrina pauca. cũ vͦo mlťa ẽ vri
na nõ erit manifeſta. ſi ãt nihil ĩ ſe ⁊ in cõitate ad p̃ncipia
ſupiora vt cerebꝝ vł nuccã patiẽtia. vt ẽ dictum preceſ
ſio paſſionũ illoꝝ vel inuẽtio demrabit. Silr̃ ſi ex cauſa ĩ
meatibꝰ exiſtat vt oppiłõne in vriťidibus vel v̄ga. Signa
erũt paucitas vrie vel eius ꝓuatio ĩ veſica. ſi ex oppiłõne
fuerit ĩ vriťidibꝰ vel eiꝰ mlťitudo ⁊ abũdãtia ĩ veſica quã
tumor oñdit ⁊ ĩflatio pectis. ſi fuerit in collo veſice vł v̄ga
⁊ ẽt cũ fricatõe ⁊ ĩ nutritõe educeť fortaſſe: niſi carnoſa ex
titerit oppiło. ¶ Cura ſtrãgurie ⁊ difficultatꝫ vrie ẽ due
res: ⁊ vna cõis eiꝰ ⁊ diſſurie ac diſtillatõi. ⁊ eſt cãe abſciſio
ſeu ablatio. Alia ẽ cõis ſtrãgurie ⁊ difficultati. ⁊ eſt vrie ꝓ/
uocatio ꝯria exñs accñti: qͦd eſt vrie retẽtio ſiue ſtrãguria
⁊ cure diſſurie ⁊ diſtillatõis. ſ. oppoſita: queãdmodũ ⁊ ĩ il/
lis. cura ẽ vrine retẽtio. ſic ẽ; in iſtis. cura eſt vrie ꝓuoca/
tio. Jngt. n. hyp. in aff̃o. Cõtraria ꝯrys ſananť. ꝓpa cura
ẽ vrie ꝓuocatio. Jn ſtrãguria cũ mollificatõe ⁊ ꝓuocatio
cũ ſiccitate ⁊ moderata ſtipticitate ĩ difficultate. Conſtri/
ctio. n. ⁊ coartatio mẽbri ĩ oppiłõne ſtrãgurie ĩdiget molli
ficatõe: debilitas vͦo ĩ difficultate ſtipticoꝝ ꝯfortatõe. S;
ne retineãt debẽt eẽ ꝑpata. Abſciſio aũt ĩterioris cãe ⁊ ex/
terioris ablatio ex dcis ſupra iã ẽ mãifeſta: ⁊ repetemꝰ: vt
aliq̃ huic diſpõni ꝓpa adiũgamꝰ. Si igiť cã ſit ĩ lacerto: q;
fuit in ſe ſpaſmatꝰ: cura ẽ cura ſpaſmi in ſuo dcã caplo cõ/
mixtis ei aliq̃bꝰ diureticis: ⁊ ꝓprys mẽbro: q ꝯbant medi
caminũ vͥtutẽ ad mẽbꝝ: ꝓut in cura vlceꝝ recolimꝰ nos
dixiſſe. Si vͦo ſpaſmatꝰ fuerit nõ ĩ ſe, ſ; ex cõitate ad ſupio

ra vt ad cerebꝝ patiẽs carabitũ cura illiꝰ erit iſtiꝰ cãe ab/
ſciſio ⁊ ſilr̃ ſi ex apãte nuce. Cũ ſiqdẽ ĩ cã fuerit oppiło ex
caliťate ⁊ ſiccitate feb. abſcideť ⁊ curabiť cura febris. Et
ex ꝓprys ſũt ſcĩa cõia fr̃a: vt eſt ſemẽ lactuce cũ vͥo ſubti/
li ꝑmixto cũ aq̃ granati acetoſi: ⁊ regimen hũectatiuũ. Et
ſi in cã fuerit oppiło a fr̃itate extrĩſeca coãguſtãte ⁊ ꝯgelã
te: qͦd iuiſcatũ ẽ: ẽ oppilãť meatũ colli ipiꝰ abſcideť ⁊ cura
biť cũ oleis całis ⁊ ꝯfectõibꝰ q̃ ſupius hũiſti. ⁊ breuiter cu
rã ꝯpłõnis fr̃e ẽt ſi ſit a cã ĩteriori. Et ex ꝯueniẽtibꝰ illis ⁊
appropꝛiatis ẽ vt ſumať fimi colũbini ſilueſtris. ʒ. i. ⁊ bibať
cũ vria pueri: qm̃ cũ hoc ꝙ calefac̃ ẽt ꝓuocat. ⁊ ſtercꝰ mu/
ris aur. i. in põdere cũ aq̃ d coctõis aneti. ⁊ q̃nq; ſumiť cuz
mũia aut vẽtris arabamati põdꝰ. ʒ. ij. cũ ea mẽſura ſał ĩdi
aq̃ całd. ⁊ tertia ẽt aſſe ĩ lacte aſinino. ⁊ hoc ꝯfert ei: q ẽ ex
hũore groſſo. ⁊ ẽt ĩ paliſi. Si ẽt ſit ĩ cã oppiło ex ꝯpreſſiõe
fcã in collo veſice a repłõne ꝑtiũ vicinaꝝ eaꝝ curatio cãe
erit abſciſio. Si vͦo ab apãte ipſoꝝ ad cãe abſciſionẽ p̃mit
tere oꝫ fłomiã baſilice: deide fłomiã ſaphene: qm̃ ꝓuocať
cũ ea vrina: ⁊ ĩiungať ei abſtinẽtia duobꝰ diebꝰ: deiñ cure
tur apa ſm̃ ſua ꝑpa ⁊ mollificeť ⁊ leniať cũ admĩſtratiõe
tiriace in balneo całe aque: ⁊ cũ oleis całis ĩunctis notis ⁊
empłis ⁊ ex leniẽtibꝰ ⁊ cliſteribꝰ ſilr̃ ĩ ano ĩmiſſis ⁊ v̄ga. q̃/
les ſũt caules: altea: fenu. ⁊ ſemẽ lini: cepe: ⁊ pori decocti: ⁊
elixati: qm̃ cũ lenificatũ fuerit apa cũ deſcẽdet vria cũ cõ/
preſſiõe ⁊ minoreť aq̃ fr̃e potꝰ ⁊ dimittat ſtiptica. ⁊ ſiqdẽ ĩ
cã fuerit dolores ipoꝝ egritudine puta vlceribꝰ: emoroi/
dibꝰ ragadys vł tenaſmõe: cureť cura illoꝝ cũ p̃miſſione
mitigatiuoꝝ doloris: vt ſupiꝰ deiñ ẽ in ꝓpͦ loco d eis. Si
vͦo in cã eiꝰ oppiło fuerit a veruca vł carne calloſa ĩ collo
veſice. tũc cura eiꝰ erit ĩ tinis ex herbis ſcibꝰ mollificãtibꝰ:
⁊ oleis lẽificãtibꝰ ſcitis ſupra h. ⁊ ĩ cura oppiłõnis epatis: ⁊
cũ fricatiõe ĩ loco: ⁊ abſtinẽtia ab acetoſis: ⁊ ſtipticis ⁊ for/
taſſe ꝓderit: ⁊ fortaſſe ñ vt ſup̃ ĩ cura oppiłõnis epis deiñ ẽ
Si ẽt oppiło carnoſa tał ſit ex apãte ĩ collo veſice curabiť
cura p̃dcã apatũ ꝑtiũ vicinaꝝ. ſ; ſi ĩ eiꝰ cã fuerit oppiło co
artatoria ex q̃cunq; fuerit cã curabiť ⁊ cureť cura oppiło
nis renũ ⁊ veſice ſupra ĩ p̃ncipio tradita. ⁊ cura ꝯgelatiõis
ſanguĩs ĩ veſica ⁊ breuiter cũ diureticis całis fortibꝰ ſim/
plicibꝰ abſcideť ⁊ ꝯpoſitis q̃ ſupra ĩ lapidis cura ſũt dcã: ⁊
ĩfra ſubiũgeť huic ꝓpa. Porro ſi cã ſit in veſica debilitãs
expulſiuã ⁊ ſit ꝓpa q̃ ſit alterata ⁊ ĩfrata ꝙ pl̃imũ aufere
tur ⁊ curabiť. cura oppiłõnis fr̃e hic ſupius enarrate. Et ſi
ſit vlcꝰ debilitãs cura vlceꝝ abſcideť ſupra iã dcã. Vł q;
ſit apa cura apatis abſcideť ⁊ curabiť q̃ eſt dcã. Et ſi ſit ñ
ꝓpa. ſ; ex cõitate ad p̃nᵐ. ſ. epar aut renes. cura dbilitatis
ipſoꝝ abſcideť in ꝓprys dcã caplis. Et ſi cã dbilitatis ex/
pulſiue ſit ĩ lacertꝫ coadiuuãtibꝰ vẽtris curabiť ⁊ abſcide
tur cura illoꝝ q̃ diceť. ⁊ ſi mollificati fuerit cura paliſis ab
ſcideť. Si ẽt ex cõitate ſit ad cerebꝝ vel nucã vel ſpõdi/
les diſlocatos cura illoꝝ egritudinũ abſcideť. Et ſi ꝯtẽtũ
fuerit ĩ cã vt paucitas vel mlťitudo vrie vel eiꝰ acuitas ĩ/
ducẽs ardorẽ abſcidať cura paucitatis mlťitudĩs ⁊ ardo/
ris vrine. Et ſi cã fuerit dbilitas ſenſus abſcindať ⁊ cureť
eiꝰ p̃nᵐ. Et ſi cã fuerit in p̃nͦ. ſ. ĩ cerebro vel nuca: aut ipſe
lacertꝰ ⁊ collũ veſice cũ medicis hñtibꝰ acutũ obeꝑez: vt ẽ
tiriaca mitridatũ ⁊ ĩunctões cũ olͦo ſãbucino de lilio nar/
ciſino de croco de balſamo. Et admiſtreť ẽpła ex folys
arboꝝ fructuũ ⁊ oleũ dilectoꝝ ſpũi aiali vt alleoꝝ: mẽte:
⁊ rute: ⁊ miſceanť cũ eis medicie exꝑgefaciẽtes valde: ſicͭ
ẽ ſeñ armeł rute mõtãe: deiñ ẽpleť cũ eis pectẽ. Et ſi ĩ cã
fuerit lõga retẽtio: cura ẽ cũ tinis mollificãtibꝰ: deiñ cũ ſti
pticãtibꝰ ſupra dcis: ⁊ cũ cartamo. ⁊ ſilibꝰ: ⁊ ẽpłis fcis ex il
lis: deiñ vtere eiꝰ q̃ ſũt vehemẽtis ꝓuocatõis: vt ſiringa ⁊
oleũ balſami ẽ maximi iuuamẽti ĩ hoccãu. Et ſi cã fuerit
cãus ⁊ ꝑcuſſio apatõis: ⁊ nõ apatõis: ſ; remanet aliq̃d: tũc
p̃mittẽda ẽ fłomia: deide tine ⁊ mollificãtia ꝑpate ⁊ ſtude

vt mingat. Qꝛ ſi minxerit ſanguinẽ plurimũ retinebis cũ
trociſcis de charabe ⁊ de terra ſigillata. Prouocatio vrĩe
q̃ eſt accñti ɔ̃ria: ex quo cãe ꝑceſſit ablatio oppilãtis fit fa/
cilis. ⁊ ſeqꝫtur ſtatim: ſi ſola cã retentõis oppil'o ſit ĩ collo.
Ceſſante. n. cauſte oppilãte ceſſat oppil'o oĩs cũ fiẽs ⁊ fcm̃
in oppil'one tal'r ſint cõnexta: q̇ ceſſante fiẽte ceſſat ⁊ fa/
ctũ: vt ſupꝛa in ꝑpate dcm̃ eſt. ⁊ ceſſãte oppil'one ſtatĩ tale
accñs ceſſat: cũ ex ea depẽdeat velut vmbꝛa: ⁊ maxĩe cũ
remaneat veſice potẽtia in cõpꝛeſſiõe. Qꝛ ſi cã retẽtõis ſit
debilitas in veſica cã abſciſa ꝓuocatio nõ ſtatĩ fiet: niſi ve
ſice ɔfortatio ſubſeq̃tur. ceſſante. n. cã defectõis adhuc d/
bilitas remanet ɔfortatiõe ĩdigẽs vt ꝓuocetur vrĩa. Sic
quoqꝫ ꝓuocãtia cũ ɔfortatiõe poti⁹ abſcidẽtia: cãm ſunt
admĩſtrãda. Sĩl'r ſi in cã retẽtõis vtraqꝫ cã ɔcurrat: ceſſã
te. n. altera retẽtio remanebit. Et q̃nqꝫ vrĩna ꝑ ſui multitu
dine in retẽtõe minãdo piculũ doloris grauedĩs ⁊ crepa/
tiõis ꝓſternẽtis ṽtutẽ abſqꝫ eo q̇ det ſpaſmũ ad cãe abla
tionẽ adhuc eo manẽte cuiuſcũqꝫ gñis fuerit ꝓuocatione
ĩdiget. Sicqꝫ in oĩ cã retẽtõis vrĩe eſt neceſſaria ꝓuocatio:
fiet aũt manẽte cã retentõis nõ certe nec penit⁹: ſꝫ adula/
torie. ⁊ ad pñs cũ his q̃ nãꝫ alliciẽdo ꝓuocãt ad expulſio/
nem vrĩe. vt eſt ĩtromiſſio pediculi. vel feſcel' in capite vir
ge vel orificio vulue. ⁊ ex illis ẽ ĩmiſſio naſcalis ĩ ano d ſa/
le tabarçet: q̃m ſoluẽdo ventrẽ ꝓuocabit vrĩnã ad emiſſio
nem vrine. Et ẽt linitio allei v'l cepe vel alterius rei acute
ſuꝑ virgã pectinẽ et ꝑtineomenõ: q̃m trahẽdo calorẽ ⁊ na/
turã ad locũ ⁊ diſſoluẽdo ⁊ reſoluẽdo oppil'onis cãm ꝓuo
cabũt vrĩnã. Et ex illis ẽ miſtratio diureticoꝝ mollifican/
tiũ: vt ſupꝛa hoc dcm̃ eſt cũ lenificata fuerit cã oppilãs: c⁹
vis fuerit gñis ⁊ mẽbꝝ cõſtrictũ ⁊ coartatũ in ea mollifi
catum ⁊ relaxatũ ⁊ mitigat⁹ doloꝛ q̃ſi in modũ adulatio
nis cedẽt vrĩe egrediẽti cũ ɔpſſiõe ṽtutis potẽtie viciaria
in expulſiõe. talia ſũt aũt ſupꝛa dcã. Sũt ⁊ alia leueꝫ ṽtu/
tem hñtia ne ſua fortitudĩe faciãt diſtẽdere mãm pl'imã:
q̃ magis debilitet ⁊ oppilet. Et ex reb⁹ magis ɔuenientib⁹
eis eſt lac calefactũ cũ nõ eſt febriẽs ꝑ oẽꝫ admĩſtratiõis
modũ. Et ex illis eſt ĩiriſſio argalie ſimpl'r ĩmiſſe: vel cũ
ꝑdictis mollificãtib⁹ ⁊ leniẽtib⁹ medicis ꝑ eã in rectis: v'l
alijs cãe cuiuſlꝫ appꝛopꝛiatis: q̃ dcã ſũt caplõ oppil'onis ⁊ la
pidis: q̃m cũ cõpꝛimit mẽbꝛũ ⁊ cãm diſſoluat ſeu repellat
ꝓuocat vrĩnã. ⁊ hoc in mare. in muliere ṽo vice ipſi⁹ ſup/
ponatur cũ radice dauci: ĩnnipi vel narciſci cũ oleo ſãbu/
cino vel laureon inuncta poſtq̃ ſederit in aq̃ decoctõis ra
fani cicerũ nigroꝝ folioꝝ dauci ſilueſtris. ¶ Cauẽdũ aũt
ne argallie ĩmiſſio ĩferat dolorẽ vel nocumẽtũ vel ex ſua
ineptitudĩe vel ex malo ĩmiſſiõis mõ q̃ q̃liter debeat eẽ ⁊
q̃uo ĩmittẽda ſit: docꝫ ꝑnceps. Abo. ĩ difficl'tate vrĩe capi.
Si quoqꝫ ĩ cã d̃bilitas expulſiõis veſice adſiſtat cã ablata
ipſi⁹ vel in manẽte fuit vrĩe ꝓuocatio cũ diureticis ſiccis
⁊ moderate ſtipticis q̃ ꝓuocãdo ɔfortent ⁊ nõ retineãt q̃/
lia ſunt q̃ ſupꝛa dcã ſunt in cura lapidis ⁊ oppil'onis: ⁊ ĩfra
dicenꝫ vel ſaltẽ cũ cõpꝛeſſiõe pectinis cũ manu. ducta a ſu
perioꝛib⁹ ad ĩferioꝛa trahẽdo corpoꝛe ſtãte vel ſituato re/
cte. talis. n. cõpꝛeſſio vicaria ⁊ ꝓportionabil' exiſtit nãli ve
ſice ɔpꝛeſſioni in ꝓducẽdo vrĩnã vt. H. ait. Et ex ꝓuocãti/
bus expꝛtis in oppil'one ex hũoꝛibus groſſis. ⁊ oleũ d ane/
to vel de lilio ⁊ decoctiõis fabaſulaꝝ ſcarabeonũ cimicũ
vel cãtaridis pectini applicatũ. Et ex illis eſt ſi ſumãtur
folia edere vel ſucc⁹ eoꝝ cũ vĩo vel aq̃ decoctiõis acrimo
nie vel abꝛotani. Et ex exterius applicãdis ſunt folia ſam
buci paritarie ⁊ petroſilini ⁊ dauci decocta ĩ aq̃ ⁊ cataplaſ
mata pectini. Et ex expertis eſt: qd̃ circũſtãs poſuit. ⁊ ẽ vt
teranꝫ folia paritarie ⁊ bulliãt in oleo antiquo vel camo/
millio in frixoꝛio ⁊ cataplaſmenꝫ pectini. Et ex illis ẽ vt ſu
manꝫ mataſſa vna filati crudi ⁊ bulliat cũ cinere ⁊ cal'a ſuf
ficiẽter pectini applicenꝫ. Et aq̃ tribuloꝝ marinoꝝ diſtilla

ta eſt expꝛta. Et aq̃ ciceꝝ nigroꝝ ex oppil'one ex hũoꝛibus
vel lapide. Et oẽs medicĩe q̃ ad lapidẽ ſũt ɔueniẽtes ⁊ po/
tẽtes valẽt in hoc caſu. ¶ Cõfectio electuarij ɔ̃ retẽtionẽ
vrine ⁊ ex oppil'one viaꝝ vrine ex hũoꝛib⁹ groſſis vel la/
pide. ℞. ani. feni. ſemis apij vrtice ſaxifragie. ana. ʒ. ij. ſcis
ſparagi: bruſci: milij ſolis: petroſilini macis: ſe. geneſtre. ſe.
lini: ſpinacis meuſu. aſſari. añ. ʒ. i. ligri. ʒ. iij. ſe. cõiꝫ mũda/
toꝝ. ℥. i. puluere capil. ve. ʒ. i. teranꝫ ⁊ cribellenꝫ: ⁊ fiet ele/
ctuariũ cũ melle vel çuc. Et ſi vis laxatiuũ facere addas
turbit. ermodactiloꝝ. añ. ʒ. i. cũ çin. ⁊ pipis lõgi. ʒ. ij. diagri
dij cocti. ʒ. iij. doſis. ℥. ß. cũ cal'a. ¶ Cõfectio diuretica foꝛ/
tis ad idẽ ſm̃ Abo. ℞. ſauine. aſſari: amomi: amcos petro/
ſi. ſe. apij rubee tictoꝝ amigdalaꝝ amaraꝝ ſpice. añ. ʒ. zo.
ſe. melonũ. ʒ. io. corpoꝝ cãtaridaꝝ abſciſis capitib⁹ ⁊ alis.
ʒ. i. armoniaci. ʒ. iij. reſoluaꝫ armoniacũ cũ triplicato ſub/
tili ⁊ fiant ex eis auellane vel pill'e de q̃b⁹ ſumanꝫ vſqꝫ ad
tres. ¶ Cõfectio alia ſm̃ eundẽ. ℞. caſtoꝛei: euforbij çin.
pi. lõ. olei balſami qd̃ ſuffic̃. Et q̃ñ addũꝫ opij: ſe. iuſqami
albi cã doloꝛis. ſe. vrtice pulueriçati. ʒ. i. cũ vĩo ſubtili ſtatĩ
ꝓuocat. ¶ Puluis educẽs lapides ⁊ hũoꝛes groſſos d re
nib⁹ ⁊ veſica. ℞. aniſi api ſe. fenugre. añ. ʒ. ij. ſquãti. ʒ. i. ni/
gelle rubee tictoꝝ. añ. ℈. ij. doſ coclear. i. cũ vĩo ſubtili.

¶ Caplm̃. xiiij. de ardoꝛe vrine.

Ardoꝛ vrine ẽ notus. qꝛ ẽ nociu⁹ ſenſus ipſi⁹ vri/
ne vel ſenſus ardoꝛis apud emiſſionẽ vrine. Et cã
eius ex ꝑdictis eſt manifeſta: aut ex parte vrine:
aut ex ꝑte mẽbꝛoꝝ vrinaliũ ⁊ ꝓpꝛie colli veſice ⁊ virge ĩ
q̃bus ꝑcipiꝫ vt plurimũ. Et apud emiſſionẽ magis ex ꝑte
vrine: nõ aũt ex ſe. qꝛ ſit acuta rõne materie acute ciboꝝ
ſ. ⁊ potuũ. Et caliditatis mẽbꝛoꝝ generãtiũ ⁊ trahẽtium
vt ẽpis ⁊ renũ: vel alioꝝ ĩfluẽtiũ illis aliquid accidẽtiũ
vt humoꝛẽ vel saniẽ: aut ex defectu hũiditatis apte ad tẽ
perãdũ ipãꝫ: ⁊ currẽdũ ſuꝑ meatus: vt eos leneat: ⁊ gluti
noſos reddat q̃ generanꝫ ⁊ ꝓcedit a carnib⁹ glãduloſis q̃
natural'r ſunt illic. Cũ ergo deficꝫ remanet ibi vrina acu/
ta nãlis: ⁊ in mẽbꝛis deficit lenificatio ⁊ glutinoſitas: q̃re
moꝛdet ⁊ vrit mẽbꝛa illa neruoſa ⁊ diſcooperta: ⁊ ꝓuenit
doloꝛ. Et cã ⁊ ardoꝛ defectus ei⁹ eſt ieiuniũ ⁊ abſtinentia
coitus diminuẽs humiditates ⁊ egritudines eliquãtes ⁊
laboꝛ pl'imus: ⁊ ſilia ex ɔpl'one etate: ⁊ hũiditate: ⁊ alijs
circũſtãtijs. Ex ꝑte ṽo mẽbꝛoꝝ vrinaliũ: qꝛ differentiũ
⁊ ꝓducẽtiũ acuitas ꝓuenit. qꝛ ſint vlcerata vel ſcabioſa
que cũ attingat vrina de ſe natural'r acuta: ⁊ ꝑꝑ colamen
tũ humoꝝ ⁊ colera cũ ea eſt apta trãſire moꝛdet ⁊ accidit
ardoꝛ. Cauſa ṽo ei⁹ eſt ex ꝑte vrine ꝑceſſio regimis acuẽ
tis vrinã. Ex parte mãe cibi ⁊ pot⁹ acutoꝝ ⁊ efficiẽtis: vt
ĩflãmatiõis epatis renuꝫ: ⁊ alioꝝ membꝛoꝝ vel corpoꝛis
vniuerſi ⁊ ſenſus acuitatis ipi⁹: Ex coloꝛe. qꝛ citrina fue/
rit valde: ⁊ ex moꝛdicatiõe cauſaꝫ apud egreſſionẽ abſqꝫ
ſignis vlceꝝ: ⁊ ſcabiei: ⁊ ꝑceſſiõe ieiunij plurimi laboꝛis: ⁊
ẽt cuiuſlibet egritudinis eliquãtis corp⁹. Eius ṽo q̃ eſt ex
parte defect⁹ hũiditatis ɔtẽperãtis cũ lenitate ẽ ꝑceſſio
cauſaꝝ ipi⁹ cũ macredine corpoꝛis ꝑcedẽti ⁊ ſenſus aſpe/
ritatis in loco ante hoꝛã vnctiõis: ⁊ iuuanꝫ hũidis: ſed ei⁹
que ẽ ex parte mẽbꝛoꝝ vrinaliũ: vel qꝛ vlceratoꝝ: vel ſca
bioſoꝝ ſigna ſunt ꝑceſſio ſignoꝝ vlceꝝ vel cauſaꝝ eius:
⁊ ſigna vlceꝝ pꝛeſentium ⁊ ſcabiei ipoꝝ dicta. qꝛ ſanioꝛa
fuerit vrina vel furfuracia. Et dixit Abo. multociẽs ꝑmũ
perducit ad ſcõm: ⁊ nõ ecõuerſo: ſicut ergo egeſtio coleri/
ca ad vlcerationẽ ĩteſtinoꝝ. ⁊ tũc antecedũt ſigna acuita
tis: ⁊ ſequunꝫ ſigna vlcerum: qd̃ te ſcire oꝫ ne deuenias in
erroꝛẽ. Cura ei⁹ q̃ ẽ ex ꝑte vrĩe ẽ due res. ꝑma ẽ hũoꝝ coꝛ
poris ⁊ mẽbꝛoꝝ adeq̃tio. ſcda ẽ glãdulaꝝ circa collũ: ve/
ſice ⁊ radicẽ ṽge exiſtẽtiũ hũectatio. ꝑma ẽ hũoꝝ coꝛpis
⁊ mẽbꝛoꝝ adeq̃tio ĩ ɔpl'one. Cũ. n. vrĩa ſꝫ. H. ſit collamẽ/
tũ ſãguis ⁊ hũoꝝ d ẽpe ꝑ renes ⁊ vritides vẽiẽs ad veſicã

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0374-7
DFG

adequatis humoribus ⁊ mēbris vrina collata reddetur in nociua ⁊ ſuauis: maxime ſi humiditatem hūerit ꝑmix/ tam obtundentē eius nālem actū ⁊ lenientē ſupficiez vie. Sicqꝫ ſcđa res erit ipſaꝝ glandularuꝫ hūectatio ⁊ reſtau ratio. ¶ Primā rē ↄplent regimē. Regimē aūt eſt vt fiat eius cōuerſio ad ↄriū diſpōnis ꝑcedētis cuꝫ ꝑtermiſſione oīs cibi ⁊ potus acuti ſalſi amari dulcis valde ⁊ acetoſi et diuretici ⁊ lacticinoſi ⁊ laboris ⁊ coitus ⁊ miſtratiōe frigi/ di ⁊ hūidi atqꝫ iſipidi ex quo iſipidi generant̄ hūores ⁊ in/ ſpiſſante ſanitatē ⁊ minorāte vrinā: quoꝝ mentionez iā fe/ cimꝰ in cura vlceꝝ ⁊ lapidis. Medicie aūt ſunt q̄ ſūt alicꝰ acuti hūoris ſup excreſcētiā educētis ſi adſit q̄les ſunt le/ nientes ⁊ ſuauiter educentes vt mel caſſia tamarindi mā na ſuccꝰ violaꝝ ⁊ aq̄ lactis ⁊ foliculoꝝ ſene in aduſtis. Ca ueat āt ab atractiuis ⁊ diſſolutiuis. ſua eni acuitate vrinā acuunt ⁊ mēbra exaſpant. Quedā vero ſunt alterātes in fridantes ⁊ humectantes ſimplices ⁊ ↄpoſite itus ⁊ extra ꝑ oēz modū adminiſtratōis q̄ corporis ⁊ mēbroꝝ ⁊ ꝑpe epis ⁊ renū calitatē ⁊ iſlāmatōez remittāt de qbꝰ ē dictū ſupra i ſtō epe ⁊ reībꝰ ſufficiēter. ¶ zᵃᵐ rē ↄplēt ēt regim̄ ⁊ medicine. Regimē inqꝫtū .ſ. humectatiuū cū cibis ⁊ po/ tibꝰ ⁊ alijs neceſſarijs rebꝰ ⁊ dimiſſione exiccantiū ꝙ ſu/ pra in cura meri ſtōi ē ꝑdictū. Medicine vo ſunt ūncte ⁊ iniecte ex humectātibꝰ q̄les ſunt mucilago pſilij ſemē ci/ tonioꝝ: dragagāti: albumis oui: lactis mlieris vel aſine vl̄ capre oleū roſ. ⁊ violis amigdal' dulciū decucurbita ⁊ me lonū: iniectis ſingulariter vel ↄmixte ⁊ approxiate tepide aq̄. Et qn̄qꝫ debet ei miſceri aliqd ſtupefactū ⁊ ꝑpe cū do lor vel ardor ē vehemēs vt ē ſemē iuſqami albi vel lac ſe/ minis papauer. vel etiā opij. Eiꝰ vero qui ē ex vlcere vel ſcabie vulneꝝ mēbroꝝ cura eſt: cura vlceruꝫ ⁊ ſcabiei an̄ dicte. Et ex appropatis medicis eiꝰ ſimplicibꝰ eſt ligri per oēz admiſtratōis modū ⁊ aſſūpta ꝑprie ⁊ iniecta. valꝫ.n. ardori vrine vlceribꝰ renū ⁊ veſice ſcabiei ipſiꝰ ⁊ myrra ⁊ citoniū ⁊ ꝑprie ſuccꝰ eiꝰ aut oleū cū diſtillat̄ i virgā ⁊ gra/ na pini: ⁊ ſemia cōia ⁊ ius galline mediocriter piguis ⁊ la/ ctis grana ꝑdicta. Et ex cōpoſitis eſt. Syrupꝰ expꝰ ad ar/ dorē vrine ex vlcere viarū vrine vel ſcabiei veſice remit/ tens ardorē ⁊ ↄſolidās vlcera. ℞. vngule caballine virge paſtoris cōſolidemi. pinpinelle graſſule capilloꝝ veneris bugloſſe. an̄. M. i. ligri. violaꝝ malue. an̄. ʒ. i. iuiubaꝝ. ſe/ ueſten. an̄. xi. papaueris: vel ſemis lactucaꝝ portulace. an̄. ʒ. ſ. ſeminū cōiuꝫ ordei. an̄. ʒ. iiij. çuccari lib. ij. çuccari vio/ lati. ʒ. iiij. ¶ Troſciſci ꝑprij ad idē ſunt nr̄i alkechengi: ⁊ alij ⁊ experti quoꝝ deſcriptio eſt. ℞. ſeminū cōiuꝫ purga/ toꝝ. papa. amigda. amidi dragagāti: ſemis altee portulace lacce lote rubi. an̄. ℈. ij. ⁊ ſ. terre ſigillate. ʒ. v. pineaꝝ pur gataꝝ chechengi macis. an̄. ʒ. iij. ſucci ligritie: pſilij integri an̄. ʒ. x. Cōficiat̄ cū lacte aſine. ⁊ fiāt trociſci. ʒ. i. doſis eoꝝ ʒ. iij. cū ꝑdicto ſirupo. Prius tn̄ ꝑmittit̄ mūdificatio vl/ cerū cū ſtipticis ⁊ vnctis ſic̄ ſunt ꝑprie aq̄ mellis vel çuc/ cari cū aq̄ ciceꝝ: ⁊ deīde lac: qr mūdificat ⁊ icarnat. ¶ Ca uendū aūt ne ſtōs ſit itēperatus: vel adſit fe. deīde vtatur ꝑdictis: deīde icarnabis ⁊ ſigillabis. ſic̄ ſūt trociſci de cha rabe ſupradicti: ⁊ vncti cū lacte: ⁊ trociſci de cera. ⁊ ſic̄ ſūt tales quoꝝ cōfectio eſt. ℞. ſarcocolle amili ceruſe thuris albi. an̄. Cōficiant̄ cū lacte: ⁊ miſceant̄ cuꝫ eo ⁊ adde. ſi vis lutum ſigillatū ⁊ bdeliū mechiū: qr leniēdo ꝓhibꝫ exaſpe rationem: ⁊ minorat vrinā ⁊ lapidē frangit. ¶ Empl'z cō/ ſolidatiuū quo deīde empl'et̄ virga ⁊ periton eon acuunt. ℞. dactiloꝝ paſſulaꝝ gallaꝝ acatie aluis. ypoqſtidos yſo pi: ſtoracis merdaſengi ceruſe. Cōfice cū oleo roſa: ⁊ ſucco caude eqne ⁊ empl'et̄ cū eo corroſio. Si vo nō: tūc ſuffic̄: vt fiat cerotū ex cera ⁊ adipe galline: vel capre ⁊ oleo roſa cū ⁊ ſiſamio recēte ⁊ vngat̄ ⁊ iniciat̄. ¶ Trociſci experti. ℞. ypoqſtidos terre ſigillate charabe: coralli: amili: ſemen

citonioꝝ: ſe. altee. ſe. melonis: indi: apij: dauci. ana. Cōficiā tur cū lacte aſine dent̄. ʒ. ij. vel. iij. cū aqua fra. ¶ Tragea almāſoris ad mitigādū ardorē ⁊ dolorē cui opꝫ iſtare pri/ us. ℞. papa. ſemis melonis indi: ligri. ſe. citonioꝝ munda toꝝ. an̄. ʒ. i. pineaꝝ fiſticoꝝ. an̄. ʒ. i. pſilij itegri vl̄ iuſqami: qđ eſt ſecurrius: eius.n. ſuba nō vrit ſic̄ ſuba pſilij: niſi ſu/ mat̄ mucillaginis ipſiꝰ. ʒ. iij. an ſi. ʒ. ij. çuccari taberçet: qđ ſufficit. ¶ Puluis ad idem. ℞. caude eqne ⁊ ſiccet̄ ⁊ pul/ ueriçet̄ ⁊ da. ʒ. ij. in mane cuꝫ ſirupo mirtino ⁊ mucillagis pſilij. ʒ. i. cum aq̄ ligri. Et ſi videbis ibi lapidem adde bde lium mechiū. Itē ſi dolor intollerabilis ſit ꝑducēs ad re/ ſolutionē fiat emchatiſma. ℞. ſemis malue ⁊ folioꝝ eius: ſe. lini viola. mellilotí: ro. graſſule. an̄. floꝝ camomille ⁊ fe nugreci paꝝ bulliant in aqua fontis ⁊ ſedeat in ea tepida duꝫ migit: ⁊ poſt emiſſionē ifundant̄ filtrū vel ſpōgia ſeu coriū: ⁊ applicent̄ pectini virge ⁊ peritoneoni: deīde etiaꝫ iniciat̄ in virgā lac mulieris nutrici ex fridis ⁊ hūidis in quo ſit diſſolutū aliqd opij: ⁊ eo vngat̄ virga cuꝫ olo roſ. Potus extinctiuꝰ ſitis eoꝝ poteſt hora ſitis de ſirupo vio lato vel mirtino cuꝫ aq̄ ordei ſimplici vel dilatatis in ca: ſemibus cōibꝰ ⁊ melonis idi. ⁊ poſt cibū digeſto cibo i me ridie vel nocte mane poterunt ēt ſumere de lacte caprino mulieris vel aſine: ⁊ eſt bonū. Caueat aūt ne habeat ſtōꝫ itēperatum: abſtineat a vino oīo. Item inungat̄ epar de ceroto de ſandal'. noſtro. ⁊ ēt renes: ⁊ vtat̄ fridis ⁊ hūidis herbis: ⁊ fructibꝰ ſtipticis: ⁊ per iterualla ſi cōſtipatus ſit qdem plurimū cliſteribꝰ lenitiuis cū fridis ꝑdictis: ⁊ iu/ uet̄ natura. Cōtingit plurimū ꝙ cōpoſitio fiat ex ardore vrine: vlcere: lapide. Ex alijs itaqꝫ difficile eſt iuenire qđ multū ꝓſit. obſit aūt nihil: quo caſu cū ardorem habeat actu moleſtātem alia ipotētia: ⁊ nō ſentiat̄ alia continue ſicut ardor. imo nō niſi per ipm ardor plus ↄtinue atten deret alijs ꝑ iterualla: ⁊ local'r: ⁊ ſi nō ſimul qn̄qꝫ vni: qn̄/ qꝫ alteri eſt iſtādum. ¶ Iniectio magne efficacie ad ar/ doreꝫ vrine: ⁊ ē gualterij: ℞. pſilij partē. i. decoquat̄ in aq̄ ⁊ accipiat̄ ēt mucilago: ⁊ decoquat̄: ⁊ in oleo viol'. diſſol/ uant̄: ⁊ cū lacte mlieris puellā nutriētis: ⁊ adde pulueris cāphore. ʒ. i. ⁊ inijciat̄ totū per ſiringā: ⁊ ſi ſumat̄ mucila/ go cū camphora eſt ꝑpria. vt dixit ſerapio.

¶ Caplm. xv. de multitudine vrine ⁊ mictu in lecto.

m

Ultitudo vrine aut eſt cuꝫ q̄tō ↄtinuo: aut diſcre to. Si qdem cum q̄tō ↄtinuo quādoqꝫ eſt ſola, ⁊ cauſa ipius ↄtrarie ſunt cauſis diminutōis ipius ꝑdictis: ⁊ qn̄qꝫ eſt cū diſuria vel dyabete. ⁊ ꝓuēit ex cau ſis ipaꝝ ſuperiꝰ enarratis. Si vo ſit cū q̄tō diſcreto erit ꝑ modū diſtillatōis: ⁊ ex defectu ↄtētiue accidit: vl' expul ſiue vl' cā i vrina vl' alijs i cā diſtillatiōis ꝑdiſtictis: ⁊ ipa qdē ē cā mictꝰ i lecto: ⁊ ēt ōbilitas colli veſice ⁊ lacertoꝝ eiꝰ: nec nō reuocatio virtutis ſenſibilis cū qete a partibꝰ veſice vt nō ſentiat mēbꝝ vel grauedinez que in pueris vel infantibus conueniunt ſimul. Cum.n. in guloſitate ⁊ multa cibi ⁊ potꝰ aſſumptiōe ꝑſiſtat in eis vrina multi/ plicabit̄: ⁊ cū debilē habeāt cōtentiuā oēm ꝓpter ↄpoſi/ tiōis humiditatē. ⁊ proīde ſunt ꝓfundiſſimi ſomni certe grauata cōtētiua veſice ⁊ vrie multitudine: tūc vt virtus ſenſibilis ⁊ reuocata ad ꝑncipiū: ⁊ ſopita nō ſentiet vt ipe ret motiue. ⁊ retineat: deficiet cōtētiua cū lacertꝰ mollifi cat̄. nec vrina egredit̄. Et qn̄qꝫ coadiuuat acuitas eiꝰ cuꝫ ex guloſitate aliquā rē acutā ſumpſerit acuētem vrinam que ēt in maioribꝰ crapulatis qn̄qꝫ cōcurrunt. vt vrinaꝫ in lecto mingāt. brutoꝝ naturā: ⁊ infectionē ſui corporis fetidā ēt nociuaꝫ pretermittēdo verecūdiam attingētes. Cauſe vo multitudinis vrine ſunt note: ⁊ cura ēt ex his q̄ dicta ſunt in caplis ꝑdictis: ⁊ cura diminutiōis ipius. In/ qt hy. ↄria ↄrijs curāt̄. Et ex ſimplicibꝰ medicis ſt̄ q̄ a ꝓpe tate hn̄t miorare vrinā: vt lētes. ⁊ alia q̄ a ↄplone vt ſunt

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0375-3
DFG

bdelium mechium dactili paſſule pingues penidy. ⁊ alia
lenientia q̄ leniēdo ventrē minorant vrinā. Et caro ericy
triēni confert puero qui mingit in lecto ⁊ renes leporis
exiccari ⁊ cerebrū ei⁹. ⁊ enula cū qs aſſuete vtif ea ⁊ excu/
ſabif a freq̄nti mictura ⁊ oleū de been iunctū eſt vltimuꝫ
⁊ thus eſt cōueniēs mirabo. ciperū coriādrū gallia myrra
⁊ alia pōtica ⁊ ꝓprie ſi ꝑmittant eis aliq̄ lubrica vt ſupra
in diſurria dcm̄ eſt. Et oꝫ vt an̄ itroituꝫ lecti cōmoueat ſe
ad mingēdū ⁊ imaginet in lecto ſuo eſſe aliq̇d ſanctū ⁊ in
camera in q̄ ſit oratoriū aliq̇d. nā cū talis imagīatio rema
neat in ſōno retinebif fortaſſis vrina. ⁊ ſi vberet tūc timē
do retinebit. Et de medicis ꝯpoſitis ſunt q̄ ex ꝑdictis cō/
ponūf ⁊ q̄ ſequunt. ¶ Cōfectio medicamis ad mltitudi
nem vrine ꝯueniēs. ℞. caſtorei mirre albaſce copularum
glandiū piretri. an̄. ptes eq̄les fiant ex illis pillule cuꝫ aq̄
mirte hūide de qb⁹ ſumat ad manſionē. ℥. i. ¶ Cliſtere ad
illud bonū ⁊ ꝯfortat renes. ℞. ſuccū albaſce decoctuꝫ do/
nec iſpiſſet ⁊ vitellis oui. ⁊ adipē renū capraꝝ colant ⁊ re/
ſeruent oīa illa eq̄liter aggreget ⁊ aſſumat de lacte recē/
ter mulſo ⁊ butyri ⁊ adipis gibbi camelli ⁊ olei albaſce al/
chāna ptes eq̄les. doſis ſilis ꝑme. ⁊ ꝯquaſſant iuicē. ⁊ fiat
ex eis cliſtere. ¶ Cōfectio cuꝫ vino iuuatiua ei⁹ q mingit
paꝝ ⁊ freq̄nter i modū diſtillatiōis. ℞. vniuſcuiuſqꝫ miro
ba. an̄. ℥. x. glādiū iſuſaꝝ in aceto die ac nocte torrefacto/
rū ſandarache cipi. thur. maſ. enule ſicce ſtoracis ſicce co/
ral. oiuꝫ. an̄. ℥. v. myrre ℥. iiy. Cōficiāt cū melle. doſis. ℥. ſ.
cum vino. ¶ Aliud exptū. ℞. glādium thuris myrre. ana
ptes eq̄les decoq̄nt oīa in vino q̄titatis. ℥. i. collent ⁊ po/
nant cū. ℥. i. olei ⁊ dent ⁊ ꝯferāt. Trociſci ꝯfecti ex maſſa i
qua poſita eſt ṽtus fimi colūbini cū aq̄ fra. ſunt. n. vltimi.
Et cliſtere cū medicis retinentib⁹ vrinā ⁊ iniectio eaꝝ q̄s
ſupra dixim⁹. Aliud ſerapiōis ſumant glādes ⁊ iſundant
in aceto die ⁊ nocte: deide frigant in patella: ⁊ terant ⁊ ſu
mant ex eis. ℥. x. miroba. emblicoꝝ. ⁊ bellericoꝝ torreſa/
ctoꝝ. an̄. ℥. vy. croci thuris. an̄. ℥. vy. granoꝝ mirti. ℥. x. terā
tur ⁊ cribellent ⁊ dent ex eis. ℥. iy. in aq̄ i qua ſubmergit
ferrū ignitū. Remediū ad mictū in lecto vbi ꝓhiberi nō
poſſit. ℞. veſicaꝫ ⁊ imitte in ea oleū ⁊ dimitte per horā vt
madefiat eo bn̄: deide imitte virgā in eā: euacuato oleo ⁊
paꝝ dimiſſo i ea: ei liga eam ad caput virge ⁊ anchas: ⁊ dor
miat cum ea. ſi enim minget nō minget in lecto: ſed in ea
⁊ remanebit in lecto.

¶ Incipit Sūma tertia quarte particule. ſectiōis ꝑme cō
tinens capitula ſpecia lia. xxi.

PRinceps medicorum

Hali. ingt. q̄ꝫ multis. n. exn̄tib⁹ dogmati/
bus nālib⁹. Et pp generatōeꝫ ⁊ corruptio
nem aīaliuꝫ ſanitates ⁊ egritudies. ⁊ cura
i ea ſolū vnū nutrif id Eriſiſtrato ⁊ viris
hmōi. i. alic⁹ grā oīa facere nām: ⁊ ianiter
nihil. Et q2 illud cui⁹ grā. oīa fecit nā hō eſſe dignoſcif: q
cum ſit periculo nāe reſolōni ſupposit⁹ nō ſtet ſemp. ſꝫ de
ficit in termio ei nāliter ꝯſtituto ⁊ plimū ifra abbreuiato
ꝓuidit ne deficiēte eo. ⁊ ſic oīa inaniter egerit: vt ſemp per
maneret in vita ꝙ vel q̄ꝫdiu diſponit diuina ſapiētia quo/
quomō. Et ꝑ inde in corpore hois vltra nutritiua mēbra
ad cōſeruationē. ſic prefiniti ex eſſe ipſi⁹ ſunt neceſſaria ꝑ
creauit alia eis q̄ virtutes iposuit deſideratiuas cuꝫ dele/
ctatione grandi qua iclinaret ⁊ ꝓuocaret hō plurimū ad
coitum ⁊ effectiuas ad ſui ſilis generationē. per q̇d ſucceſ/
ſiue ꝑduret in vita: q̇d ex ſe ipſo ſemp nō valuit ꝑmanere:
q̇d Auer. ⁊ Ar. voluit cū dixit. Oīa. n. illud appetūt. ⁊ pp il
lud eſſe agunt. Et q2 gn̄atio hois fit imiſſo ſpermate i ma/
tricem velut ſemē plantaꝝ in terrā. ⁊ aliq̄ ꝓcreauit mem
bra q̄ ad ſpermatis gn̄atione ēt faciūt ⁊ in maribus: ⁊ feis
teſtes. ſ. ⁊ ſeminaris vaſa ⁊ in ſeminātib⁹ marib⁹ ad emittē
dum virgā ⁊ ad receptionem ipſius ex quoqꝫ emiſſum eſt
. ſ. matricē in femis tāq̄ꝫ locū ꝓpriū ꝯſeruatiōis ne pereat.
Et in quo ſuā facit actionē nec nō generatiōi longius ꝓui
dendo in eis vbera ꝓcreauit cōtiguata matrici ꝑ q̄ſdā in/
termedias venas per q̄s ſanguinē ad matricē imiſſuꝫ tpe
cōceptionis poſt partū reaſſumerēt vbera ipſa retrahēte
nā: vt ſua ṽtute cōuerſus in lac valeat nutrimētū ydone
um preſtare fetui donec mandare dura poſſit. Sublimis
itaqꝫ deus in marib⁹ ⁊ femis creauit teſticulos generatio
nis ꝑncipalia inſtrumēta: in marib⁹ manifeſtos pendētes
in burſa. in femis vero occultos in duob⁹ matricis corni/
bus collocatos ex carne glandoſa alba iter membra ꝑnci
palia nūeratos ad generandū ſperma: q̇d gn̄atiōis exiſtit
ꝑncipiū effectiuum ex mare: ⁊ māle ex femina ex humidi
tate delata ad eos in venis: que eſt quaſi ſupfluitas quar/
ti cibi in corpore toto. Et eſt ſanguis magis digeſtus et
magis ſubtilis quem alterant propria complexione ⁊ con
uertunt in albedinem ⁊ ſimilitudinem ſuam: ad quod ad
iuuat commotio aereitatis in ipſo per ſpiritum ⁊ forman
tem ipm ſic mamille ſanguinem venienteꝫ ad eas ex ve/
nis: ⁊ queādmodū ecōtra: epar chilū albū ad ſe tractū cō
uertit in rubedinē ſanguīs: vis. n. agētis eſt aſſimulare ſi/
bi patiēs. Creauit quoqꝫ duos pp cām dictā ſupra in reni
bus ⁊ rotūdos: vt eēnt ſalui ⁊ nocumēto: ⁊ a ſiphac maio
re ꝓcēdūt duo meatus vocati didimi veniētes ad teſti/
culos quos cōprehēdunt ⁊ aperiūt: vt duo folliculi itra
burſaꝫ cū meatib⁹ illis: venit quoqꝫ ad duos teſtes de ve
nis pulſatilib⁹: ⁊ q̄etis plurimū ramificatis ex vena pulſa
tili ⁊ vena q̄eta que illaꝝ ſunt radices ramificatiōe pluri
morum. ⁊ iuolutionē cū anfractib⁹ multis deferentibus
humiditatē illam ſanguineā que eſt mā ſpermatis in q̄/
bus aliquā recipit alterationē virtute carnis glandoſe in
qua iuolute ſunt iuxta teſtes ex q̄bus infundif in teſtes:
⁊ ibi fit ſperma ꝯpletū. Etiā ibi gn̄ant duo foramina que
ad virgā vadūt: cui⁹ eūo fit: cū illa replentur vētoſitate
groſſa: ⁊ vene arterie ei⁹ ſanguinē ⁊ ſpiritū: ⁊ calorē. Cum
eni virt⁹ imaginatiua imaginat coitū ex ſe ꝑncipalr: vel
ex ſenſibili a nāli appetēte cōmota cuꝫ ſit vna de ṽtutib⁹
ſuperiorib⁹ ꝑcipit ꝯcupiſcibili q̄ ē i corde: vt mittat ſpūꝫ
⁊ calorē ad genitalia mēbra. ⁊ calor illi fortiter veniens
diſſoluit hūiditates ꝯtētas i venis ⁊ arterys i motu: quo
erigif virga ad iniectionē ſemis in matricis concauū. alr
eni nō poſſit imitti: ſic. H. declarat. Et tūc nō q̄ſcit ab ex/
timatiōe ſua virga q̄ꝫdiu vaſa ſpmatis tēſa fuerit. que q̇d
i eis ē expellere appetūt: ſiue ſit ſpma multū: ſiue acutus
ad q̇d adiuuat caput virge cuꝫ fricatū fuerit: q̄re a vaſis
illis trahif ⁊ effundif ſperma: ⁊ ex ea mittif in matrices
Et in coitu nāli cui obuiat matrix cū orificio ſuo aperto:
⁊ trahit illud deſiderās ſua ꝓpria ṽtute valde. Et ex teſti
culis ſuis pre delectiōe ēt ꝓcedit ſperma q̇d gn̄at in eis
ad matricis cōcauū. cum ergo cōcurrunt ambo ⁊ oīa ſibi
iuicem ꝑmiſcent tēperant: gn̄atio ꝓcedit. Uaſa vō ſper
matis dicta ſunt: velut duo meat⁹ ꝓcedētes ab vnoquo/
qꝫ ouo nō gn̄ati ab eis: ſed cōtigui eis apud ipa oua: ſeu te
ſtes dilatati manifeſta dilatatiōe. deide cum ꝓcedāt ad
virgā ſtringunt ꝯſtritiōe lacertoꝝ generatoꝝ ſup ea ⁊ in
mulierib⁹ ramificant iteꝝ apud ſtatū ſuū. Et in ꝓceſſu
ſunt aſcēdētes verſus iguia poſt ꝑnpiū: deide deſcēdētes
vſqꝫ ad collū veſice ſub meatu ṽge. vt ēt ⁊ q̇d eſt iter ipa
digō ſpermatis ꝯpleat: donec redeat ad meatū: ⁊ expellā
tur in virgā donec oꝫ ipm ꝑfici illo tpe breui cū coit⁹ cele
braf. Uirga vō ē mēbꝝ viri tale generatū ⁊ ſituꝫ ex car/
ne ligamēti orta: ex carne pectinis plīme ꝯcauitatis ⁊ ve
nis. ⁊ neruis ortis a ſpōdilibus caude: ⁊ ſunt ligamētales
nō ꝑuati ſenſu ſubmerſi in ea. Et nerui cū q̄bus erigif ſūt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0376-9
DFG