ni:cũ neq₃ febris:neq₃ calor affuerit:ſ₃ aderit ventoſitas
magna. ℞.caſtorei:opij aſſati:ſtoracis liqde:myrte:ſemi/
nis iuſqami ru.thuris:añ.ptes equales:mellis qḋ ſufficit
ad ſpecierũ cõſperſionẽ:doſis ẽ a.ʒ.ij.vſq₃ ad.iij. ¶ Itez
cõfectio empl'i ad hoc de ſtorace. ℞.cimini aſſati.ʒ.ij.te/
raẽ ꝛ cõfice cuz ſtorace liqda. ꝛ applica ſup vẽtrem ſedat
dolorẽ.ſtrigit ꝛ reſoluit vẽtoſitatẽ. ¶ Cliſtere ꝯſtrictiuũ
valde ſcḋz eũdẽ. ℞. panici excorticati lẽtiũ:ꝛ riſi excorti/
catoꝝ:roſaꝝ ſiccaꝝ:balauſtiaꝝ:copulaꝝ glãdiũ:añ. M.
Loia in lib.iij.aq̃ pluuialis buliãt:donec ad tertiã redeãt
colenẽ:deide ſumaẽ ceruſe cineris q̃rte papiri:balauſtia/
rum:añ.ʒ.i.boli armeni.ʒ.i.vitellis oui aſſati.i.olei ro.ʒ.i.
Ex his oĩbus i predicto appoçimate fricãdo diſſoluanẽ ꝛ
cliſteriçeẽ eger bis vel ter. ¶ Modus licinij ſcḋz Alexã
drũ.quo vtiẽ qñ dolor ſit fortis:ꝛ vigilie:ꝛ ẽ mirabil'. ℞.
croci myrre:licij:olibani:añ partẽ.i.opij partes.ij.fiat lici
niũ de pano nouo:ꝛ torqueaẽ bene. ꝛ diſſoluaẽ opiũ i vio.
Et cum eo confice alias medicinas:ꝛ iuoluatur licinium
medicamine. ꝛ ponatur ꝛ cliſteriçatur cum eo in vulua
ad fluxum ſanguinis. ¶ Confectio trociſ. de alumine.
Recipe gallarum aluminis : acacie : balauſtie: corticis
granati:ſucci hipoqſtidos:ana. ptes equales:teranẽ ꝛ cli
ſteriçanẽ cũ decoctõe mediane corticis glãdiũ:balauſtia
rum ꝛ roſarum. ¶ Itez. ℞.tapſi barbaſſi:ꝛ adde parum
piperis. ꝛ coque in optimo vino acetoſo : ꝛ calidum quã/
tum tollerare poterit applicetur ano. valet tenaſmoni : ꝛ
egreſſioni ani.

¶ Caplm.v.de emoroidibus ꝛ medicinis eius.

e Moroides ab emoroſagia dicte ſũt:eo ꝙ ab eis
plurimũ ſanguis fluit. Unde.H.ait. Emoroides
ſunt fluxus ſanguis ex ano.quez ipoſſe eſt eẽ ſine
apitiõe venaꝝ q̃ ſunt i eo.Eſt.n.anus foramẽ iferius poſt
tũ ſub cauda expulſiõis ſupfluitatũ ſiccaꝝ deſeruiẽs:cui
cõiungiẽ extremitas iteſtini recti i quo ẽ lacertus vnꝰ la/
titudinalis ſua ꝯtractiõe retinẽs ipas ꝑ velle. ꝛ ꝓhibens
egreſſiõez hora icõueniẽti:ꝛ extẽdiẽ in egõne:nec nõ ꝛ ca
capita venaꝝ quinq₃ emoroidaliũ ſunt in eiꝰ circuitu po/
ſita.Egritudines ergo euenire poſſibiles ſunt plures ſecũ
dum pluralitatem eoꝝ que cõueniũt in ipo.Et ſunt emo
roides apoſtemata:ragadie:fiſtule:vlcera:ꝛ mollificatio.
quare egreditur iteſtinum rectuz que omnes ſunt diffici
les ad ſanandum propterea aggregantur in eo ſuperflua:
quorum eſt via penetrans ad inferius in quo eſt ſituatus
vſque ſuperius: ꝛ eſt fortis ſenſus:quare quod deſcendit
ad ipſum dolorem ad auget ꝛ diminuit ipſum a quiete cũ
qua completur receptio iuuamenti medicinarum.
Diuiduntẽ aũt emoroides dupliciter ex pte eiꝰ quod.H.di
xit apertionẽ oris venaꝝ que i ano ſunt qḋ denotat mem
brũ ꝛ a parte eiꝰ qḋ dixit eſt fluxꝰ ſanguis q ẽ accñs.ſ.a cor
pore exeũtis. Primo mõ q̃druplicĩter a pte ſpẽi loci diſpõ
nis:ꝛ finis ſeu malitie. A pte ſpeciei:nã ſunt eiꝰ tres ſpẽs.ſ.
verucales morales:ꝛ vuales ſeu veſicales:verucales ſunt
que ſunt ſimiles verucis paruis ꝛ vue ſunt late rotunde
purpurei coloris aut ad purpureitatẽ decliues vel ſicut ve
ſice ꝛ morales ſunt molles ſanguinee. A parte loci:nã q̃dã
ſunt extra manifeſte q̃dã intus occulte. A parte diſpoſitio
nis:nã q̃dã ſunt apte quedã cece. A pte finis ꝛ malitie.naz
deteriores:ꝛ nociue magis ſunt verucales ꝛ occlte ꝛ cece
ꝛ ꝓprie q̃ ꝓpinquores ſunt in ſuo ſitu cãne veretri : qḋ ẽ q₂
qñ emoroides apantur oppillãt curſuz vrine.Et q̃ ſunt re
tro nõ nocẽt mltũ. Et a pte ſi moderate mittãt:vl' minus
debito:ſunt minꝰ male ceteris.ſi võ ſupflue magis male.
A pte eiꝰ ꝙ ſunt fluxꝰ ſanguis triplex.ſ.mãe q̃litatis ꝛ q̃ti
tatis ꝛ tpis:nã aut fluũt ſeu emittũt moderatũ ſanguinez
in q̃titate ſcḋm eiꝰ abundantiaz in corpore apparentẽ ad
eiꝰ expurgandas ſupfluitates ſecũdũ hyp. ꝛ cõuenienti q̃/
litati:q₂ nigrũ ꝛ tpe q₂ in ꝯſueto ꝑiodo: Aut ecõtra i oĩbus
aut coꝝ aliquo.ſ.q̃titate vl' q̃litate vel tpe ꝑmo mõ talis
fluxus dicẽ eſt a.H.nãlis ſcḋm formã qdẽ ſcilicet ꝯſuetũ.
eo ꝙ ꝯſuetudo eſt altera nã ſcḋm hyp. Nec dixit ipm ſim/
pliciter nãlẽ ꝓpter cãm iferius aſſignandã. Secũdo mõ
inãlis:ꝓpter qḋ aduertẽdũ ꝙ fluxꝰ ſanguis q de corpore hois
ꝓcedere ꝯſueuit plurimũ ẽ triplex. Menſtrualis de nari/
bus:ꝛ emoroydalis ꝑ virgã ꝛ iteſtina malus eſt:ꝛ ꝑ os etiã
qualiſcunq₃ ſit:vt dixit hyp. Mẽſtrualẽ vero.H.inter ali/
os dixit nãlem abſolute de naribꝰ.ſil'r yſaac de emoroidi
bus hyp.bonũ:ꝛ nãlez dixit cũ ꝯditione:ſi videlicet niger
exierit. Propter ꝙ ſciendũ ꝙ fluxus emoroydalis in ho/
minez nãliter eſſe non dz:ſed ꝓter nãz ꝛ accidaliter tan/
tũ.hõ eni cũ ſit nãliter ſanus ſuaſq₃ ꝑfectas oꝑationes ha/
beat in etate in q̃ ad finẽ ꝑuenit augmẽti exiſtẽs ſi debite
regulaẽ ſanguinẽ talẽ agregare non debent:maxime ſi ſe/
xus fuerit maſculini q ter ſexus magis exierit ꝑfectꝰ. Unñ
nec emoroidaꝝ fluxũ nec aliquã aliã eundẽ manifeſtã ſu/
perfluitatẽ tertie ꝛ q̃rte digõnis dz habere. vnde etiam ſu/
dor in eo preter nãm eſt vt theophilus inqt. In ſexu autẽ
feminino qui eſt imꝑfectus cũ femina ſit maſculus occa/
ſionatus ſecundũ philoſophũ.quantũcunq₃ ſanꝰ debet ha
bere euacuationẽ ſanguinis ex ſui lapſu mltiplicati ſic ha/
buerit nãliter menſtrua ad expellendũ groſſuz ſanguinis
Et q₂ contingebat aliquando licet raro ſubtilez ſanguinẽ
abundare in ea ſuperiora petens ſtatuit nã fluxuz ſangui/
nis nariũ vt eo educeretur vel vt illo defficiente expellaẽ
per nares:vt hyp.dixit cũ ait in affo. Mulieri menſtruis
defficientibꝰ ſanguinem ex naribus fluere bonum. Pro
inde yſaac dixit omnẽ fluxũ ſanguinis ꝓter nãz preter flu
xum ſanguinis nariuz ꝛ menſtruoruz. Non ergo emoroi/
dalis fuit neceſſarius ei cum ſanguis groſſus ipſe mlicus
menſtruis educaẽ ſicut quandoq₃ ecõuerſo cõtingit.igiẽ
talis fluxus nãliter in eo eſſe non põt:ſed preter nãz ꝛ acci
dentaliter tantũ inq̃tũ puta contingit a generatione tem
pore vel etate hoiez i ſua idiuiduitate labi a ſanitate ꝛ nõ
feminaz tantũ:que ex ſuo ſexu lapſa exierit. Quapropter
contingit ipm ſanguinez in corpore mlicũ aggregari quẽ
nãm impellere eſt neceſſariũ ad id cõpulſam ad illas par
tes ani ad quas ſua grauedine tendit vt inde extra corpus
expellat.Sicut eniz femina lz in ſuo ſexu lapſa a ſit põt ta
men in ſua indiuidualitate habere aliquã perfectionẽ ꝑ
quã carebit menſturis vt nihil vel paruz habeat: ſicut eſt
virago: vt ariſto.ponit ꝛ Abo.ſic mas perfectus in ſe a ſua
ꝑfectione a generatione tempore vel etate labi poterit:vt
ꝑ eius emoroydes fluat ſanguis. ꝛ ẽt mulier multo magis
cum ſit in ſuo ſexu lapſa:quare tamẽ in ea abũdabit tunc
mlicus ſanguis ꝙ ad eius cõpletã mundificationez men/
ſtrua non ſufficiunt ſi fluant:ſed emoroydibꝰ etiã ſupple/
ri oz ſic accidẽtaliter talis fluxꝰ ſanguinis emoroydalis: ꝛ
preter nãm in hoie ꝛ non nãliter eſſe poteſt. Cõſideratus
autẽ ex ſe talis fluxus vt cõſuetus factus q̃tuz ad ſuas cõ
ditiones variantes ipſum poteſt eſſe nãlis ꝛ preter nãz:vt
ſuperius dictum eſt.ſicut etiam fluxus ſanguinis narium
ꝛ menſtruorum ſicut voluit.Hal.Cum enim ſint tẽperati
in quãtitate ſuperflua vel diminuta vel qualitate vel tem
pore quia in conſueto perydo ſunt naturales:cum vero i
temperati in quantitate ſuperflua vel diminuta vel tem
pore:quia continuatio fuerit preter naturam. Sic fluxus
menſtruorum etiam ad intra qui dictus eſt a. Hali.ſolus
naturalis cum proſit ſpeciei ꝛ indiuidue ſecundum tales
conditiones:dici poteſt naturalis ꝛ preter naturã. Ex qui
bus concludendum eſt fluxum ſanguinis menſtruorum
eſſe naturalem ꝛ emoroydarum preter naturam: ꝛ ex na/
ribus medium inter illos comparatione habita reſpectu
corporis cui debentur ꝛ in ſunt. Sed inquantũ facti ſunt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0352-4

conſueti. ⁊ ſic naturaliter vnuſquiſq; nālis ⁊ preter nām
dici poterit ſuis cōditionibus variatis. ex quibus effect⁹
vtilis ⁊ inutilis poteſt ſeq. Et ſi ſolutionē cōtinui corpori
ineē preſupponāt ſemꝑ. dū tñ ꝯſuetam ſint formā cōſer-
uātes illā paruā ⁊ nociuam ſenſibilr̄ preſupponūt que cor
pori perfecte ſano ſcd̄m. G. pōt ineē dummō nō illā pre-
ſupponit grādē ⁊ nocuā ſenſibilr̄. q2 virtutes ⁊ oꝑationes
debilitāt manifeſte. ⁊ ꝑinde a. G. tunc dicte ſunt ꝑter na-
turā tñ: eo mō qui dictus eſt ſupra. Cauſa emoroidarum
nālis diuerſa eſt ſcd̄m diuerſitatē ſpecieꝝ. Nā eſt melan
colia ⁊ ſanguis melācolicus plurimū: quoꝝ melia eſt ve
rucaliū cauſa melancolicus vō ſanguis moraliū. Flegma
aūt raro cauſa eaꝝ exierit. ⁊ colera rariſſime ſenſiū petēs
ꝓpter leuitatē. Et dignius eſt vt a flegmate veſicales fiāt
ad modū veſicaꝝ ventriū piſciū ⁊ vue medio modo iter
has ⁊ illos exiſterēt. Cauſa vō efficiens duplex ē ꝑncipalr̄
operās ⁊ coadiuuās. Pria ē nature cretice. vel ſinto māꝫ
illā ad partes īferiores trāſmittēs: Coadiuuās eſt graui-
tas humoris īclinās ipm ad partes īferiores mēbri debi-
litas recipiētis. q2 villis ⁊ caliditas eius: ⁊ dolor trahēs ſi
adſit. his. n. in venis ani mā multa aggregat: quare neceſ-
ſe eſt eas repleri extēdi. ⁊ dolore ꝓpͤe cū eaꝝ orificia pre
fortitudine obcecent: ⁊ qñq; aperiunt: nō tñ complete.
Quare paꝝ ſanguis vel ſubtilis. ⁊ nō pfecte fluit. Qñq;
aperiunt qñtum oꝫ. vt tñ qñtū abūdat: euacuet. qñq; plu
res q̄ opꝫ. vt ſuperfluū effundat. Cauſa formalis ⁊ fina
lis eſt nota. quia vt expellantur nociua. Signa emoroi-
darum que extra ſunt ſenſui in ſuis ſpeciebus ⁊ diſpoſi-
tionibus ſunt manifeſta. Que vero intra parum expreſ-
ſionem manifeſtantur. Que vero ⁊ multum grauedine
⁊ dolore intus in ano percepto maxime apud immiſſio-
nem cliſteris ⁊ imiſſionem fecum: ⁊ proprie ſquiballarū
⁊ ex materia illarum proprie infectarum: ⁊ exitu ei⁹ poſt
illas ſi aperte fuerint. Si vero cece īfectio nulla erit: nec
etiam materie exitus poſt eas. niſi forte alicuius mado-
ris ⁊ dolor fortior ſimilis ei qui eſt ex vlcerib⁹ ani: qua-
re credunt multi habentes vlcera emoroides habere cū
non habeant: ſed vlcera tantum. ⁊ econuerſo. Que diſtin-
guit ab illis exitus ſaniei: ⁊ puris. ⁊ mordicatio percepta
in vlcera apud emiſſionem: fecum etiam liquidarum.
Et dum emittitur ſanguis malus: corporis color meliora
tur ⁊ pulchrior magis fit. Cum vero retinetur ⁊ bonus
emittitur vel retinetur mutatur color habentium emo-
roydas ad ſubrufedinem ⁊ viriditatem vt ponit Abo.
Cum vero malus emittitur: ⁊ deide bonus mutatur co-
lor ad citrinitatē: ⁊ deide ad palorē. Et cū retinet ⁊ nihil
emittit: dolor in dorſo erit ⁊ grauitas in coxis ⁊ cruribus
⁊ īflāmatio in lateribus: ⁊ gurgulatio in vētre. ¶ In cura
emoroydaꝝ duplex eſt regimē: ꝓpriū ⁊ cōe. Cōe gdē cor-
pori toti debet ⁊ ſpēbus eaꝝ cōiter ꝯfert. Et eſt qnq; res.
Prima eſt hūor ⁊ ſanguis adeq̄tio ⁊ eſt vt ſanguis mlicus
⁊ mlia ⁊ etiā flā abūdans in vniuerſo eūet ⁊ purget tēpo-
re apertiōis eaꝝ vel ante eūonem ſanguis mlici cōplent
flomie de ſaphena ꝓpͤe cū de iteriori parte calcanei: et
vene almabil. i. curuature poplitis: purgationeꝫ humoris
mlici ⁊ ēt flegmatis detinētis ſanguinē ne fluat ad extra:
vel ēt colerici vincētis in ſanguie: q̄re ſupflue fluūt com-
plent ꝓcedētia digeſtiua ⁊ ſubſequētia farmaca ipſoꝝ ex-
purgantia ꝓpria ſupra in cura icteritie nota. Fiet aūt ī re-
centis ⁊ cecis cū aliquo acutoꝝ: vt ſūt gūmarum ſpēs. ⁊ ſi
milia. In fluētib⁹ vō cū aliquo farmaco. ſtipticoꝝ: vt ſint
mirobolani citrini mirob. bdeliū. ⁊ ſilia. Scd̄a res eſt de-
riuatio q̄ complet cum vētoſis īter ſpatulas q̄ ad omneꝫ
mām deriuandā ſimul cōueniūt. Et ſi gdē virtus debilis
ſit ſine ſcarificatione fiāt. Si vō fortis cū ſcarificatiōe. Si
militer quoq; ⁊ alie eūones antipaſſiue ēt cū flomia ō ba-
ſilica ſiniſtra vel dextra facta. ⁊ alie ſpēs deriuatiōis note
vel ad mēbrū vel ad cutē cōiter deriuātes vel trahentes
ad locū mām in recētis ⁊ cecis. Tertia res eſt cōplexionis
totius alteratio ſanguis ⁊ hūoris ac epatis ⁊ ſplenis: q̄ ta-
lem hñt generare ⁊ multiplicare humorē. Regimis quo
q; rectificatio: vt tales mā in ſanguie nō vlteri⁹ aggreget.
Alterantia cōplexionē totius epis ⁊ ſplenis ſupra vbi de
cura eaꝝ dictū eſt hūiſti. Rectificatio aūt regimis eſt vt
oīa mlica ēt ſanguinem adurētia ex cibis ⁊ potib⁹ obmit
tant miniſtrent ea ꝓpͤe q̄ habēt bonū ſanguinē genera-
re ipmq; mūdificare q̄les ſunt cibi ex panibus mundis ⁊
recentib⁹ ⁊ carnibus gallinaꝝ ꝓpͤe ⁊ agnoꝝ aīalium et
edoꝝ vituloꝝ lactantiū ouoꝝ ⁊ epatū gallinaꝝ ⁊ piſciuꝫ
petrinoꝝ ⁊ ſquamoſoꝝ mediocriū paruoꝝ. Et ex herbis
vt borago bugloſſa: ⁊ endiuia ꝓpͤe: ⁊ alijs mūdificātib⁹
ſanguinē ⁊ pot⁹ boni vini albi clari odoriferi maturi: me-
diocriter limphati. ⁊ ſilia. Ex fructibus poma ⁊ granata
dulcia amigdale vue ficus: bñ mature ⁊ ſilia: niſi ſolō vē-
tris ⁊ fluxus pl'im⁹ adſit: quo caſu ſtiptica in quā huius lo
cum hñt vel ꝑdictas eis admixta. Quarta res eſt viarum
⁊ ductuū per quos ſāguis a ſuperiorib⁹ currit ad eas coar-
tatio vel aperitio cōplet aut cū ſtipticis eplīc in dorſo ⁊ re
nibus ⁊ aperitiuis notis. Quinta eſt nāe lenificatio: vt fe-
ces anū ſua duricie nō offendāt ⁊ doleant: quā cōplēt cibi
⁊ potus lenificātes ⁊ medicie q̄s ſupra in cura colice ex fe
ce ſicca ſerioſius nūerauim⁹. ⁊ in cura vlceꝝ īteſtinorum.
¶ Proprium aut vnicuiq; ſpēꝝ debet. Cōſiſtit aūt in lo-
calibus remedijs q̄ circa ipſas ſpēs: ⁊ diſpōnes ipſaꝝ mini
ſtrare opꝫ: q̄ ſunt multe ⁊ diuerſe: vt ſuperius dictū ē. Aut
eni ſunt replete ⁊ cece quas oꝫ feſtinanter aperire ac inge
niari vt ex eius apertiōe retentus paulatine effluat ſāgui-
nis qñtum poſſe eſt: donec debilitati appareat ⁊ ex nigredi-
ne mutet in colorē rubeū clarū. in ſanguie enim fluēte ta
li ex ano ⁊ ex emoroydibus eſt iuuamētū. ſedat eni in eis
mox dolor ⁊ fit ſecuritas ab erpete heſtiomeno epilīa me
lancolia ⁊ mania eriſipila miliari excoriatōe cancro lepra
freneſi pleureſi ⁊ peripleumōia. Et qñq; retinetur ſāguis
ex eis currere cōſuetus timet aliqua coꝝ egritudinum ⁊
idropiſis. Et pp corruptionē cōplexionis ex multitudie ⁊
malitiā ſanguis ⁊ timet ptiſis ⁊ dolor pulmonis pp expl-
ſionē ſanguis mali ad ipm cū repletōe extēdente ⁊ frāgē-
te venas ſua multitudine ⁊ ſua acuitate vlcerātis. Aut ſūt
aperte nimis quas ne multus ⁊ ſupfluus exeat ſāguis ad
irreparabilem defectionē adducēs oꝫ claudere ⁊ ſangui-
nem reſtringere ⁊ retinere: ⁊ hoc cū defectio īceperit ape-
rire. eſt eni cōe ſignū nos ad reſtrictionē īuitans in oī flu-
xu nō ſolū cretico: ſed ēt ſinthomatice: vt Abo. dicit. In ſu
perfluo. n. ſanguis fluxu ſpiritus deficere cōſueuerunt: di
xit Hal. calor naturalis diminui ⁊ etiā reſumptionib⁹ ven
tres humectari digeſtio epatis ⁊ alioꝝ membroꝝ debili-
tari qua ſanguis minuit ⁊ aquoſitas augmētat. ⁊ ſic idro
pem fieri eſt neceſſe ⁊ plurimū ſequi mors. Aut ſunt emi-
nentes ⁊ apparētes extra atq; pendētes ⁊ plures quas īci
dere opꝫ vt cadant. ⁊ deide cauteriçare ad retentionē ſan
guinis īciſionis. Aut ſunt dolētes quarū oꝫ ſedare dolo-
rem ne ad reſolōnem adducant ⁊ mām magis ꝓuocēt ad
currendum ⁊ apoſtemādū: q̄ oīa cōplere oꝫ cum medicis
ſimplicib⁹ ⁊ ꝯpoſitis ꝓprijs ⁊ ex partis īt⁹ ⁊ extra appro
ximatis. ⁊ per oēm modū cum ꝓprio ingenio: qđ ſubiuge-
mus ſtatiꝫ. Si ergo plene ſūt tumentes ⁊ cece in aperien-
do eas duplr̄ ingeniari opꝫ. Primo vt lenianī cū balneis
fomentis ⁊ ſeſſionibus in aquis dulcibus decoctiōis mal-
uarum mercurialis brāce vrſine melliloti radicis altee ⁊
alioꝝ hñtiū virtutē ſubtiliatiuā cutis. vt ſūt: ruta ⁊ vechu
en. Et ex ill' ſūt piguedines gibbi: camelli: ⁊ adipes anatis
galli: vulpis: lupi: leonis: ⁊ vrſi: que mollificando ⁊ reſol-

uendo attenuant: ⁊ medule cerui: ⁊ olea: vt eſt oleum: nu
cũ: amigdalarũ amarũ de perſicis: ⁊ de criſomil ⁊ bdeliũ
diſſolutũ ĩ eoꝝ aliquo vl' vĩo. Scđo oꝫ vt cutis ſubtiliata
⁊ mollificata aperiat̃. ꝑmo cum fricatiõe cũ folijs parita/
rie fici vel pãno aſpero ſi fuerũt apparẽtes ſuauiter aperit
⁊ occultas ad ꝓpatulum trahit ad qđ adiuuat ſithia ma/
gna applicata ano: ⁊ cuꝫ iunctione ex felle bouino: vl' ſuc
co atthalci ⁊ foliorum ficus ⁊ melle anacardino cũ ẽpl'is:
ex cepe ↄtrito ſic̃ eſt ex emplaſtro: vel cũ aliquo lacticino/
ruꝫ vt eſt brionia: anabula. ⁊ ſĩlia. Et cũ ſtaphiſagria ⁊ ſter
core columbio. ⁊ cãtaridib⁹ cũ ſucco flãmule: q̃ꝫ eſt pre
ſtantis iuuamẽti. Et empl'm de aſpalto ⁊ galbano eſt pro/
priũ: ⁊ expertũ eſt ſicut granũ arſenici ſublimati ſup liga/
tum. Caue tñ q2 eſt vehemẽtis acuitatis ⁊ ꝓfundationis
ne diutius ĩmoret̃. Et cerotũ balneãtiũ qđ gallicatuꝫ: qđ
fit ex calce arſenico. ⁊ alijs q̃ diximꝰ in apertione apatum
mamillaꝝ ⁊ vbi patiẽs nõ aborret magis ꝓpe ⁊ ſecure tol
lerabilius fit eaꝝ apertio cũ appoſitiõe ſanguiſugarum q̃
ſint totidẽ numero quot ſũt apparẽtes vel cũ fl'omi icĩſio
ne. Q2 ſi occulto fuerint nec poſſint trahi extra cũ ebibitis
aperiant̃ ⁊ collirijs longis. Cũ ebibitis gdẽ vt ſunt pillule
de aloe ꝓprie ⁊ radix yreos ⁊ cuꝫ collirijs cõfectis ex pul/
pa colloqntide. ℥. ij. ⁊ oleo amigdalaꝝ amaraꝝ. ℥. iij. ex q
bus fiunt licinia lõga donec locũ eaꝝ attingãt. ⁊ ſilr colli/
rium factũ ex pane porcino ⁊ radice brionie ⁊ alſcebran ⁊
felle bouino ⁊ cuꝫ dolor ex eis fortior fit extrahant̃: ⁊ lici/
nium oleo roſaceo iuncto mittat̃. Si vo aperte ſint minꝰ
debito ſupplebimꝰ cũ ꝑdictis aperitiuis vel cũ fl'omia ſa/
phene educẽte q̃ꝫtũ ſufficiẽs fuerit. Si aũt nimis aperte ĩ
geniabimus ipſas claudere ⁊ ſanguinẽ retinere cuꝫ ebibi/
tis plibus collirijs ⁊ empl'is fomẽtationibꝰ fumigijs liga
turis ⁊ cauterijs. Cũ ebibitis qdem dãdo ſauic ordei cum
ſpodio ⁊ luto. ⁊ alias ſpẽs luti ſanguinẽ dra. ⁊ alia reſtrigẽ
tia ſanguinẽ. ⁊ ex his q̃ dicta ſunt. ſupra in cura iteſtinoꝝ:
⁊ ſcoria ferri ſumpta cũ antiquo vĩo eſt ꝓpria. ⁊ pillule de
bdelio quoꝝ iuuamẽtũ in emoroydibus habẽtibꝰ perio/
dum eſt manifeſtũ ⁊ maiuſq3 in nõ hñtibus illas ⁊ cũ pul
uere ex ꝑdictis ⁊ puluere dicto ſupra in cura fluxꝰ ſãguis
ex ficteri. ⁊ ſimilibꝰ ⁊ collirijs factis ex his q̃ dcã fuerunt
in tenaſmonis cura. Et ex empl'is empl'm eſt de taxo bar
baxo elixato in vĩo põtico ⁊ cõtrito ⁊ mixto albumen oui
⁊ gallaꝝ puluere. ⁊ alijs glutinãtibꝰ notis ⁊ generãtibꝰ car
nem vt eſt maſtix thus albũ cũ ceruſa ⁊ ſĩlia vt radix pen
tafilon decocta ⁊ empl'ata. Et ex fomẽtatiõibus in qbꝰ ſe/
dere oꝫ eſt fomẽtũ cũ aqua ferri vel alumĩs in qua ſũt de
cocte galle balauſtie: ⁊ ſĩlia. ⁊ q̃nq3 decoq̃nt̃ in aceto puro
vel mixto illis. Et ex fumigijs exiccãtibꝰ ⁊ claudẽtibꝰ eas
eſt fumigiuꝫ ex pice ⁊ puluere thuris: qđ eſt fortis exicca/
tiõis ex ſandaracha ſtorace ſicca ſulfure ⁊ collophonia et
ſolatro. Et ꝓpria eſt fumigatio cũ ſoleo acalciamẽti ſicca
to: ſed oꝫ vt addat̃ cortex thuris ⁊ ipꝫ thus vt mitiget fe
torem ⁊ ex illis eſt baurach. tamariſcus ſemẽ eiꝰ nigella ⁊
myrra floꝝ carubaꝝ. ⁊ ſĩlia. Et ĩgenia in occultis cũ traie
ctorio ĩmiſſo in ano vt fumꝰ perueniat ad eas vel cũ vaſe
perforato ſup quo ſedat ⁊ recipiat fumũ ĩ ano. Et ligature
qdem oꝫ vt fiant cũ filo de ſerico vel lini vel pilis capitis
vel caude eq: ⁊ dimittat̃ donec ꝑ ſe cadãt. Cauteria autẽ
opꝫ ꝙ cũ candela approximent̃ ⁊ meliora ſunt potẽtialia
q̃ꝫ actualia ꝑꝑ mẽbri ſenſibilitatem ⁊ illa ꝓpria q̃ ſunt ex
farmacis cariſticis q̃lia ſunt calcãtũ exuſtũ arſenicũ calx.
⁊ ſĩlia. ⁊ q̃ approꝑate operant̃ q̃ ſupra in cura fluxꝰ nariuꝫ
habuiſti. lꝫ actualia ſint aliter meliora: vt in cura dicet̃ ar
tetice ⁊ eo ꝓprie: q2 poſſunt applicari: ita ꝙ aliq̃ dimittat̃
aperta. Et ſi cũ hec plures nũero fuerĩt ⁊ eminẽtes extra
atq3 pendentes ĩgeniari oꝫ vt exiccent̃ ꝑdicto mõ ⁊ retra/
hant̃ per ſe aut oꝫ illas icidere ⁊ cauteriçare vt cadãt vel

corrodore. Deĩde ſãguinẽ retinere ĩciſiõe ⁊ cauteriçatõe
oꝫ ꝑmũ attẽdere hyp. ꝑceptũ vt ſi icidant̃ vel cauteriçen
tur ꝙ altera ſit derelicta aperta: vel apertiõi apta. inciſe
.n. ⁊ cauteriçate per nãm nõ ſunt poſt cõſolidationẽ apte:
quare ſanguis q effluere ↄſueuit fluere ſolito more nõ po
terit. ex cꝰ retentõe timẽdũ eſt idropẽ fieri aut maniã aut
ptiſim. expedit ergo: vt ſic icidas vel cauteriçes ꝙ vnã di/
mittas aptam per quã ſanguis exire tẽperate ſolitus edu/
cat̃. Ingeniũ aũt inciſiõis eſt: vt vna poſt aliã incidatur. ⁊
nõ ſil' oẽs: ⁊ leuius eſt ⁊ ſecurrius cũ ligatura ex ꝑdictis ca
dente in radice eaꝝ dimiſſa donec ꝑ ſe cadet q̃ ſi non ceci
derit abſcidat̃ cũ acutiſſimo ferro vel corrodãt vel vt ab/
ſcidat̃ ꝑus deĩde cauteriçet̃ ⁊ exiccet̃ vt ſanguis reſtrin/
gat̃ ⁊ cauteriçatio cũ medicis cauſticis ẽ ſecurior. ⁊ hoc ĩ
apparentibꝰ erit facile. In occultis iterius valde: oꝫ vt ex
trahant̃ ſi eſt poſe: deĩde liget̃ ⁊ poſt ligamentũ abſcidat̃:
ſed ſi ꝑmittant̃ fl'omia baſilice iter ligaturã ⁊ iciſionẽ erit
optimũ: vt hoc cũ vẽtoſis magnis cũ igne appoſitis ſuper
anũ ⁊ dimiſſis vna hora: donec tumeſcant: ⁊ nõ redeant: ⁊
tũc retiet̃ cũ iſtrumẽto extractõis vt nõ redeat: deĩde li/
get̃ velociter ⁊ dimittat̃ exteriꝰ. Et q̃nq3 fit cũ medicinis
extrahẽtibus. ſic̃ ſi ſumat̃ ſuccꝰ centauree ⁊ aneti hũidi ⁊
ſtafiſagrie: ⁊ liniat̃ anus vel adminiſtret̃ nitrũ ⁊ fel tauri vl'
piper ⁊ nitrũ ⁊ buchormarien cũ ſtafiſagria. Et corroſio q
dem fit ſi liniant̃ cũ myrra cõfecta cũ aqua ſilique hũide
in qua fit lana ĩfuſa ⁊ ſuperpoſita ano: ⁊ etiam ſi fricetur
ex ea q̃nq3 deſtruit eas: ⁊ ꝓprie verucales: ⁊ fit cum alijs
corrodẽtibꝰ multis q̃ nota ſunt. De illis aũt q̃ retinẽt fluẽ
tẽ ſanguinẽ meliora ſũt ſtiptica cõglutinãtia ⁊ ſigillantia
q̃ꝫ cauteriçãtia: ⁊ cauteriçãtia potẽtialia ſunt actualibus
meliora. lꝫ ĩ alijs exterioribꝰ mẽbris ſint actualia melio/
ra: vt dixit alkindꝰ ex qbꝰ ẽ attramẽtũ: ⁊ ſĩlia. ⁊ puluis ex
aloe: thure: ſanguĩe dra. balauſtijs ⁊ ſicꝰ. memithe pulue/
riçatis ⁊ ligatis ligatura forti: ⁊ de illis ẽ tela aranea cum
albumine oui. q̃ꝫ retinet curſuꝫ ſanguis: ⁊ ꝓhibet apari
vulnera ⁊ puluis. Galienus ſuper aſperſus ⁊ poſitus ſuper
vulnera qui. ℞. pilos leporis ⁊ pulueris thuris. ſanguinis
draconis. añ. ꝑtes equales: vitrioli: ⁊ floris eris. añ. partẽ
ʒ. liget̃ fortiter donec cadẽt per ſe: ⁊ ſigillet̃: ⁊ alia reſtri
ctiua ſtiptica leuiora ꝙ ſi nihil cõfert coquant̃ cum coto
ſubmerſo ĩ oleo calido feruẽte. deĩde pulueriçent̃ ⁊ reti/
nebit̃ ſanguis: ⁊ ex illis ſũt aque ſtiptice: vel vinuꝫ in qbꝰ
decocta ſunt ſtiptica ꝑdicta. Et ex eis que bibunt̃ ad illõ
ſũt triferã minor ĩ q̃ mixta ẽ ſcoria ferri ĩfuſa in aceto per
ebdomadã a q̃ colet̃ acetũ: ⁊ frigat̃ in ſartigine. deinde te
rant̃ ſic̃ alcofol: ⁊ bibat̃: ⁊ eſt ↄfectio de ſcoria ferri nota: ⁊
ↄfert micletũ. ⁊ hic modus ẽ ſecurus. Si vo doleant forti
ter ex mediciaꝝ acumie vel iciſiõe vl' ligatura embrocet̃
ſedeat ĩ aqs ſemis lini: fenugreci: altee: mellilotí: ⁊ camo/
mille: ⁊ euaporent̃ cũ ſpõgia ĩfuſa ĩ aceto. ⁊ ẽpl'et̃ cũ coꝝ
ſuba: ⁊ vitello oui. deĩde vngat̃ cũ oleo lini: vel õ nucleis
ceroſoꝝ ꝑſicoꝝ vl' criſomilloꝝ: vl' ceroto ex cãcro fluuia/
li iſopo hũida adipe renũ capraꝝ: ⁊ ceroto albo. Et vbi ex
dolore timet̃ apa: ſuccurẽdũ eſt cũ cepe aut porro elixa/
to: ⁊ cõfecto cũ butiro ĩ aq̃ decoctiõis rex ſtipticaꝝ cum
aceto: deĩde liget̃ cũ icarnatiuis fortiter: ita vt apoſtemẽ
tur. Et ex ſedãtibꝰ dolorẽ eſt vt ſumat̃ ſerapinũ ⁊ bdeliũ
ſubalbidũ: caſtoreũ: ⁊ opiũ: ⁊ crocũ facte ex eis licinio ⁊ li
ciniũ ex radice nenufaris: ⁊ cũ vides anũ apatum: ⁊ dole
re fortiter ex huiꝰ medicis: tũc nec̃arium eſt vt ſumat̃ ca
momilla: mellilotũ: ⁊ paꝝ croci: ⁊ terant̃: ⁊ cõficiant̃ cuꝫ
mucilagine ſemis lini triplicato. ⁊ empl'a encatiſma: ⁊ ex
eis deĩde ẽpl'abis de pane vitello: oui: ⁊ oleo priꝰ ſuffumi/
gato cũ bdelio ⁊ adipe gibbi: camelli. ⁊ cũ fuerĩt emoroy
des abſq3 dolore: tũore apate: ⁊ mlta aptiõe: ñ erit tẽ mlt
ta nec̃itas curõnis eaꝝ eaꝝ. n. curõ q̃ꝫ ꝑduc̃ ad fiſtulas

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0354-6

apata ⁊ ragadias. ¶ Medicamē Gabrielis ꝙ ſuffumiga
tio fit ad emoroydas. ℞. radicis capparis oleādri radicis
apij: ⁊ alba mali amuden lilij fruct⁹ tamariſci. añ. ptes eq̄/
les terant̄ ⁊ ꝯficiant̄ cū oleo ſiſami ⁊ fiant trociſci. ʒ. i. ſu/
mat̄ ſtercus cameli ⁊ cōburat̄ ⁊ ponat̄ ſup ipm rotellus ꝑ
foratus ⁊ ſedeat ſup ipm īfirm⁹ mane: ⁊ veſpe donec exic/
cent̄ ⁊ cadāt. ¶ Aliud ſuffumigiū ad hn̄tes ex iura ī emo
roydibus ſm alexādrū. ℞. ſinapis albi venaꝝ tinctoꝝ ra
dicis capparis radicū collogntide radicis armel: calx tin/
ctoꝝ vinee: ſemis maratri ſarcocolle. añ. ptes eq̄les terā/
tur: ⁊ colent̄ cū eis. ¶ Ad emoroydas cū aſcellat ſāguinē
ſemp ſm filiū ſerapiōis. fiat potio. ℞. tabel ferri: ſeis por/
ri: ſemis ameos. añ. ʒ. ij. fructus capparis ſicci. ʒ. iij. terant̄
⁊ cribellent̄: ⁊ ſit potio ei⁹ pōdus. ʒ. ij. cū aq̄ porri q̄ntitatis
ʒ. i. ⁊ aq̄ calide pōdus. ʒ. ij. ⁊ ꝯfert ī aq̄s in q̄b⁹ decocta ſūt
ſtiptica. ⁊ pille de q̄nq̄ gn̄ib⁹ mirabo. ʒ. x. limatiaꝝ cōbu/
ſtaꝝ ⁊ karabe. añ. ʒ. iij. giezi. ʒ. ij. bdelij. ʒ. xx. Cōfice cū vio
da. vij. ¶ Cōfectio raſis ad emoroydas ⁊ vulnera magna
ītestinoꝝ. ℞. ſemis lini. ʒ. x. granorū nigello. ʒ. v. in al' xv.
bdelij. ʒ. vij. thuris maſ. ciperi ameos. añ. ʒ. ij. ʒ. ſandarach
dechei. ʒ. ij. ʒ. terant̄: ⁊ dent̄ in potu. ʒ. iij. cū aqua. ¶ Cōfe
ctio medicamis ſm eū ſedātis dolorē. ℞. olei nucleorum
criſomilloꝝ. ʒ. x. ſtoracis liq̄de. ʒ. i. bdelij. ʒ. ij. diſſoluat̄ in
eo: ⁊ vngant̄. ¶ Cōfectio empl'i ſedantis dolorē emoroy/
darū apoſaꝝ ⁊ apa ani. Elixet̄ cepe: ⁊ conficiāt̄ cū butyro
vaccino ⁊ emplet̄ cū eo. eſt. n. valde vtile. ⁊ ſit cepe albuꝫ.
Cliſtere fiat de ſucco porri: ⁊ butyro ſm yſaac. ¶ Scōm
hibernicū: gūmi edere diſtēperatū: cū ſucco taxi barbaxi:
⁊ inunctū exiccat emoroydas. Et ſuffumigat̄ cum ſpōgia
marina. Et cinis fact⁹: de radice cucumeris agreſtis: ⁊ fili
cū: ⁊ acori ſuppoſit⁹ exiccat eas p̄cedēte lotiōe: cū vino ſti
ptico ⁊ cerotū ex ceruſa cū olō roſato: ⁊ licio ſedat dolorē
⁊ ꝯſolidat. ¶ Ad idē ꝯcaua panē porcinū: ⁊ reple ipꝫ olō.
⁊ fac bullire bn̄: deide iunge vel empl'a cū eo retinet ſtati
ſanguinē: ⁊ ſedat dolorē. ¶ Antidotū valens ad iteriores
de frigido hūore ſm yſaac. ℞. charui lib. i. aniſi aſſari. ana
ʒ. vi. coſti ciamomi: galāge ciuçi. añ. ʒ. v. piretri polipodij:
acori. añ. ʒ. iij. fac puluerē adde mel ⁊ dabis bis ī die ī mo/
dum auellane. ¶ Cerotū ad dolorē emoroydaꝝ tumorē
⁊ duriciē. ℞. ſucci radicis ſerpētarie olei: pſicoꝝ vel criſo/
miloꝝ vel lini: aſſungie gallie: vel anatis: ⁊ paꝝ cere: ⁊ ſub
inunge. ¶ Deſcriptio pillaꝝ de ſandaracha ſm Abo. reti
nentiū ſanguinē emoroydaꝝ ſupfluētū. ℞. ſādarache cor
ticū ouoꝝ vſtoꝝ fumiterre: ſemis porri. añ. ptes eq̄les ſal'
armoniaci ptem. ʒ. ſcorie ferri partes. iij. fiāt ex eis pille.
ſicut nabac. doſis earum eſt ī mane a. v. vſq̄ ad. vij. ⁊ cum
mouent coitum.

¶ Caplm. vi. de apatibus ani: ⁊ medicis eorundem.

a Poſtemata ani. ſunt nota diſtinguunt̄ vo q̄ntū ad
fiendi modū. ⁊ q̄ntū ad cās māles. Primo mō. nā
de eis ſūt q̄dā pſe icipiētia q̄dā facta pp dolorem
emoroidaꝝ: aut pp inciſiōes ipſaꝝ ⁊ acuitates medicina/
rū approximataꝝ illis. Scdo mō. nā ex illis q̄dā ſūt fl'ati
ca vel mi̇̄ca ſine dolore acuto: q̄dam fl'onica ⁊ eriſipilata
cū dolore acuto: vt ſunt pl'imuꝫ pp colerā q̄ apta eſt trahi
ad ipm: ⁊ cū cōſueta cū egōne deſcēdēte. ⁊ hec oia ſunt ma
nifeſta. ¶ Cura coꝝ duplex eſt: gn̄alis ⁊ ſpālis. Gn̄alis eſt
due res. cūo. ſ. toti⁹ ⁊ ptis. Cūo vo toti⁹ cōplet̄ cū fl'omijs:
vel farmacijs cū p̄ceſſiōe digeſtiuoꝝ. Sint aūt farmaca
ex lenibus q̄ māꝫ nō agitant: ⁊ vehemēter attrahāt ad paſ
ſionis locū. Et cū regimie ſubtiliatiuo diminuēte māꝫ ne
fluat ſuperfluēs ⁊ repleat magis ⁊ lenitio nāe. ⁊ breuiter
vl'e regimē: qđ p̄ceſſit in cura emoroydaꝝ ipm complet.
Euacuatio ptis tripl'r fit ꝑ pulſū tractū ⁊ trāſmiſſū. Spā/
lis eſt ſm diuerſas ſpēs ipſoꝝ varia ⁊ diuerſa ſiq̄dem apa
fuerit flegmonicū ſiue icipiēs ſiue factū ꝓmittat̄ fl'omia
baſi lice: deide ſaphene corp⁹ totū: ⁊ epar cū fr̄is alteretur
notis. Et regimē ſubtile ſit ad fr̄itatē ⁊ lenitatē decliue. de
inde circa apa pticulariter opare. ⁊ p̄mo ſtiptica miſtrent̄
⁊ fr̄iſſima ſi mā ad hec fluit q̄lia ſub albumē oui ꝯquaſſa/
tum cū oleo roſato: qđ cū lenitate ſedat dolorē q̄ ci⁹ ē cā
fortaſſis ⁊ pellit mām: aut ex vitello ouoꝝ tritoꝝ cū me/
mithe: deide cū ptrāſierit p̄ncipiū admiſtrent̄ ſedātia do
lorē leniētia ⁊ reſoluētia tpata q̄lia ſunt camōilla mellilo
tū fenugrecū: ſemē lini: cerebꝝ anatis cū eis: ⁊ alia ſupius
dicta in p̄cedēti caplō. ⁊ emplm de cepe vel porro ꝯcocto.
⁊ ꝯtrito cū butyro. ⁊ ſiq̄dē reſoluant̄ pfecte: bn̄ q̄dē. Si vo
maneat adhuc replō applicent̄ ſāguiſuge: q̄m eradicabūt
eā: qđ ſi nō eradicet̄ ⁊ venerit ad exiturā oꝫ pforare. ⁊ api
re ſaltē fl'omo ante maturationē ne putredo extēdat̄ ver
ſus pfundū ⁊ fiſtulā faciat: vt hyp. dixit. Et ſiq̄deꝫ fuerit
colericū addes fortiora: nō tn̄ multū: q2 inimicant̄ ano: vt
hyp. dixit. Et ſiq̄dē ſit fl'icū vl' melācolicū curet̄: put dcm̄
eſt ſupra ca. de tenaſmone: ⁊ ex exptis eſt ſucc⁹ ſcabioſe ſū
pt⁹ ⁊ ipaꝫ ēpl'ata frāgit ⁊ ſanat: ⁊ naſturciū apit ⁊ maturat.

¶ Caplm. vij. de medicinis ragadiarum ani.

r Agadie ſūt fixure eueniētes ano: ⁊ ſūt pl'imū lōgi
tudiales ī circuitu ei⁹ currētes: put muſcul⁹ latitu
dinalis p̄cedit pp ei⁹ dilationē. Et cā earum ē du
plex iterior ⁊ exterior. Interior ē mala ꝯpl'o ſicca ꝯtrahēs
partes ani: quare ſeperantur: ⁊ q̄nq̄ caliditati: q̄nq̄ frigi/
ditati ē iuncta cū mā plurimū: ⁊ q̄nq̄ ſunt a fece groſſa ⁊
ſicca: ⁊ q̄nq̄ pp aliā cām: puta ⁊ apata calida ⁊ ſicca: ⁊ q̄n/
q̄ pp emoroidas q̄ ſcidunt̄ nāl'r pp fortitudinē expulſio/
nis ſanguis ī orificijs venaꝝ ani. Exterior eſt multiplex ⁊
plurimū ē pp abſterſionē ani in ſeceſſibus cū re dura: pu/
ta lapide acuto: aut re ſcindente emoroidas ⁊ apoſtema
eius. vt eſt flebotomus farmaca cauſtica. ⁊ ſimilia.
¶ Cura ragadiaꝝ eſt tres res. Prima ē cāe abſciſio. Se/
cūda partiū fixaꝝ ꝯglutinatio. Tertia ē regimē ⁊ cibatio.
Primā rē cōplēt diuerſa medicamina diuerſitatē cāꝝ
Si ergo cā ſit mala ꝯpl'o ſicca: alteret̄ cū hūidis lenitiuis
⁊ lubricātib⁹ tēperatis ſiptis: ⁊ iurētis p̄prie q̄lia ſunt aq̄
⁊ iura carniū tēpataꝝ ⁊ folioꝝ. vt maluaꝝ: boraginuꝫ: bu
gloſſaꝝ: ⁊ pinguedines galline anatis: ⁊ medule vt crurū
aſini: ⁊ vituli: ⁊ mucilagines. ⁊ fenu greci: ſemis lini: fru/
mēti. ſ. amidi: ⁊ olea: ⁊ amigdalaꝝ dulciū: ⁊ ſiſaminum: ⁊
iſop⁹ hūida: vel calidis: vt ē ius galli antiqui: ius ſerpētis
anatis: ⁊ anſeris: ⁊ medule: lupi: canis: leonis: capri: vrſi: lu
pi: ⁊ vlpis: ⁊ piguedines ſpoꝝ: ⁊ mucilago radicis ireos: ⁊
ſcabioſe cōtrite: ⁊ expſſe. ⁊ ſiſium: ⁊ oleo de lilio: de nuce
īdica ⁊ vulpinū. Vel fr̄idis vt ē ius ⁊ aqua attriplicis ſpi
nachiaꝝ: lactuce: violaꝝ: ⁊ ſiſium. ⁊ carniū edoꝝ: ⁊ vitu/
loꝝ: ⁊ mucilago pſilij: ⁊ altee: ⁊ ſeminū citonioꝝ: ⁊ lac mu
lieris: ⁊ papaueris albi: ⁊ ſeminū melonum: ⁊ cucurbite: ⁊
piguedo porci: ⁊ capre: ⁊ medule coꝝ: ⁊ olea ꝺ violis roſa
rum nenufare: ⁊ alchechēgi: ⁊ put cā reqrit. Et ſil'r ſi ſint
ex fece groſſa ⁊ ſicca. ⁊ ſi fit cū mā mala ꝯpl'o q̄ ſit veniēs
de ſup purget̄ cū aloe totū: vel pillulis ei⁹ ⁊ regimē corri
gat̄. Et ſi fuerit retēta ibi fixuris ani ſanguiſug: applicē/
tur. vt mām iā fluxā educāt: ⁊ ſunt efficaciſſime ī fixuris
eib⁹ ani: ⁊ labioꝝ: ⁊ ſi ſint ab apatib⁹ curent̄ p⁹us apata. vt
ē dcm̄. Similr ſi ſint pp emoroidas curentur emoroide ⁊
euacuet̄ repletio corpis: ⁊ dolor: ⁊ cal'itas ani ſedetur. vt
corp⁹ ⁊ mēbra nō ſint ī mittēdo auida ⁊ trahēdo: nec ſub
dn̄io māe faciētis egritudinē ī illo mēbro. ſ. ano poſita: ⁊
cā ſi exterior ſit auferat̄. ¶ Scdaꝫ rē ꝯplēt due res. pria
ē fricatiōes aſpe: dōec ptiū ſiſſaꝝ: ⁊ labiorū caꝝ ſupficies
excoriēt̄ ⁊ ſāguiolēt̄: ⁊ fit cū aſpa fricatōe p̄dictoꝝ mi̇̄ta:
⁊ p̄pē cū folijs ficoꝝ. Sa ē p⁹ ipaꝝ abraſionē ⁊ ſāguiolēta
tōeꝫ. vt ꝯglutinātia miſtrēt̄ ⁊ īcarnātia nō. ⁊ vltio ſigilla
m⁹. ex approbatꝫ ⁊ exptꝫ ſi fex attramti: ⁊ alia q̄ ī cura vlce

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0355-2
DFG

rum dicemus prout miniſtrabit pius ⁊ miſericors dn̄s.
¶ Tertia res completur per abſtinentiam a ſtipticis ſic-
cis ⁊ acetoſis: ⁊ acutis ⁊ ſalſis ⁊ vſu in pͥncipio diu lenien̄tiū
dictoꝝ ⁊ lubricātiū ex cibis: ex qb⁹ ſūt vitella ouoꝝ ⁊ ami
liū. ⁊ auelane penidiȷ. ⁊ ſiſia: ⁊ potib⁹ vini albi: dulcis ma
turi: ⁊ aq̄ ordei: ⁊ iuiubaꝝ: ⁊ granatoꝝ dulciū: ⁊ pomorū ⁊
ſimiliū. Et ex medicis ex qb⁹ fortis ē ꝯfectio ꝺ vitelli ouo
rum cepe butyro vaccino ⁊ oleo: ⁊ vltimo cum congluti-
nantibus que ſunt nota.

¶ Caplm̄. viij. de medicinis fiſtularum ani.

f Iſtule in ano ſunt vlcera ꝓfunda: oblōga ⁊ conca
ua ſtricta in eo emittētia putredinē: quaſi ꝯtinue
ad qđ adiuuat ſupfluitatū corꝑis miſſio ad ipſum
ordinata. Et eaꝝ q̄dā ſunt nō penetrātes: ⁊ ſunt icolumio
res: ⁊ q̄dā penetrātes vſqȝ ad iteſtinū rectū: ⁊ ſūt deterio-
res. ⁊ qn̄qȝ hn̄t orificiū vnū. qn̄qȝ plura: ⁊ ille q̄ ſūt ꝓpinq̄
ꝯcauitati itroitus: ⁊ remote a lacerto latitudinali ſunt ico
lumiores. qm̄ lacert⁹ eſt ſalu⁹ a nocumēto ꝓ maiori pte.
nec i cura oꝫ vt ledat̄ iciſiōe vl' corroſiōe medicinaꝝ expe
dientiū: ⁊ deſtruat̄ tota retētio ei⁹: ⁊ ꝑducat ad egreſſionez
ſtercoris pter volūtatē. ⁊ qꝛ ē ꝯtinuis cuȝ venis arterijs ⁊
venis: quare fit i eis timor. Et cā ex qua gn̄ant̄ ē qn̄qȝ ab
apͣte ani dubelati diu pmanēte nō pforato ſicut pͥdictuȝ
ē. qn̄qȝ ab emoroidib⁹ iciſis: vel corroſis: qn̄qȝ ab vlcerib⁹
ꝓlōgatis ⁊ ꝓfundatis. Signa fiſtulaꝝ ſūt ꝓlōgatio vlce-
rū. ⁊ longitudo tpis ipoꝝ cū ipoſſibilia deſiccādi ⁊ ꝯgluti
nādi ea: ⁊ ſi ꝯſolidari videant̄ nō pmanēt: ſȝ poti⁹ quatuor
vel .5. dies: vel mēſeȝ redeūt. Et penetrātes a nō penetrā
tibus diſtinguunt̄. vel remiſſio digito itus in anū tēta per
orificiū vlceris imittat̄: ⁊ ſi qdem ad digitū perueniat vt
eam tāgat erit penetrās. ſi vero nō tangat digitū imedia-
te erit non penetrans. Preterea ſi penetrās ſit fecis ali-
quid in ſeceſſu emittet per vlcus. ſi vͦ nihil nō penetrans
erit. ⁊ ſi ꝺclinēt ꝯcauitati itroit⁹ vl' ad lacertū ſenſu digno
ſcunt̄. Cura fiſtulaꝝ ani ē tal'. Nā ſi nō penetrātes ſint ⁊
curſus putredinis non fuerit plurimus: neqȝ fetor fortis
dimittantur: ſolum aūt commotum fieri neceſſariū eſt .i.
mundificationē ipſaꝝ cū ablu͡ētibus abſtergētibus ⁊ mū
dificantib⁹ vlcera q̄ nota ſunt i ſupiorib⁹ vbi de cura vlce
ruȝ actū eſt: ⁊ ifra ſectiōe ſa. hic. n. eſt cura ipſaꝝ ⁊ pͥuiſio.
pͥſeruat. n. ne ꝓfundent̄ ⁊ ledant̄ iteriora nobilia: ⁊ circū-
ſtantia mēbra eaꝝ reſtrictio cā eſt plimaꝝ egritudinuȝ ⁊
mortis. Qn̄qȝ ſi mā q̄ inde fluere ꝯſueuit nō ꝓhibeat̄ ꝺbi
to regimie multiplicari: vl' multiplicata nō al'r expurget̄.
Si vͦ curſus putredis ⁊ fetor fuerūt tediātes illas cura-
re oꝫ. Et cura eoꝝ eſt. v. res. Prima ē corporis toti⁹ cūo: et
rectificatio vſqȝ in pͥcedētib⁹ capl'is dcm̄ ē. ſa eſt remotio
corruptōis ⁊ putredis nō ſolū hūiditatis: ſȝ ēt carnis mor-
tue in eis appentis vſqȝ ad radicē ⁊ carnē viuā. tertia ē car
nem bonā loco remote ⁊ iciſe regn̄are: ⁊ idurare ſeu ſigil-
lare ⁊ calloſaȝ reddere. q̄rta eſt dolorē iteruenientē ſedare.
qnta eſt regimē debitū ordinare. ¶ Primā rē cōplentia
ex pͥcedētib⁹ nota ſūt. ¶ Scđaȝ rē cōplēt q̄ hūiditatē mū
dificāt ⁊ abſtergūt putridā: vt eſt aq̄ mell' vel vinū i quo
mel roſatū eſt diſſolutū imiſſa cū tēta vel cliſteri ſi fuerit
penetrātes. ſint aūt tepida: qꝛ abſtergūt melius: ⁊ ſūt ano
amica. Et poſt hoc acuta farmaca ⁊ corroſiua pulueriçata
vel cū tēta imiſſa q̄ carnē mortuā corrodūt vt ē puluis af-
fodilloꝝ ariſto. ⁊ vnguētū viride ⁊ nigrū. ¶ Tertiā rē cō
plent icarnātia ⁊ cōglutinātia nota ſupra ex qb⁹ efficaciſ-
ſima ⁊ expta eſt cauda eq̄na. Et deīde ſicca fortia ⁊ ſigillā
tia: ⁊ cicatriçantia vt eſt puluis galle ⁊ corticis thuris. ⁊ ſi-
milia. Et ex ꝓprijs ē aloes pulueriçat⁹ ſimplex vel cū pͥdi
ctis mixt⁹. mūdificat. n. ⁊ ꝯſolidat vlcera difficil' ꝯſolida-
tōis vt fiſtulas ꝓprie in ano. vbi gͣ. naſo ⁊ labijs ſeu ore.
¶ Quartā rē cōplent vnctuoſa acuitatem farmacoꝝ ⁊ ēt
traſeūtiū ſtercoꝝ corrodētiū remittētia ⁊ ſedātia vt ē bu
tyꝝ ⁊ oleū roſatū imiſſū cū tēta vel cliſteri. ⁊ ſiſia. ⁊ qn̄qȝ
narcotica ſūt opportuna. ¶ Quintā rē cōplēt abſtinentia
ab acutis ſalſis ⁊ acetoſis q̄ ſupfluitates trāſeūtes reddūt
acutas: ⁊ vſus ſuccoꝝ exiccātiū froꝝ qb⁹ pͥmittant̄ lenien
tia: ⁊ lubricātia nota ſupra q̄ ſeruāt nām lenitā. Si vͦ fue
rint penetrātes eiſdē reb⁹ curā cōplebis: ſȝ oꝫ vt medica-
mina ſint fortiora ⁊ imiſſa cū licinio vel tēta lōga ⁊ ſubti-
li inuncta ex eis ⁊ ꝓprie ex attramēto vt ꝑueniāt vſqȝ ad
ꝓfundū ⁊ cū pila cōprimat̄ vt maneat i loco. ſȝ qn̄qȝ ꝑdu
cat ad dolorē vehemētē ⁊ ꝓprie cū fuerit corroſiua ⁊ acu
ta valde: q̄re timet̄ ex neruis ne accidat ſpaſm⁹ ⁊ ſincopis
⁊ tract⁹ māe ⁊ additio vlceris ⁊ ꝓfundatōis ipſi⁹. Quapꝑ
hyp. dixit. Quibuſcūqȝ cācri abſcōditi fiūt nō curare meli
us eſt: curati. n. citi⁹ ꝑeunt: nō curati lōgi⁹ tp̄s pficiūt. Qua
re ſit ligata tēta filo vt cū dolor itendit̄ ⁊ in tollerabil' fit
extrahat̄ ⁊ admiſtrent̄ ſedātia dolorē ⁊ ꝓhibeāt fluxum
māe deſcēdētis ad illū. Ex qb⁹ ē illđ qđ reſoluit̄ ex piſtel
lo ⁊ tabula facta ex plūbo fricatis cū oleo ro. deīde reite-
rent̄ donec ſufficiat ⁊ vltimo ſiccātia carnē gn̄antia ⁊ cica
triçantia miſtrent̄ q̄ fortiora ſūt ⁊ ex ꝓprijs ē lapis filagi
us ⁊ medicias cōpoſitas q̄s expti ſum⁹ ſubiungem⁹ iſtan-
ter. Ulcera ani ſūt nota. nō. n. ſūt ꝓfunda ⁊ ꝯcaua ⁊ ſtricta
ſic̄ fiſtule: ſȝ ſupficialia tm̄. Et cura eoꝝ eſt cura fiſtularuȝ
nō penetrantium ⁊ cum lenioribus habēt cōpleri: ⁊ ex ap
propriatis eſt aloes.

¶ Capitulum nonum de pruritu ani.

p Ruritus ani notus eſt. Et cā ei⁹ ſunt vermes ⁊ aſ-
carides exītes in extremo recti iteſtini ac humo
res ſalſi veniētes ad ipm aut vlcere ſanioſa pͥdcā.
Et cura ei⁹ eſt. Nā ſi ſit a vermib⁹: curet̄ cura pͥdcā vmiū.
Et ſi ſit ab vlcerib⁹: curet̄ cura vlceꝝ. Si vͦ ab hūorib⁹
ſalſis: ꝯſiderādū. Nā ſi qdē ſint tales hūores a ſupiorib⁹
miſſi due res in cura ſūt neceſſarie. Prima ē corporis cūo
ab eis: ⁊ rectificatio regimis vt n̄ regn̄et̄: ſȝ adeq̄nt̄ gn̄ati.
ſa eſt eoꝝ q miſſi ſūt reſol'o ⁊ abſterſio. ¶ Primā cōplēt
purgātia farmaca appropͣta tali hūori cū pͥceſſiōe digeſti
uoꝝ appropͣtoꝝ q̄lia ſunt ſirup⁹ ide de fumo tere. ⁊ pill'e
ei⁹. ⁊ ꝯuerſio regis ad ꝯriū nāe hūoris: ⁊ fit cū cibis ⁊ poti-
bus gn̄antib⁹ ſāguinē bonū abſtinēdo a ſalſis ⁊ acutis. Et
deriuatiua: vt ſūt vētoſe ſup anchas poſite ⁊ renes. ¶ Se
cūdā rē cōplēt ſeſiōes in aq̄s ꝺcoctōis vio. maluaꝝ melli-
loti acetoſe: ⁊ granoꝝ lupinoꝝ ⁊ fumiterre ⁊ abſterſio cū
eo: ⁊ deīn cū cerotis appropͣtis iunctis q̄ dicent̄ i cura ſca
bici. Si vͦ fuerit retēti tales hūores in ptib⁹ ani nō de no
uo miſſi curent̄ vt ſupra i ten aſmone dcm̄ ē: ⁊ reſoluant̄: ⁊
abſtergant̄ cū lamia eris ⁊ ſuppoſitorijs tpͣtis. ⁊ qn̄ȝ nar
coticis ⁊ rob ex aceto vini: iuuamētuȝ eſt valde ⁊ iunctio:
iuxta ignē ex ſale ⁊ aceto ⁊ olo: ⁊ vētoſe ſup alchaſos poſi-
te q̄ mūdificāt ptes cutis ⁊ attrahunt ſubtile colericū: qđ
hūorē effic̄ ſalſū. ¶ Bibēda ſm ꝑcidaniū expta ad fiſtu-
las deſiccāt ⁊ cōſolidant. ℞. pedis colūbini cardi bn̄dicti
an̄. lib. i. cimaꝝ rubi. ℥. vij. ſaluie betonice. an̄. ℥. iij. hic ꝯtri
ta bulliāt i vini lib. v. vſqȝ ad ꝯſumptōeȝ medietatis: deīn
collent̄: ⁊ adde q̄rtā ptē mell'. ⁊ coq̄ paꝝ ⁊ cola ⁊ vſui reſer
ua de q̄ ſumat mane ⁊ ſero in ieiuno ciatū vnuȝ. ⁊ qdā ad-
dūt callendulā. Cauda eq̄na ſepe ſumpta in vino ⁊ empla
ſtrata curat fiſtulaȝ inter omnia ⁊ eſt experta. ¶ Puluis
ad fiſtulam ⁊ cancrum ⁊ ſcropulas apertas. ℞. arſenici.
vitrioli aluminis çuccarini: iter. an̄. ℥. ij. pulueriçent̄ cum
aceto fortiſſimo in moduȝ oximellis ponant̄ in olla ⁊ co-
operiant̄ ⁊ circūuoluant̄ bono luto vt fum⁹ ide nō exeat
⁊ bulliāt lento igne a mane vſqȝ ad tertiā ⁊ remoto vaſe:
qđ īuenit̄ in cooperculo colligat̄ ⁊ ſeruet̄: ⁊ tāta in ipo pul
uere iuoluat̄: ⁊ in fiſtulā iponat̄: ⁊ ſit ibi ꝑ diē ⁊ noctē dei-
de remoueat̄: deide curet̄ ad modū alteri⁹ vulneris.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0356-8
DFG

¶ Capl'm.ix.de mollificatiōe ani ⁊ egreſſiōe eius.
Ollificatio ani ⁊ egreſſio ei⁹ eſt nota. Et eſt aut a
m nā ſeu īfantia vel ꝑter nām dilatat⁹ ⁊ egreſſus nō
congregeꝶ ⁊ retrahaꝶ nāli ⁊ debito mō: ſed rema
neat extra ⁊ caput ſeu extremitas recti iteſtini cū eo: ⁊ qñ
qȝ paꝝ qñqȝ in q̄titate palmi vni⁹ ⁊ plus: put in quodam
vidim⁹ ianueñſe. Et qñqȝ egreſſio ei⁹ eſt cū volūtate ⁊ ē mi
nus malū. ⁊ qñqȝ eſt ꝑter volūtatē: ⁊ magis malū: ⁊ qñqȝ ē
cōſenſu ⁊ eſt meli⁹. ⁊ qñqȝ ꝑter ſenſum ⁊ eſt pei⁹. ⁊ qñqȝ eſt
egreſſio fecū inuolūtaria ⁊ eſt peſſimū. Et cā ei⁹ ē aut ma
la cōplexio paliticata frigida ⁊ hūida iterioꝝ cū mā ſub
tili ībibita i neruo latitudiali ꝯgregāte: ⁊ neruis lōgitudi
nalibus ꝛetrahētibus ipm ⁊ iteſtinū cū eo. ⁊ qñqȝ eſt mix
ta cū caliītate īnuāte ipam ad penetrādū ⁊ ibibendū. Et
qñqȝ eſt apa in ano ſua grauedine trahendo īferi⁹ coadiu
uans. Et qñqȝ eſt exteri⁹ veniēs puta ex aq̄ frigida: cū bal
neaꝶ: vt fullonib⁹ ⁊ nauigātib⁹ ſepe accidit vel aere frido
cū ei coacti exponunꝶ aliq. Et qñqȝ eſt pp emoroidarū li
gationē icīſionē vel corroſionē in medicis cadētem ſupra
neruos ſeu lacertos ꝑdictos: q̄re abſcindimur ⁊ eius cura
erit īpoſſis. Aut pp caſum ſupra dorſum aut ꝑcuſſionē diſ
locantē ſpōdiles a gb⁹ nerui ꝑdictoꝝ lacertoꝝ egrediun
tur: q̄re nerui cōprimunꝶ vel diſrumpunꝶ. ¶ Signa eius
q̄ a cōplexiōe mala palitica eſt ſūt qꝛ eſt. qꝛ paulatī accidit
⁊ ꝑceſſit regimē multiplicās talē mām: ⁊ eſt ſine ſenſu pli
mū: ⁊ accidit vt egrediaꝶ egō iuoluntaria ⁊ ſi eſt cū calita
te ſenſus declarat ⁊ tact⁹ ⁊ ſi eſt a cā exteriori ⁊ frigore ſi
militer. Que v̄o pp alias cās eſt ſubito veniēs. ⁊ ē cā mai
feſta abſqȝ aliquo alio malo regimīe ꝑcedēte: ⁊ accidit do
lor pp illud qđ accidit in neruo cōſtringēte vel retrahēte
de leſione. ¶ Cura ei⁹ q̄ eſt a mala cōplexiōe paralitica i
teriori cū mā f'ra vel calitati cōiuncta eſt ſīl'is cure pruri
tus ani ab hūore facti. Cū ergo ꝑceſſerit corporis purga
tio ab hūorib⁹ ꝑdictis veniētib⁹ cū ꝑceſſiōe digōnis cū ꝓ
prys ⁊ regimē fuerit declinās ad calꝫ ⁊ ſiccū: nece ē vt hu
morē illic ībibitū reſoluas abſtergas ⁊ exiccas: ⁊ hoc cum
cliſteribus lauacris collirys empl'is vnctōib⁹ cū pulueri
bus. Cliſterib⁹ gdē ex aq̄ marina ⁊ euforbio vel ſerapino
vel yeris magnis vel agarico ⁊ ol'o rutaceo. Lauacris cū
aqua maris ſulfuris baurach felle nitro ⁊ aqs termarum.
Collirys ex melle aloe ⁊ collognide. Unctiōibus ex oleo
nardino coſtino ⁊ laurino: vel cerotis vel vnguētis appro
priatis q̄ in antidotario nr̄o diximꝰ. Empl'is ex armōiaco
ſerapino: ſtafiſagria aceto ſglle ⁊ cera ⁊ melle. Deinde ſiq
dem retrahaꝶ ⁊ reducaꝶ vtaris ſtipticis lauacris ꝑdcis i
tenaſmone. Or ſi nō retrahaꝶ ⁊ reducaꝶ per ſe oꝫ vt laueꝶ
cū vino nigro pōtico vel aq̄ alumis decoctiōis gallaꝝ q̄r
cus ⁊ cipreſſi ⁊ copulaꝝ glādiū mirte: ⁊ balauſtie: ⁊ deide
aſpergaꝶ puluere thuris merdaſegni: ceruſe plūbi gallaꝝ
⁊ antimony: ⁊ deide reducaꝶ ⁊ reſtringaꝶ ⁊ qeſcat: ⁊ vēto
ſa ſupra alchatim reducit ipm. Or ſi anus non reducaꝶ pp
tumorē ⁊ apa in ipo: tunc opꝫ vt mollificetur ſedendo in
aquis calidis decoctionis mollificātium ꝑdictoꝝ i tenaſ
monis cura cū ol'o camomillio bdelio. qñ reduceret: dei
de cureꝶ cū eis q̄ dcā ſūt i cura apatis: deide cū reſoluenti
bus ⁊ ſtipticis ꝯſtrīgaꝶ. Or ſi nō reducaꝶ ad hec ſupra cau
dā a duob⁹ laterib⁹ ei⁹ cauteria applicenꝶ. Et ſi ē a fridi
tate exteri⁹ ꝓcedēte cureꝶ cū calis: put in tenaſmōe dcm̄
eſt. Et ſi eſt a cāu vl' ꝑcuſſiōe ſupra dorſū cureꝶ diſlocatio
ſi poſſe eſt vt i ꝑa ſectōe deo duce dicemus. Puluis cornu
cerui ſupaſperſus poſt ablutionē cū vīo ⁊ reductionē cō
fert. ¶ Medicamē exptū ybernici ad exitū ani. ℞. kara
be cornu cerui buſti balauſtia. thuris ātimony acatie thu
ris minuti teranꝶ ⁊ puluericenꝶ ſup anū ⁊ vmbilicū ⁊ re
nes cū petroleo ⁊ vitello oui aſſa. ¶ Aliud medicamē ad
exitū ani ⁊ emoroidas ſup lapidē molarē calīn: folia porri
ꝯtrita ipōe: ⁊ acetū ſupaſpge: ⁊ fac patiētē ſedere ſup eū ⁊
anche ei⁹ ⁊ renes inunganꝶ melle ⁊ puluere: ſemis naſtur
cy: ⁊ ſup liga. ¶ Itē aliud. ℞. abſinthiū pātariā ⁊ menta
ſtrū ſine aliquo liquore calefactū ⁊ ſuppoſitū multū valꝫ.
Itē ſpōgia marina calefacta i aceto in quo cocte ſint radi
ces granatoꝝ ⁊ mirt⁹ ſupponaꝶ. Itē muſceleon calꝫ ſūptū
multū valꝫ: ⁊ qñ vadit ad ſellaꝫ ⁊ ſurgit ab ea recipiat fu
mū collofonie thuris ⁊ pineaꝝ. Et ad dolorē ani paritari
am bñ decoctā. ⁊ ꝑ mixtā oleo: ⁊ deide cocta applicꝫ.
¶ Itē aliud ad dolorē ⁊ iflāmatōeꝫ. ℞. ſterc⁹ galline ſic
cū vel recēs diſſolue cū ol'o iteſta cal'a ⁊ ſup peciaꝫ extēde
⁊ loco dolēti appone: ⁊ oleū decoctiōis ſcarabeonū balnei
cū cinbalaria facit idē. ¶ Medicamē. S. ꝯferēs ad molli
ficationē ani ⁊ exitū ei⁹. ℞. fruct⁹ q dꝛ arabuſti gallaꝝ ce
ruſe de plūbo acarie barbe yrcine corticis pini q̄ dꝛ fantis
thuris ⁊ myrre oīuꝫ. añ. aur. iiij. puluericenꝶ ſicca ⁊ poſtq̄
abluiꝶ anus cū vino pontico ſuperaſperge.

¶ Incipit ſūma ſcđe pticule ſectiōis p̄me: ē ad medici
nis egritudinū īſtrumētoꝝ vrine ꝯtinēs. xv. capl'a.

S Ublimis deus renes creauit. eoſqȝ dotauit v̄tute ſpecifica q̄ ſu
perfluitatē aquoſaꝫ ⁊ traherēt ex venis.
vt v̄tute epis ipellētis in ſimul a ſanguīe
ſeq̄ſtreꝶ: ex quo iuuamētū mixtiōis ipi⁹
extitit ꝑfinitum. Et coagulauit eos i ſub
ſtātia dura ex ſanguine ne ab ei⁹ acuitate mordicanti q̄ſi
continue grauiter lederentur. Et cōbinauit eos. vt ſi vni
accideret nocumentum alius in operatione complenda
ſubſiſtat fecitqȝ proinde vnumquodqȝ plurimarum diui
ſionum ſicut in boue non vni⁹ ꝯtinue ſubſtātie ſic̄ i porco
vt cū nocumētū alicui ex ptib⁹ ei⁹ accideret ſtaret i opera
tiōe tā nec̄aria cū plurimo ei⁹ ab illa pte diſtictō. Incūbit
eni nāe tā grandis nec̄itas trāſcolatōis aquoſitatis ex ve
nis a ſanguīe vt nō minor ſit nec̄itate mixtiōis ipi⁹ cū eo
quēadmodū. n. nutrimētū trāſire ad mēbra ſine aquoſita
te nō pōt: nec eis diſtribui ⁊ appon̄ ita ſine ei⁹ ſeq̄ſtratiōe
nō valꝫ illis diſtributū vniri ſic̄ ex primo defectu accidat
atrofia: ita ex ſcđe ꝓueniat hidrops vl' cacexia. Hāc āt ne
ceſſitatē nā ꝑcognoſcēs illos alligauit dorſo neruis ac liga
mētis explātatis: ab eo ⁊ iu xta venā ſupra ipm extēſam: ⁊
hic ide lateral'r collocauit vt a vena ipa emulgēti vocata
abili⁹ trahēt illā. Collocauit illos ſeorſuꝫ i hōie: dextrum
gdē ſupi⁹ ꝓpinquū epi donec penulā eius tāgat: ⁊ hoc vt
abili⁹ ab eo illā traheret q̄tū poſſe ē. Siniſtrū v̄o īferi⁹. vt
qꝛ qđ trahiꝶ ex illa nō attrahit ex p̄mo foramine qđ hꝫ ad
venā. imo a dextro vt attrahaꝶ: ⁊ qđ ꝓpiqui⁹ p̄mo ⁊ ad lō
ginqui⁹: ſcđo ſicqȝ trāſcolatio meli⁹ ꝯpleaꝶ ob quā poſita
ē in īferiori ſeu itriſeca coꝝ pte ꝯcauitas ad quā trāſmit
tiꝶ p̄mo ⁊ aq̄ ipelliꝶ īferi⁹ ad veſicā: ⁊ i medio corpe renes
qđ de ſanguine aſſociaꝶ aquoſitati: trahēdo purificāt me
liori mō quo pñt ab ea: vt nutrianꝶ ab eo: ⁊ aquoſitatē tā
q̄ȝ inutilē ad veſicā ipellāt. Aquoſitas. n. nā ordinante nō
ſic a ſanguīe purificata ď epe trāſfert ad renes gn ad ſan
guis mixti ad modū loture carnis recētis hāc quo nutriā
tur renes q̄ȝ ſi i ſeq̄ſtrādo nec nutrianꝶ ex illo ďficeret vri
na rediret ſic̄ lotura carnis recētis codē q̄ſi modo. quo ſi
epar debilē nō diſcernat quā ipellit eis aquoſitatē a ſan
guīe: put oꝫ. Et ex rēib⁹ aduēit neru⁹ paru⁹ quo excreanꝶ
pāniculi ipos a mēbris alys diſtiguētes: ⁊ circa venā flectē
tes ⁊ dorſuꝫ. Aduēitqȝ eis vēa illa magna ab epe ⁊ arteria
ex arterys q̄ aduenīūt epi. Poſt quoꝝ creationē creauit
veſicā: quēadmodū. n. de⁹ ad expulſioneꝫ ſicce ſupfluita
tis q̄ digōni p̄me iſeqtur: ordinauit q̄dā mēbra ad ſeque
ſtrādū ipam a chilo vt ſupiora inteſtina gracilia maxime:
q̄dā ad colligēduꝫ vt monoclū: ⁊ quedā ad complendum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0357-4
DFG