tum ſua quieſceret in fluentia. ℞.capilloꝝ veneris ſcariole ſilueſtris:portulacaꝝ ſcolopēdrie:eupatorij:lupul'. ſaxifragie.epatice.radicis ⁊ folioꝝ cicoree ⁊ floꝝ radicis apij: feniculi:bruſci:ſparagi:⁊ ſempuiue:tamaridoꝝ:rubi: vuarum cū teneritate ſua:alchechengi vel nenufaris: ſolatri domeſtici.an̄.M.ſ.ſemis coriandri: portulace:apij: feniculi:aniſi ſubtiliſſime pulueriçatoꝝ.an̄.ʒ.iij. floꝝ boraginis:violaꝝ:pſilij ꝑparati:roſaꝝ.an̄.ʒ.iij. ſandali vtriuſq;: calami aromatici:ſpodij:maſticis.an̄.ʒ.i.ſucci plātagis depurati:ſucci fumi terre:ſucci apij:ſucci artemiſie:ſucci pomi acetoſi:ſucci ſcariole:⁊ pomi terranei ꝑfecte depuratorū.an̄.ʒ.iij.reuipontici.ʒ.iij.reubarbari electi.ʒ.i.ſ.cāphore.ʒ.i.ſpice.ʒ.ſ.çuccari lib.iij.aceti infecti in muſco.℥.iij. doſis.℥.i.vſq; ad.ij.cū aq̄ cicoree vel lactis caprini in mane. ¶ Hyppoc.ſirupus vltimꝰ epati iflāmato ⁊ poſſeſſori oppilationū venaꝝ. ℞.floꝝ tamariſci: camepitheos berberis.an̄.℥.i.endiuie epatice: ſcolopendrie lupulo.apij.an̄.℥.i.ariſtologie.M.i.ſandali albi:⁊ rubei.an̄.℥.i.çuccari li.ij.cuſcute:abſinthij.an̄.℥.i. ¶ Filiꝰ Zacharie.modꝰ emplī refrigerātis epar iflāmatū ⁊ fel ⁊ colerā. ℞. ſandali.ʒ.iij. ſempuiue trite.℥.ij.farie ordei.℥.ſ.maſt.ʒ.i. albuminis ouorū triū:cāphore.ʒ.ſ.olī ro.⁊ aq̄ ro.ſucci ſolatri ſucci berbene.an̄.ʒ.ij.aceti.℥.i.applicent̄ ꝑmixta bñ a tertijs vſq; ad veſpas. ¶ Syrupꝰ Iudei. ℞.ſucci endiuie ſucci abſinthij ſucci eupatorij.an̄. li.i.depurent̄ ⁊ addat̄ çucc.li.i.aceti radicū.℥.ij.Et arōatiçet̄ cū vtriuſq; ſādali:ſpodij.an̄.ʒ.ij.ſpice.ʒ.ſ.val; ictericie ci. ⁊ nigre ex aduſtiōe:⁊ oppil'one expertū eſt.Sil'r ſi fiat ex ſucco roſtri porcini. ⁊ ſi ꝑmittat̄ cum aceto albo ē efficax ⁊ exptū. ¶ Grecꝰ.medicamē magnū in egritudibꝰ diuturnis ep̄is icteritia nigra.⁊ egritudibus flatis ſalſi ⁊ lepra. ℞.fumiterre.ſe.lapatij.ſe.abſinthij:ſcabioſe.an̄.ʒ.ix.oīu; mirabo.ſine oſſibꝰ.an̄.ʒ.v.ieralogodiō.ſucci ro.an̄.℥.i. thimi.epithimi ſene. an̄.ʒ.vi. reupōtici.℥.i.māne:pulpe caſſie:tamaridoꝝ.an̄.ʒ.iij.reubar.bōi ⁊ reuſeni.an̄.℥.i.ꝯficiāt̄. ¶ Syrupꝰ. ℞.lacce ſpodij.an̄.ʒ.i.ſpartane.ʒ.i.polipodij aniſi.an̄.℥.i.eupatorij:epatice.an̄.M.ſ. doſis.℥.ſ.cū aq̄ lactis capn̄i. ¶ Vnguētū refrigerās epar acumē fell' ⁊ fe.cal'as magnas. ℞.aſſungie porcine recētis q̄ntitatē quā volueris .laua eā cu; aq̄ cal'a decies:⁊ octies cū fra.poſtea piſtet̄:⁊ cū ea icorporet̄ roſarum.℥.i.ſandali vtriuſq;:ſpodij.an̄.ʒ.iij.reubar.ʒ.ij. ſpice.ʒ.i.cāphore.ʒ.i. cere albe.ʒ.iij.olei roſati:ſucci ſempuiue.ana.℥.ij. coq̄nt̄ cū facilitate:deīde colet̄:⁊ ꝑmitte congelari ē maxīe efficacie vbi oꝫ. ¶ Ingt experimētator magnꝰ. Succꝰ ep̄ice cū albūie ouoꝝ agitato mixtus ꝑ decē dies in ieiunio aſſumptꝰ curat diſcraſiaz ep̄is ⁊ fell' cal'am ⁊ eſt efficax ⁊ appropriatū in icteritia.ſi xp̄s voluerit. ¶ Ingt Teſaurus. ℞.ſucci ſempuiue depurati ꝑtes.x.mell' ꝑtem.i. aceti ꝑtē.ſ.⁊ bulliāt ad ꝑtē mell'. Ius ſerpētis vt ſupra de cura oppilationū ep̄is poſitū ē ⁊ exptū in vtraq; ictericia:⁊ ſupcalefactis in ep̄e ⁊ malitia fell' nō et ꝯiūctiōe ꝯpl'onis ⁊ ſube q̄uis ad bene eē ſm aliqd faciāt nec ſuba nec compl'one. Scriptū eſt.n.ꝙ tale ex nō quali muniuit medicinā largitor bonoꝝ nāli:ſed ſupnaturali v̄tute vtraq; celeſti ⁊ elemētaria ſic̄ deꝰ creauit.ſic̄ q̄daz eſt nobiliſſima in rebꝰ virtus nō nā hac:ſ; altera nā. nā ignota:nō de naturis q̄ ſunt ſub ſole.ſed alteriꝰ nāe nr̄o itellectui ignote. ¶ Abo.ſirupus de abſinthio curat icteritiā citrinā:⁊ ꝯfortat ſtō;:⁊ camomilla ⁊ chechengi aq̄ decoctōis cuſcute lacca:⁊ ſirupꝰ de menta:lactuca cū aceto: caſiafi.acetoſitas citri ⁊ ſuccꝰ ro.curat eā:⁊ albaras. reubarbaꝝ ⁊ aloes cū aq̄ lactis capraꝝ vel camellaꝝ. ¶ Idē.ꝺcoctio polij cum aceto curat icteritiā nigrā litiū idū bibitū ⁊ linitū ꝓhibet icteritiā nigrā ⁊ ſplenē.Et aſſa admiſtrata cū ficubꝰ:⁊ decoctio cicerū ⁊ camedreos camepitheos cōfert icteritie nigre. Succus caul' cū vino ꝺ paſſis.ſuccꝰ radicis pētafilon calamē tum ſilueſtre ⁊ radix peonie ⁊ ſirupꝰ ex eis ꝯpoſitꝰ eſt efficax ⁊ exptus:ſi xp̄s voluerit:ſcolopendrie os ſpice ⁊ venetinctoꝝ ꝯferūt icteritie ex oppilatōe ⁊ ꝓp̄e cū aniſo ⁊ vio albo. Aq̄ folioꝝ rafani aperit oppil'ones ep̄is ⁊ rēouet icteritiaz reubarbaꝝ agaricū ⁊ aloes. ¶ Filiꝰ Serapiōis.medicina ſolutia q̄ abſtergit ictericiaz. ℞. ſcamonee:aloes:ſiracoſt.ſeīs atriplicis.an̄.ꝑtes eq̄les:terant̄:⁊ det̄ ī potu ex eis.ʒ.i.cū aq̄ bulliēte. ¶ Idē medicia ſolutia ad icteritiā valde mirabil'. ℞.ſcamonee.ʒ.iij.mirabo.citri.ʒ.vi. ſucci eupatorij.ʒ.ij.terant̄ ⁊ cribellent̄:⁊ det̄ potio.ʒ.ij.ex ea cū aqua ⁊ çuc. ¶ Serapio medicina ſolutiua ad icteritiā nigram expta ⁊c̄. ℞.ſucci ciclamis. ʒ.iij.alias.℥.i. Et ſolue ī .iij.lib.çuccari. ⁊ decoq̄ quouſq; remaneāt due ⁊ det̄ ī mane. ¶ Itē alia ad ictericiā:⁊ iceptionē idropiſis:⁊ dat̄ cu; lacte camelaꝝ vel aq̄ caſei:⁊ ſi illic ē cal'itas cū aq̄ ſolatri. ⁊ ēdiuie ⁊ volubilis. ℞.ſucci eupatorij: raued:croci.an̄.ʒ.i.ſ.lacce:ſeīs cuſcute.an̄.ʒ.ij.cimaru; ſgnāti:ſeīs citruli:ſemis cucumeris:ſeīs portulace ſcamōee antiocene aſſate ī citonio.an̄.ʒ.i.terant̄ ⁊ cribellent̄:⁊ det̄ potio ex ea aur.i. cū eo:qꝺ videt̄ ex rebꝰ ꝑdictis. ¶ Syrupus ex iuentione nr̄a.ad ep̄is iflāmationē.colerā reprimit ⁊ eius furorē in ciſti extinguit mēbra totiꝰ calefacta ifrigidat:febres alterat:⁊ diuturnas abbreuiat ⁊ ictericiā citrinā ſanat.ſi deus voluerit. ℞. ſucci endiuie:ſucci lupul'.depuratorum.ana. li..i.ſucci apij:ſucci abſinthij:et eupatorij.ſucci boraginis depuratoꝝ.an̄.li.ſ.⁊ bulliāt ī eis ꝑmixtis.v.radices cōes. ro.ī aceto.an̄.℥.i.lactucaꝝ:portu.papaueris: ēdiuie.an̄.℥.ſ.eupatorij.M.i.coq̄nt̄ ⁊ colent̄ cū expreſſiōe:⁊ colature addant̄ çuc.lib.ij.aceti:ꝑdictaꝝ radicū:⁊ ſucci granatorū muçoꝝ.an̄.℥.ij.⁊ in pecia rara bulliāt ſandali vtriuſq; ſpodij.an̄.ʒ.ij.⁊ q̄dā addūt cāphore.ʒ.ſ.doſis.℥.ij .cū tepida ī aurora:⁊ ꝑmittat̄ flomia ſi expedit. Deīde f̄nito ſirupo miſtret̄ ifuſio reu.ʒ.ij.ſ.in aq̄ caſei fructuū vel ſucci ro.⁊ alteret̄ epar cū ſādal' cōibꝰ ⁊ ſucco ēdiuie:deiñ balneū tēperatū dulcis aq̄ itret:⁊ ſuato bono regie liberabit̄ ſi xp̄s voluerit:q cū tali regimie liberaui multos. ⁊ eſt expertū.

¶ Incipit ꝑticula q̄rta ſectōis p̄me q̄ eſt de medicis egritudinū mēbroꝝ expulſiōis ꝯtinēs ſūmas. v.ſūma p̄ma de medicis egritudinū mēbroꝝ deſeruiētiū expulſiōi ſuperfluitatis ſicce vt iteſtinoꝝ ⁊ ani cōtinēs capitula.x.

E Xplicauimus hucuſq; ſermonē ī medicis egritudinū mēbrorū nutritōis q̄ ad tertiā ſpectabāt ꝑticula; ſectōis p̄me.tp̄s ē:vt afferamꝰ illū ad eiꝰ ꝑticulā q̄rtā q̄ erit de medicis egritudinū mēbroꝝ expulſiōis. ¶ Sciēdū ꝓut rettulit falco ꝙ expl'ſio ſupfluitatibꝰ ꝓp̄e ōbet̄ tāq̄; corpi iutilibꝰ. Circa quā.H.ſūmus medicoꝝ ingt.Et q: ex neccitate cibarijs ſupfluitas iſeq̄t organa ad euandū eā natura ꝯſtituit.eiſq; v̄tutes ipoſuit:qbꝰ mota alia q̄dē attrahunt: alia nutriunt̄:alia v̄o expellūt ſupfluitates. Attrahūt v̄o ſplen ciſtis fell' ⁊ renes:vt ī p̄mo capl'o ſūme tertie ⁊ q̄rte ꝑcedētis tertie ꝑticl'e dcm̄ ē. Nutriūt v̄o ſplē ⁊ ciſtis fell'. ſic̄ dcm̄ eſt ī ſūma ꝑcedēti:vbi de eis diximꝰ.Expellūt ſuperfluitates iteſtina:veſica ⁊ vie vriales. Triplici āt exiſte digōne ac triplici ſupfluitate q̄ illi inſeq̄t̄ neceſſario ſic ca.ſ.hūida ⁊ vaporoſa.ad expulſionē ſicce taliter a ꝑdominio nominate:q̄ digōni p̄me ſtomaci inſequit̄: cōſtituit ꝓprie ⁊ p̄ncipaliter nā inteſtina.vi.nūero:tria gracilia ⁊ tria groſſa cōtinua in ſe ipſa icipientia a fundo ſtomaci.⁊ ꝑtenſa vſq; ad poſtremum ſicteri lōga circumuoluta iuolutōibus pluribus: ligata dorſo ligamētis ſtrigētibus ea:qbus adueniunt arterie vene ⁊ nerui plurimi tanq̄; ſenſu plurimo idigentes. Cōpoſita ex duplici tunica neruoſa ſolida ne rumpant̄ a ſuperfluitatibꝰ trāſeuntibꝰ hn̄te tria ī ſe vil

lorum gña quoꝝ latitudinales in īteriori tunica ſūt ſitua
ti:in exteriori alijs ſituatis. Jngt.n.H.⁊ oīa.ſ.organa vide
bis ſm villos mota. Et ꝓpterea vnicuiqꝫ gdē īteſtinoꝝ ro
tundi.i.latitudīales ſm alterutrū tunicaꝝ īuoluti ſunt:q
circūtrahunť.n.ſolum attrahūt nihil. Et ſua circunuolu/
tione retinēt magiſqꝫ ꝓpria v̄tute:quoꝝ tria ſupiora gra/
cilia ītrinſeca ſupficie ſūt fulcitą hūiditate mucillagioſa.
tria groſſa īferiora piguedine ne a motis ⁊ diſcurrētib⁹ ſu
perfluis effundanť. Primū ipſoꝝ vocatū eſt duodenū.qꝛ
lōgitudis.xij.digitoꝝ in rectū exiēs a ſtōi fundo cui cōti/
nuať:c⁹ officiū ⁊ iuuamētū eſt vt ſit porta īferioris meat⁹
ſtōi:⁊ eo clauſo teneať cib⁹ in ſtō.donec digerať ꝑfecte.et
ſič cibus ꝑ meri in ſtōm ore apto trahiť ita eo apto expel/
lať ꝑ eū de ſtō ad īteſtina:alia gracilia ꝯtiua ipſi.ſ. ieiunū
⁊ ileon qbus multiplr̄ īuolutis teneať dōec meſeraice eis
affixe multe traxerit eis ſuccū ad epar:c⁹ ſūt man⁹.aliter
aūt corp⁹ ſemꝑ appeteret vt guloſū doneqꝫ ſi qd dimiu/
tum a digōne ī ſtō hūerit ꝯpleať ꝑ v̄tuté ei⁹ mediātib⁹ me
ſeraicis ab epe veniētē ⁊ ſua ꝓpa ꝯplōne q̄ eſt ſilis ꝯploni
ſube ſtōi. Et qꝛ maxie tales vene ſunt affixe ieiuno a quo
maxie attrahēdo ipm ianitū a viſcoſitate cibi dimittūt ⁊
a groſſo feculēto ianiēte ipm colera rubea illi tranſmiſſa
ꝑ felleū poꝝ a ciſti:q̄ excitat expulſiuā:dictū eſt ieiunum.
Jleon aūt iuuamētū eſt idē:lꝫ ab eo min⁹ trahať qꝫ a ieiu
no:plus tñ digō fit ī eo qꝫ fiat in īferiorib⁹ groſſis:q̄ ab ea
ēt nō euanť:ſič nec a venis epis veniētib⁹ ad ea ꝑꝑ ſuctio
nē:lꝫ modicū ſugāt:⁊ ab eo paſſio iliaca dcā eſt. Jngt.n.H.
Egritudies mltis mōis ſortiunť noīa vt a mēbro.⁊ hmōi.
Jnteſtino v̄o ileon ꝯtinuanť alia tria groſſa:quoꝝ officiū
gñale eſt ꝑparare feces cōpellere ⁊ exiccare.ſič triū graci/
lium gñale officiū eſt cibū a ſtō miſſū ꝯtinere donec meſe
raice traxerint ei⁹ ſuccū dimiutū digōnis ſupplēdo. Do/
rum ꝑmū dcm̄ eſt:monoculus:qꝛ vnū hñs orificiū per qō
cibū a ſupiorib⁹ gracilib⁹ recipit.⁊ ſi qd in eo ſit īdiſpoſitū
ſuctiōi ꝑꝑ īdigōnē ſtōi.⁊ ſupioꝝ īteſtinoꝝ detinēdo ipſuꝫ
getū in ei⁹ ꝯcauo tanqꝫ in burſa decoquēdo perfectius vt
aptū faciat ſuctōi meſeraicaꝝ in alijs īteſtis groſſis īferio
rib⁹ affixaꝝ:lꝫ illa ſit pauca q̄ꝝ ꝓportio ei⁹ ad īteſtia alia
groſſa eſt ſič ꝓportio ſtōi ad ſupiora gracilia. Et ꝑpea ſit⁹
ei⁹ eſt ad poſteriora:⁊ dēclinās aū ꝑtē dextrā vt v̄tutis epa
tis opportūe recipiat īfluētiā: qō v̄o oīo īdiſpoſitū ē illi ꝑ/
parat vt ꝯuertat in fecē quā poſtmodū ꝑ idē orificiū ex/
pellit ad īferiora ⁊ plurimū ad ꝯſumptionē flatis ī eo ag/
gregati ꝑ īdigōnis modū lūbricos ⁊ ſerpētes ex ipſo corru
ꝑto gñat:paucos tñ nūero ⁊ qꝫtitate.ſic.n. iuuāt ad ipſius
ꝯſumptionē nec nocēt: q̄re corp⁹ raro ē ſine eis. Et ex ei⁹
iuuamētis eſt vt colligat feces ⁊ paulati ſubſeqnti ipm.ſ.
colon emittat vt exiccenť:⁊ cōpleanť ī eo atqꝫ aggregenť
donec expellanť a nā grauata ⁊ meli⁹ ꝯprehēdēte totum
cōiunctū qꝫ diſpartitū.ſi.n.ſiltanee expellereť ad īteſtinū
colon.⁊ ſil venirēt oēs timereť euēt⁹ collice ꝑꝑ multitudi
nem oppilantē. Et hoc īteſtinū digni⁹ eſt vt deſcēdat ī bur
ſam teſticuloꝝ alijs ꝓpter rupturā īguis ſeu ſiphac cū nō
ſit alligatū meſenterio per meſeraicas vt alia īteſtia:imo
pendēs ab alijs ſič burſa oblonga. Huic.n.ab īferiori par/
te ꝯtinuať aliud groſſum īteſtinū vocatū colon. Cuius iu
uamētū eſt feces exiccare.⁊ ꝯplere ⁊ aggregare vt dcm̄ ē:
⁊ ab eo dicta eſt collica ſič iliaca ab ileon. Et hoc īteſtinuꝫ
cū elōgať a monoculo declinat ad partem dextraꝫ ꝓpin⁹
quam epati:deīde ad partē ſiniſtrā deſcēdit:⁊ pertrāſiēs
ſplenē coartať:q̄propter in groſſicie ſplēis vētoſitatis exi/
tus ꝓhibeť.dū vero cōprimiť ſuper ipm:deīde redit:⁊ de
clinat ad partē dextrā ꝓpinquā epati deſcēdens ad poſte
riora:⁊ tūc cōicat renibus ⁊ vijs vrine: q̄re in lapidē renū
cū aggregať ⁊ deſcēdit cū vrina accñtia accidūt collice ꝓ
pter cōpaſſionē ex colligātia ⁊ vicinitate. Et illic ꝯtinuať

cū recto:qō eſt poſtremū īteſtinoꝝ ī rectū ꝓcedēs vſqꝫ ad
ſicteri cui ſui extremitas ampla cōtinuať.⁊ in ſuo ꝓceſſu
ſuſtentať ꝓpter dorſū alchati. Cui⁹ iuuamentū:vt dcm̄ ē.
ē fecis expulſio ad exteriora:⁊ vt ſit facilis ſuit ī rectū po/
ſitū:ad cui⁹ expulſionē adiuuāt lacerti ventris almirac
octo nūero ſm.H. Et lacerti q ſunt in ipſis ꝑter quaſdam
extremitates ipſoꝝ ⁊ alioꝝ que ſunt via cibi vt eſt gutt:⁊
caput ⁊ extremitas q̄ eſt in ſicteri q̄ iuuanť lacerto latitu/
dinali:illa ad attrahendū.hec vero ad retinēdū. Ex qbus
ſic per anothomiā collectis ſcire ⁊ ꝯprehēdere poteris co/
rum nām ⁊ q̄les ⁊ qꝫte ſint egritudies eis accidere poſſes.
loca quoqꝫ egritudinū cās ⁊ modos nec non ꝓpria:⁊ cōia
accñtia īſurgētia q̄ oīa ſunt in cura egritudinū neceſſario
ꝑſcienda. Scire ergo oꝫ q̄ īteſtis accidere pñt morbi cu/
iuſlibꝫ gñis.ſ.male ꝯplōnis ꝯpōnis ſolonis ꝯtinui ⁊ apa/
tis:veꝝ qꝛ īfirmo cū ſint īteſtina ī ꝓfūdo poſita ipoꝝ mor
bi ſenſu nō ſūt ꝑcepti nec medico niſi ſpē alteri⁹ duoꝝ ſin
thomatū cōiuꝫ oīb⁹ doloris.ſ.⁊ flux⁹ q̄ ſm.H. ſuo exceſſu
īprimunt nām ſubaꝫ ipſi⁹ reſoluēdo ⁊ euādo: q̄re medi/
cū cogūt dſiſtere a cura ꝑdictoꝝ morboꝝ ⁊ vehemētie ipo
rū īſtare ac fixioni ⁊ ꝑmanētie eorūdē qb⁹ egritudis nāꝫ
aſſumūt egrotis:illud idē petētib⁹ ꝑ moleſtia ⁊ defectiōe
q̄ ſentiūt vt ſupra in ſtō dixim⁹.⁊ ēt in corde. Jdcoqꝫ an/
tiq de egritudinū īteſtinoꝝ cura agētes moti ſūt curā illo
rū duoꝝ ſinthomatū tm̄ ꝯtractare.cura.n.illoꝝ v̄a eſt cu
ra ꝑdictoꝝ quos ſequiť morboꝝ. Scdm hoc igiť.hec q̄r
ta particula qnqꝫ cōtinet ſūmas. ❡ Prima erit de medi/
cinis egritudinū mēbroꝝ deſeruiētiū expulſiōi ſupfluita
tis ſicce vt īteſtinoꝝ ⁊ ani. ❡ Scda de medicis egritudi/
nū mēbroꝝ deſeruiētiū expulſioni ſupfluitatis aquoſe vt
renū veſice ⁊ alioꝝ. ❡ Tertia de medicis egritudinuꝫ te
ſticuloꝝ ⁊ virge. ❡ Quarta de medicis egritudinuꝫ mēb/
cis q̄ gñatiōi deſeruit ⁊ expulſiōi ſeis atqꝫ fer⁹ de gñe ſu/
perfluoꝝ ſm q̄ exiſtētiū in diuiduo expellēti. ❡ Quinta
de egritudib⁹ mēbroꝝ ⁊ partiū vētris ex qbus ſunt lacer
ti ventris ⁊ alie cooperātis ꝑdictoꝝ mēbroꝝ expulſiōi vt
.H.dixit. ❡ Prima ſūma continet capitula.x.

❡ Capitulum.i.de dolore inteſtinoꝝ ⁊ medicinis eius.
❡ Capitulum.ij.de cura vermiū ⁊ medicis eorum.
❡ Caplm.iij.de fluxu vētris oīum modoꝝ ⁊ medicis ei⁹.
❡ Caplm.iiij.de tenaſmone ⁊ medicinis eius.
❡ Caplm.v.de emoroidibus ⁊ medicinis earum.
❡ Caplm.vi.de apoſtematib⁹ ani ⁊ medicinis eius.
❡ Caplm.vij.de medicinis ragadiarum ani.
❡ Caplm.viij.de medicinis fiſtularum ani.
❡ Caplm.viiij.de pruritu ani.
❡ Caplm.x.de medicis mollificatōis ani ⁊ exitus eius.

❡ Caplm ꝑmū de dolore inteſtinoꝝ ⁊ medicinis eius.

Dolor īteſtioꝝ ē ſenſus nociu⁹ eoꝝ ⁊ eſt diſionē re
cipiēs. Nā aut ē ī oīb⁹ aut ī aliqb⁹. Si ī oīb⁹ vt to/
tū ꝯphēdat vētrē hypocūdria.ſ.ſupra ⁊ īfra vmbi
licū.⁊ hic aut ē ī motu.⁊ dř tortio:aut eſt qet⁹:⁊ dř ꝓpe do
lor vētris:q ſi mediocres ſint īdicāt diſpōnē neutralē ⁊ fu
turā portēdūt egritudinē.ſi v̄o fortes vt actionē ledāt:ſūt
egritudo. Jngt.H.tortio qdē ī vētre aut aliqs mediocris
dolor:aut ſꝫ ſtōꝫ:aut ſꝫ īteſtioꝝ aliqō ō gñe ſūt:eoꝝ q̄ ſūt
ꝑter nāꝫ.⁊ hec ſť egritudinū ſigna qꝫ diu fuerit pui.nōdū
v̄o egrotare ita hñtes diciť qñ nōdū ꝑꝑ hoc a ꝯſueta opa
tōe īpediūt:⁊ egritudies ei⁹ iſta ē ī talib⁹ diſpōnib⁹:⁊ ꝑpea
ī ad aliqd eādē diſpōnē ⁊ neutrā ⁊ egrā dicim⁹. Si ī aliq
b⁹:aut eſt circūſcript⁹ ī aliquo ꝑticlari loco alic⁹ q̄tuor par
tiū ventris.⁊ tñ puus ⁊ dř pūctio:⁊ eſt ō gñe neutroꝝ:aut
eſt magn⁹ fix⁹ ⁊ ꝑdurās ad opa ꝯſueta īpediens:⁊ tč aut ē
in groſſis ⁊ dř colica ꝓpe a colon. aut eſt ī gracilibus:⁊ dř
iliaca ab inteſtino,ileon ꝓprie. horum aūt nominū ipoſi

tio a nomĩe ipſoꝝ duoꝝ ĩteſtinoꝝ ſumpſit originez pp eo
rum aptitudinẽ: ⁊ ꝓpetatẽ iter alia ad hũc incurrendũ do
lorem. ſũt. n. ſtrictiora alijs. ⁊ circũuoluta circũuolutiõib⁹
plĩbus qb⁹ apta ſunt repleri. ⁊ oppilari: maxie ſupfluitati/
bus q̃ ſunt cã doloris. nõ ſic duodenũ ꝓpter ei⁹ ſit⁹ recti/
tudinẽ ⁊ breuitatẽ ⁊ orificiũ largũ. Nõ ẽt ſic rectũ pp eius
rectitudinẽ curtitatẽ: oris largitatẽ ⁊ ꝓpingtatẽ ad extra.
⁊ hec eſt diuiſio quã dolor recipit a locis ſine cãe pcipien/
tis varietate. Alia ẽ diſio quã dolor r̃cipit rõe ſue cẽntie ⁊
ĩprimẽtis cãe. ⁊ eſt qꝛ aut eſt pũgitiu⁹: aut grauatiuus aut
extẽſiuus: aut corroſiu⁹: aut pforatiu⁹. ¶ Cã. n. iterior ipz
dolorẽ ĩprimẽs aut ẽ calа ⁊ acuta ⁊ ſubtil' ĩpoꝝ ſeperãs cõ
tinuitatẽ: lꝫ ſit raro: ⁊ tũc facit pũgitiuũ. aut ẽ frigida groſ/
ſa viſcoſa alterãs. ⁊ tũc facit grauatiuũ: aut ẽ vẽtoſa ⁊ ytra
ꝙ eſt plurimũ cã ei⁹: ⁊ tũc facit extẽſiuũ ⁊ dolorẽ ventris
ꝯprehendere totũ: lꝫ hic q̃nq; a frigiditate exteriori ꝓce/
dat: aut eſt diſcurrẽs cũ adherẽtia cũ circũuolutõib⁹ inte
ſtinoꝝ: ⁊ tũc facit tortuoſum ſeu tortionẽ aut penetrãs in/
ter duas laminas ĩteſtinoꝝ ⁊ ſeparãs iter eas: ⁊ tũc facit
pforatiuũ ac ſi viſcera pforent̃ terrebello. ſic̃ in ſe ipſo pa/
tiente collicã. H. ſenſit: q̃ ſi ſit debil' facit dolorez pmũ de
neutralitatis gñe. ſi fortis collicũ ⁊ iliacũ. Et ſi gdẽ ſue im
preſſiõis fortitudie multũ debilitauerit iteſtina alterãdo
ſoluẽdo oppilãdo pfecte: vt qꝛ fuerit vẽtoſitas ꝯtorquẽs
ea groſſa ⁊ fixa queadmodũ apa iã factũ ⁊ cõfirmatũ ĩ eis
eũ cõfirmatũ relinquet. ſi v̓o nõ multũ debilitauerit ĩte/
ſtina erit in fieri nõ ꝯfirmatũ. Et gñaliter aut cã ei⁹ erit ĩ/
terior: aũt exterior. Et ĩterior aut ẽ ĩ ipſis ĩteſtis aut ĩ alijs
pueniens ad ipſa pp colligãtiã ⁊ cõitatẽ ꝓpinquã abſolu/
tam: ⁊ nõ abſolutã. In ipſis exñs eſt egritudo q̃libet debi/
litãs eoꝝ expulſiuã. ſ. mala cõplõ mala ꝯpõ: ſolõ ꝯtinui. ſ.
apa. Mala cõplõ diuerſa ſubito alterãdo ipſoꝝ nãm do/
lorẽ facit quelꝫ ⁊ mãlis ⁊ plurimũ frida pp ꝓportionẽ in
nã. min⁹ vero hũida de ſe pp debilitatẽ ĩpreſſiõis. Ma/
la cõpõ eſt ipſi⁹ cã per accñs: nõ per ſe: cũ eñ dolor ſit ſen/
ſus nociuus nõ fiet niſi ex permutatione grandi fiẽte a re
p̃ter nãz ĩprimẽte in organũ v̓tutis ſenſibilis ⁊ in nãz ei⁹:
q̃ eſt cõplõ ⁊ vnitas ſeu ꝯtinuitas c⁹ fit pmutatio ⁊ altera/
tio in dolore. eſt. n. v̓tutis ſenſibilis tactiue: c⁹ dolor ẽ paſ/
ſio organũ p̃ncipale ⁊ cõpletiuũ ꝯſile membꝝ: puta ner/
uus ſm. H. nõ officiale c⁹ nã eſt ꝯpõ ⁊ ꝯtinuitas ꝓpꝛie ⁊ nõ
vnitas vel ꝯtinuitas ꝓpe vt Auer. ponit. Ad hoc aũt com
poſitio ipſa mala nõ ẽ ĩprimẽs ⁊ pmutãs nãm organi ſen/
ſus tactus iã dictã: cũ nõ ſit illi ꝯ̃ria ſic̃ eſt mala ꝯplõ ⁊ ſo/
lutio: qbus mediãtibus res alterãs ⁊ ſoluẽs ĩprimũt in il/
lam. ⁊ ſi res ĩprimẽs malã ꝯpõnẽ in mẽbro ꝯpoſito ſoluat
eius cõpõnẽ. ⁊ ſic ĩducat dolorẽ: illud tñ nõ erit. qꝛ ꝯpõne
ſoluat q̃ eſt ei⁹ nã ꝓpa: ſed vnitatẽ ⁊ ꝯtinuitatẽ q̃ ſꝫ auer.
eſt ꝓpa nã mẽbri ꝯſilis qõ eſt organũ ſenſus. ⁊ ſic p accñs
faciet. Ex qbus ꝯcludendũ q mala cõpõ per ſe nõ ſit cã
doloris: tum qꝛ ei⁹ pmutatio dolorez nõ cauſat: tũ qꝛ ipſa
nõ ĩprimit nec pmutat nãm organi ſenſus per ſe: c⁹ permu
tatio doloris eſt cã. Per accñs aũt mala ꝯpõ fit cã ei⁹ du/
pliciter. puta: qꝛ fit ĩ eis oppilõ. pmo rõne ſue cãe replẽtis
⁊ oppilãtis ei⁹ receptaculũ atq; viã ꝓhibẽtis expulſione:
Put ſpectat ad pñs: q̃ põt multipl'r p̃ſtare dolorẽ. Aut qꝛ
ſit ſtercus durũ ſiccũ groſſum: ⁊ multũ: qõ extẽdẽdo dolo
rem ĩprimit: aut hũor groſſus viſcoſus ⁊ multipl'r ĩfrigidã
do ⁊ extendẽdo ĩducat dolorẽ. Aut lapis aut vermes mł/
ti ⁊ groſſi ⁊ cõglobati: q extendẽdo ⁊ pungẽdo dolorẽ idu/
cunt: aut apa qõ alterãdo: ⁊ ſoluẽdo dolorẽ p̃ſtat: ⁊ ſic dar
tatoria fit nõ carnoſa nec verucoſa aut attenuatoria: ⁊ eo/
rum ptes ꝯſtringẽdo ac ꝯprimẽdo dolorẽ p̃ſtãs vt eſt ad/
iacentia mẽbroꝝ vicinoꝝ cõprimẽtiũ vt ſplenis ꝓpe apa
ti ⁊ ĩdurati: ⁊ ſil'r epatis ⁊ lacertoꝝ almirac: aut vẽtoſitas
circumuoluendo ⁊ torquẽdo oppilãs. ⁊ per ꝯñs replendo
⁊ extendendo ipſa faciens dolorẽ ꝯſideratione aliaꝝ ſup/
fluitatũ ex ea retentaꝝ q̃ cã doloris eſſe pñt. Solõ conti/
nui coꝝ nãz mutãs ſoluẽdo dolorẽ fac̃ p ſe: lꝫ auer. oñdat
ꝯ̃rium dicẽs q cũ dolor ſit ſenſus nociu⁹ a ꝯ̃rio ĩpreſſore
nõ ſentit̃: niſi per ꝯplõnẽ mẽbri nãlez nõ ĩtegre pmutatã:
ſi enim eſſet itegre permutata nõ ſentiret̃. Impreſſor aũt
ꝯ̃ri⁹ cõplõni nãli erit mala cõplõ alterans ꝯplõnez nãlẽ
vt eſt mala cõplõ ſeu q̃litas: nõ ſolutio ꝯtinui: vt dixit. H.
⁊ errans auicenna confirmauit. Cui falco reſpõdit. d. q ſi
ſolõ ꝯtinui ſeu ſoluẽs ꝯtinuitatẽ in q̃tũ h⁹ nõ ſit ꝯ̃riũ im/
primẽs in nãlẽ cõplõnẽ mẽbri: eſt tñ ĩprimẽs in vnitatez
ipſi etiam nãlem. ambe ſunt eñ nãles ei ſm eũ. ⁊ ꝓpe vni
tas ⁊ ꝯplõ: lꝫ ſm. H. vna ſit cõis ⁊ alia ꝓpa ⁊ ambe a ſe lu/
ent. q̃ſi in ſimul pmutate. ſic. n. ĩuicẽ in mẽbro ꝯſimili ſũt
cõiuncte q mutata vnitate ſeu cõtinuitate ſtatim ĩducit̃
mala cõplexio: lꝫ nõ ecõuerſo ſeq̃tur: ⁊ illud qm̃ ſolõnem
eũo cõitat: ſeqturq; occurſus alteri⁹ caloris ⁊ ſpũs q male
complexiõis eſt cã: q̃re ſolutio cõtinui cã per ſe erit dolo/
ris: ⁊ maioris q̃ꝫ mala cõplexio: qõ ẽt ſenſus declarat ꝯtra
quem nulla r õ valet. ſicut ga. ⁊ ariſto. dixit. Et cã ſoluens
coꝝ continuũ eſt aliqua ex p̃dictis puta humor acut⁹ vel
multus vẽtoſitas vermes ⁊ lapis in ĩteſtinis generat̃. vt
recitat. H. Et vidim⁹ nos quendã puerum emittentẽ plẽs
lapides groſſos ſic̃ nux ⁊ plus per anũ nõ taꝫ magnos per
virgã: cui contulerunt valde melones: ⁊ mirũ: qꝛ ſine do/
lore: lꝫ in lapide ĩteſtinoꝝ minor dolor ſit ſic̃ ẽt generatio
minor: ⁊ illud ꝓpter ꝯplexionẽ amplitudinẽ mẽbri. ⁊ va/
cuitatis eius. Apoſtematis aũt cãe ⁊ modi ſuperius dicte
ſunt. Cã aũt ei⁹ ab alijs ꝓueniẽs ad ipſa: ⁊ ĩfluẽs cũ cõitate
nõ abſoluta: ⁊ ꝓpinqua eſt vt cum a ſuperioribus iteſtis ⁊
ſtõ aliq̃ p̃dictaꝝ cãꝝ ad ea ꝓuenit ſeu mittit̃ aut rẽota cũ
ab epe vl' ſplene aliq̃ ex illis imittãt̃ eis: vt ẽ plimũ co. ru.
vel ni. aut a ſpũalib⁹ vt cũ eis ſanies mittit̃ ab vlcerib⁹ pe
ctoris ⁊ pulmõis p venã magnã extẽſam ſupra dorſũ me
diãte epe: lꝫ illud fit raro aut a cerebro: vt ĩ catarris. aut a
toto corpe vt ĩ diaria ⁊ fluxu liq̃factio ⁊ fe. diſſolutia: aut
pp cõitatẽ abſolutã ⁊ ẽ ipoꝝ ꝯpaſſio ad renes ⁊ vias vrine
hñtes lapides ⁊ ſtrãguriã. aut neruos vt ĩ ſpaſmo ⁊ tetão.
aut ad ſiphac rupturã cũ deſcẽdũt ĩ burſã teſticuloꝝ. Ex/
terior v̓o cã eſt aer f̃rus vel peſtilẽtial' ⁊ vẽt⁹ ſeptẽtrional'
balneatio ĩ aq̃ f̃ra. ſeſſio ĩ lapide f̃ro. potus aq̃ f̃re vel vene
ni alterãtis ⁊ corrũpẽtis ⁊ ꝓpe in ileon ⁊ cib⁹ ⁊ pot⁹ q ſua
ꝓpetate hñt facere collicam vt cucur. vua: pira ĩmatura:
fruct⁹ põtici ⁊ alij recẽtes. Et potus aq̃ f̃re ſup ipſos ⁊ cibi
ex põticis ⁊ ſtipticis: ⁊ caſus ſup vẽtrẽ: pcuſſio cõtundẽs ⁊
ſcindẽs. Sꝫ ſpãliter ingrẽdo ipſi⁹ cã ẽ: q̃ vniuſcuiuſq; ſpẽi
ei⁹ gñalẽ cãm ſubdiuidit ⁊ ſpecificat p̃diſtictã. Pũgitiui
. n. doloris cã cũ ſit calа ⁊ acuta ⁊ ſubtil' aut erit hũor cole
ric⁹ aut ſalſus ſua viſcoſitate eis adherẽs: ⁊ ſua bauracita
te mordẽs: aut ſãguis corrupt⁹ aut v̓mes ſuis capitib⁹: aut
aculeis ea pforãtes ⁊ pũgẽtes: aut vlc⁹ apatis. aut vẽtoſi/
tas coartata q̃ petẽdo exitũ pforat: ⁊ pũgit: ⁊ oĩuꝫ cã quo
ad q̃dã dcã ẽ. quo ad aliq̃ dicet̃ ĩfra. Et grauatiui cã ei⁹ cã
ſit f̃ra groſſa ⁊ viſcoſa in eis aggregata: aut erit hũor f̃lic⁹:
aut ſãguis ꝯgelat⁹: aut mł̃ia q̃ d̓ ſe dolorẽ talẽ faciũt ⁊ ſua
uẽ q ꝯuerſi ĩ vẽtũ exacuũt ⁊ ĩtẽdũt ſꝫ. H. Extẽſiui tortiui
⁊ pforatiui cũ ei⁹ cã ſit vẽtoſitas aut erit ex pte cãe efficiẽ
tis: aut mãl' aut vtriuſq; vt ſupra d̓ ĩflatiõe ſtõi dcm̃ ẽ. Et
cã mãl': aut ẽ hũor groſſus ⁊ hũid⁹ ex guloſitate ⁊ idigõne
cãt⁹: aut cib⁹ q ſua nã mł'tiplicat f̃la: ⁊ vẽtoſitatẽ: qr̃ colli
caꝫ fac̃ q ibi ſupra not⁹ ẽ. ⁊ ſil'r pot⁹. Et ſiccitatis ſtercoris
aut groſſiciei cã ẽ aut ex pte cibi: aut ex pte corpis. Cibi qꝛ
fuerit ſicc⁹ ⁊ pauc⁹. Si ex pte corpis: aut ex cã in inteſtis:
aut in reliquo corpore. In inteſtinis per ſe. et per accidẽs.
per ſe quia ſint calida: ⁊ ſicca nãliter vel ex frigiditate ex/
triſeca aeris cõſtrigẽte calitatẽ iteri⁹ q̃ hꝫ facere exiccare

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0327-6
DFG

⁊ flegma groſſum condēſare in lapidem. ¶ Per accidēs
aūt: qꝛ longo tēpoꝛe eam retinuerit. ⁊ cā eſt: qꝛ ſint foꝛtis
retentionis ⁊ debilis expulſionis nāliter: aut ex tempoꝛe:
aut qꝛ ſint debilis ſenſus: aut ex egritudine vt paliſis aut
ex medicina narcotica ſumpta. Si in reliquo coꝛpoꝛe aut
in aliq̄bus mēbꝛis: aut in totiꝰ habitudīe. ꝑmo mō vt cū
fuerit in lacertis ventris debilitatis in cōplōne: aut qꝛ nō
fuerit miſſa colera excitās ipſa ad expulſionē ꝑꝑ peccatū
in epe ciſti. ⁊ vijs colere ad ītestina: aut qꝛ multa vꝛia fue-
rit ꝓuocata. Jnq̄t. n. hyppo. in affo. multa vꝛina noctu fa-
cta modicū ſeceſſum ſignificat. Si in hītudine totius: vt
qꝛ fuerit coꝛpus inanitū vel multe reſolōnis māifeſte cū
ſudoꝛe vel occulte: qꝛ fuerit rare ꝯpōnis aer calidꝰ ⁊ reſol
uens: ars coadiuuās: vt laboꝛioſa in aere calō vt fabrīl vi
trealis: ⁊ ſeruiētiū in balneo. ⁊ in ſole vt curſoꝝ ligōiçātiū
remigātiū murantiū ⁊ aratoꝝ. Et modꝰ cōis in euētu co-
lice eſt vt repleaꝑ ꝑmo monoculū ītestinum fece ⁊ flāte
groſſo ⁊ oppileꝑ qđ calefactū a circūſtātiū mēbꝛoꝝ calīta
te vel approximatōe auxilioꝝ ⁊ ꝯuerſū in vētū ⁊ extēſū
ad īferioꝛa collicā ⁊ doloꝛē foꝛtē faciat. Et dū nō euaꝑ mo
noculū nō ſanaꝑ ꝑfecte: īmo tūc accidit: vt ſi fiat cliſtere
aut euapoꝛatio agitaꝑ mā in monoculo aggregata q̄re du
plicaꝑ doloꝛ ſic accidit ēt in iliaca maxie. Cū enī cliſtere
īmittiꝑ: mā in gracilibꝰ contenta ad q̄ nō peruenit enema
ſubalr vt. d. H. ſed ſꝫ vtutē agitaꝑ ⁊ ꝯmoueꝑ: q̄re doloꝛ au
geꝑ. Et qn̄qꝫ cliſtere ⁊ mā mota ꝑ ipm nō hn̄s exitū ꝑ īfe-
rioꝛa ſuperiꝰ expelliꝑ: ⁊ cū ſtercoꝛe ſimł ꝑ os emittiꝑ ⁊ eſt
moꝛtale: vt dic̄. H. Et qn̄qꝫ in ſtōi oꝛe ibibita manet ⁊ fac̄
ſingultū. Et quēadmodū collica ⁊ iliaca ex alijs mēbꝛis
patiētibus accidit ꝑꝑ colligātiā vicinitatē ac cōitatē: ita
ex eo paſſio ⁊ nocumētū alijs ꝓuenit mēbꝛis ꝑꝑ cōitatē
nō abſolutā ⁊ permutatiōē māe ipſiꝰ ad ſtōm ⁊ ꝓpe ilia-
ce. Et qn̄qꝫ accidit ſingultꝰ ⁊ vomitꝰ vt dcm̄ ē. qn̄qꝫ ad iū
cturas doꝛſi ⁊ alioꝝ mēbꝛoꝝ articulos ex q̄bus doloꝛ ī eis
debilis obfuſcatꝰ ꝑꝑ collice vehementiā vt dixit hypp. q̄
ſi ſit ex mā ipſiꝰ multa extēſiōe malū eſt. ſi vō ex ꝑmuta-
tiōe eſt bona. Et qn̄qꝫ fit trāſlatio māe ⁊ permutatio ad
neruos: ⁊ accidit paraliſis: ⁊ qn̄qꝫ ad cerebrū: ⁊ accidit epi-
lepſia vł melia: ⁊ tūc ꝓpe cū balneū approximaꝑ añ euo-
nem. Et qn̄qꝫ ꝑꝑ cōitatē abſolutā coꝛrumpit epis cōplō-
nem. ⁊ accidit idropiſis. Et qn̄qꝫ coꝛdis ꝑꝑ vtrāqꝫ cōitatē.
⁊ accidit tremoꝛ eiꝰ ⁊ malitia anhelitꝰ ⁊ ſudoꝛ frīus ⁊ ſinco
pis ⁊ eſt malū ſignū totū. Et ex collica ⁊ iliaca deterioꝛ eſt
cꝰ cā eſt oppilō ꝑfecta ex apate. Deīde ex ventoſitate toꝛ-
quēte: deīde ex hūoꝛe: deīde ex fece. ¶ Signa doloꝛis vē
tris ⁊ ītestinoꝝ: q̄dā ſunt rememoꝛatiua: q̄dā demr̄atiua:
⁊ q̄dā ꝓnoſtica. Rememoꝛatiua ſūt q̄ rememoꝛant cās
eiꝰ ꝑmitias extra coꝛpꝰ: ⁊ coꝛpꝰ ītrātes ex potibꝰ ⁊ cibis: q̄
per nām ⁊ ꝓpꝛietatē hn̄t cōmouere ipꝫ ⁊ ꝯſuetudo ēt eue
niēdi. Jnq̄t. n. Abo. cā eſt q̄ ꝑmo eſt ex q̄ ꝓuenit īuētio di-
ſpōnis in coꝛpe hūano q̄ ex medici rememoꝛatiōe ac īfir-
mi relatione ⁊ aſtātiū aſſertiōe habeꝑ. Demr̄atiua ſunt q̄
ꝓntē doloꝛē ⁊ ſpēs eiꝰ declarāt: ⁊ cās: ⁊ gn̄alr colligunꝑ ex
ſenſu q̄ ꝯriū īpꝛeſſoꝝ ſubito ꝑcipit in varijs ꝑtibus vētris
vario mō ſm̄ diuerſitatē caꝝ īpꝛimētiū ipm vt ſupꝰ dcm̄
eſt. Spāliter aūt ex ſignis ꝓpꝛijs diſtictiuis īter eas: ⁊ ꝓ-
pꝛie īter colicā ⁊ iliacā oꝫ colligere illa ꝑꝑ ꝯuenietiā eaꝝ
qꝛ erroꝛ pōt accidere īducēs periculū ex reſolōne vtutis
quā īpoꝛtāt: ⁊ ꝓpe iliaca. ¶ Un̄ dcā eſt ab antiq̄s. domie
miſerere. Jnq̄t Abo. doloꝛ foꝛtis reſoluit vtutē ⁊ mēbꝛa a
ſuis operatiōibus ꝓhibet. ¶ Circa qđ ſciendū q̄ collica ⁊
iliaca quāqꝫ in cauſis gn̄alibꝰ ꝯueniāt ꝑnarratis diſtiguū
tur tn̄: ⁊ dn̄t in ſpālitate ipſaꝝ: ac ex eis plurima ꝯtingen-
tia nec nō ⁊ in ſpē doloꝛis in q̄titate ipſiꝰ in loco eiꝰ ī ꝑmu
tatione illius in exeūtiū diuerſitate ac remedioꝝ iuuamī-
to. Jn ſpālitate cāꝝ. nā iliaca plus accidit ex cāis ꝑmiti-
uis ⁊ extrinſecis ⁊ mala cōplōne ſinguli ⁊ frigida ⁊ a potu
aq̄ frigide nō ſm̄ neceſſitatē: ⁊ hoc qꝛ gracilia ſunt ſtō ma-
gis ꝓpinqua: ⁊ ēt ab apate accn̄ti magis ⁊ ab aere peſtilen
tie ꝑꝑ ꝓpinq̄tatē ad coꝛ ad ſtōm: q̄re ꝑmutaꝑ de regiōe in
regionē ⁊ de coꝛpoꝛe in coꝛpꝰ ad modū peſtilētis moꝛbi a
tota ſpē venenoꝝ ſūptoꝝ ꝑꝑ vicinitatē graciliū ad ſtōꝫ. ⁊
ꝑꝑ vehemētiā vtutis retentiue. qꝛ ſtrictioꝛa. ⁊ qꝛ ad retē-
tionē gracilia ſunt gn̄ata potiꝰ q̄ꝫ ad expulſionē. Jn ſpē do
loꝛis. nā in iliaca doloꝛ eſt magis oppilatiuꝰ ⁊ toꝛtuoſus ꝓ
pter eiꝰ ſtricturā ⁊ pungitiuꝰ ꝑꝑ colerā miſſā ad ea. Jn q̄-
titate doloꝛis. nā in iliaca doloꝛ eſt maioꝛ ſm̄. H. i. acutioꝛ.
Inteſtinū. n. ileon eſt magis neruoſū ſm̄. H. ⁊ magis ꝑnci-
palibꝰ ꝓpiquū. q̄re ꝑcipiꝑ ⁊ magis vtutē reſoluit: q̄re īter
petratꝰ eſt ab antiq̄s. Domie miſerere. a quo nos tueatur
xp̄s: q̄ oīum eſt ꝓtector. Jn loco. nā in iliaca doloꝛ eſt ſu-
pꝛa vmbilicū ⁊ in hypocūdrijs ꝓpe. Jn ꝑmutatōe illiꝰ: nā
eius mā eſt maioꝛis ꝑmutatiōis ad mēbꝛa ꝑdicta ꝑꝑ ma-
ioꝛem vicinitatē ileon ad ipſa ⁊ colligantiā. vn̄ p̄dcā ſe-
quunꝑ icōmoda. Jn exeūtiū diuerſitate: nā ī iliaca egre-
diꝑ per anū paꝝ vel nihil. vn̄. H. ileon eſt cū nihil egrediꝑ
ēt ſi acutiꝰ cliſteriçeꝑ: ſed ꝑ vomitū ⁊ illud eſt flīcū: q̄ꝫ co
lericū rubeū: qn̄qꝫ viride eruginoſū vel praſſinū magis: ⁊
qn̄qꝫ nigrū ⁊ itenſum: ⁊ plurimū vētoſū cū eructatiōe: ⁊
raro fetidū ⁊ ſterglinoſū q̄ ſi accidat vt emittaꝑ tale ꝑ vo
mitū noīaꝑ ſcroſus alias fetidus. nā os eructuatio anus ⁊
totū fetet coꝛpꝰ eſt moꝛtale ſm̄. H. ſed illō eſt ꝑlūmū: vidi-
mus. n. ſanari aliquos. ¶ Jtē in iliaca vꝛina ē coloꝛata mł-
tū ꝑꝑ doloꝛē īflāmantē acutioꝛē: ⁊ qn̄qꝫ ꝑꝑ retentionē co-
lere nō miſſe ad gracilia ꝑꝑ oppilationē accn̄tē in ipſis: q̄-
re redit ad canales ⁊ vias vꝛine ⁊ tigit. Sudoꝛ quoqꝫ ī ilia
ca magis ꝯtingit. ꝑꝑ doloꝛis vehemētiā in ſpūalibꝰ angu
ſtiam īpꝛimētē: ⁊ eſt frigidioꝛ. Jn iuuamēto remedioꝝ.
nā in iliaca cū vomitu magis fit iuuamentū cū cliſteribꝰ
minus. Jn collica vero ceteris eq̄liter. Cōſiderabis alia ſi
gna vel accn̄tia. nā plus accidit ex cā an̄te ⁊ īterioꝛi flīca ⁊
ventoſa ꝑꝑ frigiditatē groſſoꝝ aggregantiū illā: ⁊ ſterco-
re groſſo ſicco ⁊ multo: qđ in eis gn̄aꝑ ⁊ aggregatur: qđ ex-
pellere nequeūt: ad qđ ſūt oꝛdiata magis: ⁊ doloꝛ ē magis
grauatiuꝰ extenſiuꝰ ⁊ ꝑfoꝛatiuꝰ: ac pungitiuꝰ ex vermibꝰ
ibidē generatis ⁊ multiplicatis: ⁊ eſt maioꝛ: qꝛ magis ꝑdu
rans per lōgā māe retentionē ex ipſoꝝ ſpiſſitudine ⁊ car-
noſitate ⁊ ſenſus eius eſt īfra vmbilicū. ⁊ circa pectinē: ⁊ ē
minoꝛis ꝑſtatōis nocumentoꝝ ad ſupioꝛa ꝑncipalia: lꝫ ſit
maioꝛis ꝑmutationis: ad iliacam q̄ꝫ ecōuerſo. Et hoc ꝑꝑ
nām cōpōnis ipſoꝝ. ſ. ſitus ⁊ viaꝝ aptitudinē atqꝫ māe. co
lon. n. cū ſit īferius poſitū oppilatiōe adueniēte in eo. mā
ſuperfluitatis ex̄ns moꝛbo quo a ſupioꝛibꝰ ꝓuenit ei non
potēs īferius tranſire regurgitat ſuperiꝰ ad gracilia: q̄ cū
ſint ſtricta apte retineꝑ in eis: ſicqꝫ oppilat ⁊ iliacā cauſat.
Jleon vō cū ſit ſtrictū qđ recipit a ſupioꝛibꝰ: lꝫ nō poſſit ī-
fra expellere illō: tn̄ regurgitādo ſupius emittiꝑ per os cū
nulla inter ipm ⁊ ſtōm īcidat oppilatio. Et ſi q̄dē emittaꝑ
īferius cū ſit ſubtile: ⁊ trāſeat d̄ ſtrictis ad larga nō pōt re
tinere in eo vt faciat oppilationē ⁊ colicā. ⁊ cū cliſteri ⁊ co
lirio in ea egrediꝑ per anū mucillaginoſū ⁊ ſchibaloſū mu
cillagine iuolutū ſeu īfectū ⁊ ſic vitrū liq̄factū cū ventoſi
tate egrediēs multa ſonāte. qđ eſt actu frꝫ ſm̄. H. ⁊ tn̄ ī ꝑn
cipio paucū eſt: deīde multiplicaꝑ: nec vōitu egrediꝑ ali-
q̄d niſi ꝑꝑ cōitatē ad ītestīa: ⁊ ꝯpaſſionē gracilium ad ea ⁊
ſtōi ad gracilia. Et vrina in collica ruber ꝓpter doloꝛē in-
flāmantem magis q̄ꝫ ꝓpter colere regurgitationē ad vi-
as vꝛine: ⁊ ēt ꝓpter cōpaſſionē renū in doloꝛe: q̄re vꝛina
retineꝑ diu ⁊ tingiꝑ. Et in collica iuuamētum ex cliſteri ⁊
collirio maius eſt q̄ꝫ in iliaca. ¶ Cauſas vō doloꝛis īterio
res occultas īdicantia. ſigna per oꝛdinē ꝑcōtaberis. Nā
ſi quidem cā eius fuerit mala cōplō frigida inteſtinoꝛum

patiens ſentiet frigiditatē in viſceribus: ⁊ iuuatur calidis:
frigidis vō triſtaẜ. dolor erit minor. egeſtia quoq; erūt i/
digeſta: alba: fl'ica: vel melica: ⁊ vēto admixta. Si vō ſit
mala ꝯpoſitio: puta repl'o: oppil'o: retētio fecū vētoſitatis
⁊ aliaꝝ ſupfluitatuʒ egredi ꝯſuetaꝝ declarat. Et ſi qdem
oppil'o ſit ex tortōe iteſtinoꝝ ſignificat ipam ei⁹ euentus
ſubitus poſt motū laborioſū: aut ſaltū vehemētē: aut caſū
aut pcuſſionē: aut luctā: aut tolerātiā pōderis: aut multā
vētoſitatē retētā rūpētē: ⁊ ſeparātē iteſtinū a meſenterio
⁊ circūuoluētē ipm: ſicut ēt circūuoluiẜ i crepatura. Sol'o
vō cōtinui: ſi cā fuerit doloris: ⁊ cā fuerit exterior ſenſus: ⁊
iuētio demōſtrat. Et ſi iterior: ⁊ ſit tumor acut⁹: dolor acu
tus declarat. regimē quoq; pcedēs grauedo pauca ſitis. ⁊
iſlāmatio: egeſtia citrina: vel nigra ſilitudo circūſtātiaꝝ
Et iuuaẜ frigidis ⁊ pōticis. calidis vō lediẜ ⁊ triſtaẜ. Si
vō fuerit vētoſitas demōſtrāt ipam pcedēs regimē. tēſio
⁊ iſlatio. rugit⁹ ⁊ pforatiu⁹ erit dolor: ac ſi terrebello pfora
renẜ iteſtina. Et egeſtia erūt iſlata ſpumoſa: ⁊ ſupnatātia
⁊ iuuanẜ ꝯpreſſione ⁊ calefactorio ⁊ ꝑprie ſicco cū cā ven
toſitatis hūida fuerit. ⁊ nō ſicca. Si vō fuerit ei⁹ cā lapis
acut⁹ pūgēs ⁊ ſcindēs erit ibi grauedo: ⁊ pūctio: ⁊ rememo
ratio ei⁹ pcedēti tēpore: ⁊ alias gñati ⁊ educti. Si vō fue
rit vlcus apatis pcedere videbis apa. deīde exitū puris ⁊
ſanici. Si vō fuerint lūbrici. ſigna lūbricoꝝ iferi⁹ poſita
tibi demōſtrabūt: ⁊ dolor erit pungitiu⁹. Si vō fuerit apa
ſigna erūt dolor fixus in vno loco cū grauedine plurimuʒ
⁊ iſlatio: ⁊ tumor ibidē. Et ſi qdem fuerit cal'm: dolor erit
acutior cū fe. acuta: ⁊ pulſatiōe. ⁊ ſiti vehemēti iſlāmatio
erit. ⁊ rubedo i toto corpe: ⁊ oculis: lʒ qñq; appareat frigi/
ditas extremitatū arſura iteſtinoꝝ adeo ꝙ opimēta pati
nequeāt: ⁊ illud ꝑprie cū eſt apa magnū in eis. ⁊ eſt malū
ſignū: ⁊ mortale. Ingt. n. hyp. in acutis morbis frigiditas
extremitatū malū. Et ſi qdē fuerit colericū: erit grauitas
⁊ pulſatio mior: ſi fe. iſlāmatio ⁊ mordicatio vehemētior:
⁊ regimē pcedēs decliue ad cal'm magis. Si vō fuerit fla/
ticū: ꝯria erūt ſigna: ⁊ ſi nō ſpē ſaltē gradu ⁊ friditati atte
ſtātia. Ingt. n. abo. min⁹ calʒ reſpcū magis cali dr̄ eē ffm.
Si āt dolor fuerit pp ꝯpaſſionē ⁊ cōitatē abſolutā ⁊ ꝑpi/
quam: puta ad ſtōm erit apparēs repl'o ⁊ grauedo in ſtō: ⁊
nauſeatiua ſatietas cū eructuatiōe ⁊ ſingultu: atq; ipoten
tia enormēdi eā. Si vō ad epar vel ſplenē: vel imittentia
colerā vel melācoliā ſupfluā pcedēs iſlāmatio epatis. vl'
oppil'o ipi⁹ ⁊ ſplenis groſſicies cū circūſtātys multiplicāti
bus illos hūores tibi idicat: ⁊ declarat. ⁊ dolor ſcōm perio
dos exacerbaẜ. Silr ⁊ ſi a toto corpore qḋ feraẜ ad regio/
nē: q̄ ſcōm vētrē. Et ſi col'a fuerit calidis ledunẜ: fridis vō
⁊ pōticis iuuanẜ valde: vt gal. ait: ⁊ expertus ſum: ⁊ ꝑprie
cū educētib⁹ colerā vel ſanguinē ad ſanitatē priſtinā: redu
canẜ. Si aūt ad ſpūalia pceſſio ſitis ptiſis. ⁊ vlceꝝ partiuʒ
pectoris: quoꝝ ſigna premiſſa ſunt ſupra: vbi de eis locuti
ſum⁹ tibi oſtēdūt. Silr ſi ad cerebruʒ catarr⁹ añs oſtēdit
Et ſi ad totū corp⁹ dyaria ⁊ fluxus liq̄factiuus antecedet.
Sʒ ſi qdē fuerit pp ꝯpaſſionē ⁊ cōitatē abſolutaʒ: vt ad
epar: ſpleneʒ: vel mirach apatos ſua groſſitie ⁊ grauedine
cōprimētes iteſtina: ⁊ opilātes ſigna apatū illoꝝ mēbroꝝ
pcipies antecedere. Et ſi qdē ad renes ⁊ vias vrine patien
tes ſtrāguriā pp hūorē groſſum viſcoſuʒ aggregatuʒ: aut
apa. vel lapidē ꝯprimētē: ⁊ oppilātē inteſtinū colon dolor
iteſtinoꝝ: ſeu colica fuerit: ſigna erūt hūoris calidi domi/
nātis ex regimie circūſtātys ⁊ egeſtib⁹ collecta: ⁊ calidis
⁊ diureticis iuuanẜ ⁊ fe. ſupueniēte. Ingt. n. hyp. Quibuſ/
cūq; ex ſtrāguria ileos inaſciẜ in. vij. dieb⁹ pereunt. ſi nō
fe. ſupueniēte multa vrina fluxerit. Si vō pp apa ſigna vi
debis apatis ipſoꝝ: q̄ ifra dicenẜ auxilio ſaluatoris. Si āt
pp lapidem quē patiunẜ renes: ad quos ꝯpatiētia iteſtina
groſſa doleāt: ⁊ colicā patianẜ qḋ frequēter accidit ad ve/
rā curā expedit ſigna diſtinctiua hr̄e. ⁊ ꝑpria qñ ipſa coli/
ca vā eſt: q2 ex iteſtinoꝝ ꝑpria paſſiōe accidat: ⁊ qñ ē non
vera: q2 ex ꝯpaſſiōe: aut cōitate ad renes lapidē hñtes ꝑ/
ueniat. ⁊ ꝑprie in pncipio cū tūc ſint occulta: niſi. n. hēant.
ſtolid⁹ qdē medic⁹ cū curare voluerit: nō curabit. ſed ma/
gis augebit dolorē. ¶ Eſt ergo aduertēdū ſcd'm. H. ꝙ iter
colicā verā ⁊ nefreticā grādis eſt dr̄ia quā ptractās abo.
e⁹ iterps. ait ꝙ dr̄ia tal' ex ſex reꝝ ꝯſideratōe accipiẜ. ex diſ
pōe. ſ. doloris. ex vicinātiū ꝑpetate. ⁊ ex eo qḋ ꝯuēit ⁊ ꝯfert
⁊ qḋ nō ꝯuēit nʒ ꝯfert. Et ex diſpōe egeſtiū: ⁊ ex pte vltie
ꝯſecutōis accidētiū: ⁊ ex pte cauſaꝝ antecedētiū: ⁊ ſignifi
cationū. Ex diſpōne aūt doloris. q2 diſpō doloris diuerſi
ficaẜ in ei⁹ q̄ntitate loco ⁊ tēpore: ⁊ motu. Quātitate vero:
qm̄ ille q eſt lapidis ē paru⁹: q̄ſi ſit acus: ⁊ colic⁹ ē magnus
Loco aūt. q2 colic⁹ icipit ab iferiori parte dextri lateris: ⁊
tēdit ad ſuperiorē ſiniſtri pp ſitū colon: ⁊ ſplenis ē qñ dila
taẜ: ꝯfirmaẜ i dextro ⁊ ſiniſtro: ⁊ ſcd'ʒ quoſdā nō icipit co/
lica. niſi a ſiniſtra: ſʒ illud nō ē veꝝ: nā lʒ pp ei⁹ frigiditatē
poſſit eē: nō tñ ꝯtrariū experti ſum⁹. preterea eſt ad ante/
riora: ⁊ vſus pectinē decliuior: q̄ʒ ad poſteriora. Et renal' i/
cipit a ſupiorib⁹: ⁊ deſcēdit paulatim vſq; ad locū: vbi cō/
firmaẜ: ⁊ eſt decliuior ad poſteriora. Tēpore vō qm̄ renal'
fit fortis hora vacuitatis: collic⁹ vō alleuiaẜ in ea: ⁊ fit for
tis in fine ſuo: ⁊ antecedit ipſuʒ cū ſumiẜ aliqḋ: ⁊ collicus
icipit ſubito: ⁊ in tpe breui: ⁊ lapidoſus paulatim: ⁊ ſit for/
tis i fine ſuo: ⁊ antecedit ipſuʒ dolor dorſi: ⁊ difficultas vri
ne. deīde apparēt ſigna: ⁊ dolor in colon. Motu āt qm̄ co
licus ad partes mouéẜ plies: renal' vō figiẜ. Ex parte āt vi
cinātiū ꝑprioꝝ: qm̄ tremor multiplicaẜ in renib⁹ ambo/
bus. ⁊ nō partiū colon. Dr̄ia vō accepta ex eo qḋ ꝯuēit ⁊ ñ
ꝯuēit ē qm̄ cliſteria ⁊ exit⁹ vētoſitatis. ⁊ fecis alleuiāt do/
lorē colice: ⁊ nō alleuiāt dolorē renū alleuiatione: de q̄ ſit
curādū in plurib⁹ diſpōnib⁹: ⁊ medicine lapidē frāgentes
aleuiāt doloreʒ renū: ⁊ nō dolorē colice. Ex pte aūt ei⁹ qḋ
egrediẜ eſt. qm̄ in renali nō eſt retētio fecuʒ vētoſitatis: ⁊
rugit⁹: ſic̄ in colica. Ex parte aūt vltime ꝯſecutiōis accidē
tiū eſt: qm̄ dolor cruriū. ⁊ dorſi: ⁊ tremor in renali eſt pus
⁊ caſus appetit⁹: ⁊ vomit⁹ ꝯñs flegmatic⁹ ⁊ puitas digōnis
⁊ vehemētia doloris. ⁊ pductio ad ſincopim. ⁊ ſudor frid⁹
⁊ iuuamētū cū vomitu i renali ē min⁹. ¶ Ex pte aūt cau/
ſaꝝ ⁊ ſignificationū añcedētiū eſt: qm̄ aſſūptio ciboꝝ ma
loꝝ: ⁊ aſſiduatio nauſeatiue ſatietatis: retentio fecis ⁊ vē
toſitatis rugit⁹: ⁊ pūctio eſt magis pcedens in colica ⁊ vri
na arenoſa. ⁊ filoſa eſt precedens i renali. Et cū accidit do
lor renū fit prio ſubtilis: ⁊ cū apparet in ꝯſueto pati idicat
renaleʒ. deīde fit filoſa: ſeu aſpa in vltio eſt arenoſa: ⁊ ē bo
na. Et ſi qdeʒ colica fuerit p ꝯpaſſioneʒ ad cerebꝝ apoſte
matū puās ⁊ auferens ſenſuʒ iteſtinoꝝ: quo minus expel
lāt ſigna apoſtematis cerebri antecedunt. ⁊ appoſito coli
rio ex acutis nō ſentieẜ: ⁊ nec cliſtere ipoſitū: nec p os ſum
ptū aliqḋ acutū faciat declinare feces: vt neq; poꝝ cepe:
⁊ pip i aſſelatiōe ſentiaẜ. Et qñq; accidit: vt ſit illic fiſtula
corrūpens ſenſuʒ. Silr ſi pp ꝯpaſſioneʒ ad neruos ſpaſ/
matos: q̄re muſculus ꝯtrahiẜ fortiter: ⁊ retiet ſupflua vi
debis ſpaſmū ⁊ tetanū i alys membris manifeſtis. Si vō
accidat colica pp rupturā videbis apparenteʒ rupturam:
vel herniā. ¶ Reſtāt ſigna ad pſciendū futuꝝ bonū: vel
malū euare. Scias ergo ꝙ cū i eo nō eſt retentio: ſeu ꝯſti/
patio multa. nec dolor vehemens: ⁊ alleuiaẜ plurimū: q̄ʒ/
uis redeat: ⁊ iuenit eger remediū p exituʒ ventoſitatis: ⁊
remedia iuuare ſolentia iuuāt. eſt ſignificatio bona: ⁊ ico
lumis: ⁊ ꝑprie ſi ſpūs bon⁹ exiſtat. Cōtraria vō ſunt mala.
Ingt. n. H. ſolentia vō iuuare ſuo tpe: ſi nō iuuent cum de/
beāt iuuare eoꝝ ſignificatio ꝑtendiẜ i maluʒ: pculdubio
ꝙ ſi cū eis accidat vomit⁹ ꝯñs ⁊ ſingult⁹: friditas ſudoris
⁊ extremoꝝ pturbatio rōnis: ⁊ ſubeth ſpaſmus ⁊ ſincopis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0329-0
DFG

eſt mortale. Cura doloris inteſtinorum ſimilis eſt cure
alioꝝ mēbroꝝ: quā ſupra in dolore ſtōi generalr ꝑtracta/
uimus. dr̄t vō ab alijs quo ad nām mēbri auxilia variātē
⁊ modū vtēdi eis. Eſt aūt in ea itētio duplex. generalis. ſ. ⁊
ſpecialis. Gn̄alis ordinē ponit: ⁊ modū. ⁊ ē. Nā ſi gdeꝫ par
uus ⁊ mediocris dolor ſit: vt ſunt ſpēs eiꝰ de gn̄e neutrali
tatis ſuperiꝰ enarrate eius ſanatio eſt vna res tm̄. nam ad
cāe oblationē opꝫ agere tm̄: ſimul. n. cām ⁊ ſinthoma tol/
lemꝰ: nō aūt a ſinthomate: ſic. n. agēdo non itendimus ad
ſanitatē: ſed delectationē potiꝰ. Jngt. n. H. Adulatoris ē
largiri egrotāti itētionē quoꝝ gerit ponētis delectatiōeꝫ
nō ſanitatē. Si vō eoꝝ dolor fortis ſit ⁊ magnꝰ conſuetas
operatiōes ipediēs: vt eſt colicꝰ ⁊ iliacus: eiꝰ cura erit qua/
tuor res. ṗmo. n. oꝫ ad eiꝰ mitigationē iſtare: deide ad cāe
ablationē. Scdo ꝓcedere nō ecōuerſo. ſi. n. ecōuerſo ꝓce/
damus vita ſimul cū egritudine ṗuabimꝰ hominē. Unde
Ha. ait. Siniſtri qdē viri opera eſt ſimul cū egritudine vi/
ta ṗuare hoiem. Tertio oꝫ regimē ordinare: ⁊ q̄rto accidē
tium iſurgere poſſibiliū correctionē ſubiūgere. Que autē
ſint dolorē mitigātia: ⁊ q̄ dolorē auferentia generalr fue/
rūt tibi ſupra tradita. Ut aūt ad ſpecificationē eoꝝ deue/
nias ac ꝓprioꝝ: que ad dolorē talē iteſtinoꝝ notitiaꝫ pre/
ſcire oꝫ ꝙ colica: ⁊ iliaca in tali cura cōueniūt ⁊ dn̄t. ſic in
cura ipaꝝ itentio pōt eē cōis ⁊ ꝓpria. Cōis qdem inq̄tum
in cauſis ꝯueniūt pluribꝰ. accidere. n. pōt iliaca ex eiſdem
cauſis oibꝰ: ex qbus colica gn̄at̄: ⁊ ꝓinde medicinas ⁊ re/
gimē in vtraq; oꝫ eē eaſdē. Propria vō eſt in eis diuerſa
inq̄tuꝫ ipa iliaca ex certis ꝓprijs cauſis accidere pōt. vel
magis a cōibꝰ ſibi: ⁊ colice diuerſis ſuperiꝰ numeratis: do
lor etiā in in ea eſt fortior. natura quoq; graciliū iteſtino/
rum a natura groſſoꝝ varia eſt ⁊ diuerſa. nec nō ⁊ accidē
tia iſurgētia: vt ſuperiꝰ eſt mōſtratū. ⁊ ꝓīde ſpeciem medi
dicinaꝝ: q̄titatē: ſeu virtutē: locū: ⁊ modū vtēdi eis a me/
cinis cōibꝰ variare oꝫ. ❡ Sciēdū ergo ꝙ mitigātia dolo/
rem. ṗmā rē ꝯplētia ꝯmunia colice ⁊ yliace. q̄dā ſunt que
tm̄ ipimētē cām: quedā ſunt: que vtraq; cām. ſ. ipimētē
⁊ percipiētē reſpiciūt: ⁊ quedā que ꝑcipiētē tm̄. Et ṗma q̄/
dem in ordine ſunt ṗora: ⁊ quedā ſunt ſimplicia: ⁊ q̄dam
cōpoſita. ſimplicia ſunt ſupra in dolore ſtōi numerata. Cō
poſita vō hic iferiꝰ ſubiungent̄ auxilio creatoris. Propria
vō collice ⁊ yliace ac eis ex certa cā cū de ablatione cauſe
vniuſcuiuſq; loq̄mur: ⁊ nō obmittemꝰ mitigātia. q̄ ꝑcipiē
tem cām reſpiciūt. ibi ēt ſupra in dolore ſtōi habuiſti: ⁊ in/
fra in dolore iūcturaꝝ habebis. ⁊ ſimplicia: ⁊ ꝯpoſita: ⁊ ēt
que vtraq;. tp̄s quoq; modū ⁊ locū vtēdi eis: qd̄ ꝓprie ſm
Hal. eſt cū doloroſa: aut calida ſit virtutibꝰ: ⁊ ſubtilia cōſi
ſtētia: tūc. n. nō ſolū ꝑcipiētem cāꝫ ſtupefaciēdo auferūt:
verū ēt ipimētē obtūdēdo ⁊ iſpiſſando adequāt. eiꝰ quo/
q; diſcraſiaꝫ calidā alterāt: ⁊ ad tēperamētū adducūt. Jn
alijs vō doloroſis frigidis nō ꝯueniūt. cū dolorē forteꝫ ta
lia: expectatē nō cauſent: ⁊ ſi ꝑ ꝯuerſionē in vētoſitateꝫ ta
lē cauſent dolorē. Juuamētuꝫ ipimūt nō ſine nocumēto
magno. vſus. n. ait. H. taliū farmacoꝝ nō eſt niſi iſtare ad
ſinthoma: augēt. n. hec diſpōnē hāc ⁊ eā difficile ſolubileꝫ
operant̄ virtutē debilitādo: calorē ⁊ ſpūm obtūdēdo ⁊ ſuf
focando vel extinguēdo. maxime ſi recētia ſint narcotica
⁊ multa: ⁊ poros mēbroꝝ ⁊ iteſtinoꝝ iſpiſſando. ꝓinde rē
magni erroris ꝯponūt qui talibꝰ farmacijs in talibꝰ vtun
tur: vt in ſeipo Ceſar medicꝰ ipe fecit niſi caſu quo euitari
nō poſſunt: vtputa cū talia frigida doloroſa: vētoſa fuerit
⁊ ꝑforādo fortē iducāt dolorē: ad cuiꝰ mitigationem cum
alia mitigātia anodina nō ꝯtulerūt: nec euantia ꝑꝑ reſo/
lutionē vtēdū eſt eis: ſꝫ cū mō vt ſuperiꝰ mōſtratū eſt.
Specialis aūt itētio in cāe cuiuſlibꝫ ipimētis dolorē ab/
ſciſſione verſat̄: que recta eſt cura: ⁊ ad ꝑfectionē eiꝰ neceſ
ſario cōꝓbata: circa quā deiceps ſigilatiꝫ per ordinē ꝓ/
cedemus incipientes ab inferioribus cauſis ⁊ proprijs in/
teſtinis ipis exiſtētibꝰ. Si qdē ergo cā eaꝝ ſit mā frigida
fl̄ica alterās. replēs: ⁊ oppilās iteſtina cura ē due res. digō
⁊ euatio. digō aūt fit cuꝫ ſubtiliātibꝰ ⁊ icidentibꝰ: ⁊ poros
dilatātibꝰ. Jngt. n. H. Secāt. n. ambo hūoꝝ groſſiciem:
acetoſa ⁊ pōtica: hec cū frigiditate: hec vō cū caliditate.
Talia aūt ſunt ſimplicia ⁊ ꝯpoſita: que ifra dicent̄ oppitu
lāte xp̄o. Simplicia vō ſunt anodina ſupra in dolore ſtōi
numerata: ⁊ alia magis calida nō multū excedentia: ⁊ ꝓ/
prie in ṗncipio cū mā fuerit multū abūdās: cuꝫ. n. eā non
poſſunt ꝯſumere: ſeu reſoluere diſſoluendo in vaporem ⁊
ventū ꝯuertūt: ⁊ ſic doloreꝫ augent imiſſa ⁊ euaporata vt
ſupra in cura iflationis ſtōi dcm̄ fuit. Talia ſunt origanū
calamentū: pulegiū. iſopus ortenſis: ameos: maiorana ſic/
la: nemen: meu. enula: galia: radix pionie. ſtercꝰ colūbinuꝫ
⁊ adib. fel tauri: abrotanū: aſpaltū. myrra: ſcordeon: ⁊ aſſa
fetida: ſiſeleos: ireos: andacoca: laurus ⁊ bace eiꝰ: anetum
tribuli: naſturciū: muri: ruta: galāga: crocꝰ: ⁊ vinū antiquū:
ſparagi: ⁊ ſilia cliſteriçata: ⁊ ſumpta ſimplicia ⁊ ꝯpoſita ſe
cūdū omnē modū: ⁊ etiā exteriꝰ applicata ꝑ modū empl̄i
⁊ aliū. Jn ꝓceſſu vō cū materia fuerit diminuta: ⁊ euacua
ta calidiora poteris miniſtrare ad reſolutionem ⁊ cōſum/
ptioneꝫ relīqe. qualia ſunt piper: aleū: ſinapis: ꝗinq;. ⁊ ſilia.
abſtergentia ⁊ riptica. i. radentia ⁊ euaporātia. Abſtergen
tia ſunt centaurea minor. vrtica: ſemen eiꝰ: aſſarū: ſuccus
blitis: ſalis ſpecies ⁊ baurach: ſulfur mercurialis: ⁊ ſuccus
eiꝰ: ius galoꝝ antiquoꝝ: carthamꝰ: ⁊ ſtercus canis: carice.
⁊ ſilia cliſteriçata: ⁊ ſumpta. Et fortiora illis ſunt yera. H.
aloes: polipodiū: ſerapinū. ⁊ alia laxatiua leuia: que nō agi
tāt ⁊ cōmouent mām ⁊ fl̄a trahūt ab alijs membris ad i/
teſtina: trahendo. n. ad ea: doloreꝫ augent. Et ex eis ſūt vo
mitiua. que fl̄a vomitu ſolūt: ⁊ ſic trahūt ad ſtōm non ad
iteſtina: que ſupra in cura ſtōi habuiſti: ⁊ in libro ꝯſolatio/
nis medicinaꝝ. Euaporātia ſunt iteriꝰ ⁊ exterius approxi
māda. Et ex eis eſt balneū termaruꝫ. ⁊ ex aq̄ marina: vel
dulci hn̄te virtuteꝫ ṗdictaꝝ poſt ṗdicta approximatam ⁊
ꝓpe cū ṗdicta doloreꝫ nō ſedāt. q̄nq; vō oꝫ ante approxi/
mare: ſedat. n. doloreꝫ: ꝓuocat vrinā ⁊ ſomnū. ⁊ cām ma/
turat ſi cibꝰ ſit. ſiue hūor. Jngt Abo. eſt aūt cū balneū ci
bū idigeſtū digerit: ⁊ hūoreꝫ crudū maturat: etiā acutum
ſi ex aqua dulci ⁊ tepida fiat ſimplici ſcdm̄. H. Ex ꝓprijs
eſt petroleū inunctū vel cerotum: qd̄ ſcripſimus capl̄o de
ciclamie: ⁊ fricatio cum manu vncta ex oleis calidis: ſicut
anetino de lilio: de ſpica: de caſtoreo: ⁊ alijs ſupra in ſtō di
ctis: ⁊ dolore iuncturaꝝ: ſi ſupponant̄ que caliditatē ꝯſer
uent: ⁊ augeāt: vt eſt pellis vulpis: ⁊ ꝓprie ſacculi: ex pulue
ribus ſpōgia: ⁊ ſubarū eſt bonū in ventre: ⁊ ſapo. ſemen ra
fani ⁊ aqua multū calida: etiā ſumpta: que collicā reſoluit
⁊ ſplenem. Sed opꝫ ꝙ ſint multotiens hec ⁊ ṗdicta reite
rata: donec multitudo materie tota ſit euacuata. ſint cuꝫ
itermiſſione ſpatij donec natura confortet̄: ⁊ materia di/
geratur approximata euacuātia. Or ſi predicta euacuātia
nō ſuffecerint pre multitudine groſſicie ⁊ viſcoſitate ma/
terie nō eſt malū ſi ꝯfortetur cū alijs que materiā educāt
cū virtute: ⁊ ꝓprie in yliaca: ⁊ ſi trahāt ab alijs ad iteſtina
cito: ⁊ non retineāt cū ſua tarda ⁊ debili operatiōe in eis:
vt eſt agaricū in frigida: ⁊ aloes in calida. Confortet̄ ergo
cū colloquintida ⁊ ſpeciebus gumoruꝫ: ⁊ in calida cū dya
gridio rectificato: ⁊ alijs facile ⁊ cito ſoluentibus appro/
priatis: que in libro ꝯſolationis medicinaꝝ ſufficientius
habuiſti. Sint aūt ſi ſufficit q̄titatis pauce: ſic. n. ſoluen
do ſi qd̄ nocumentum extractione humorum ad ipa affe
rant: non durabit: ſed cito tranſeundo iuuamentum ilico
maius ſequetur. Et proinde talia per inferius poſita ⁊ cli
ſteriçata in colico ſunt meliora: q̄ per os ſumpta: ⁊ ꝓprie
ſi aliquam antiquam vel nouam egritudinem patiantur,

Euacuant enim a groſſis proprie inteſtinis: nec a toto cor
pore trahũt ad ea rem: de qua ſit curãdũ: nec debilitãt ſi-
cut illa. Ideoq; in cliſterib⁹ ſtãdũ: nec ꝑ os aliqd ex illis
ſumẽdum niſi ab alijs mẽbris ⁊ toto corpore aliqd iſluat
ipſis: vt ĩfra dicet̃ auxilio ſaluatoris: quo caſu ad cautelaʒ
fecũ ⁊ ſchibaloꝝ euacuationẽ oportʒ p̄mittere: vt ĩfra di-
cetur. Uomit⁹ quoq; ⁊ vomẽtia locũ in ea nõ hñt: niſi cũ
a ſtomaco: ⁊ a ſuperiorib⁹ inteſtinis aliquid ad ĩpa groſſa
mittat̃: qđ declarat grauitas ſupra vmbilicũ ⁊ nauſea: alr̃
aũt non cũ a vilibus traherentur ad nobilia qđ eſt maxie
vetituʒ. In yliaca vͦ egros oʒ ꝙ talia ſumant per os: ⁊ ꝓ-
p̄rie vomitiua. p̄mo. n. educũt a gracilib⁹ cũ ſint ſtomaco
aſſociata. deĩde cliſteria ĩponant̃ ad fecum eductionem ⁊
humoꝝ ĩferius tractionẽ: q̃uis cõmode nõ educant̃: ꝙ ſi
nõ ſufficiat per os. ⁊ fortiora ſumant̃ ſimplicia: ⁊ cõpoſita
que ĩfra ponem⁹: ⁊ ꝓprie cũ ab alijs ĩfluat illis vt dictum
eſt. Tempus aũt cliſteriçandi ⁊ ꝓpinãdi ſolutiua vẽtris
eſt cũ cibus iã digeſtus in ſtomaco fuerit: ne aliqd cruduʒ
trahat̃ ad ĩteſtina per cliſteria: ne quoq; medicina ſoluti-
ua vẽtris efficiat̃ vomitiua. natura. n. ſtomaci grauata ci-
bo ſupueniẽte farmaco ſolutiuo magis grauat̃: ⁊ moleſtat̃
q̃re ad vtriuſq; euonẽ: añq; dĩcẽdat: vomitu ĩcitat̃: ex quo
ipſa valde deijcit̃ a dolore precedẽte defecta: qđ in revite
valde timoroſuʒ eſt. Et q2 p̄dicta ſunt acuta ⁊ ĩflãmantia
maxime cũ corpora ex dolore ſint calefacta: ne leſio eorũ
ad p̄ncipalia trãſeat: ⁊ fumus ꝓprie cũ cliſteriçata: ſeu bi-
bita nõ ſoluãt: vel ſi ſoluãt nõ ĩferi⁹: ſed per os ⁊ ileon pro-
prie oʒ: vt p̄ncipalia cuſtodiant̃ cũ frigidis ⁊ ſtipticis aro-
maticis: puta cerebꝝ cũ oxirodino: cor cuʒ roſis ſandalis
ſpodio: ⁊ cãphora epithimatis. Epar cũ eiſdeʒ ⁊ ſtomacus
cũ oleo maſticino: vel de citonio: vel myrtino ⁊ pauca ma
ſtice ſuperaſperſa. Qꝫ ſi ſitim patiant̃ melius eſt tollera-
re ſi poſſibile eſt: ꝙ ſi nõ: parũ dabis ex granatis dulcibus
vel iuleb cũ calida aqua. Iuuat. n. talis pot⁹ cũ cito pene-
tret ⁊ humectet: ꝙ ſi cliſteriçata nõ ſoluãt: iuuent̃ per ĩfe
rius cũ colirijs: ⁊ per ſuperi⁹ cũ humidis mollificãtib⁹ ma
turãtib⁹ ⁊ abſtergẽtibus: vt eſt ius galli ſimplex vel com-
poſitũ: ⁊ deĩde cũ ſtipticis ⁊ põticis parũ ſumptis. ⁊ etiam
calida ꝓprie. Si vero cã ei⁹ fuerit ſtercus groſſum duruʒ
⁊ ſiccũ in iteſtinis ĩtercluſuʒ cura eſt due res. p̄ma eſt mol
lificatio duriciei: ⁊ ſiccitatis ipſius. Scđa ipſius mollificati
euacuatio. ¶ Primã rẽ ꝯplent mollificãtia ĩterius ⁊ exte
rius approximata. ĩterius aũt per os ſumẽdo iura pĩguia
carniũ: ⁊ ꝓprie gallinaꝝ: ſiue galloꝝ ſimplicia ⁊ cõpoſita
vt ſupra in antidotario noſtro diximꝰ ſpecies oleoꝝ. ſ. ſiſa
minũ violarũ: ⁊ amigdal̃. niſi adſit fe. tũc. n. loco ei⁹ dabis
in potu aquã ordei vel prunoꝝ: ſebeſten ⁊ iuiubarum ta-
marindoꝝ ⁊ leniẽtium: ⁊ alioꝝ fructuũ frigidoꝝ: ⁊ herba
rum: vt malue: viole ſicle: atriplicis ⁊ ſpinacioꝝ mucilagi
nes: fenugreci: pſilij ⁊ dactiloꝝ ſcđm ꝙ neceſſitas revoca
bit. Et ex ꝓprijs ⁊ expertis eſt mel caſſiefiſtule ſumptũ
⁊ cliſteriçatũ: cõplent. n. vtrãq; : ſʒ oʒ vt poſt hoꝝ ſumptio-
nem moueant̃ fortiter: ⁊ deſcẽdãt detẽta. ⁊ feces faciant
deſcẽdere detinẽtes ⁊ cliſteria ſi oʒ. deĩde cũ predictis.
Exterius empl̃a ⁊ vnctiones ⁊ fomẽtationes ex p̄dictis: ⁊
fricatio tractatiua vẽtris cũ manibus: ⁊ oleis p̄narratis.
¶ Scđam rẽ ꝯplent p̄dicta draimia: riptica: ⁊ ſolutiua cli-
ſteriçata: ꝓprie vel per os ſumpta. put diſpõ exigit. Sed
ad perfectã curã. ⁊ in via preuiſionis a recidiua oʒ vt cauſa
ſiccitatis ⁊ indurationis. fecum auferat̃ oĩo. ſi ergo cauſa
ſiccitatis ei⁹ fuerit cib⁹ ſicc⁹: ⁊ paucus cibet̃ cũ predictis.
herbis cũ carnibus coctis pinguib⁹ ⁊ iuribus ĩparuʒ. Aut
ante cibũ p̄mittant̃ fructus maturi lubrici nõ ventoſi. vt
carice pruna ⁊ perſica ſicca. deĩde multiplicent̃ cibi nutri
mẽti multi noti. Si vͦ multa caliditas ſtõi ⁊ iteſtinorum
deſiccãs ⁊ ꝯdẽſans ſic predictis oʒ vtaris recẽtibus ⁊ fri-
gidiorib⁹: vt lactucis: ſpinacijs: attriplicib⁹. blitis ſolatro
portulacis: mucilagine pſilij. ⁊ melone indo. Et cibes cuʒ
gelea ⁊ aqua ordei potabis cum ĩfrigidata vino limphato
cũ ipſa. Si aũt cauſa fuerit fortitudo retẽtionis: ⁊ debili-
tas expulſionis iteſtinoꝝ miniſtrabis predicta lubrica.
q̄bus admiſcebis aliqua acuta moleſtãtia. vt porrum ce-
pas ſiclã. ⁊ alea cũ multo ſale. Et ſi cum debilitate ſenſus
fuerit. miniſtret̃ in ſolutione eius yera ⁊ agaricũ: yera her
metis: ⁊ pillule de ſerapino. Et ꝯfortabis deinde naturaʒ
⁊ ſpũm cum tiriaca ⁊ metridato dyamarte: odoricon ⁊ ſa-
genea. Et cibabis eos carnib⁹ laudabilib⁹. Sil̃r ſi fuerit
ex debilitate in lacertis vẽtris. Si aũt illud ſit: q2 colera
vt ꝯſueuit nõ mittat̃ ad iteſtĩa corrigat̃ oppilatio epatis:
⁊ pori ciſtis: vt ſuperi⁹ in epe dictũ eſt. Si vͦ ſiccitas fe-
cum ex multa ꝓuocata vrina fuerit: extrahe feces cũ pre-
dictis. deĩde miſtra ea que minorãt vrinã nõ cũ retẽtione
vẽtris. vt ſunt çarur: bdelium: mechiũ excorticate lentes:
⁊ põtica que ꝑ ſe faciũt: ſʒ que minorãdo vrinã leniũt naʒ
vt ſunt dactili: paſſule dulces. penidij: caſſia: ⁊ ſilia: que il-
lud per accidẽs operant̃. Si quoq; ex raritate ⁊ reſolu-
tione corporis illud accidat. prohibeat̃ reſolutio: ⁊ ſudor.
ꝑut ſupra in cura cordis diximus. Et cibet̃ groſſis ⁊ viſco
ſis q̃ntũ poterit tollerare: ⁊ expõat̃ vẽtis ⁊ irroratõib⁹ fri-
gidis: ⁊ getibus. ⁊ ab artibus laborioſis abſtineat conſue-
tis. Simil̃r aũt ſi ex lapide fuerit dolor cauſat⁹ predictis
humidis ⁊ lubricis ac abſtergẽtibus corrigatur ⁊ educat̃
q̄bus admiſcẽda ſunt aliqua ex frãgentibus lapidẽ in re-
nibus ⁊ veſica: ſi. n. in remotioribus lapidẽ frãgunt multo
magis in ꝓpinquioribus iteſtinis. Sed ſi ex vermib⁹ cuʒ
ĩterficiẽtibus ⁊ educẽtibus ꝑut ĩfra in cura eoꝝ dicemus
porro ſi ex ventoſitate ĩtercluſa: ⁊ perforãte cũ extenuan
tib⁹ ĩterius ⁊ exterius approximatis ꝓcedes: ꝑut ſupra in
cura ĩflationis ſtõi: epatis atq; ſplenis plenius dictũ eſt.
Si vͦ ex vẽtoſitate torquẽte iteſtinuʒ cura erit: vt ſituet̃
ſupinus in loco tẽperato: ⁊ manibus inunctis cuʒ oleo de
enula: vel nardino: vel caſtoreo fricet̃ venter leuiter: ⁊ cũ
tactu ſubtili adequãte inteſtina: ⁊ reducẽte ipſa ad ſitum
⁊ ſtatum priſtinũ: deĩde extenuãtia ⁊ reſoluẽtia miniſtrẽ-
tur p̄dicta ſuperius ⁊ ĩferius cum cliſteri: qđ cruribus ele-
uatis ⁊ cõpreſſione ſuaui manus repellat̃ ad ſuperiora vt
perueniat ad gracilia iteſtina. deĩde vẽtoſetur locus: ⁊ ꝓ-
pinet̃ oleum de kerua cum vino albo: vel rutaceum loco
eius: ⁊ vngat̃ ex eis dorſum: ⁊ ſtringant̃ crura fortiter val
de. Qꝫ ſi cã fuerit humor melãcolicus: lʒ raro contingãt
educat̃ cum proprijs cliſteriçatis: vt ſunt ſticados: polipo
dium: epithimũ: cortices radicũ mori: borago: bugloſa: ⁊
ſuccus eaꝝ cum dyaboriginato: ⁊ dyabugloſſato: ⁊ dyaſe-
ne: ⁊ ſumptis: vt eſt decoctio epithimi: pillule de lapide la
çuli: ⁊ lapide armeno: ⁊ colirijs factis ex eis: iuuentur: ven
ter quoq; : ⁊ ſplen euaporet̃ ex armel: ſticados: origano: ⁊
camomilla in aceto decoctis: ⁊ ꝓprie cum a ſplene ĩfluit
iſtis. Et ſi q̄dem ſanguis cõgelatus fuerit. euacuet̃ cum
diſſoluentibus ⁊ educentibus: ꝑut in ſtomaco diximus.
Si ãt ſit apoſtema cauſa eius ſtudebis curare apoſtema
ſcđm diuerſitatem ſpecieꝝ eius. ꝑut ſupra in ſtomaco di-
ximus. Et ſi ꝯtingit plurimũ ꝙ predicte cauſe ſimul con-
ueniãt in caliditate doloris. quare oportʒ vt⁹ predictis ſi-
mul medicinas commiſceas: vel nunc vnam. nunc aliam
miniſtrabis. Et quoq; ſi ex ruptura ⁊ deſcenſu inteſtino
rum in oſſeum dolor cauſetur cura erit due res. prima eſt
inteſtina ad locum propriuʒ reducere. Fit autem cũ mol
lificantibus cataplaſmatibus. deinde cuʒ eleuatione cru
rium: ac manuũ cõpreſſione ſuaui replente ſuperius.
¶ Scđa eſt rupturam regere cum ligaturis ⁊ conſolidã-
tibus emplaſtris: ⁊ per os etiam miniſtratas. Et ſi q̄dem
cauſa eius fuerit ſolutio continui inteſtinoꝝ: ⁊ fuerit ex

cā exteriori.puta vulnere ⁊ ꝑcuſſione ſcindēte ſi penetret
vſq; in vacuū ipoꝝ eſt mortale.Et maxime ſi in gracilibꝰ
fuerit. Jngt.n.hyppo. Si inteſtinoꝝ incidatur aliqđ gra/
ciliū nō ꝯglutinatur nec ꝯſolidatur. ſi vero nō pertrāſeat
in ꝓfundum cum ſtipticis ⁊ cōglutinātibus regatur que
īfra dicētur ſectione ſcđa. Et ſi fuerit vlcus mundificare
opꝫ ꝑmum:deinde conſolidare. Si aūt a cauſa interiori
fuerit.puta ab hūore acuto pungēte actu:⁊ ſoluente effu/
ſo ⁊ colecto in īteſtinis: tūc dolor erit nō de genere colice
vel yliace vere:ſed mēdoſe:⁊ ꝓprie eſt de genere punctio/
nis:⁊ erit dolor pūgens in cuiꝰ cura excitaī ex eo.ſ.ꝙ ipoꝝ
īteſtinoꝝ dolor plurimū ex cauſa frigida ꝓuenit humoro
ſa ⁊ vētoſa:ac ſecū conſtipatione:qbus calida approxima/
ta vt ꝑdictum eſt iuuamētum preſtare ꝯſueuerunt:⁊ frigi
da nocumētum. Proinde ꝓcedunt ad eius curaꝫ cōmu
niter ſtolidi ⁊ īprouidi medici cū calidis ⁊ aperiētibus ex
qbus dolor exaſperaī:⁊ acuiī cuꝫ ex eis talis humor ſub/
tilietur:⁊ inflētur:ac buliat: curratq; ad īteſtina effrenꝰ:⁊
trahaī:⁊ ꝓprie cum ab epate ⁊ ciſtifellis:vel toto corpore
influat illis. Recta itaq; cura eſt:vt talis hūoris comple/
xio adequeī:⁊ obtundaī eius acuitas ⁊ ſubtilitas inſpiſſe
tur ⁊ cōſtipenī vie per quas īfluit.Conforteī inteſtina ⁊
educaī qđ fluxit.⁊ hoc ꝑmum cū rectificatione regiminis
⁊ cōuerſione ipſius ad frigidū ⁊ humidum qđ eſt notum.
Et cū frigidis humidis leniētibus: etiā cliſteriçatis prius
⁊ ſumptis deide.Et ꝓprie in colica:qualia ſunt viole:mal
ue:iuiube:pruna:ſebeſten:furfur:fenu grecū:⁊ ſicla cliſte/
riçata cū oleo violato:çuccaro violato:⁊ caſſiafiſtula. Et
ſumanī pruna perforata cū acu:⁊ infuſa cū iuleb.criſomi/
la ⁊ perſica:caſſiafiſtula:tamarindi: tereniabin: aqua fru/
ctuum:⁊ ſyrupus violatus:vel de ſucco ro. cū aqua ordei:
⁊ granatoꝝ muçoꝝ. Deinde pōtica nota.que ꝯprimendo
effuſam humiditatē exprimāt ⁊ educāt: ⁊ īfluentē ab epa
te ciſti:vel toto corpore cōpeſcēdo retineāt:quo caſu epar
⁊ ciſtis:⁊ totū corpus rectificeī:ꝓut in cura icteritie dixi/
mus. Cliſteribus quoq; addanī oleū onfancinū vel roſ.
ſuccus portulace:aqua ſumach: virge paſtoris:ſpodium ⁊
adeps irci.⁊ ſimiliū: vt anatis ⁊ galline.Et ſi materia ibi
bita fuerit:adminiſtrabis cū eis yeram ⁊ ſcamoneaꝫ cum
pillulis de aloe. Et ſi expediat admiſcebis illis ſtupefaciē
tia.⁊ ꝓprie tiriacā nouā:quoniam ꝯfert cauſe īprimenti ⁊
precipiēti:vt ſupra dictū eſt. Et ſi qdem ſuperius petens
īpetum faciat ad os ſtōi:⁊ vomitus ꝓuocetur ſi facile ſit
ſi vero nō īferius trahaī cliſteribus: fricationibus extre/
morum: ⁊ ligaturis doloroſis: fomentis mordentibus ⁊
vētoſis. Si qdem humor talis ſalſus fuerit.miniſtrabis
cū illis ſubtiliātia ⁊ abſtergētia qualia ſunt cartamus.ſuc
cus alubleb:⁊ ſicle.⁊ baurach:⁊ ſal in q̄titate:ſuperius ve
ro ſiclam decoctā:⁊ almuri: cappares quoq; ꝯditos cū ſa/
le ⁊ aceto:⁊ yere admiſcebis agaricū ⁊ colloquintidam. ⁊
ſimilia.Stercus quoq; adib dabis qđ eſt huic egritudini
ꝓprium.ſit aūt in vino diſſolutū ⁊ inunctū cū oleo nardi/
no:⁊ ſuſpenſum in collo etiā cum filo de lana aialis:qđ lu
pus comedit. ⁊ ſit illud qđ comedit oſſa: ⁊ illud eſt albuꝫ:
⁊ in rubis inueniī ſuſpēſum.Et ex eis eſt cornu cerui adu
ſtum cū vino in potu ſumptū:qm̄ ſedat ſtatim.Si vō cau/
ſa eius fuerit acutus cibꝰ vel potus prouocetur vomitus
cū aqua tepida:⁊ oleo ſiſamino:vel butiro:⁊ ꝓpinetur lac.
ꝯuertatur quoq; regimē ad frigidum ⁊ vnctuoſum. Qꝫ ſi
cauſa eius fuerit ſanies a ſpiritualiū vlceribus miſſa:cura
eſt due res. ꝑma eſt mūdificatio ſaniei cū cliſteribus pre/
dictis abſterſiuis ꝓprie.ſcđa eſt vt vlcera ſpiritualiuꝫ me
diceī.ꝓut ſupra in ꝑma ſectione dictuꝫ eſt. Si vō ſit hu
mor a cerebro miſſus:cura eius erit cura catarri:quā ſupe
rius diximꝰ. Si vō a toto corpore: vt in yparia ⁊ ſimilibꝰ
cura erit cura yparie ⁊ fluxus liquefactiui: de qbus ſubſe

quēter dicemus auxilio ſancti ſpiritus.Si vero compreſ/
ſio ex vicinis aꝑatis. vt epatis ſplenis ⁊ lacertoꝝ almirac
cura eſt cura aꝑatis illoꝝ membrorū:que ſuperius dicta
eſt. ſcđa eſt mūdificatio ⁊ confortatio inteſtinorum. Si
vō cauſa doloris fuerit cōpaſſio ad renes lapidē habētes:
cura erit due res. Prima erit cura lapidis renū quā īfra
ponemus. Scđa eſt mūdificare inteſtina a ſupfluis:⁊ cō/
fortare ne debilitate retineāt ſuperflua ⁊ colicā veram: ⁊
ꝓpriam incurrāt.Si vō paſſio eius ſit ꝯpaſſio ad cerebꝝ
apoſtematū. ⁊ neruos patiētes ſpaſmū vel tetanum cura
erit cura apoſtematis cerebri.quam premiſimus:⁊ etiam
ſpaſmi. Si vō a cauſa exteriori accidat que plurimuꝫ eſt
yliace: vtputa mala ꝯplexione frigida ⁊ pura īpreſſa a po/
tu vel balneo aque frigide vento ſeptētrionali:vel ſeſſio/
ne in lapide frigido: cura erit due res. ꝑma eſt vt auferaī
cauſa.ſcđa eſt vt calefiant īteſtina per cibos ⁊ medicinas
calidas intus ⁊ extra:⁊ per omnem modū approximatas:
prout in cura male cōplexionis frigide ſtomaci diximus
Si vero ab aere peſtilēte accidat: Cura eiꝰ eſt:quā ſupra
in cura egritudinū cordis diximus. Similr̄ ſi a veneno
ſūpto cura eſt quā ibideꝫ prediximus. Si vō fiat a cibis
ſtipticis ⁊ pōticis ꝓprietatem habentibus colicam com/
mouere atq; cauſare:cura erit illos educere cum lubricis
⁊ ꝓuocatione vomitus: ⁊ proprie in yliaca. Regimē autē
ordinandum ē duplex: vnum ē curatiuum ⁊ aliud preſer
uatiuum. Curatiuuꝫ ē vt regantur in aere temperate ca
lido:ne fortitudine doloris ⁊ calore aeris reſoluantur.
Exercitentur pedibus vel manibus: vel reuolutionibꝰ in
ſtratu quātum poſſibile eſt:⁊ dormiant.deinde quantum
oportet ꝓprie poſt ſolutionem ventris:⁊ ſupra inanitiōeꝫ
niſi a cauſa calida fuerit.abſtineāt vero ⁊ ſitiant quātum
tollerare valent.donec repletio corrigatur.⁊ ꝓprie ſi a fri
gida cauſa fuerit ⁊ ventoſa:⁊ tunc ſufficit eis ius cicerum
⁊ galloꝝ antiquoruꝫ ⁊ panis furfuraceus ſiccus cū aleis:
⁊ vinū antiquum ⁊ aliqđ ex extenuātibus ventoſitatem.
Halie.vero ait ꝙ operarioꝝ qdam cū ſentiebat colicū do
lorem cingebat ſe nō prius cinctus. Comedebat aūt cum
pane alea nullā derelinquens ꝯſuetam geſtioneꝫ. bibebat
aūt per totū diem nihil:ad veſpeꝝ vero meracius. deide
dormiebat per totam noctē:mane vero ſurgebat omnino
īdolorabilis. Sic ergo alendi ſunt niſi ad reſolutionem
ꝑducantur ꝓpter doloris vehemētiam.⁊ euacuationeꝫ:⁊
ꝓprie in iliaca.Tūc.n. oportꝫ vt cibus ſit facilis digōnis:
⁊ boni nutrimēti lenitiuꝰ lubricus ⁊ abſterſiuus: ſicut eſt
aqua carnis diſſolute vel diſtilate:⁊ colate.⁊ ꝓprie colum
boꝝ iuuenum nō pinguium:⁊ gallorum iuuenum. vitella
ouoruꝫ ſorbiliū:medule diſſolute in iure vel vino.⁊ qñq;
opꝫ in iure eorum vt ponaī carthamus:⁊ alubleb.ſemen
vrtice.⁊ polipodiuꝫ:turbit: vel ſcamonea diſſoluta:prout
īuitat neceſſitas. Et cōdire cibaria cuꝫ porro aleo.⁊ ſale:⁊
ſpeciebus:puta cinamomo:çinçi.origano:pipere.cimino ⁊
aniſo. Et ex fructibus cōcedanī carice paſſe dulces ⁊ ca
pares cōditi cū aceto.Et ex oleribus ruta ſicla ſinapis.vi/
tent vero groſſa viſcoſa frigida ſtiptica ꝯſtipantia ⁊ vēto
ſa. Si vō a cauſa calida fuerit qes eſt magis conueniens
⁊ ſomnus ſupra repletioneꝫ.nec nō plurima abſtinentia ⁊
cibus hūidus leniēs ⁊ lubricus frigidus: vt eſt ius herba
rum ⁊ fructuū ꝑdictorum ſupra in cura pungitiui doloris
⁊ potus aque ordei. Uitent vō ſtiptica ⁊ pontica: niſi cum
cauſa illa influat inteſtinis ex alio:tunc.n.ibi cōpetunt. vt
ſuperius dictū eſt.Et cibꝰ difficile corruptibilis vt factus
ex cōdro in aqua decocto imiſſis granis maloꝝ granato/
rum ſicut Hal.oſtendit. Et potus etiā frigidus nō veri fri
goris ſi ſiticuloſus:⁊ hora eſtatis fuerit. Sed ius galli de/
crepiti negatur oīo.inanitio eſt cōis ⁊ cotidiana cū ꝓprys
repletio eſt nociua:⁊ retētio fecis ⁊ vētoſitatis petētium

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0332-3

ꝑitum. Anime vero accidentia per ſe nocent generaliter
omni ex omni cauſa inquantum naturam exterminant ⁊
debilitāt. Per accidens aūt ꝯferūt inquātum naturaz in-
flāmant ⁊ infrigidant: ⁊ diſtrahūt a dolore. Specialr̄ aūt
ꝯferūt vt ira ⁊ idignatio in eo qui eſt ex cauſa frigida. gau
dium vel triſtitia ⁊ timor in eo qui eſt ex calida. Si v̄o ab
apate fuerit regat̄ ſicut in apate ſtomaci dictū fuit. Regi
men vero preuiſiuum īfra ponemus auxiliāte xp̄o. Circa
correctionē vltimo accidentium īſurgētium eſt īſtanduz
ſcd̄m diuerſitatē ipſoꝝ: quorum vniuſcuiuſq̄ queres cu
rationē in ꝓprys capitulis: vbi de eis dictū eſt. vel īfra di
cetur. Poſitis igenys curationis ad dolorē ventris: ⁊ ſpe
cies eius: atq̄z numeratis ſimplicibus medicinis qbus cō
pleri hūt ⁊ debēt: ad ſubiunctionē medicinaꝝ ꝯpoſitaruz
deueniemus: qbus valeāt vbi ſimplices nō ſufficerēt p ſe
cōpleri. ¶ Sciēdum ergo: ꝙ ex eis quedā ſunt enemata
quedā coliria: quedā vomitiue: quedā ſyrupi: quedam ele
ctuaria: quedā trociſci: quedā potiōes: quedā pillule: que-
dam emplaſtra: quedā euaporationes: quedā vnctiones:
quedā balnea: quedā olea: ⁊ quedā ventoſe. Et ex enema
tibus: quedā ſunt ad frigidaz ⁊ flegmaticā: ex quibus eſt
qd̄ digerit: ⁊ eſt. ℞. floruz camomille: mellilloti: abſinthy:
paritarie: calamēti: origani: malue: an̄. M. i. fenu greci: ſe-
minis lini: an̄. ℥. i. caricaꝝ. x. iſopi. ℥. i. cimini: aniſi: feniculi:
an̄. ℥. ſ. furfuris partē. i. buliant in aqua fontis: ⁊ in tribus
partibus particularibꝰ diſſoluantur mellis cōis. ℥. y. olei
anetini. ℥. y. ſalis cōmunis qd̄ ſufficit. Oportet aūt vt for
ma cliſteris ſit ſcd̄m meliorē modum: ⁊ eſt vt foramē eiꝰ
cāne ſit ita largū: vt cito inyciat̄: ⁊ quātitas eius ſecūduz
ꝗtitatez corporis ⁊ etatis ſilr̄: ⁊ enema: ⁊ ſit calidū in hoc
caſu tepidū in alio nō frigidum. Tempus eſt dictū ſupe-
rius. vt cū iam digeſtus fuerit cibus: ⁊ pertrāſierit: ⁊ eſt ſe
cūdum Hali. poſt ſex horas ſumptiōis ipſius ⁊ plus. Sitq̄z
modus iniectionis ſuauis. Ad hoc igit̄ canella cliſteris in-
ungatur oleo dulci: ⁊ ipellat̄ enema cū expreſſiōe ꝯtinua
vt aer nō ſimul ipellat̄ cū eo: ⁊ ſuaui ī colica. forti ī iliaca.
Sitq̄z corpus ſupra genua: ⁊ inclinato capite ſituatuz. Et
qn̄q̄z opz eleuare crura. vt ad ſuperiora melius ipellatur
Sitq̄z ſituatus īfirmus ſupra vētrem. in colica vero ⁊ ilia
ca: ſupra renes ⁊ dorſum. in colica non vera ⁊ nefretica:
vel ſupra latus patiens. Deinde venter manibus frice-
tur ⁊ moueat̄: ⁊ ꝗ̄ diutiꝰ poteſt toleret̄. deinde v̄o emitta
tur ꝙ ſi nō exeat colirio iuuet̄. ꝙ ſi nō ſuffert repetat̄ cli-
ſtere: cui addat̄ plus ſalis. vt excitet expulſiuaz. Et qn̄q̄z
oz admiſcere calidiora aliqua ex predictis: que magis ex
pediūt. ¶ Aliud ſolutiuū ex īuentione noſtra. ℞. mercu-
rialis: aſari: ſticados: malue: camōille. abſinthy: ⁊ naſtur-
cy: vrtice: paritarie: cētauree minoris: rute ſicce: an̄. M. i.
polipody. ℥. y. aniſi: ſemis aneti: an̄. ℥. ſ. carthami: collogn-
tide: panis porcini: an̄. ℥. i. buliāt in aqua fontis: ⁊ in partes
diſſoluant̄ mellis cōmunis. ℥. y. caſſie fiſtule. ʒ. i. yere pigre
℥. ſ. baurac. ʒ. i. olei de been. ℥. i. educit. n. fl̄a: ⁊ ventoſitatē:
⁊ ſedat dolorem colice: ⁊ yliace: ⁊ ſanat ſi xp̄s voluerit.
¶ Aliud. ℞. baurac. ℥. i. tere ⁊ diſſolue in aq̄ rute vel oleo
eius. ⁊ cliſteriça: expertū eſt. ¶ Aliđ. ℞. aſari: cētauree: ru
te ſicce: ⁊ ſemis eius: an̄. M. i. buliāt in oleo antiquo cum
collogntide. pulpe. ℥. ſ. ⁊ cliſteriçet̄. Et qn̄q̄z addit̄ yera
qn̄ materia eſt in rugis ītestinoꝝ: ⁊ tunicis īterclusa ⁊ iui-
ſcata educit. n. eā facile. ¶ Aliud. H. ad colicā vētoſaz. ℞.
ſemis apy: aneti: dauci: rute: ⁊ ciperi: an̄. ℥. i. buliant in oleo
antiquo vel ſubtilis ſube. Deinde colent̄ ⁊ in colatura diſ
ſoluant̄ adipis anatis. vel anſeris: vel galline liquefacte
℥. y. ⁊ imite. ſedat. n. dolorē: ꝙ ſi nō ſedauerit rurſus imit-
tēdum eſt idē. Qz ſi nō ſedet̄ iteꝝ adde illi caſtorei pulue
riçati. ʒ i. Et ſi cū hoc nō ſedet̄: adde opy. ʒ. ſ. Et qn̄q̄z cū
ſolo oleo rutaceo cliſteriçātur. Et qn̄q̄z admiſcetur bace
lauri. ℥. i. ¶ Aliud ſerapionis laxatiuū hūoris flatici. ℞.
camomille: aſce: violaꝝ ſiccarū: ſebeſten: ficuū: ſemis lini:
altee: an̄. partē. i. Decoquant̄ in lib. iiy. aque: donec rema
neat lib. i. ⁊. ſ. ⁊ colet̄. Et fundant̄ ſuper eā olei mirtini. ℥.
y. ſalis. ʒ. y. baurach. ℥. ſ. muri ⁊ çuccari: an̄. ℥. y. Et cliſteri
çetur cū eo tepido. valz ad colicā cū febre acuta: cuius nā
eſt ſicca. Et cū fl̄a ex alys īfluit illis: adde macē. ¶ Aliud
ad dolorē colice frigidū abſq̄z febre: miſceat̄ collogntide
cū predictis rebus. ℥. ſ. Deide decoquant̄ ⁊ colent̄. deide
ſumat̄ caſtorei: aur. ſ. ⁊ collogntide trite. ʒ. i. ⁊ q̄rta. cētau-
ree. ʒ. y. mellis. ℥. y. ſalis triti. ʒ. y. baurach. ʒ. ſ. Cliſteriçet̄
cū eo tepido. Et ex hoībus ſunt qui addunt ſerapinū: bde
liuz: armoniacū: ⁊ oppoponacū. ¶ Aliud ad colicā ex ver
mibus. ℞. cētauree minoris: agarici: abſinthy: carui: gra-
noꝝ lupinoꝝ in ꝗtitate cōueniēti diſſoluant̄: fellis tauri-
ni. ℥. ſ. olei amigdalaꝝ amaraꝝ: ⁊ baurac qd̄ ſufficit. Et cli
ſteriçet̄ precedēte cliſteri ex lacte: vel ex hidromelle. Et
aliq addūt yeram. ¶ Aliud ad colicā flegmaticam ex re-
tentione fecis. ℞. origani: ſticados: aſari: cētauree: malue:
altee: ſemis lini: an̄. partē. i. aniſi: feniculi: carui: ſemis ru-
te: an̄. ℥. ſ. olei amigdalaꝝ dulciū: baurach: ⁊ ſalis cōis qd̄
ſufficit: mellis violati. ℥. i. ⁊ cliſteriçet̄. Et ſunt aliq qui ad-
dunt ſuccū ſicle: ⁊ ꝓprie cū flegma a capite ꝓfluit inteſti-
nis. Et deinde ſi oz ſupponat̄ cū colirio de pane porcino.
¶ Aliđ abſterſiuū in aqua maris buliāt furfuris: frumē-
ti partē. i. ireos: ariſtologie rotūde: caricaꝝ an̄. ℥. i. ſterco-
ris colūboꝝ: ſtercoris canis comedētis oſſa: an̄. ʒ. y. diſſol
uant̄ in aqua p̄dictoꝝ. ⁊ terbētine: ⁊ baurach: an̄. ʒ. y. mel
lis rubei. ℥. y. olei de been. ℥. i. ⁊ fiat cliſtere. deide ſi expe-
diat ſupponat̄ cū radice brionie. ¶ Aliud ad frigidā co-
licaz abſq̄z mā. ℞. olei antiqui ſimplicis ſcd̄m Hal. ⁊ eo tē
perato cū adipe anatis fiat cliſtere. calefacit. n. ⁊ nō trahit
Et qn̄q̄z miſcet̄ cum alchitran. ʒ. y. Et qn̄q̄z buliāt in eo.
abrotani: calamenti: pulegy: ſambuci: aſce: aneti: radicis li
ly: an̄. ℥. i. ⁊ cliſteriçet̄. Et aliqui faciūt p̄dicta in vino vino-
ſo antiquo bulire. Et aliqui cliſteriçāt ſolū cū oleo ſambu
cino: vel de rafano. Et calefiat ſępe vēter cū pāno calido.
Et qn̄q̄z cliſteriçat̄ fimus colūbinus: ⁊ ꝓprius canis cum
ſucco camomile. ¶ Aliud ad colicā ex ſiccitate. ℞. extre
ma aīalium humidoꝝ. vt capita: ⁊ pedes agnoꝝ: edoruz ⁊
arietū iuuenū. ⁊ buliāt in aqua: ⁊ in parte diſſoluatur olei
ſiſamini: vel amigdalaꝝ dulciū. Et cliſteriçent̄: ⁊ aliqui
cū iure gallinaꝝ pinguiū: ⁊ aliqui cū lacte aſine: cliſteriçāt
humectāt ⁊ īpinguāt. ¶ Aliud raſis ad colicaz calidā ex
īfuſiōe colere ad īteſtina. ℞. olei roſati. ℥. y. ⁊ diſſoluatur
in aqua decoctiōis violaꝝ: ⁊ cliſteriça. Et accipe oleum ci
tonioꝝ: ⁊ cū aqua violaꝝ ⁊ ſumach: miſce ⁊ ſuperadde ſpo
dy. ʒ. y. ⁊ cliſteriça: ⁊ ſi ꝙ īfluit fuerit flegmaticū ſuperad-
de macē: myrrā: ⁊ charabe loco illoꝝ. ¶ Aliud ad colicaz
ex apate frigido. ℞. olei laurini. ℥. i. olei ð oliuis partes. y.
adipis anſeris. partē. i. cliſteriça. Eſt. n. mirabile ſcd̄z abo.
Et ꝯſequēter adhibe empl̄a facta ex abrotano ⁊ aneto: ſq
nanto ⁊ mellilloto: ⁊ reliqs: qbus curat̄ tale apoſtema.
¶ Aliud Iſaac ad frigidam flegmaticā ⁊ vētoſam. ℞. ca
momille: aneti: an̄. ℥. i. ſ. cētauree: ligritie: ſemis lini: ⁊ fenu
greci: an̄. ʒ. x. apy: ameos: calamēti: meu. croci ortēſis an̄. ʒ.
iy. caricaꝝ octo. coquant̄ in aqua: ⁊ in partes tres mittes
mellis. ℥. i. obſomogare: olei oliuarum: ſiſameleon: an̄. ʒ. i.
ſambucini: lenticuleon: an̄. ʒ. ſ. nitri. ʒ. i. Et fiat cliſtere. Et
ex eis que valde conferunt. eſt emplaſtrum de abrotha-
no factum cum aſpalto. Et emplaſtrum noſtrum factum
de granis lauri. Ad colicā aūt melancoliam cliſteriçatur
polipodium cum ſale indo: ⁊ epithimo: boragine bugloſſa
⁊ melle. Et ex colirys eſt coliriū Almanſoris. ℞. ſalis. ʒ. y.
colloquintide: ſcamonee. an̄. ʒ. i. ⁊. ſ. mellis qd̄ ſufficit: ⁊ de
coquatur vſq̄z ad ſpiſſitudinē decentē: ⁊ fiāt inde coliria.

¶ Aliō ex radice brionie vel radice pāis porcini iunctis
cum oleo anetino. Et valet ad frigidā flegmaticā ex fece.
¶ Aliud ex litio. ℞. lity. ʒ.i. myrre: ſtoracis: calamite: opy
thuris: aā. ʒ.i. croci. ℈.ſ. Cōfice cū ſucco arnogloſſe: ⁊ ipo/
ſitū teneat̄ per horā ſedat dolorē: ſtringit materiā: ⁊ dor/
mire facit. ¶ Aliud qḋ diſſoluit vētoſitatē. ℞. cimini: fo/
lioꝝ viridis rute: aā. M.i. buchormarien: ⁊ eſt radix pire
tri: vel mali terre. ʒ.ij. nitri. ʒ.v. pulueriçent̄ ⁊ cōficiant̄ cū
melle: ⁊ coquant̄ ad ſpiſſitudinē. Et fiāt coliria: ⁊ vngātur
oleo de ruta: vel nardino: vel de kerua: ⁊ imittant̄ cū opꝫ
¶ Aoli Abo. ℞. ſtercoris ſoricini: ſalis gēme ⁊ baurach.
aā. ʒ.v. terant̄ ⁊ miſceant̄ cū melle. ℥.ij. ⁊ coquant̄ ad ſpiſ
ſitudinē: ⁊ inungant̄ oleo: ⁊ imitantur. ¶ Confectio ſup
poſitory que ſoluit vētrē. cōteritur. n. ⁊ ꝓycitur in cliſteri
ſolutiuo: ⁊ noīatur ſuppoſitoriū album a Raſi. ℞. bacarū
ʒ.x. collogntide: nitri: bdely Serapini: ana. ʒ.v. ſcamonee
ʒ.ij.ſ. Et fiat coliriū ex eis. ¶ Aliud abo. Cōteratur ruta
cum aqua mellis donec fiat ſicut illud de quo fit linimen
tum: ⁊ ponat̄ medietas ipſius de cimino ⁊ quarta pars de
nitro: ⁊ ſumat̄ glans lōgitudinis. vij. digitoruꝫ: vel fiat ex
oleo rutaceo cū caſtoreo ⁊ melle: felle vaccino ⁊ baurach
ana. aur. ſ. ſerapini: bdely: colloquintide ⁊ altee: aā. ʒ.iiij. ⁊
fiat ex eis glās: valet ad ſiāticā ⁊ ventoſam. ¶ Uomitiuū
bonum ad yliacā frigidā: vinum grecū ſimplex vel ſianū
ſimplex vel ſclauū: ſicut eſt vel calidū vel aqua cepe narci
ſci: ſemis rappaꝝ vel rafani ma. ſimplex: vel cū aceto ſql/
le: ⁊ vinū īfuſionis aſari: per noctē aā: ⁊ aqua nucis vomi/
ce vel īfuſionis elebori albi. ¶ Aliud ad colicā. ſumatur
aqua decoctionis attriplicis. Et bibat̄ ſola. vel cum aceto
⁊ oleo violato. ¶ Aliud ad vētoſam. ℞. carui: ſemis ane/
ti. ⁊ rute: ⁊ buliāt in aqua: ⁊ tepida cū oleo de neriden: vel
de enula ſumat̄. ¶ Aliud vomitiuū: ⁊ eſt Raſis: ⁊ eſt for
te. ℞. tartari: nucis vomice: nigelle: ſemis rafani ⁊ aneti:
aā. eqľr. ſalis idi: baurach: aā. ptē. ſ. doſis. ʒ.iiij. cū tepida.
Et qñq3 additur in ea. ʒ. quarta de condiſi. ¶ Syrupus
cōferens colice ⁊ yliace: flegmatice ⁊ vētoſe. ℞. calamēti:
origani: iſopi ortēſis: creçi ortēſis: ſanſuci: aā. M.i. ſiſcle/
os: aniſi: feniculi: carui: ſeminis apy: rafani: aā. ʒ.ſ. radicis
enule. ℥.ſ. ireos. ℥.ſ. meu. fu. aniſi: acori: aā. ℥.ſ. ſquināti: ſe/
minis vrtice: aā. ℥.ſ. floꝝ roriſmarini: boraginis: ⁊ bugloſe
aā. ℈.i. mellis cōmunis diſpumati libr. ij. aceti ſquillitici
℥.iiij. in pecia buliāt. çinçib. galāge: gar. aā. ʒ.ij. ſpice. ʒ.i. Et
qñq3 ſufficit ſyrupꝰ ex melle ſqllitico cū geleniabin: aā. ℥.
i. cū aqua aniſi: ⁊ feniculi. Idem operatur ſyrupus de iſo
po ⁊ calamēto: quoꝝ deſcriptiones poſuimꝰ in antidota/
rio noſtro. ¶ Syrupus ꝯferens colice ⁊ iliace calidis. ℞.
endiuie. lupuľ. lactucaꝝ: portulacaꝝ: trifoly: cimaꝝ rubi:
criſolocāne: acetoſelle: aā. M.i. prunoꝝ: ſebeſten: iuiuba/
rum: aā. xxx. ligritie: violaꝝ: roſ. aā. ℥.i. çuccari: libr. i. ſuc/
ci citonioꝝ: ⁊ aque ro. aā. ℥.ij. in pecia rara buliāt: ſpody:
ſandali: vtriuſq3 aā. ʒ.ij. ſucci granatoꝝ muçorum. ʒ.ij.
Et quādoq3 ſufficit ſyrupus violatꝰ ſimplex: vel de ſucco
violaꝝ: ⁊ ꝓprie cū volueris ſoluere materiā iam collectā
¶ Syrupus ad colicā nō verā que eſt ex lapide renum.
℞. camedreos: camepitheos: ſenationū: ⁊ cretanoꝝ mari
norum: paritarie: capiľ. veneris: os mūdi calēdule: ſcolopē
drie cum radice endiuie: cum radice cicoree: epatice: bu
gloſſe: acrimonie: ſicle pentafilon: filipendule: ana. M.i.
gnq3 radicū cōium: aā. ℥.i. liquiritie: maluaꝝ: ſemis viola/
rum: floꝝ boraginis: acori: enule: radicū iris: radicū cardo
nis: ⁊ arundinis: ſaxifragie: milei: ſolis: aā. ℥.i. ſileris: aniſi:
feniculi: ſe. apy: ameos: cordumeni: petroſelini: macedo/
nici: aſari: meu. ſquināti: aā. ℥.ſ. caricas. x. ſemis vrtice. ra/
dicis rafani: ana. ℥.i. ſemis ſparagi: bruſci: caſſie lignee: ana
℥.ſ. prunoꝝ ſebeſten: ana. xxx. ſeminū cōmunium: ciceruꝫ
nigroꝝ: aā. ℥.iiij. ſeminū lactucaꝝ: portulace: ſcariole: ana
℥.ſ. ordei mū. ptez. i. gūmi: dragāti: lapidis iudaici: lapidis
q īuenit̄ in ſpōgia marina: aā. ℥.i. medulle oſſium ceraſo/
rum: betonice: ana. ℥.i. ariſtoľ. longe: ⁊ rotunde: ana. ʒ.ij. al
chechengi. ℥.ſ. paſſulaꝝ enucleatarum: çuccari: ana lib. ij.
mellis roſati: lib. ſ. ſucci capil. veneris: ſucci ſcabioſe: ſucci
vrticarū paruaruꝫ depurataruꝫ. ana lib. ſ. aceti. ℥.iiij. ⁊ ſit
radicū vel ſquilliticū. Et quādoq3 addit̄ cū volueris ꝙ la
xet hermodactilorū: ⁊ cortic̄. radicis celſi: ana. ℥.ij. polipo/
dy. ℥.iiij. Et aromatiçet̄ cū cinamomo. cubebe ⁊ ſpica.
¶ Electuaria ad colicā frigidā: dyacalamētuꝫ: dyambra
Et fortius eſt dyatrion. Et ad vētoſam dyagalāga. confe/
ctio de ſeminibus. Et fortiꝰ eſt dyaciminum ⁊ tiriaca anti
qua: ⁊ filia. Ad eaꝫ q̄ eſt ex ꝯſtipatione facit dyacaſiafiſtu
latum: ⁊ dyaprunis: ⁊ valēt etiā ad colicā calidaꝫ: ⁊ dyaro
don: ⁊ triſandalū: quoꝝ deſcriptionē ſupra habuiſti in an/
tidotario noſtro. ¶ Trociſcos ex p̄dictis ſimplicibꝰ poſ/
ſes ēt ꝯficere eligēdo ꝓpria tue itentioni. Siľr ⁊ potiones
ad maturationē: ⁊ reſolutionē nature per vomitum vel ſe
ceſſum. ⁊ plures in antidotario noſtro eligere poteris ad
hanc egritudinē ſi volueris. ¶ Ex pillulis ad colicā frigi
daꝫ flegmaticā ſunt pillule de ſerapino: de ſarcocolla: de
oppoponaco: pillule fetide noſtre. pillule de euforbio. de
coloquintida. ¶ Pillule de quatuor rebus expertiſſime
℞. coloquintide: ſerapini: ſalis gēme: dyagridy cocti: ana
partes equales: terant̄ ⁊ cōficiant̄ cum ſucco porri: a. ʒ.i.
vſq3 ad. ij. ¶ Ad ideꝫ. ℞. yere magne: ⁊ ꝓprie logodion ⁊
cologntidos: ⁊ benedicta ⁊ iuſtinū ad nefreticaꝫ filantro
pos. ¶ Ad colicā calidā ⁊ colericā pillule de yera Hali.
de reubarbaro. ℞. pulueris yere. H. ʒ.ij. agarici: reubarba
ri. ana. ℈.ij. vel dyagridy cocti. Informent̄ pillule cū ſuc/
co roſarū. ¶ Et pillule noſtre: quas in noſtro poſuimꝰ an
tidotario: que valēt ad febres colericas: ⁊ egritudines de
genere colere citrine ⁊ ſanguinis. Et ad melancoliam.
¶ Pillule de collogntida: de lapide armeno: ⁊ de lapide
laçuli. ¶ Et ex emplis ad colicā ⁊ yliacā frigidam eſt em
plaſtrū de granis lauri: ⁊ de aleis: ⁊ relatū ad andromacū:
⁊ relatū ad eraſiſtratū: ⁊ ſinapiſmū: ⁊ relatū ad androma/
cum cauteriçās vbi opꝫ. Et emplaſtrū ad colericaꝫ eligas
ex his que dicta ſunt in cura icteritie. Et ex p̄dictis ſimpli
cibus cōponere poteris: ꝓut opꝫ. Et ſiľr vnctiones ⁊ cerota
Et ex euaporatiōibus: quedā ſunt humide: vt ſunt ex ſpō
gys: filtro: coto: vel lana: ⁊ īfuſis in aqua decoctionis pre/
dictorū anodinorū. Et quādoq3 ipletur ex ea vas eneum
vter: vel veſica: ⁊ applicet̄ vētri ⁊ hypocūdrys. Et quādo/
q3 buliūt extenuātia vētoſitatem. Et quādoq3 faciūt ſa/
celli. ex q̄bus q̄dam ſunt ſicci. q̄dam ex ſale ⁊ milio vel pa
nico fiūt: nec valēt niſi in materia hūida ⁊ vētoſa. Et quā/
doq3 ex paritaria in vino cocta: ⁊ q̄dam ſūt tpati: vt q fiūt
ex camōilla: abſinthio: ⁊ ſe. lini: ⁊ q̄dam ex alys: puta ſe. li
ni: fenugreco: radice altee: violʼ. malua: camomilla: melli/
loto: ⁊ ꝓprie in colica nefretica cū bulierit in aqua: ⁊ vino
⁊ applicent̄ ſupra renes. Et balnea quoq3 ⁊ olea que ad
frigidā ſunt oleū anetinū de abrothano: de lilio: qḋ hꝫ vir
tutē tiriace: oleū onfacinū: ⁊ vltimū eſt oleū apoſtoloruꝫ.
Et ad vētoſam oleum rutaceum nardinum: ⁊ de enula: ⁊
de cherua ad vtrāq3. Ad calidam oleum ro. ⁊ violarum: ⁊
de ſe. melonum: ⁊ de ſcorpionibus ad nefreticam inunctū
ſupra renes. Et ad vtrāq3. ſ. veram ⁊ nefreticā: ⁊ oleum de
piperibus. Uentoſe quoq3 debēt eē magne cuꝫ multa flā
ma: ⁊ ſint de vitro: vel cornu: vel de argilla.
¶ Cliſtere educens flegma groſſum ⁊ ventoſitatē ſi xp̄o
placuerit. ℞. rubee. M.i. ſcordeon. ʒ.ij. cimini: aniſi. ana. ℥.
i. bacarum lauri. ℥.ſ. aſſe fetide. ʒ.ij. mellis ⁊ ſalis ana. ℥. i.
buliant in oleo antiquo: vel vino veteri: ⁊ fiat cliſtere.
¶ Unctio ex butiro cōfecto cum puluere colloquintide
ſupra vmbilicum ſoluit ventrem: ⁊ curat colicam ſi oco

placuerit. ¶ Cliſtere benedictum pro nobilibus cuꝫ ſua/
uitate educens flegma ⁊ melancolicum humorem: reſol/
uit oēm vētoſitatē: ⁊ ſanat colicaꝫ. ℞. aniſi triti: polipody
triti: añ. ℥. ij. buliāt cū aqua lactis caprarū lib. v. ⁊ diſſolue
ſpere pigre. ℥. i. mellis. ℥. ij. ſalis. ℥. i. olei viol. fac cū reitera/
tione ſi oportcat. ¶ Regimē pſeruatiuū a colica ⁊ ileon
cū apparēt ſigna replōnis ⁊ iceptionis ex. tortione dolore
leuiter ⁊ pūctione opꝫ vt iterdicat̃ repletio: ⁊ iniungatur
abſtinētia ⁊ euacuatio cū vomitu ⁊ fluxu vētris cū cliſteri
bus pdiſtinctis: ⁊ deinde cū aliquo ſolutiuo leui: deinde ſi
expediat cū forti: pmiſſa digōne cū appropriatis vnicuiqꝫ
cauſe replēti. Et ex digeſtiuis bonis in via pſeruatiōis ad
colicā verā ⁊ yliacā. Et etiā nō verā: ſeu ne freticā ęſt ſcdꝫ
iudeum belçamen de thimo: vt ſumat̃ quolibet mane co
clear vnū huius pulueris cū vino albo ſubtili. ℞. ſeminis
aneti: feniculi: apij: fenu greci: añ. ʒ. i. ſ. ſquināti. ʒ. v. Item
aliud. fiat vinū ex triofolio: vel pentafilon: vel betonica ⁊
gramine cōtritis: ⁊ poſitis in vegete cū vinū in videmus
ebulit: de quo ſumat̃ medius ciatus ante cibū cū puluere
çedoarie. Et ex ſolutiuis leuib⁹ eſt talis tragea experta ēt
ſi ſit cū febre vera ⁊ mēdoſa: educit. n. hūores groſſos: qui
ſunt cā vtriuſqꝫ: ⁊ ēt calculos. ℞. turbit boni hermodacti
li: ana. ℥. i. eſule. ℥. ſ. piperis lōgi: çinçib. ſpice ana. ʒ. i. macro
piperis. ʒ. i. croci. ʒ. ſ. ſemis leuiſtici: granorū ſolis: ſeminis
geneſtre: ſaxifragie: ana. ʒ. ij. medule: carthami. ℥. i. çuccari
q̃tum ſufficit. de qua ſumat̃ coclear vnū in menſe: ⁊ deſu
per bibat̃ parū aque tepide. Et ſūt qui addūt caudas gril
loꝝ cicadarū ⁊ cineres ſcorpionū ⁊ cantaridaꝝ in hyeme
⁊ in frigidis circūſtantijs. Eſtate vō ⁊ in calidis nō addan
tur: ſed ſumat̃ loco ei⁹ mel caſſiefiſtule cum aqua liquiri/
tie ſeruato bono regimine. Et eſt vt in pncipio cibi: vel pa/
rum ante ſumat aquaꝫ ciceꝝ nigroꝝ cū ſemine melonis:
deinde ſumat ſubtiliātia ⁊ icidētia: ⁊ a ɔtrarijs abſtineat.
¶ Itē ſumat poſt cibū trageā cōfortatiuā digōnis: ⁊ reſo
lutiuā ventoſitatis: que eſt. ℞. gar. iciſoꝝ. ℥. ſ. galange. ℥. ſ.
çinçib. ℥. i. granoꝝ paradiſi. ℥. iiij. aniſi: feniculi: ana. ʒ. iij. li/
quiritie. ʒ. ij. ſeminum melonum mundatoruꝫ. ʒ. iiij. vinū
eius ſit ſubtile vinoſum.

¶ Caplm. ij. de cura vermium ⁊ medicinis eorum.

q Uia curā vermiū exiſtētiuꝫ: vna ex cauſis colice:
vt patuit p̄cedēti caplo reſeruauimus: vt loque
remur de ea latius eoꝝ genera cās: ſigna ⁊ medi/
camina iueſtigandū pprias cuꝫ ſint accidētium plurium
horrendoꝝ ⁊ mortiferorū: iō de ea ad preſens loquemur
put miniſtrabit grā ſaluatoris. ¶ Sciendꝰ igit̃ q̄ ſcdm
Gali. vermiuꝫ tria ſunt genera. ſ. lūbrici rotūdi aſcarides:
ſubtiles parui: ⁊ tertiū genus eſt eoꝝ qui lati vocant̃ ⁊ cu/
curbitini producentes ſemina ad modum ſeminis cucur/
bite: ceteris longiores: vtpote alternatim ſibi continuan
tes ad modū cordelle: ſeu çagarelle: ſicut ſenſus declarat.
Cauſa aūt in generatiōe ipoꝝ triplex eſt. materialis. local̃
⁊ efficiēs. Materialis eſt humiditas iſipida: alba: viſcoſa
in vnū cōdēſabilis ⁊ cōpactibilis: ⁊ talis eſt fl̃a non colera
rubea: nec nigra lꝫ effundant̃ ad iteſtina cū ſint ſicce diſ/
partibilis ſubē nō ɔdēſabilis bene: ⁊ nimis calide vel fri/
gide ſaporis ɔtrarij: generatōi ⁊ conſeruationi ipoꝝ: vt qꝛ
amari vel acetoſi valde. qbus necant̃. coloris diſſimilis
qꝛ citrini vel nigri: nō ēt ſanguinis: lꝫ ſit ɔueniēs ppter ſa
porē. qꝛ dulcis eſt ad iteſtinoꝝ: tamē vacuū nō effunditur
ſed a nā ſtricte in venis: vt theſaurus ɔſeruet̃ exiſtēs pro/
portiōalis ⁊ neceſſarius generatiōi nutrimēto ⁊ augmen/
to mēbrorū radicaliū. ⁊ carniformiū qbus in colore eſt ſi/
milis nō ſicut vermib⁹. Localis eſt iteſtinoꝝ vacuitas
in qua ipa mā flatis: vt ſuperflua. qꝛ ex digōne ⁊ ciborum
malitia ⁊ regiminis in alijs aggregatur: cuius cōſideratione
eorū generatio in etatib⁹ oībus eſt cōmunis ⁊ in tempore
pportionali eſt magis in qua qui manet ⁊ cōſeruet̃ pre fri
giditate ⁊ circūuolutiōe iporum ab eius adherēte viſcoſi
tate ⁊ pre debilitate caloris ipoꝝ ibi manēs non regulata
corrumpit̃ ⁊ putreſcit: ⁊ ſic calorē accendit. qꝛ cū nequeat
eam cōſumere eius humiditatē reſoluit. ⁊ groſſum cōdē/
ſatuꝫ dimittit: nec rectificat ſic ignis materiā luti putridi
ſibi ſubiectā: quā ɔſumere negt rectificat ɔſumēdo humi
ditatē: vel minuēdo: ⁊ groſſum relinquēdo lapideum: ſic
ipam rectificat cōdēſando: ⁊ cū iſluētia ɔſtellationis coo/
perāte nā corporis formā ⁊ figurā vermiū iprimit in illaꝫ
ad hūc finē vt materiā putreſcibilē in id qō minus maluꝫ
eſt ɔuertat: ⁊ reſiduū putredinis naturalr̃ in iteſtinis ag/
gregāde ɔſum āt ſe paſcēdo ex illa: cuius caloris ɔſidera/
tione: vt diſponētis ipi efficiēti cauſe. dixit hyppo. in affo.
Eos maxime in ſeniorib⁹. i. in pcedētibus vltra etatē dē/
ciuꝫ plātatiuā generari. Ex qbus iā cauſa efficiēs nota eſt
Et eſt triplex. diſponēs. vt eſt calor putredinalis. operans
vt nā. perficiēs: vt ſupercceleſtis iſluētia: put Ariſt. dixit.
ſic. n. eſt videre in aialib⁹ exterioribus mūdi: que nō gene
rant̃ ex ſemine: vt ſunt muſce: ſcarabones qui ex ſtercore
bouis: ⁊ veſpe: que ex carnib⁹ generant̃ equoꝝ corruptis
cū. n. calefiūt a calore ſolari in ipas agēte: ⁊ nequeat ipſas
cōſumere depurant̃ ⁊ cōdēſant̃ in vnū: ⁊ nā ſupercceleſtis
corporis. ſ. cōſtellatio formā ⁊ figurā taliū vermiū diuer/
ſoruꝫ ſcdm diuerſitatē materie ⁊ aptitudinis ei⁹ ad eos i/
primit. vnde Ax. dixit ppter melius: q̄. n. ex putrida tali
materia generent̃ tales vermes ſiue talia aialia meli⁹ ē q̄ꝫ
dimittat̃ ſcdm ſuā putredineꝫ purā: ⁊ vt reſiduū ei⁹ ⁊ alie
cōgregāde putredines ɔſumant̃ ſumpte ⁊ conuerſe in nu
trimētū eoꝝ exiſtentes in aere terra ⁊ aquis multiſqꝫ mo
dis nocine hoībus meli⁹ eſt q̄ꝫ pmaneāt ſic. ¶ Sed cōtra
hoc eſt qō ſequit̃: nā. n. ſi qō melius eſt agit ⁊ minus malū
aget: ſed minus malū eſt q̄ tale flegma putrefactū in ɔca
uo iteſtinoꝝ remaneat que ſunt vt dictū eſt deputata col
lectioni putredinis: ⁊ expulſioni ipſius: colera ru. coadiu/
uāte. ⁊ ex ordinatiōe nature iſuſa in ea ad illud: q̄ꝫ q̄ talia
vermiū genera pcreent̃: ⁊ cū ſuperius dictū ſit q̄ pluriuꝫ
⁊ horrēdoꝝ accntiū freq̄nter ſint cauſa ⁊ mortis: q̄ eqdē
nō ſunt cū in q̄ꝫtitate fuerint moderata: tūc. n. ſolum iuua
mētū qō poſitū eſt faciūt abſqꝫ nocumēto vt ſupra ī ano
thomia iteſtinoꝝ eſt dictū. Sed ſi q̄ꝫtitate ſupfluant cōti
nua vel diſcreta accidētia iducēt plura: ⁊ ēt mortē frequē
ter vt ſtati dicet̃. Nec obſtat q̄ ibi dictū eſt q̄ colera ite/
ſtina habeat expurgare. qꝛ illud eſt nō ſemp: ⁊ tūc quādo
generant̃ ipi: cum tūc occultet̃ colera ⁊ fl̃a abūdet in eis
quo ēt potius obſtruit̃ mittēs colerā ad iteſtina. Et ex acci
dētib⁹ eoꝝ horrēdis eſt qō eſt. qꝛ in loco in quo generant̃
ipi cū tūc occultet̃ cola. ſ. in iteſtinis faciūt accidere coli/
cā ⁊ yliacā: vt ſupra dictū eſt. ſic locū generatiōis eoꝝ nu/
trimēti ⁊ augmēti ɔſeruatiōis pncipalr̃ pūgēdo cōtra nāꝫ
offendūt: ⁊ tūc maxime cū fe. aderit: cū. n. ɔſumat eorum
materiā nutrimenti iſlāmet eos: ⁊ colerā ſuper eos effun
dat ad furiā ⁊ motū in querēdo cibū icitat: ⁊ circūuoluti i
iteſtinis ⁊ acuiliter pungāt: ⁊ quādoqꝫ pfundius tēdunt
fugiēdo: donec iteſtina mirach vētris perforēt: ⁊ cuteꝫ vt
exeāt inde ſicut multi dixerūt: lꝫ ſit raro ⁊ icredibile: ⁊ cō
ſequēter ſubrapiēdo cibū: fames generat̃ canina: ⁊ quan/
doqꝫ boliſmus ⁊ caſus virtutis oris ſtōi ppter aſcēſuꝫ eo/
rū ad ipm: ⁊ tūc quādoqꝫ vomitu expellunt̃ qō eſt abho/
minabile valde: ⁊ quādoqꝫ ifrigidant̃ extrema: ⁊ quādo/
qꝫ per cōpaſſioneꝫ: ⁊ pp vtraſqꝫ diſpōnes pdictas: tremor
cordis magn⁹. Et pp eleuatōeꝫ fumoꝝ ad caput generat̃
ex eis epilepſia ⁊ ſtupor que maxime in hora cōmotionis
iſurgūt: que eſt de ſero: ⁊ hora ſomni: tūc. n. q̄rēdo cibū ſto
macū aſcēdūt: ⁊ ſupiora: ⁊ ſic talia accidētia cauſant. quo/
rum generꝫ diuerſitas a diuerſitate cauſe mālis ⁊ localis

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0335-0
DFG

ꝓcedit.mã.n.ipoꝝ flegmatica aut eſt viſcoſa valde iſepa/
rabilis aut parũ aut mediocriter aut pͥma exiſtẽte in ſupe
riorib⁹ iteſtinis.ſ. gracilib⁹ ſeu ileon ⁊ ieiuno: qñq; gñant
lõgiſſimi dicti cucurbitini ex ea q̃ ẽ paꝝ viſcoſa adherẽte
recto ⁊ fecib⁹ corruptis ⁊ ſchibalatis cõmixta gñant rotũ
di aſcarides ſubtiles ⁊ parui.ex media gñant lũbrici õ gñe
lõgoꝝ exiſtẽtes.q2 qñq; ſcõ3 palmum vel cubitũ ꝓlõgati
apparẽt i medijs iteſtinis.ſ. colon ⁊ orbo. Et eoꝝ deterio/
res ſũt lati alijs lõgiores cũ ex mã putrida vehemẽtioris
adherẽtie gñent. Et i loco ſupiorib⁹ pͥncipalib⁹ ſituentur
magis ꝓpiquo.Et min⁹ nociui ſunt parui aſcarides ⁊ ſub/
tiles ad modũ ariſte:cũ a ſupiorib⁹ pͥncipalib⁹ ſint magis
remoti ꝓpinqui ano: vt facili⁹ expellant:l3 ex mã magna
corrupta. Quapp ſi dimittant diuti⁹: vt augmẽtent ⁊ aſcẽ
dãt ſuperi⁹ magis fiẽt nociui cu3 ex magis putrida mã ꝓ/
creent.Sed lũbrici medij ſunt i malitia: ⁊ cũ diu retineã/
tur oẽs febꝛẽ p eoꝝ corruptõe accẽdũt ⁊ augẽt. Et vmes
gdẽ ſua hñt iudicia.Cũ.n.exeũt añq; morbidi fiãt.vel cũ
i febrib⁹ acutis exeũt vermes viui ſignificant virtutis ex/
pulſiue potẽtiã: ⁊ ẽ ſignũ bonũ.cũ vo mortui malũ:qm̃ ibi
multã caliditatẽ mortificãtẽ eos demrant. Et ſi gdẽ puri
exeãt mali ſũt:cũ mãe putrefacte iobediẽtis multiplica/
tionẽ oſtẽdãt.S3 cũ fuerint pmixti fecib⁹ boni ſũt: ⁊ ꝓpe
cũ in declinatiõe emittant vel fine ſtat⁹ nõ i tpib⁹ pͥcunti
bus morbi. Uñ hyp.ingt bonũ ẽ ſi lũbricos admixtos ha
buit.ſ.ſterc⁹ iteſtinis ſtõ ⁊ corpi mãifeſtãt a quo ſtõ ſi või/
tu exeãt: horribil' ẽ ⁊ malus.cũ malos hũores i ſtõ eẽ portẽ
dat:ſi gñent ibidẽ vl' ſi cã q̃redi cibũ aſcẽdãt nã3 ipotẽtẽ
repellere eos demrent.Signa vermiũ q̃dã ſũt cõia oĩ eo
rũ gñi: q̃dã ſũt vnicuiq; ꝓpria.Cõium aũt q̃dã ſunt ſigna
ſũpta ex his q̃ ſequunt accñtib⁹ imediate ipos gñatos: vt
ẽ mordicatio pũctio iteſtinoꝝ ⁊ grauitas percepta: ⁊ ꝯmo
tio q̃ imediate eos gñatos ſequunt: vt dictũ ẽ.veꝝ nõ ſũt
certa ex eo ꝙ talia ex hũoribus colericis ibi retentis fieri
pñt: vt ſupra de dolore inteſtinoꝝ eſt dictu3. Quedã ſunt
ſumpta ex his que mediate ſequunt cũ nocumentũ eorũ
extẽdit ad ſuperiora mẽbra.ſ.ſtomacũ cor ⁊ cerebru3. Et
illa ſunt q̃ dicta ſũt ſupra. Ex quib⁹ ſunt ꝙ ſtridẽt dẽtes ⁊
abſtergũt labia ſp. Et cũ dormiunt accidit eis maſticatio
hñs viciſſitudines ex eo ꝙ cor reſtio eorũ illa hora cõmo
uet imaginatiuã q̃ iperat motiue vt moueat genas ad ma
ſticãdũ: ac ſi comederet ſili mõ. Et hec min⁹ ſũt certa cu3
ex alijs cãis poſſint accidere q̃ ſũt note. Quedã ſũt talia ſi
gna ex ãtecedẽtib⁹ ipoꝝ gñationẽ ſũpta. ⁊ talia ſunt: qm̃ p/
ceſſerit paucitas ⁊ corruptio digõnis guloſitas ⁊ appetit⁹
multus. ⁊ aſſiduatio ciboꝝ flẽcorũ ⁊ corruptibiliũ hñtiu3
gñare ipos ꝓpꝛie: vt lac caſeus ⁊ frumẽtũ: ⁊ ſilia. Et hec ẽt
nõ ſunt necẽaria: nõ.n.neceſſariũ eſt ꝙ ex predictis lũbrici
gñent: ⁊ vermes. Alia vo ſunt ex eẽntialib⁹ ſũpta q̃ cõco/
mitãtia dici pñt vt ſũt ipoꝝ eũo ⁊ apitio exit⁹ eoꝝ p vomi
mitũ vl' ſeceſſu3. veꝝ tñ eoꝝ eũo nõ ẽ ſp: ſ3 cũ ia3. q̃ſi victi
ſũt a nã: vt cretice vel ſinthomatice expellant: q̃re o3 alia
certiora q̃rere: gbus a pͥncipio cognoſcant. ⁊ certe vel pͥdi
cta certificare. Certificant aũt ſi oĩa ſimul ꝯiungant: vel
ſaltẽ fiẽt vnitati magis ꝓpiqua. ipoſſibilis.n.ẽ certa iterio
rũ quorũdã cognitio: vt. G. ait: ſ3 cõiectural' polis. Cũ ergo
ꝯſideraueris ꝙ eſce faciẽtes ad eoꝝ gñationẽ pceſſerunt
⁊ ãtia: ⁊ ſequẽtia ſenſeris accidẽtia q̃ ſũt dcã eos cõiectu
rabis adeẽ. Et cũ i exeũtib⁹ apparebũt vermes p vomitũ
vl' ſeceſſu3 eoꝝ certificabis cognitiõe3. Hec.n.ẽ doctrina
medicoꝝ pͥncipis. G. ſeruãda i dictis ⁊ dicẽdis oĩb⁹ cauſis
⁊ egritudinib⁹ cognoſcẽdis occultis. quoꝝ ſigna nõ ſũt iſe
parabilia nõ pdurãtia: neq; certa p ſe ipa diſticta. Signo/
rũ vo ꝓprioꝝ: q̃dam ſũt lõgis ꝓpria magis vt ſunt cõmo/
tio oris ſtõi mordicatio ipi⁹ cũ pũctiõe ⁊ grauedine: ⁊ hũo
re ibi pcepto: qñq; caſus appetit⁹ ⁊ difficultas trãſglutio/
nis nocumẽtũ ex cibo ⁊ lubricitas: ⁊ flux⁹ ſaliue: ⁊ qñq; no
cent pulmoni ⁊ cordi pp vicinitatẽ ſuã: vñ accid t tuſſis: ⁊
tremor cordis: ⁊ diuerſitas pulſus: ⁊ ſomn⁹ ⁊ exiccatio nõ
ſ3 ordinẽ: ⁊ cũ pigritia: ⁊ accidit prurit⁹ ⁊ ituit⁹: ⁊ palpitatõ
⁊ aptio oculoꝝ cũ decliatiõe ad clauſionẽ: ⁊ accidit eis vt
nũc rubeãt: nũc vo obfuſcent: ⁊ qñq; tẽdunt eoꝝ vẽtres:
⁊ fiũt idropici: ⁊ qñq; ſupuenit flux⁹ vẽtris: cũ lũbricis vo
⁊ rotũdis appetit⁹ ſcõm pl'imũ multiplicat: qm̃ elõgãtur
a ſtõ: q̃re nõ nocẽt ipi. Et rapiũt cibũ: ⁊ cõmouent i tpe fa
mis motu forti nocẽte ⁊ debilitãte vtutẽ. Et ſũt cũ pũctio
ne ⁊ grauedine icidẽte i eo qð ſequit vmbilicũ. Paruos
aũt ſignificãt prurit⁹ ani: ⁊ iſeparabilitas cõmotiõis apud
ip3. Et iuenit habẽs eos grauitatẽ ſub hipocũdrijs ſuis ⁊
dorſo. Et exit⁹ vniuſcuiuſq; generis rectificat cognitiõe3
cuiuſq;. Cura vermiũ ẽ q̃tuor res. pͥma ẽ regimẽ. Si.n.cã
pͥma generationis ipoꝝ eſt malitia regimis i cibis ⁊ i poti
b⁹ ⁊ i alijs diminuẽdo ⁊ corrũpẽdo digõnẽ mlt'iplicãs fla
qð ẽ groſſu3: frigidũ hũidũ ⁊ viſcoſu3. ergo ſi cura ordina/
ta ẽ ꝙ pͥus oporteat cãm abſcindere: pͥmũ erit i cura regi/
mẽ emẽdare. Scða ẽ ipoꝝ iterfectio: vt facile educantur
niſi.n.iterficiant eũoni nõ obediẽt: viui.n. tenent i iteſti/
nis. ⁊ adherẽt ſcõm diſpoſitione3 cui⁹ diſſolutio ẽ difficil'.
tertia ẽ eoꝝ eũo: ſi neq; eos mortuos: neq; viuos nã expel
lat: nõ.n.o3 vt eoꝝ ꝓlõget ſtatio i vẽtre poſt mortẽ ne iſe
rat vapor eorũ nocumẽtũ venenoſu3 pͥncipalib⁹ mẽbris.
q̃rta ẽ accidẽtiũ correctio. ¶ Primã rẽ ꝯplet rectificatio
regimis i cibis ⁊ potib⁹ ſũptis ſcõm ꝯrietatẽ eſce. ⁊ put di
geſtioni cõplẽdo o3 vt ſint cibi ſubtiles facil' digõnis ⁊ bo
ni chimi: q nõ corrũpant calidi ⁊ ſicci: nec viſcoſi: imo ſit i
eis abſterſio q̃ educant: ⁊ iterficiẽtes nã vel ꝓprietate: vl'
ſint ex iterficiẽtib⁹ ⁊ abſterſiuis: vel eis admixti: q̃les ſũt
aq̃ ciceꝝ ⁊ cicera comeſta iſuſa i aceto poſtq; abſtinuerũt
p mediũ diẽ: folia cauliũ oliue ſalite ante cibũ cũ ruta co
meſte: panes furfuracei cũ carui cõfecti aniſo: vl' feniculo
vel cimino: carnes colũboꝝ: paſſeꝝ. ⁊ aliaꝝ cũ decoctiõe
mẽte: vl' ſalſamẽto facto ex ea pane aſſo: ⁊ aceto forti ⁊ po
tus aque ſalſe ſimplicis vel cõmixte vino auſtero: vl' forti
aceto: vel aq̃ dulcis cũ cimino i ea decocto aniſo vel feni/
culo: vl' gramie ⁊ alijs. ſit ordinatio ꝯgruẽs ꝯfortatiõi di/
gõnis ⁊ pfectiõis ipi⁹. put ſupra i cura ſtõi dcm̃ ẽ. ¶ Se/
cũdã rẽ ꝯplẽt medicie iterficiẽtes vermes: quaꝝ q̃dã ſũt
cões oĩb⁹ generib⁹: q̃dã ſũt ꝓpꝛie. Et cõiu3 q̃dã ſũt ſimpli
ces: q̃dã ꝯpoſite. Et ex ſimplicib⁹ q̃dã ſũt calide: q̃dã fride
q̃dã ꝓpꝛie. Cões oĩb⁹ ſimplices. ⁊ cal'e ſũt pueniẽtes ad
gradum tertium niſi ſit cum eis feb. vel apoſtema: ⁊ ſunt
amari ſaporis acuti: ⁊ contrariantes qualitate ⁊ ſapore il/
lis que magis diligũt ipſi que ſunt dulcia ⁊ vnctuoſa: qua/
lia ſunt macis in multo vſu nux indica antiquata ⁊ come
ſta naſturcium ⁊ ſemen apij ſunt ambe fortes in interfi/
ciendo omnem vermem: ⁊ ſiſimbriũ: aſſe: charui: cappar.
aqua lupinorum: ⁊ ipſi amari: calcantu3. 3.i. cũ melle ſum
ptum. Ziniar: lactuca aſini: ⁊ nigella. ⁊ ſi ſuper ſumen vn/
gat radix enule exiccata: ⁊ ſumpta auri. ij. perſica ⁊ folia
eorum emplaſtrata ſumini: ⁊ oleum eorum: ⁊ menta pe/
troleon cauſa licinio imixtum: ⁊ proprie aſcaridibus. Fa
rach cum ſyrupo de melle myrra decocta in oleo bibitur
ad omnes. Calamentum ſilueſtre: kitran ⁊ coſtus cum po
nuntur in cliſteri ſcea: radix cameleon interficit vermes:
⁊ proprie albi: praſſium: cordumemi: grana ademeſte.
Et credo ꝙ ſunt grana: que non eſt diu ꝙ habita ſunt in
vſu: aniſum: feniculum: ciminum aſſatum: camepitheos:
pulegium: origanum: abrotanum: ſicut abſinthium. De
medicine interficiunt omnes acuitate: ⁊ ſua qualitate ⁊
amaritudine: ⁊ a proprietate longos: ⁊ aſcarides alique
ex eis: vtputa polium: aleum proprie chitran miniſtratu3
in cliſteribus ⁊ epithimatum: coſtus amarus: ⁊ lancis mi/

rabilis eſt. aſiniar. ⁊ ſuccus perſici. Communes ſimpli-
ces frigide ⁊ pauce caliditatis interficientes ſunt ſemen
coriandri bibitū tribus dieb⁹ cū rob: ⁊ lac acetoſum cū ſe-
mine apij bibitū vel ſirupo acetoſo. ⁊ ꝯcoctio fauſel. ⁊ ſpi-
na egiptiaca: ⁊ ſūt abſq; ꝑlima caliditate: ⁊ ſemen atriplicis
cortex radicis mori ⁊ rubus ⁊ ꝯcoctio arboꝝ granati ace-
toſi ⁊ muci ⁊ aqua decoctiōis radicū ei⁹ ⁊ ſucc⁹ arnogloſe
aut ipa ſicca ⁊ ſumach diſſolutū in aqua eſt mirabile ſi cū
eis ſit flux⁹: ⁊ hypogſtidos: ⁊ lutū ſigillatū cū vino eſt mi-
rabile vel indicū vt dicit̄: ⁊ eſt magis mirabile ſemen por-
tulace cū multū ſumit̄ in īterficiendo vermes. Endiuia
amara tribuli vermicularis mirtus ⁊ apiū aceto cōditū
⁊ acetū ipm in hora ſomni ſm aliquā ſui ꝗtitatē ſtatim
eſt ꝯueniēs: q̄ eni ſunt nō q̄litatis ⁊ ſaporis excedentis a
ꝓprietate ſunt īterficiētes illos cum nō illud agāt a quali
tate. Et alique ex ipſis frigidis ſūt īterficiētes latos vt eſt
feratura ſalicis coriādrū: endiuia amara cū bibit̄ cum la-
cte acetoſo aut ſirupo acetoſo: aut aq̄ calida. Cōpoſite ve-
ro īterficiētes oēs ſunt ſicut tiriaca magna ⁊ cōfectio de
bētonica. he ſūt medicine q̄bus te opꝫ īterficere vermes.
Sed in eaꝝ admiſtratione oꝫ te attēdere eaꝝ ſpēm potē-
tiā ſeu virtutē tps locū ⁊ modū. Spēꝫ vt ꝓprias ꝓut dem
eſt admiſtres. Potentiā ſeu v̄tutē vt in cadēdo aſcarides
ex eis eligas fortiores: in lumbricis ⁊ rotundis ⁊ latis for-
tes: in lōgis debiliores. ⁊ maxie cū ſint ex his q̄ bibunt̄ a q̄
bus remotiores ſūt aſcarides: deide lumbrici: lati ⁊ longi
ſunt ꝓpingores. Temp⁹ vt admiſtres illa vacuitatis tē-
pore: medicie eni tunc nullo mō īpediunt̄ ad eos ꝑuenire
⁊ ipſi fameſcētes magis trahunt̄ ad ipſas. Locū vt inte-
rius approximāda: approximes: nō approximanda dene-
ges ne maius nocumētū adducas: ſed poti⁹ exteri⁹ admi-
niſtres: ⁊ ꝓprie vmbilico ⁊ īfra: vbi ſūt groſſa īteſtina in q̄
bus gn̄ant̄. ⁊ ꝓpē monoculus ſupra. n. applicata ſtō nocēt
ꝑlima. Et aliqui applicāt ſup ilia ⁊ renes illa: imo cū ite-
rius miſtrabis tales medicīas īterficiētes: ⁊ ꝓprie calīas:
tūc opꝫ vt ſtringant̄ nares: ne aliq̄d ex vapore eaꝝ malo
ꝑueniat ad caput: ⁊ multiplicetur expiratio ne aliq̄d ex eo
ꝑueniat ad cor: q̄re oꝫ vt os teneat̄ apertū. Et ēt meli⁹ eſt
vt tūc liniatis ſtōm cū ſtipticis ꝯfortātib⁹ ne ledat̄ ab ea-
rū malitia. Et ſint ex īterficiētib⁹ q̄lia ſūt ſumach hypog-
ſtidos ⁊ acatia diſſoluta in vino ⁊ in lōgis ꝓprie per ebibi-
ta ⁊ quouis mō meliori ſumpta dūmō ſint ſupioꝛib⁹ min⁹
nociua ī aſcaridib⁹ cliſterib⁹ vel colirijs īmiſſa ī lūbricis ⁊
medijs per vtraſq;: ⁊ in oīb⁹ per extrīſecus applicata: ſm
oēm modū empl̄i. ſ. epithimatis cataplaſmatis ⁊ vnguētī.
¶ Modus vt ꝑmittas eis delectabilia. ſ. dulcia ⁊ vnctuo-
ſa q̄ ſūt eis vt eſca ad quā currāt. ⁊ hoc per horas diei vnā
vel duas: deide medicinas īterficiētes: ⁊ ꝓprias illis ſub-
iungas vel vtraq; ſil' miſceas: cū. n. currūt ad eſcā īueniēt
īuoluta venena q̄b⁹ occidunt̄ ſic piſces ī ꝓprijs eſcis amis
q̄bus capiunt̄. ⁊ hoc ſiue īteri⁹ approximes: ſiue exteri⁹. ⁊
per oēꝫ modū illud agas. ¶ Tertiā rē cōplent medicine
ventrē ſoluētes ſolōne eos educētes: quaꝝ q̄dā ſūt diſpo-
nentes q̄dā cōplentes. Et diſponētes ſūt duplices: q̄dā oc-
cidentes vt ꝑdictū eſt: q̄daꝫ īferius ad loca ꝓpinq̄ ficteri
puta īteſtinis īferioribus illos trahētes q̄lia ſunt dulcia ⁊
vnctuoſa: vt mel: lac. ⁊ ſimilia: cliſterib⁹ īmiſſa vel colirijs
ſuppoſita vel peritinconi ano: ⁊ alijs partib⁹ ei adiacētib⁹
īiuncta trahentia illos q̄ adiuuāt: amara acuta ſalſa ⁊ ace-
toſa ilion fugātia per os ſūpta ⁊ ſupra ſtōm. ⁊ vmbilicū ap-
proximata. Et eductionē cōplētes: q̄dā ſunt tātū educen-
tes: q̄dā īterficiētes. Et educētes q̄ educūt tātū ſunt ille q̄
nō īterficiunt: ſed delectāt: vt lac mel. ⁊ aqua mellis. ⁊ ſi-
miles ſimplices vel mixte ī ſuppoſitorijs īmiſſe ⁊ ficteri ī-
uncte ſic baurach: ⁊ bebuli: ⁊ yſopus ſicca q̄ ſoluunt fl̄a: ver-
mes ⁊ aſcarides: ſemē coriādri cū rob: educit ſerpētes: ve-
rum extrahit vermes ⁊ aſcarides. origanū ēt polipodiuꝫ.
Et tales ſunt ꝓprie habētes locū in ſuperioꝛib⁹ ⁊ medijs:
nō in īferioꝛib⁹ vt ſunt aſcarides ſubtiles ⁊ miuti: q̄b⁹ me-
liores ſunt īterficiētes: ⁊ ſoluēdo educentes mō īfra dicto
approximate: q̄ꝝ quedā ſunt ſimplices: ⁊ q̄dā cōpoſite. Et
ſimplices ſunt collogntida fel tauri abſinthiū epithimuꝫ
cartamus aleū: centaurea: nigella: ⁊ ſemē atriplicis. So-
lutiōe educētes oēs ⁊ mortificatōe: ⁊ breuiter oēs ſolutie
medicine: quas in antidotario nr̄o ſtatim diximus: ⁊ ma-
xime laborioſe educētes. Sꝫ melior eſt aloes omnib⁹: q̄m
mortificādo educit oēs: ⁊ oleuꝫ bibitū in ꝗtitate īterficit
cū ſua amaritudine ⁊ viſcoſitate educit. Et oleū onfacinū
latos īterficit ſua amaritudie ⁊ educit ſua viſcoſitate: q̄re
ſi nō pōt ml̄tū ſemel bibi: bibat̄ ter. Et grana nil īterficiūt
ſerpētes: ⁊ extrahūt eos. ¶ Cōpoſite ſunt ierapigra: etiā ſi
ſumat̄ ſcea ⁊ abſinthij. an̄. ℈. iiij. pulpe collogntide. ʒ. ij. ⁊
q̄rta. ſalis īdi danich. i. ⁊ ſumat̄ in potu cū aq̄ mellis. Et ni-
trum: ⁊ ciminū: ⁊ fenugrecū. an̄. aur. ij. Iteꝫ nitri piperis
cordumeni. an̄. partes eq̄les cuius doſis ſit vſq; ad. ʒ. i. ſ.
¶ Itē ciminū indū maſtix: grana lauri. an̄. cōficiant̄ cum
melle: ⁊ ſit doſis in mane coclear. i. ⁊ tantundē in ſero. Et
q̄nq; addit̄ enula. ⁊ pillule de abſinthio educūt lōgos. Et
alie q̄ ſunt cōpoſite ex ꝑdictis ſm diuerſas ītentiōes eligē-
dis nō ſolum īterius per ſub ⁊ ſupra: ſed ēt exterius ſcōm
oēm modum approximāde. Modus aūt ⁊ regimē aſca-
ridū ⁊ paruoꝝ ē vt īterficiant̄ ⁊ educant̄ cū ſuppoſitorijs
ex ꝑdictis: ⁊ ſale: ⁊ cliſteribus ex aqua calida: q̄ eradicant
māꝫ coꝝ. Et fortius eſt in quo recipit̄ cētaurea: cartam⁹
yſopus ſicca pulpa collogntide ⁊ baurach. Et forti⁹ illo eſt
coliriū alchitrā. ⁊ cliſtere cū eo ⁊ petroleo ⁊ ꝓpē cūꝫ oleo
ꝺ criſomilijs: aut medullis pſicoꝝ amaroꝝ ⁊ archanita vl'
buchomarien ⁊ cortex radicis aſce. Et ex eis que colligūt
ipſos in ano eſt caro piguis ſolida ⁊ lardū: ſit aūt ligatū cū
fimbria fili: vt poſt horā cūꝫ fuerint collecti extrahant̄ ⁊
īteret̄ donec mūdificent̄. ¶ Quartā rē cōplet medicine
diuerſe ſm diuerſitatē accidētiū cōcomitātiū ex q̄bus eſt
fe. q̄re opꝫ vt admiſtres frigida: ex q̄b⁹ ſunt ſemē portula-
ce ītus: ⁊ granata vermicularis extra ⁊ acetū ītus ⁊ extra:
⁊ ſil'r coriandrū atriplex. ⁊ ſilia: nō calīas niſi moderate ca-
lidas vel frigidas ex cibis ⁊ potib⁹ ꝓut exigit diſpō: ⁊ cūꝫ
debilitat fluxus vētris neceſſaria ſūt q̄ nutriūt cū fortitu-
dine. vt eſt aqua carnis: ⁊ carnes: ⁊ alia q̄ ſunt boni chimi
⁊ velocis digōnis: ⁊ maxime in paruis: nam virtus eorum
per ſe in cauſa operationis nō peruenit ad eos omnino. Et
ſi ſunt boni chimi: minoratur chimus corruptus: q̄ eſt ma-
teria eorum: quare indigent etiam eis ⁊ vermes. cum eni
fluxus minuat vel auferat nutrimentum mordicant acri-
ter ſtomacum: ⁊ faciunt magis cadere virtutem: quare ci-
bentur ante motum eorum hora quietis ⁊ ſomni. Et ſepa-
ret̄ cibus eorum vt ſit paucus ⁊ permixtus aliq̄bus ex in-
terficientibus ſtipticis ⁊ cōfortantibus. Ex quibus ꝓprie
eſt ſumach: ⁊ mirtus ⁊ coriandrū. ⁊ ſimilia q̄ ſtringunt cō-
fortant ſtōm ⁊ excitant appetituꝫ: qui ſi timetur ne cadat
cōfortabis ſtomacū cum epithimatibus ⁊ emplaſtris in q̄
bus eſt ſtipticitas: ⁊ interfectio ⁊ eductio ſuauis non deici-
ens virtutem: ⁊ confortatio ⁊ ereptio appetitus. Et ꝓpriū
eſt q̄d fit ex aloe ⁊ abſinthio. Et pillule facte ex eis cū ſuc-
co citonioꝝ vel mēte. ¶ Medicinas ꝯpoſitas ad eos ali-
q̄s ſupra in cura egritudinum cordis diximus. Et nūc ad-
demus alias expertas. Ex quibus eſt. Recipe folioꝝ per-
ſici granorum lupinorum abſinthij. ana. M. ij. tere groſ-
ſiter ⁊ fac bullire in aqua ⁊ aceto. ana. partes equales. Et
ſuper vmbilicum ⁊ renes cum faſſia liga: ſtatim educit vi-
uos vel mortuos expertū eſt. ¶ Itē Recipe ſucci mente
panis aſſi aceti fortiſſimi. an̄. partes equales ⁊ miſce ī mo-
dum ſalſamenti de quo dabis an̄ cibū ⁊ ligabis in pulſib⁹

brachioꝝ ꝓbatū eſt: ⁊ ſi odoreꝫ etiā. Jtē grana vermiū:
q̄ ſunt grana cētonice de rōania fricata ⁊ exhibita cū çuc.
vel melle ro. omni etate ſunt experta: ⁊ omni diſpōni: ⁊ in
cauſone cū granis aranciorum. ❡ Jtem acetū fortiſſimū
hauſtū de ſero cū vadit dormitū eſt expertū. Jtē centau-
rea decocta in oleo de perſicis ⁊ iuncta ſup ṽmbilicuꝫ ex-
perta eſt. ❡ Emplin Archidia. Cōfortās ſtōm īterficiens
⁊ expellēs lumbricos ⁊ valet ad fluxum. ℞. abſinthy mē-
te ſicce: roſaꝝ cū ſtipitibꝰ cētonice. aā. ℥. i. farine lupinorū
℥. i. panis aſſi īfuſi in aceto forti. ℥. ſ. fellis tauri. ℥. iy. aloes
℥. ſ. cornu ceruini vſti. ℥. iiy. ſpice macis gallie muſ. gar. ca
lami aro. macis nucis muſ. galāge karui. aā. ℥. i. ſ. hypoqui
ſtidos acatie ſūach berber. aā. ℥. tertiā. Cōfice cū oľo mir-
tino ſucco mēte ⁊ cera qd̄ ſuffic̄. Jtē vngat̄ vēter de mel-
le ſi ſine fe. fuerit vel de lacte ſi fuerit cū fe. ⁊ poſt horam
pulueriça deſuper puluerē aloes cabalini mirabilr̄ īterfi-
cit. ❡ Jtē fiat embroca ſup ſtōm ⁊ vētrem ꝯtra lybricos.
℞. panē aſſum in aceto forti bn̄ mollificatuꝫ ⁊ exp̄me per
peciam. ⁊ cū liquore miſce ſuccū abſinthy ſiſimbry orten
ſis: ſucci folioꝝ pſici pſicarie ⁊ vniuſcuiuſq̄ꝫ mēte ⁊ maru
by cū oleo modico ⁊ aceto. Et oīa ponant̄ ī olla vna: ⁊ fac
bullire. poſtea aſperge puluerē aloes cabalini ⁊ collognti-
de. aā. ℥. y. fell' tauri. ℥. i. Et peciā īfuſaꝫ in eo tepidā ſupra
ventrem appone: ⁊ adde puluerē lupinoꝝ. Adde cingulū
g ex lōgioribus vermibꝰ cātur cura ex īuentiōe antiquo-
rum medicoꝝ efficax eſt. ℞. granorū piperis. ℥ o o. ⁊. y. ra-
dices rapiſte: ⁊ duas radices antiq̄ fabe lupine maioris ⁊
radices granati acetoſi. tere ⁊ coq̄ cū. v. ciatis albi vini do
nec tertia pars remaneat de quo vino det̄ ad mēſurā triū
digitoꝝ: ⁊ in tertia vice emittet totū. ❡ Pillule ad īterfi-
ciēdū ſingultū: ⁊ omnes vermes. ℞. ſuccū affodili: ⁊ ſuccū
abſinthy: ⁊ centonice ⁊ ſiſimbry fabe lupie. aā. ⁊ decoq̄n-
tur: donec īſpiſſent̄ aliquātuluꝫ: ⁊ addito aloe fiāt pillule
⁊ dent̄. iy. vel. v. mire op̄ant̄. ❡ Puluis ad idē. ℞. cornu
ceruini vſti: cētauree: mēte: pulegy: ſiſimbry abſinthy cē-
tōice: lupioꝝ amaroꝝ. aā. ℥. iy. ſ. vtat̄ hoc puluere cū lacte
vľ aceto: vel vino calido vel quocūq̄ꝫ modo accipere pōt.
❡ Electuariū ad lumbricos oēs ſm̄ Nicolaum ⁊c̄.

❡ Capitulum tertium de fluxu ventris omnium mo-
dorum: ⁊ curis eius.

f Luxus ventris ſm̄. H. generalr̄ eſt accn̄s excun-
tis mālis a corpore per īteſtia. Spāliter aūt ē mo-
tus nāe ſeu v̄tutis expulſiue īteſtinoꝝ ad expellē
dum nocētia ſaltē ſibi. Diuidit̄ aūt ⁊ ſpecificat̄ qncupli-
citer ſm̄ qnq̄ꝫ genera cārum quas. H. ponit cōia oibꝰ ſine
quoꝝ cognitiōe cuiuſq̄ꝫ ſcia nō habet̄ vt ponit Abo. q̄. ſ. in
hac notificatiōe tāgunt̄. ſ. formalis cū dicit eſt motꝰ. Effi
cientis cū dicit nāe ſeu v̄tutis expulſiue mālis ſubiectiue
ſiue īſtralis cū dicit īteſtinoꝝ. Finalis cū dicit ad expellē
dum. Et mālis obiectiue cum dicit nocētia. Et ex parte q̄-
dem cāe formalis: q̄ꝛ aut eſt tēperatus ⁊ ſuauis. q̄ꝛ reple-
tioni ꝓportionat̄ ⁊ virtuti aut eſt difficilis diminutus vel
ſupfluus. De cura cuiꝰ hic ītendimꝰ ſpāliter. Ex pte cauſe
mālis ſubiectiue ſiue īſtralis. aut. n. eſt ab īteſtinis. q̄ꝛ ī eis
mā ſit aggregata paulatiꝫ: ⁊ eſt multiplr̄: q̄ꝛ aut lubricitas
⁊ dicit̄ lubricitas īteſtinoꝝ aut diſſentericus ⁊ eſt triplicis
ſpēi ſeu gradus: vt hyp. dixit. Et eſt aut a ſupioribꝰ aut īfe
rioribus aut recto: ⁊ qn̄q̄ꝫ eſt ab ipſo qn̄q̄ꝫ ab extremitate
eius ⁊ ficteri aut eſt ab alys mēbris īfluentibꝰ mām illis.
Et hec aut eſt a cerebro: ⁊ vocat̄ fluxꝰ cerebralis aut a ſtō
⁊ vocat̄ lientericꝰ ſeu lubricitas ſtōi. aut eſt ab epate. ⁊ ci-
ſti fellis ⁊ vocat̄ fluxꝰ epaticꝰ. ⁊ eſt multiplr̄ vt īfra dicet̄
aut ꝓpter peccatū epis vel meſeraicarum abſq̄ꝫ īfluxiōe
māe ad illa ⁊ vocat̄ chiloſus: aut eſt a ſplene ⁊ vocat̄ ſple-
neticus ⁊ mľicꝰ. aut a toto corpore ⁊ eſt dyaria: ⁊ fluxꝰ liq̄-
factus vel ſanguineꝰ vel paſſio colerica. Ex parte v̄o cau-
ſe materialis obiectiue q̄ in fluxu expellit̄ ſic. nā aut ē ex-
terior corporea vt cibus ⁊ potus ⁊ medicia ⁊ cōprehendit̄
ſub lubricatiuo ⁊ ex eo eſt feculētus multi ſtercoris aut ī-
terior ⁊ corporea. ⁊ hec aut eſt ex cōtinentibꝰ vt mēbrum
pars mēbri ſeu fruſtum ⁊ pellicula: aut ex contentis. ⁊ hec
aut erit ex nālibus hūoribus puta ſanguie flegmate cole-
ra ⁊ melācolia ⁊ ab hūore ꝓprio gn̄aliter nūcupat̄. q̄ꝛ ſan-
guineus flꝰcus colericus: ⁊ mľicꝰ ⁊ ſpāliter a ſpē vnicuiuſ-
q̄ꝫ ipſiꝰ aut erit ex nō nālibus vt eſt fluxꝰ corruptis p̄redi-
ctis humoribꝰ. q̄ꝛ fetidus eruginoſus ſanioſus virulētus:
lotiuus. ſic̄ lotura carnis aquoſus feculētꝰ niger ſicut ſan-
guis: vel groſſi vini fex. ⁊ felleus niger ⁊ niger mľicꝰ ⁊ ſan-
guinis puri ⁊ diuerſoꝝ coloꝝ ⁊ ſunt ſpēs epatici. Et qn̄q̄ꝫ
eſt ex vermibus quotidie ⁊ freq̄nter expulſis ſicut accidit̄
īfantibꝰ q lacte nutriunt̄: ⁊ qn̄q̄ꝫ eſt ex lapidibus: licet ra-
ro. Et viſuꝫ eſt a pluribꝰ in vno colerico neapolitano: cuiꝰ
cognomē erat medicus. Et ſeruaui duos ex lapidibꝰ quos
emiſit cōtinue per menſem ꝑ virgā ⁊ anū ⁊ erant plures.
⁊ magni: ſed emiſſus per anū erat fere ſic̄ ouū. per virgam
ſicut nuclea: ⁊ cū melonū comeſtione liberatus finalr̄ ex-
titit. Ex parte efficiētis cāe dupliciter. ſ. nature ſeu v̄tutis
p̄ncipaliter operātis ⁊ aeris coadiuuātis: ⁊ ſimiliū: vt ven
ti balnei. ⁊ ſimiliuꝫ. p̄mo mō. ſ. ex pte v̄tutis aut expulſiue
p̄ncipalr̄ mouētis ipam ad expulſionē aut cōtentiue p̄nci
paliter deficiētis. ⁊ per ꝯſequēs expulſiue. p̄mo mō vt cū
erit a nā factus nāliter operante. vt q̄ꝛ p̄mo digeſſerit. dei
de diuiſit ⁊ finaliter expulſit ⁊ dr̄ creticꝰ. Scd̄o mō vt nō
naturaliter operāte a natura factus ⁊ vocat̄ ſinthomati-
cꝰ. Ex parte coadiuuantiū vt aeris ⁊ ſiſium: nā aut ſua ca
liditate erit diſſolutiuꝰ aut ſua frigiditate cōpreſſiuꝰ. Ex
parte aūt finalis. q̄ꝛ aut ad expellendū nociua: aut iuuati-
ua corpori: nociua tn̄ ſibi. Ex quaꝝ cōbinatione gn̄aleꝫ po
teſt recipere diuiſionē: nā aut erit fluxus laudabilis aut il
laudabilis. ⁊ hic eſt cā fluxus vētris generalis ⁊ cōmunis.
attribuit̄ aūt potiſſime: vt efficienti. cū enī in eo p̄reſtatiō
ſit materia. nitit̄ enī cā vniuſcuiuſq̄ꝫ ad debilitatē vel for-
titudinem ipſius vt dixit Abo. debilitas. ſ. cōtentiue ⁊ for
titudo expulſiue v̄tutis. talem habitudinē inter ſe habēt
he due virtutes diſpenſante nā: cū ſit cōe in coruꝫ ꝓprio
actu q̄ niſi vna cedat alteri vel deficiat reliq̄ ſuū nō exer
cebit actum. nec fortificabit̄ vt dixit. H. ſic eſt inquā in re
tentione q̄ nec cedat qeſcat vel deficiat cōtentiua nō reti
nebit. Si quoq̄ꝫ in expulſione: ⁊ fluxu niſi cedat vel defici
at cōtentiua expulſiua expellere ⁊ fortificari nō valebit.
Uerū qn̄q̄ꝫ p̄cedit debilitas in contentiua ⁊ ſequit̄ opera
tio vel fortitudo expulſiue ⁊ eſt plurimū vt ē in fluxu ſin-
thomatico. q cum ꝓcedat a multitudine quā contentiua
inteſtinorum cum ſuis villis bona cōprehēſiōe capere ne
quit ⁊ continere: nec etiam muſculus ani ſine mala quali-
tate pungente illa neceſſe eſt illam deficere: ⁊ deinde ex-
pulſio ſequitur. quandoq̄ꝫ eſt econuerſo: vt quia p̄cedit et
incipit expulſiua expellere: ⁊ tunc cedit contentiua. ⁊ illō
eſt ꝓprie ī fluxu cretico: digeſtaꝫ. n. materiam ⁊ diuiſam
contentiua retinet q̄ꝫ diu agat expulſiua: ⁊ tunc ſic̄ expul-
ſiua expellit ita paulatim ⁊ ordinate contentiua dimittit
Similiter accidit in apertione oppilationuꝫ ⁊ apoſtema-
tis dubelati. in qua ſicut expulſiua aperit ita contentiua
cedit. ❡ Alia eſt cauſa ſpecialis vnicuiq̄ꝫ propria ſpēi di-
cte poſt generales in vnaquaq̄ꝫ ſeruanda. Et quidem pri-
mi cauſa eſt obedientia materie membrorum ⁊ viarum
aptitudo ⁊ nature fortitudo cui nihil ē impoſſibile in ex-
pellendis nocentibus ex ſua ſapientia ordinata ⁊ infinita
vt dixit Galienus. Contrary vero cōtraria eſt cauſa. quia
debilitas nature noſtri corporis opp̄ſſe a nā elemētari ta
liter q̄ a nā celeſti regulāte ⁊ gubernante nr̄a corp̄a ⁊ alia
ſemꝑ vt Ga. ait ſubleuari nō poſſit membroꝝ debilitatis

viarum oppilatio vel largitas ⁊ materie inobedientia. q2
groſſa ſit viſcoſa vel ſubtilis ībibita in diminuto vel eius
effrenitas ⁊ furia ⁊ grauedo in ſupfluo. Et cā inteſtinalis
⁊ lubricatiui eſt quā ſupra in lubricitate ſtōi diximꝰ. Et
cā diſſenterici eſt plurimū colera rub. in īteſtīs collecta vł
īfluxa ſm. H. ⁊ qñq3 eſt fel nigrū: qñq3 fl'a ſalſum ⁊ ſaguis
acutus. ⁊ qñq3 ſanies ex āpate in eis acuto: ⁊ aperto. Et cā
eius q eſt a recto eſt īterior ⁊ exterior. Interior eſt multi/
plex ſed plīmū eſt fl'a nitroſum putridū qđ acqſiuit acui/
tatem: q̄re abradit īteſtina adherēdo ſua viſcoſitate illis:
deīde vlcerat ⁊ egredit' ſic pūctura ſāguis ⁊ extimat eger:
ꝙ in ano ſuo ſit ſal puluericatū ꝓpter bauracitatē ſuam ⁊
eſt cū dolore ⁊ grauedine. Et ex illis eſt emoroys īτriſeca
fiſtule ⁊ ragadie. Exterior eſt frigꝰ adueniēs ano. ⁊ ſeſſio
ſuper duro. Et cā eius q eſt ab extremitate eius eſt ſāguis
quē nā expellit ſine dolore. ⁊ per venas emoroydales que
ſunt ī ſicteri cretice vel ſinthomatice. Et cauſa illius q ab
illis membris exiſtit ⁊ cerebralis eſt cā catarri: quā ſupra
in cura ēpis diximꝰ: ⁊ eſt breuiter mala cōplexio cerebri ⁊
plīmū fr'a īpediens ⁊ corrūpens nutrimētū eius: q̄re mul
tiplicat' in eo ſupfluitas: ⁊ eſt plīmū fl'ica: quā coadiuuat
diſpō membroꝝ īferioꝝ ⁊ maxime ſtōi. ⁊ totius corporis
repletio. in eo multiplicās vapores ⁊ fumos poroſq3 cutis
oppilans ⁊ ductus eius per quos ſupfluitates ꝯſueuit nā/
liter expurgare ⁊ expirare: q̄re regurgitant ad alios cana/
les occultos ⁊ fluunt īferiꝰ ad ſtomacū ſic in cura ſtōi dixi/
mus. ⁊ ad inteſtina ꝓpter eoꝝ debilitatē. Cā aūt eiꝰ q eſt
a ſtomaco dicta eſt ſupra ibidem. Et cā eiꝰ q eſt ab epate: ⁊
ciſti fellis ⁊ eſt plurimū colericus radēs excorians ⁊ vlce/
rans īteſtina: q̄re ſanguis ꝓfluit ab eis ⁊ pīguedo vel pel/
licule vel fruſta ipſoꝝ educunt' ⁊ fit diſſentericus: aut ſā/
guineus ⁊ qñq3 eſt aliaꝝ ſpecieꝝ: ſupius p̄dictaꝝ. Sed cā
colerici eſt multitudo colere ⁊ acuitas ipſiꝰ ꝓpter diſcra/
ſiam caľam ipſiꝰ epatis ⁊ mēbroꝝ cū regimīe caľo vel ꝓ/
pter oppilationē ī poris ciſtis cum fortitudīe expulſiue.
Sed ſanguinei ab ēpe cā eſt oppilatio venaꝝ chilis ⁊ ra/
moꝝ eiꝰ ad mēbra ꝓcedentiū. q̄re ſanguis in ēpe gn̄atus
ad mēbra nutriēda trāſire nō valet: ſed remanens in ēpe
tanq̄3 ſuperfluꝰ ab eo ad īteſtina trāſmittit'. ⁊ per ea expel
lit' vt nociuꝰ. Aut ruptura vene porte. hec. n. cā eſt egōnis
ſanguinis ſicut ruptura chilis cā eſt vrine ſanguīee. Et cā
fetidi eſt corruptio māe. ⁊ qñq3 a lōga retentōe in eis pro
cedit. Et cā eruginoſi eſt aduſtio ſanguis ⁊ humorum ī ipiſ
ſans. ⁊ qñq3 perducit ad aduſtionē corporis epatis: vt ſu/
pra in cāis caľitatis epatis dictū eſt. Et cā viruleti eſt liq/
factio ſanguis ⁊ hūoꝝ: vel reſudatio āpatis caľi in eis: ⁊ ſe
pe fit reſudatio ex apoſtemate ēpis calido. Ingt. n. H. In
di āpate ſub cute celato ſolet virulētus exire liquor. Abo.
vero eruginoſum quē. H. ſub virulento cōprehēdit. d. tm̄
ꝙ ⁊c. Et ſanioſi cauſa eſt āpatis dubelati apertio. vel vlcꝰ
ſanioſum in eis vel ſupiorībꝰ mēbris vt in p̄cedenti caplo
habuiſti. Lotiui v̄o cā eſt debilitas v̄tutis alteratiue ēpis
aut ex ſe aut ex defectu cōtentiue ei deſeruiētis: aut debi/
litas ſeq̄ſtratiue aquoſitatis a ſanguie ꝓpter debilitatem
ēpis ⁊ renū. Et aquoſi eſt maior debilitas alteratiue ēpis
q̄3 ſit in lotiuo: īmo q̄ſi deſtructio multiplicās aquoſitatē
quā coadiuuat multus potꝰ aq̄ ⁊ potentia v̄tutis expulſi/
ue epatis expellētis per meſeraicas ad īteſtina q̄ ſi defice
ret eēt cā aſclitis vt ſupra dictū eſt. aut cōuerſio aq̄ aſcliti
corum per venas in vacuū īteſtinorum quā nā expulſiua
ipſoꝝ expellit ⁊ ſoluit' aſclites ſic hyp. dixit. Et cā in nigro
feculento ſic eſt ſanguis vel groſſi vini fex eſt ſm Ha. caľi
tas ēpis adurēs vel frigiditas eiꝰ maſſam ſanguineā cōge
lans ꝓueniēs ex melācolia nō mūdificata ab ēpe q̄ ſup/
fluens in eo putreſcit ⁊ accēdit calorē ⁊ febrē vel manet ſi
cut eſt: ⁊ īfrigidat' ſi ſpōte ⁊ in p̄ncipio appareāt cū fe. vel
ſine fe. ſunt peſſime ⁊ mortales. Si vero in ꝓceſſu ſponte
vel cum farmaco ſūt meliores vt dixit hyp. Et qñq3 eſt ni
gredo a longa mora in trāſitu ab ēpe ad īteſtina. ſed illa ē
parua nec eſt ꝓpter cām ab ēpe. Et cā nigri fellei eſt adu/
ſtio coľe ru. in ēpe vel multe ⁊ ꝓprie ſubtilis partis eiꝰ. Et
cā nigri mľici q eſt ab ēpe eſt debilitas ſplenis vel oppila/
tio eius. q̄re nō mūdificat' melācolia ab ēpe: ſed ſupfluit
⁊ expellit epar ad īteſtina. Et cā eius q eſt diuerſorū colo/
rum ē diuerſitas humoꝝ confluētium ab epate ad īteſti/
na cretice vel ſinthomatice: cuiꝰ cā eſt diuerſa ⁊ inequalis
epatis ⁊ ſtomaci. ⁊ venaꝝ diſcraſia ⁊ diuerſitas regimis.
Et eiꝰ qui eſt ex vermibꝰ cauſa eſt quā ſupra in p̄cedēti ca
pitulo diximus. Et chiloſi cauſa ē dbilitas attractiue epa/
tis: vel oppilatio meſeraicarum. vel multitudo cibi chilū
augēs ſupra potētiam ēpis attractiue vt. H. dixit. Et cauſa
ſplenetici ⁊ melācolici ē multiplicatio humoris melācoli
ci in ēpe: ⁊ mēbris abſq3 oppilatiōe ⁊ debilitate ſplenis:
q̄re ſplen multam melācoliam trahit quā mittit ad īteſti
na virtus eiꝰ expulſiua vel apertio oppilationis ipſiꝰ. Et
cā facti a mā īfluxa a toto corpore ⁊ dyarici ꝓprie ē ſcdm
ſerapionē multitudo hūoris in corpore ⁊ vēis ⁊ nō mali.
q2 cibꝰ nō digerit': nec cōuertit' in mēbris: nec reſoluit' ꝓ/
pter cutis dempſitatē. ſ3 tanq̄3 grauans a nā p īteſtina ex
pellit'. Et cā liquefactiui ē caliditas diſſoluēs ⁊ liq̄faciēs
humiditates mēbroꝝ q̄s nā vt nociuas expellit qñq3 per
vrinam ⁊ fit vrina oleagina vel vnctuoſa ſic ſperma in ſu
periore hñs ſicut telā araneā. ⁊ qñq3 p īteſtina ⁊ fac' flu/
xum vētris vnctuoſum ſicut in ethica ꝯtingit: ⁊ ptiſi. Et
cā fluxꝰ ſanguis q ē a toto corpore eſt ſupflua repulſio ve
narum ex ſanguīe quā multitudo cibi ⁊ ꝓprie carnium ⁊
potꝰ: ⁊ ꝓprie vini rubei ſpiſſi effic' vel mēbri mutilatio ag
gregauit vel dimiſſio exercitiy cōſueti nō reſoluit nec ſoli/
te euōnes nāles vel artificiales eduxerūt. ſic Ha. dixit: ſed
nā grauata ad īteſtina apertis venis ēpis trāſmittit quam
īteſtina expellunt ⁊ fit egeſtio ſanguis. Et īterdū ad renes
⁊ veſicā venis renes ībibētibꝰ nō apertis: ſ3 ſoluz rarefa/
ctis ipam tranſmittit. et vrina ſic ſanguis ipſe emittit' vt
contingit in egritudibꝰ acutis ſanguīeis ſicut dixit Abo.
Et cā fluxꝰ q colerica paſſio dicit' eſt multiplicatio malo/
rū humoꝝ in corpore ex īdigōne ⁊ corruptione ciboꝝ ꝓ/
pter malitiā ipſoꝝ regimis ⁊ diſcraſiam mēbroꝝ ⁊ ꝓprie
corrumpentē digōnē ⁊ multiplicantē humores ipſos ma/
los ſicut accidit īfantibꝰ ⁊ guloſis ⁊ ꝓprie in eſtate ⁊ autū
no: in quibus eſt digeſtio debilis: ⁊ ꝓprie ciborum haben
tium ꝓprietatē in cōmouēdo quos natura nō conuertit:
ſed aborret: q̄re mouet' ad expellendum ⁊ reddit eos ad
īteſtina: ⁊ fit fluxꝰ vētris colericꝰ aquoſus ⁊ eruginoſus: ⁊
reddit ēt eos ad ſtomacum ⁊ accidit vomitus colericus ⁊
virulentꝰ viridis vel aquoſus: ⁊ ſcdm plurimum fit fluxꝰ
ventris ⁊ vomitus ſimul. natura. n. valde ab eorū corru
ptione ⁊ malitia moleſtata toto conamie mouetur ad eo/
rum expulſionē. ⁊ ſic ſimul per vomitum ⁊ ſeceſſum ex/
pellit. Et facti a cibo ⁊ potu cauſa ē māifeſta. Et fluxꝰ mul
ti ſtercoris cauſa ē q̄ititas ⁊ qualitas cibi ⁊ paucitas eiꝰ qđ
ad epar: ⁊ mēbra trahit' ex eo: ⁊ multitudo eiꝰ: qđ ex eo et
vtraq3 coľa ab eo mediante ciſti fellis ⁊ ſplene reddit' ad
inteſtina vt. H. ait. Et cā eiꝰ in quo mēbrum pars ſeu fru/
ſtum eiꝰ vt pellicula emittit' ⁊ vocat' excoriatiuus ⁊ vlce/
roſus ē cā diſſenterici ⁊ colici. ⁊ eiꝰ q colerica paſſio nūcu/
patur quā ſupra diximus. Cū. n. humor acutꝰ in īteſtinis
colligit' aut diu per ea fluxerit ipſa vlcerat vel abradit: ⁊
excoriat ⁊ pinguedinē coꝝ ſanguinē ac pelliculas educit
demū vlcerat: ⁊ fruſta coꝝ expellit. Et qñq3 ē ex ſuperio
ribus qñq3 ex īferioribus. ⁊ qñq3 ex vento: ⁊ qñq3 ex acu
mine medicine. Sed ſpēs excoriatiōis ſūt ſanguīea viru/
lenta ſanioſa: ⁊ tiriaca corticalis ⁊ habētca ꝯparatiōes ad

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0339-6
DFG

inuicem pͥma eſt ſaluioꝛ. ⁊ erit qnꝗ ex egritudinibus acu
tis ⁊ febꝛibus adurentibꝰ ⁊ vnaqꝗ ex exeūtibꝰ eſt manife
ſta. Et cā eius q eſt ex ſanguīe: vel flate: vel colā vel mlīa
cōtenta in iteſtinis eſt multitudo eiꝰ ꝑueniēs a ſuperioꝛi
bus ad ea paulatim in eis aggregata ꝓpter cōſtipationez
vētris donec ſuperfluat ⁊ ledat ſua q̄titate vel q̄litate vl'
vtraqꝫ expulſiuā: q̄re mouet̄ ad expellendū ipaȝ quā ad/
iuuat qnꝗ humiditas ⁊ lubꝛicitas māe ⁊ hūoꝛes ⁊ ꝓpꝛie
cum fuerit ex flate aquoſo vel mucillaginoſo. Et cā vniuſ
cuiuſqꝫ ſpēi ipſius ex p̄cedentibus eſt nota. Et cā nālis cre
tici laudabilis ⁊ q eſt ad expellendū nocētia ex dictis cau
ſis tēperati nota eſt. ⁊ ꝯrīj cā ex ꝯrījs cauſis. ¶ Signa. ſi/
gnoꝛū q̄dā ſunt cōia: q̄daȝ ꝓpꝛia. Cōia ex p̄cedētibꝰ comi/
tantibꝰ: ⁊ ſeq̄ntibus aſſumunt̄. ſūt. n. cōia tēperato cretico
⁊ laudabili q eſt ad expellenduȝ nocētia. ⁊ eius ꝯrīo vt ſu/
pꝛa in vomitu dictū eſt. Et ſigna facti a foꝛtitudīe expulſi
ue ſunt alienatio q̄ ſeq̄t̄ ⁊ facilitas eius cū bona tollerātia
Sed facti a defectiōe ꝯtentiue ſigna ſūt cōia. qꝛ nec ꝯfert
nec bñ ferūt. ¶ Signa vō ſpālia vniuſcuiuſqꝫ ſunt. Et q/
dem lubꝛicatiue ſūt ſigna mala ꝯplexiōis ſtōi: cū mā frigi
da vel calā. ⁊ vlcerū eius ſuperiꝰ dicta. Dr̄nt tñ lubꝛicitas
iteſtinoꝝ ⁊ ſtomaci. qm̄ in lubꝛicitate iteſtinoꝝ cibaria ⁊
potus ſunt magis digeſta q̄ꝫ ī lubꝛicitate ſtōaci. ¶ Signa
vero diſſenterici ſūt apparitio p̄dictoꝝ hūoꝝ in exeūtibꝰ
acutoꝝ ⁊ ipſoꝝ exitus cū doloꝛe toꝛtiōe ⁊ punctiōe: ⁊ plu/
rimū eſt cū fe. ⁊ deīde permiſcet̄ ei ſanguis paucus ⁊ pin/
guedo. deīceps ſi perdurat pellicule: ⁊ ſi vltra ītendat̄ fru
ſta iteſtioꝛū apparebūt. Et per ea diſtiguunt̄ tres ſpēs no/
te diſſenterice. pͥma in qua educunt̄ ſanguis ⁊ piguedo. ꝯa
in qua educunt̄ pellicule. tertia in qua educunt̄ iteſtinoꝝ
fruſta ſicut hyp. ⁊ G. in affo. oñdit. Et ſiqdem tales humo
res ab iteſtinis fuerint. in q̄bus aggregati paulatiȝ fuerīt
p̄dicta eꝛ ūt q̄ſi cōtinua. Si vō alījs mēbꝛis īfluxa eis p̄di
cta exeūtia ⁊ doloꝛ erūt peryodica. ⁊ mēbꝛū a quo fluxerīt
per p̄cedentem eius diſpōnē vel paſſionē cognoſcere pote
ris: ſi qd̄ eſt. Et ſiq̄dē fiunt ex iteſtinis ſup̄ioꝛibus cogno/
ſces per doloꝛes ſupꝛa vmblicū ⁊ cū raſura apparēte in eo
⁊ exitum egōnis poſt longū tp̄s doloꝛis. ⁊ per q̄titatē ſan/
guīs q eſt plus. ⁊ per q̄titatē pelliculaꝛū. qꝛ ſunt mīoꝛes ⁊
tenuioꝛes: ⁊ pmixtionē ipſoꝝ cū fece maioꝛē. ¶ Si vō in
īferioꝛibus ecōtra perpēdes oīa. ⁊ loco raſure piguedineȝ
⁊ doloꝛē ſub vmblico. Et ſi q̄dem talis fluxus inceperit a
colā vel flegmate ſalſo vel ab alījs acutis collectis vel īfu
ſis eſt curabilis ſi ꝯueniāt neceſſaria ex parte medici īfir/
mi aſtātiū ⁊ neceſſarioꝝ. Qꝛ ſi a felle nigro īceperit ē moꝛ/
tale vt dixit hyp. Et tamē ſi mutant̄ in bonū ⁊ nāles ſup/
fluitates admixtas habuerit eſt bonū vt hyp. dixit in affo.
¶ Signa cerebꝛalis ſūt ſigna coꝛruptōis ꝯplōnis cerebꝛi
. ſ. frigiditatis eiꝰ ⁊ hūiditatis ⁊ eſt plımū: vel caliditatis ⁊
hūiditatis ⁊ eſt rarius: q̄ ſupꝛa in cura egritudinuȝ capitis di
ximꝰ. ¶ Signa quoqꝫ catarri ⁊ q eſt fluans peroydos: vt
qꝛ de nocte mouet̄ ⁊ poſt ſomnū magis eo q illa hoꝛa gn̄a
tur ⁊ retenta aggregat̄ mā: ⁊ poſt ſomnuȝ aggregata fluit
ad inteſtina ⁊ apud deſcenſum cū tranſit per meri trāſglu
tiet īfirmus: ⁊ cum ꝑuenit ad ſtomacū ſentiet qnꝗ graue/
dinem vel doloꝛē ⁊ tranſiēs per eū educit ab eo indigeſtū
cibum ſecum ſi īuenit ipm̄ in eo: ⁊ apparebit ſic lubꝛicitas
inteſtinoꝝ. Differt aūt ab illa: qm̄ lubꝛicitas de ſe hoꝛas
nō hȝ diſtictas in q̄bus creſcit ⁊ minuat̄ ſic cerebꝛalis: ſed
ſm̄ regimē tātū: q̄re nō accidit niſi ſumpto cibo: ⁊ cerebꝛa
lis etiam apparet abſqꝫ cibi aſſumptione. nec ſigna cere/
bꝛi coꝛrupte cōplōnis in ea apparēt: nec repletōis nec alia
accñtia q̄ apud deſcenſuȝ māe in cerebꝛali contigūt. ⁊ hec
eſt in ea. q̄ eſt ex malitia cōplexionis. Sed ſi ſit lubꝛicitas
ex vlceribus in ea apparēt coꝛtices ⁊ ſanies q̄ nō apparēt
in cerebꝛali. ¶ Et ſigna eiꝰ q ē a ſtō ſunt ſigna lubꝛicitatis
ibidē dicta. ¶ Et ſigna eius q eſt ab epe. ⁊ ciſti ſunt ſigna
īflāmationis epatis. ⁊ regimē p̄cedens multiplicās cole/
ram abſqꝫ ſignis oppilatōis ⁊ debilitatis ciſtis. ⁊ epatis cū
circūſtātījs ſimilibꝰ. ⁊ apparitiōe colere in egōnibus ⁊ vri
na alba: ⁊ cū cōſuetudīe patiendi q̄ in icteritia diximꝰ: ⁊ ſi
ſit colera praſſina eſt magis a ſtōaco. ¶ Et ſigna ſāguinei
q eſt ab epe ſunt ſigna oppilationū venaꝝ ⁊ ramoꝝ poꝛte
vel ruptura eius q̄ ſupꝛa in epate diximꝰ. Et eſt ſine dolo/
re vētris. ⁊ eſt dr̄ns a lotiuo. qꝛ hic eſt ſanguis purus. ibi ſic
lotura carnis recentis. Et ab eo q eſt ab iteſtinis. qꝛ hic eſt
ſine doloꝛe ⁊ apparens ſubito multus ⁊ īterpolat̄ duobus
vel tribus diebꝰ habēs ītermiſſionē donec mā aggregat̄:
deīde fluit: ⁊ deīde fit eruginoſus ſubtilis: deīde paſſione
augmentata fit groſſus ſic fex. Et eſt cū raſura ⁊ diuerſita
te coloꝝ a p̄ncipio ꝓpter diſſolutionē ſub̄e epatis quā cū
nā diu pati nō poſſit ſignum eſt cite moꝛtis ille paulatiȝ ⁊
poſt exitū colere ⁊ humoꝛis acuti cū doloꝛe quaſi ꝯtinuo.
Et ſi eſt a recto eſt ſic gutte fila: ⁊ ſputū ſanguis pauce q̄n
tatis nō ꝯmixtū: ſed circūuolutum ſtercoꝛi vel hūoꝛi mu/
coſo ⁊ ēt cū expreſſiōe ⁊ quādoqꝫ eſt cū doloꝛe: ⁊ vocauit
Albo. ipm̄ açair. Et ſi eſt ab emoꝛoidibꝰ manifeſtis ſenſus
d̄clarat. ſi itrinſecis occultis: doloꝛ eſt ſine expreſſiōe: ⁊ ſā/
guis eſt niger in p̄ncipio. ⁊ per ſe emiſſus vel valde diſtin
ctus. Et eſt ēt dr̄ns ab eo q eſt ex toto coꝛpoꝛe. qd̄ eſt. qꝛ q
eſt ex toto coꝛpoꝛe eſt cū cāis ſuis q̄ ſunt manifeſte. ab epa
te vero veniēs nō eſt. Et ſigna fetidi ſunt fetoꝛ cuȝ p̄ceſ/
ſione cauſe coꝛruptiōis vt eſt putredo humoꝛis vlceris ⁊
ap̄atis. Et ſigna eruginoſi ſunt viriditas ſic eris erugo in
egōne apparēs ⁊ ſignū mlte īflāmatiōis epatis ⁊ coꝛpoꝛis
totius adurentis ⁊ regimē p̄cedens calidū. Et cū p̄ducit
ad epatis aduſtionē apparet qnꝗ vrine hypoſtaſis oꝛobi
na. ⁊ oꝛobus eſt fragilis ⁊ rubeus tendēs ad nigredinē ad
d̄riam eius q eſt ex renibꝰ: ⁊ eſt moꝛtalis. Et ſigna virulen
ti eſt īflāmatio apparens nō aduſtiua: ſed liq̄factiua vl' ſi/
gna ap̄atis calidi ſub cute ſubtili celati vt eſt apoſtemati
epatis. ⁊ quādoqꝫ ſtomaci. ⁊ iteſtinoꝝ. Et ſigna ſanioſi ex
p̄cedenti caplo nota. ⁊ ſunt ſigna vlcerum. ⁊ apoſtematis
dubelati ⁊ aperti. Et qnꝗ eſt vlcus ſoꝛdidum. ⁊ qnꝗ coꝛ/
roſiuum. Et diſtinguit̄: qm̄ coꝛroſiuum eſt cū maioꝛi dolo
re: ⁊ fetet ēt: ⁊ qd̄ egredit̄ eſt decliue ad nigredinem. Et ſi
gna lotiui ſunt ſigna debilitatis alteratiue epatis dicta ſu
pꝛa tam ſi ex ſe defecta ſit p̄ncipalr̄ q̄ꝫ ēt ſi deficiat ex con/
tentiua deficiente p̄us. q̄ oīa poſuimus in debilitate digō/
nis ſtomaci ⁊ epatis dicta ſupꝛa ibidē. ⁊ eſt cum paucitate
vrine. ⁊ ꝓpꝛie qñ eſt ex defectione ſequeſtratiue renū. Et
ſigna aquoſi ſunt ſigna eadem: ſed foꝛtioꝛa: ⁊ regimen p̄e
cedens ſicut comeſtio fructuuȝ: ⁊ potus aq̄ ⁊ paucitas vri
ne ⁊ p̄uatio ſudoꝛis vel aſclitis p̄cedens cum cōfoꝛtatiōe
virtutis: ⁊ aq̄ tūc eſt citrina: ex precedēti vero cā eſt alba.
Et ſigna nigri feculenti ſicut eſt fex ſanguis ⁊ groſſi vini
ſunt ſigna debilitatis ⁊ oppilationis ſplenis: ⁊ regimē p̄e
cedens multiplicās mlīaȝ in epate ⁊ ſanguīe cū coꝛruptio
ne ⁊ īflāmatiōe epis ⁊ fe. peſtilente multiplicās vel ſigna
fr̄itatis ⁊ regimē p̄cedens melancoliā in epate ⁊ ſanguine
cū coꝛruptōe ⁊ īflāmatiōe epis. ⁊ fe. peſtilēte. vel ſigna fri/
giditatis ⁊ algoꝛis ipſiꝰ abſqꝫ coꝛruptōe ⁊ fe. Et q̄ eſt a fri/
giditate ē pauce nigredinis ⁊ ſine odoꝛe ⁊ groſſioꝛis ſub̄e.
que eſt a caliditate eſt econtra ⁊ p̄cedunt cū egeſtiones ⁊
vrine colerice ⁊ virides ⁊ mixte. Que eſt a longa retentio
ne eſt minoꝛis nigredīs ⁊ p̄cedēs abſqꝫ omni nocumento
epis: īmo cā eſt in iteſtīs. Et ſigna nigri fellei ſūt calitas: ⁊
īflāmatio foꝛtis in epe cum ſignis debilitatis ſplenis ⁊ op
pilatōis eiꝰ ⁊ regimē p̄cedēs calīm vel mlīcuȝ. Et qd̄ egre/
dit̄ ſuper terrā effuſum ebulit ſicut acetuȝ a quo fugiunt
muſce ⁊ ē valde nigrū lucidū ⁊ acris odoꝛis p̄cedēs aut ni
hil ex his tribꝰ hȝ. Et ſigna nigri mlīci epici ſūt d̄bilitas ⁊

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0340-7
DFG

oppilatio ſplenis precedentes cum dominio melancolie
in epate ⁊ ſanguie. Et eſt minoꝛ duabus nigris predictis
ſine compactione ⁊ ſine odoꝛe. Et eſt differens a ſpleneti
co melācolico: qm̄ in illo nō eſt apparēs debilitas ⁊ oppi/
latio ſplenis ſaltē in poꝛo per quē trahit: ſed ſola malitia
regiminis multiplicās melācoliā: ⁊ cū circūſtantÿs ſimili/
bus. Et qn̄q; oppilatio in poꝛo expulſiōis ē retinēs melā/
coliam quā traxit ſplen ab epate: ⁊ cū aperit̄ ſeq̄t̄ fluxus
mlicus. ⁊ qn̄q; vomitus: ⁊ eſt tūc maioꝛis nigredis ꝓꝑ mo
ram in lōga retentiōe. Et ſigna eius ꝙ diuerſoꝝ coloꝝ eſt
ſunt apparitio ipoꝝ in egeſtiōe: ⁊ regimē ꝑcedēs diuerſū
cūineq̄lis diſcraſie coꝛpoꝛis ſignis. Et ſigna chiloſi ſūt ap
parens chilus in egeſtiōe ⁊ ſignū frigiditatis epis vel op/
pilatiōis eius vel ſigna oppilatiōis meſericaꝝ. Sȝ differt
ꝙ eſt ex oppilatōe meſeraicaꝝ ab eo qui eſt ꝓpter oppila/
tionem i venis epatis: nā cum eſt ex oppilatōe venaꝝ epa
tis eſt chilus tendēs ad rubedinē aliqualem ꝓpter altera
tionem aliquā quā recipit in meſeraicis. ſed cū eſt in meſe
raicis oppilatio ⁊ oꝛificÿs eaꝝ eſt chilus albus ⁊ citi⁹ egre
diens vel eſt ꝑcedens regimē multe q̄ntitatis: ⁊ qualitatis
abſq; aliquo ꝑdictoꝛum. Et ſigna ſplenetica ⁊ eſt plurimū
melācolicus: iam dicta ſūt. Et ſigna dyarici cui⁹ mā fluit
a toto coꝛpoꝛe ad īteſtina ſūt ſigna repulſiōis nālis ⁊ ple/
toꝛie vel cacochimie cuȝ foꝛti v̄tute abſq; paſſiōe alicui⁹
mēbroꝝ ad dīaȝ colerice paſſiōis q̄ ſemꝑ eſt ſinthomati
ca. Et ſigna criſis vel mlice māe. ⁊ ſinthomatice cōpellen
tis nām. Et ſigna liq̄factiui ſūt ſigna ptiſis: ⁊ ethice proce
dentis cum teneritate membroꝝ: vt eſt pueroꝝ ⁊ īfantiū
⁊ coꝝ ꝓpꝛie quoꝝ lacerti ſūt molles ⁊ humidi ⁊ excūtia
ſūt ſicut hūiditas liq̄factiua alba viſcoſa ⁊ ꝓpꝛie cuȝ ꝑce
dat a ſuba radicaliū membroꝝ: qn̄q; enī eſt ex liq̄factio
ne adipis membroꝝ. differt tn̄ ab illa. q2 hec nō eſt viſco/
ſa ſicut illa nec cū tāta defectiōe ⁊ arefactiōe: ⁊ cum eſt al/
ba eſt adipis recētis. Si v̄o eſt citrina eſt adipis antiq̄. Et
cum expellit̄ per vias vꝛine: vꝛina eſt alba ſimilis ſperma
ti: vel lacti. Et ita vidim⁹ in fratre noſtro cui⁹ coꝛpus totū
fuit ex fe. longa cōſumptū ⁊ diſſolutū per talem vꝛinaȝ ⁊
moꝛtuus eſt: cui⁹ animā xp̄s recipiat bn̄dict⁹. Et cū eſt ex
liq̄factiōe adipis vꝛina eſt oleagina per totū admixta ⁊ ꝑ/
pꝛie cū eſt ex liq̄factiōe ſuperioꝝ membroꝝ: ſed cū eſt ex
liquefactōe adipis renū pinguedo eſt cōglobata ⁊ ſepara/
ta ſupernatās. vnde hyp. in affo. Quib⁹ vero piguis hypo/
ſtaſis ⁊ cōglobata nefreticā ſignificat. Et ſigna fluxus ſā/
guinis ꝙ ꝓcedit a toto coꝛpoꝛe ſunt ſigna plectoꝛie dimiſ/
ſio exercitÿ cōſueti ⁊ quies ⁊ mult⁹ vſus carniū ⁊ vini: mu
tilatio membri ꝑcedētis ⁊ retentio euōnis cōſuete abſq;
oppilatiōe: ⁊ egritudie alicui⁹ mēbri. Et ſigna colerice paſ
ſionis ſūt ſigna digōnis dimiute ⁊ coꝛrupte ⁊ malitiā regi
mis particularis multiplicātis hūoꝛes diuerſos: ⁊ calidos
magis. Et ſimul apparet flux⁹ ⁊ vomit⁹: ⁊ eſt cuȝ anguſtia
ſiticuloſa vigilÿs: ⁊ doloꝛe vētris. ⁊ qn̄q; perducit ad raſu
ram ⁊ excoꝛiationeȝ iteſtinoꝝ ⁊ meri: ⁊ gutturis ⁊ debili/
tatem ſudoꝛē frigidū ⁊ extremoꝝ frigiditatē ⁊ ſincopim
⁊ ſpaſmū ⁊ eſt malū ſignum. Et cum mā cōuertit̄ ad vias
vꝛine eſt bonū: ſed cū ſupfluit ide ꝑducit ad excoꝛiationē
⁊ vlcus ⁊ accidit ardoꝛ vꝛine iteſtinis perducēs ad reſolō
nē. Et ſigna facti a cibo potu ⁊ medicia ſūt manifeſta ⁊ ēt
ſigna ſtercoꝛis apparētis. Et ſigna excoꝛiatiui abraſiui ⁊
vlceroſi: ex excūtib⁹ patēt ex regimie ꝑcedēte ⁊ fluxu hu/
moꝛum acutoꝝ lōgo qui ipm̄ minant̄ ⁊ poꝛtendūt. Et ſi/
gna eius qui eſt ex ſanguie colera vel flegmate ⁊ melāco/
lia cōtenta ⁊ aggregata in iteſtis eſt grauedo ⁊ pūctio per
ſeuerās abſq; nocumēto ⁊ paſſiōe manifeſta in ſuperioꝛi/
bus membꝛis: ⁊ eſt regimē ꝑcedēs mlꝉiplicās hūoꝛes coꝛ/
poꝛis ⁊ ſtringēs vētreȝ: ex q̄bus i iteſtinis māerū illaꝝ ali
qua coadunat̄. ¶ Cura flux⁹ eſt multiplex: nā ſi ſit lauda

bilis ⁊ cretic⁹ permittat̄. ꝙ ſi ſit difficilis ⁊ diminutus eſt
coadiuuandus ⁊ facilitādus vt dixit hyp. Et qualiter fiat
illud īfra dicet̄: deīde permittēdus donec ad perfectionē
vēiat: ⁊ cognoſcit̄. q2 cōfert ⁊ bene ferūt: ⁊ cū ꝯfoꝛtatiuis
mēbroꝝ tēperate ſtipticis ē vtēdū q̄ ſint ſic habene māe
ne effreniter ⁊ ſuperfluat flux⁹. Qꝛ ſi ſupfluat ex tūc fact⁹
eſt illaudabilis: ⁊ eſt reſtringēdus. Et cognoſcit̄ vt hypp.
dixit. Nā q̄diu cōfert ⁊ bene ferūt eſt vt laudabilis per/
mittendus. Cū aūt nec ꝯferre icipit nec tolerat̄ bn̄. q2 nā
debilitari appareat eſt vt illaudabilis retinēdus. Si v̄o
ſit illaudabilis ⁊ ſinthomatic⁹ aut eſt cū nāe regulatōe vt
ſupꝛa ī cura pleureſis habuiſti. Et tūc ē permittēdus. Eſt
enī ſaltem per viaȝ cāe bonus quā minuit. ⁊ per ꝯn̄s moꝛ/
bum dependentē ex ea: ⁊ nām ſupꝛa reſiduū māe potēteȝ
facit vt. G. dixit. Aut ſine regulatōe nāe. ⁊ tūc cum ſit a to
to genere ꝑter nām ⁊ malus eſt retinēdus. In retentione
aūt eius duplex eſt ītentio. generalis. ſ. ⁊ ſpālis. Generalis
eſt generalem cām īſpiciendo ⁊ immediatā res vna. ſ. cō/
foꝛtare ſemꝑ retētiuā: ⁊ per ꝯſequēs debilitare expulſiuā
ſiue queſcere facere q̄ eſt in oībus ſpālib⁹ ēt attēdēda. Si
enī ſpālis cā q̄lȝ nō niſi debilitādo ꝯtētiuā: ⁊ ꝯfoꝛtādo cō
pulſiuam fluxum gignit. ergo q̄libet cura ſpecialis ſic cāe
ſpecialis fluxus cuiuſlibet dȝ eſſe ablatiua ꝙ ꝯfoꝛtet retē
tiuam: ⁊ debilitet expulſiuā vel queſcere faciat. Cōpletur
aūt iquantū huius frigidis ſtipticis vel calidis ꝓut diſpō
exigit que infra dicent̄ trinitatis auxilio. Sed cōſideran
do oēs cauſas eius mediatas ⁊ materiales eſt multiplex.
q2. vi. res quibus omnibus vel pluribus oȝ vt ꝯpleas pre/
ter regimē cōmune qđ quamq̄ȝ premittendum ſit hic vt
cōmune ⁊ ꝑncipale in cura: poſtponemus tamē vſq; in fi
neȝ vt illud ex ꝓpꝛÿs melius colligam⁹: q̄s res ſupꝛa dixi
mus in cōſolatione medicinaꝝ: vbi ſolutionē medicīe cū
ſuperfluit te docuimus retinere. ⁊ in cura vomitus: et qui
bus complent̄: illuc ergo recurras: ⁊ inſpicias diligenter.
Et adapta vnicuiq; ſpeciei res ꝑdictas ſibi cōuenietes ſi/
ue omnes ſiue plures expediāt. Specialis itentio varia
eſt ⁊ diuerſa ſꝫm varietatē ſpērum eius atq; cauſaruȝ pro/
pꝛie materialium ⁊ iterioꝛum maxime. Si ergo flux⁹ ſit
iteſtinalis ⁊ lubꝛificatiuus curādus eſt: ꝓut ſupꝛa in lubꝛi
citate ſtomaci dictuȝ eſt. Et eſt breuiter cura eius. vi. res.
Pꝛima eſt mundificare ⁊ alterare. Scđa eſt ſtipticare et
cōfoꝛtare cum his q̄ dicent̄ infra: ⁊ ꝓpꝛie in hoc caſu mū/
dificantia ſunt ſolutiua vētris bibita ſi cā ſit in ſuperioꝛi/
bus: vel cliſteriçata ſi ſit in īferioꝛib⁹ maxime: vel vtraq;
ſi ſit in vtriſq; ſicut in lienteria cū eſt in ſtomaco vomiti/
ua. Inquit enim Gal. vomitu vero nō educitur niſi qđ in
ſtomaco ſolo erit. Maxime cū cliſtere nō tranſcendat ie/
iuniū vbi mundificando deriuare intēdas. quo caſu vtra
q; in vtraq; lienteria congruunt ⁊ vomitus ⁊ in vlceroſa
magis. Et ſumpta etiam omni eius cauſa ex lauantibus
⁊ lubꝛicantibus ſeu lenificantibus ⁊ abſtergentibus pro/
pꝛie eſt aqua furfuris vel oꝛdei mellis vel paſſularuȝ vel
aqua lactis: ⁊ aqua oliuarum ſalitarum calida: ⁊ ſalitoꝛuȝ
piſcium mucillagine caſſiafiſtula mel ⁊ çuccarum rubeū
ſimplex. Et compoſitum cuȝ roſis confoꝛtantibus qđ cō/
foꝛtat ⁊ ſoluit vt eſt geleniabin ⁊ çuccarum roſ. olea. pu/
ta roſatum camomillinum amigdalaꝝ amararum nardi
num ⁊ hirinuȝ. baurach. ⁊ alia abſterſiua calida ⁊ frigida
que opoꝛtet eligere ſecunduȝ neceſſitatem. puta. Nam ſi
inteſtinoꝛum lubꝛicitas fuerit ex vlceribus eligas in moꝛ
dacia cum quibus aliqua immiſcebis ſtiptica confoꝛtan/
tia inteſtina vt repellant ſi adſit materiam fluenteȝ: ⁊ cli/
ſteriçabis donec mundificatio vlceruȝ facta ſit plene: de/
inde cliſteriçabis cum ſtipticis cōglutinātibus. Et ex pro
pꝛÿs eſt terra ſigillata ⁊ ſanguis draconis ſucc⁹ rubi ima
turi ⁊ caſeus vetus aſſatus vt īfra dicet̄ cū aqua ſumach:

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0341-2
DFG

quoniam ſunt bene ꝓpria in conſolidatione vlceruꝫ coꝝ
ꝛ preter hec ſumach: qꝛ reprimit tales humores reumati
ꞔantes a ſuperioribus membris ad inteſtina. Et cum daſ
aqua eius cū tyriaca noua eſt vltima. In ea vero q̄ eſt ex
mā frigida ꝛ hūida eligas acuta per ſe ſine ſtipticitate mꝉ-
ta: deīde cōfortabis. Tertio aūt ſi aliqḋ membꝝ aliqd in-
fluat rectificabis. ꝛ ſpica eſt ꝓpria: ꝛ alumē ꝛ macis ꝛ pio-
nia in ſirupis. ꝓhibet eni cursum taliū membroꝝ ad ea.
Et quarto māꝫ deriuabis ꝛ exiccabis ꝛ in hoc ꞔinꞔiber eſt
ꝓprium ꝛ cinamomum. Quito regimen ordinabis cū ſti
pticis cōglutinātibus. Sexto accidētia corriges: vt ibi ſu-
pra dictū eſt. Sed ſi ſit fluxus diſſentericus cū ſtipticis ꝛ
glutinātibus ex mā aggregata paulatiue in īteſtinis non
fluente ab alijs: cura erit q̄tuor res tantū. p̄ma eſt mundi-
ficare mām. Scḋa eſt cōfortare cōgregare ꝛ vnire īteſtia
debilitata ꝛ relaxata vel ſoluta per fluxuꝫ. tertia eſt regi-
men. Et quarta eſt accn̄tiū correctio q̄ dimittaſ ad p̄ſens
cum nō ſit de eſſentialibꝰ curatōibus. ſed accn̄talibus. et
ideo in fine capituli reſeruetſ. Mūdificationeꝫ cōplēt cli
ſteria ex abraſiuis ꝛ lauātibus dictis frigidis aliquā ſtipti
citatem hn̄tibus vt aqua ordei ꞔuccarū roſ. oleum ro. et
ſuccus portulace: cū mā fuerit calida ꝛ ſubtilis. Et ſi plus
fuerit calida ꝛ aduſta addes mucillaginem pſily cucur-
bite ꝛ melonis vel ex ea cuꝫ aqua lactis cliſteriꞔabis oleo
ro. ꝛ aqua ſeminū cōiuꝫ vel caſſiefiſtule. Si vero viſcoſa
quale eſt flegma ſalſuꝫ fiat ex aqua furfuris melle cōmu
ni vel roſato oleo amigdalaꝝ amararū: ꝛ ſale vel ex alijs
fortioribus abſterſiuis in vnoquoqꝫ ſequātur cōpreſſiue
ex ſpēbus mirabo. electis ꝓut requirit materie diſpoſitio
que aggregant virtuteꝫ in ſe mundificatiuā nō aſſate: vel
parum cōfortatiuam. Et ex illis eſt reubar. parū aſſum ꝛ
alia cōſimilia reuponticū ꝛ etiam vomitiua ꝛ ꝓprie cum
materia in ſuperioribus eſt īteſtinis quas ſuperius in cu-
ra ſtomaci habuiſti. Cōfortationem aūt ꝛ vnionem com
plent īteſtinorum medicine ſtiptice habētes in ſe aggrega
tiuam virtutem cōfortationis quatenus effuſam ſi quaꝫ
materiaꝫ ꝓpter debilitatem coꝝ non recipiant: ſed repel
lant coadunatiōis ꝛ vnitiōis partium corū. ꝛ retentionis
materie calide. ꝛ frigide: ꝓut qualitati ip̄ius māe cōgruit
ꝛ diſcraſie īteſtinoruꝫ quas ibi ſupra in conſolatione me-
dicinarum enarrauimus ſimplices ꝛ cōpoſitas: quarū ali
quas chriſto duce infra ponemus ꝓut diſpoſitio exigit il-
las miniſtrabis īterius ꝛ exterius per oēm modum. Et ex
illis eſt hipogſtidos lutuꝫ armenuꝫ galle pulueriꞔate cha
rabe cortex ſorbium: papauer albū. Et ſi cuꝫ ſirupo viola
to ſumaſ ſoluit. Et ex illis eſt camphora ſandali al. ſemen
acetoſe alumen ꝛ ſucci p̄dictorum exiccati ꝛ rob ipſorum:
ꝛ ramich. ꝛ roſtruꝫ porcinū. Et ex herbis conſolida virga
paſtoris ꝛ burſa corigolꝰ: faſolaria cauda equina portula
ca daraſceni diurdea: endiuia decocta: cū aceto ꝛ ꝓprie ſil
ueſtris. Omnia diuretica frigida ꝛ calida vt ſparagꝰ ſtrin
gunt ventrem. qꝛ vrinā multiplicāt. Et fructꝰ ſtiptici alij
noti: vt maciana pira citonia: ſorba: neſpula ribes: ꝛ ꞔarur.
ꝛ lac acetoſum decoctū cum lapidibus molaribus vel fer
ro. Et eſt melius ſm̄ Abo. quo eſt penitus abſtractū buti
ruꝫ. ꝛ per decoctionē eſt ſeroſitas miorata ꝛ frigida ſtipti
ce vtutis vitellus oui elixatus in aceto: ꝛ alia frigida ꝛ ſic
ca cōſimilia. Et ex eis calidis eſt ſandaraca. ameos radix
feni. cū ſemie ſuo pulmo ꝛ viſcera aialiū vſta ꝛ pulueriꞔa
ta. ꝛ xilo aloes macis gallia muſcata maſtix ſtorax. ſicca q̄
dſ calamitta ſanguis hirci darſcelaan. Et tēperatū eſt ce-
ra ſuccus folioꝝ coti. Et ex ꝓprijs ſoloni pueroꝝ ē lauda
num: ꝛ capillus veneris exiccatus: cui īeſt ꝓprietas vt cō-
fortet ſtōm. ꝛ ventrem ne recipiāt ſupfluitates ſic ſumac.
Et ex eis eſt coagulum edi ꝛ pulli equi qn̄ daſ in potu īfā-
ti pondus quartū. ʒ. vniꝰ in aqua frigida ꝛ magno ſupra il-
lum. ʒ. i. ſicut ex coagulo leporis: qn̄ coagulando mām li-
q̄factam retinent ventrē ſtatim: vt dixit Abo. Et addit: ꝛ
oꝫ: vt īcipiat q ad potandū dat coagula a dauich. i. ſi vo nō
ſufficiat vel ꝯfert addat in eo vſqꝫ ad illud qḋ nō ptrāſeat
in pōdere. ʒ. i. qn̄ eſt vehemītis caliditatis: ꝛ valet ī fluxu.
cuius cā ignoraſ vt ait Auer. ꝛ oī ꝓprietate ꝛ frigido plus:
qn̄ in eo iungiſ ꝓprietas cum complexione. Et caſeus q̄-
dem vetus cuꝫ p̄mo fuerit ablutus cū aqua ꝛ ſale pluries
ꝛ decoquaſ bene vt egrediaſ ab eo ſal: deīde exiccaſꝰ: vel
aſſatus cum ex eo datur in potu pondus. ʒ. i. eſt mioris no
cumenti ꝛ fortioris cōſtrictōis q̄ꝫ coagulum. Et alia ſūt ex
eis cōpoſita ad frigiditatē declinantia alia ad caliditateꝫ
q̄ īfra chriſto duce ponemus. Et ſiqdem ſiſtatur fluxꝰ ex
his nec facta remāſit aliqua leſio in īteſtioꝝ ſuba ad alia
ꝓcedere non opꝫ. Quod ſi facta ſit opꝫ ad alia procedere
auxilia vt ſequetſ. Qꝛ ſi talis diſſentericus fluxus a mate
ria acuta ab alijs membris īfluxa fuerit: vel etiam medi-
cina p̄dictis rebus p̄mittes res alias ad cure eius ꝑfectio
nem q̄ membꝝ reſpiciūt ſi qḋ mittit rectificādū: viā coa-
guſtādam per quā mittiſ: mām getandā īſpiſſandā ꝯpin
gendam ꝛ repellendā ꝛ deriuādā: quas p̄dicte medicine
ꝛ in cura vomitus ꝛ ſupra in cura accidentiū medicinarū
habent cōplere. Cuꝫ ergo abſcindiſ q̄ currebat tota: tunc
opꝫ vt redeamꝰ ad īteſtina ꝛ curemus īpreſſionē factā in
eis cū p̄mis duabus rebus. Si ergo fuerit p̄me ſpēi talis
fluxus in conpinguedo īteſtinorū groſſoꝝ vel mucillagi-
noſitas ꝛ raſura gracilium apparet in exeūtibꝰ p̄miſſa mū
dificatione ex p̄dictis ſufficiūt leuiora ſtiptica: ꝛ forte ſim
plicia. Qꝛ ſi ad excoriationē ꝛ ſanguinē ꝛ corticū emiſſio-
nem deuenerit oꝫ vt eligas fortiora ꝛ ſtiptica ſemꝑ ꝓprie
tatem habētia in ꝓhibendo materie acute effuſioneꝫ ad
ea: qualia ſunt citonium ſuccus mori īmaturi ꝛ ſuccꝰ cheil
qui ꝓhibet materie attractionem: ſumach: adeps ericij: ꝛ
epar eius. Et ſi ad vlcerationem fortiſſima conglutinā-
tia incarnantia ꝛ a proprietate conſolidantia ꝛ ſigillātia.
ꝛ ſanguinē reſtringentia que infra omnipotentis grā an-
nuente dicenſ: ꝛ non ſolum ſimplicia: ſed ēt compoſita. ꝛ
fortaſſe nō ſufficiūt: quare opꝫ procedere ad cauteriꞔātia
ꝛ vltimo ad narcotica: quorum omnium per ordinem re-
colimus nos ſufficientiam poſuiſſe ſupra in cura fluxꝰ ſā-
guinis nariuꝫ. ꝛ in cura ptiſis plurima. illuc ergo recurre.
ꝛ miniſtra que ſunt huic conuenientia ꝛ propria que per
te eligas: ꝛ vt abundantior ſit tibi electio ponam ante te
aream medicinaruꝫ propriarum aliarum. ad hec. ſ. diſſen
teriam raſuram inteſtinorum excoriationem ꝛ vlcera ac
fluxum ſanguinis ꝛ dolorem ex quibus eligas: prout dili
gentia te inuitat. Ex quibus eſt glans ſemen lini aſſatū
cum ex eo ꝛ oleo roſato fit cliſtere ſtringit ꝛ iuuamentum
eius eſt magnum in vlceribus inteſtinorum. Et ſumitur
ex myrra quantitas fabe ad omnia. Fabe decocte in ace-
to cum corticibus ſuis: ꝛ ſauich ex eis quaꝫ non approba-
mus. quia ventoſa eſt ꝛ dilatat vlcera. Et ſic per accidens
nocet magis q̄ꝫ per ſe conferat. Sanguis capre vel hir-
ci bibitus cum melle confert diſſenterie: et acutus con-
fert dolori et raſure eorum. Stercus canis comeden-
tis oſſa cliſteriꞔatum ꝛ bibitum in lacte in quo extinctuꝫ
ſit ferrum confert ſolutioni ꝛ vlceribus inteſtinorum et
ſolutioni antique. Semen acetoſe confert fluxui: ꝛ ra-
ſure. fenugrecum per omnem modum confert dolori: et
vlceribus: vinum in quo extinctum ſit ferrum vel ſti-
pticum: vel aliud non dulce cum aqua extinctionis fer-
ri confert. Tararit bibitum in lacte caprino decocto
retinet fluxum: et deſcenſionem ſanguinis in egeſtione
et diſſenteria et talibus. taliſafar. ideſt cortex citri omni-
bus confert. Camphora: ꝛ ſuccus vitis eſt conueniens diſ-
ſenterie calide. Barba hircina ꝛ flos eius: et ſuccus qui

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0342-8

eſt ypoquiſtidos bibita eſt fortior medicina ad vlcera inte
ſtinorum. Et cū hec ſtringit membra ⁊ coꝝ ductus infun
dentes materiaȝ ad ipſa. ⁊ ſtōacuȝ. ⁊ ad omnia membra ⁊
potus ſemis eius: ⁊ cliſteriçatio ſucci lingue arietis vlceri
bus cōfert. Carnes vaccine ⁊ ꝓprie cū coriādro. Caro le
poris aſſata bona eſt vlcerib⁹ coꝝ. Merda ſengi daꝛ i po
tu ad fluxū vētris ⁊ vlcera iteſtinoꝝ. Et cū aq̄ minuit no
cumentū. Muri in ſorbitōibus ex milio ⁊ pāniculo ⁊ riſo
ſumptū valet ad vlcera. Sal ē vlt imū ad diſſenteriā: qm̄
mūdificat. ꝯſtringit ⁊ ꝯfortat. Radix nenufaris ſucc⁹ por
tulace ſoloni colere: ⁊ diſſenterie ꝯfert ⁊ ſoloni antiq̄ ⁊ vl
ceribus coꝝ. Et vitellus oui elixati in aceto eſt ꝓprius ite
ſtiali nō epatico: nec ſtōatico. Lac recēter mulſū cliſteriçaꝛ
ad vlcera. Succucuri ꝯfert oībus cornu cerui aduſtuȝ: po
ma pōtica ad diſſenteriā ⁊ dulcia ⁊ acetoſa retinēt vētreȝ
ſi inueniant vacuū ⁊ cuȝ humore ſoluūt. Cinis ligni ficus
valet ad diſſenteriaȝ: papauer album ⁊ nigrum ſtringit ⁊
cōpingit materiam ⁊ ꝓuocat ſomnuȝ. Grana altee retinēt
ventrē. Et decoctio radicis eius ꝯfert ardori inteſtinoruȝ
⁊ ſoloni male. Carub alneabut bona eſt dolori vētris pū
gitiuo ⁊ ſolutiōi male. Et cliſtere ex aceto ⁊ ſale ad vlcera
ambulatiua iteſtinorum poſt lenitiuū ⁊ abſterſiuuȝ. Eu
patoriū datur in potu cū vino: ⁊ ꝯfert vlceribus iteſtino
rū. Omnes ſpēs luti ſunt ꝓprie in ſanguine retinēdo: ⁊ la
pis ematitis ⁊ ſanguis draconis: myrra ⁊ ſucc⁹ plātaginis
acatia ꝯſolida. ⁊ ſilia. Reubarbaꝝ retinet ſanguinē ſtrin
git. ⁊ oībus ꝯfert. Cōpoſita ſunt q̄ ex his componunꝛ. Et
experta ifra ponem⁹ ad vlcera ānuente xp̄o. ¶ Sed ad
uerte ne dictū hic ordinē in coꝝ adminiſtratiōe ꝑtercas. vt
q̄ a poſterioribus vltimis incipias ⁊ fortioribus ⁊ cōpoſi
tis. Eſt. n. cā magni erroris icipere a ſtipticis ⁊ cōſtringen
tibus: vt ſerapio dixit. Cuius cām iferius ſubiungemus: ⁊
multo magis ab vltimis q̄ ſunt cauteriçātia ⁊ narcotica.
Cauteriçātia. n. fortaſſe idigentiā excoriatiōis trāſcendūt
q̄bus ſtiptica cōglutinātia: icarnātia: ⁊ ſigillātia ſufficerēt
q̄ cuȝ ꝑtermittanꝛ: ⁊ cauteriçantia miniſtrenꝛ excoriatio
nem augent ⁊ vlcera ex eo q̄ cruſtam ⁊ eſcarā in facie vl
cerum generant: q̄ cum facile cadant mā acuta fluente et
educente ipam relinquit excoriationē: ⁊ vlcera dilatata ⁊
augmenta. Etiam narcotica materiam non mūdificant
cum retineāt ipam ꝯgelando ⁊ igroſſando. ⁊ vias cōſtrin
gendo poroꝝ ⁊ venaꝝ orificia. virtuteȝ ſenſibilem ſtupefa
ciendo ne ſentiat nocumentū māe. quare nō mouebiꝛ ex
pulſiua debilitando virtutē: caloreȝ nālem extinguendo
⁊ ſpiritum cōgelando: cōtēriuam poſt paucuȝ tempus ad
defectionem adducunt: quare redibit fluxus fortior quā
fuerit ꝑus: imo ſm ſapientiam operare. Et ꝑmiſſis mūdi
ficatiuis ꝓprys q̄tum opȝ ꝓcedas ad ſtiptica leniora: dei
de ad fortiora: deide ad cōglutinātia ⁊ icarnantia ⁊ ſigillā
tia: ⁊ cuȝ hec nō ſuffecerint ꝓcedas ad cauteriçantia ⁊ vl
timo ad ſtupefacientia niſi in caſu. puta cū vlcera fuerint
ex materia corroſiua quā ꝑdicta in vlceribus detinent et
ea augent: q̄re poſt abſterſionē oȝ: vt incipias a cauteriçā
tibus q̄ cōſumunt māʒ illā ⁊ cruſtam in facie vlceruȝ gi
gnunt. Et vbi dolor fuerit grādis quē opȝ ꝑus narcoticis
ſedare: deide ſtipticare: ⁊ cōglutinare ſemꝑ caue ne cadat
eſcara: ⁊ ne narcotica ad vltimā ifrigidationem perducāt
⁊ mortem: quare eligas ex eis cōpoſita magiſq̄ȝ ſimplicia
qualia ſunt trociſci de charabe arſenico ⁊ ſtella ⁊ filoniū.
Cōmixtione. n. eorum extrema caliditas vel frigiditas re
mittiꝛ ⁊ malitia: ⁊ nāe fit tolerabilꝛ magis. Nec ꝓpterea
cum opȝ retardes vel premittas illa vtputa poſtq̄ȝ vulne
ra ſiue vlcera videas augmentari ⁊ infirmum debilitari
valde. Tūc enim ſi paras medicinas tales facias: vt dicit
ꝓuerbium. Conſilium bonum poſt cōſumationeȝ litis vt
ſerapio dixit. Quare ſollicite: ⁊ cū cōtinuitate ⁊ ordine: vt

dictum eſt oȝ vt diſpō exigit approximare illa. Et cū ma
teria eſt acuta corroſiua: ⁊ dolor ⁊ mordicatio fortis in vl
ceribus nō eſt malum cliſteriçare cū vnctuoſis: ⁊ pingue
dinibus: qualia ſunt pinguedo galline ⁊ ꝓprie porci ⁊ ana
tis ⁊ ꝓpria magis eſt pinguedo renū hirci vel capre cū fue
rit dolor cū vlceribus. ſua. n. facili cōgelatōe obtūdit acui
tatem māe adherentis in vlceribus ⁊ in coꝝ facie adhe
rentes ⁊ tuenꝛ ea ne ab acuitate trāſeunte vlteri⁹ augmē
tenꝛ vlcera: ⁊ doleant magis ⁊ ſua ſtipticitate ꝯſolidāt ea:
vt ait. G. Et ex illis eſt roſeū ⁊ cerotū cicatriçatia ⁊ praſſy
ſucc⁹ ⁊ paſſe cum iterorib⁹ ſuis ſumpte dolori ſūt ꝓpe vt
eſt ſpodiū. Et cura eius q̄ eſt a recto eſt tres res. ⁊ dicenꝛ i
fra in cura tenaſmonis auxiliāte xp̄o. Et ſi eſt ab extremi
tate eius ⁊ ficteri cura eſt due res. ꝑma eſt vt ꝑcedat mun
dificatio ⁊ ablutio cum aq̄ fenugreci. ⁊ ſemis lini ⁊ ſiſami
vel cū vino decoctōis illoꝝ: ⁊ deide ſequanꝛ ſtiptica con
glutinātia ⁊ ſigillantia q̄lia ſunt merdaſengi balauſtie ce
ruſa: plumbi: ⁊ obſtrata aſſata: ⁊ ſanguie draconis pulue
riçata deſuper ⁊ emplaſtrata. Et oleū vetus permixtū cū
aqua agreſte ꝯfert cū eo fit cliſtere vlceribus ani intrinſe
cis ⁊ eſt ꝓprium. Et ſi eſt a medicina acuta cura eſt ſupra
in conſolatione medicinaꝝ poſita. Et ipſius regimē ꝓpri
um ad frigiditateȝ ⁊ ſiccitatē tendat. Or ſi fluxus ventris
ſit ab alys mēbris vtputa ex cerebro: q̄ dict⁹ eſt cerebra
lis ⁊ plurimum eſt flegmaticus cura eius eſt cura catarri
quā ſupra diximus. ⁊ breuiter eſt due res. vna q̄ debeꝛ ce
rebro mittenti ꝑmo: alia vō q̄ debeꝛ ſtōaco ⁊ iteſtinis reci
piētib⁹ a q̄bus fluit. q̄ debeꝛ ꝑmo cerebro mittēti duplex
eſt. Prima q̄ debeꝛ ipſi cerebro. Scđa q̄ debeꝛ vys ⁊ du
ctibus ꝑ quos mittit. Tertia eſt q̄ debeꝛ tranſmiſſe māe.
¶ Prima eſt vt cerebꝝ ſiquideȝ repletio in eo appareat
euacueꝛ ⁊ mūdificeꝛ a cacochimia ⁊ demū eius cōplexio
tēpereꝛ ⁊ ꝯforteꝛ ne māʒ regeneret. ¶ Scđa eſt vt du
ctus. ⁊ vie per quos nāliter eius ſuperfluitates ꝯſueuerūt
emitti puta nares ⁊ palatum aperti teneanꝛ: q̄re nā apte
per illos poſſit eas more conueniente ⁊ ſolito expurgare:
⁊ ꝓinde: vt currant ad ipſos ſitueꝛ vt iaceat ⁊ dormiat cū
iclinatione capitis verſus anteriorēm parteȝ nō ſupra col
lum: q̄m diuertit eas ab illis ad vias occultas poſterioris
partis capitis per q̄s fluunt ad illa. Ipſe quoq̄ȝ vie occul
te debite ꝯſtriganꝛ vt ifra diceꝛ ꝓpitiāte xp̄o. ¶ Tertia
q̄ debeꝛ māe fluēti donec eūo cerebri fiat illis ex quo fa
cta eſt ei: q̄ ſupereſt aut regeneraꝛ donec cōplexio cere
bri adequeꝛ eſt vt exiceeꝛ vel deriueꝛ. Ex q̄b⁹ hec oēs cō
pleanꝛ res dicte ſupra in cura catarri ſerieſius habuiſti.
Ordinē quoq̄ȝ modū ⁊ vſuȝ aptū vtendi eis. Et ex appro
ꝑatis in ei⁹ retentiōe ⁊ exiccatiōe eſt ſacculus ſupra coro
nalem cōmiſſuram cōpoſitus ex ſale pauco ſandaraca. ſpi
ca ⁊ myrra: ⁊ radice nenufaris: q̄ eſt ꝓpria. ⁊ vltima ē cau
teriçatio ſupra in ꝑmo caplo dicta. Scđa res ꝑncipalis q̄
debeꝛ ſtō ⁊ inteſtinis recipiētibus eſt duplex. ¶ Prima
eſt mundificatio coꝝ ab humore q̄ fluit cū vomitu. ⁊ hoc
cū peruenit ad ſtomacū. ⁊ anteq̄ȝ deſcendat ad inteſtina:
vel cum cliſteribus ſaltem ex quo fluxit ad ipa. raro eniȝ
materia iteſtinorum educiꝛ vomitu vel poſtponit tēpus.
¶ Scđa eſt confortatio ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ cum ſtipti
cis aromaticis ꝓhibētibus effuſiōeȝ materie talis ad ipa.
Ex quibus proprie eſt thus ſpica capillus veneris macis
⁊ alia dicta hic: ⁊ ſupra. Et ide cū calidis valde conſumen
tibus materie reliquiam et alterantibus diſcraſiam im
preſſam in eis frigidam ⁊ humidā ſimplicibus qualia ſūt
ꝓprie cortex citri çinçiber ameos cortex thuris. ⁊ ſimilia
dicta ſupra in mala complexiōe ſtomaci: ⁊ ex compoſitis
intus ⁊ extra. ⁊ per omnem modum approximatis. ⁊ ha
bentibus confortare naturam ⁊ ſpiritū: qualia ſunt diam
bra mitridatum amoruſia et tyriaca. Et ſi eſt flegma

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0343-4

ſalſum ſint min⁹ calida vel frigida ſtiptica. ⁊ ex eis appro
priatis eſt ſemen papaueris albi: ⁊ dyacodion retentuȝ in
ore maſticatũ ⁊ tranſglutitũ. terra ſigillata ⁊ lutũ armenũ
eſt efficax in retinẽdo ip̄m ne fluat retentũ in ore: ⁊ ſuȝ ex
pertus. In ſubtili calõ ꝓprie ſic̃ ſpicã ⁊ thus in frido ꝓpe:
⁊ ipſi⁹ regimẽ ad ſiccitatẽ ⁊ calitatẽ vel frigiditatẽ decli
net ꝓprie. Et qñq3 opȝ: vt miſtres narcotica cõpoſita que
ſunt res magni iuuamenti. ⁊ cura ſtõi eſt cura lubricitatis
ſtõi quã ſupra in cura egritudinũ ſtõi tibi tradidim⁹: illuc
ergo accede. Et cũ fuerit ex colera praſſina cura eſt mũdi
ficatio cũ frigidatiuis lenitiuis ⁊ lubricatiuis. ſcdo ꝯforta
tio ſtõi. cũ ſtipticis frigidis notis ſupra. ¶ Cura epatici ſã
guinei eſt eadẽ q̃ cerebralis cõſiſtit in duab⁹ rebus ſilib⁹
illis. Prima q̃ debeẽ epati mittẽti q̃ triplex eſt ⁊ ea qb⁹ cõ
pleri hȝ ſupra in cura epatis: ⁊ icteritie habuiſti. Et q̃ õbe
tur iteſtinis recipiẽtib⁹ q̃ eſt triplex. ⁊ ea qb⁹ hȝ ꝯpleri hic
⁊ in cura male ꝯplexiõis ſtõi cũ mã tibi tradidim⁹ ſufficiẽ
ter ⁊ bene. ⁊ in ſuma nõ oȝ vt curã icipias cũ ſtipticis ⁊ op
pilatiuis ſuperi⁹ vel deſubt⁹ miſtratis. ꝑducunt. n. ad egri
tudĩes fraudulẽtas ⁊ difficilis eradicatiõis: vt dicit Albo.
Immo icipias cũ eũantibus ⁊ expurgãtib⁹ opationẽ ⁊ re
pletionẽ: c⁹ ſiue ſit apans ſiue nõ ⁊ cũ diminutõe cibi mul
te q̃litatis: vt carnis panis: ⁊ vini: ſȝ ſit content⁹ in p̃ncipio
patiẽs potu aq̃ vel ſauich ordei ⁊ paſſulis piguib⁹. ⁊ ex me
dicinis ꝯferẽtib⁹ ip̄m cũ ſint apata eſt corallus. ⁊ ſi eſt ex
ruptura vene porte vel ramoꝝ eius p̃cedẽte flomia ſi tol
leret de baſilica. Stiptica ꝯglutinãtia ⁊ ſanguinẽ retinen
tia ac ip̄m deriuãtia ſũt ꝯueniẽtia. ⁊ ex appropriatis ẽ ſuc
c⁹ plãtagis cũ lapide ematicis. Et ſilr̃ ſi ſit ex vlcere cura
ẽ cura vlceris cũ ꝓprys epati: ⁊ cũ apitis ſi oppilõ ſit: ⁊ fa
cientib⁹ penetrare ſanguinẽ. ⁊ in hoc ꝓpriũ diacalamẽtuȝ
tiriaca ⁊ vinũ ſubtile fricatio ⁊ balneũ ⁊ piccatio ⁊ hmõi. ⁊
cũ tẽperãtib⁹ ei⁹ ꝯplõnẽ nõ multũ frigidis ne mãm reti
neãt in eo ⁊ iclineẽ nec multũ calis ne diſſoluãt: ⁊ cũ cõ
fortantib⁹ ſi debilis exiſtat ⁊ q̃lia ſint hec ꝯplentia ſupra i
cura ei⁹ ſunt dcã mũdificãtia ⁊ mãȝ ab iteſtis diuerſã ſm̃
diuerſitatẽ ſpẽi eius ibi ẽt hũiſti. ⁊ in cura doloris ſtõi. ⁊ iã
ꝯfortantia ⁊ ſtipticãtiã hic ſupra. ⁊ cura aquoſi eſt eadem
q̃ ⁊ lotiui: q: mũdificatio: ⁊ digeſtiue epatis ꝯfortatio. Sȝ
oȝ vt illas cũ fortiorib⁹ cõpleãt. ⁊ ex ꝓprys ei eſt pot⁹: ſe
minis: ⁊ cliſteria ſucci ligue arietis ⁊ laudanũ cũ vĩo ⁊ oĩa
ꝓuocantia calã. ꝯfortant. n. digeſtiuã epis ⁊ educũt aquo
ſitatem a ſãguine. ⁊ ſic retinẽt. ⁊ ex illis eſt ꝓprie ſpica caſ
ſia lignea ⁊ hmõi. ⁊ ſi ẽ ex ꝯuerſiõe aq̃ aſciticoꝝ i venis il
lis iuuaẽ: ⁊ regimẽ ac ſiccitatẽ tẽdat. ⁊ cura ſãguinei nigri
⁊ feculenti eſt due res mũdificatio iteſtioꝝ. ⁊ epis ab hũo
re tali ꝓprie cũ reubarbaro. ⁊ cliſterib⁹ ⁊ deoppilatio ſple
nis ⁊ ei⁹ ꝯfortatio atq3 epis. ⁊ ipſius ifrigidatio vel calefa
ctio ꝓut exigit diſpõ. ſilr̃ regimẽ vt ſupra in cura ſplenis: ⁊
epatis habuiſti. ⁊ ſi eſt a lõga mora in iteſtis ꝯforteẽ expul
ſiua ipſoꝝ ⁊ debiliteẽ ꝯtẽtiua. Cõpleaẽ aũt cũ humidis le
niẽtibus vel lubricãtib⁹ notis. ⁊ eadẽ eſt cura nigri melã
colici q ex epe eſt. ⁊ cura nigri fellei eſt feſtina mundifica
tio eius ne ſua malitia morã trahẽdo vlceret iteſtia. ⁊ hec
cũ bibitis. ⁊ cliſterizatis notis ſupra in cura epis. ⁊ ſplenis
⁊ epatis ⁊ totius corporis ẽt ꝯfortatio ⁊ alteratio cũ regi
mine declinãte ad frm ſtipticũ moderate. ⁊ cura eius qui
eſt diuerſoꝝ coloꝝ eſt eq̃tio ꝯplõnis mẽbroꝝ nutritiuoꝝ
⁊ ẽt regimis ⁊ illoꝝ hũoꝝ mũdificatio p̃cedẽs. ⁊ cura chi
loſi eſt ꝯfortatio attractiua epis: cũ calis ꝓprys emplis ⁊
vẽtoſis aptio oppilõnis viaꝝ eius ⁊ meſeraicaꝝ ⁊ dimiu
tio cibi cũ tẽperamẽto: ⁊ potus: ⁊ oĩa hec cõplentia ſupra i
cura epis dicta ſũt. ⁊ cura ſplenetici q plurimũ eſt melãco
licus eſt tres res. ¶ Prima eſt ꝯuerſio regimis ad humo
ris boni ⁊ ſanguis gñationẽ. ¶ Scđa eſt ſplenis rectifica
tio cũ purgatõe ⁊ eũone hũoris melãcolici: ⁊ cũ deriuatõe
eius ꝓprie cũ vẽtoſis poſitis ſupra ſplenẽ cũ apertiõe op
pilatõis ſplenis ⁊ ei⁹ ꝯfortatõe. ¶ Tertia eſt mũdificatio
ſtõi ad quẽ plus melãcolicus hũor ꝑuenit. ⁊ deide iteſtio
rũ ad q̃ duo maxĩe tẽdit hũor mlicus ⁊ ipſoꝝ confortatio.
Et ea qbus hec ꝯpleanẽ ſupra ĩ cura ſplenis ⁊ hic dcã ſũt.
Et ex appropriatis huic fluxui eſt rauedſeni: ⁊ reupõticuȝ
nigrũ. aggregat. n. in ſe vtutẽ in cõi ꝯueniẽtẽ. Et ex cõpoſi
tis eſt diaſcene. Et ex appropriatis in retẽtiõe ipſi⁹ ex ſim
plicib⁹ eſt aq̃ myrre ⁊ xilo aloes. Et ex cõpoſitis miclerũ.
⁊ ex ꝯfortãtib⁹ eſt diamuſcuȝ dulce. ⁊ ſilia. Cura flux⁹ dia
rici ex p̃dictis in p̃ncipio vbi de regimie cretici ⁊ ſinthõa
tici dcm̃ fuit: eſt gñalr̃ nota. Spãliter ãt vbi oporteat ipȝ
retinere eſt due res. Prima debeẽ toti ⁊ ꝯpleẽ tribus mo
dis. ſ. cũ eũone toti⁹. ⁊ hec cũ flomia vel farmacia ſi tolle
ret vtus ⁊ cũ deriuationẽ mãe. ⁊ hoc cũ vomitu. Ingt eni
hyp. A diaria habito diuturna ſpõtaneus ſupueniẽs vomi
tus ſoluit egritudinẽ. ⁊ ẽt artificialr̃. ars. n. eſt imago nãe: ⁊
ſequela ipſi⁹ ſm hyp. Et ſilr̃ cũ fricatõe ꝓpe vlr̃ totã cuti
q̃ calefaciat ⁊ poros apiat; ⁊ reſoluat vel iſpiſſatõe ipſi⁹. ⁊
coanguſtõe viaꝝ: ⁊ poroꝝ per quos fluere hũt: ⁊ cũ dietã
extenuatiua declinãte ad ſtipticitatẽ. ¶ Scđa res debeẽ
iteſtinis ſi ĩ eis aliq̃ ipreſſio facta ſit q̃ ex p̃dcis pȝ. ⁊ ex ap
propriatis eſt vt ſumaẽ vẽter ſtrucy: ſed pȝ qd̃ limeẽ cũ li
ma ⁊ deẽ in potu ex eo q̃titas. ȝ. iy. in rob mirti. aut ĩ rob
de citonys ſȝ declinationẽ ꝯplõnis. Cura liq̃factiui flux⁹
gñaliter eſt cura ptiſis ⁊ ethice: ⁊ ſpãlr̃ eſt due res. Pria ẽ
q̃ recipit cãm ⁊ eſt alteratio ⁊ ifrigidatio corpis ⁊ mẽbro
rum p̃ncipaliũ. Et ꝯplentia ſunt frigida moderate ſtiptici
tatis ⁊ frigiditatis nõ vehemẽtis q̃ extinguant caliditatẽ
naturalem: ⁊ ſubito retinentia. ſua. n. forti ſtipticitate op
pilando ꝓhibent tranſitum nutrimenti ſimplicia ⁊ cõpo
ſita ex medicis cibis ⁊ potib⁹ actu frigidis nutritiuis. ⁊ re
ſtaurantib⁹: quales ſunt ex carnibus perdicũ ⁊ gallinaruȝ
p̃paratis in gelatina: ouis ſorbilibus ⁊ ſorbitiõib⁹ ex lacte
in quo extinctũ ſit ferrum. Et meli⁹ eſt lac muliebre: deĩ
aſine deĩde capre. deinde bouinũ. Et ex farine ordeo. ⁊ ſe
mine acetoſe: qm̃ eſt ꝓpria. Et qñq3 inſpiſſaẽ cum gũmi
draganti ⁊ puluere coriandri. qd̃ eſt ꝓpriũ. Inſpiſſat. n. hu
miditates ⁊ eas reddit viſcoſas ⁊ adherẽtes mẽbris ⁊ ꝑ
inde min⁹ liq̃factibiles. Et ex illis eſt charabe ⁊ puluis co
riandri ⁊ iuſqami ⁊ folia ſurice ſunt ꝓpria in iſpiſſando et
ꝓhibẽdo liq̃factionẽ ⁊ reſolutionẽ. Et alia q̃ nõ ſubito: ſȝ
paulatim retineãt ⁊ ꝯſtringant que opȝ eligere ex p̃dictis
ſimplicibus ⁊ ꝯpoſita ĩfra dicenẽ duce xp̄o. Scđa eſt con
fortatio membrorum digeſtionis ⁊ miniſtratio ciborũ ⁊
potuum reſtaurãtium humiditates diſſolutas. Et cõplen
tia talia ſupra in cura ſtomaci. ⁊ epatis ⁊ cura ptiſis copio
ſe habuiſti. Et ſi eſt a radicalibus membris oportet q͛ tu
procedas cum fortioribus. Si võ a carniformibus ſuffi
ciunt leuiora. Et cura fluxus ſanguis q ꝓcedit a toto cor
pore generaliter eſt cura fluxus ſanguinis procedẽtis ab
epate ⁊ diarici. Spãliter autē vbi ip̄m oporteat retine
re eſt due res. p̄ma aufert cãm: ⁊ debeẽ toti corpori fit au
tem tribus modis. p̄mo cuȝ euacuatione plectorie: ⁊ illud
eſt flebotomia vene nigre vel baſilice vel ꝓportionalib⁹
ſibi que ſciuiſti ſupra ⁊ ꝓprie ſi ſint ei conſueta. q: conſue
uit habere fluxũ ſanguis ex naribus emoroidibus vel mẽ
ſtruis que fuit ei priuatus: quare reiteratio ⁊ ꝓuocatio il
lius cum hoc qd̃ proportionalis flebotomie cura eſt eius
⁊ cum extenuatiua dieta. reiteratiua vero exercitiy cõſue
ti qd̃ vltra ſolitum excedere oȝ ſi cum membri mutilatio
ne ſit licet euacuet. ⁊ deriuet plenitudinem. q: tamen cor
pora turbat in cura huius locum nõ habet: ſed ipreſſione
magis. quare vice huius vniuerſalis fricatio ordineẽ. eua
cuat. n. per poros inſenſibiliter ſicut illud ⁊ deriuat ſine
turbatione. Scđo cum deriuatione ⁊ inſpiſſatione ſãguis

⁊ eius infrigidatione. Tertio cum viarum coangustatiõe
ex qbus breuiter ꝯpleant̃ nota ſunt ex ꝑdictis. ſcꝺa eſt vt
ſi fcã ſit ĩpreſſio aliq̃ ĩ iteſtinis ꝓcedat ad alia q̃ mũdificãt
ſtipticãt ⁊ ꝯfortãt ⁊ retinẽt. Et adhec ꝓpria eſt accatia cũ
ſanguine draconis ⁊ karabe: ⁊ ſpẽs luti: ⁊ lapis ematbitis
cũ ſucco plãtagis: vel cõſolide: vel caude eqne ſũpta ⁊ cli/
ſteriçata: ꝓut regio exigit. Et cura colice paſſiõis ẽ diffici/
lis. ⁊ maxime in ꝓceſſu: eſt. n. acuta: ⁊ ſine intermiſſione ⁊
prauoꝝ accidẽtiuꝫ. ⁊ plĩmoꝝ terrẽtiũ: q̃re ĩdiget medico
ꝯſtãti ⁊ prudẽte: quẽ nõ terreãt accidẽtia. Et gñalr̃ ẽ cura
vomitꝰ ⁊ fluxꝰ dicta ſuperius. Specialr̃ aũt eſt q̃tuor res.
Prima debet̃ mẽbris nutritiuis ſcꝺe ⁊ tertie digõnis ma
los hũores quos generãt mittẽtibꝰ ad iteſtina ⁊ ſtomacuꝫ
Scꝺa q̃ debet̃ iteſtinis ⁊ ſtomaco recipiẽtibꝰ ⁊ expellenti
bus illos. Tertia ẽ q̃ debet̃ virtuti: ⁊ ẽ regiminis rectifica
tio ĩ cibis ⁊ potibꝰ: ⁊ vlr̃ ẽt ĩ oĩbus ſex rebꝰ non naturalibꝰ.
Quarta ẽ q̃ debet̃ accñtibꝰ prauis ĩſurgẽtibꝰ ⁊ ẽ ipſorum
correctio: q̃ ĩfra dicet̃ ĩ fine. ſi xp̃s adiuuerit. ¶ Pria ẽ tri
plex. Una ẽ ipoꝝ mẽbroꝝ. ſ. epis ⁊ venaꝝ ⁊ alioꝝ mẽbro
rum mittẽtiũ euo: q̃re oꝫ vt fluxꝰ ⁊ vomitꝰ nõ cõſtringat̃
ſꝫ dimittat̃ donec repletio ſeu cachochimia ſit expurgata
perfecte: ⁊ illud ẽ cũ ĩ egeſtiõe egredit̃ chilus vl̃ aliqd ho/
mogeneũ ꝑducẽs ad defectuꝫ: ⁊ ſi qdẽ nõ ꝓcedat ad ſuffi
ciẽtia iuuet̃ cũ leuibꝰ: ⁊ vomitu. Jngt. n. hyp. vomitꝰ vo
mitu. ⁊ fluxꝰ fluxu: ⁊ fluxꝰ vomitu: ⁊ ecõuerſo curat̃. Juue
tur itaq̃ꝫ vomitu: ⁊ ꝓprie cuꝫ aderit nauſea: cũ aq̃ ſimplici
tepida: vel cũ pauco aceto: plĩmo. n. mordet̃ ſtomacus ⁊ i/
teſtina: vel cũ aq̃ mellis: ⁊ oximelle acetoſitatis pauce. vl̃
aq̃ cal'a cuꝫ pauco baurach: aut cũ ſale naptico: aut pauco
cimino qꝺ ĩ hoc ẽ iuuatiuũ valde ſcꝺm diuerſitatem mãe
nõ cũ oleis: ⁊ vnctuoſis qm̃ mollificãt ⁊ debilitãt. Et iuue
tur fluxꝰ cum cliſteribꝰ lenitiuis vel abſterſiuis. ſ. ex aqua
ficle pauco baurach: çuccaro ru. ⁊ oleo ro. vel ſiſamino. Et
cũ colirijs ex melle ſeu çuccaro: ⁊ mãna: vl̃ cũ aliquo ex le
nitiuis qꝺ deponat ſuauiter: ⁊ ꝓprie cũ hũor ẽ deſcẽdens
qꝺ ex grauedine ⁊ pũctiõe vẽtris ꝑcipies: ſic. n. opꝫ iuuare
illos: vt mõ vnũ mõ aliũ ſcꝺm declinationẽ mãe. quomo/
docunq̃ꝫ. n. iuues curabis illũ ⁊ aliũ: illũ euãdo. ⁊ alium
deriuãdo. Simul aũt eos artificialr̃ iuuare nõ oꝫ. ſeq̃ret̃
eñi ꝯtrarius motꝰ mãe ꝑducẽs ad reſiſtẽtiam. vt ait Abo.
¶ Scꝺa ẽ mãe: ſeu hũoris ꝺriuatio: getatio: ĩgroſſatio: vl̃
ꝯpõ ſi ꝑꝑ eꝰ effrenitatẽ. alia nõ ſufferrẽt: ⁊ ꝯplẽtia ſupiꝰ nõ
ſũt. ¶ Tertia ẽ viaꝝ ⁊ ductuũ coãguſtatio. ⁊ ꝓprie cũ ſuc
co barbe yrcine. Luto armeno: ⁊ alijs q̃ ſupiꝰ habuiſti ĩ cõ
ſolatiõe medicinaꝝ. ¶ Scꝺa ꝑncipalis que debet̃ ſtõ ⁊ i/
teſtinis ẽ duplex. Una vt ſi q̃ mã adheſerit eis mũdificet̃
⁊ cũ ꝑdictis modis. Scꝺa ẽ vt ꝯfortet̃ ſtipticis ⁊ alterãti/
bus ⁊ retẽtiuis quatenꝰ ĩfluxas mãs: ſi adhuc fluãt nõ ſu/
ſcipiãt: ⁊ ad priſtinã diſpõnẽ bonaꝫ adducant̃: ac eq̃litate
ꝯplonis ⁊ ſube: q̃ ꝯplẽtia ex ꝑdictis ſunt nota q̃ eligas ꝓut
oꝫ. Et ſũt ex ſpẽbꝰ rob: ſyrupis trociſcis: ⁊ pulueribꝰ ĩtus ⁊
extra empl'is ⁊ cerotis notis ibi ſupra: cal'is ⁊ fridis: prout
diſpõ exigit. Et ex appropatis ẽ aq̃ andachoche: qm̃ ꝯfert
ei ſtringẽdo vẽtrẽ. Et ſi qdẽ nulla facta ſit ĩ eis ĩpreſſio nõ
oꝫ ad alia ꝓcedere: ſꝫ regere tm̃. Regimẽ ergo qꝺ quarta
res erat ẽ: vt nullo mõ cibet̃: nec potũ ſumat. donec fame/
ſcat ſi virtꝰ eiꝰ tollerat tãdiu. Et tũc balneet̃ ꝑus. deide cõ
tẽtet̃ patiẽs aliquo cibo leui boni chimi: ſicut ẽ ſauich or/
dei: vel amidi: vl̃ ex granis granatorũ cõtritoꝝ cũ pulpis
eoꝝ: ⁊ ſumach ĩ ꝑncipio. Et cibet̃ deide cũ carnibꝰ ꝑdicuꝫ
⁊ auiũ paruaꝝ: ⁊ ꝓprie mõtanaꝝ vel minutaꝝ ⁊ piſcium
cũ agreſta: vel ſucco granatoꝝ cõditoꝝ: ⁊ decoctoꝝ cũ co/
riãdro ꝑparato. Et potet̃ aq̃ granatoꝝ muçoꝝ: ⁊ aliorum
fructuũ põticoꝝ: ⁊ aqua frida hñte vtutẽ floꝝ vue. Et qm̃/
q̃ iuuat̃ cal'a. q̃z ſpgit mãm: ⁊ facit ſudare: q̃ ſi nõ tolleret
ſtõs aquã potet̃ odorifero vio põtico bñ liphato cũ aq̃ fer
rea vel pluuia li: ⁊ hoc in diſpoſitione calida. Jn frigida ve
ro cibetur cum pane diſſoluto in vino pontico ⁊ rubeo: ⁊
ouis ſeroſis in prinncipio. deinde cum carnibus columbo
rum ⁊ paruuloꝝ nõ pinguiũ: vel gallinaꝝ cũ ſpeciebꝰ ⁊ vi/
no paſſo ⁊ rubeo paꝝ limphato. Et paulatiꝫ addat̃: donec
ꝯfortet̃ ⁊ redeat ad diſpõnẽ ſanitatis. Qꝫ ſi vtꝰ nõ tolleret
vſq̃ꝫ ad ꝑfectaꝫ purgationẽ: ⁊ cadit in medio: ⁊ ſincopiçet
viuificet̃ cũ pane ſimilagineo calefacto ĩ vino: deide cibe
tur colaticio: vl̃ aq̃ gallinaꝝ iuuenũ: diſtilata q̃ ex ꝓprijs
carnibꝰ eaꝝ: vel ꝑdicũ cõtritis ⁊ decoctis ĩ duplici vaſe: ⁊
expreſſis colligit̃: vt docuit Abo. ĩ q̃ ſit virtus ſandali: ma
gaçir ⁊ ſpodij ĩ diſpõne calida: ⁊ fiat acetoſa cũ agreſte: ſuc
co vel granatoꝝ acetoſoꝝ: vel citonioꝝ: vel macianoruꝫ.
Jn frigida vo ſit hñs ſilr̃ virtutẽ xiloaloes: mẽte vel galie.
Et ſi diſſoluat̃ panis ſimilagineꝰ ĩ ea ẽ virtuoſior de q̃ det̃
paulatine. Qꝫ ſi nõ tolleret ſtomacꝰ cibos: ⁊ abhorreat do
nec nõ accipiat: oꝫ vt ei tribuas fructꝰ põticos: quos maſti
cet: ⁊ vgat ꝓiecta ſuba: donec viuificet̃. Ex qbꝰ ſũt fructꝰ
delectabiles. Et ex illis ẽ vua paſſula maſticata cũ cõtri/
tione ſuoꝝ granoꝝ. deide viuificato ⁊ roborato ſtõ cibet̃
ex ꝑdictis cibis: ⁊ ſupdormiat: qm̃ ſomnꝰ eſt cura eiꝰ ⁊ mi
niſtrent̃ odorifera: qm̃ ꝯfortãt cor ⁊ cerebꝝ: ⁊ gñant gau/
diũ: ⁊ ſedãt nauſeã: ⁊ võitũ: vt ſupiꝰ hũiſti. Qꝫ ſi tardet diu
in ſtõ eiꝰ cibꝰ iuuet̃ digerere faciẽtibꝰ. ⁊ faciẽtibꝰ penetra
re. ſ. vino dyatrion: dyacalamẽto: ⁊ tiriaca: ⁊ trahat̃ cũ ĩpo
ſitione extremorũ ĩ aq̃ calida ꝯpreſſione ⁊ fricatiõe: ⁊ cũ
vẽtoſis ĩ vmbilico ⁊ epe. Et cũ fortificatus fuerit: redeas
ad mũdificationẽ corruptiõis ⁊ ĩdigõnis: ⁊ cachochimie
donec ſit expurgata ꝑfecte. deide ẽt de ſtõ ad mẽbrũ: bal/
nea ẽt poſt tertiũ: ⁊ ciba paulatim: donec ad diſpõnem re/
deat ſanitatis. Regimẽ aũt ĩ alijs rebꝰ ĩ oĩ regimine reſer
uet̃ ĩfra. Correctio quoq̃ꝫ accidẽtiũ cũ ĩfra de eis dicet̃ ad
plenũ ꝓpiciãte xp̃o. ¶ Cura eiꝰ q factꝰ ẽ a cibo. ẽ breuiter
tres res. pria ẽ mutatõ regimis ĩ ꝯtriũ qꝺ ẽ cã eꝰ. Scꝺa ẽ vt
dimittat̃ fluere: donec corruptꝰ ⁊ ĩdigeſtus cibꝰ totaliter
exeat: ⁊ interim abſtineat ꝓprie ſi quãtitas ſupflua fuerit
retẽtio: aut ipſiꝰ cã ẽ colice paſſiõis. Tertia ẽ vt ſtomacus
⁊ iteſtina relaxata a multitudine nocita a q̃litate acuta ⁊
ſuba ſubtili leui: vt ĩ ſupioribꝰ dcm̃ ẽ reaggregent̃ ⁊ cõtẽ/
perẽtur exaſperẽtur: ⁊ confortetur etiã totũ corpꝰ qꝺ fuit
nutrimẽto ꝑuatũ: ⁊ extenuatũ: ⁊ debilitatũ: bonis cibis:
⁊ humectãtibꝰ reſtauret̃. Et ſtercoroſi regimẽ ẽ tres res.
Pma ẽ vt cibet̃ cibis multe q̃ntitatis: ⁊ paucarũ ſupfluita/
tũ: ⁊ ſint moderate quantitatis: donec ſufficiat. Scꝺa ẽ vt
aperiant̃ vie alimẽti cũ ficubꝰ: ⁊ fiſticis cũ amigdalis nuci
bus: ⁊ alijs apitiuis ⁊ faciẽtibꝰ penetrare cibum ꝑdictis.
Tertia ẽ vt cõfricet̃ mẽbra vlr̃ ⁊ balneent̃. donec trahãt
multũ ex cibo: ⁊ ꝑ poros ſi qdẽ eis ſupfluat reſoluatur ne
redat̃ ſtõ ⁊ iteſtinis. Et cura eiꝰ q factus eſt a medicina di
cta ẽ ſupra ĩ ꝯſolatõe medicinarũ. Ex his aũt q̃ abraſionẽ
ꝓhibẽt iteſtinorũ ab acumine medicine eſt bdelium: licꝫ
in via ꝑuiſionis nõ curatiõis ſicut illud. Et cura facti ab
aere eſt q̃tuor res. pria eſt ꝯtẽperare aerẽ: vt ſupra in cura
cordis: ⁊ alijs dictũ ẽ. Scꝺa ẽ corporis euo ſi aliqua ſit re
pulſio diſſolubilis vel cõpreſſibilis: ⁊ hec cuꝫ flebotomia
vel farmacia: ꝓut repulſio reqrit abſtinentia ieiunio ⁊ fa
me. Tertia ẽ mãe ĩſpiſſatio ⁊ ĩgroſſatio ſi a caliditate eiꝰ
diſſoluẽte fuerit: ⁊ hoc cũ cibis groſſis ex carnibꝰ bouinis
⁊ extremis aĩaliuꝫ decoctis in lacte ⁊ frumẽto riſo: ⁊ ſimi/
libus: ⁊ iuiubis coriãdro: ⁊ papauere: ⁊ alijs fridis: vel ipiꝰ
retractio ad mẽbra: qbus cõprimunt̃: ſi a frigiditate eius
fuerit: ⁊ hoc cũ fricatione vlĩ cũ manibꝰ ⁊ pãnis calidis ⁊
ſiccis: ⁊ ſilr̃ balneis. Quarta eſt iteſtinoruꝫ mũdificatio ⁊
cõfortatio cũ his que nota ſunt ſupra: vt folijs barbe yrci
ne: vel eius ſemine. Et cura excoriatiui ⁊ vlceroſi eſt cura
diſinterici dcã ſupiꝰ. Et cura hũoris flatici colici ⁊ melici

eſt cura dyarici: ⁊ ē nota. Seqtur qnta res cōis curatiua fluxus: ⁊ ē regimen. ſ. cōmune ꝯueniēs ⁊ vniuerſas res nō nāles rectificās debito mō īſinuās ⁊ demōſtrās: locet̃ ergo pͥmo patiēs ī domo tēperati aeris iter actiuas declinātis ad ſiccitatē: ⁊ ſi nō ſit naturalr̃ fiat artificialr̃ cuꝫ bis q̄ ſciuiſti ſupra ī cura cordis: ⁊ lucidi nō tenebroſi. qꝛ recludit vitio res ⁊ ſpūs ad īteriora: ⁊ clari non turbati. qꝛ aer turbatꝰ triſtificat aīam: ⁊ pmiſcet hūores ſcðꝫ Abo. Qui ſi turbatꝰ exiſtat clauſis portis fiat cū luminaribꝰ lucidus ⁊ qeſcat ī lecto moll̃ culcitre. durus. n. cōfrāgit ⁊ debilitat ⁊ frequēti reuolutiōe ī eo mouet hūores. Jnqt. H. Mouētibꝰ nobis mouent̃ ⁊ ea q̄ ſunt ī nobis: q̄re nō oꝫ vt moueat̃. imo īgeniet̃ cū excitat̃ ad ſellā: vt in lecto. vel iuxta ipm ſituet̃ ſella: vt ceſſet a motu. Jnqt hyppo. ī affo. Manifeſtat nauigatio: qm̄ motꝰ corpa turbat. Jn cibis aūt regimē ē vt nō ſit ī eis acuitas: nō dulcedo: n̄ ſalſedo: nec aceroſitas multa: ne ſua mordicatiōe vigilet expulſiuā ⁊ pͥ̄prie cū pueīt ad vlcera q̄ dilatet nō vnctuoſitas mlta: nec hūiditas: nec liqditas ne debilitēt ꝯtētiuā: ⁊ fluāt: ſed ſint īſipida ⁊ tēperati ſaporis ac delectabilis: vt acris ⁊ ſtiptici vel agreſti: qm̄ appetitū excitat ⁊ reſtringit: ⁊ ſube ſpiſſe: ⁊ ſolide: ⁊ q̄litatis ſicce calide vl̃ fride actu vel potētia: put exigit diſpō ⁊ ſtiptice parū ī pͥncipio: donec fiat mãe eūo. ⁊ mūdificatio: lꝫ. n. hūidi plures ꝯueniāt eūoni ⁊ mūdificatiōi: tn̄ parū ſtiptici ꝯferūt: ꝯfortāt. n. mēbra ⁊ mām effrenitare nō pmittūt: nec mūdificationē īpediūt: q̄les ſūt lac decoctū cū lapidibꝰ fluuiorū ignitis vl̃ ferro. Et ē melius pp ſtipticitatē ſuā: ⁊ panis īfuſus in eo adhuc: aut euacuat hūiditates corruptas: ⁊ colericas corrūpētes. ⁊ qð remanet in corpe tēperat̃ ⁊ refrenat̃. Sꝫ oꝫ vt lac ſit q̄titatis ꝯueniētis: quā digerere poſſit: vel ſit īfuſum ī ſucco granatoꝝ ⁊ ſorbitio ex ordeo aſſato ⁊ riſo cū lacte cocto frigida ⁊ amido. Deīceps vͦ mā adhuc fluēte ſint electi ſcðm alterā trium virtutū. vel qꝛ ſint ſtiptici plures: vt conſtringant ductus. ⁊ retineāt: q̄les ſūt ſorbitiōes facte ex milio panico: vel riſo torrefacto: vel ſumach: vel lētibꝰ excorticatis cū amilo ðcoctis· tū aqua pluuiali vl̃ ferrea: ⁊ cōditi cū pauca pinguedine galine edi: vel capre: vel yrci. ⁊ cuꝫ pauco ſale torrefacto oleo onfacino. vt ſint ſapide. Et ſi vis vt ſint magis ſtiptica. fac decoq cū eis aliqð ex fructibus pōticis: ⁊ ſi vis calidos expetente diſpoſitione condias cum cinamomo pontico xiloaloes cimino vel aniſo torrefactis ameos ⁊ ſimilibꝰ. vt caſeo aſſato: vel coagulo: vel ſint ſpiſſe vel viſcoſe ſubſtantie vt materiam ingroſſent. quales ſunt ſorbitio facta ex candaruſio que ſtringit ⁊ ingroſſat ⁊ maxime ſi addatur gummi dragaganti torrefactum. ⁊ ex tri. ⁊ riſo decoctis cū pedibꝰ aīaliū ⁊ lacte bouino. Et lētes excorticate vel decocte cū corticibꝰ bis: ⁊ illud mutatū Et ēt caules bis cocti: ⁊ portulaca ⁊ acetoſa ⁊ plātago. ⁊ ſimilia. Et carnes bouine cū puluere coriandri ſi virtus digeſtiua tolleret. Juuetur cū ſeminibꝰ ⁊ ſpēbꝰ calefacientibus ⁊ ſubtiliantibꝰ vel ſint expingentibꝰ mām ⁊ ē ſorbitio facta ex amilo cū ſemie papaueris albi: ⁊ coriādro viridi. ⁊ lactuca factis acetoſis cū granis granatoꝝ vel agreſte ⁊ tādiu miniſtrent̃ donec ſiſtat̃ mā ab effluxione ⁊ fluxu. Jn carnibꝰ aūt nō eſt iuuamētū magnū cū ſint mlti nutrimēti valde addētes ad māꝫ niſi apud neceſſitatē: ⁊ tūc eligant̃ volantia ſup pedeſtria: ⁊ pedeſtria ſuper aquatilia. Et ex volatilibꝰ eligantur q̄ ſint fre: ⁊ ſtiptice velocis digōnis vt ſunt pdices conturnices: turtures turdi nutriti ex mirtilis. Uel ſtiptice calide vt ſunt columborū ſilueſtriū pulli nō pingues paſſerū: ⁊ qualiaꝝ. Et ex pedeſtribꝰ q̄les ſunt capreoli: lepores. cuniculi: gaçeli: ⁊ anetū caſtratoruꝫ ⁊ cāpeſtriū ⁊ ſint preparate. qꝛ aſſe vel frixe vel decocte in aqua pluuiali vel ferrea cū fructuū aliquo ponticoꝝ vt citonioꝝ ſorborū neſpuloꝝ vel ſumach. Et ex aq̄tilibꝰ ſunt piſces petrini parui ſquamoſi q̄les ſunt trilie lucy fragilia gābares ⁊ ſimiles. Et ſint aſſati vel decocti in agreſta vel aceto limphato: vel vino pontico cōditis cū ſpēbꝰ ſcðꝫ diſpoſitionē. Et cū māꝫ volumus ingroſſare ⁊ humectare ſint ex aq̄ dulci q̄les ſunt cācri truteparue: ⁊ ſilr̃ preparati. Hora aūt cibandi ē vt in pͥncipio abſtineāt ab oī cibo: vſqꝫ ad duos dies donec mā minoret̃ ⁊ nā reddat̃ auara in tranſmittendo māꝫ ſi q̄ fluat. deīde cibent̃ cibis pauce ſtipticitatis donec euacuet̃ ⁊ mūdificetur mā. deīde alys ſcðm itentionē quā habes vt ſint pauce q̄titatis ⁊ numeri nō mlti niſi faſtidiat. Faſtidientis eniꝫ ſtōi eſt mlta degustare. Seneca dixit. Et cū ſapit alys cōtētent̃ eo. ⁊ opꝫ vt pmittatur ſtipticus vel alys ex fructibꝰ ponticis cuius ſuba trahatur: ſed viſcoſitas tantū ⁊ ſumpto cibo pmant̃ extrema ⁊ pprie: ſupiora. Qꝛ ſi nō ſufficiāt cibi pdicti qꝛ ꝓlongetur fluxus ⁊ debilitet̃ ṽtus oꝫ vt ꝯcedas cibos ex carnibꝰ pdictis ⁊ eligas cibaria pauce q̄titatis ⁊ mlte q̄litatis q̄lia ſunt epata gallinaꝝ iuuenū ⁊ pinguiuꝫ: teſticuli galloꝝ nōdū coeuntiuꝫ aſſati ⁊ vitelli ouoꝝ ſeroſi: ⁊ ſilia q̄ in cura ptiſis habuiſti. Jn potibꝰ vero regimē cōe eſt vt abſtineat oīno ſi poſſibile fuerit: eſt. n. cura p ſe ⁊ abſolute ipſiꝰ. Qꝛ ſi ſitiat vehemēter nec tolleret potus ſit aq̄ pluuialis vel ferrea pauca ſimplex vel cōmixta alicui ex ſuccis vt granatoꝝ agreſte citonioꝝ: vel robub. ſtipticoꝝ vl̃ çuccaro antiquo: vel ſit habens ṽtutē maſticis ⁊ cinamomi ſcðm diuerſitatē diſpōnis ⁊ pprie in pͥncipio cū mā eſt mlta ⁊ calā. Et īterdicat̃ ei vinū: quoniā inflāmat ⁊ diſſoluit: effumat ⁊ repere facit ſubtile eiꝰ ad ſupiora q̄re dolor capitis ⁊ mētis pcuſſio valde timet̃. Qꝛ ſi ſtōacus aquā nō tolleret ⁊ ṽtus ſit nō regrens qꝛ debilis vt reuiuiſcat ⁊ cōfortetur detur ei vinū maxime ſi appetat tunc: ⁊ maxime in ꝓceſſu ſit aut nigrū palmeū ⁊ ponticū puꝝ vel limphatū ſcðm diuerſitatē diſpōnis mãe ⁊ mēbroꝝ ſuperioꝝ aīalium ⁊ īferioꝝ nutritiuoꝝ requirit: vt Hyp. dixit vel ſubtile ſi oppilatiuus fuerit fluxus: ⁊ oꝫ vt ſit actu frigidū qꝛ reſtringit ⁊ tepidū reſoluit niſi in eo q ē a debilitate digōnis oppilatōe colerica paſſione ⁊ apoſtemoſo. vt ait Abo. Jn ſomno regimen eſt vt dormiat oī hora ⁊ maxime ſumpto cibo poſt parum quoniā tunc ꝯfortat ſomnus ⁊ quietat humores motos lꝫ prius reuocet ītus ṽtutē ſenſibiles reuocat q̄re qeſcat expulſiua inteſtinoꝝ ⁊ cōtentiua confortat̃ ⁊ ſic fluxꝰ ſiſtitur. vnde Hyp. dixit in affo. Cum volueris elluim magis educere moue corpꝰ: cū vͦ ſtare ſomnū fac ⁊ noli mouere. Et ſi nō potes per ſe vel īpediat̃ artificialiter pcuret̃ ī calā diſpōne cū narcoticis ī frigida: cū calis ſomniferis ordiate approximatis q̄ in cura doloris ſtōi habuiſti. Jn repletione vero ⁊ inanitōe ē regimē vt īaniat̃ corpꝰ in pͥncipio ſi repletū fuerit ianiant̃ īteſtina ex mā īfuſa. deīn ꝯfortent̃. Et finalr̃ corpore: ⁊ īſtinis mūdificatis ⁊ ꝯfortatis repletio ſubſequat̃ paulatim ex laudabilibꝰ cibis predictis. Jn accn̄tibꝰ aīe regimē eſt vt oīa letificantia ⁊ dilatantia aīam p oēs ſenſus approximent̃. Finalis ⁊ vltima res curā fluxꝰ cōplens ⁊ īpediētia remouiens q̄ erat ſexta ſubiungit̃ ⁊ eſt accn̄tiū correctio inſurgentiū ⁊ ſpēbꝰ eiꝰ ſunt aut plura, ⁊ diuerſa q̄ ſuperiꝰ tacta fuerūt in poſitione ſignoꝝ. Et breuiter quedā ſunt ꝓpria: ⁊ eēntialia vt ē punctio dolor ⁊ grauedo ſeu mordificatio viſceꝝ: excoriatio: vlceratio: ⁊ tenaſmon. quedā ex cōmunitate aut ꝓpinqua ad ſtōm vt ſitis nauſea faſtidiū ⁊ vōitus ⁊ dolor eiꝰ. Quedā ad epar vt ē debilitas hydropiſis caceſia: dolor in eo ⁊ grauedo ⁊ illud ꝓpter duo. ſ. pp colligantiā ⁊ vicinitatē ad īteſtina ſolū: ſꝫ qꝛ ſtōacus cōtinuat̃ oībꝰ mēbris mediante epate: ⁊ recipit ſupfluitates oīum mēbroꝝ mediante ipſo. H. dixit ⁊ q̄nq3 in ſplene ⁊ plus. Quedā ex cōitate remota puta ad cor vt ē debilitas: extremitatū fritas ⁊ ſudoris: ⁊ ſincopis ⁊ febris. Quedā ma

gis remota puta ad cerebrū: vt ſunt vigilie ſpaſmꝰ ſiccus
vſq; icipit pmo i mādibularū neruis qbꝰ mouent̄. ppte
rea ex mēbris mobilibꝰ ſunt ppīgora cerebro. ⁊ ſicciora:
pp cutim frōtis ⁊ palpebras q̄ cū moueant̄ lacertis ⁊ ner
uis dilatatis admodū paniculoꝝ ad cerebꝝ nō habentiū
rectitudinē nō ſpaſmant̄ vt illi. ⁊ oculi q͛ ſunt de ſe hūidi
nō ſpaſmant̄ pus aut ad renes vt ē dolor grauedo in eis ⁊
veſica: ⁊ quādoq; ardor. q̄ oīa ip̄rimūt in nāꝫ ⁊ debilitant v̄tu
tē ⁊ ſic curā īpediunt. q̄re correctione ⁊ remedio īdigent.
Et q͛ quorūdā dcā ſunt remedia ⁊ quorundā dicent̄ in p
prys capitulis regrant̄ ⁊ reſeruent̄ ibi. ſolū aūt hic de eēn
tialibꝰ dicemꝰ. Et ppe de tenaſmone cū citet ⁊ trahat īfe
riꝰ māām ad fluēdū ⁊ de alys ſit dictū ſupra de cura diſſin
terici nec nō ⁊ de febre cū ſit addēs ad cāꝫ humoris diſſol
uēdo ⁊ acuēdo: vias apiendo ⁊ dilatando ac mēbra debili
tando oīa miſcētia: ⁊ ſuſcipiētia ſic ſit fluxū fuās ⁊ augēs.
Et q͛ modis pluribꝰ ē nociua: iō de ea q̄ʒtū ad hanc māām
ptinet pus dicamꝰ: deinde de tenaſmone. Sciendū igit̄
q̄ febris quādoq; antecedit fluxū ⁊ fluxꝰ ſequit̄ ipſaꝫ: vt cām
eo mō: vt dcm̄ ē. quādoq; ſupuenit fe. illi ⁊ cōicat̄ illū. quādo
q̄ ſeqt̄ fluxū q ꝑteryt ⁊ ceſſauit pmo mō non ē pn̄tis cōſi
deratiōis. ⁊ de eiꝰ regimie ſupra in pncipio cū de fluxu liq̄
factiuo: ⁊ ſynto loqueremur dcm̄ fuit. Etiā mō nō ē pn̄tis
ītentionis cū illa nō ſit eiꝰ accidēs: ſꝫ morbꝰ aliꝰ factus ei
ſuccedēs. Solū ergo ſcōo mō gn̄ata eſt pn̄tis noſtre ppo
ſitiōis cū tunc ſolū ſit fluxꝰ accn̄s ⁊ nō cā nec ꝯn̄s morbꝰ.
Scire ergo te opꝫ q̄ fe. accidere ⁊ ſupuenire fluxu pōt du
pliciter. vno mō ex ꝯmotione humoꝝ ſpūs īflamāte ⁊ eſt
effimera. Alio mō eſt putreſcentia ipſoꝝ cōmotoꝝ: q͛ in
motu non regulant̄ vel retinent̄ intranſpirabiles fiūt vt
ī eo q ē oppilatiuus ⁊ apoſius eſt putrida: fa ſimpliciter eſt
mala q͛ facit morbi ꝯpoſitionē ⁊ additionē cuiꝰ cura peri
clōſa ē fortaſſe. n. q̄ꝺ vni nocet alteri ꝯfert. ⁊ ecōuerſo. pri
ma nō ē ſimpliciter bona: ſꝫ plurimū mala. Sed circa ſe
cūde correctōeꝫ ē magnū ſtudiū adhibēdū. vt dicit Abo.
Cū. n. ſit cā fluxꝰ cōſeruās ⁊ augens ⁊ ecōuerſo. ⁊ ſint cōue
nientia īdicātia: q͛ fe. īquātū huiꝰ. Semp fr̄a ⁊ hūida. flu
xꝰ vero inq̄ʒtū huiꝰ ſemp ſicca: ⁊ quādoq; fr̄a ⁊ quādoq; cal̄a vt ſu
periꝰ habuiſti. Et inq̄ʒtū in medicatione paſſiuaꝝ ſaltē cō
ueniūt diligēter opꝫ aduertere ordinē: vt. H. docet in ꝯpo
ſitis corrigendis ⁊c. vt prius inſpiciatur ⁊ corrigatur īſtan
tius q̄ʒ in magnitudine moleſtia ſeu leſione ſupet: ⁊ alius
non negligatur miſcēdo illius correctiōis aliqua q̄ alteriꝰ
correctiōeꝫ reſpiciūt ex his q̄ dicta ſunt: ⁊ his q̄ dicent̄ du
ce chriſto. Qz ſi in magnitudine ſint eq̄lis fluxꝰ ⁊ fe. rectꝰ
ordo curatiōis ē vt icipiat̄ a fluxu cū ſit pncipalior in cau
ſando ⁊ febris poſterior: ⁊ cū nō ſit ſolū cauſa conſeruans
⁊ augmētans ſicut fe. ſꝫ efficiens quoq;. ⁊ pinde ſit ēt illō
ſine quo fe. curari non poſſit. Inquit. n. H. Inutiliter quis
prouidebit febribus niſi pus meminerit cauſe. quoniam
nullatenꝰ ē poſſibile curare diſpōnē aliquā penitꝰ adhuc
manente cā faciēte eaꝫ. cū plurimū etiā in magnitudīe ſu
pet: ſic ea correcte fe. ceſſabit. Et ſi remaneat poſt pp cor
rectionē fluxꝰ eiꝰ detenta putredine atq; cā ſine īpedimē
to exierit putretudo fe. meliꝰ digeretur ⁊ expurgabit̄: ac
humectabitur fe. ⁊ frigidis extinguet̄ ⁊ pprie vbi fluxus
iudicet cal̄a. Si ergo fluxuꝫ pus pdicto mō pmiſſis mun
dificantibꝰ q̄ʒtū v̄tus tollerare pōt cū ſiccis curabis ⁊ ſti
pticis fluxū ſiſtentibꝰ q̄ reſpiciāt mēbꝝ mittēs ⁊ recipiēs
viaꝫ atq; māꝫ ad cuiꝰ mūdificationē pp eiꝰ putredinē ne
detineat̄ a ſimpl̄r ſtipticis. ſicut quādoq; aliq̄ ex ſtipticis cō
primēdo ſoluētibꝰ notis ſupius q̄ p īteruolla put v̄tus tol
lerat ⁊ diſpoſitio exigit miniſtrabis ⁊ cū virtutē ꝯfortanti
bus cū cordialibꝰ ex cibis ⁊ potibꝰ ⁊ medicinis ſupius de
monſtratis. qbus alterāte rōne febrilis ſiccitatis admiſcē
da ſunt humida tempate ex medicinis cibis ⁊ potibus in

cura male ꝯplexionis ſicce ſtōi ſupius nūeratis ⁊ hoc v bi
fluxus īdigeat frigidis. Ubi vero cal̄is admiſcenda ſint
hūida q̄lia ſunt ex medicis aq̄ cucumeris cucurbite ⁊ me
lonis: indi ⁊ herbe vt criſolocanna: lactuca: blite: ſpinacia
ſemperuiua: ſolatrum: ⁊ compoſita ex eis: et ex cibis: vt
ſauich ordei. ⁊ amidi ⁊ ſorbitio fcā ex pdictis herbis ⁊ fru
ctibꝰ. Jura gallīaꝝ aq̄ ⁊ colaticia corūdē atq; edoꝝ grana
ta ⁊ poma. Et ex potibꝰ aq̄ çuccari. vel cū iuleb ⁊ ſiſibꝰ pre
ter lac q̄ ſi ſint alicuiꝰ ſolōnis abſtergētia ⁊ lenietēria ꝯfer
ret pp putredinis abſterſionem tn̄ fortiter ſoluāt. ⁊ ea mi
xta tripl̄r. vt. H. docuit miniſtrabis iſto mō particulariter
vt ſimul ſiccas ⁊ hūidas: fridas ⁊ cal̄as: ī eadē medicia ci
bo ⁊ potu eq̄l̄r pmiſcendo. q̄ꝺ ē nō oīo laudabile. ſꝫ ab au
ctoribꝰ ſit oīo ꝯceſſuꝫ ſaltē reſpcū aliquoꝝ modoꝝ cū ſint
aduerſantiū virtutū ⁊ ipedientiū opationū. vt dixit Abo.
ſtōm aggrauētes ⁊ nāꝫ igetātes ac reddētes ſolicitā circa
diſtictionē ipaꝝ. ⁊ ī appropriatōe ipediētes ⁊ diſturbātes
cū nō ſit tota ſoli rei ītēta: vt inuit hyppo. Alio mō tpal̄r
vt nūc ſtiptica pp fluxuꝫ: nūc hūida pp fe. ⁊ nūc ſtiptica in
medicis miniſtrabis īteriꝰ pp fluxū. nūc i cibis ⁊ potibus
hūida pp fe. Tertio mō local̄r: vt īteriꝰ ſicca pp fluxū: ⁊
exteriꝰ hūida pp fe. ⁊ īteriꝰ cal̄a dcā ſupiꝰ pp fluxū quādoq; ⁊
exteriꝰ fr̄a pp fe. Sic epithimabis cor cū fridꝰ ſupiꝰ dictis
ī cura cordis. Epar cuꝫ ceroto de ſandalis. Et ſpinam: naꝫ
dorſi cum ceroto Galieni: quorum d̄ſcriptioneꝫ in noſtro
antidotario habes ēt q̄ pp fluxū ſtōm ⁊ īteſtina ⁊ mēbꝝ ſi
q̄ꝺ ſit mitēs ſtipticis empl̄abis: ⁊ quādoq; cal̄is. pdicta vͦo mē
bra cū fridis ⁊ hūidis pdictis: vl̄ alys pp fe. Circa corre
ctionē fe. ſcōo mō īſurgētis q ē effimera ſciēdū q̄ lꝫ in ali
quo fluxu: puta lubricatiuo fl̄atico: vel ex frigore feb. ꝯpe
tat alterādo: ⁊ māām ꝯſumēdo ſtudēdū tn̄ cū hoc ne illam
aliq̄ʒdiu dimitas ppterea quoquo mō augmētes. Eſt enī
moleſta nāe ipiꝰ actiōes vl̄r ledēs ⁊ paſſiōes: vt āit yſaac:
īpediēs curā: atq; ꝯponēs. Et nūc maxie cū ī aliō genꝰ mu
tetur. Jpa. n. de ſe paucā vel debilē īdicationē. vt. H. dicit.
imo ſp cū aliquo frido remitas. ⁊ cū tibi ſuffecerit debito
mō extiguas: put ī ſcōa ſectōe ſi xp̄s ānuat deſcribemus.

¶ Caplm̄. iiy. de tenaſmone ⁊ medicinis eius.

Sequit̄ ꝺ tenaſmone deiceps dr̄e ſic̄ ppoſuimꝰ in
caplo pcedēti. Eſt aūt tenaſmon ſcōm. H. expreſ
ſio recti īteſtini: cuiꝰ cā ē res moleſtās vel grauās
ipi īteſtino adherēs ⁊ īfixa: ad cuiꝰ expulſioneꝫ mouet̄ nā
cū conamine ⁊ expreſſiōe pp eiꝰ adherētiā ⁊ fixioneꝫ. Eſt
aūt talis res duplex īterior. ſ. ⁊ exterior. Interior duplex ē
ppa ī eo exiſtēs: ⁊ a ſupiorībꝰ ei effuſa. ppa ē mā colico in
eo ībibita pūgēs vel fl̄atica adherēs q̄ a putrefactiōe acq
ſiuit ſalſedinē ⁊ hauracitatē nāꝫ grauans ⁊ corrodens vl̄
apa duꝝ aut calꝫ q acuās q̄ꝺ putrefactionē acq̄ſiuit: ⁊ ſua
virulentia egrediente moleſtans: aut vlcera ⁊ corroſio in
eo fiſtule emoroydes oculte ⁊ ragadie. A ſuperioribꝰ effu
ſa eſt duplex aut acuta mā fluens p īteſtina vt in pceden
ti capitulo dictū eſt: aut eaꝝ fece ſicca exaſperāte ⁊ ſua vi
ſcoſitate in ſuo tranſitu adherente ipſi ad cuiꝰ expulſionē
nā cū conamine mouet̄. ⁊ talis dicit̄ mēdoſus tenaſmon.
Exterior res eſt frigiditas ad ipm̄ p anū magis adueniēs
⁊ ipreſſa aut ex aere frigido cū exponunt̄ aut aqua cū bal
neantur aut ex lapide duro frido cū ſederint in eo: ſua cō
preſſione conq̄ſſante ⁊ ſua friditate ledente ad cuiꝰ expul
ſionē natura mouet̄ violēto motu expreſſionis ac ſi eſſet
corporea ſic̄ in ſingultu ⁊ tuſſi ē videre ex aeris vel aque
vel alteriꝰ fr̄i atracti cauſatis: vt ſuperiꝰ dictū ē in pprys
locis eoꝝ. Et q͛ nā ad talis friditatis expulſioneꝫ ipreſſe
decipitur cū mouet̄ credens eaꝫ expellibilē vt corporeaꝫ
cū nō ſit expellibilis: ſꝫ alterabilis pprie lꝫ plurimuꝫ ex ea
cauſet̄ ppter pportionē in natura mēbri. In genere pro
portionabili facilior eſt trāſitus. dicit Abo. merito talis te

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0347-8
DFG

naſmon ꝓprius pōt dici mēdoſus .Et ſigna ipſius ſunt.qꝛ
cū accidit hoi ſubito deſideriuz egerendi valde cuz cona
mine donec extendat̃ inteſtinū rectū ⁊ anus extēſione ve
hemēti. ⁊ qd̄ egredit̃ in ꝑncipio eſt paruū admodū ſterco
ris galline pingue viſcoſuz ⁊ vnctuoſuz deinde apparent
plurimū in fece puncta ſanguinis parua deiñ ſanguis ma
ioꝛ nō valde ꝑmixtus:tunc egritudo ē in ĩteſtino eiecto ⁊
vocat̃ tenaſmon.Et ſigna cāꝝ eiꝰ ex q̃ttuoꝛ ſunt ſumēda
ex cāis ꝓcatarticis:⁊ antecedētibꝰ ex accñtibꝰ ⁊ cōcomitā-
tibꝰ ⁊ exeuntibus ⁊ iuuātibꝰ ⁊ nocētibꝰ.verbi gratia. ſi ſit
ex colā imbibita pungente cognoſcetur ex ꝑcedenti regi-
mine multiplicante colāz cū circūſtātijs ſilibꝰ ⁊ ex ſignis
dñij colere ipſius in corpore ⁊ ex punctōe ꝑcepta in recto:
⁊ exeūtia ſunt citrina paꝝ vel citrinitati admixta ⁊ ex eo
ꝙ alterantibꝰ ⁊ mūdificantibꝰ colerā iuuātur ⁊ a multuz
calīs ledunt̃ manifeſte.Et ſi ex flate ſalſo ꝑceſſerit ex ꝑ-
cedēti regimīe mltiplicāte flā a ꝑdominio ⁊ colore mani
feſtabit̃ cū circūſtantijs ſilibꝰ.Et ex ſignis abundantiam
ipſius ſignificantibꝰ flāticaz cachocimiaz demonſtrātibꝰ
cū colera mixtaz et ex coroſione ⁊ pruritu ꝑcepto in loco.
Et exeuntibꝰ flegmaticis ⁊ corruptis.Et ex eo ꝙ iuuatur
calīs anodinis ⁊ humidis abſtergētibꝰ que xp̄o duce dicē
tur:⁊ ↄ̃rijs ledunt̃ manifeſte: Et ſi ex apāte ſit ꝑceſſerūt
cauſe mltiplicātes humorē ⁊ ſigna ipſius dñantis. ⁊ ſentit̃
grauedo vel doloꝛ in loco ↄtinuus ⁊ magis apud emiſſio-
nē ſtercoris ⁊ caloꝛ.Et qñqꝫ ē fe. ⁊ exeuntia difficile emit-
tunt̃ ⁊ ſunt cū virulētia qñqꝫ diſtincta non ꝑmixta ⁊ alia
apātis ſigna ⁊ iuuant̃ mollificantibꝰ anodinis:⁊ ↄ̃rijs oſtē
dunt̃.Et ſi ſit ex vlceribꝰ ⁊ corroſiōe ⁊ ragadijs ꝑceſſerūt
cauſe vlcerātes ⁊ hūores acutos mltiplicātes:vel apā qd̄
fuit ibi apertū:vel diſinteria ⁊ fluxꝰ eruginoſus colericus
niger felleus vl̄ flātis ſalſi.vel medicina vlceratiua vt eu
forbiū ⁊ ſimiles:vel ſumptio alicuiꝰ rei dure acute īdige-
ſtibilis:vt vitrū ⁊ ſimiliū:vel mala īmiſſio cliſterijs cuius
canulla fuit acuta vel colirij:⁊ ſentit̃ ardoꝛ in loco aſſiduꝰ
⁊ ſanies ⁊ putredo in exeuntibꝰ apparebūt ⁊ iuuantur la-
uātibꝰ ⁊ acutis moꝛdētibꝰ.Et ſilr̄ ſi ex emoroydibꝰ ocl̄tis
⁊ itrinſicis ⁊ ſanguis niger appebit in exeūtibꝰ ⁊ diſtictus
Et ſiqdē ex fluxu ꝑcedēte fuerit ſignificabūt ipm eiꝰ pre-
ceſſio ⁊ relique eiꝰ que remāſerūt ⁊ pulſus erit cordoſus.Et
ſi ex fece ſicca egreſſio eiꝰ cū cibis ꝑcedentibꝰ ↄſtipātibꝰ
laboꝛ ⁊ regimen:⁊ omne exſiccans feces in cura colice di-
ctum ⁊ exaſperatio percepta in loco ⁊ humidis ⁊ lubricis
iuuantur ⁊ leduntur cōtrarijs.Et ſi ſit ex frigiditate ante-
ceſſit expō in aere frigido ⁊ iteret̃ in eo balneatio in aqua
frida ⁊ potus eius poſt laborē vel balneo:⁊ ſeſſio ſup mar
morem ⁊ ꝓprie in mēſibꝰ erratis ⁊ ſenſus obtuſius ⁊ cōge
latio in loco:nec ē in exeuntibꝰ aliqd nociuū ex ꝑdictis ap
parens ⁊ calidis valde iuuant̃ ⁊ ledunt̃ ↄtrarijs. Cura ve
ro eius generalis eſt q̃ttuoꝛ.ꝑma eſt mūdificare ſeu reſol-
uere māz imbibitā ⁊ affixā .ſcd̄a ē retinere fluētē ſi adſit.
tertia alterare ↄplexionis malitiā ↄfortare membꝝ ⁊ paſ
ſaz particulā eiꝰ mitigare dolorē.quarta ē regimē oꝛdina-
re.his.n.rebꝰ oībꝰ vel pluribꝰ tota eiꝰ cura ↄplet̃.Specia-
liter aūt ſingulas cās īſpiciēdo ē talis:vt ſiqdē fuerit ex co
lera imbibita in recto.Cura eiꝰ eſt:quattuoꝛ res. Prima ē
alterare ⁊ inſpiſſari ipaz.Scd̄a ē mūdificare ⁊ reſoluere.
Tertia ē ↄfortare ⁊ ſedare dolorē ⁊ punctionē. ⁊ hoc ↄple-
bis cliſteribꝰ colirijs:euaporatiōibus ⁊ emplīs. Primo cli
ſteriçabis cū aq̄ oꝛdei tepida:oleo violato : ſucco ligri. iu-
iubis ⁊ mucilagine dragagāti.deīde addas mel violatū ⁊
medullā caſiefiſtule: ⁊ vltimo ierā ſimplicē vt imbibitaz
māz ⁊ maturatā, euellas vel pillulas ſeu coliria ex caſief.
ſucco ligri. ⁊ dragagāto ꝑmo.deīde ex melle ⁊ aloes immit
tes.deide euapoꝛabis anuz. et emplābis ex fenugreco ſe-
mine lini maluis melliloto radice altee ſiſamo caulibus

camomilla:⁊ ſilibus mollificantibꝰ anodinis decoctis in
aq̄ ⁊ emplātis cū vitellis oui: ⁊ oleo ro. vel poſitis ī ſacel-
lis in quoꝝ aqua ſedeāt vel ſpōgia filtro lana vel cocto in
fuſo tepido cataplaſment̃ ⁊ euaporet̃ .aggregāt.n. ī ſe hec
virtutē maturādi reſoluēdi ↄfortandi ac ſedandi dolorē.
Et ꝓpriuz ē ſiſamū cliſteriçatū ⁊ oleū eiꝰ. Regimē quoqꝫ
qd̄ eſt quarta res ſit declinans ad friduz ⁊ ſtipticū mode
rate ↄfortatiuū ſtōi cū defectione patit̃ ex cōpaſſione:qd̄
hic ēt dictū ē.Si vō ex flāte putrefacto ⁊ humiditatibus
baurachijs adherentibus fuerit.ꝑmo mūdificabis cū cli
ſteribus ex aqua oliuaꝝ ſalitaꝝ.deinde cū ſucco foliorūz
ſicle cū virtute turbit vel bdelio:cum aqua mellis ⁊ alijs
que ſupra in cura fluxꝰ ex ſalſo flegmate dicta ſunt . dein-
de mitigabis dolorē cū euapoꝛationibus ex ꝑdictis addi-
tis fumo terre paritaria ſcabioſa ⁊ abſinthio: deiñ immit
tes coliriū ex bdelio croco. adipe galine ⁊ cera ⁊ laudāo.
hoc.n.ſedat dolorē lenit maturat ⁊ reſoluit. ⁊ eſt rōnale ⁊
exptū Regimē aūt ad calidū tēperatuz declinet ⁊. ſtipti-
cū ⁊ cōfortatiuū. Qz ſi.fuerit ex apāte ⁊ fuerit calidus re-
ge ipſum vt ſuperius dictū eſt:ſicqꝫ eius regimen in tribꝰ
rebus ↄſiſtit ī retinēdo illud qd̄ currit ad apāta ſi ꝑ modū
īfluxionis fuerit cauſatū in temperando humores ⁊ in re
gēdo ipz apā. ¶ Prima res ↄplet̃ mutatōe ſui cū flōmia
ſi necāriū fuerit vel farmacia colagogo ⁊ minoratiōe cibi
multa.īmo fac eū ieiunare ſi poſſe ſit duobꝰ diebꝰ, vt nā in
trāſmittēdo reddat̃ auara:⁊ nā in ieiunio ↄfirmat̃.Dein
de da poſt illud ꝑus paꝝ cibi. Si aūt panis īfuſus ī lacte
mltō decocto:qm̄ ē melioꝛ. euāt.n.ſupfluitates colericas
corrūpētes:⁊ qd̄ remanet ī corpe tēperat ⁊ retiet ne fluat
ad apā.deide dabis ſoꝛbitionē de riſo: cādaruſio ⁊ milio.
Scd̄a ↄplet̃ cū exhibitiōe alicuiꝰ frigidi ⁊ īſpiſſātis māꝫ:
⁊ alterātis caliditatē eiꝰ:ſic ē ſuccꝰ granatoꝝ:⁊ macianoꝝ
aq̄ lupuli:endiuie:lactuce:cucumeris:cucurbite:oꝛdei: co
riādri: ⁊ ſiliium.Et ex ↄpoſitis ē oxiçaccarū:iuleb roſ. vio
latū. ⁊ ſiliium:potio de iuiubis. ⁊ ſilia. ¶ Tertiā rē ↄplent
medicie ꝑticulares approximāde loco apāto q̄ ſunt ſm̄ di
uerſitatē tēpoꝝ apātis ex qbꝰ ſunt ſtiptice aliq̄lr fride.Et
cū hoc mollificātes approximāde ī ꝑncipio ꝓhibētes ⁊ re
pellētes illō qd̄ effundit̃ ad apā cliſteribꝰ imiſſe: ⁊ colirijs
⁊ linite ⁊ epithimate exteriꝰ q̄le eſt cliſtere ex aq̄ oꝛdei:aq̄
coriādri ro. ol.ro. ⁊ mirtinum cliſteriçata ⁊ colirio ex lici
nio iuncto ī oleis ipis: ⁊ albumīe oui: ⁊ alcāna:⁊ iunctio re
nū ficteris:pectinis:īguinū: ⁊ pitoneō cū eis: ⁊ filtrū īfuſuꝫ
ī aq̄ mirte coriādri ro. cū pauca alcāna epithimatū ficteri
⁊ alijs adiacētibꝰ mēbris. ꝑcedēte vō adminiſtrabis ꝑdi-
ctis modis oībꝰ reſolutiuoꝝ aliqd̄ ꝑdictoꝝ deide ꝑcedē
te ↄfortabis ⁊ mltiplicabis illa:⁊ ſic admiſcebis ei bdeliū:
qm̄ lenit maturat ⁊ reſoluit.Et ex illis ē cepe albū aſſatuꝫ
cū butiro vel iſopo hūida:⁊ laudanū ⁊ anetū ſiccū emplā.
⁊ ſilia.Et ſilr̄ ī ↄcliatōe balneabis cū reſoluentibꝰ ꝑdictis
paꝝ ſtipticis ↄcoctis in aq̄:ī q̄ facies egꝝ ſedere. ⁊ inūges
locū cū oleo lilij.amigdalino:anetino:yrino: vel nardino
modis ꝑdictis. Qz ſi apā fuerit fridū:ſiccū in ꝑncipio mi-
niſtrabis ꝑdicta anodina ſtiptica tēperate.Et ſi qdē aliqd
virulētū currat ex eo mūdificet̃ ⁊ abſtergat̃ cū cliſteribꝰ
colirijs ex ꝑdictis ⁊ ſacell: ex malua radice altee: ſēie lini
⁊ fenu greco:deīde ꝑmiſcebis reſolutiua: vt camomilla ⁊
mellilotū. ⁊ deide augebis ipā. Qz ſi apā fuerit duꝝ melā
colicuz mollificabis ⁊ reſolues:ſic in cura colice apāte eſt
dictum.in qua de omnibus eſt dictum. Si vero ex vlce-
ribus corroſiōe in extrema parte eius que percipies apud
exitum ani in expreſſione curabis cum mollificantibus.
⁊ deinde conglutinātibus ⁊ conſolidantibus vt ſupra in
cura vlceꝝ īteſtinoꝝ ſufficiēter dciñ ē. Etiā ſi ſint vlcera
interioꝛi parte eius: ⁊ occulta ſenſui. vt dictū ē ibi oleum
vetus cliſteriçatū cū agreſta eſt ꝓpriuz ⁊ alcofol. ex mer-

daſengi. ⁊ alijs q̄ imitti poſſunt cũ canella imiſſa ano re
pleta puluere ⁊ i ſufflatõe ſequẽte. Regimẽ quoq; in cibis
ſit ex mollificantib⁹ que feces generãt humidas non ſic-
cas: qm̃ exaſperant ⁊ doloꝛes vlcera ⁊ coroſiones augmẽ-
tant ⁊ ex iſipidib⁹ non foꝛtis ſapoꝛis: q꞉ nec acuti nec ſalſi
nec amari nec acetoſitatis multe: qm̃ feces reddunt acu-
tas oĩa talia ſapoꝛis foꝛtis que vlcera moꝛdẽt ⁊ augẽt. Et
ſi fuerit a fiſtulis emoꝛoidib⁹ ⁊ ragadijs curabis cura ipa
rũ: quã in cura fiͨteris: xp̃o duce dicem⁹. Et ſiquidẽ fue-
rit ex humoꝛib⁹ effuſis a ſupioꝛib⁹ facientib⁹ ventris flu-
xum in quo eſt ſermo prepoſitus curabis cura fluxus ven-
tris pdicta: in quo ſunt mixta que fluentẽ ꝯpeſcũt acutã
mãz ad iteſtina: vt eſt ſumach moꝝ: imaturum citoniũ:
vitellus oui decocti in aceto: ⁊ ſucus poꝛtulace. Si eniz ex
fece ſicca fuerit exaſpãte curabis cura collice ex fece ſic-
ca ſuperi⁹ dicta: deĩde ſi aliqḋ viſcoſũz quod adhereat ſit
in ea miſcebis in enemate aliqḋ abſterſiuũ acutũ: vt bau-
rach: mel: ſal: ⁊ ſiſia: ⁊ coliriũ ex melle ſale ⁊ bdelio. Sz ſi
fuerit ex frigiditate ab exterioꝛib⁹ aduenĩete ano. q̄re ſit
tenaſmon difficilis cũ elleuatione ad ſellam freq̄nti ⁊ nõ
egreditur aliquid: ſicut etiã accidit cũ ẽ ex apate duro ei⁹
cura pceſſit. Et ꝓpꝛiũ eſt ei oleũ ſiſaminũ calefactũ cliſte-
riçatũ cũ aqua altee vel dulci vino ⁊ diu retentũ. Sitq;
cura ei⁹ alteratio cũ calidis oĩbus modis pdictis aproxi-
matis cũ cliſterib⁹: ⁊ camomilla: aneto: calamẽto: oleo nã-
dino: vel coſtino rutaceo: vl' bdelio: ⁊ pauco vĩo decoctis.
vel cũ abꝛotano ruta. lauro: ⁊ origano: quod eſt ꝓpꝛiũz: vl'
oleis coꝝ in qb⁹ ſit lana iſuſa vel ſpõgia: ⁊ eſt melioꝛ: q꞉ cõ-
ſeruat caliditatẽ magis applicata ano. Et cũ vnctionibus
ẽ eiſdem ani ⁊ partiũ adiacentiũ ⁊ cũ ſeſſionib⁹ ſup miliũ
⁊ ſal calefacta ⁊ ſup lapidẽ marmoꝛeũ cal'z vel lateres vel
ſuper tabulã cipreſſi vel pince vel ſaltẽ ppl'i ſup quaz fue-
rit vinũ cal'm ſupaſperſum. Et qdaz inungũt eã cũ adipe
capꝛe ⁊ cũ ſuffumigationib⁹ ex ſulfure aut mirra: cortice
thuris vel ſtoꝛacis. quare oꝫ: vt infirmus ſedeat ſup ſedẽ
pfoꝛatã vndiq; tabulis vl' emboto circũdatã ⁊ ponat anũ
ſup foꝛamẽ ⁊ ſit teſtũ ignitũ vel panne ſup qḋ pulueriçeť
ſulfur: vel aliqḋ ex alijs donec calefiat anus ⁊ iteſtinum.
q̄re pcipiať vt ingrediať balneũ ⁊ ſedeat ſup ſolũ ei⁹ ⁊ cũ
egrediť defendať totũ coꝛp⁹ ⁊ ꝓpꝛie pedes ⁊ mẽbꝛa frigo-
re. Frigus eñi nocet neruis ⁊ ano pudẽdo. vt Hypo. dixit
⁊ eo mediãte inteſtinũ rectũ: iõ nocet tenaſmoni in pluri-
b⁹ hoꝛis ⁊ ꝓinde calefactio coꝝ ẽ vtilis ⁊ cõueniẽs. Dein-
ceps medicinas ꝯpoſitas ſubiungemus ad fluxus ſpecies
cũ fe. vel tenaſmone. ¶ El'm ꝯferẽs ad fluxũ ſtõaticũ liẽ-
tericũ ex flãte lubꝛicãte cui⁹ deſcriptio ẽ democriti. ℞. ſe-
minis arnogloſſe aniſi torrefacti ãñ. ʒ. i. corticũ granatoꝝ
coꝛiandri ꝑparati ãñ. ʒ. ß. cinamomi. ʒ. ij. çinçi. ameos ana.
℈. i. ß. bibať cũ vino pontico inq̄titate. ʒ. i. ſi nõ eſt fe. ⁊ ſi
eſt fe. cũ aqua pluuiali. ¶ Aliud ad idẽ ex vlcerib⁹. ℞. ſe-
minis arnogloſe acetoſelle aniſi torrefacti. ãñ. ℈. ij. corti-
cũ granatoꝝ ſanguinis dra. thuris albi. ãñ. ℈. i. pulueriçẽ-
tur ⁊ miſceanť ⁊ ſumãť ſicut pus. Auic. fiat ad idẽ de gal-
lis electuariũ de thure electuariũ de ſiliqs. ¶ Et empl'm
de ſaufel cuz fuerit caliditas. Ex empl'is fiat tale. ℞. ſeĩs
lini torrefacti dactiloꝝ imaturoꝛum ãñ. ʒ. ß. maſticis. ʒ. ß.
aluminis ypoqſtidos accacie balauſtiarũ ãñ. ʒ. iiij. roſarũ
rubeaꝝ mirti rubiana partes eq̄les fiat empl'm cuz oleo
maſticio ⁊ cera. Serapio inqt ſi ſit lubꝛicitas iteſtinoꝛum
ex vlcerib⁹: oẽ qḋ ꝯfert ad excoꝛiationẽ: ꝯfert huic egritu-
dini. ¶ Itez linimẽtũ ſcḋz eũ ad dyariaz ⁊ lienteriã ex de-
fectione virtutis retẽtiue. Reci. abſinthij romani. ʒ. i. In-
fundatur in vino pontico nocte: vna ⁊ miſceať cũ eo ſuc-
cus foliorũ mirti laudanũ ⁊ ramich. ⁊ ſubmergať in eo pa-
nus lini: ⁊ ſuffumigeť cuz xiloaloes ⁊ ponať ſuper ſtõm ⁊
viſcera poſtq̄ illinieris cũ linimẽto qḋ eſt. ℞. olibani ma-
ſticis a: cacie: aluminis: aloes apij corticũ: radicis mandra-
goꝛe ſeminis iuſquiami ãñ. ʒ. iiij. ſumach oꝛdei roſ. ſiccaꝝ ſu-
mach gallaꝝ viridiũ balauſtiaꝝ ſucci barbe yrcine: galie:
ramich. licij ãñ. ʒ. ij. terãť bñ ⁊ ꝯficianť cũ aceto ⁊ aq̄ mir-
ti recẽtis. Et ſi nõ eſt cal'itas ꝓhibens line mirach. cũ vĩo
⁊ meyſuſen ⁊ line mirach totũ ⁊ retro ſupꝛa ſtricturã doꝛ-
ſi ⁊ dimitte donec cadat per ſe ipm̃ empl'm. Et que ex eis
ꝯferunt ẽ empl'm factũ ꝺ fundo oꝛboꝛis. ¶ Cõfectio pul-
ueris aluminis lenis qui in oꝛe ꝓijcitur ad ſolonez vẽtris
cum tuſſi. ℞. granoꝛum mirti tritoꝛũ. ʒ. i. caſtanearum pa-
pauerís ſicut alcool ſiliquarũ ſeminis ſpodij ãñ. ʒ. ß. teran-
tur oĩa ⁊ miſceantur ⁊ dentur in potu. ʒ. iij. cũ frigida ⁊ pre-
cipiatur vt in mane cõmedat vitellos duos ouoꝛum be-
ne elixatoꝝ: ⁊ ſumat in his puluerem de papauere. ¶ Cõ-
fectio trociſcoꝛum de ſiliquis foꝛtium valde conſtringẽ-
tium ventrem qui ad miniſtrantur cuz vehemens eſt ne-
ceſſitas. ℞. gallarum ſiliquarum nabati fruct⁹ tamariſci
thuꝛ: balauſtie ãñ. ptes eq̄les gũmi opij ãñ. pteꝫ. ß. fiãt tro-
ciſci põderis. ʒ. ij. ß. doſ ſit vni⁹ cũ aq̄ pluuiali vl' vĩo põti-
co. ¶ Trociſci quos paul⁹ dixit valere ad liẽteriã ⁊ leni-
tatẽ iteſtioꝝ. ℞. corticez mali granati gal'. ãñ. ʒ. viij. myrť
ʒ. iij. ſumach. ʒ. iiij. fac puluerez ⁊ tẽpera cũ vino accido: ⁊
fac trociſcos. ʒ. ij. ⁊ da. i. cũ aq̄ ſimplici. ¶ Syrup⁹ valens
ad ſtõi defectionẽ: lienteriã vomitũ ⁊ ardoꝛẽ. ℞. ſumach:
corticũ mali granati. vel myrti ãñ. ʒ. xx. oĩa decoq̄nť i lib.
aque. v. donec redigať in vnã: deĩde colenť ⁊ ſucc⁹ piroꝛũ
neſpuloꝝ ⁊ citonioꝝ eq̄li põdere: ⁊ çuccari lib. i. ß. ⁊ ſyrupẽ-
tur de quo dabis. ʒ. i. cũ aq̄ frigida. ¶ Alius valẽs ad ea
ex frigido hũoꝛe flatico vel melãcolico: ⁊ ẽ yſaac. ℞. ſucci
mali granati accidi cũ pulpa ĩterioꝛi lib. v. ſucci calamẽti
lib. iiij. vini odoꝛiferi lib. iiij. oĩa coquanť vſq; ad mediũz
diez. deĩde colenť. adde çuccari lib. i. ſape lib. ß. poſtea coq̄
donec ſyrupeť: da. ʒ. ij. vel. i. cũ aq̄ cal'a. Cliſtere mũdifica-
tiuũ i diſſenteria colica. ℞. aq̄ oꝛdei lib. i. diſſolue çuc. roſ.
ʒ. ij. ſucci poꝛtulace. ʒ. ij. Et ſi mã fuerit valde acuta fiat
ex ſucco cucurbite. vel melonis ĩdi cũ pdictis. Si vͦo fue-
rit ex mã adhuſta fiat cũ aqua lactis. ſucco poꝛtulacaruz: ⁊
oleo roſato. vel cum aqua violarum boꝛaginis: ⁊ bugloſſe
oleo ro. ⁊ çuccaro. Et ſi fuerit ex flãte ſalſo fiat ex aq̄ oꝛ-
dei diſſoluto i ea furfure ⁊ fenugreco: ⁊ colenť ⁊ diſſoluan-
tur mel roſa. ⁊ oleo ro. ⁊ ſi oꝫ addať paꝝ ſalis vel aque pi-
ſciũ. vel oliuaꝝ ſalitaꝝ. ⁊ totiẽs repetať. quotiẽs oꝫ vt mã
perfecte mũdificata appareat. Et ſi fuerit medicina acu-
ta vel ſupfluit. fiat ex mucilagine pſilij cuz çuccaro ⁊ oleo
ro. Et ſi ſit ibi doloꝛ ⁊ punctio ⁊ moꝛdicatio diſſoluať pin-
guedo galline vel anatis ⁊ ꝓpꝛie poꝛci recẽtis ⁊ puluis ſpo-
dij ſupaſpergať vel cerotũ roſeũ. Et ſi doloꝛ ẽ foꝛtioꝛ pdu-
cẽs ad ſincopim ſedeat i aq̄ cal'a decoctiõis fenu greci: ſe-
minis lini: camomille meliloti ⁊ myrte. Et ſi non ſufficiat
addanť narcotica pͥus extra. deĩde in colirio. deĩde in cli-
ſterib⁹. ⁊ deĩde ꝑ os. Et ſi pueñerit ad raſurã addas ſemẽ
acetoſe pulueriçatũ. Et ſi ſit ex flãte ſalſo decoquanť aco-
rus ⁊ capillus veneris ſicc⁹: ⁊ fenugrecũ: ⁊ ſpina egyptiaca
i aqua oꝛdei: ⁊ cũ alijs cliſteriçeť. Et ad ſanguinẽ venerit
addas accaciã ſanguinẽ draconis. lutũ ſigillatũ: ⁊ ſuccum
plãtaginis vel ꝯſolide. Et ſi pueñerit ad vlcerationẽ: adde
adipẽ yrcinũ cũ luto ſigillato. Si vͦo ad coꝛroſionẽ: addas
trociſcũ de arſenico: vel de ſtella: vl' de carta. Uel cliſtere
fiat ex luto ſigillato: ⁊ ſucco arnogloſſe: qm̃ ẽ ꝓpꝛiũ ⁊ ſecu-
rius vel ſucc⁹ moꝛi imaturi: ⁊ ipm̃ lutum cũ ſucco pdicto
poſt mundificationẽ deť. Et fiat cliſtere cõſtrictiuũ aliqḋ
ex his q̄ ſequunť. ¶ Cliſtere ꝯferẽs diſſenterie ⁊ vlcerib⁹
iteſtinoꝝ ꝯfoꝛtãs iteſtina ne recipiãt effuſionẽ ſupfluita-
tũ acutaꝝ a ſuperioꝛib⁹ mẽbꝛis reumatiçãtium ⁊ ductus
conſtringẽs ⁊ ꝯglutinãs vlcera: ⁊ cõſolidans. ℞. ſumach.
ʒ. ij. riſi toꝛrefacti. ʒ. i. bulliant in aqua pluuiali. deinde co-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0349-2
DFG

lentur ꝛ colature ſufficienti addātur ſucci mori immatu-
ri: ſucci barbe yrcine: ꝛ ſucci teil: ꝛ portulace: ana. ℥. ij. caſei
antiqui: ꝑparati. ℥. ß. vitelloꝝ ouoꝝ: ꝛlixatoꝝ in aceto. ij. te
re ſigillate: ſanguis draconis pulueriçatoꝝ: ān. ʒ. i. ꝛ ē pro-
priū ꝛ mirabile: ꝛ ē Joānitij. Oꝛ ſi ex mā flica effuſa fue-
rit decoquaꝰ in aq̄ capilli veneris: macis: ſpice: charabe ꝛ
acori. ¶ Deſcriptio cōpreſſiui: qd̄ ān hec oꝫ ꝑmitti cōfert
ad oīa predicta: ꝛ mūdificat māmꝫ: ꝛ ꝯfert eā. ℞. pulpe mi
robol. citri. ℥. ß. reubar. aſſati. ʒ. i. ß. gumi arabici: aſſi luti: ſi-
gilati: ſanguis draco. ān. ʒ. i. torrefiāt mirobol. ꝛ reubarb.
parū: ꝛ diſſoluanꝰ ī aq̄ decoctiōis: ſemis ro. ꝛ galāge: ꝛ alia
addanꝰ. ꝛ ſuccꝰ plātaginis in quo ductus ſit lapis emathi-
cis. ℥. ij. Si aūt flā ſit ſalſum loco citrinoꝝ ponanꝰ chebu-
li: ſi melicus hūoꝛ ponanꝰ nigri: emblici: ꝛ bellerici.
¶ Cliſtere ꝯferēs diſſinterie ꝛ excoriatōi. ℞. corticū fiſti
co. granoꝝ granatoꝝ: galloꝝ granoꝝ ſumach folioꝝ leui
ſtici: ꝛ radicū leuiſtici: ꝛ radicū aloes: ana. partes equales
Coquanꝰ in vino ſtiptico: donec ſpiſſenꝰ. deīde colenꝰ et
teranꝰ aliq̄ ex trociſcis. ſ. de arſenico: vel de carta: vel ſtel-
le: ꝛ cū de oleo mirtino imitaꝰ. ꝛ ē Abo. ¶ Cōfectio troci.
de carta ſm eū. ℞. carte cōbuſte. ʒ. x. arſenici aduſti: ꝛ cor-
ticū eris: aluminis iameni: gallaꝝ: calcis nō extincte: ān. ʒ.
vij. fiāt ex eis trociſci cū ſucco arnogloſſe ponderis. ʒ. iiij.
ex aqua adminiſtreꝰ pōdus. ʒ. i. ¶ Aliꝰ trociſcꝰ fortioꝛ ſe-
cūdū eū. ℞. calcis. ꝛ alchali accacie: gallaꝝ ꝛ arſenici: ana.
ꝛ teranꝰ cū aceto. ꝛ dimitanꝰ aliqbꝰ diebꝰ. ꝛ informentur
troci. ꝛ cliſteriçeꝰ vnus ex eis. ʒ. i. cū aqua arnogloſſe prece
dēte cliſteri ex ſale: ꝛ aceto qd̄ ꝓhibꝫ ambulatōe vlceꝝ.
¶ Cliſtere aliō ſcd̄m eū ſi ad vlcera ītestinoꝝ cuꝫ dolore
vehemēti adeo ꝙ perducit ad ſincopim. ꝛ vbi alia ꝑdicta
cliſteria nō ꝯtulerint. ℞. aq̄ chiſti ordei ꝛ riſi: adipis renū
capraꝝ: olei ro. gūmi arabici: ꝛ ceruſaꝫ: ꝛ vitellus oui: con-
quaſſenꝰ alia in luto vno: ꝛ ſi expedit adde paꝝ opij: ꝛ ad-
miniſtra. ¶ Coliriū ad idē ꝙ ꝓcedere debet cliſtere ꝑdi
ctū: ſcd̄m eūdē ꝛ valet ad tenaſmonē. ℞. myrre: croci: thu-
ris: opij: ān. ꝑtes equales: caſtorei ꝑtes. ß. cōficianꝰ cū ſuc-
ce arnogloſſe: ꝛ albūmine oui: ꝛ ſi vis addas ceruſe parteꝫ
tertiā: liga cū filo: ꝛ dimiſſuꝫ ꝑ horā extrahe ſuauiter ne ſi
dormiat expgefiat. Et dixit medicine q̄ ſunt mā coliriorū
ſūt mirra: thus: crocꝰ: ſandarach: alumē litiū: ſtoraꝝ: caſto-
reū cū adeſt opiū. lutū oē: ꝛ carta cōbuſta: ſanguis draco-
nis: cornu cerui adbuſtū: ꝛ chimolea: chlimia ꝛ laudanuꝫ:
merdaſegni: ꝛ ſilia. Qūqꝫ ſunt neceſſaria attramēta ꝛ ar-
ſenica. ¶ Cliſtere aliud ad idē retētiuū Archidiaconi. ℞
panici excorticati riſi lentiū excorticataꝝ roſaꝝ ſiccaꝝ ba
lauſtie capulaꝝ glādiū ana. M. i. oīa in lib. iij. aq̄ coquan
tur donec ad tertiā redeant ꝛ colenꝰ. deinde ſumaꝰ ceru-
ſe cineris papiri aut iunci ana. ʒ. i. boli armeni. ʒ. i. vitellis
ouoꝝ aſſatorū. ij. olei ro. ʒ. i. oībꝰ bis in apoçimate diſſolu-
tis cliſteriçeꝰ eger ſemel vel bis: ꝛ valꝫ fluxui ventris ra-
ſure ꝛ excoriationi ītestinoꝝ ꝛ tenaſmoni. Jtē cliſtere ex
pertū ex ſucco oliuarū imaturaꝝ: vel ſucco mori imaturi.
¶ Cliſtere ſecunduꝫ ītentionē noſtram conferens fluxui
ventris vitio inteſtinoruꝫ facto ꝛ optime ſtringit ꝛ vulne
ra ītestinoꝝ ꝯſolidat. ℞. boli. ar. ordei excorticati ꝛ torre-
facti ſanguis dra. ceruſe. ān. ʒ. iiij. roſ. ītegrarū papiri ꝯbu
ſti: accacie. ān. ʒ. iij. dragaganti: gūmi: arabici: maluauiſti.
ān. ʒ. i. ſucci portulace: ſucci plantaginis: vitelli: ouoꝝ: olei
roſ. ān. ʒ. i. ß. fiat puluis ꝛ cliſteriça. ¶ Suffuſ. miclete ꝛ
bibūgiçir ꝯferens ad fluxū ventris diaricū ꝛ colicam paſ
ſionē: ꝛ tenaſmonē ꝛ egeſtionē ſanguinolentā ad raſuraꝫ
excoriationē ꝛ vlcerationē inteſtinoꝝ. anū cōfortat ſcd̄ꝫ
oēm modū adminiſtrationis. ℞ mirob. chebul. ꝛ indorū.
ān. ʒ. vij. bellicoꝝ: emblicoꝝ. ān. ʒ. iiij. groſſe terantur ꝛ cū
oleo ro. linianꝰ ver lenīꝰ aproximenꝰ: deīn ſumaꝰ naſtur-
cij coſti. ān. ʒ. v. cimini: ſemis feni: aniſi: ameos: charui. ān.

ʒ. ij. oīa in aceto ꝑ diez ꝛ noctē īfundanꝰ: ꝛ poſtea in patel-
la friganꝰ deīn pulueriçenꝰ ꝛ cū ꝑdictis miſceanꝰ deinde
ſumanꝰ: ramich: ſpodij: balauſtie: maſticis: boli: ar. coſti. ſu
mach. gūmi arabici. ān. aurū. i. teranꝰ ꝛ cribelenꝰ ꝛ cū ꝑdi
ctis icorporenꝰ ꝛ totū cū oleo liniāꝰ: deīde cū rob. de cito
nijs ꝯficianꝰ: ꝛ in olla viridi reponanꝰ doſis ē ab aureis. ij.
vſqꝫ ad. iij. cū aqua decoctionis mirte ꝛ boni temperamē-
ti ꝓbauimꝰ ꝛ laudauimꝰ. ¶ Jtē pillule. ān. cibū. ℞. arilo-
rū: vuaꝝ: corticū: thuris: maſticis: ypoquiſtidos: accacie: ma
cis: gūmi arabici boli ꝛ ſanguinis draco. ān. partes eq̄les.
Cōfice cū albumine ouoꝝ. Informenꝰ pillule: ſicut cicer
cū ſucco citonioꝝ da. iij. ān cibū. Jtē alia ꝯfectio. ℞. licij:
opij: ſtoracis thuris albi: mirte: croci. ān. ꝑtes eq̄les. Cōfi-
ce cū albumine oui ꝛ īformenꝰ pill'e ſicut ꝑdicte: de quibꝰ
denꝰ. iij. ante cibū ꝓprie cū paſſio eſt in ſuperioribus. Et fi-
ant coliria ꝛ īponanꝰ ꝛ poſt horā extrahanꝰ vt dictū eſt ſu
pra: ꝛ proprie cū paſſio ē in īferioribꝰ. Jtē ſuppoſitoriū ad
ſiſtendū fluxū ventris ſanguineū ꝛ humoralē. ℞. accacie
bedeguar. ān. ʒ. x. cartaꝝ ꝯbuſtaꝝ. ʒ. vij. ſanguis dra. ceru
ſe: merdaſengi. ān. ʒ. iij. copuloꝝ glandiū balauſtiarū. ān.
ʒ. iiij. licij. ʒ. v. mirre. ʒ. iiij. ß. alchanne. ʒ. ij. adde ſi vis opij.
ʒ. iij. ſucci barbe yrcine. ʒ. iij. teranꝰ ꝛ cribellenꝰ deinde ſu
menꝰ gūmi ꝛ thus. Et confice cū aq̄ ſpinaꝝ humidaꝝ ꝛ fi
at ſieꝰ longū ꝛ in vngaꝰ cū oleo ro. āntiquo: ꝛ ponaꝰ in anū.
¶ Jtē fiat emplm̄ ad diſſinteriā ꝛ fluxū ſanguinis. ℞. gū
mi arabici aſſi mirtiloꝝ paꝝ aſſatoꝝ cornu cerui: aſſi ma-
ſticis terbētine ſtoracis: liqde. ān. ℥. ß. cimaꝝ leuiſti pulpe
citonioꝝ maloꝝ ſilueſtriū neſpulaꝝ ſorboꝝ ꝛ piroruꝫ de-
coctoꝝ in aq̄ ro. ān. ℥. ß. thuris mirte ypoquiſtidos accacie ſe
minis arnogloſſe. ān. ʒ. iiij. boli armeni ſanguis dra. terre
ſigillate lapidis ematicis. ān. ʒ. ij. ß. pulueris turturis aſſe
cū pluma in cacabo. ℥. i. olei mirtini ſtoracis calamite ꝛ ce
re. ana. qd̄ ſuff cit. Et ſi vis adde medicinas cōfortātes ſto
macū: ꝛ empl'a totū ventrē ꝛ renes: ꝛ eſt exptū. ¶ Jtē fo-
mētū ad eos. ℞. radicis vlmi: filicū neſpuloꝝ ſorboꝝ mir
te citonioꝝ lentiſci: ꝛ caſtaneoꝝ ꝛ piroꝝ. ana. bulliant in
aq̄ pluuiali ꝛ ſedeat in ea. Ad fluxū epicū calm ꝛ colicum
erugioſuꝫ viruletum ꝛ felleum: fiat epithima ſupra epar.
℞. vtriuſqꝫ ſandali ſpodij ro. ana. ℥. ß. ſucci endiuie: ſucci ci
tonioꝝ. ana. ℥. iij. aq̄ ro. aq̄ portulace. ān. qd̄ ſufficit. Fiat ꝑ
modū epithimatis: vel ceroti: ꝛ eſt democriti. Si tamē ſit
oppilatio in eiꝰ cā ponaꝰ ſuccus abſinthij vel cime eiꝰ aut
flores ſquinanti ꝛ ſpica loco citonioꝝ: ꝛ ꝓpriū eſt reubar-
bari ſuccꝰ reſidentis ī vino vl' ſucco roſa vel aq̄ lactis ſcd̄ꝫ
neceſſitatē. Jtē cōpreſſiuuꝫ ex reubarbaro aſſo. ſucco cito
nioꝝ: ꝛ ſucco arnogloſſe cū aq̄ mirobolanoꝝ ꝛ ro. ꝛ ſi non
ſit oppillatio in eiꝰ cā. ¶ Jtē ſyrupus. ℞. ſucci endiuie aq̄
ro. ana. lib. ij. bulliāt in eis granoꝝ ſumach: ſemis ro. ribe
çarum ana. ℥. ß. çuccari lib. i. ꝛ aromatiçetur cū ſandalis: ſpo
dij ana. ʒ. i. ꝛ aliq̄ addūt ſuccū granatoꝝ ꝛ coriandrū eſt ſa
nus: ꝛ exptus datus cū aq̄ pluuiali. Ad fluxū vētris epati
cū ex ruptura vene porte. ℞. ſucci ꝯſolide ſucci plātagīs
ſucci caude eq̄ne barbe: yrcine lingue: arietis ꝛ portulace
depuratorū ana. lib. ß. çuccari ro. lib. i. ſpodij ſanguis dra.
terre ſigillate lapidis ematitis ana. ʒ. i. ſirupenꝰ ꝛ colētur
ꝛ reſeruenꝰ ꝛ denꝰ cū aq̄ pluuiali frigida ī q̄ntitate. ℥. i. ß. ꝛ
eſt gualterij: ꝛ ſuꝫ exptus ipꝫ. ¶ Aliꝰ fortioꝛ ſꝫ eū ꝛ valet
ꝓprie ad fluxū ſanguinis ex ruptura vene porte vel fluxū
ſanguinis per vrinā ex ruptura vene chilis. ℞. ſucci plāta
ginis: ſucci radicis barbe yrcine ana. lib. i. ꝯſolide maioris
ꝛ minoris ꝛ medie pimpinelle virge paſtoris burſe plāta
ginis lenticulaꝝ aq̄ roſtri porcini lingue: arietis epice her
be viol. ana. M. ſucci portulace lib. ß. floꝝ boragis nenu-
faris ana. ℥. i. oīum ſandalo. ſeminis arnogloſſe mirtilis co
ralli albi ꝛ rubei boli armeni: dragagāti: gūmi arabi. ſemi
nis portulacaꝝ folioꝝ roſis al. charabe ana. ℥. ß. iuiubarū

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0350-2
DFG

℞.coriandri.℥.ſ.pulueris ematitis:ſpody: ſanguinis dra/
co.an̄.ʒ.ij.ordei mūdi excorticati lib.i.çuccari.lib.ij.Fiat
ſyrup⁹ cū aq̄ pluuiali ⁊ clarificet̄ bn̄: de quo ſumat̄ mane
⁊ ſero cū aq̄ frigida p̄dicta. ¶ Et ſi flux⁹ nō cēt cliſteriçet̄
cū eo:⁊ deide applicet̄ ventoſa ſupra epar ⁊ deide hoc em
plꝫ.℞.oīuꝫ ſandaloꝝ an̄.℥.i.charabe boli.ar. lapis:emati
tis terre ſigillate.an̄.℥.i.ſanguis dra.gūmi arabici: draga/
gāti:ſeīs portulace:plantagīs:⁊ cū ſucco ſanguinarie ⁊ ſuc
co barbe yrcie ⁊ aq̄ ro.an̄.lib.ſ.Cōficiat̄ emplꝫ ⁊ ponatur
actu frꝫ.Et dēt patiēti ad bibēdū ter ī ebdomada:ſucci plā
tagis.℥.ij.ī quo ſit lapis ematitis duct⁹in cote.Syrup⁹ad
fluxū epicū ex oppillatiōe ſiue ſit ſanguine⁹ ſiue chiloſus
ſiue cū apate ſiue abſq̄꞉.℞.endiuie cū radice camepiteos
eupatoꝛij calamēti ⁊ poly.an̄.M.i.gnq꞉ radicū cōiū.ana.
℥.ſ.fiſtici cimaꝝ ſqnanti yreos floꝝ abſcinthy.ana.℥.ſ.cu
ſcute lupli.an̄.℥.i.lace lote.ʒ.iiij.çuccari.lib.i.aceti ſqllitici
℥.ij.⁊ filargy ēvalꝫ ēt ſi ſit ex ſplēis:⁊ alioꝝ viſceꝝ oppilla
tione ⁊ ſi ſit diuerſoꝝ coloꝝ exptus ē ⁊ ſan⁹ ſyrupus nr̄ de
abſcithio ō eupaterio de ſucco herbaꝝ ⁊ ſyrup⁹diarodon
athēaſia ⁊ ſilia: vt tyriaca ⁊ metridatū. ¶ Cōfectio troci.
retinentiū dyariā.℞.granoꝝ vuaꝝ mirtoloꝝ granorum
granatoꝝ:⁊ citonioꝝ.an̄.℥.ſ. balauſtie: chararebe.an̄.ʒ.ij.
copulaꝝ glādiū.ʒ.i.maſtic.corticis:thuris: ameos: ciamo
mi pōtici xiloaloes macis.an̄.ʒ.i.ſ.coriādri p̄parati.ʒ.i.gū
mi arabici aſſi.ʒ.ij.ꝯfice cū mūia aromatica dies.ʒ.i.cū ſy
rupo mirtino:vel vīo pōtico ſcdꝫ neceſſitatē. Ad idē p̄pa
ē ꝯfectio nr̄a de citonijs. ¶ Cōfectio trociſ. de balauſtijs
nimis ꝯferētiū dyarie cū multū ſupfluit ſiue ſit ſanguini
admixta ſiue nō ſꝫ deſcriptiōeꝫ almāſoris.℞.galaꝝ ſilue
ſtriū:ſeīs tamariſci:olibani balauſtiaꝝ.an̄.ptes eq̄les opij
gūmi arabici.ana.ptes.ſ.īformēt̄ trociſci pōderis.ʒ.ij.cū
ſucco citonioꝝ da.i.cū vino ſi neq꞉ caloꝛ affuerit neq꞉ fe.
q̄ ſi fe.affuerit dabis cū rob.ō citonijs acetoſis.Dixit Ar/
chidiachon⁹:pōe ſithias magnas ī p̄ra capitis ſepe ī fluxu
cerebrali:⁊ ꝯfortat ſtōꝫ ⁊ epar. Itē dixit recipiat oī mane
ī ieiunio maſticis.ʒ.i.cū aq̄ pluuiali ī fluxu ſtōatico ⁊ liēte
rico ītestinoꝝ ⁊ ſtōi. Itē ſāguis draco. cū ſucco plātaginis
in fluxu ſanguineo:vel mumia cū ſucco ꝯſolide: vł caude
eq̄ne. ¶ Pillł valētes ꝯ fluxū ex ōbilitate retētiue ſtōi ⁊
ītestinoꝝ.℞.ro.granoꝝ mirrte: ſumach:luti:ar.ana.ptes
eq̄les ꝯficiant̄ cū ſucco plātaginis.⁊ da cū aq̄ decoctionis
granatoꝝ. Itē dixit abo.tyriace noue aur.ſ.cū aq̄ ſumach
valet ad epicū ⁊ lotiuū. ¶ Confectio pillarū fily çacharie
cohibētiū fluxū mēbroꝝ ⁊ ꝯfortātiū ⁊ ꝯferētiū iuuamēto
magno ſi de⁹ voluerit.℞.aniſi aſſati.ʒ.i.maſticis ſumach
piloꝝ leporis ꝯbuſtoꝝ balauſtiaꝝ ſanguis dra.ſeīs citōio
rū.ana.ʒ.ij.ligni aloes.ʒ.iij.leuiſtici:olibani: mandragore:
terbētine ro.ana.ʒ.i.ꝯfice cū ſucco arnogloſſe doſ ē.ʒ.iij.
H.medicia magna ſedās fluxū p̄pē q ſequit̄ cāꝫ friditatis
mēbroꝝ. ¶ Et hic modus qn̄ accidit vix ſepatur.℞.cina
momi ligni aloes:aſari macis gar.aniſi:charui.ameos:ca/
medros:ariſtol.ro.ſparagi. ana.cōfice cū ſyrupo de ligno
aloes. ¶ Fili⁹çacharie fumigiū reſtrictiuū.℞.accacie ba
lauſtiaꝝ.ana.ʒ.ij.corticoꝝ ſorboꝝ.M.i.folioꝝ prunoruꝫ.
M.iij.lapidū molariū vel laterū ignitorū extictoꝝ in ace
to ī quo p̄dicta bullierint: et fumū p̄ īferiorē partē recipi/
at. ¶ Itē.℞.aluminis:maſticis:gūmi arabici:ſarcocole:ſto/
racis.ana.⁊ ponat ſup prunas ⁊ recipiat fumū. ¶ Balneū
exptoꝝ iuuamētoꝝ ī fluxu vētris ꝯfortās nāꝫ ⁊ ſedās ac/
cidētia mala.℞.folioꝝ pruni:cetrarie:balauſtiaꝝ:foliorū
ſic⁹:⁊ quercus ⁊ corticis ei⁹ ⁊ ſorboꝝ acerboꝝ:mirte: lapi/
dū:ignitoꝝ oīuꝫ poſitoꝝ ī aceto poſt q̄ cū aq̄ pluuiali ſuf
ficiēter bulliāt ī quo balneent ſe ſcdꝫ poſſe v̄tutis die ⁊ no
cte:ſedat.n.cito fluxū ſi deo placet.⁊ iā v̄ificatū ē q̄ vēto/
ſe poſt balneū ſupra vmblicū ſunt ſblimes:⁊ hic ide ēt ap
plicatū. ¶ Dixit Iouabim q̄ carnes pauonis aſſate ſtrin/
gunt vel nō aſſate.⁊ iter alias carnes laudabiles diſſinte/
ricis exiſtūt. Dixit Auer. carnes p̄dicū aſſe ⁊ elixe ſtrigūt
vētrē.Dixit quoq꞉ coagulū leporis ſtrigit fluxū:c⁹cā igno
rat̄.Syrup⁹ expt⁹.℞.ſucci plātagis:ſucci tomegilis ꝯſoli
de:⁊ v̄ge paſtoris ſumach.barbe yrcie balauſtiaꝝ roſa.on
tere:folioꝝ mirre.ana.℥.i.bulliāt in aq̄ pluuiali:⁊ cū çucca
ro fiat ſyrup⁹.Et in pecia rara ſi vis bulliāt maſticis terre
ſigillate.ana.ʒ.ij.Gualteri⁹ingt:ſi flux⁹fuerit ſine excoria
tiōe fiat talis ſyrup⁹.℞.ro.veteꝝ ſiccaꝝ.℥.iiij.viol.balau.
mirtiloꝝ.an̄.℥.i.çuccari.lib.ſ.fiat ſyrup⁹ de quo bibat bis
vel ter ī die cū aq̄ pluuiali:cū adeſt ſitis.Deide dabis iſtā
decoctionē.℞.oīuꝫ miroba.ana.℥.i.pulueriçent̄ ⁊ ponant̄
in lib.ſ.aq̄ roſa.⁊ ſtēt ſub diuo p̄ vna noctē. ⁊ ſūmo mane
colent̄ ⁊ det̄ colatura ⁊ regat̄ vt potionatus. ¶ Si v̄o fue
rit cū excoriatione aſſent̄ mirob.cū oſſib⁹ ſuis ⁊ vtat̄ iſto
pluere.℞.boli.ar.gūmi arab.aſſi: dragagāti: aſſi.ana.℥.i.
ſpody:ſang.draco.ana.℥.ij.pluericent̄ ⁊ miſceant̄ da.℥.ſ.
cū ſauich ordei oī die. ¶ Si v̄o flux⁹fuerit ſine caloꝛe,vta
tur iſto pluere.℞.gar.℥.ſ.cinamōi:galāge:macꝫ:mēte ſic/
ce.ana.℥.ſ.xiloaloes.℥.ij.Fiat pl̄uis de quo recipiat in p̄n
cipio cōeſtiōis cū vīo. ¶ Si v̄o fuerit cū caloꝛe da iſtū pl/
uerē.℞.oīuꝫ ſanda.mirtiloꝝ:⁊ ſumach.an̄.℥.i.boli:ar.℥.i.
ſan.dra.ſpody pſily aſſari.an̄.℥.ſ.Fiat pl̄uis de quo recipi
at cū ſyrupo mirtio:⁊ ī cibis.Si v̄o flux⁹ accidat pueris: ⁊
ſine fe.pōat̄ ſpōgia ī aceto calo:⁊ abſtergat̄ iſto pluere.℞.
boli armeni:maſtic. thuris al.an̄.℥.i. ſpody: ſanguis dra
conis:an̄.ʒ.ij. ⁊ actualr̄ calida applicet̄ ſupra ſtomacum.
¶ Scdm ioānez caſamiçulā.℞.caſeū: veteꝝ:vitellum
oui elixatū:floreꝫ taſſi:barbaſſi.Fricant̄ oīa ſimul ſupra
teſtū:⁊ comedat patiēs additis:ſemīe mirtiloꝝ:⁊ plātagi
nis de quo ſemīe cū vitellis ouoꝝ ſumat puer.Si autem
fluxus cū tuſſi fuerit calida ⁊ tūc dabis ſyrupū de granis
mirti maturis:ſcdm Abo.cuꝫ aqua dragagāti:vel dyaco/
dion:⁊ coriādri.Si v̄o cū tuſſi frigida dabis ſyrupum de
capill. ve. ſiccis: ameos:aniſo aſſato : gummi:dragagāti:
⁊ candis cinamomo pōtico:maces:roſas cū çuccaro:⁊ cū
aq̄ maſticis det̄. ¶ Medicine ꝯpoſite ad tenaſmonem.
Fiat ſcdm Ricardū cliſtere in aqua ordei buliant fenu
greci:ſemis malue an̄.℥.ij.deide diſſoluant̄ mell.ro.℥.ij.
⁊ olei roſ.q̄ ſufficit:⁊ fiat cliſtere ſi mā fuerit caliditati
attinēs.Si v̄o fuerit attinēs frigiditati fiat cliſtere ex aq̄
furfuris buliti cū fenu greco floꝛib⁹ camomille ⁊ melilo
ti ī q̄ diſſoluant̄ mellis ro.℥.ij.⁊ cū oleo camomillino ſiſa
mino vel yrino. vel nardino cliſteriçet̄.Et ſi materia val
de viſcoſa fuerit.addat̄ parū ſal:⁊ ē Rabi moyſi. ¶ Po
tio ꝯferēs tenaſmōi.℞.micleti.℥.i.diſſolue ī aq̄ pluuiali ī
q̄ reſiderit mirabo.electi ī ſpecie eoꝝ: p̄ut neceſſitas reg/
rit.⁊ da cū çuccaro roſato lib.ſ.Et cū volueris magis re/
tinere mām ſunt aſſati mirobolani:⁊ ſi magis ſint aſſati
cū nucleis iterioꝛib⁹.Grecus fomētū ad ſedādū grauedi
nē ⁊ doloꝛē ⁊ fluxū retinēdū.Buliāt in aq̄ pluuiali:floꝛū
camomille meliloti:radicꝫ altee:fenugreci ſemis malue
altee.ſemis lini. nucū.cipreſſi :an̄.℥.i.gallaꝝ.℥.ſ.ī qua aq̄
calida ſedeat:⁊ euaporet̄ cū ea. Cū v̄o exierit p̄dicta ī ſac
cellis recluſa applicet̄ ano:mūdificabūt.n.⁊ ſedabūt do
loꝛē:⁊ retinebūt fluētē mām cōfortado. ⁊ eſt gualtery.
Dixit circa iſtās fac ſaccellū ex thimo.⁊ origano:⁊ buliat
ī vīo calabrēſi: vł alio ſtiptico:⁊ bn̄ cal'm q̄tū tollerat ap/
plica ano.tollit ſtatim tenaſmonē ex friditate factū p̄ba
tū eſt.Et ſi ex caliditate fuerit: fiat ex ſumac. myrta mal
ua ⁊ biſmalua decoctū ī aq̄ roſata. ¶ Cōfectio trociſ.ad
tenaſmonē qui dādi ſunt cū caloꝛis abſentia fuerit ⁊ vē/
toſitas nociua ſcdm almāſorē.℞.ſemīs iuſqamī:al.ſemi
aneti:⁊ feni.an̄.ʒ.v. ameos.ʒ.ij.⁊.ſ. opij.℈.iij.ſemis apij:
ʒ.x.fiāt troci.aur.de q̄b⁹.i.ſumat̄ cū vino. ¶ Confectio
elli de ſtorace ſcdm eūdē ꝯferēs fluxui vētris:⁊ tenaſmo

ni:cū neq̨ febris:neq̨ calor affuerit:ſ3 aderit ventoſitas
magna. ℞.caſtorei:opij aſſati:ſtoracis liq̄de:myrte:ſemi/
nis iuſq̄ami ru.thuris:an̄.ptes equales:mellis qđ ſufficit
ad ſpecierū cōſperſionē:doſis ē a.ʒ.ij.vſq̨ ad.iij. ¶ Jte3
cōfectio empl'i ad hoc de ſtorace. ℞. cimini aſſati.ʒ.ij.te/
rat̄ ⁊ cōfice cu3 ſtorace liq̄da.⁊ applica ſup vētrem ſedat
dolorē.ſtrigit ⁊ reſoluit vētoſitatē. ¶ Cliſtere ꝯſtrictiuū
valde ſcđ3 eūdē. ℞. panici excorticati lētiū:⁊ riſi excorti/
catoꝝ:roſaꝝ ſiccaꝝ:balauſtiaꝝ:copulaꝝ glādiū:an̄. M.
Loia in lib.iij.aq̄ pluuialis buliāt:donec ad tertiā redeāt
colent̄:deīde ſumat̄ ceruſe cineris q̄rte papiri:balauſtia/
rum:an̄.ʒ.i.boli armeni.ʒ.i.vitellis oui aſſati.i.olei ro.ʒ.i.
Ex his oībus ī predicto appoçimate fricādo diſſoluant̄ ⁊
cliſteriçet̄ eger bis vel ter. ¶ Modus licinij ſcđ3 Alexā
drū.quo vtit̄ qñ dolor ſit fortis:⁊ vigilie:⁊ ē mirabil'. ℞.
croci myrre:licij: olibani:an̄ partē.i.opij partes.ij.fiat lici
niū de pano nouo:⁊ torqueat̄ bene.⁊ diſſoluat̄ opiū ī vīo.
Et cum eo confice alias medicinas:⁊ iuoluatur licinium
medicamine.⁊ ponatur ⁊ cliſteriçatur cumeo in vulua
ad fluxum ſanguinis. ¶ Confectio trociſ. de alumine.
Recipe gallarum aluminis : acacie : balauſtie: corticis
granati:ſucci hipoqſtidos:ana. ptes equales:terant̄ ⁊ cli
ſteriçant̄ cū decoctōe mediane corticis glādiū:balauſtia
rum ⁊ roſarum. ¶ Jte3. ℞.tapſi barbaſſi:⁊ adde parum
piperis.⁊ coque in optimo vino acetoſo : ⁊ calidum quā/
tum tollerare poterit applicetur ano. valet tenaſmoni : ⁊
egreſſioni ani.

¶ Caplm.v.de emoroidibus ⁊ medicinis eius.

[E]Moroides ab emoroſagia dicte ſūt:eo q̄ ab eis
plurimū ſanguis fluit. Unde.H.ait. Emoroides
ſunt fluxus ſanguis ex ano.que3 ipoſ'e eſt eē ſine
apitiōe venaꝝ q̄ ſunt ī eo.Eſt.n.anus foramē īferius poſt
tū ſub cauda expulſiōis ſupfluitatū ſiccaꝝ deſeruiēs:cui
cōiungit̄ extremitas īteſtini recti ī quo ē lacertus vn⁹ la/
titudinalis ſua ꝯtractiōe retinēs ipas ꝑ velle.⁊ ꝓhibens
egreſſiōe3 hora īcōueniēti:⁊ extēdit̄ in egōne:nec nō ⁊ ca
capita venaꝝ quinq̨ emoroidaliū ſunt in ei⁹ circuitu po/
ſita.Egritudines ergo euenire poſſibiles ſunt plures ſecū
dum pluralitatem eoꝝ que cōueniūt in ipo.Et ſunt emo
roides apoſtemata:ragadie:fiſtule:vlcera:⁊ mollificatio.
quare egreditur īteſtinum rectu3 que omnes ſunt diffici
les ad ſanandum propterea aggregantur in eo ſuperflua:
quorum eſt via penetrans ad inferius in quo eſt ſituatus
vſque ſuperius:⁊ eſt fortis ſenſus:quare quod deſcendit
ad ipſum dolorem ad auget ⁊ diminuit ipſum a quiete cū
qua completur receptio iuuamenti medicinarum.
Diuidunt̄ aūt emoroides dupliciter ex pte ei⁹ quod.H.di
xit apertionē oris venaꝝ que ī ano ſunt qđ denotat mem
brū ⁊ a parte ei⁹ qđ dixit eſt flux⁹ ſanguis q̄ ē accñs.ſ.a cor
pore exeūtis. Primo mō q̄druplicíter a pte ſpēi loci diſpō
nis:⁊ finis ſeu malitie.A pte ſpeciei:nā ſunt ei⁹ tres ſpēs.ſ.
verucales morales:⁊ vuales ſeu veſicales: verucales ſunt
que ſunt ſimiles verucis paruis ⁊ vue ſunt late rotunde
purpurei coloris aut ad purpureitatē decliues vel ſicut ve
ſice ⁊ morales ſunt molles ſanguinee. A parte loci:nā q̄dā
ſunt extra manifeſte q̄dā intus occulte. A parte diſpoſitio
nis:nā q̄dā ſunt apte quedā cece. A pte finis ⁊ malitie.na3
deteriores:⁊ nociue magis ſunt verucales ⁊ occlte ⁊ cece
⁊ ꝓprie q̄ ꝓpingores ſunt in ſuo ſitu cāne veretri : qđ ē qr
qñ emoroides apantur oppillāt curſu3 vrine.Et q̄ ſunt re
tro nō nocēt mltū. Et a pte ſi moderate mittāt:vl' minus
debito:ſunt min⁹ male ceteris.ſi vō ſupflue magis male.
A pte ei⁹ q̄ ſunt flux⁹ ſanguis triplex.ſ.mãe q̄litatis ⁊ q̄ti
tatis ⁊ tpis:nā aut fluūt ſeu emittūt moderatū ſanguine3
in q̄titate ſcđm ei⁹ abundantia3 in corpore apparentē ad
ei⁹ expurgandas ſupfluitates ſecūdū hyp.⁊ cōuenienti q̄/
litati:qr nigrū ⁊ tpe qr in ꝯſueto ꝑiodo:Aut ecōtra ī oībus
aut coꝝ aliquo.ſ.q̄titate vl' q̄litate vel tpe ꝑmo mō talis
fluxus dict⁹ eſt a.H.nālis ſcđm formā q̄dē ſcilicet ꝯſuetū.
eo q̄ ꝯſuetudo eſt altera nā ſcđm hyp. Nec dixit ipm ſim
pliciter nālē ꝓpter cām īferius aſſignandā. Secūdo mō
ināliſ:ꝓp qđ aduertēdū q̄ flux⁹ ſanguis q̄ de corpore hoīs
ꝓcedere ꝯſueuit plurimū ē triplex. Menſtrualis de nari/
bus:⁊ emoroydalis ꝑ virgā ⁊ īteſtina malus eſt:⁊ ꝑ os etiā
qualiſcunq̨ ſit:vt dixit hyp. Mēſtrualē vero.H.inter ali/
os dixit nālem abſolute de narib⁹.ſil'r yſaac de emoroidi
bus hyp.bonū:⁊ nāle3 dixit cū ꝯditione:ſi videlicet niger
exierit. Propter q̄ ſciendū q̄ fluxus emoroydalis in ho/
mine3 nāliter eſſe non d3:ſed ꝑter nā3 ⁊ accidaliter tan/
tū.hō enī cū ſit nāliter ſanus ſuaſq̨ ꝑfectas opationes ha/
beat in etate in q̄ ad finē ꝑuenit augmēti exiſtēs ſi debite
regulat̄ ſanguinē talē agregare non debent:maxime ſi ſe/
xus fuerit maſculini q̄ ter ſexus magis exierit ꝑfect⁹. Un
nec emoroidaꝝ fluxū nec aliquā aliā eundē manifeſtā ſu
perfluitatē tertie ⁊ q̄rte digōnis d3 habere.vnde etiam ſu
dor in eo preter nām eſt vt theophilus inq̄t. Jn ſexu autē
feminino qui eſt imꝑfectus cū femina ſit maſculus occa/
ſionatus ſecundū philoſophū.quantūcunq̨ ſan⁹ debet ha
bere euacuationē ſanguinis ex ſui lapſu mltiplicati ſic ha/
buerit nāliter menſtrua ad expellendū groſſu3 ſanguinis
Et qr contingebat aliquando licet raro ſubtile3 ſanguinē
abundare in ea ſuperiora petens ſtatuit nā fluxu3 ſangui/
nis nariū vt eo educeretur vel vt illo defficiente expellat̄
per nares:vt hyp.dixit cū ait in affo. Mulieri menſtruis
defficientib⁹ ſanguinem ex naribus fluere bonum. Pro
inde yſaac dixit omnē fluxū ſanguinis ꝑter nā3 preter flu
xum ſanguinis nariu3 ⁊ menſtruoru3. Non ergo emoroi/
dalis fuit neceſſarius ei cum ſanguis groſſus ipſe mltiplicus
menſtruis educat̄ ſicut quandoq̨ ecōuerſo cōtingit.igit̄
talis fluxus nāliter in eo eſſe non pōt:ſed preter nā3 ⁊ acci
dentaliter tantū inq̄tū puta contingit a generatione tem
pore vel etate hoīe3 ī ſua idiuiduitate labi a ſanitate ⁊ nō
femina3 tantū:que ex ſuo ſexu lapſa exierit. Quapropter
contingit ipm ſanguine3 in corpore mltiplicū aggregari quē
nām impellere eſt neceſſariū ad id cōpulſam ad illas par
tes ani ad quas ſua grauedine tendit vt inde extra corpus
expellat.Sicut eni3 femina l3 in ſuo ſexu lapſa a ſit pōt ta
men in ſua indiuidualitate habere aliquā perfectionē ꝑp
quā carebit menſturis vt nihil vel paru3 habeat: ſicut eſt
virago:vt ariſto.ponit ⁊ Abo.ſic mas perfectus in ſe a ſua
ꝑfectione a generatione tempore vel etate labi poterit:vt
ꝑ eius emoroydes fluat ſanguis.⁊ ēt mulier multo magis
cum ſit in ſuo ſexu lapſa:quare tamē in ea abūdabit tunc
mltiplicus ſanguis q̄ ad eius cōpletā mundificatione3 men/
ſtrua non ſufficiunt ſi fluant:ſed emoroydib⁹ etiā ſupple/
ri o3 ſic accidētaliter talis flux⁹ ſanguinis emoroydalis:⁊
preter nām in hoīe ⁊ non nāliter eſſe poteſt. Cōſideratus
autē ex ſe talis fluxus vt cōſuetus factus q̄tu3 ad ſuas cō
ditiones variantes ipſum poteſt eſſe nālis ⁊ preter nā3:vt
ſuperius dictum eſt.ſicut etiam fluxus ſanguinis narium
⁊ menſtruorum ſicut voluit.Hal.Cum enim ſint tēperati
in quātitate ſuperflua vel diminuta vel qualitate vel tem
pore quia in conſueto peryodo ſunt naturales:cum vero ī
temperati in quantitate ſuperflua vel diminuta vel tem
pore:quia continuatio fuerit preter naturam . Sic fluxus
menſtruorum etiam ad intra qui dictus eſt a . Hali.ſolus
naturalis cum proſit ſpeciei ⁊ indiuidue ſecundum tales
conditiones:dici poteſt naturalis ⁊ preter naturā.Ex qui
bus concludendum eſt fluxum ſanguinis menſtruorum
eſſe naturalem ⁊ emoroydarum preter naturam:⁊ ex na/
ribus medium inter illos comparatione habita reſpectu
corporis cui debentur ⁊ in ſunt.Sed inquantū facti ſunt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0352-4