remus dicere reſeruamus.

Sequitur ſumma vltima particule tertie: ſectionis prime de egritudinibus ſplenis cõtinens capitula quatuoꝛ.

Caplm primum eſt probemiale: ⁊ eſt ſermo gn̄alis in ſplene ⁊ egritudib⁹ ei⁹.
Caplm. ij. de oppilatione ſplenis.
Caplm. iij. de apoſtematibus ſplenis.
Caplm. iiij. de ſpeciebus icteritie.

Caplm pͥmū generale de egritudinibus ſplenis.

g Alien⁹ inquit cõmentari ⁊ exponere qd circa gn̄atione humoꝝ in epe contingere dicāt antiqui per exēpla lꝫ adiſcere. Uinū vtiqꝫ nouiter itelligere expreſſuꝫ ab vuis nõ colatū: ⁊ buliēs ⁊ alteratū a caloꝛe q in ipo eſt demū ſcdm ſui trāſmutationē duas gn̄atas ſupfluitates in eo eē apparebit. hāc qdem leuioꝛē ⁊ mollioꝛē hāc aūt terreſtrem ⁊ grauioꝛē: quaꝝ hāc qdem floꝛē: hāc vero fecē vocāt qḋ ex eis depuratū in medio exiſtit vinū Silr̄ ⁊ in generatione ſanguinis in epate alterato chilo: ⁊ trāſmutato a caloꝛe epis ē videre in eo duas generari ſuperfluitates vnam ſupernatantem vocatam colām ſpume aſſimilatam: alteram deſcendentem grauem aſſimilataꝫ feci vocatā meliam: ⁊ qḋ depuratū eſt ab eis mediū ſanguinē aſſimilatū vino depurato ab illis: a qbus depuratū opꝫ eē ſanguinē naturalib⁹ exiſtētibus pro parte: ⁊ ēt factis innaturalib⁹ per aduſtionē ꝓpter dictam ſuperius cāꝫ i caplo pͥmo h⁹ aūqꝫ i alimētū trāſeat ipoꝝ mēbroꝝ.

Ad huius aūt mūdificationeꝫ artificialis nā duo creauit mēbra: vnū qḋ ꝓpter amaritudinē xancte colere nālē ſibi admixtā trahat. ſ. veſicā fellis ciſtim ab antiqs vocatam: que duas tunicas hꝫ ꝯtextas ex triplici gn̄e neruoꝝ ad modū tunice vni⁹ oꝛtoꝝ a venis epis ad quā veniūt ex neruo ⁊ vena pulſatili. ij. rami parui a cerebro ⁊ coꝛde. q̄ p poꝛum explātatū ab eis ipam coleraꝫ ab epe ſibi ipulſam trahit cū virtute ꝓpria: vt ex ea nutriat̄: ⁊ qḋ ſupereſt expellat per poꝝ aliū qui in plurib⁹ hoīum eſt vnus mittēs colerā ad gracilia iteſtina ad expurgandū ea non ad ſtōm cū ledat̄ per cā: nauſeet̄: ⁊ ei⁹ digō coꝛrūpat̄. In qbuſdā ēt duplex eſt: ſiue biffurcat⁹: ⁊ p vnū mittit coleraꝫ ad iteſtina: ⁊ p aliū ad ſtōm nõ in vacuū ei⁹ ꝓpter dictā cām: ſed īter duas tunicas ei⁹ ad faciēdū: ⁊ adiuuādū digeſtiuam. Et in quibuſdam eſt amplioꝛ primus: vt in Audino pho: ⁊ in qbuſdā ſecūdus: vt in ſabino ſacerdote: vt recitat. G. At quoqꝫ creauit mēbꝝ qḋ ꝓprie trahit feces eius. ſ. ſplenē: qḋ adhuc eſt vt fecē ſanguis naturalē ⁊ inaturalē ſemper trahat cū virtute ꝓpria per poꝛū ꝯiūctū epatis venis: a parte cõcaua: qui in venis pulſantib⁹ in eo digerit̄: vt ex ea nutriat̄ ⁊ ſanguine: ⁊ ſua ſube raritate recipiat cum ſit groſſa: ⁊ retinet donec digerat: ⁊ qḋ ſupeſt ei remādet per aliū poꝛū ad ſtōm: vt cū alijs ſuis ſupfluitatib⁹ expellat q in hoīe figure eſt clipealis ſicut i poꝛco liguoſe: ⁊ eſt coopertus pellicula oꝛta a ſiphac: ⁊ dyafrate: ⁊ ſuſpenſus pāniculis coſtaꝝ: q̄ſi ligamētis a parte ſiniſtra ad ꝯtēperandum caliditatē coꝛdis ſua frigiditate. Si ergo deficiat mūdificatio ſanguis ab illis ſuperfluitatib⁹ totalr̄: vel pro parte ſiue ꝓpter cām mēbroꝝ. ſ. debilitateꝫ epatis expellētis: ⁊ ipoꝝ. ſ. fellis ⁊ ſplenis trahētiū: ſiue ꝓpter cām in poꝛis: p quos ab epate trahūt. ſ. oppilationeꝫ: ſiue per cām ſupfluitatū. qꝛ ſit amplioꝛ q̄ꝫ trahere poſſint remanēs colera xancta cū ſanguine in epate facit apa euenire in eo: vt ſuperi⁹ dictū eſt: vel trāſiēs de eo cū ſanguine per venas facta occaſiōe aliqua intrāſpirabilis putrefit ⁊ accendit fe. tertia. ꝯtinuā vel cauſonē veniēs ad lacertos ⁊ ſubcutaneas partes putrefacta accēdit fe. tertia. iterpolatā. vadēs ad cutiꝫ diffuſa in ea cū ibi trāſpirabilis ſit per poꝛos ei⁹ facit icteritiam citrinam. Collecta in aliqua ſui parte facit eriſipilam. ſi aduſta facit eriſipilā vulneratiuā: ſeu carbūculum ſicut i cerebꝛo carabitū. Silr̄ itelligas ſi melīa cū ſanguine mixta. facit. n. egritudines ſimili modo ſcdm gen⁹ ſuū. In epe pmanēs facit ſclirośim: vel oppilōnes in totū coꝛpus vel habitudinē lacertoꝝ diffuſa ſi fuerit aduſta facit leprā ſi in cute ſit diffuſa facit icteritiā nigrā. ſi in vno mēbꝛo collecta nõ aduſta facit duritiē. ſi aduſta q̄ꝫtuꝫ ad partem groſſaꝫ facit cancrū: q̄ꝫtum ad ſubtilē antracē.

Si vō trahāt perfecte: nõ tn̄ ex eis qḋ ſupeſt: poſſunt expellere ad ſtōm ⁊ iteſtina: ſiue pp cām exiſtētē i mēbꝛis. ſ. felle ⁊ ſplene: ⁊ epe. ſ. debilitatē accidētē eis. ſiue ꝓpter cām exiſtētem in poꝛis: per quos excernūt: ⁊ mādāt illas: puta oppilationē ſiue cām exiſtentē in ſupfluitate. qꝛ ſit amplioꝛ q̄ꝫ expellere poſſint remanēte in eis neceſſe eſt ipa mēbꝛa igroſſari: ſi in vacuū ſit colecta: ⁊ apari ſi colliget̄ in poꝛoſitate ipoꝝ: ⁊ cupiꝫ. Et cū ꝯuertat̄ in vētū neceſſe eſt ipm iflari: ⁊ cum ſplen igroſſat̄ coꝛpus neceſſe eſt ſubtilia ri: ⁊ econuerſo. vt ait hyppo. Et illud ex triplici cā: vna qm̄ deſtruit̄ virt⁹ epis vehemēter cū ꝯtrarietate hūoꝛis: quare minoꝛat̄ gn̄atio ſanguis. Scōa eſt. qꝛ cū hoc ꝙ attrahit de ſanguine bono coꝛpoꝛis illi⁹ iferūt rē plurimaꝫ ꝓpter magnitudinē ſuā. Tertia cā eſt: qꝛ ex multiplicatiōe melācolie ſanguis remanēs fit ifect⁹ quē abhoꝛrēt membꝛa ſic nõ nutriunt̄: ⁊ extenuant̄: cū ergo ſplen extenuat̄ accidit ex cõtrarijs cāis: ex qbus coꝛpus ipinguat̄ ⁊ igroſſat̄ Si vō tractas ſuperfluitates pfecte nequeāt ſuſtinere pp defectū cõtentiue illoꝝ mēbꝛoꝝ: vel amplitudinē poꝛoꝝ vel ꝓpter multitudinē ⁊ malitiaꝫ ſupfluitatum trāſiens colera vltra modū ad ſtōꝫ: ⁊ ſilr̄ melīa faciūt nauſeā ⁊ coꝛrūpūt digōnem. ſi ad iteſtina faciūt multū fluēdo diſenteriā. Ingt. n. G. plurima diſenteria ex colera ni. fit. Et ſi a colera ni. ⁊ felle iceperit: eſt moꝛtalis. ait hyppo. Si vero trāſeat colera ad vias vꝛine: que ſunt ei⁹ euacuatoꝛiꝫ ꝓpriū ſcdm. G. facit ardoꝛē vrine. ⁊ deīde vlcera eoꝛundeꝫ qḋ āt ex pdictis colligere oꝫ. ē ſcire nāꝫ pdictoꝝ mēbꝛoꝝ . ſ. ciſtis fellis ⁊ ſplēis opatōes ⁊ iuuamēta: nec nõ ⁊ egritudines eis euenire poſſes: cās quoqꝫ: quaꝝ quedā ſunt pꝛoprie ⁊ in ſe: ⁊ quedā ex colligātia ⁊ vicinitate: ⁊ illud eſt ad epar plurimū. ⁊ ſunt oīs gn̄is. ſ. mala ꝯplo debilitans ſuas nāles operatiōes: mala ꝯpoſitio. ſ. oppilatio ipediēs debitā operationē coꝝ ad quā oꝛdinauit ipa nā. ſolutio continui ⁊ apa: ſeu groſſicies pter nāꝫ ad q̄s ſeqt̄ plīmū accn̄s ſedātiū coloꝛis nāl'q fac ad pulchꝛitudis bn̄ eē: qḋ ictericia dr̄: ō qb⁹ dicet̄ p oꝛdinē xpo yhu auxiliāte q ſit benedictus. Et qꝛ pdicte egritudines ciſti poſſibilr̄ ꝯtingētes ⁊ egritudies epis cui affixus eſt in cura nõ differūt. ideō obmittātur: eſt. n. eadē vtraqꝫ cura. Sꝫ de egritudinib⁹ ſplenis plīmū ꝯtingētibus ei cū ſit mēbꝛum ab epe diſtictū ſpecialr̄ dicere eſt in hac quarta ſūma neceſſe

Caplm. ij. de oppilatione ſplenis.

o Ppilatio ſplenis eſt egritudo officialis veniēs in vijs ⁊ poꝛis ei⁹: per quos trahere ⁊ excernere hꝫ fecē ſanguis ab epe: quaten⁹ mūdificet̄: ⁊ conueniēs fiat alimēto mēbꝛoꝝ. Et eſt triplicis ſpēi: aut. n. eſt i poꝛo q eſt iter ipm ⁊ epar: per queꝫ hꝫ trahere ſanguis feces ab ipo: aut eſt i poꝛo q eſt iter ipm ⁊ ſtōm per queꝫ qḋ ſibi ſupeſt mādat illi: aut i vtroqꝫ. Cauſa aūt ipſi⁹ ex cauſis oppilōnis epis eſt manifeſta. ⁊ plurimum eſt coartatoꝛia. Cui⁹ cā vt pcedenti caplo dcm̄ fuit. eſt hūoꝛ melic⁹ feculēt⁹ ⁊ lutuoſus queꝫ trahere hꝫ: ⁊ excernere ſua multitudīe ⁊ groſſitie nõ potēs trāſire p poꝛos illos: ſꝫ remanet obſtruct⁹ i eis. Et q̄nqꝫ eſt attenuatoꝛia ex ſiccitate: ⁊ pūctōe colere. vel vētoſitate vicinoꝝ: vel apate ꝯprimēte. Et raro ē carnoſa. ⁊ cū ē nõ ſeparat̄ cura. Signa vō

oppilõnis poroꝝ diſticta ſũt. nã ſi qdẽ oppilõ ſit ĩ poro: ꝑ
quẽ trahit extẽuatio erit ĩ ſplene. Et ẽt ſi ſit ĩ vtroqꝫ magis
nec pro tãto corpꝰ erit pingue: ſꝫ extenuatũ magis ꝓpter
ſanguis ĩduritatẽ: ⁊ maiorẽ ĩfectionẽ: ⁊ ṗdicta accidentia
apparebũt in alijs mẽbris: ⁊ vniuerſo corpore: ⁊ cute. Si
vͦo ſit in porro: ꝑ quẽ illã excernit: ⁊ mittit ad ſtõm groſſi-
cies: ⁊ duricies cũ grauedine apparebit in ſplene. nõ ex nã
⁊ diſpõne mẽbri. qꝛ ſit ſtrictoꝝ poroꝝ: vt epar cũ ſplen ra
re ⁊ mollis ſubẽ exiſtat: ſed ex nã ſubẽ hũoris obſtruẽtis
⁊ derẽti q groſſus eſt ⁊ terreus ſicuti. H. dixit. Et in vtraqꝫ
eſt defectio appetitus: ⁊ vrina magis ſcõm plurimũ. ⁊ ege
ſtio: quaſi ꝯſueta minꝰ ſcõm diuerſitatem poroꝝ. Si. n. in
ṗmo poro per quẽ trahit ſit oppilatio. oĩa erũt minora. Et
ſigna cauſaꝝ: ⁊ modoꝝ alioꝝ ex dictis in oppilõne epatis
ſunt nota. Signa vͦo vẽtoſitatis ⁊ apatis ĩfra dicenť. Cu
ra oppilõnis ſplenis: ſicut cura aliaꝝ egritudinũ eius gñā-
liter ex cura oppilõnis epis ſuperiꝰ dicta eſt manifeſta.
Eadẽ. n. vtriuſqꝫ ẽ in re: ⁊ in ĩtentiõe. Cõplemẽtũ tñ eius
ſeu ꝓſecutio: fiet qñqꝫ cũ eiſdẽ: qñqꝫ cũ fortiorībꝰ ꝓprijs
⁊ diuerſimode miniſtratis. Ingt. n. H. nos nõ ĩuenimus
medicinas alias que ſint magis ĩciſiue ⁊ ſubtiliatiue hũo
rum groſſoꝝ: ⁊ viſcoſoꝝ q ſunt in pectore ⁊ pulmone: ⁊ ſa-
nici exiſtẽtis in pectore: nec melioris aptitudinis ⁊ conue
niẽtie ad maturãdũ: ⁊ iuuamẽti ad ſpuẽdũ illud qͦ oꝫ q̃
ṗdicte. Et de ꝓprietate eaꝝ eſt huius: vt aperiãt oppilõ-
nem epis: ⁊ mũdificẽt venas eiꝰ: ⁊ faciãt ſimile illi in ſple
ne: qñ oppilõ nõ eſt vehemẽs: qñ oppilõ: qñ eſt in ſplene
vehemẽs ĩdiget medicis fortioribꝰ iſtis: ſicut ſunt radix ⁊
cortex capparis: ⁊ radix tamariſci: ⁊ medicina noĩata gre-
ce ſcolopẽdria: ⁊ ſqlla: ⁊ herba noĩata aſceleni: cuiꝰ expoſi-
tio eſt mũdificatiua ſanguĩs. ⁊ extimo q ſit cortex ſalicis
vel fraxini. Et ꝯuenit tibi: vt ſit viſus vniuſcuiuſqꝫ eaꝝ di
uerſus. Medicine. n. ſplenis approximãde ſunt cũ aceto.
Epatis cũ ſyrupo acetoſo. ⁊ aq̃ ordei. In pectore ⁊ pulmo-
ne cũ aqua mellis: ⁊ kiſt ordei: ſꝫ opꝫ q ſint medicine ma-
terieꝝ reſolutiue ſplenis magis ſtiptice medicis epis ꝑꝑ
ſubẽ raritatẽ ſplenis: vt dicit. H. Specialr qñ plurimũ
coartatoria eſt. cura eiꝰ eſt quatuor res. pͥa ẽ euãtio. ſecũ-
da pori expurgatio. tertia ponit ſtudiũ in vita. quarta eſt
accidẽtiũ correctio. Euãtio eſt duplex. ṗma eſt cãe retẽte
in epe ⁊ venis. ſcõa cãe oppilãtis ⁊ retẽte in ſplene. ❡ Pri
mã ꝯplẽt: ſi cũ melĩco hũore peccare ſanguis appeat: qͦ
tumor venaꝝ illaꝝ partiũ ꝓpe ĩdicat. flẽomia de baſilica.
ṗmo. deinde de ſaluatella ſiniſtre manus: que tãdiu fluat
q̃diu reſtringeť ꝑ ſe ſi nã corꝑis tollerabit: vel flẽomia de
ſaphena loco eiꝰ. vel aptio venaꝝ emorroidaꝝ ꝓpͥũ ſi re
tẽtio ſanguis mẽſtrualis: vel emorroidaliũ ṗceſſerit.
❡ Ingt. n. H. melĩcis emorroides ĩnate bonũ. Et qñqꝫ ti-
bi neceſſariũ ẽ vt flẽomes guideç ſiniſtrã: deĩde cũ euõne
ipĩꝰ melĩe ꝑ fluxũ vẽtris ꝓprie dicẽte hyppo. Spleneticis
diſſinteria ſupueniẽs bonũ. Que ſi ꝓlongeť accidit ei hi-
drops: aut liẽteria: ⁊ pereũt ſplenetici. Spleneticꝰ ãt eſt q
duriciẽ ⁊ groſſiciẽ hꝫ in ſplene. dicit Abo. ❡ Scõam euõ-
nẽ cãe oppilãtis ꝯplẽt euões cũ medicis educere hñti-
bus hũorẽ melĩcũ a ſplene ꝓprie ſimplicibꝰ ⁊ cõpoſitis: q̃
ĩfra dicenť: cũ ṗmiſſiõe medicinaꝝ maturãtiũ ⁊ aperien-
tiũ hũorẽ ⁊ mẽbꝝ: q̃s dicemꝰ. Et vltimo cũ medicis reſol
uẽtibꝰ ipm de loco: qbus mollificãtia ſunt ṗmittẽda: vel
ꝑmiſcẽda: vt ĩfra diceť. Medicine vͦo ſimplices: qbus eſt
maturatio ⁊ aptio ſũt apitiue: ĩciſiue: ſubtiliatiue: ⁊ abſter
ſiue. Et haꝝ q̃dã ſunt tales a ꝯplõne. qꝛ ſunt tẽperate cali
de ⁊ amare: ſtiptice: ⁊ confortatiue: quedam a proprietate
confortatiue. Que vero ſunt tales a complexione ſunt
duplices: quedam leues: ⁊ quedã fortes virtute: leues ca-
medreos: camepitheos: cicera: ſuccꝰ cauliũ domeſticorũ:
acorus: aniſũ: agnꝰ caſtus: ſcolopẽdria: canabir: poliũ: ſpa
ragus: nil. acetoſa: anetũ: eupatoriũ: bedeguar: feniculus:
aſſe: ſpica: calamẽtũ: ⁊ ſil'es. Fortes ſunt naſturciũ volubil'
ſemẽ raffani: ⁊ ſinapis: praſſiũ: lupne: iũiperꝰ: fructꝰ rubee
tinctoꝝ q aperit ⁊ mũdificat a ꝓprietate: ſqlla oximel eiꝰ
⁊ eſt vltima. Leuibꝰ ergo vtere in oppilõnibꝰ leuibus: ⁊
fortibꝰ ⁊ ꝯpoſitis in fortibꝰ. Inquit. n. H. forti ĩfirmitati
fortis medicina occurrat. Cũ ergo in mã apparuerit digõ
euãbis cũ epithimo a. ʒ. iij. vſqꝫ ad. v. cũ ſyrupo acetoſo. ⁊
cũ reiteratõe. educit. n. id qͦ ẽ ĩ ſplene: ⁊ detũeſcere facit
illũ: vel armoniacũ cũ ſyrupo acetoſo. ⁊ decoctiõe lupino-
rum ⁊ cappar. vel ſuccꝰ eiꝰ: educit. n. mãm groſſam: ⁊ ſeqť
ſanitas: ⁊ radice lilij: vel vrina ⁊ lacte camelaꝝ nutritarũ
ex ſcea: aniſo ⁊ feniculo. ❡ Scõam rem ꝯplẽt ꝯfortãtia ex
cibis ⁊ potibꝰ q ĩfra dicenť. Et medicine operãtes illud a
ꝓprietate ſunt tales. ſ. ſumac ſcis portulace. ʒ. ij. cũ aceto:
aut corali valde ꝺcocti: aur. i. cũ ſyrupo acetoſo. Et emplꝫ
de cucurbita tenera. aut cucurbita ipſa terať poſt exicca-
tionẽ: ⁊ bibanť ex ea. ʒ. ij. cũ ſyrupo acetoſo. ⁊ ſemẽ cãnc: ⁊
ſemẽ cuſcute: ⁊ folia ſalicis: ⁊ ſemen acetoſe: ⁊ attriplicis: ⁊
fructꝰ tamariſci: ⁊ folia eiꝰ: ⁊ pulmo vulpis: ⁊ ſplen aſini ſil
ueſtris: ⁊ puli eqni exiccati. ⁊ epar ipĩꝰ exiccatũ. ʒ. ij. cũ ſiru
po acetoſo. Medicĩe reſoluẽtes ſimplices ſunt predicte
operãtes a ꝯplõne: q̃s ꝑ te eligas: ⁊ ex eis ꝯponas ꝓut te ĩ-
uitat neceſſitas: ⁊ alias ĩfra dicemꝰ: ⁊ etiã mollificantes.
❡ Scõa res cõpleť cũ euõne ptis: ſeu expurgatione pori
oppilati. ſi. n. ſit in poro q eſt ĩter ipꝫ ⁊ epar ꝯpleť aptio cũ
leuioribꝰ: ſꝫ ĩ poro q ẽ ĩter ipm ⁊ ſtõm: ſeu in vtroqꝫ ꝯpleť
cũ fortioribꝰ ṗdictis. ſilr ⁊ ĩ ciſti. Tertia res que ponit ſtu
diũ ĩ vita ꝯpleť cũ ordĩatiõe regiminis ĩ cibo ⁊ potu. Et ẽ vt
cibi ſint leues ⁊ pĩgues ex iuribꝰ ⁊ carnibꝰ ṗpatis cũ ſubti
liãtibꝰ: ⁊ calefaciẽtibꝰ eũ: eq̃litate: vt capar. cũ aceto: ⁊ re-
liq̃ q̃ ſciuiſti ſupra. Et potꝰ ſit ſic aq̃ ĩ q̃ extĩctũ ſit ferꝝ igni
tũ multotiẽs: ⁊ vinũ ſbtile. Et breuiter ĩ alijs rebꝰ appropi
quat regimini oppilationis epis. Quarta res. ſ. accñtium
correctio: ⁊ proprie duriciei ac ſplenis doloris: que nunc
diceť. Alioꝝ vͦo accñtiũ q̃ ĩ mẽbris ⁊ toto corpe ꝯtigũt ex
ea ĩfra ſectõe ſcõa ⁊ tertia diceť: vbi ꝺ vnoquoqꝫ caplꝫ fa
ciemꝰ appropͥatũ. Sciẽdũ ergo q duriciei ſplenis ꝯueniẽ
tia q̃dã ſũt ſimplicia: ⁊ q̃dã ꝯpoſita. Et ṗmoꝝ q̃dã ſũt ope
rãtia a cõplõne: q̃dã a ꝓpetate. A ꝯplõne ſũt mollificãtia
hũida: ⁊ tẽpate cal'a: ⁊ vnctuoſa: vt fenugrecũ ſemẽ lini. ca
rice: altea ⁊ mucilago earũ: ⁊ radic: filicũ: ⁊ malua: ⁊ radix
lilij: olcũ amigda. dulciũ ⁊ amaraꝝ de lilio. iſopꝰ hũida: ⁊
ſil'ia. Unctuoſa vt pĩguedĩes: adipes oẽs: ⁊ ꝓpe gallic ana
tis: anſeris porci: ⁊ vituli: ⁊ medule ipoꝝ: ⁊ alia ſupra ĩ cu-
ra apatis dcã. H. n. iuncta mollificãt: ⁊ reſoluẽdo extẽuãt.
Operãtia a ꝓprietate ſũt vrina ſplenetici: q̃ bibita ẽ mira
bil'. ꝺcoctõ nucis cõis: vl' cipſſi cũ aq̃ ⁊ aceto ſũpta valꝫ du
riciei: ⁊ ſuccꝰ caul' cũ ſucco ꝺ paſſis: ⁊ ꝺcoctio folioꝝ ſceta-
ragi cũ aceto bibita ꝯfert valde. Et ſcolopẽdria ꝯfert ma
gnifice ſũpta cũ oxielle facto ex ꝺcoctiõe folioꝝ eiꝰ diebꝰ
xv. Spica cũ vĩo bibita oſtracũ puꝝ cũ aceto bibitũ been
qñ bibiť cũ aceto mixtũ ĩ põdere. ʒ. ij. acorꝰ ꝯfert groſſiciei
⁊ extẽuat ipꝫ. armõiacũ ⁊ oppopõacũ cũ aceto more ẽplĩ
ſuppõiť: ⁊ bibitũ aceto. viſcꝰ cũ calce: extẽuat ſplenẽ iſopꝰ
hũida cũ caricis ⁊ baurac ꝯfert duriciei. ariſtolo. cũ melle
ſupiuncta ṙſoluit duriciẽ: ẽt ẽplꝫ ex naſturtio cũ melle. Et
fẽu grecũ ẽpl'atũ cũ nitro. granũ vide. ⁊ ꝓpe alboti cũ des
reſoluit duriciẽ. Cortex rafani cũ oxielle ẽpl'atꝰ ſi emplm
ex accalo. cẽtaurea valꝫ duriciei bibita ⁊ ẽpl'ata. ſcertaragi
. i. tapſia linita ſuꝑ ſplenẽ extẽuat: ſinapis extẽuat lactuca
aſinina cũ aceto cõcta ⁊ ẽpl'ata: ſtercꝰ capraꝝ mõtanaꝝ ꝑ
ṗe ẽpl'atũ: ſuccꝰ ẽt ſyrupꝰ: ⁊ reubarbaꝝ ẽpl'atũ: ⁊ ſil'es. Do
lori ãt eiꝰ ꝯuẽiẽtia ſt h ⁊ betõica cũ ex ea ſumunť. ʒ. iij. cũ
melle ⁊ aceto: ⁊ ſil'ia. Attẽdere ãt oꝫ ⁊ nãꝫ ſplenis ꝑꝑ iuua
mẽtũ eiꝰ ĩ cura ⁊ me. dcẽ: ⁊ q̃ ſpleĩs ĩ paſſiõibꝰ miſtrãť: ꝟtu
tis vehemẽtia ſint ill' ꝓportõate. Ait. n. H. ni. col'a potõi ñ
obedit: ⁊ ĩ oppilõnibꝰ eiꝰ maxie nõ facile ꝑtranſibilis. du-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0320-5
DFG

plici enim interueniente alteratione:ac moꝛa in trāſitu p
artos ꝛ coartatos meatus periculū eſt eaꝝ exſolui virtu/
tem anteq̄ȝ ad ꝓfundū ei⁹ deueniat qđ ex nāli cōplone ꝛ
diſpōne ſube ac ꝓprietate ſube iueſtigari opȝ. Que.n.cali
da ſunt cōplone ꝛ ſimilia ꝓprietate ſe iuicem trahūt ꝛ tra
hunť.ꝛ ſic velociter penetrabiles fiūt ꝑ ꝑe ſi adſit ſubſtā/
tie diſpō.ꝛ ſubtilitas. q̄ vero ecōtra ꝯriū. Cooperať autē
ars vt inqt heben meſue cū tritura ꝑmixtōe ꝛ coꝛpoꝛis ꝑ/
paratione.tritura vt ſi ſint groſſe ꝛ ſolide ſube teranť ſub
tiliter ſicͣ alcofol.ꝑmixtōe.ſ.cū aceto vl' ſirupo acetoſo qđ
facile pertranſibile ſubtilitate ſube ſue ꝛ virtute groſſiciē
ſubtiliat hūoꝝ viſcoſitatē icidit ꝛ poꝛos ripticādo exfra/
ctat.Coꝛpoꝛis ꝑparatōe vt nō pleno coꝛpoꝛe:ſed ieiuno vl'
appetēti exhibeanť ꝛ poſt fricationē vel exercitiū ſeu bal
neū vt mēbris inanitis ꝛ calefactis velociter attrahunť.
❡ Syrupus extenuās ſplenē:ꝛ aperiēs oppilatiōes eius.
℞.epithimi:corticū radicis capparis:ſcolopēdrie ꝛ fruct⁹
tamariſci corticis ſalicis rubee ireos:aſſari acoꝛi.aā. ꝑtes
equales:decoquanť cū aceto forti.deīde coleť:ꝛ cū çucca
ro fiat ſirupus acetoſus çuccarin⁹ vel melin⁹:ꝛ bibať.do,
ſis.ʒ.ij.ꝛ in q̄lȝ doſi ſit.ʒ.i.armōiaci.Eſt.n. mirabilis adeo
ꝙ ſi ꝑdicte medicīe dētur aliq̄bus dieb⁹ bibere poꝛcellis
nō reperieť in eis ſplen.❡ Trociſci expertoꝝ iuuamēto/
rū in oppilatōib⁹ ſplenis. ℞.rubee.ʒ.xij.corticū radicis ca
paris ariſto.lon.ireos.aā.ʒ.ij.teranť valde ꝛ cōficianť cū
oximelle acetoſo:ꝛ fiant trociſci aur.i.ꝛ denť cū aq̄ abſin/
thij:ꝛ corticū radicis capparis.Dixit almanſoꝛ.ſi cū duri/
cie ſplenis fuerit calitas da trociſcos de agno caſto. ſi fri/
giditas da trociſcos de cappare.❡ Cōfectio trociſcoꝝ de
agno caſto. ℞.ſe.agni caſti:ſe.tamariſci:ſcariole ꝛ poꝛtula
caꝝ.aā.ʒ.v.fiant trociſci.ʒ.iij.cū aceto:de q̄bus deť vnus
cū ſirupo acetoſo.❡ Alij. ℞.folioꝝ rafani recētiū:corticū
radicis capparis fructus tamariſci:ſcolopēdrie ſq̄lle aſſa/
te:piperis al.aā. partes eq̄les. ifoꝛmenť ex eis tro.aur.ij.
doſis.i.cū ſirupo acetoſo. ❡ Syrup⁹ ex īuentōe noſtra.ꝯ
antiq̄s oppilatōes oīuȝ viſceꝝ ꝛ ſplenis ꝛ rectificat ea.℞.
abſinthij:radicis:ireos:cētauree mioꝛis:ſcolopēdrie radi
cis capparis.ꝛ fruct⁹ ei⁹ fruct⁹ tamariſci eupatoꝛij aſſe yſo
pi mōtani.aā.ʒ.ij.ariſto.lon.ꝛ ro. corticuȝ fraſini diptami
floꝝ camomille:aniſi.aā.ℨ.i.ellebori ni.ʒ.i.ſ.maſti. ſerapi
ni galbani oppopōacis:lapidis laçuli ꝑparati ſquame fer/
ri myrre electe:gūmi edere:laudāi.aā.ℨ.i.gar. cubebe:ma
cis galāge cinamomi.aā.ʒ.iij.cuȝ q̄b⁹ aromatiçeť ſirup⁹.
In fine decoctiōis ſue adde epithimi ſene agarici.aā.ℨ.ſ.
ſucci radicū ebuloꝝ ſucci cucumeris aſinini.aā.lib.i. ma/
gnetis.ℨ.i.aceti.ℨ.iij.çuccari lib.iij. doſis eſt ab.ℨ.ij. vſq̄ȝ
ad.iij.cū aqua ſcolopēdrie in ſtō vacuo.qn̄ itur doꝛmitū
ꝛ maxie qn̄ oppilatio fuerit īfixa cū diuturnitate tēpoꝛū
in mēbꝛo.ſanat.n.hec medicia.ſi xp̄s voluerit.❡ Pillule
reſoluētes oppil'ones epatis ꝛ ſplenis ꝛ ad ꝑncipiū idropi
ſis. ℞.rauedſeni.ʒ.v.armoniaci ſerapini bdelij.aā.ʒ.viij.
lacce.ℨ.i.oppoponaci.ʒ.iij.meçereon.ʒ.v.turbit: ſpice po/
lij:aloes.aā.ʒ.v.maſt.ʒ.ij.oīuȝ miroba.aā.ʒ.iij.lapidis la/
çuli abluti epithimi:ellebo.ni. ſalis īdi.ana.ʒ.ij. pigre.ʒ.x.
diſſolue gūmas in vino ꝛ īfoꝛma pill'as.doſis.ʒ.ij.cū ſero.
Et hi pōdus cibi qđ aſſumūt hodie ſumāt cras. Dixit.H.
egritudies ml'ice nō niſi foꝛti medicina curanť: qm̄ ml'ia
nō obedit ei.Dixit Afraym aq̄ in q̄ decocta ē radix iris re
mouet oppil'ones oīo antiq̄s:ꝛ ē foꝛtis opatōis. Dixit.A.
decoctio abſinthij:ꝛ cētauree mioꝛis ē medicia maxia in
remouendo oppil'ones ſplenis.Educ̄.n.vtraq̄ȝ coleram.ꝛ
maxie aduſtā:aperit vias adeq̄t māȝ ad expellēdū ꝛ foꝛ/
taſſe ꝯfoꝛtat mēbꝛa mittētia māȝ ī valoꝛē oppil'onis.Et ē
de ītētōe rei ħe vt ſtō.ꝛ epati ꝯferat.❡ Dixit democritus
fruct⁹ edere folia:ꝛ gūmi ei⁹ a ꝓprietate remouēt oppil'o
nes epis.ꝛ ſplenis antiq̄s.Et fit ex puluere ſcertaragi pul
uis laudabil' q̄ aſſumiť ī cibis oī hoꝛa. ℞. pulueris ꝑdicti
.ℨ.ij.aniſi.ℨ.i.limature argēti.ℨ.ſ.auri boni.ʒ.iij.limature
eris albi.ʒ.i.magnetis.ʒ.ij.gar. cubebe macis: çinçi.gūmi
edere.aā.ʒ.i.çuc.lib.ij.doſis.ʒ.ij.Et ſupbibať paꝝ poſt pa
rū vini antiq.❡ Et ē medicamē regū ꝛ magnoꝝ domio/
rū.Reſpicit.n.coꝛ ꝛ mēbꝛa ꝑncipalia ꝛ gn̄at gaudiū. ꝛ eſt
medicamē diuinū ī rēouēdo oppil'ones.❡ Medicamen
magnū reſoluēs ſplenē duꝝ ꝛ attenuās ei⁹ magnitudineȝ
ꝛ groſſiciē. ℞.armoniaci.ʒ.iiij.floꝝ camōille aneti tama/
riſci.aā.ʒ.i.radicū cappis carui granoꝝ balſami tamariſ/
ci rubee.aā.ʒ.ij.ſq̄lle aſſate.ʒ.iij.ſcolopēdrie ariſto.ro.aā.
ʒ.ij.Cōficiāť cū melle ꝛ denť ex eo.ʒ.iij.cū aceto ſic ꝑpato.
ſpatāe.ʒ.ij.mittanť i.ℨ.vij.aceti boni.ꝛ bulliāt vſq̄ȝ ad q̄r
tā. ſit doſis mediocris a.ʒ.ij. vſq̄ȝ ad.iij.cū.ℨ.ij.ipſi⁹ aceti ī
hoꝛa doꝛmiēdi.Egrediť vt⁹ h⁹ medicamis vſq̄ȝ ad ꝓfūdiſ
ſimas ꝛ abſcōſas mās h⁹ mēbꝛi ml'icas ꝛ violēter opať at
tenuat ꝛ ꝯſumit māȝ rebellē ꝛ ſepultā. Dixit Abo.accipe
veſpertilionē ꝛ decolla ꝛ exicca ipȝ ꝛ ꝯtere ꝛ accipe ex eo
q̄ꝫtū toll'ant tres digiti.aut accipe.vij.veſꝑtiliōes pigues:
ꝛ decolla eos:ꝛ exicca ipſos ꝛ pone eos ī vaſe vitreato ſub
merſos cū aceto foꝛti:ꝛ luta ꝛ dimitte ī furno clauſo. Cuȝ
ergo ꝯcocti ſūt depōe vas extractū dōec īfrideť. Et deīn
extrahe eos ꝛ diſſolue digitis ī aceto:ꝛ ſūať ex eo oī die in
potu pōd⁹.ʒ.ij.ꝛ ē ſana ꝛ expta medicia. ❡ Inqt abo.em/
pl'a vnguēta ꝛ olea ſūt ex ꝯueniētib⁹ medicis egritudib⁹
ſplenis ꝑdcis. ❡ Medicia vͦ ꝛ elm illoꝝ ē:qm̄ qn̄ȝ q̄dē
ſumiť ex ſimplicib⁹ ꝑnarratis:puta q̄ꝛ fit empl'm de ſter/
coꝛe ouiū cū aceto vel ſtercoꝛe capraꝝ mōtanaꝝ cū aceto
ꝛ qn̄q̄ȝ ex fece ipſi⁹ aceti qn̄qȝ fit euapoꝛatio cū ipo.Et qn̄
qȝ fit cataplaſmatio cū filtro īfuſo in aceto tepido.Et qn̄/
qȝ ſumiť ſterc⁹ vaccaꝝ herbas paſcētiū ꝛ exiccať.deinde
cogť cū aceto ꝛ fit empl'ȝ bonū.ꝛ qn̄q̄ȝ puluerīçať ſup ipȝ
ſulfur citrinū.Et ēpl'ȝ cū floꝛe eris ē mirabile. Et ex eis q̄
ꝓpinq̄ ſūt eq̄litati ē ſicla ꝯcocta cū aceto:ꝛ ſil'r radices al/
tee.Et qn̄qȝ fiūt vnguēta ex armoniaco ꝛ ſtercoꝛe ouiū:ꝛ
aceto ꝛ oleo rutaceo.Et olea ſūt de amigdal' amaris:ꝯ ſe.
agni caſti.de granis narciſci aut alcāne:aut fraſini. ꝛ qn̄ȝ
fiūt ꝯpoſita ex ꝑdcis vt ē marā baſilicōis ꝛ marā.H.ꝛ ma
rā factū de radice cappe.īfuſa ī aceto dieb⁹ tot dōec leni/
ficeť:deīn exicceť ꝛ fiat marā ex ea cū cera ex ol'o de alcā
na:aut aſſumať nigredo vaſis ꝯ ere:ꝛ fiat eſt ea cū farina
oꝛ.ꝛ aceto ꝛ ſirupo acetoſo ēpl'm:qm̄ ē vltimū.❡ Euapo/
ratio expta ſȝ alchindū. ℞.rute.corticū radicū cappe.ab
ſinthij:calamēti oꝛigani.aā. ꝑtes eq̄les decoq̄nť ī aceto ꝛ
īfundāť fruſta filtri:ꝛ exꝑmanť:ꝛ applicēť.xx.vicib⁹.ꝛ cū
īfridanť auferanť. Itē ſi domiať calitas euapoꝛeť ſplē
cū vapoꝛe aceti ī lapide crudo.ꝛ ipm filtrū īfuſū in aceto
cal'o applicēť ſup ſplenē. Et ꝑꝑe ſi decocta ſit ſalicis coꝛ/
tex vel ruta ꝛ ꝑꝑe ī balneo.Euapoꝛatio ad vētoſitatē ꝛ ī/
flationē ſplenis ꝛ ēt apantē.in aceto bulliāt coꝛtex cappis
radicis:ruta agn⁹ caſt⁹:calamētū armoniacū. ꝛ ſpica ꝛ īfu
ſuȝ filtrū freq̄nter applicēť.Et ē raſis. ❡ Cōfectio troci.
ad ſplenē cū cal'itate. ℞.raçeriſich.ʒ.v. lacce reu.ſucci eu
patoꝛij aniſi ſpice maſti.aā.ʒ.i.deť cū ꝯcoctōe radicū:ꝛ ē
raſis.❡ Cōfectio empl'i ad ſplenē cū cal'itate. ℞. ligni ſa/
licis ꝛ folia ei⁹ ꝛ tamariſci extremitates mirti ꝛ cipſſi ꝛ cō
tere ꝛ miſce cū aceto vini: ꝛ ē Raſis. ❡ Empl'm ad duri/
ciē ſplēis ꝛ vētoſitatē. ℞.folioꝝ ru.ʒ.x.nitri mētaſtri ſicci
aā.ʒ.iij. armōiaci.ʒ. vij.armōiacū diſſoluať ī aceto vl' vio
ꝛ cū cera ꝯſpſa.fiat ēpl'm ꝛ ſuppōať:ꝛ ē almāſoꝛis. ❡ De
coctio ſapiōis.ad ſplenē expta. ℞.folioꝝ cappis:ꝛ teranť
cū aceto:ꝛ exꝑmať ex eis q̄ꝫtitas.ℨ.ij.q̄ bibanť ꝛ denť tri
bus dieb⁹.Sed pueri ſumāt ex eo poſtq̄ȝ expreſſuȝ fuerit
ſine aceto.❡ Alia ſagaſſara ꝛ eſt alfeleſif equalis ei tera/
tur ꝛ exprimať: ꝛ deť ex ſucco eius eq̄le ei:ꝛ deť in potu
etiā.ʒ.ſ.armoniaci cum aq̄ rafani.ꝛ miſceantur cuȝ aqua

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0321-1
DFG

raſani qui expreſſus fuit qđ ſit equale ei de ſiſamo ⁊ terã-
tur ⁊ fiat emplaſtrum ex eis ſuper ſplenem trib⁹ dieb⁹: ex-
pertum enim eſt. ¶ Dimac ſerapiõis valens ad duricieꝫ
ſplenis ⁊ ſtõi: ⁊ cõfert ad reliquas exituras: ⁊ apata calã ĩ
eis. ℞. bdelij armoniaci. añ. ℥. i. caricaꝝ. v. fabaꝝ: paſſula-
ruꝫ enucleataꝝ: ciceꝝ: mellilioti: fenugreci. ⁊ ſeis lini: ca-
momille: alumis: farine lupinoꝝ. añ. ℥. ß. olei rute: ⁊ camo-
mille q̃tum neceſſe eſt. Infunde fic⁹ in meibutegi: ⁊ ace-
to die ⁊ nocte ⁊ teranť valde ⁊ miſceãť cũ medicis ſoluãť
q̃ ſoluũť cũ meibutegi ĩ quo ĩfuſiſti ficus: ⁊ rectifica illud
⁊ admiſtra ipꝫ. ¶ Aliud. armoniacũ ſoluať cũ aceto for-
ti donec fiat ſic̃ alcat: line ipꝫ ſup pãnũ. ⁊ epithima. ¶ Ali
ud. ſumať mirra bdeliũ armoniacũ thus equali põdere ⁊
ſoluanť cũ aceto forti ⁊ epithimenť. Siĺr abſcindať car
ta ſm q̃titatem ſplenis ⁊ liniať ſuper ipam fauus mellis
⁊ pulueriçeť ſup ipm ſinapi humectatũ nõ tritũ ⁊ epithi-
meť cum eo nocte vna. ¶ Unguẽtũ expertũ ad doloreꝫ
⁊ oppilationẽ ſplenis ⁊ duriciẽ eius ⁊ dolorẽ matricis. ℞.
bdelij: maſticis: galange: armõiaci: aloes: colofonie: melĺ
cõis. añ. ℥. i. terebentie. ℥. ij. ſerapini: ſtoracis liqde. ana. ℥.
vij. cere citrine. ℥. iij. ſucci ciclamis ⁊ abſinthij. ana. lib. i.
olei camõillini lib. i. butiri lib. ß. terať terẽda ⁊ ꝯficianť ⁊
emplaſtrenť cõtiñe. mollificat. n. ⁊ reſoluit ⁊ rectificat cõ
plexionẽ ei⁹. ¶ Dixit diaſcorides. ciclamẽ ſm oẽꝫ modũ
admĩſtratõis eſt medicia ꝓbatiſſima ĩ ſoluẽdo oppilatio
nẽ ſplenis: ⁊ mollificat: ⁊ reſoluit ⁊ attenuat. Et ſucc⁹ eius
cũ tantundẽ aceti mollis: ⁊ cere ptes. iij. bullitis vſq͂ ad
ſpiſſitudinẽ ẽ medicamẽ exptũ valde in antiq̃s oppilatõi
bus eius. ¶ Antidotũ ad ſplenẽ ꝓbatiſſimũ. ℞. radicum
enule cãpane: raſani maioris. añ. ℥. ij. mediane corticis ta-
mariſci. ℥. i. floꝝ eiuſdẽ. ℥. ß. betõice ſiſimbrij. añ. ℥. ß. lima
ture ferri. ℥. iij. melĺ qđ ſuffic̃. ſumať bis vel ter ĩ die adde
ſpice. ℥. i. Neminem fefellit vnq̃ ⁊ puluis tamariſci cũ ſpi
ca ⁊ cinamomo proprius eſt.

¶ Caplm. iij. de apoſtematibus ſplenis. ⁊ tumore eius.

a Poſtema ſplenis eſt tumor ꝑter nãꝫ eueniens ei.
Eius aũt ſpẽs ſequunť numerũ materieꝝ ad mo-
duꝫ apoſtematũ cõtingẽtiũ in epe ⁊ ſĩlibus mem
bris: ſed plurimũ eſt melãcolicuꝫ duꝝ ꝓpter cãm ſupi⁹ in
ꝑncipio dictã. Et qñq͂ eſt flõnicũ qđ eſt: q: in eo ſunt arte
rie ⁊ vene cõtinẽtes ſanguinẽ: g ꝑter nãm ĩfluẽs ⁊ ĩ ſubaꝫ
ſplenis collectus flegmonẽ facit. Et aliqñ eſt fl̃icũ molle:
ſed raro ꝑꝑ fl̃a groſſum aggregatum ĩ epe ex ĩdigõne: vel
mẽbro catariçãte illi per poros occultos ad ei⁹ mollicieꝫ
adiuuat ſuba eius mollis ⁊ cũ calefiat ſimul cũ ml̃ia a te-
pida caliditate accidẽte ei fit vẽtoſum ſi colligať. Si võ
in vacuo ſit diffuſa vel ĩterclusa facit ĩflationẽ. Colericũ
võ rariſſime accidit. colera. n. ſi ſupexcreſcat ĩ epe trãſmit
tiť ad ciſtim nõ ad ſplenẽ. Oppilatõe võ in poro ciſtis con
tingẽte vt nõ poſſit trãſmitti abili⁹ trãſit cũ sãguie per ve
nas q̃ꝫ in ſplenẽ mittať ſplene repugnãte illi ⁊ nã ſui ignea
q̃ de cẽtro ad circũferẽtiã ſemꝑ moueť. Et ſi per venas et
arterias trãſeat in illis obtũdiť ⁊ alterať: ĩſpiſſaturq͂ ſple
nis frigiditate ⁊ hũoris melãcolici in eo ꝯtenti: q̃re nõ re-
manet colericũ. ſꝫ trãſmutať in durũ. Cauſe eius ſũt note
ex dictis hic ⁊ ſupra de apate epatis cui delatorie ſeruit.
Et ex cãis eius eſt flõnia plurima ⁊ cõueniẽtia circũſtan
tiarum eſt cã exterior. Et qñq͂ fit ꝑmutatione apatis epa
tis cũ eius mã transferť in ſplenẽ: ⁊ eſt melius q̃ꝫ ſi ecõuer
ſo fiat. Et qñq͂ ꝯfortať ſplen ſubito ⁊ educit ei⁹ mãm fe
culentam ⁊ euadit ĩfirm⁹. Et eius eductio eſt qñq͂ per flu
xum ſanguĩs naris ſiniſtre: qñq͂ per vomitũ: qñq͂ ſꝫ raro
per vrinã: ⁊ qñq͂ per ſeceſſum. Et ſigna ei⁹ abſolute ſunt
ſigna oppilatõis ſuperi⁹ nũerata: ſed ſunt cũ dolore graua
tiuo ꝑꝑ tenſionẽ ſuſpẽſoꝝ: q̃re extendiť vſq͂ ad furculaꝫ
⁊ compatiť diafragma ex quo ſeq̃tur malitia in anhelitu:
⁊ fit velox frequẽs ⁊ ĩterceptus. ſic̃ accidit pueris quãdo
plorãt ⁊ eſt cũ ml̃ia. ⁊ qñq͂ cum riſu. Et cũ eſt flegmonicũ
eſt minus durũ cũ ĩflãmatiõe ⁊ fe. ⁊ maiori dolore. Et ma
gis cum eſt colericũ: ⁊ eſt cum alienatione. eius aũt qđ eſt
flegmaticũ ſigna ſũt ꝑdictis oppoſita. Uentoſi võ ſigna
ſunt abſq͂ grauitate ⁊ cũ ꝑmitur tactu: reſiſtit illi ⁊ ſonat.
¶ Cura apoſtematũ ſplenis ex cura oppilationũ ipſius et
apoſtematũ epatis ĩnoteſcit. Curã ergo illorum ꝓſequere
ſm illorum ĩtentiõẽs ⁊ modos. Et cõpleas cũ appropria
tis ſimplicibus ⁊ cõpoſitis q̃ ſunt deſcripta ibidẽ. Et ex ap
propatis in apate calido eſt alumẽ. in eo eñi eſt ĩciſio aliq
cum q̃litate equali ⁊ ſtipticitas ⁊ v̾tus frigiditatis: q̃re oꝫ
vt miſceať cum medicis eius apocruſticis ⁊ reſolutiuis.
Et acetũ ẽt eſt ex illis ⁊ aqua folioꝝ ſalicis ⁊ folioꝝ alga-
rab: ⁊ aqua portulace ⁊ capil. veneris hũidi. Et ſumere in
potu de ſemĩe portulace. ℥. i. cũ aceto arnogloſſe exiccate
⁊ pulueriçate omni die coclear. i. ⁊ alia q̃ a ꝓprietate ope-
rantur frigida ſuperius numerata.

¶ Capitulum quartum de ſpeciebus ictericie.

i Ctericia vt dicit Abo. eſt alteratio coloris corpis
feda. Eſt aũt triplex: citrina nigra mixta ſeu viri-
dis. Et cã eius eſt q̃druplex ſm q̃tuor actus ĩter-
ueniẽtes ad eius cãlitatẽ ſe inuicẽ ordiate hñtes ſicut cã
ad cãm: ⁊ ſunt imediata: mediata: magis mediata: ⁊ remo
ta. Immediata ſꝫ. H. eſt effuſio colere in toto corpore ⁊ ꝓ
prie in cute: nec mirũ cum cutis ſm eũ ſit mẽbrũ ordina-
tuꝫ ad receptionẽ ſuperfluitatũ corporis totius. eſt quoq͂
illius effuſio qñqꝫ cretica: qñqꝫ ſinthomatica: ⁊ ſi qdẽ ſit
colere citrĩe facit citrinã. ſi võ nigre fac̃ nigrã. ſi võ vtriuſ-
qꝫ mixtã ſeu viridẽ operať. Cũ. n. miſcenť duo hũores ci-
trini coloris ⁊ nigri viridis reſultabit color vt dixit Abo.
nec erit tertia ſpẽs ſimplicis ictericie: lꝫ ſit tertius hũor: q
nãliter per venas vadit cũ ſanguine: fl̃a. ſ. albuꝫ colore di-
cente hyppo. in affo. Si albo fl̃ate. Tale. n. fl̃a eſt nãle qđ
a ſanguine nõ ſequeſtrať: nec ſub ꝓpria forma in alteratũ
tranſeat in cutẽ vt ꝓpriũ ĩprimat coloreꝫ in ea ſicut color
vterqꝫ facit. Et ſi fl̃a innãle a ſanguine ſepareť qñqꝫ illđ
tamen ꝓpter ſui viſcoſitatẽ ⁊ groſſiciẽ nõ bene eſt effuſi-
bile per vniuerſa corporis mẽbra ⁊ cutẽ ſine ſanguie: q̃re
totam cutim dealbare nõ põt: lꝫ interdũ diuerſus ⁊ circũ
ſcriptus in aliqua parte cutis illaꝫ dealbet ⁊ morpheã al-
bam operať ſicut ml̃ia nigraꝫ: q̃ dĩť ꝑter hoc ab ictericia:
quoniam morphea ex errore tertie digõnis fit ⁊ membro
rum eius. Ictericia võ ex errore ſecũde ⁊ membroꝝ ipſi⁹.
Et ſi qñqꝫ colorem palidũ ⁊ plumbeũ in vniuerſo corpo-
re ĩprimat innãle fac̃ ſuperexcreſcẽs in ſanguie: ⁊ effuſum
cum eo in totũ ⁊ cutẽ illud eſt. q: in ſua ſupexcreſcẽtia nõ
ſeparať a ſanguie vt tranſiens in cutẽ ꝓpriũ. ⁊ per ſe colo
rem ĩprimat in ea: ſed mixtus cũ eo ipſius colorẽ obtũdit
ita ꝙ alteratum cũ eo in nã membrorum cutis colorẽ pa
liduꝫ ⁊ plumbeũ reddit: q ⁊ ſi nõ ſit nãlis: tamen nõ eſt fe
dus vt color ictericie: cũ nõ tantum a naturali recedat: q̃-
re ictericiam facere nõ eſt dictum. Et in ſũma flegma qđ-
cunqꝫ nõ efficit ictericiam albam: licet ſit album cũ icte-
ricia vt dictum eſt ſit alteratio coloris corporis ⁊ cutis to
tius feda ipꝫ flegma corpus totũ ⁊ cutẽ alterare nõ põt. ⁊
ſi alterat totã ipſius alteratio nõ eſt feda. i. multum rece-
dens a naturali: ſicut eſt citrina ⁊ nigra vt poſſit ictericia
dici. ¶ Cauſa mediata eius eſt effect⁹ mũdificatõis illoꝝ
hũoꝝ a ſanguie in venis ⁊ epate vt ſuperius dictum eſt.
¶ Cã magis mediata ẽ dbilitas ĩ mẽbris: ⁊ oppilõ ĩ vijs ⁊
in mã colere multitudo ĩ mẽbris. ſ. ciſti q̃tũ ad citrinã: ⁊
ĩ ſplene q̃tũ ad nigrã: ⁊ ĩ vtriſqꝫ q̃tũ ad viridẽ. Remota
cã eſt q̃lꝫ egritudo debilitãs ipſa in attractione ⁊ epar in
expulſione ⁊ ꝓprie mala cõplõ quelꝫ vt ſuperius dictũ ẽ.
in epatis debilitate ⁊ apoſtemate. In poris oppilationis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0322-7
DFG

cauſa eſt nota ex cauſis p̄dictis in materie q̄ntitate multa
ſeu illoꝝ humoꝝ ⁊ magis q̄ per illa mēbra mundificari
poſſit. Talis ſm̄ .H. eſt duplex īterioꝛ .ſ. ⁊ exterioꝛ. Interi/
oꝛ eſt duplex .ſ. mālis .ſ. cibi ⁊ potus: q̄ ſint acuti vnctuoſi
⁊ dulces in vtraq; vel mlici ⁊ groſſi ⁊ terreſtres in nigra.
Et efficiēs vt cōplo calida multū epatis multiplicās cole
ram citrinā in citrina vel calaꝫ multū adurens valde: ⁊ co
leram nigrā multiplicans in nigra: vel cōplo totius corpo
ris ⁊ membroꝝ cala multū ſanguinē in colerā citrinā per
mutans in citrina vel ī nigrā per aduſtionē ſuo ſuperexceſ/
ſu in nigra icteritia vel frigida valde totiꝰ ⁊ epatis ipꝫ ſan
guinē ꝯgelans ⁊ denigrās q veniēs ad cutē nigrā icteritiā
operaꝰ: lꝫ cā hec ſit rariſſima. ⁊ cū adſit in epate potiꝰ egō/
nem nigraꝫ q̄lis eſt ſanguis nigreſcēs q̄ icteritiā opaꝰ pp
groſſiciem ſui nō bñ effuſibilē in circūferētias cutis: ſꝫ pe/
tentē potius cētrum: ⁊ iteſtinoꝝ īfimū pp grauitatem. Et
cum acciderit nō reſoluiꝰ eius mā cito ⁊ eſt timoroſa. Ex/
terioꝛ ē coadiuuans ⁊ eſt ꝑ ſe. ⁊ ꝑ accñs. per ſe eſt oīs circū/
ſtantia cōſilis calida vel frida cooperās ad gñationē illo/
rum humoꝝ. per accñs eſt diſpō tēporis aeris regiōis ⁊ ſi
miliū frigida ⁊ ſicca q̄ calorē remittūt ⁊ fortificāt ī iterio
ribus igniēdo. vñ hūoꝝ p̄dcōꝝ ſeqꝰ ex p̄dcis cibis gñatio
⁊ poros cutis cōſtipant nō tantū q̄ per hoc ītrāſpirabiles
illos reddat hūores. q̄ ſic febrē accēderet. ſꝫ q̄ ad eoꝝ re
tentionē in cutis ſuba opereꝰ vt ī hyeme ⁊ borea: ⁊ ī regio/
nibus ſilibus eſt videre. Uel eſt ſumptio veneni ſeu moꝛ/
ſus aīalis venenoſi. ⁊ ꝓprie tyri ſanguinē ⁊ hūores corpis
⁊ mēbroꝝ corrūpentis: ⁊ in citrinū colorē ⁊ viridē ꝯuertē
tis: q ꝑueniens ad cutiꝫ citrinā opaꝰ vel viridē icteritiaꝫ.
vñ .H. ait. Redeamꝰ igiꝰ ad epar ⁊ videamꝰ an in oī tēpo/
re epar icteritia exñte patiaꝰ. ⁊ an ſit ad hoc accñs opans.
Dico ergo q̄ multotiēs epate ſalubre exñte: videmꝰ cole/
ram rubeā diuidi ⁊ extra cutim exire ⁊ hoc eſt ſm̄ criſim.
Item ſine criſi ſanguinē cōſpicimꝰ in colerā mutari cū ex
peſſima ⁊ aliena corruptōe corrūpiꝰ ſicē ex morſu reptiliū
venenoſoꝝ: queādmodū vidi regis miſtrū: cꝰ officiū erat
tiros capere quodā tēpore a tiro morſuꝫ fuiſſe: q tardans
ſumere medicinā ſolutiuā mutatꝰ ē ī colorē praſſij. ¶ Si
gna. ſpēs ictericie vnaqueq; per ſe viſui nota eſt: cū ſit mē/
bri exterioris coloratio feda: cꝰ viſus eſt iudex ꝓprius.
¶ Cārum vō ſigna q̄ ſunt occulte oꝫ ſubiungere diſticte
⁊ ꝓprie remotaꝝ īterioꝝ: q̄ lꝫ ſint poſteriores in ipſiꝰ im/
preſſiōe. priores tñ ſunt in curatiōe. Eis .n. abblatis ꝓmpte
fit mūdificatio ſāguīs: ceſſatq; effuſio colere ⁊ feda cutis
coloratio fiens: nec nō ⁊ facta ceſſabit facile. Inqt .n. Gal.
Qd̄ prius eſt ī itentōe poſteriꝰ eſt ī opis executiōe: ⁊ ecōuer
ſo recto curatōis ordine ꝓcedēdo. Hoc āt dixit. q̄ inutili
ter qs ꝓuidebit febribus ⁊ ēt alijs diſpōnibꝰ: niſi prius me
minerit cāe cꝰ cognitionē cura cōfeſtim ſeqtur. vt dcm̄ ē.
Si igiꝰ cā eius ſit egritudo q̄lꝫ: ⁊ maxīe oppilatio q̄cunq;
mala ⁊ debilitās ⁊ frida ⁊ hūida ⁊ attractiā ciſtis: ⁊ ēt ſple
nis cōiecturādo cognoſces ex ſignis p̄dictis diſpōnes epa
tis: quas plīmū ſeqtur ciſtis: pp affixionē ⁊ ſplen pp colli/
gantiā: ⁊ vtraq; pp ſeruitiū egritudis debilitātis epis ex/
pulſiuam. Signa ibidē hūiſti. ipſiꝰ ergo p̄ſentia cū p̄uatio
ne ſignoꝝ ſubſequentiū cāꝝ īdicant illā. ¶ Signa vō di/
ſtinguētia inter debilitatē attractiue ipſoꝝ ⁊ ſeqſtrationē
epatis ſunt. nā debilitatē attractiue illoꝝ abſq; debilitate
expulſiue epis ſignificat pauca tictura egōnis ⁊ mioꝛ ſoli/
ta nāli: ⁊ mioꝛ tictura vrine cū p̄ceſſiōe egritudinū ciſtis ⁊
ſplenis ⁊ abſq; egritudie epis. Debilē ſeqſtratiuā epis abſ
q; debilitate attractiue illoꝝ mēbroꝝ ſignificat āceſſio
egritudinū epis cū leſiōe in alijs opatōibꝰ eiꝰ ⁊ tictura in
egōne ⁊ vrīa mioꝛ ſolita. Et q̄nq; ſūt ſanguinolēte ſicut lotu
ra carnis: ⁊ ſeqꝰ cacheſia: deinde idropiſis. Si vō ſit cā eiꝰ
oppilatio ī poris ꝑ quos trahūt ⁊ trāſmittūt ſupfluitates:
ſigna erūt egō alba: ⁊ ꝯſtricta in citria nō neceſſario in ni/
gra: ⁊ vrina citria vel nigra ⁊ coloꝛ obtuſus ī ictericia ⁊ ſu/
bito eueniēs. ¶ Signa vō ſpēꝝ ⁊ mōꝝ oppilōnis ex p̄di/
ctis ī epe ⁊ ſplene ſūt māifeſta. Signa quoq; diſtictiua op
pilatōis poroꝝ ex dcis ī oppilōne epis ſūt māifeſta: cū p̄di
ctis oppilōnis ipoꝝ ſignis q̄ ꝑcipies abſq; ſignis p̄cedētis
⁊ ſeqntiū cāruꝫ. Si vō in cā ſit mā: ⁊ multa q̄ntitas colere
cꝰ cā mālis ſit cibus ⁊ potꝰ ſcies ex relōne īfirmi ⁊ aſtātiū.
Si vō in cā efficiēte ſit culpa q̄ eſt mala ꝯplo cala multuꝫ
epis multiplicās colerā citrinā vel nigrā ſigna erūt q̄ ſupe
rius dcā ſunt ī mala ꝯplōne epis cala: ⁊ eſt paulatine eue/
niēs: ⁊ cū hoc videbis ī citria citrinitatē maiorē: ⁊ ī nigra
maiorē nigredinē: vrinā quoq; rubeā vehemētis rubedi/
nis donec ad rubedinē trahat ⁊ panū talr tingat vt vix re
moueri poſſit: ⁊ ſilr egōnē. Et oīa exeūtia ꝑ nares ⁊ ſudo/
res q̄ſi citrina ī citria: vel nigra ī nigra vel mixta ex vtriſ/
q; ſeu viridis ī viridi. ⁊ cōmixta. Et ſi qdē ſit ex mala com
plōne multū cala totiꝰ corpis ⁊ mēbroꝝ ex tactu mēbroꝝ
corpis ⁊ cutis calo īflato ⁊ venaꝝ rubore ⁊ pruritu ⁊ erūt
ī colore ictericie: ⁊ mō veniēdi mediocres: tūc ⁊ vrīa ⁊ egō
nāles vel q̄les in p̄ncipio. Colera .n. multiplicata ī mēbris
tendit de ſui nā ad circūferētias cutis nō regurgitat ad in
teriora cū epar cū ſuis emūctorijs ſaluū exñs egōnē: ⁊ vri
nā nāles tūc opeꝰ: lꝫ ī ꝓceſſu ꝯtigat mutari: ⁊ eſt ſignifica
tio bōa: q̄ epis ſanitatē oñdit: q̄re idrops nō timeꝰ: vnde
hyp. Icterici nō valde īflati ſūt. Et ex his ſpērum cauſarū
ipſius ictericie nigre ⁊ citrie ſūt note. Et erūt cū p̄uatōe ſi
gnoꝝ p̄cedētiū cāꝝ. Et ſilr ſi ſit cā mala cōplo epatis fri/
gida vl totiꝰ corpis ⁊ mēbroꝝ ex ſignis ꝯrijs p̄dcis cogno
ſces. ¶ Cāꝝ vō exterioꝝ q̄ ꝑ ſe ſunt: ſūt māifeſta: cognitis
eis ēt q̄ per accñs cāe fiūt. Et ſi qdē ſit venenoſa ſi ab aīa/
li ē morſus oñdit ſeu pūctio. ſi vō aſſumptōe veneni ſigni
ficat ipaꝫ p̄terita ſuſpicio ⁊ ſanitas ⁊ bōitas hūoꝝ aduen/
tus illiꝰ ſubito cū p̄uatōe p̄dcārū cāꝝ: atq; egōnis: ⁊ cū vri
na mordicali vel fiſticali. ⁊ ſic ireos ꝓpe vel in colore ſili
erugini eris vl ſucco porri ſm̄ diuerſitatē ꝯplōnis ipſiꝰ ve
neni ⁊ ſpēꝝ icteritie. Signa vō ipaꝝ ex cretica vel ſintho
matica effuſiōe colere ꝑueniētiū ſumi pñt ex p̄cedētibus
ꝯcomitātibꝰ ⁊ ſeqntibꝰ. Ex p̄cedētibꝰ qdē. nā creticā p̄ce/
dit egritudo acuta epis vel ſplēis apta termiari ꝑ eaꝫ: nec
fit ſubito. ſꝫ p̄cedētibꝰ ſignis digōnis. ⁊ alijs ſignis bōe cri
ſis. Ex ꝯcomitātibꝰ. q̄ eſt cū bōa tolerātia: cū fit añ ſtatū
ſꝫ ī ſtatu ⁊ ī die cretica q̄ ē poſt .vij. nō añ niſi ī corpe calo.
⁊ regiōe cala vt ē regio Auer. Et ñ cū duricie hypocūdrij
dextri: imo cū bōa diſpōne ipſiꝰ. vñ hyp. Ictericia añ .vij.
mala ī .vij. vō ⁊ .xi. bona ſi dextrū hypocūdriū nō duꝝ fiat.
Ex ꝯñtibꝰ. q̄ ceſſet egritudo ⁊ vtꝰ ꝯfortetꝰ. Inqt hyp. Si
q̄lia oꝫ purgari purgenꝰ ꝯfert ⁊ bñ ferūt. ſi vō nō ꝯrium.
Sꝫ ſinthomaticā ꝯria p̄dcis ſigna oñdūt. ¶ Cura icteri/
cie ſinthōatice vt ex p̄dcis ē hitū ē due res. p̄ma ē cārum
ablatio. ſa ē ipſiꝰ alteratōis cutis fede fcē ad nālē ꝑmuta
tio. ¶ Primā rē ꝯplēt ꝓpe q̄ cās debilitatis ciſtis ⁊ ſple/
nis attractie aufert. Cās quoq; dbilitatis ſeqſtratie epis ⁊
vēaꝝ: ſiue ſint ō gñe male ꝯplōnis ꝯpōnis ſolōnis vl apa
tis: q̄ oīa ī cura epis ⁊ ſplēis tradita ſūt. Inqt āt abo. ſi fue/
rit cā ictericie ī epe ⁊ felle cureꝰ cū regie p̄dcō ī debilitate
epis. nā cura ipſiꝰ fell ē illa vel ea: q̄ oppilōnes poroꝝ ci/
ſtis fell apiūt cās caꝝ auferēdo q̄cūq; ſūt: q̄ oīa ſupiꝰ ī cu/
ra oppilōnis epis ⁊ ſplēis tibi nota fecimꝰ. Et ex ꝓprijs in
cuſcute q̄ fell oppilōnem apit ⁊ epis: ⁊ ēt oīa amara q̄ q̄ñ
apiūt ⁊ abſtergūt curāt ictericiā. Dixit Abo. ex ꝯueniēti
bꝰ attenuatorie ex ſiccitate quā ſignificat corporis aridi
tas ē admiſtratio lenificantiū ⁊ ſubalterātiū colaꝫ ſicē mu
cillagies ſre ⁊ ſicē ſebeſtē. ⁊ filia cū olō amigdal. Si vō fue
rit ex naſcētia rei alicꝰ ñ extio q̄ ſit cura. ſi vō fuerit ex apa
te cura ē cura illiꝰ. In coartatoria aſiniar ē ex melioribꝰ

medicinis icteritie. Et ǒbilioꝛ iſtā eſt in q̄ oppil'o ē in mea
tu colere. Et qn̄ cū oppilatōe eſt fe. tūc atriplices ſūt boni
valde quoniam ſunt aperitiui. ⁊ extinctiui. ⁊ ſil'r radix la
ctuce de qua ſumanť. ʒ. ij. cū melle. ⁊ ſil'r aqua cuſcute en
diuie lactuce: ⁊ mirti cū rotulo caſſiefiſt. ⁊ oleo amigdala
rū dulciū ⁊ amaraꝝ. Et ex appropriatis in oppil'one ei⁹ eſt
reubar. hypericon capilli veneris olibanū: rubea tinctoꝝ
an̄. ptes eq̄les de q̄bus deť. ʒ. i. cū aq̄ feni. gentiane ariſto
logie coſti poly: cētauree. ⁊ ſil'uꝫ ſi nō ſit fe. Serapio ait: ⁊
ꝯfert in hac ſpē icteritie vomit⁹. foꝛtaſſe. n. aperiť oppil'o
ꝑꝑ motuꝫ eius ĩpetuoſum. Cliſteria quoqꝫ ex polipodio
epithimo ⁊ thio in nigra ⁊ abſinthio endiuia malua. ⁊ vio
lis in citrina: vel ea q̄ malā ep̄is cōpl'onē calā ꝫ vel frigidā
valde alterāt ⁊ ꝑmutāt q̄ ēt ſupꝛa in cura ipī⁹ diximᵘ vel
totius coꝛpoꝛis ⁊ mēbꝛoꝝ cōpl'onē malā cal'am adurēteꝫ
q̄ ibidē ēt tetigimᵘ. Et ex eis ꝓpe eſt balneū vniuerſi coꝛ
poꝛis cū aq̄s dulcibus ex fridis mollificātibᵘ ⁊ rarefaciē
tibus nō ſtipticis q̄ denſando poꝛos iſlāmāt: q̄lia ſūt vio
le malue lactuce atriplices mellilotū coꝛiandrū ſolatruꝫ
acetoſa. ⁊ ſil'ia. Et ex eis eſt alterare epar cū ceroto vl' epi
thimate de ſandal'. Et cū ſirupo de endiuia trociſcis ď cā
phoꝛa de ſeibus cōibᵘ: ⁊ frigidis. Ex electuarijs diarodō
⁊ triaſādali. ⁊ cuꝫ ſeibus: ⁊ ſucco frigidaꝝ herbaꝝ. ⁊ alijs
frigidis aperitiuis appropatis q̄ ſupiᵘ dicta ſūt. Et altera
re ēt coꝛ cum fr̄is appropatis ſupꝛa in cura ipſiᵘ enarratis.
ait. n. H. cū coꝛ ⁊ epar eſt fr̄m totū coꝛpᵘ fr̄m erit. Et vꝛina
rectificabiť ⁊ ictericia ceſſat: vel q̄ frigidā cōpl'onē totius
coꝛpoꝛis moꝛtificantē alterāt ⁊ calefaciūt ⁊ ēt ep̄is: q̄ ſunt
ex calidis nūeratis ibi in cura ep̄is iteriᵘ ⁊ exteriᵘ approxi
mandis. Opꝫ aūt ne ſubito approximenť. ſꝫ paulatī ⁊ cuꝫ
cal'itate nō ſupflua aduſtiua: ⁊ taliter approximata caloꝛē
nālem debilē exn̄tē in eis reſoluunt. ¶ Regimis quoqꝫ re
ctificatio in cibis ⁊ potibᵘ. ⁊ alijs nō nālibᵘ rebᵘ ſit ita ꝙ ī
ꝯriū vertať diſpōni mãc ⁊ mēbꝛoꝝ hn̄tiū ipam gn̄are. Et
caro ericij eſt iuuatiua valde ꝑꝑ foꝛtitudineꝫ ꝓuocatiōis
mūdificatōis ⁊ ꝯueniētie ſue ad epar. Et ex regimīe lauā
te fel ⁊ remouente putrefactionē eiᵘ ⁊ īgroſſante illud qō
eſt in eo. Et ē vt cibeť in fr̄is pane nō açimo ſale trito ⁊ en
diuia plurima. vij. diebᵘ. Et ſi q̄dē ſit a cā venenoſa cura
eſt ea ⁊ cū his q̄ ſupꝛa ī cura egritudinū coꝛdis ex ſimili cā
diximᵘ. H. aūt dixit. cū aūt ad ꝰne veniret: q̄ punctᵘ fuit a
tiro ⁊ cām paſſiōis narraret iuſſi eū tiriacā aſſumere: q̄ ſū
pta in pauco tēpoꝛe in nālē redijt coloꝛē. ¶ Poſt ipam aūt
dixit Abo. bibat patiēs aq̄ꝫ maloꝝ macianoꝝ granatoꝛuꝫ
ſuccū endiuie poꝛtula. mucillaginū ⁊ berberis ⁊ oīa in qui
bus eſt īfrigidatio cū virtute tiriace: ⁊ coꝛdiali. Et in ipſa
iam exptus ſum cū accidit in ꝑncipio ⁊ ꝓprie cū venenuꝫ
eſt ibi bibitū ⁊ bibat lac aſſidue cū oleo amigdalino. Et ex
regimīe ꝯueniente ⁊ cōi ſinthomatica: q̄cūqꝫ cᵘ ꝑmiſſa eſt
cura. Et eſt vt iuueť cū ꝓuocatōe fluxᵘ vētris ⁊ ſudoꝛis ⁊
ꝯfoꝛtatione nāc. Jnq̄t. H. icteritia an̄. vij. mala niſi cuꝫ de
vētre nimia humiditas exierit. Abo. quoqꝫ dixit. ictericia
an̄. vij. mala niſi ſuccurrať fluxu vētris: aut ſudoꝛe nāli ⁊
nā ſit foꝛtis. illud tn̄ cōſideratōe indiget quēadmodū de
fluxu vētris in pleureſi. ⁊ vomitu in ꝑncipio diximᵘ. Si
vͦ cretica ſit dimittať nāc. Jnq̄t. n. hyppo. ea quoꝝ criſis
fit aut facta eſt nō mouere oꝫ neqꝫ nouū facere. ſꝫ ſinere.

¶ Scđam rē ꝯplent q̄ māꝫ colericā in poꝛis ⁊ ſuba cutis
ībibitā reſoluunt ⁊ abſtergūt ⁊ lauāt. ⁊ ſic ipm̄ fm̄ nālem
coloꝛē dimittūt. Quoꝛū q̄dā ſunt illā ꝯplentia a ꝓprieta
te: q̄dā a cōplexione: a ꝯpl'one reſolutionē cōplēt exercitia
tēperata fricatiōes ⁊ ꝓpe cū aquis ⁊ oleis ex reſoluētibus
mām ſubcutaneā: vt eſt camomilla ireos: ⁊ ꝓprie anetuꝫ:
⁊ ſudoꝛeꝫ ꝓuocātia q̄ in cura epatis in vl'i dicta ſunt. Ab
ſterſionem cōplent vnctiones, cū fricatiōe ꝓprie ex aceto
ſitate citri: aqua acetoſelle. ſe. melonis: ⁊ aqua cucumeris:
⁊ aqua ⁊ aceto: ⁊ alioꝝ abſtergentiuꝫ frigidoꝝ. ſi adſit fe
bꝛis: vel calidoꝝ: ſi nō adſit: quoꝝ ſumā in decoꝛatiōe in
fra faciemus ān̄uente xp̄o. ¶ Lauatiōeꝫ cōplent balnea
naturalia: ⁊ artificialia ex aq̄s dulcibᵘ ⁊ ďcoctōe atriplicis
ſicle tribuli endiuie capil. veneris: cuſcute aneti. ⁊ ſimiliū
in citrina. Jn nigra vͦ cū epithimo thimo boꝛagīe ⁊ bu
gloſſa ſene. ⁊ ſil'ibus. immixta cū vtriſqꝫ: veꝝ tn̄ ante itroi
tum balnei oꝫ vt ſumať aqua decoctōis ſparagi cicerum.
an̄. M. i. que decocta ſit in vaſe vitreato cū. v. veſij aque:
⁊ ſit cum vino mixta ſi non ſit fe. ſi vͦ adſit: ſola bibat. Et
ſimiliter aq̄ cuſcute cuꝫ. ſe. apij ⁊ çuccaro tabarçet. ſi biba
tur ex ea ſacraiat. i. eſt iuuatiua valde. veꝝ ꝑticularia bal
nea ſeu lauatōes ſunt ꝯueniētia oculis ⁊ citrinitati ipoꝛuꝫ
cum ſuperfluit cū ſit eis nociua. Et ſint cū aq̄ feni. celido
nie vſnee rute: vel cū aqua tribuloꝝ ⁊ memithe ſolatri co
riandri ⁊ fructuū frigidoꝝ habentium v̄tutē abſterſiuaꝫ
iam dictoꝝ ⁊ ſubmerguntť ēt oculi in ea. Et ex cōuenienti
bus eis eſt ſternutatio ꝓuocata fm̄ diuerſitateꝫ diſpōnis
cum calidis vt eſt succᵘ folioꝛuꝫ naſturcij praſſij: aut cicla
minis. ſic eſt vel coctū vel īfuſum in lacte mulieris: deide
in mane expꝛeſſum aut ſuccᵘ radicis rafani vel folioꝝ eiᵘ
vel cū paꝝ calidis vt eſt ſuccᵘ ſicle: vel cū ſuccis frigidis vt
eſt ſuccus ſempuiue: ⁊ acetū ipm̄ qn̄ ſugiť naribus ⁊ tene
tur hoꝛa vna. Et ſtet īfirmᵘ in pila balnei: qn̄ eſt bona cu
ratio: motu. n. colerā de oculo excutit: ⁊ per nares deriuā
do educit dic̄. H. Cōplentia vero a ꝓprietate ſunt vt ſumā
tur nucis cipꝛeſſi. ʒ. ij. caſſie lignee. ʒ. iij. ⁊ bibanť cum vio
antiquo: ⁊ deide abluať qn̄ minget icteritiā. ¶ Item ſu
mať fel vrſi cū vino: aut de coꝛnu cerui. ʒ. i. aut pulueris
ſulfuris. ʒ. ij. Et ex eis q̄ laudanť eſt vt ſumať in potu cū
vino de lumbꝛicis terrenis exiccatis: qn̄ ipm̄ mundificāt
ſtatim. Et ex expertis eſt: vt deť radices acetoſe ⁊ ſtet pa
tiens in ſole ⁊ ambulet in ipſa hoꝛa vna donec calefiat et
ſitiat. deīde ſumat in potu ďcoctionē capilloꝝ veneris: ru
bee tinctoꝛum ⁊ mente. Et ſil'r ſi bibať poſt balneuꝫ con
fert valde. Et ex ſolutiuis ꝓprijs eſt: vt ꝑfoꝛeť collog̃nti
da ⁊ expellať illud qō eſt in ea: ⁊ repleať vino ⁊ bulliat ſu
per pꝛunas: deinde coleť ⁊ bibatur. ¶ Syrupus in mate
ria epatis calida ſiue refrigerans epar ⁊ membꝛa ſuperca
lefacta audaciam fellis. ⁊ acumē colere extiguit ⁊ omnes
moꝛbos febꝛiles. Et releuat infirmum ab ethica ⁊ icteri
cia citrina. ſi chꝛiſtus voluerit ſanatoꝛ omniū languoꝛuꝫ.
¶ Recipe berberis floꝛum boꝛaginis: cicoꝛee: ſeminis poꝛ
tulace: ſcariole. lactucarum papaueris pſilij ꝯquaſſati in
aqua frigida epatice. ana. ℥. i. plantaginis pimpinelle ſem
peruiue ſolatri. ana. M. ſ. ſucci epatice: ſucci cicoꝛee: ſca
riole ſilueſtris ⁊ domeſtice: ſucci ſempuiue: ſucci: apij de
puratoꝛum. ana. ℥. ij. ſpodij ſandal'. ana. ℥. iij. ſeminū com
munium mundatoꝛum. ℥. ij. camphoꝛe. ʒ. i. çuccari libꝛ. ij.
aceti. ℥. iij. doſis. ℥. ij. in auroꝛa cum aqua frigida. caue ne
ſit infirmus cum oppilatione epatis ⁊ ſplenis ⁊ ſenex ⁊ de
bilis ſtomaci. ¶ Alexander. ſirupᵘ vtilis habentibᵘ epar
ſupercalefactum ⁊ coleram exuberantem in felle. extin
guit ⁊ mundificat. ¶ Recipe ſucci endiuie: ſucci plantagis:
lupuli: fumi terre. ana lib. ij. depurentur ⁊ bulliant: aque
fontis in quibus reſideant reubarbari. ʒ. x. ſpice nardi. ʒ.
i. ſ. per duos dies: ⁊ bulliant: deinde vſqꝫ ad conſumptio
nem lib. iij. deinde coletur ⁊ aque çuccari lib. i. ⁊ ſirupen
tur. doſis. ℥. ij. cum aqua frigida. ¶ Syrupus ex inuentio
ne noſtra. ad epatis materiam nociuaꝫ vt expellatur mū
dificans epar ⁊ malitiam fellis per veſicam extinguit au
daciam colere fugat febꝛes omnino rectificat effigieꝫ ci
trinitatem oculoꝛum ⁊ icteritiaꝫ ex caliditate inflammā
te ⁊ vrente: eo ꝙ membꝛa que ſunt radix egritudinuꝫ re
ctificat: ſi xp̄s voluerit. Omnia. n. velut deficiēte igne de
ficiūt ⁊ velut pluuia ďficiētibᵘ nubibᵘ euaneſcet ſi modi

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0324-9 DFG

cum ſua quieſceret influentia. ℞.capilloꝝ veneris ſcario
le ſilueſtris:portulacaꝝ ſcolopēdrie:eupatorij:lupul'. ſaxi
fragie.epatice.radicis ⁊ folioꝝ cicoree ⁊ floꝝ radicis apij:
feniculi:bruſci:ſparagi:⁊ ſempuiue:tamaridoꝝ:rubi: vua
rum cū teneritate ſua:alchechengi vel nenufaris:ſolatri
domeſtici.añ.M.ſ.ſemis coriandri: portulace:apij: feni-
culi:aniſi ſubtiliſſime pulueriçatoꝝ.añ.ʒ.iij. floꝝ boragi-
nis:violaꝝ:pſilij ꝑparati:roſaꝝ.añ.ʒ.iij. ſandali vtriuſqꝫ:
calami aromatici:ſpodij:maſticis.añ.ʒ.i.ſucci plātagis de
purati:ſucci fumi terre:ſucci apij:ſucci artemiſie:ſucci po-
mi acetoſi:ſucci ſcariole:⁊ pomi terranei ꝑfecte depurato
rū.añ.ʒ.iij.reuponitici.ʒ.iij.reubarbari electi.ʒ.i.ſ.cāpho
re.ʒ.i.ſpice.ʒ.ſ.çuccari lib.iij.aceti infecti in muſco.℥.iij.
doſis.℥.i.vſqꝫ ad.ij.cū aq̄ cicoree vel lactis caprini in ma-
ne.¶ Hyppoc.ſirupus vltimꝰ epati iflāmato ⁊ poſſeſſori
oppilationū venaꝝ. ℞.floꝝ tamariſci: camepitheos ber-
beris.añ.℥.i.endiuie epatice: ſcolopendrie lupulo.apij.añ
.℥.i.ariſtologie.M.i.ſandali albi:⁊ rubei.añ.℥.i.çuccari li.
ij.cuſcute:abſinthij.añ.℥.i.¶ Filiꝰ Zacharie.modꝰ empli
refrigerātis epar iflāmatū ⁊ fel ⁊ colerā. ℞. ſandali.ʒ.iij.
ſempuiue trite.℥.ij.farie ordei.℥.ſ.maſt.ʒ.i. albumis ouo-
rū triū:cāphore.ʒ.ſ.olī ro.⁊ aq̄ ro.ſucci ſolatri ſucci berbe
ne.añ.ʒ.ij.aceti.℥.i.applicent̄ ꝑmixta bñ a tertijs vſqꝫ ad
veſpas.¶ Syrupꝰ Judei. ℞.ſucci endiuie ſucci abſinthij
ſucci eupatorij.añ. li.i.depurent̄ ⁊ addat̄ çucc.li.i.aceti ra
dicū.℥.ij.Et arōatiçet̄ cū vtriuſqꝫ ſādali:ſpodij.añ.ʒ.ij.ſpi
ce.ʒ.ſ.valꝫ ictericie ci. ⁊ nigre ex aduſtiōe:⁊ oppilōne exꝑ
tū eſt.Silr ſi fiat ex ſucco roſtri porcini. ⁊ ſi ꝑmittat̄ cum
aceto albo ē efficax ⁊ exꝑtū.¶ Grecꝰ.medicamē magnuꝫ
in egritudibꝰ diuturnis ep̄is icteritia nigra.⁊ egritudibus
flatis ſalſi ⁊ lepra. ℞.fumiterre.ſe.lapatij.ſe.abſinthij:ſca
bioſe.añ.ʒ.ix.oīuꝫ mirabo.ſine oſſibꝰ.añ.ʒ.v.ieralogodiō.
ſucci ro.añ.℥.i. thimi.epithimi ſene. añ.ʒ.vi. reupōtici.℥.i.
māne:pulpe caſſie:tamaridoꝝ.añ.ʒ.iij.reubar.bōi ⁊ reu-
ſeni.añ.℥.i.ꝯficiāt̄.¶ Syrupꝰ. ℞.lacce ſpodij.añ.ʒ.i.ſpar-
tane.ʒ.i.polipodij aniſi.añ.℥.i.eupatorij:epatice.añ.M.ſ.
doſis.℥.ſ.cū aq̄ lactis capni. ¶ Unguētū refrigerās epar
acumē fell' ⁊ fe.calās magnas. ℞.aſſungie porcine recētis
q̄titatē quā volueris.laua eā cuꝫ aq̄ calīa decies:⁊ octies
cū fra.poſtea piſtet̄:⁊ cū ea icorporet̄ roſarum.℥.i.ſandali
vtriuſqꝫ:ſpodij.añ.ʒ.iij.reubar.ʒ.ij. ſpice.ʒ.i.cāphore.ʒ.i.
cere albe.ʒ.iij.olei roſati:ſucci ſempuiue.ana.℥.ij. coq̄nt̄
cū facilitate:deīde colet̄:⁊ ꝑmitte congelari ē maxie effi-
cacie vbi oꝫ.¶ Jngt experimētator magnꝰ. Succꝰ ep̄ice
cū albuie ouoꝝ agitato mixtus ꝑ decē dies in ieiunio aſ-
ſumptꝰ curat diſcraſiaꝫ ep̄is ⁊ fell' calām ⁊ eſt efficax ⁊ ap
propriatū in icteritia.ſi xp̄s voluerit. ¶ Jngt Teſaurus.
℞.ſucci ſempuiue depurati ꝑtes.x.mell' ꝑtem.i. aceti ꝑtē
.ſ.⁊ bulliāt ad ꝑtē mell'. Jus ſerpētis vt ſupra de cura op-
pilationū ep̄is poſitū ē ⁊ exꝑtū in vtraqꝫ ictericia:⁊ ſupca-
lefactis in ep̄e ⁊ malitia fell' nō et ꝯiūctiōe ꝯplōnis ⁊ ſube
q̄uis ad bene eē ſm aliq̄d faciāt nec ſuba nec complōne.
Scriptū eſt.n.ꝙ tale ex nō quali muniuit medicinā largi
tor bonoꝝ nāli:ſed ſupnaturali ꝟtute vtraqꝫ celeſti ⁊ ele-
mētaria ſic̄ deꝰ creauit.ſic̄ q̄daꝫ eſt nobiliſſima in rebꝰ vir
tus nō nā hac:ſꝫ altera nā. nā ignota:nō de naturis q̄ ſunt
ſub ſole.ſed alteriꝰ nāe nr̄o itellectui ignote. ¶ Abo.ſiru
pus de abſinthio curat icteritiā citrinā:⁊ ꝯfortat ſtōꝫ:⁊ ca
momilla ⁊ chechengi aq̄ decoctōis cuſcute lacca:⁊ ſirupꝰ
de menta:lactuca cū aceto:caſiaſi.acetoſitas citri ⁊ ſuccꝰ
ro.curat eā:⁊ albaras. reubarbaꝝ ⁊ aloes cū aq̄ lactis ca-
praꝝ vel camellaꝝ.¶ Jdē.ꝺcoctio polij cum aceto curat
icteritiā nigrā litiū idū bibitū ⁊ linitū ꝓhibet icteritiā ni
grā ⁊ ſplenē.Et aſſa admiſtrata cū ficubꝰ:⁊ decoctio cice-
rū ⁊ camedreos camepitheos cōfert icteritie nigre.Suc
cus caul' cū vino de paſſis.ſuccꝰ radicis pētafilon calamē

tum ſilueſtre ⁊ radix peonie ⁊ ſirupꝰ ex eis ꝯpoſitꝰ eſt effi
cax ⁊ exꝑtus:ſi xp̄s voluerit:ſcolopendrie os ſpice ⁊ vene
tinctoꝝ ꝯferūt icteritie ex oppilatōe ⁊ ꝓp̄e cū aniſo ⁊ vio
albo.Aq̄ folioꝝ rafani aperit oppilōnes ep̄is ⁊ rēouet icte
ritiaꝫ reubarbaꝝ agaricū ⁊ aloes. ¶ Filiꝰ Serapiōis.me
dicina ſolutia q̄ abſtergit ictericiaꝫ. ℞. ſcamonee:aloes:ſi
racoſt.ſeis atriplicis.añ.ꝑtes eq̄les:terant̄:⁊ det̄ ī potu ex
eis.ʒ.i.cū aq̄ bulliēte.¶ Jdē medicia ſolutia ad icteritiā
valde mirabil'. ℞.ſcamonee.ʒ.iij.mirabo.citri.ʒ.vi. ſucci
eupatorij.ʒ.ij.terant̄ ⁊ cribellent̄:⁊ det̄ potio.ʒ.ij.ex ea cū
aqua ⁊ çuc.¶ Serapio medicina ſolutiua ad icteritiā ni-
gram exꝑta ⁊c̄. ℞.ſucci ciclamis. ʒ.iij.alias.℥.i. Et ſolue ī
.iij.lib.çuccari.⁊ decoq̄ quouſqꝫ remaneāt due ⁊ det̄ ī ma
ne.¶ Jtē alia ad ictericiā:⁊ īceptionē idropiſis:⁊ dat̄ cuꝫ
lacte camelaꝝ vel aq̄ caſei:⁊ ſi illic ē caliītas cū aq̄ ſolatri.
⁊ ēdiuie ⁊ volubilis. ℞.ſucci eupatorij: raued:croci.añ.ʒ.
i.ſ.lacce:ſeis cuſcute.añ.ʒ.ij.cimaruꝫ ſq̄nāti:ſeis citruli:ſe
mīs cucumeris:ſeis portulace ſcamōee antiocene aſſate ī
citonio.añ.ʒ.i.terant̄ ⁊ cribellent̄:⁊ det̄ potio ex ea aur.i.
cū eo:q̄ḋ videt̄ ex rebꝰ ꝑdictis.¶ Syrupus ex iuentione
nr̄a.ad ep̄is iflāmationē.colerā reprimit ⁊ eius furorē in
ciſti extinguit mēbra totiꝰ calefacta īfrigidat:febres alte-
rat:⁊ diuturnas abbreuiat ⁊ ictericiā citrinā ſanat.ſi deus
voluerit. ℞. ſucci endiuie:ſucci lupul'.depuratorum.ana.
li..i.ſucci apij:ſucci abſinthij:et eupatorij.ſucci boraginis
depuratoꝝ.añ.li.ſ.⁊ bulliāt ī eis ꝑmixtis.v.radices cōes.
ro.ī aceto.añ.℥.i.lactucaꝝ:portu.papaueris: ēdiuie.añ.℥.
ſ.eupatorij.M.i.coq̄nt̄ ⁊ colent̄ cū expreſſiōe:⁊ colature
addant̄ çuc.lib.ij.aceti:ꝑdictaꝝ radicū:⁊ ſucci granatorū
muçoꝝ.añ.℥.iij.⁊ in pecia rara bulliāt ſandali vtriuſqꝫ ſpo
dij.añ.ʒ.ij.⁊ q̄dā addūt cāphore.ʒ.ſ.doſis.℥.ij.cū tepida ī
aurora:⁊ ꝑmittat̄ flomia ſi expedit. Deīde fīnito ſirupo
miſtret̄ iſuſio reu.ʒ.ij.ſ.in aq̄ caſei fructuū vel ſucci ro.⁊
alteret̄ epar cū ſādal' cōibꝰ ⁊ ſucco ēdiuie:deiñ balneū tē-
peratū dulcis aq̄ itret:⁊ ꝟuato bono regie liberabit̄ ſi xp̄s
voluerit:q cū tali regimie liberaui multos. ⁊ eſt expertū.
¶ Jncipit ꝑticula q̄rta ſectōis ꝑme q̄ eſt de medicis egri
tudinū mēbroꝝ expulſiōis ꝯtinēs ſūmas. v.ſūma ꝑma de
medicis egritudinū mēbroꝝ deſeruiētiū expulſiōi ſuper-
fluitatis ſicce vt iteſtinoꝝ ⁊ ani cōtinēs capitula.x.

Explicauimus hucuſqꝫ
ſermonē ī medicis egritudinū mēbrorū
nutritōis q̄ ad tertiā ſpectabāt ꝑticulaꝫ
ſectōis ꝑme.tp̄s ē:vt afferamꝰ illū ad eiꝰ
ꝑticulā q̄rtā q̄ erit de medicis egritudi-
nū mēbroꝝ expulſiōis.¶ Sciēdū ꝓut
rettulit falco ꝙ expl'ſio ſupfluitatibꝰ ꝓp̄e ōbet̄ tāq̄ corpi
iutilibꝰ.Circa quā.G.ſūmus medicoꝝ ingt.Et q: ex nec̄i-
tate cibarij ſupfluitas iſeq̄t organa ad euandū eā natura
ꝯſtituit.eiſqꝫ ꝟtutes ipoſuit:q̄bꝰ mota alia q̄dē attrahunt:
alia nutriunt̄:alia ꝟo expellūt ſupfluitates. Attrahūt ꝟo
ſplen ciſtis fell' ⁊ renes:vt ī ꝑmo caplō ſūme tertie ⁊ q̄rte
ꝑcedētis tertie ꝑticl'e dcm̄ ē. Nutriūt ꝟo ſplē ⁊ ciſtis fell'.
ſic̄ dcm̄ eſt ī ſūma ꝑcedēti:vbi de eis diximꝰ.Expellūt ſu-
perfluitates iteſtina:veſica ⁊ vie vriales.Triplici āt exīi-
te digōne ac triplici ſupfluitate q̄ illi inſeq̄t neceſſario ſic
ca.ſ.hūida ⁊ vaporoſa.ad expulſionē ſicce taliter a ꝑdomi
nio nominate:q̄ digōni ꝑme ſtomaci inſequit̄: cōſtituit ꝓ
prie ⁊ ꝑncipaliter nā inteſtina.vi.nūero:tria gracilia ⁊ tria
groſſa cōtinua in ſe ipſa icipientia a fundo ſtomaci.⁊ ꝑten
ſa vſqꝫ ad poſtremum ſicteri lōga circumuoluta iuolutōi-
bus pluribus: ligata dorſo ligamētis ſtrigētibus ea:q̄bus
adueniunt arterie vene ⁊ nerui plurimi tanq̄ ſenſu pluri-
mo idigentes. Cōpoſita ex duplici tunica neruoſa ſolida
ne rumpant̄ a ſuperfluitatibꝰ trāſeuntibꝰ hn̄te tria ī ſe vil-