gar.ʒ.ij. ℂ Electuariū ex noſtra īuētione in retinēdo ſan/
guinis vomitū vltimū confortans ſtomacū: ⁊ alterās ma
litiā ꝯplexiōis calidā. ℞.corali ru. ʒ.v. maſticis.ʒ.ß.roſaꝝ
ʒ.iij.acacie:ſumac:aā.ʒ.ij.antere:ſandarache:aā.ʒ.ij.gar.
℈.ij.caſtorei. ℈.i. muſci.gra.i.ſanguinis draco. luti ſigil/
lati:aā.ʒ.ij.cōfice cū hoc ſyrupo. ℞. ſucci piroꝝ ⁊ pomorū
ſilueſtriū ⁊ citoniorū:agreſte:mēte:aā.lib.ß.zuccari lib.ij.
ℂ Pillule reſtringētes vomituꝫ. ℞.maſticis:myrre:ſan/
guis dracōis:aā.ʒ.ij.antere.ʒ.i.Cōfice cū ſucco mēte:⁊ da
mane ⁊ ſero. ℂ Cōfectio ſyrupi de berberis ꝯueniens ad
p̄dicta. ℞.ſpody.ʒ.iiij.berberis.℥.iiij.vue acerbe.℥.ij.cico
ree.M.ß.zuccari lib.ij.⁊ da ieiuno ſtō cū aqua maſticis.
ℂ Linimētū ſerapiōis retinēs vomitū colericum. ℞.ba
lauſtie.℥.iiij.folioꝝ oliue.℥.ij.foliorū rubi.℥.i. romani bi/
muſcie.℥.i.piſta ⁊ diſtēpera cū albumine ouoruꝫ: ⁊ farina
ordei:⁊ ſtō ſuppone:ſtringit oēm vomitū.ſi xpo placeat.
ℂ Aliud ad hoc ſublime ⁊ vltimū. ℞.ſucci plātaginis lin
gue canis:pētafilon:ana.ʒ.ij.aceti.℥.i.olei onfancini.℥.ij.
buliāt vſqꝫ ad ꝯſumptiōeꝫ duaꝝ partiū:⁊ adde:cere:oliba
ni.aā.ʒ.v. cāphore.ʒ.ij.croci.ʒ.i.maſticis.ʒ.iiij. ſanguinis
dra.ʒ.iiij. ſupiunge:⁊ ſupaſperge puluerē: corticuꝫ grana/
toꝝ:⁊ ſumac. ℂ Itē. ℞.aq̄ aluminis:vini pōtici:ſucci mē
te:pulueris maſticis:⁊ roſ.cū ſtipitib⁹:⁊ fac bulire:⁊ īfun/
de filtrū:ſpōgiā vel birrā ſcarleti: ⁊ ſuppone deſup pānū
fumigatū ex xiloal.thure:ſpica:⁊ maſtice.expertum eſt.
ℂ Ad vōitū īfātiū. ℞.ſucci mēte:citōioꝝ:vini pōtici:aā.
eq̄les ptes fac bulire:⁊ miſce ī eis.maſticis corticū thuris
aā.℥.ß.ſpice:cinamomi:gar. nucis muſ.galie muſ.aā.ʒ.ij.⁊
īfuſa birra ſcarleti bene calida applicet̄. ℂ Aliud ad vo
mitū ſan. ℞.ſan. dra.vnicis:lapidis ematitis:aā.ʒ.ij. boli
armeni:terre ſigil.aā.ʒ.i.puluerizētur ſubtiliter.⁊. ℞. ſuc/
ci arnogloſe.℥.vi.aque decoctionis radicum arundinis.℥.
iij.⁊ miſce bene.⁊ da.℥.ij.

ℂ Incipit ſumma tertia particule tertie ſectionis prime de cura ⁊ medicinis egritudinum epatis ⁊ venarum continens capitula.xvi.

S Ciendum eſt autem

q̄ epar vnuꝫ ex p̄ncipalib⁹ mē bris exi/
ſtit.ē.n. baſis ⁊ fons nāl' v̄tutis:q̄ ad cō/
ſeruatiōeꝫ īdidui ⁊ ſpēi quodāmō necīa
ꝯprobat̄.Cui⁹ opatio ē p̄mo naturaliter
gn̄are ſanguinē.q̄ vltim⁹ ē ī alimēto quo
corpus perdurat in eſſe. Et proinde ſapientiſſima ⁊ ſum/
me artificialis natura.vt dixit hyppo.ipi⁹ ſubaꝫ ꝑcreauit
ſanguineā ad modū coagulati ſanguis:lꝫ ex ſpermate mu
lieris ſit factum: vt chilū futuꝝ nutrimētū a ſtō ab eo ſu/
ſceptū trāſformet in ſanguinem q̄ ī nām aliti ꝑ virtutē ei⁹
apt⁹ ē alterari. Quapp.iiij. v̄tutib⁹ dotauit ipm nā ad hoc
neceſſarijs ī venas ab eo ortas:⁊ fines ramoꝝ ipaꝝ ptēſis
ēt q̄b⁹ res nutrimēti ī mēbro vnoquoqꝫ ꝯplet̄:appetitiua
ſcꝫ.retētiua:digeſtiua:⁊ expulſiua. appetitiua q̄dē nāli ſo
la nō ꝯmixta ex ea:⁊ aiali:vt ſtomac⁹:lꝫ p toto appetat ſi/
cut ſtomac⁹ epar:⁊ illud ē ſicut liliū dicit. qm̄ epar ab itra
trahit: qō appetit a ꝑrimo .ſtomacus v̄o ab extra:⁊ lōgin
quo. ℂ Nos aūt faciētes doctrinā diſciplinatiuā nō ipro
batiuā dicim⁹ illud eē eo q̄ tal' v̄tus in epate eſt:ſicut in ra
dice in qua eſt formalior q̄ꝫ in ramo: qualis ē ſtomac⁹. Et
ꝑinde in eo trahere pro ſe potuit:⁊ pro toto exiſtēs ſola.
In ſtō v̄o īdiguit auxilio appetit⁹ aialis: quo ſenſu fortio/
ri ſentiat inanitionē ſui epatis venaꝝ:⁊ alioꝝ viſceꝝ:quo
rum miniſter eſt:vt ſupra dictum eſt. Et q̄ꝛ coagulatio
eius non fuit ſolida:vt carnis:ſed tenera:circūdedit eum
pāniculo ſubtili ex neruo adueniēte ſibi a cerebro ꝑcrea/
to:⁊ ſifac: vt eo mediante ſenſum quo ex ſe carebat hēet:
⁊ ſua ſuba atqꝫ forma ī ſe diſticta ab alijs ꝑmaneret.alijſ/
qꝫ viſcerib⁹ necteret̄:plaſmauitqꝫ illud forma lunari:⁊ in
hoīe mai⁹ q̄ꝫ ī ceteris aialib⁹ eiuſdē q̄titatis: vt ſanguinis
gn̄atio p̄ ceteris abūdaret ī hoīe pp labores corporeos:⁊
aiales plurimos ipm reſoluētes,cū ſit maxime reſolubil'
⁊ cū additiōib⁹:ſeu pēnulis.iiij . vel. v.diſtinctū:⁊ a dome/
ſtica pte ꝯcauū vt ei⁹ reflexu circa ſtomacū in amplectē/
do coadiuuāte ei⁹ digōis gra ſufficiēs eēt:⁊ aptū:⁊ a d̄xtra
pte corpis iuxta coſtas falſas ſituatū:q̄b⁹ alligat̄ ī q̄buſdā
vt eis adherēdo meli⁹ ſuſtentetur:⁊ vt inſpiceret ſtōi fun
dum:cui⁹ ē quā iuuat digō ꝓpria:⁊ a ſilueſtri giboſum:ne
dyafragmatis locū ī ſuo laborioſo motu qō attingit ī pun
cto ſua amplitudine coartaret. In quo venas īplantauit ī
villos atqꝫ poros: vnā q̄dē magnā ī pte concaua: q̄ epatis
porta vocat̄:p eā.n.ſubītrat chilus:quē ab īteſtinis meſe/
raicis ramificatis ab illa:vt ſuis manib⁹ ſugat cū ſua v̄tu
te attractiua vna ex q̄tuor ſupradictis:⁊ p eas reddit̄ īte/
ſtinis ſi qua ſit in ſima ei⁹:ſeu toto corpore groſſa ꝑter na/
turā aggregata mā: vt per ſeceſſuꝫ ꝓpꝛie:vel vomitū vir/
tute ipi⁹ expulſiua operāte expurget̄. Ipſiqꝫ ī ramos gn
qꝫ ipi⁹ tēdētes ad q̄nqꝫ ei⁹ pēnulas:⁊ ramos alios coꝝ dif
fuſos in epatis ſubaꝫ cū ſcd̄a v̄tute retētiua ꝯtinet:donec
ī ſanguinē alteret ⁊ hūores villis circūtractis.ſic āt diffu/
ſus ſua v̄tute meli⁹ alteret digeſtiua.cū.n.totū corp⁹ agēs
attigit patiēs aptior ⁊ ꝑfectior opatio fiet. Aliā aūt iplā
tauit venā magnā in parte gilboſa venā chilis vocatā per
quā ꝓgrediētē ex eo ſanguinē ſua virtute īpellente cordi
trāſmittat: ⁊ p ſuos rāos corpi toti a mēbris v̄tute coope
rāte attractiua corpis ⁊ mēbroꝝ. Et q̄ꝛ ī alteratōe chili in
ſanguinē tria ſupfluitatū gn̄a īſurgebant:ſic in vino nouo
buliēte appēt.ſ.feculēta melica ſpumoſa:colerica:⁊ aquo
ſa q̄ in trāſitu ſtricto meſeraicaꝝ opitulabat̄ chilo.explan
tauit ex porta:ſeu lactea poros:q̄b⁹ ipas ſupfluitates ſeq̄/
ſtret a ſanguine: ⁊ ꝓprijs receptaculis:⁊ expurgatorijs d̄/
ſtinaret melicā fecē per porum explātatū ex ea ī pte cōca
ua in quā gn̄atio ſanguinis: ⁊ hūoꝝ potiſſima in ſplenem
trāſmittat ab ei⁹ ſuba ſeparatū:vt meliam ⁊ colerā nigrā
nāe maxime odioſas:⁊ in actōe digeſtiōis īpediētes ī mē
bꝛꝝ a ſe diſtictū ſubalr' ſequeſtraret. Colerā aūt p porum
īde ēt ortū in chiſtim fell' trāſmittit:que ſue epatis.ſ.ſube
manet affixa: vt ſuo calore:ſicut accēſio ignis ſub vaſe di/
geſtiōis coctionē vigorādo ipm ī ſua coagulatōe ꝯſeruet.
Si.n.ab eo auferat̄ ſtatim ſuba eius diſſoluit̄:⁊ corrūpit̄
ſicut experiētia dictat. ℂ Dis.n.duab⁹ ſupfluitatib⁹ ſan/
guinē oꝫ eē purgatū anteq̄ꝫ ad chilū ꝑueniat: p quā in ali/
mētū ad corp⁹:⁊ cetera mēbra deſtinat̄:cuꝫ nō ſint apte p
vlteriorē decoctiōeꝫ ꝯuerſiōi in ſanguinē:⁊ ad nutrimētū
mēbroꝝ.ſ.melia ꝓpter ꝯplexionē ⁊ ſupfluam groſſiciem
⁊ tereſtreitatē colera rubea ⁊ ni.pp malā morigeratiōeꝫ:
⁊ q̄ꝛ ſanguis reddit̄ p eas nāe horribilis:nō ſic fl'a ⁊ aquo
ſitas:cū fl'a nāle per vlteriorē decoctionē ꝯuertat̄ in ſan/
guinē:⁊ aquoſitas ipa ēt iuuet ſanguinē p ramos ſubtiliſſi
mos chilis trāſire. Et q̄ꝛ ſupexcreſcētia fact⁹ ſanguis flui
dus mēbris nō debite vniret̄: ꝑcreauit nā renes in quos
vena illa chilis īferi⁹ ꝓtēſa īfigit̄: vt aq̄ p ipos ab illis vir
tutib⁹ mēbri īpellētis ⁊ attrahētis ad ſanguinē trāſcolet̄
⁊ diſcernat̄ nō virtute per ſe diſticta ab illis p̄dictis:⁊ per
vritides poros in veſicā trāſmiſſa extra corpus finaliter
excludat̄.necnō ꝓpria mā ſi qua accidentalr' in ei⁹ gilbo
fuerit aggregata. Cōtinuauit ipm p dictas venas cordi
cerebro:teſticulis:corpori toti: ⁊ oībus mēbris ⁊ īteſtinis
etiā ſtomaco per ſubtilē neruū:cordi quoqꝫ per arteriam
cōcauam veniētē ab illo portantē ſpiritū:⁊ calorem:⁊ ſan
guineꝫ:q̄bus ſua inata caliditas ꝯſeruatur ⁊ tēperatur ei⁹
pulſu ac dyafragmatis motu. Ex q̄bus enarratis:⁊ ſic ex
anothomia collectis ſcire ⁊ itelligere poſſum⁹ epatis na/
turā: qualeſque ⁊ q̄te ſint egritudines ei euenire poſ eſ.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0301-9
DFG

Eas.n.ignotas nec cognitas ſaltem quodam vicino veritatis arbitrio curari nullaten⁹ eſt poſſibile. Jngt.n.gali. Qualr āt dignoſciturus mod⁹ curatiuus egritudinū erit qs ignorans eas q̄les q̄te ꝛque ſint: q̄ſi dicat nullatenus Loca quoqꝫ egritudinuꝫ cās ꝛ accidētia ꝑpria ꝛ modos: vtꝫ.ſ.ex ſe ꝑprie: vel ex vicinitate ſeu colligātia accidant: que oīa ſcdm Gal.in cura egritudinū mēbroꝝ ſunt neceſſario p̄noſcēda. Sciēdū ergo ꝙ epati accidunt egritudines in ſe: ꝛ ex colligātia ꝛ vicinitate. Jn ſe q̄dē ꝛ in ei⁹ ſuba carnoſas ſimplices triplicis gn̄is.ſ. mala ꝯplexio: mala cōpō ꝛ ſolutio cōtinui. Et ꝯpoſita ex oībus puta apa: accidit quoqꝫ in ſuis poris ꝛ venis. Et p̄mo p̄dicte egritudīes ſimplices ꝛ plurimū oppilatio: ꝛ ſuo ēt pāniculo.ſ.ſolutio ꝯtinui: ꝛ plerūqꝫ apa ſeu veſica que cū ſcindit̄ egredit̄ aqua ꝛ currit in vētre. Ex colligātia vō ꝛ vicinitate ad p̄dicta pati pōt p̄dictas maxime in ſuis actōibus nocumentum. ¶ Ad quarū cognitionē certā ꝛ poſſibilē. īuocato xp̄i auxilio: qui ſolus ītuēs cūcta reuelat: put poſſe ē arbitrāduꝫ eſt: ſeu coniecturalr̄ veniēdū ex his.vꝫ. nocumēto operationū: dolore: exeūtibus: tumore eius: diſpōe toti⁹ corporis: ꝛ mēbroꝝ vicinoꝝ ortoꝝ ab eo ei9qꝫ colligatorum ſibi cōpatiētiū: ſiti: ꝛ alys accidētib⁹ notis ꝛ ꝯparatis.vꝫ. regimine circūſtantys ſīlibus iuuātib⁹: ꝛ nocētib⁹: ꝛ ꝯſuetudine patiēdi: que exercitatis ꝛ abūdantibus intellectu ſunt nota: ꝛ īfra ſpecialr̄ ſpiritu ſancto ānuente ꝺclarata ponemus. ¶ Continet autem hec ſumma capl'a.xvi.

¶ Capitulum primum eſt de generali modo curationis diſpoſitionum epatis.
¶ Capitulum ſecundum de cura male complexionis ei⁹ ſimplicis ꝛ compoſite: que ſunt octo.
¶ Cap.tertiū de paruitate epatis: ꝛ cura eius.
¶ Cap.quartum de cura oppilationum eius.
¶ Cap.v.ꝺ pcuſſiōe caſu: ꝛ obuiatiōe ſup ipꝫ: ꝛ cura eius.
¶ Cap.vi.de fixura ꝛ īciſione epatis: ꝛ cura eius.
¶ Cap.vij.de apoſtemate epatis ꝛ cura eius.
¶ Capitulum octauum de apoſtemate meſeraicarum ꝛ lacertorum ventris: ꝛ cura eius.
¶ Cap.nonum de epatis inflāmatione.
¶ Cap.x.de dolore epatis: ꝛ eſt actio leſa.
¶ Cap.xi.de dolore hipocundriorū.
¶ Cap.xij.de debilitate epatis.
¶ Cap.xiij.de cacheſia: ꝛ eſt qualitas mutata.
¶ Cap.xiiij.de hidropiſi.
¶ Cap.xv. de egeſtionibus que ſunt ab epate: ſeu fluxib⁹ eius: ꝛ eſt exiens a corpore.
¶ Cap.xvi.de icteritia citrina.

¶ Capitulum primum de generali modo curationis diſpoſitionum epatis.

Pecificatis egritudinibus epatis p capl'a ꝛ diſtinctiones ad curā ipaꝝ ſcdm generalē modū veniēdum eſt pri⁹ ꝛ ſcdm ſpecialē deiceps. ¶ Jngt eni Gal. vlīa ꝛ gn̄alia p̄cedūt ſpecialia artificialr̄. ꝛ naturalr̄. Talis aūt modus generalis ex nā mēbri colligit̄ p̄narrata: ſi.n.ſcdm.G.in cura nō ſolū qḋ p̄ter nām eſt: ꝯtrario ſit remouēdū. īmo ēt qḋ nāle eſt ſuo ſimili ꝯſeruādum ſicut in morbis ſingulis eſt facere maxime in cura p̄ncipaliū ꝛ virtutē īfluētē habētiū: qb⁹ toti⁹ machina gubernat̄ illō eſt aduertēdū: ꝛ qꝛ ꝯtrariū illud reb⁹ ꝯſeruātibus eſt plerūqꝫ oppoſitū: ꝛ naturalib⁹ inimicū. ꝛ vtrūqꝫ ſimul oꝫ agere: ideoqꝫ ꝯtrarium qḋ ad remotionē rei p̄ter naturā epati ꝯtingēter approximādū eſt: ſic modificandū eſt appropriatūqꝫ eligēdū: qꝛ remouēdo illā naturalia nō offendat ſed ꝯſeruet: nocumētū.n.coꝝ extēſibile eſt in venas alia p̄ncipia: ꝛ ēt totū corpus. Per ꝯſeruationē aūt eoꝝ ad tēperamētuꝫ: ꝛ nām reducet̄ qḋ eſt p̄cioſiſſima reꝝ ſanitas deſiderantibus viuere ſcdm naturam. vt ait Gal. Talis aūt mod⁹: ſeu modificatio ꝛ approximatio vt dictuꝫ eſt a nā mēbri ipſius eligit̄: ſicut ab egritudinib⁹ variat̄ cōtrariū curatiuū. ꝛ qꝛ nā epatis ꝯſiſtit in hoc ꝙ principalis eſt alyſqꝫ p̄ncipalib⁹ alligatū: in q̄bus virtus exiſtēs ꝛ ſpirit⁹ gaudēt aromaticis medicis ꝛ ſtipticis ꝯfortant̄ ꝛ cōſeruātur nō debꝫ eē puris ꝯtrariū: ſed naturalr̄ īſitas tales habēs in ſe ꝑprietates: ꝛ virtutes: vel alys habētibus tales artificialr̄ mixtū. Jngt.n.G. Tale meli⁹ ē ſi idē farmacū ſimul ſtipticū ſit: ꝛ aromaticū. inſitas.n. virtutes h̄ns melius operabit̄ ēt ſi aperitiuū ſit in oppilatiōib⁹ eius datū illius mixtione nō careat: taliqꝫ ꝯfortet: a reſolutiōe ipoꝝ ꝓhibeat: ꝛ nō noceat oppilādo. Nec ꝓpterea dꝫ eē excedētis virtutis: vel q̄litatis: ꝛ maxime cū virt⁹ ipſius ꝛ ſpūs fundata in ſuba tenere ꝯſolidatiōis: ac calide ꝛ hūide cōplexionis exiſtat: que frigido ſup̄fluo ꝯgelat̄ ꝛ īdurat̄ virtus: ſpūs: ꝛ calor extiguit̄ calido excedēti reſoluit̄ ꝛ hūido aquoſo relaxat̄ ſtiptico ſuperfluo in ſuis venis ꝛ poris: ac pōtico oppilat̄: quare ſup̄flua in gn̄atiōe ſanguis neceſſario īſurgētia a ſanguine nō ſequeſtrant̄: que oīa multa ſequunt̄ incōmoda: que dicent̄ ſanguinis alimēti exit⁹ obſtruunt̄: qḋ eſt valde malū ꝛ areſactiōis cā. Proinde gal. ait aptos eē eos qui ſcdm epar exitus alimēti nō ſoluꝫ in ſanis: ſed ēt in egris eſt ſecuriſſimū. Jtē lapſuꝫ faciēte diſſoluit̄: dꝫ ergo eē approximādū ipi ſue egritudinis ꝯtrariū tēperatū: ſeu excedēs modicū: ꝛ ſi nō ſit illis in neruis ꝓportionatū in q̄ttitate multa frequēti: multiſqꝫ partibus ꝛ per oēm modū approximatū ei ſaltē ꝓportionabilr̄ effectiue: debetqꝫ eē aperitiuuꝫ ꝛ abſterſiuū: qḋ qꝛ acuit ſanguineꝫ: generatqꝫ hūores diuerſos: ꝛ incōlles: vt eſt aqua radicū oꝫ vt cū dederis eā duob⁹ vel trib⁹ dieb⁹ ꝯñter naturā ſoluas cū aliquo lenitiuo ꝛ alteratiuo: vt ſunt tamarindi: caſſia: ꝛ māna: ꝛ cū ſit in ꝓfundo poſitū nō dꝫ eē ſubſtātie pichimeris: ſꝫ lēptomeris vt ante v̄tutis ei⁹ reſolutionē ad eū ꝑueniat: ꝛ ne ſua vehemēti ſubtilitate: ꝛ virtute ſubito de epate trāſfundat̄ ad vlteriora mēbra: miſceatur ei aliq̄d rafani: vel ſemīs ei⁹ qḋ trahēdo ipm ad ſtōm ī medio.ſ.epate remaneat diu: ꝛ ne īpediat̄ in via ſit hora īnanitionis ſtōi: vel ꝯplete digōis ei⁹ ablatū: ꝛ īfra de cura ſplenis dicet̄ ad plenū de facile ꝛ difficile trāſeūtib⁹ ſi ſpūs ſancti gr̄a ſim ībutus. Etiā cuꝫ ſit a ſima ītestinis ꝛ ſtō aſſociatū vicinū: ꝛ alligatū venis: ꝛ poris ꝛ cirbo renib⁹ ꝛ vys vrine: ac venis ſupiorib⁹ baſilice.ſ. ꝛ cephalice tendēti ad caput ꝛ nares mā: ſi q̄ educēda de ipo fuerit euacuatiuū: qḋcūqꝫ dꝫ eē tale qḋ p illas ꝛ vicinas ꝑtes expellat: nā.n.quā iuſſit hyppo. medicū in oībus ſemp ſeq: p ꝓpinq̄ ꝛ latiora ſemp expellit: ꝛ per longinq̄ q̄nqꝫ. qꝛ p poros in ſudorē mām vtriuſqꝫ partis expurgat: q̄nqꝫ mām vni⁹ partis in aliā deriuādo expellit: ſicut teſtat̄ Hyppo. cū dicit. Urina mlt'a noctu facta modicū ſeceſſum ſignificat: ꝛ ecōuerſo. Etiā cū dyafragma attingat frigidū ei approximādū exteri⁹ a falſis ſecedat coſtis: ne īdurādo illō ad ſpūs difficultatē adducat: dꝫ quoqꝫ eē nō ſolū virtute elemētaria morbo oppoſitū: ſꝫ ēt ꝑprietate: vel ſaltē morbo a ꝯplone ꝯtrariū. a ꝑpetate vō ꝯueniēs morbo. ſic.n. ſupra ꝺ medicinis egritudinū cordis recolim⁹ fore dictū. ¶ Stude ergo eligere medicamē qḋ cōueniat epati a ꝓprietate ꝛ ꝯplone in cōditionib⁹ dictis: ꝯtrariet̄ aūt egritudini a ꝯplone: ꝛ ꝑprietate: etiā ſi poſſe fuerit naturalr̄ īueniri: vt eſt abſinthiū: ꝛ eupatoriū in flegmone ſcliroſi: ꝛ oppilatiōe ei⁹: put. G. edocuit: ꝛ ſicut ꝯtingit repiri ī coriādro: cui⁹ ꝯplexio cū ꝑprietate eſt in ꝓhibēdo fumos ꝛ vapores a capite: q̄re cōmedāt ipm in dolore capitis calido pulſatiuo: vbi vō nō cōuenit: vt in ſolatro: qḋ ꝑprietatem hꝫ reſoluēdi apa: cerebri. Et qꝛ frigidū nā ꝛ ſtupefactiuū reſolutionē vetat: ꝛ ī ſcorpione frido q ſua ꝑprietate lapi-

des renu⁊ cõminuit ⁊ reſoluit:certe preeligendum eſt qd̕ a ꝓprietate contra operat̃ morbo ei qd̕ ꝯtra agit a cõple‐xione.andagoga ergo in cura fe.flegmatice ꝑeligenda eſt yſopo. Et oleũ de ſcorpionib⁹ in lapide renũ ꝑeligendum eſt oleo de piperib⁹:qd̕ eſt.q2 ꝓprietas eſt potentior ⁊ effi‐cacior ꝯplexione ac generalior in opatione:ita vt ꝑueniat operationi illius. At q2 ꝓprietas reſpicere põt egritudinẽ ⁊ membꝛ:cui⁹ eſt: ſed ꝯplexio in medicis curatiuis egri‐tudinem reſpicit:⁊ non membrum:etiam operatio a pro‐prietate eſt appropriatior:⁊ magis articulata diſpoſitioni cui ꝯuenit q̃ꝫ opatio a ꝯplexiõe. ¶ Primũ pꝫ.q2 ꝯplexiõi que ꝯtrariat̃ ꝓprietati põt meli⁹ obuiari q̃ꝫ ꝓprietati cõ‐trariãti ꝯplexioni:vt pꝫ ĩfra eſt efficacior ĩ operatõe. quia aer frigidus q̃tũcũqꝫ ꝯplexione virtute ſolis ⁊ ſtellaꝝ cor‐pora noſtra reſoluit:vt ait Abo.⁊ magnes cũ ſit frida tra‐bit ferrũ a ꝓprietate nõ obſtãte friditate ſua. Eſt quoqꝫ generalior cuꝫ reſpiciat mẽbꝛ ⁊ egritudinẽ in oĩ diſpõne ſua:vt ꝑinde ei⁹ operatio ſit certior:⁊ ab errore remotior ꝯplexio vͦ reſpicit ipm̃ in altera tñ vt infra de medicis iſcturaꝝ xp̃o duce dicet̃. ¶ Scd̕m eſt manifeſtũ.q2 en‐diuia reſpic̃ iſflatõeꝫ epis vt epar:lactuca iſflationẽ ei⁹:nõ vt epis:ſꝫ vt iſlãmationẽ. Sed tertiũ ẽt liquet.q2 ꝯplexio operat̃ idẽ in plurib⁹ differẽtib⁹ ſpecie ⁊ nũero:ſꝫ ꝓprietas idẽ operat̃ in oĩb⁹ vel plurib⁹ differẽtib⁹ numero ſub vna ſpecie ꝯtẽtis:vnde operatio a ꝓprietate a tota ſpecie dicta ẽ:ſeu forma ſpecifica:vt ait Auer. ¶ Primũ quoqꝫ pꝫ.q2 cõplexioni ꝯtrariãti ꝓprietati obuiari põt miſcẽdo ei cõ‐trariũ:ſic̃ endiuie albe ĩ epatis algore miſcem⁹ mel:qd̕ cõ‐trariat̃ ſue frigiditati. Et in oppilatiõe ei⁹ eligim⁹ endiuiã rubeã.vt docet Abo. Sꝫ ꝓprietati ſic nõ põt obuiari cuꝫ nõ ſit illi ꝯtrariũ in operatiõe ipſi⁹:nõ.n.ſic apte ĩuenitur ꝙ ſolatri a ꝓprietate operationẽ ĩpediat. ſic ꝙ eius frigi‐ditatẽ a ꝯplexione alteret:ſeu remittat:eo ꝙ multo plura ſunt q̃ ꝯplexioni ꝯtrariant̃: q̃ꝫ que ꝓprietati ſaltẽ cognita quo ad nos:⁊ dato ꝙ ĩueniant̃:vt eſt ĩ napello:cui⁹ ꝓprie‐tati ſola obuiatõe ĩterficiẽti nã aſſociauit ꝯtrariũ.ſ.murẽ in eo ĩuẽtum:⁊ alijs venenoſis alia tiriacalia generalia:⁊ ſpẽalia ꝑcreauit:⁊ hoc:q2 nihil fec̃ cui ꝯtrariũ nõ oppoſuit vt Ar.dicit.ſicut iuxta fabã barbã ĩrcinã ꝑcreauit natu‐re ipſi⁹ ꝯtrariã: ⁊ lino cuſcutã: nõ tñ ẽ ſic mutabile ⁊ varia‐bile per gradus ⁊ mãſiões:ſicut alterãs ꝯplexionẽ: quare nõ ſic apte obuiari põt:vt igr̃ electio taliũ ꝯtrarioꝝ curã‐tiũ ⁊ ꝯſeruãtiũ:ſimul ⁊ cõfortãtiũ a nã ꝑdictas cõditiões habẽtiũ:ac ꝓprioꝝ:qb⁹ in cura diſpoſitionũ epatis ĩdige‐mus tibi ſit facil' añponem⁹ archã eoꝝ: de qb⁹ eligere va‐leas q̃ ſunt tue ĩtẽtõi ꝯformes. ¶ Sciendũ eſt ergo ꝙ re‐rum ꝯueniẽtiũ epati:⁊ diſpõnibus ei⁹:q̃dã ſunt ſimplices ⁊ quedã cõpoſite.⁊ ſimpliciũ quedã ſũt cõueniẽtes a com‐plexione: quedã a ꝓprietate: quedã vtroqꝫ mõ cõferunt. A cõplexiõe aũt quedã ſunt:que in tẽperamẽto ipm̃ ꝯſer‐uãt:vel ad illud reducũt:⁊ ſubam vniũt:⁊ haꝝ quedã ſũt calide:q̃dã frigide:q̃dã ſicce:q̃dã hũide:⁊ quedã tẽperate Calide ſunt elbub:acor⁹:ciner. iſop⁹ hũida bibita ⁊ linita: coſtũ:gallia:amomũ: crocus:cinamomũ:caſſia lignea: fũ‐micates ſgnãti:myrta:aranabũ:naſturciũ:apium:maſtix: ameos:cipuꝫ:foliũ origanũ:ſpica:xiloaloes:gar.mumia.⁊ ſilia. Frigide vͦ ſunt ſandal'.ſpodiũ:viole:nenufar.cãpho‐ra:aq̃ ordei:acetũ:vngula cabalina:roſe:⁊ aq̃ eaꝝ:ſolatrũ Politricũ:coriãdrũ ꝓprie adiãtos:aq̃ lactis ꝓprie capre: ⁊ lac acetoſuꝫ:granata acetoſa ⁊ muça:pruna acria:⁊ cete‐ri fruct⁹ fridi ĩſipidi. Si vͦ ſint ſiptici:ſint pauci:⁊ poſt ci‐bũ ſumpti:ne veſtigiũ oppilatiõis dimittãt:ſemina cõia:⁊ ſẽia fridoꝝ acetoſa: ⁊ aq̃ ordei:acetũ ex vngula cabalina. ſicce ⁊ hũide colligũt̃ ex his. Tẽpate ſũt euc.⁊ ꝓ̇pe albu‐ſac:⁊ cuſcuta ⁊ lacca. A ꝓ̇petate ꝯueniẽtes:ſt q̃ ſt cibi ⁊ me‐dicie:vt ẽ ẽdiuia:vtraqꝫ cicorea:⁊ epatica:⁊ ſpiacbia:bate‐cha:melon idus:citruli:cucumeres: lactuca :portulaca:⁊ ꝓprie muça.⁊ abſinthiũ:⁊ eupatoriũ ſcd̕m. H. Et que ſunt cibi abſolute.vt epata animaliũ:boni chimi:⁊ ꝓprie epar adhib.carnes limaciaꝝ:⁊ ericiꝫ:perdicũ:turtuꝝ:galinarũ: piſciũ petrinoꝝ:⁊ fic⁹:auelane:fiſtici:amigdale: fruct⁹ ſer‐bin:vua paſſa:⁊ por⁹ vini odoriferi ſubtilis:⁊ dulcia ſubaꝫ ei⁹ ĩpinguãtia:que ſi ſint groſſe ſube oppilãt:ſi ſubtilis in‐flãmant̃ facile niſi cũ ſubtilib⁹ ⁊ accidis miſceant̃:⁊ bre‐uiter oĩa boni chimi nõ groſſa nec viſcoſa cibaria: Utroqꝫ mõ ꝯueniũt vtraqꝫ:⁊ que ipꝫ mũdificãt. ⁊ ab eo mãs eua‐cuãt ⁊ purgãt:quaꝝ q̃dã ſunt eũantes mãs gibi:q̃dã ſime ei⁹:⁊ q̃dã vtriuſqꝫ: Gibi vt ẽ flomia baſilice dextre.⁊ ꝓuo‐catio fluxus ſanguis ex narib⁹: ⁊ vrinã ꝓuocãtia: quorum q̃dã ſunt calida: q̃dã frida:q̃dã tẽperata. Tẽperata ſũt ca‐pil'.veneris:ſgnãtũ.ĩfuſio ſiſami:ꝺcoctio .v.radicũ cõiuꝫ: ⁊ ſemẽ ipaꝝ fenugrecũ: ⁊ aq̃ altee: ⁊ ſimilia.q̃daꝫ calide ⁊ fortiores: vt dauc⁹:acor⁹:ameos:ſpica:croc⁹:vrtica:cãepi‐theos:alhaſce: ariſtologia:⁊ ſilia:q̃dã fortiſſime: vt canta‐rides rubea.meſtrameſis:⁊ ſilia. Frigida ſunt ſemia cõia ⁊ fruct⁹ eoꝝ harbag: ⁊ ſilia. ¶ Purgãtiũ vͦ mãꝫ ſime:q̃‐dã ſunt purgãtes ꝑ vomitũ: ⁊ ĩteſtina: ⁊ hoꝝ q̃dã purgãt colerã:vt tamaridi:reubar.aloes rectificat⁹:mirob. citri‐ni:dyagridiũ in robuſtis corporib⁹ ad ſoluẽdũ duris. Eſt eni de furioſe ſoluẽtib⁹.q̃re rectificatiõe ĩdiget. Quedam flegma:vt agaricũ:q̃dã meliaꝫ: vt epithimũ:mirob.nigri: indi:q̃dã hũores aduſtos: vt aq̃ lactis: q̃dã vtroſqꝫ:vt ſce‐ne:q̃dã aq̃ꝫ citrinã:vt ciclamẽ:⁊ ireos ſerapinũ:euforbiuꝫ cucumer aſinin⁹:laureola:aſcebrã: nocẽt tñ epi:q̃re oꝫ re‐ctificare: q̃ educũt mãm vtriuſqꝫ ei⁹ partis ſunt ſudorem ꝓuocãtia q̃ dicta ſũt ſupra ĩ cura apatũ cerebri. Cõpoſite ſũt:q̃ ex his ꝯponunt̃: ⁊ in nr̃o antidotario dicta ſũt:⁊ ab alijs ſumpta ĩfra ſpũs ſancti gr̃a ponem⁹. Nota tñ ꝙ ꝑdi‐ctoꝝ oĩum q̃dã ſũt q̃ ꝯferũt ei⁹ diſcraſijs:q̃daꝫ ipi⁹ oppila‐tionib⁹:q̃dã icteritie:q̃dã caceſie:⁊ hidropiſi:q̃dã ꝑcuſſio‐nib⁹:⁊ vulnerib⁹ ei⁹:q̃dã apati:q̃dã ĩflatiõi: q̃dã dolorib⁹ ei⁹:q̃dã debilitati:⁊ q̃dã fluxib⁹: q ab eo ꝓcedũt.quoꝝ ſu‐mã ſigillatiꝫ ponem⁹ ĩ caplis ꝓprijs: qb⁹ ĩfra dicet̃ de eis Et ex his ſunt q̃ cũ ſipticitate temperata ꝯfortãt:⁊ matu‐rãt:vt croc⁹ ⁊ darſeſaha. Et ex his ſũt q̃ exiccãdo mũdifi‐cãt vir⁹ malũ:⁊ ꝯriant̃ putrefactiõi:⁊ expellũt cãm corrũ‐pẽtẽ.⁊ reſiſtunt medicis mortiferis:⁊ veneno: vt cinamo‐mũ:⁊ caſſia:q̃ ſũt fortiores ĩ his oĩb⁹ aromaticis:⁊ vt ẽ ſpi‐ca:⁊ alia:⁊ vinũ ẽt odoriferꝝ ꝯriat̃ putrefactõi. Et q̃dã vni ꝯferũt:ſꝫ alteri diſpõni nocẽt:⁊ ꝓ̇pe vbi ſũt diſpões ei⁹ ꝯ‐rie:vij. H.ait. Jtaqꝫ difficillimũ ẽ ĩueire qd̕ mltũ ꝓſit.ob‐ſit ãt nihil: ⁊ q̃dã diſpõni cõferũt.epi vͦ nocẽt:⁊ ecõuerſo q̃ doctrine ſimpliciuꝫ relinq̃nt̃ pp breuitatẽ. Mirabile ãt ẽ ꝙ ꝓ̇petas a ꝯplõne ĩ aliqb⁹: vt ꝑdiſtinctis diſcrepet: cũ ſemꝑ ei debeat cõuenire:cõplo.n.diſpõit ad ꝓprietatẽ ſemꝑ.vt ponit Abo. Et ea corrupta nõ remanet ꝓprietas: q̃re diſcrepare nõ debẽt:ſaltẽ ĩ opatiõe. ¶ Sꝫ ſcd̕ꝫ Gali. ꝑlima q̃ ſimplicia vident̃ ad ſenſum:cõpoſita ſũt ꝭꝫ v̇tutẽ itaqꝫ ex tali cõpõne acq̃rit̃ alia cõplo:quã ſequit̃ ꝓ̇petas diuerſa a ꝑ̇ma cõplone:a q̃ ꝑ̇ncipalr̃ depẽdet actio ſic̃ ĩ ꝑ‐diſtictis.ſ.ſolatro ⁊ ſcorpiõe ẽ videre. Jn ꝑ̇ma.n.eaꝝ ſuba dñatur friditas ſtupefactiua.ĩ ſcd̕a vͦ ſuba ſuꝑficiali pau‐ca caliditas quã ſeq̃tur caliditas reſolutiua que in opera‐tione reſoluendi conueniũt ſemper.

¶ Cap.ij.ꝺ cura male cõplõnis epis ſimplicis ⁊ cõpoſite.

Mala cõplo epis ẽ diſcraſia q̃litatũ q̃tuor. ꝑ̇maruꝫ elꝛoꝝ ei⁹ cõis exiſtẽs ei: ⁊ alijs cõſilib⁹ ĩq̃tũ cõſi‐milia ſũt: hꝫ ãt ſuas diſiões:⁊ ſubdiuiſiões:vt ait. H.aut ꝯmixta:⁊ hoc ꝑlimũ ẽ.⁊ vnaq̃qꝫ ẽ q̃druplex ⁊ ẽ aut pura:aut ĩpura:⁊ ẽ ꝑlimũ:⁊ q̃lꝫ aut diuerſa:aut eq̃l' ⁊ ẽ ra‐ro. Et cã ei⁹ ẽ duplex ĩterior ⁊ exterior:⁊ exterior ẽ vna vl' plures ex ꝓcatarticis cãis ſupra ĩ mala ꝯplõne ſtõi dictis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0303-1
DFG

interior aut eſt propria aut ex cōmunitate ꝓpria eſt male
q̄litatis hūores gn̄ati ī eo: ꝛ mala ꝯpō ſolo vel apa. Ex cōi
tate ēvt mala ꝯplo cordis: ſtōi cerebri ꝛ toti⁹ corpis: vt fe.
gb⁹ nō pōt ꝯdicere epar: variant̄ aūt ille cāe: ꝛ ſpecificant̄
ſꝫ varietatē ſpecieꝝ ei⁹ ꝑmiſſaꝫ: nā q̄lꝫ ipaꝝ ꝓpriā hꝫ cāꝫ
ꝓpa ſigna: ꝛ ꝓpriā curaꝫ. Si ſit mala ꝯplo ep̄is cal'a: ꝛ ſit
pura ꝛ diuerſa apparebit vna: vl' pl'es ex ꝓcatarticis cāis
ſupra ī mala ꝯplone ſtōi dictis abſqꝫ ſignificatiōe aliqua
antecedētiū cauſaꝝ iterioꝝ: ꝛ ꝯtriſtatōis ſenſu: ꝛ nocumē
to gn̄atiōis ſanguis ꝛ hūoꝝ. Et ei⁹ ſigna eēntialia ſunt q̄li
tas mutata ad tactū: ꝛ ad viſuꝫ: puta calor ī totū corp⁹ ex
tēſus: ꝛ maxie ī hipocūdrio dextro ꝑcept⁹: ſi nihil aliō cō
tradicit. Et cū auget̄: vt nō ſolū ꝯtriſtet: ſꝫ vniuerſas ledat
actōes ꝛ paſſiōes fit febril' ꝛ color citrin⁹: ꝛ actio leſa. q2 ſi
tis magna: appetit⁹ cibi vel fames nulla vel modica: q̄re
egeſtio modica ꝛ ſicca. deſideriū fridi: quo iuuat̄ ꝛ leditur
ꝯrio multiplicatio colere ī ſanguis gn̄atiōe: ēt ex fridis ci
bis: vt ēt augeant̄ hūores aduſti: gb⁹ ſanguis paucus fit: ꝛ
nāe horribil': q̄re mēbra ex eo nō nutriūt̄ ſꝫ fiūt macilēta
vt ſil'r ī mala ꝯplone ſtōi calida dictū ē retētio debil' ꝛ ex
pulſio fortis: q̄re multiplicat̄ vrina: ꝛ fit tincta: cōcurritqꝫ
cū circūſtātys ꝯſilib⁹: ꝛ cōſuetudine iſlāmādi. Cura ma
le ꝯplonis calide ei⁹ ē tres res. q̄rū vna ē cāe exterioris: ꝛ
ꝓcatartice rēotio. ſcd̄a ē alteratio diſcraſie. tertia ē accn̄
tiū correctio. ⁋ Primā ꝯplēt ab eis abſtinētia ꝛ ꝑmuta
tio: vbi obediat: vbi vō nō: abſtiere ab coꝝ itēperātia: vbi
vō neutꝝ poſſe ſit: cura ē nulla. Jngt. n. Hyp. ī afforiſmis
Opꝫ āt nō ſolū ſe ꝑbere q̄ oꝫ faciētē: ſꝫ ꝛ egrotātē. Et Gal.
Nō ē poſſe vllā diſpoſitionē curare final'r: adhuc manēte
eā faciēte cā. ⁋ Scd̄aꝫ rē ꝯplet admiſtratio fridoꝝ cibo
rum potuū ꝛ medicinaꝝ hn̄tiū tēperamētū paſſiuaꝝ ſim
pliciū: ꝑdictoꝝ ꝛ ꝯpoſitoꝝ ex eis aggregātiū ī ſe ꝯditiōes
ꝑdictas ꝛ ꝓꝑetates: q̄ tua itereſt vt eligas ꝓut exigit diſ
pō: ꝛ approximes iteri⁹ cū mō ordinate icipiēdo a leuiori
bus ꝛ ſimplicib⁹: ꝛ gradatiꝫ: vbi nō ſufficiāt ad fortiora ꝛ
ꝯpoſita tēdas: ꝛ maxie: vbi mēbri vicini: ꝛ ꝓprie ſtōi diſpō
te iuitat. Si ergo ſtomac⁹ nō toleret frida ex cibis ꝛ poti
bus: ꝛ medicis oꝫ vt eis cal'a: ꝛ ꝓpa illi admiſceas: ꝛ calis
actu illis vtaris. Sitqꝫ illoꝝ caliditas talis: vt nō extēdat̄
ad epar. Si dabis quoqꝫ calida ꝑꝑ illud ſint groſſe ſubē:
ꝛ vinū leue: pauce ſtipticitatis: vel approximabis exteri⁹
calida ſtō: ꝛ epati frida: vel dabis mō calida ꝑꝑ ſtōm mō
fra ꝑꝑ epar. ⁋ Tertiā rē ꝯplēt: q̄ ifra dicent̄ ō cura fe. de
bilitatis ep̄is ꝛ nocumēti: ꝛ actionū ei⁹ ad ea ergo ꝓcedas
Si vō fuerit mala ꝯplexio ep̄is frida pura: ꝛ ſimplex: cās:
ſigna: ꝛ curā ecōtrario itelligas ſupradictis. ⁋ Jngt. n. G.
vnū ꝯrioꝝ ꝑ aliō itelligit̄. Sꝫ ſi ſit hūida: pura ſimplex: lꝫ
ſit raro: tū q2 mēbꝝ gn̄atiuū hūoꝝ: cui⁹ diſcraſia ſit hūo
rem nō habeat: gn̄at ſtatim ex cibis ꝛ potib⁹ cotidie ꝑcaſ
ſumptis: tū q2 hūid⁹ n̄aliter: ꝛ ꝑncipiū exiſtēs venaꝝ con
fluētiā hꝫ hūoꝝ ꝑgenitoꝝ cōtētoꝝ ī eis. Cā ei⁹ erit vna vl'
plures ex ꝓcatarticis cāis hūectātib⁹ ſupra ī mala ꝯplone
hūida ſtōi dictis. Et ei⁹ ſigna ſūt albedo coloris iſlatio fa
ciei: ꝛ oculoꝝ mollities carnis: ꝛ laxitas corpis: q2 cordis
ſiccitas nō reſiſtit: paucitas ſitis: ꝛ faſtidiū attractō ꝛ retē
tio ōbilis: q̄re ergo mollis ꝛ aquoſitas ī ſanguis gn̄atione
q̄re vnit̄ mēbris: vrina ē multa ſpiſſa: niſi aliō ꝯdicat ꝯriū
cuꝫ circūſtātys ꝯſilib⁹ ꝛ ꝯſuetudine hūefiēdi. Cura male
complonis fride hūide: ei⁹ ſil'r ē tres. ꝑma aufert cāꝫ. ſcd̄a
itroducit ꝯria ipi⁹ diſcraſie. tertia corrigit accidētia. Pria
cū notis. ſcd̄a cū adminiſtratōe reꝝ exiccātiū ꝯplet̄ hn̄tiū
tēperiē actiuaꝝ: vel declinātiū ad caliditatē parūper gn̄a
liū: q̄s ſupra de cura male ꝯplonis hūide ſtōi habuiſti ꝛ
ſpāliū ꝓpriarū: q̄s tibi hic ſupra narrauim⁹: nec nō cū ali
qbus cūantib⁹ hūorē ꝑgeneratū vel gn̄andū. deiceps ōbi
lib⁹ tn̄ ne ſuo exceſſu ad rarefactionē ꝑducāt. ⁋ Tertiaꝫ
rē ꝯplēt q̄ corpis habitū ꝯfortāt exiccādo: vt eſt ſticados

myrt⁹: camomilla: glās: myrra: galia: xiloal'. lupne: cordu
meni: olea iporū: folia pomi citrini: ſandaraca ſglla: ꝛ ſilia
Si aūt mala ꝯplo ep̄is ſicca fuerit pura ꝛ ſimplex: cā: ſi
gna ꝛ cura erūt illis ꝯria: ꝛ eis qbus cura fieri hꝫ ex dictis
hic ſupra in cura male ꝯplonis ſtōi ſicce colligere poteris
Si ergo ſit ꝯmixta ꝯmixte erūt cāe predicte ſigna ꝛ cure
dn̄tes tn̄ ſm diuerſitatē ꝯmixtionis q̄ ē q̄druplex: quaꝝ
cognitiōes ex ſimpliciū cognitiōe ꝑmiſſe ſunt ſupra hic ꝛ
ī cura malitie ꝯplonis ſtōi cōmixte habuiſti. Et ſi gdem
ſit mala ꝯplo ep̄is ipura ſiue ſimplex: ſiue cōmixta ſiles
ꝑdictis hꝫ cās ꝛ ſigna ꝛ curā: addit tn̄ cāꝫ iteriorē hūoralē
ꝛ ſigna ei⁹: ꝛ eūationē ipi⁹: cui⁹ eūatiōe: ſi recēs fuerit. nec
ipſa mala ꝯplo ceſſat. Si vō ipſa fuerit p⁹ eūationē dige
ſtiōe ꝑmiſſa. ſi expedit alterabis cum ꝯrys ex ꝑdictis ele
ctis ꝓut diſpōni cōuenit ſcd̄ꝫ cōditiōes ꝑdictas. ⁋ Syru
pus de endiuia ad ep̄is calefactionē ꝛ debilitatē mirabil'.
℞. endiuie vtriuſqꝫ: an̄. M. i. ſeminuꝫ cōium recētiū. ℥. ii.
aceti albi. ℥. ii. çuccari tabarçet: lib. i. ꝛ ſyrupent̄ cū aqua or
dei: ꝛ aromatiçentur cuꝫ ſandal'. vtriuſqꝫ: ꝛ ſpody: an̄. ʒ. i.
⁋ Jtē ſyrup⁹ ō epatica ad idē. ℞. epatice. M. i. lēticulaꝝ
aq̄. M. i. floꝝ cucurbite: violaꝝ: roſaꝝ: an̄. ℥. i. cimaꝝ ſqui
nāti. ʒ. i. çuccari tabarçet: lib. i. irroret̄ cū ſucci granatoruꝫ
℥. iiii. ꝛ aromatiçet̄ cū ſandali: ꝛ ſpody: an̄. ʒ. i.
⁋ Jtē ſirup⁹ ō nenufare efficaciſſim⁹ ꝛ vtl'is. ℞. floꝝ nenu
faris. ℥. ii. vngule cabalie: aq̄tice: pſily itegri acetoſe: an̄. ℥.
i. ſeiuꝫ cōiuꝫ. ℥. ii. ſeiuꝫ fridoꝝ. ℥. ſ. radic. feniculi. ℥. i. buliāt
ī aq̄ ordei: ꝛ addat̄ çuccari: lib. i. aceti albi: ꝛ ſucci granato
rū: an̄. ℥. ii. ꝛ aromatiçet̄ vt ſupra. ꝛ addat̄ paꝝ ſpice. ne fri
giditate oppilationē iducat. ⁋ Ali⁹ ſyrup⁹. ℞. ſucci endi
uie al. ſucci ſolatri: ſucci cucurbite: an̄. li. i. ſucci granatoꝝ
muçoꝝ lib. ſ. çuccari lib. i. ꝛ aromatiça: vt ſupra da. ℥. ii. cū
aq̄ roſtri porcini. ꝛ vno trociſ. de cāphora. ⁋ Dyacaſſiafi
ſtulatū educēs colaꝫ: ꝛ refrigerās ep. ℞. mell' caſſiefi. lib.
ii. penidiaꝝ. ℥. iiii. ſucci violaꝝ. ℥. iiii. cādi. roſ. ℥. ii. tamari.
℥. iiii. ſyrupi viol. ℥. ſ. fiat cū ꝯcoctōe herbaꝝ fraꝝ: ꝛ q̄tuor
ſe. viſalū: ꝛ prunoꝝ qō ſuffic: ꝛ reubar. ℥. i. ꝛ ſi q addūt mā
ne. ℥. iiii. ⁋ Jdē opat̄ ell'ꝫ dyaprunis ſiue dyagri. ⁋ Ma
ran ad calefactōeꝫ ep̄is: ꝛ ꝓpe iter agētib⁹ ꝯuēit q epithi
ta ꝛ cerota n̄ valēt expectare. ℞. vtriuſqꝫ ſanda. ſpo. an̄. ℥.
q̄rtū: folioꝝ roſa. ꝛ folioꝝ nenufar. an̄. ℥. ſ. cāphore. ʒ. ii. ſe.
froꝝ q̄tuō: an̄. ʒ. ii. pluericēt̄ ꝛ ꝯ ficiāt̄ cū cera al. ꝛ malaxēt̄
cū ace. ꝛ olo ro. bn̄. ꝛ adde floꝝ abſin. ʒ. ii. ꝛ extēdat̄ ſupra
epar applicet̄: ꝛ ferat̄ iter agēdo. ⁋ Epithia ad ep ſupcale
fcm̄. ℞. vtriuſqꝫ ſanda. ſpo. an̄. ʒ. ii. roſarū. ℥. i. farie ordei:
pugillū. i. capitū viol. lēticulaꝝ aq̄: an̄. ʒ. ii. ſucci ēdiuie ōpu
rati. ℥. ii. ſumitatū ſgnā. ʒ. i. ace. ℥. i. olī ro. ℥. ii. aq̄ ro. al. lib. i.
Tepida fiāt: ꝛ itictis pecys ſucceſſiue applicēt̄ ſup ep ho
ra meridiana. ⁋ Aliō maran Ap. ℞. ſucci grana. muçoꝝ
aceti leuis: ꝛ aq̄ ro. an̄. li. ſ. iſūdāt̄ pecie: ꝛ ſupponāt̄. Jtē
aliō. ℞. ſucci ſola. vl' cucurbite: lib. ii. ace. ℥. iii. calefiāt ſua
uiter: ꝛ iſūdāt̄ pecie: ꝛ ſupponāt̄: valꝫ paupib⁹: gb⁹ ſucc⁹ ſo
la. vl' ēdiuie: vl' lactuce: vl' lac. acetoſe: ſeꝝ vl' ſuc. macia. cū
pauco aceto: vl' ſucc⁹ roſtri porcini: vl' ſucc⁹ lupuli: vl' plāta
gis: vl' ſpuiue cucur. cū pauco aceto idē opat̄. ⁋ Trociſci
hyp. ℞. ſe. citru. melōis: vtriuſqꝫ cucur. an̄. ʒ. i. ſe. lactuca.
ſcariolaꝝ: portul. papaueris al. ligr. an̄. ʒ. vii. ſpody: ſan. ru.
an̄. ʒ. i. ſpice: grana. v. ꝯfice cū mucila. pſily: ꝛ fiāt troci. ʒ. i.
dabis. i. cū aq̄ lactis capn̄i: vl' ſecaniabi māe ieiuno ſtō: vl'
cū aq̄ or. Sirup⁹ ex n̄ra iuētōe ꝯ oēs egritudi. ep̄is calās
valēs ēt potēter ad fe. oēs ꝛ ethicas audaciā fell': ꝛ cole ex
tiguit ꝛ releuat ifirmū ab ictericia ſi xp̄s voluerit. ℞. her.
floꝝ bora. cicoree: ſcariole: portulac. pſily ꝯq̄ſſati ī aq̄ fra
epice: an̄. ℥. i. plāta. pipinelle: ſpuiue: ſolatri: nenufa. an̄. m.
ſ. ſucci epice: ſucci cicoree: ſuc. ſcariole ſil. ꝛ domeſtice: ſuc.
ſpuiue: ſucci apy ꝯpuratorū: an̄. ℥. iii. ſpody: ſandali: ſeium
cōiuꝫ mūdatoꝝ: an̄. ʒ. iii. cāphore. ℥. i. ſ. aceti. ℥. iii. vio. ro.
an̄. ℥. ſ. lēticulaꝝ aq̄. ʒ. i. çucca. lib. ii. ſucci granatoꝝ. ℥. iii. ꝛ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0304-7
DFG

fiat ſirupus. doſis eſt. ℥. ij. in aurora cũ frigida ſi nõ ſit op
pilatio vel ſenectus febricitantibus ſolũ de mane: ſi ex pu
ra colera patiant̃ ꝛ modicũ ante acceſſionẽ febris. Si vo
lueris eam ꝓhibere vel abreuiare ꝛ in fine peroxiſmi po
tus. ℥. iij. cũ aqua frigida extinguit tertianã duplicẽ ꝛ cau
ſonẽ ſi xps ãnuat. Auer. dixit nenufar ꝛ ſirup⁹ ei⁹ ac vſus
eius ſ̃m oẽm adminiſtratõis moduꝫ eripit colẽricos a febre.
Alias queras infra de cura icteritie citrine.

¶ Capitulum tertium de paruitate epatis.

d E egritudinibus cõpõnalibus epis qd dici opor
teat ſiue in figura ſiue in q̃ntitate ſiue in ſuis ſiti
bus exiſtant ſupra de egritudĩe ſtõi in q̃ntitate ha
buiſti. illuc ergo recurre. Et ſcõꝫ modũ illũ hic cuꝫ ꝓprys
epati opare: q̃ ex dictis ꝛ dicẽdis intelligere te oportet.

¶ Capitulũ quartum de oppilatione epatis.

o Pillatio epatis eſt morbus in vys eius ꝓhibens
tranſituꝫ eius ex hũoꝛib⁹ bonis ꝛ ſupfluis qd per
ipm trãſire nãliter cõſueuit. Eſt aũt duplex. q̃daꝫ
in venis: ꝛ quedã ĩ poris eius. ꝛ vtraq; eſt duplex. Que. n.
in venis ẽ aut eſt in paruis aut ĩ magnis. In magnis vt q̃
accidit in porta ꝛ in ramis eius groſſis ꝛ eſt plimũ: ꝛ in kili
ꝛ eſt rara. In paruis v̓o vt in ramis eaꝝ ſubtilibus ꝛ ꝓpe
in capitibus ipſaꝝ ſibi iuicẽ occurrẽtib⁹ ꝛ ĩfra epar. ꝛ hoc
eſt freq̃ntius pp eaꝝ ſtricturã ꝛ lutuoſam ei⁹ ſubaꝫ nõ pp
mãe delictũ ſic̃ in ſplene ꝯuenit vt. G. diſtinxit. Et ſequit̃
plerũq; eã flux⁹ p̃mo vẽtris ꝛ poſtea epis. Que aũt ĩ poris
ꝯtingit duplex eſt: aut. n. eſt in poris excreatõis ſupfluita
tum ꝛ eſt plimũ ꝛ ſeq̃t̃ eaꝫ p̃mo citrina icteritia vel nigra
eriſipilla vel cãcer: aut eſt in poris ſubẽ ei⁹ per quos trãſit
de pte in ptẽ ipſi⁹ nutrimẽtũ ſanguis: ꝛ hoc eſt rari⁹. ꝛ ſeq̃t̃
eam groſſicies ſubẽ cũ duritie ꝛ extenuatio corporis toti⁹:
qd eſt cõe ſignũ oĩuꝫ. ꝛ põt eã q̃lꝫ egritudo alia ꝯcomitari
cũ oppilatio epis mater ſit egritudinuꝫ oĩum. Et vnaq̃q;
aut eſt antiq̃ta: aut noua aut ſimplex aut ꝯpoſita. ¶ Cã ꝛ
modus cãꝝ ei⁹ ſ̃m. G. eſt triplex. aut. n. eſt coartatoria cor
porea: puta hũoꝛ groſſus mult⁹ ꝛ viſcoſus coartat⁹ in eis: ꝛ
ei⁹ cã eſt malitia regiminis ꝛ debilitas digõnis tibi nota ſu
peri⁹: aut ĩcorpea puta res groſſe ſubẽ vt aq̃ turbida lacu
nalis ꝛ ſtagni ꝛ dulcis aſſũpta ꝛ kilus groſſus ꝛ viſcoſus ꝛ
eſt freq̃nti⁹ eueniẽs. Aut eſt attenuatoria q̃ ẽ duplex: iteri
oꝛ aut exterioꝛ. Interioꝛ ẽt eſt duplex: diſponẽs ꝛ pficiẽs
diſponẽs eſt: qꝛ ſit nãliter creatũ anguſtũ in exitibus ſuis
ex quo ſecuta eſt fortitudo attractiue ꝛ debilitas expulſi
ue. Et pficiẽs eſt ꝯpreſſio apatis adiacẽtis partib⁹: ꝛ mala
ꝯplexio ex re ſũpta male q̃litatis fre: aut aq̃ frigoris vehe
mẽtis. ꝛ ſicce põtice. ſeu ſtiptice aggregantis ptes viaꝝ vt
aq̃ alumioſe ſeu groſſe: ꝛ ꝓpe poſt exercitiũ ꝛ balneũ cal̓ꝫ
luti ſigillati armeni gipſi ꝛ alioꝝ ſiliũ q̃ in corrupto appe
titu aſſumi ꝯſueuerũt vt ſupra in egritudib⁹ ſtõi habuiſti.
Exterioꝛ eſt ꝯſtrictio vehemẽs caſus ꝛ pcuſſio ſupra ipꝫ ꝛ
eſt freq̃nter ꝯtigẽs. Aut cã eſt carnoſa: vt puſtule ĩ lateri
bus ꝛ pietibus viaꝝ ſeu bothoꝛ caro cicatricis addita ſeu
verruca nata: q̃ tñ nõ ẽ gñal̓ in oĩb⁹ vys: ſꝫ in aliq̃ poti⁹ cõ
tingẽs ꝛ raro. ¶ Signa oppilatõis epis in q̃ntũ h⁹ ſũt mu
tata q̃litas. puta quo ad viſũ coloꝛ citrin⁹ vel palid⁹ in to
to corpe diffuſus: qm̃ ſãguis cũ totalitate ſua pp ſtricturã
viaꝝ ad cutis ſupficiẽ nõ accedit. ſꝫ ſubtile ei⁹ poti⁹ aquo
ſitate vel col̓a mixtũ trahẽtib⁹ mẽbris exinanitis: vt do
nec ceſſet opilatio iuuat actio leſa. qꝛ grauitas ĩ hypocun
drio dextro circũſcripta vl̓r in toto: q̃ ſeq̃t̃ plectoriã tũ pp
mãm oppilãtẽ tũ pp ex oppilatõe retentã ꝛ ipedimẽtum
anhelit⁹ in motu ꝛ ꝓpe ĩ aſcenſu pp frenõ ĩferi⁹ tractionẽ
ꝛ ꝯpreſſionẽ vel lacertũ. Et lꝫ in his cõicet apati duro: tñ
hec in apate duro exiſtũt maioꝛa: ꝛ plimũ abſq; fe. qm̃ tal̓
oppilatio hũoꝛib⁹ retẽtis: ꝛ ſupfluitatib⁹ euentationẽ q̃ p
venaꝝ ꝛ arteriaꝝ oꝛificia poꝛis occurrẽtia fieri hꝫ nõ ve

tat exiens ẽt a corpore: qꝛ flux⁹ vẽtris ex mãe groſſe regur
gitatõe oppilatõe ſibi trãſitũ ꝓhibẽte ꝛ vrine mltitudo: ꝛ
ſubtilitas pp ſubtile aqueũ multiplicatũ ex idigõne pene
trãs ſi aliud. ſ. epis. ꝛ totius ariditas corpis nõ obſiſtat.
¶ Sꝫ ſignũ diſtinctiuũ iter oppilationẽ venaꝝ ꝛ poroꝝ
eius eſt: qꝛ oppilationẽ venaꝝ p̃dcã ſigna ſequunt̃ a p̃nci
pio: ꝛ corpis ꝯſumptio: ſꝫ in oppilatõe poroꝝ ei⁹ illa nõ ſũt
a p̃ncipio: imo multitudo ſanguis: q̃ ad nutrimẽtũ ei⁹ nõ
acceſſit appet in venis ſi oppilatio fuerit ĩ poris ſubẽ ei⁹: ꝛ
trãſitus nutrimẽti ꝛ coloꝛ rube⁹ in cute. ¶ Si v̓o fuerit ĩ
poris excreatõis ſupfluitatũ appebit in ſanguĩe multipli
catio colere ſeu mlĩe cũ colore citrino vel nigro in cute. et
hoc eſt ſignũ diſtictiuũ ĩter oppilationẽ poroꝝ. In ꝓceſſu
ãt debilitato epe nõ nutrito appet in venis ipſi⁹ diminutio:
ꝛ p ꝯñs ĩ toto corpe ꝯſũptio ꝛ ariditas: ꝛ ſi qdẽ nocumẽtũ
extẽdat̃ ad venas p̃dcã ſeq̃nt̃ ſigna. ¶ Signũ v̓o diſticti
uũ iter oppil̓õnẽ venaꝝ magnaꝝ ꝛ p̃uaꝝ ẽ: qꝛ p̃dcã ſigna ĩ
oppil̓onib⁹ magnaꝝ ſũt fortioꝛa: ĩ p̃uaꝝ v̓o debilioꝛa. Sꝫ
ſignũ diſtictiuũ iter oppil̓õnẽ vene porte ramoꝝ ei⁹ ꝛ ve
ne kil̓ eſt: qꝛ oppil̓õnẽ vene porte ſeq̃t̃ flux⁹ kiloſus niſi ſit
pp d̓bilitatẽ attractiue ipi⁹: x⁹ ſigna diſtictia ĩfra põem⁹ ki
lo nequeũte penetrare ad ep: ſiue pp oppil̓õnẽ aũtẽ meſe
raicaꝝ q̃ man⁹ epis ſũt qb⁹ trahit. Exiſte. n. oppilatione ĩ
porta ꝛ ramis ei⁹ vel meſeraicis tot⁹ chil⁹ nõ pt recipi nec
ꝯprehẽdi ĩ ea. et ramis ei⁹ vt v̓tute ſubẽ carnoſe epis ꝯuer
tat̃ in ſãguinẽ ꝛ hũoꝛes: q̃r redit ad ĩteſtia nulla alteratõe
appente ĩ eo ꝛ cito egredit̃: ſi oppil̓o p̃cedat in meſeraicis
vel pauca ꝛ tardi⁹ egredit̃: ſi oppilatio ſit ĩ porta ꝛ ramis
ei⁹ ꝛ ſenſus tact⁹ nec groſſiciẽ nec duriciẽ ꝯphẽdit ĩ hypo
cũdrio dextro. Oppil̓õnẽ ãt chil̓ ꝛ ramoꝝ ei⁹ ſeq̃t̃ fluxus
vẽtris ſãguis ꝛ hũoꝝ iã gñatoꝝ in epe ꝛ ei⁹ ſima nõ potẽ
tiũ penetrare ad mẽbra oppil̓õne chil̓ trãſitũ ꝓhibẽte ad
toti⁹ ambitũ ꝛ ꝓpe q̃ntũ ad ptẽ coꝝ groſſã: q̃r regurgitant
ad portã: ꝛ deiñ p meſeraicas ad ĩteſtia. Et vrĩe ſubtil̓ ml̓
titudo ꝛ tictura pp debilitatẽ digõnis mltiplicãtis aquoſi
tatẽ: ꝛ pp trãſitũ ſubtil̓ ptis ſanguis ꝛ aquoſitatis mẽbris
trahẽtib⁹ inanitis. Groſſicies quoq; ꝛ duricies hypocun
dry dextri ſenſui ẽ mãifeſta. Et ſi q̃ẽ ſit oppilatio ex cã
coartatoꝛia corporea ſũt ſigna plectorie p̃dcis gñalib⁹ ad
dita ſi mltitudo hũoꝝ fuerit ĩ cã. Uel ſigna cacochimie ſi
groſſicies ꝛ viſcoſitas ꝛ regimẽ p̃cedẽs cũ malitia digõnis
q̃ ſi mltiplicet vẽtoſitatẽ appebit groſſicies: ꝛ duricies au
geri ꝛ diminui ſubito vl̓ ĩ breui. ſi v̓o nõ pmãebit d̓ ſe ſemp
eq̃l̓ duricies ad qd iuuabit regimĩs variatio debiti ꝛ mix
tio hũoꝝ ĩ egõnib⁹ vel vria erit appens. ¶ Si v̓o ĩcorpo
rea ſit paſſũptio alic⁹ ex extriſecis reb⁹ p̃narratis ꝛ mẽo
ria ei⁹. Sꝫ ſi cã ei⁹ fuerit attenuatoꝛia ĩterioꝛ ꝛ diſponẽs
ſignũ ẽ diuturnitas paſſiõis a p̃ncipio gñatõis appens cũ
fortitudĩe retẽtiue ꝛ d̓bilitate v̓tutis epis: expulſiue. Sꝫ ſi
ſit pficiẽs ſigna erũt apatis epis q̃ dicunt̃ vl̓ paſſũptio ali
cui⁹ ex p̃narratis aggregãtib⁹ ꝛ cõſtrigẽtib⁹ mãs ei⁹. ſi v̓o
fuerit exterioꝛ ꝯpmẽs ẽ mãifeſta. ¶ Poro ſi cã ei⁹ fuerit
carnoſa: puta puſtula ſeu bothoꝛ. ſigna appebũt apatis et
bothoꝛ. Si ãt ſit carnis addite ſeu v̓ruce nate ſignũ ẽ ꝙ op
pilatio nõ ẽ vl̓is ĩ oĩb⁹ vys epis. ſꝫ ptial̓ ĩ aliq̃ ſui via vl̓ po
ro pp ꝙ oppil̓o nõ erit mlta ꝛ magna: ꝛ p ꝯñs ſigna oppi
latõis d̓bilia: ꝛ cũ hoc erit puitas iuuamẽti apitiuoꝝ appro
ximatoꝝ illi. ¶ Cura oppil̓o epis: q̃ cũ nãli diſpõne antiq̃
ta ẽ ꝛ ad ſcliroſim reducta curã nõ hꝫ: vl̓ difficilẽ maxie ſi
ꝯpoſita ẽ. Que v̓o accñtal̓ ꝛ ſimplex ꝛ noua ẽ curabil̓. In
qt. n. G. ꝙ nã eſt ipe maxie: ſi nec efficiẽs ꝛ ꝯſeruãs forte
exiſtat: q̃ accñtal̓ ẽ nec firmãtẽ cãm accepit curabil̓ ẽ. In
c⁹ cura duplex ẽ itẽtio gñal̓ ꝛ ſpãlis. Gñalis eſt tres res. p̃
ma eſt oppilatõis aptio. ꝯſiſtit ãt ĩ abſciſiõe cãe. ſic. n. fiẽs
ꝛ factũ in oppilatõe ſũt ſibi inuicẽ coherẽtes ꝙ ceſſãte cã
ſil̓ ceſſat fiens ꝛ factũ. ¶ Scõa eſt mẽbri ꝯfortatio ex eo

q̄ ꝑncipaliter eſt ex egritudine debilitatum. ¶ Tertia ē accidentium correctio quorūlibet paroxiſmaliter contingentiū i eo q̄ oppilatio mater eſt egritudinū oium: quapp̄ eſt diligenter ꝛ ſollicite medicāda. ¶ Spālis in ſpāli triū dictorum ↄſideratione ꝛ auxilioꝝ iuentione qbus ꝑdicte tres cōpleant̄ itentiones. Et pmo in abſciſiōe ſpālis cauſe ipſius. Si ergo ſpālis cā ipſius ſit coartatoria cura ſpālis eſt gnq̧ res. pma erit abſciſio cāe. Cōplet̄ aūt cū adminiſtratione euōnis ꝛ particularis cāe: ꝛ ꝓprie ſi fuerit in cā multitudo ꝑus cū flōmia de cōi ſi adſit repletio vl'is: dei de de baſilica ſi remaneat ꝑticularis: ꝛ ſi ꝑticularis ſola ō baſilica tātū vtute tolerāte: ꝛ etate ↄcedēte: vel cū ꝓportionali flōmie vt eſt emoroidas ꝑclauſas apire vel mulieribus p mr̄icez mēſtrua ꝓmouere vel qb⁹ nihil hoꝝ poſſe fuerit ſcarificare crura: qbus nō ↄueniētib⁹ ei eūo facienda erit cū exercitys tēperatis: nō tolerātib⁹ illa fricatōib⁹ euaporatōib⁹ farmacys. ꝛ ieiunys. ſic. n. voluit. H. hec eni eūant ꝛ deriuāt: vel cōplet̄ cū purgatōe ex farmacys proprys ꝑnarratis in canone curatōis ei⁹ ſ₃ modū vl'em: ſi i cā fuerit hūoris groſſicies ꝛ viſcoſitas qb⁹ ꝑmittēda ſunt farmaca ꝛ riptica: vt eſt oximel ſimplex vl' ſecaniabi ſimplex vel ↄpoſit⁹ cū radicib⁹ ꝛ ſeibus vel oximel ſqlliticū ꝛ alie aperitiue medicie ſimplices ꝛ ↄpoſite q̄ dicent̄ ifra xp̄i auxilio. ¶ Et eſt ſciēdū q̄ ſimpliciū q̄dā ſūt fr̄e: q̄dā calide: ꝛ alie ſūt equalitati vicine. Frigide ſūt ſic̄ endiuia ortulana ꝛ cāpeſtris ꝛ taraſacon: ꝛ aq̄ plātagis cū folys et radicib⁹ ſuis: ꝛ oīa ꝓuocātia cū ifrigidatōe: vt ſemia cōia. ꝛ aliq̄ ex appropriatis ꝛ ↄfortātib⁹ dictis ſupra: qb⁹ vtēdū eſt in oppilatiōe cū calitate. Cal'e vo ſunt diuretica fortia. vt aſſaꝝ caſſia petroſilinū ariſto. ro. ru. tinctoꝝ ireos fiſtici agaric⁹ epithimū ſqlla poliū ſpica cētaurea mior ꝛ ſucc⁹ eius ꝛ gētiana ſirup⁹ acetoſus fact⁹ cū rubea ꝛ melle: ꝛ ſirupus ſqllitic⁹ ꝛ ficus ſicce iſuſe in olō amigdalino ꝛ ſunt fortes in ꝓuocatōe mēſtruoꝝ ꝛ ſiles q̄ dicte ſūt in ꝓprys: qbus vti o₃ n fr̄is ꝛ ātiqs oppilatōib⁹. Equalitati aūt vicine ſūt lupuli ꝛ cuſcute ꝛ lacca ꝛ capil. ve. ſunt. n. ambo aperitiua valde cū eq̄litate ꝛ meliora in oppilatōe cū calitate vel frigiditate. ꝑpꝛyſſime āt ei ſūt reubar. abſinthiū ꝛ eupatoriū xime ſgnāti: amigdale amare ꝛ ſuccus feniculi hūidi ꝛ camepitheos ꝛ ꝓpe qñ oppilatio eſt i vys ſtrictis acetū ſqlliticū ſparagi radix lily: ꝛ ſil'es. ꝛ iſta potenter ſm̄ neceſſitatē i frigida cū vīo vel aq̄ ſe. calidoꝝ vel lupinorū ciceꝝ vel abſinthy. ꝛ ſiliū₃. Et ēt exteri⁹ ſ₃ oēm modū approximent̄ in cal'a oppilatōe cū aq̄ endiuie ꝛ cuſcute: l₃ cōueniat hoc vtriq̧ ꝛ ꝓpe cū oppilatio ē in felle. aperit. n. oppilationē epis ꝛ fell': vel coriādri vel ſeminū fr̄oꝝ cōiū₃ vl' ſine his: ꝛ ꝓprie ſi fr̄e nō ſufficiūt: nec curādū de iſlāmatione cū iuuamētū aptiōis īfrigidādo ꝑualeat nocumēto qd̄ effic̄ calor eaꝝ iflāmādo eo q̄ ad extiguēdū facil' eſt poſt apertionē. Et ex ↄpoſitis ſūt q̄ ex ꝑdictis ↄponūt̄ ſ₃ triplicem mōm dcīn: ꝛ i nr̄o antidotario dixim⁹ pl'a ex his ſcō₃ oē₃ ſpēm. ſ. ſirupos trociſcos decoctiōes iuleb electuariorū pill'aꝝ cerotoꝝ emploꝝ ꝛ oloꝝ: qb⁹ ēt vti o₃ ſm̄ neceſſitatem ꝑdictā. ꝛ alie ſunt q̄ ifra xp̄o duce dicent̄. ¶ Scd̄a res ſpālis i cura eſt mēbri ↄfortatio. ↄplet̄ āt cū exhibitōe aliquoꝝ ↄfortātiū ꝑdictoꝝ ſupra: debēt ergo ꝓpitiua aut ex ꝑdictis eſſe ↄfortātib⁹ ſūpta: aut alicui ex eis admixta: ꝛ ꝓpe eſt athanaſia ꝑꝑ illud qd̄ recipit ab epate adib.

¶ Tertia res eſt ſit⁹ ſeu ꝑtis oppilate ↄſideratio: aut. n. ē oppilatio in ſima: ꝛ tūc aperiētia o₃ eē min⁹ fortia abſterſiua ꝛ vētris ſolutiua ſimplicia: q̄ ſuperi⁹ nota ſūt. Et ↄpoſita vt ierapigra ieralogodion teodoricon. ꝛ ſilia. Aut eſt in gibbo ꝛ vys nutrimēti: ꝛ tūc debēt eē fortia: ꝛ vrine ꝓuocatiua q̄ ſupi⁹ dcā ſūt qb⁹ paꝝ ſeis rafani: vel radicis ē admiſcendū: qd̄ dictoꝝ apientiū vtutē trahētib⁹ ad ſtōm ꝓhibeat̄ velox ei⁹ trāſitus ad vrialia mēbra: ſicq̧ diu i medio remaneat: qd̄ eſt epar. ¶ Quarta res pōit ſtudiū i vita cū ordinatiōe regimis in oib⁹ ſex reb⁹ nō nālib⁹: viuat ergo in aere ſubtili ſicco ꝛ tēperato iter actiuas. Exercitetur tꝑate nō dormiat in die. vtat̄ dieta cibi ꝛ pot⁹ extenuatiua. Eſt āt ſm̄. H. leguminū aptiſſima ptiſana. oleꝝ vo lactuca. piſciū vero petrini. panis clibanacei ꝛ fermentati ꝛ puri moderate. auiū mōtāe. potuū: oximel mellicratū. vinū ſubtile albū. ſil'r vo dōm q̄cūq̧ euchima eſt purgatiua. i. abſterſiua nō viſcoſa nec groſſa ꝛ hūoris vretica. i. gratiua. vitet repl'ōnē. tēperatis: ꝛ opportunis vtat̄ euōnib⁹ ꝛ gaudio tēperato: ꝛ breuiter oib⁹ operātib⁹ ad digōnis ꝑfectionem. ¶ Quinta res corrigit accidentia ꝓpria: vt ē fluxus vētris epicus icttericia arefactio ꝛ alia de qb⁹ dicet̄.

¶ Si vo cā ſpālis ſit cā attenuatoria ꝛ ꝓprie ꝛ ꝑticul' ſit interior. ſ. apatis adiacētis ꝑtis cura eſt cura apatis illi⁹ de qua ifra dicet̄. Si aūt ſit exterior cura eſt due res. ſ. amotio cāe exterioris illius ꝛ vſus aperitiuoꝝ tēperate calitatis ꝛ hūiditatis alterantiū malā ↄpl'ōnē ipreſſa₃: q̄ ex ꝑdictis ſimplicibus eligas: vel ex eis cōmiſceas ex qb⁹ eſt lac camelaꝝ fetaꝝ paſtaꝝ feniculo apio ordeo boragine. ꝛ ſimilib⁹ ꝛ ſeꝝ lactis caprini cū decoctōe abſinthy: ꝛ eupatory: ꝛ vinū ꝑdictū aq̄ ciceꝝ ꝛ decoctio radicū cōiū₃ cū floribus boragis ꝛ bugloſſe lupuli cuſcute: ꝛ fiſtici. Et ſil'r regimen in oib⁹ ad calitatē: ꝛ hūiditatē tēperatam declinet.

¶ S₃ ſi qdem cā ſpālis ſit carnoſa ꝛ ꝓprie puſtula ſeu bothor in laterib⁹ viarum. Cura eſt reſolō vel ei⁹ ſaniatio ꝛ eruptio. Jngt. n. Hyppo. Quib⁹ in vrinali via puſtule naſcunt̄ ſanie facta ꝛ erupta ſolutio: ſil'r in ꝓpoſito. qbus aūt hec cōpleant̄ in cura apatis dicet̄. Si vero fuerit carnoſa ꝛ neruoſa icurabilis eſt vt dicit Abo. tentandū aūt ē cā extenuare: qd̄ ſiccantib⁹ ſubtiliantibus ꝛ abſtergētibus: ꝛ reſoluentibus ſit aperitiuis q̄ ex ꝑdictis enumeratis eligere oportet: vel ex illis cōponere vel mollificatiuis ex balneis calidis cerotis ꝛ emplaſtris lenientibus quoquo mōmām habilitātibus: ꝛ membrum diſponētibus dilatatiōi per quā materia tranſire conſueta virtute impellente valeat penetrare vt infra in cura ſtrāguirie dicet̄ duce xp̄o.

¶ Solutiuū bonū fily Serapiōis ad oppilationem epatis ex groſſis ꝛ viſcoſis humoribus. ℞ecipe ierepigre ſimplicis. ℥. i. agarici puluericati. ʒ. i. da cū aqua polipody abſinthy apy: aniſi aſſari. ꝛ maſticis. añ. ʒ. i. ¶ Aliud medicamen factū cum camepitheos ꝛ ſpica romana ad ide₃ et maxime quādo oppilatio eſt in venis: ꝛ poris ſtrictis. ℞ecipe ſpice romane partes tres abſinthy partem vnā. camepitheos: partes duas. Terant̄ cribellent̄: ꝛ conficiant̄ cū melle diſpumato ꝛ adminiſtrent̄. ¶ Sirupus vrſonis cōtra oppilationem epatis ꝛ ſplenis bonam digeſtionē operatur diſſoluit ventoſitatem colorē reparat: renes: ꝛ veſicam aperiendo mūdificat. ℞ecipe maſticis cinamōi garcroci: nucis muſ. cincib. galange. añ. ʒ. i. aniſi apy carui: feniculi petroſilini capparis. añ. ʒ. iy. ſaxifragie ſticados foliculoꝝ ſene thimi epithimi. añ. ʒ. iiy. cuccari qd̄ ſufficit.

¶ Syrup⁹ exꝑt⁹ ad oppilatōes epis ſplēis ꝛ mr̄icis i muliere q̄ nō h₃ mēſtrua ꝓuocat ꝑcedēte flōmia ſaphenaꝝ. ℞. eupatory lupuli epatice: ſcolopēdrie cū radice. añ. M. i. calamēti fluuial: ꝛ cāpeſtris rubee tictoꝝ maioris ꝛ minoris: pulegy. añ. M. i. corticū ſumitatū tamariſci. ℥. i. corticū radicū cappis ꝛ ſalicis. añ. ℥. i. gnq̧ radicū cōiū₃. añ. ℥. i. lacce lote. ℥. ſ. ſeis bruſci: ſparagi. añ. ℥. i. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ℥. i. ariſto. lon. ꝛ rotunde. rubee tinctorū. abſinthy: ſeminis apy: aniſi feniculi: ameos: nigelle: dauci: acori. añ. ʒ. iy. cicoree. M. i. ſeminum communium. ℥. y. cuccari lib. iy. ſucci lupuli depurati: apy: feniculi: endiuie depuratorum. ana libra. ſ. Radices vero ſtent in aceto per diem et noctem: deinde purgetur cum pillulis infraſcriptis.

¶ Pillule reubarbarate experte ad oēm oppilationē vi

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0306-9

ſcerum antiquã caput ſtõm articulos viſcera: ⁊ cutẽ mundificant ⁊ pectus. idropiſim curãt: aſclitem ⁊ iposarcã qrtanam ⁊ ictericiã. ℞. ſucci abſinthij: ſucci eupatorij cuſcute: ſemis fumi terre: epithimi: foliculoꝝ ſene. añ. ʒ. ſ. agarici reubarbari: ierepigre laxatiue. añ. ʒ. ij. folioꝝ: roſaꝝ capitu: violaꝝ: ſemis portulace. añ. ʒ. ſ. ſpice: ligni aloes: ſqnãtiçinçi. gar. aniſi: ſemis apij. añ. ℈. i. pulpe collogntide: ſerapini armoniaci: lacce lote oppoponaci lapidis laçuli loti pluribus vicib⁹ cũ ſucco bugloſſe folioꝝ meçereõ repſoꝝum in aceto: ſalis gẽme: poly. añ. ʒ. ij. turbit pulpe mirobã. citrini. añ. ʒ. ij. diſſoluant̃ gũmi in vino odorifero: ⁊ cũ ſucco fumi terre vl' endiuie: ĩformenť pillule. doſis ẽ. ʒ. ij. ¶ Decoctio ꝯferens ad oppilationez epatis: ⁊ ſplenis. ℞. ſqlle: capil. ve. amigdalaꝝ amaraꝝ fenugreci extremitatum abſinthij. añ. partes equales: ſcis rafani. ʒ. i. decoq̃nť ⁊ ſumať decoctio eoꝝ cũ melle. Et eſt valẽs ad eam: q̃ eſt longi tẽporis. ¶ Cõfectio valens ad oppilationẽ epatis: q̃ eſt ꝓpinq tẽporis. ℞. pipis. ʒ. i. ſ. ſpice arõatice: carinet. vi. fenugreci: coſti: aſſari. añ. carinet. vi. mellis lib. i. ſ. Cõfice cum eo. Et ſit doſis coclear vnum cũ aliqbus ſirupis conuenientibus ad hanc cãm: vt ſirupus acetoſus de çuccaro cũ ſemibus. ⁊ fortioꝛ illo eſt mellin⁹ cũ ſemibus ⁊ ſqllitic⁹: ⁊ aqua mellis in qua fortiter decocte ſint ſpẽs aromatice: in qbus eſt ſtipticitas ⁊ decoctio lupinoꝝ. amaroꝝ in qua poſitus eſt ſuccus eupatorij. Et ex aperientibus ẽt oppilationem ſunt trociſci de lacca de abſinthio: de eupatorio: d ſcolopendria ⁊ aniſo. ¶ Solutiua ãt cõuenientia ad hoc caplm vbi oꝫ vt ſolo vẽtris fiat nõ oꝫ vt adminiſtrenť fortia niſi cũ vehemẽs fuerit neceſſitas: vt qꝛ ſit antiquata ⁊ idurata parũper: qm mã q̃ eſt in eo eſt proxima medicie. ⁊ qm membꝛũ cum v̾tuoſum ſit ſufficit qõlibet adiutoriũ ad expellendũ ipam. Et medicine bone ad hãc rẽ ſũt ierapigra pollipodiũ agaricum abſinthiũ turbit ⁊ poliũ. Et deť in potu de ierapigra forti vſq3 ad aureũ. i. ſ. ⁊ de debili vſq3 ad aur. ij. ¶ Et pillule ſtomatice ⁊ de ſerapino ⁊ ea q̃ ſunt ſicut theodoꝛicon ⁊ ieralogodion. Jngt enim ꝑnceps Abo. deide facta ſolõne cũ ꝑdictis neceſſe eſt vt des diacurcuma dialaca omoꝛoſia3 ⁊ athanaſiã. ⁊ ſilia. ¶ Ex his q̃ exterius approximanť ſunt empľa ex qbus eſt emplz factum ex polio ⁊ farina lupinoꝝ: ⁊ ſemibus diureticis ꝯfectis cum melle ⁊ aceto. ¶ Jtẽ emplm factũ ex fenugreco armoniaco abſinthio ameos maſt. croco oleo de neridem ⁊ cera. ¶ Jtẽ ex ꝑdictis cataplaſma facere poteris. Et ex ſuccis ⁊ aquis eoꝝ epithimata ⁊ ĩfuſiones q̃ celerius penetrabunt. ¶ Medicamẽ factũ cũ ſpica romana eſt valde iuuatiuu3 ſcõm ſerapionẽ. ℞. ſpice romane ptes. ij. abſinthij partez vnã. teranť ⁊ cribellenť ⁊ conficianť cũ melle diſpumato: ⁊ adminiſtreť. ſpice eni virtus eſt fortis in huiuſmodi egritudĩbus: ĩmo poſſibile eſt vt cureť cu3 eo epar qd infrigidatum eſt ⁊ induratũ ⁊ nõ eſt iuuamentũ trociſcoꝝ dictoꝝ in hoc parum. ¶ Medicamẽ laudabile ⁊ expertũ ex inuentione noſtra. ℞. carnes ſerpẽtis albi nõ antiquati nec mõtani abſciſis mẽſura digitoꝛu3. vij. a capite ⁊ cauda. ẽt moꝛiatur ⁊ bulliat in aqua. ⁊ ꝑma aqua ꝓyciatur: deide bulliat cũ ciceríb⁹ ⁊ floꝛib⁹ roꝛiſmarini: ⁊ paru3 croci ⁊ diptami ⁊ bibať aqua. Mire valet ad oppilationẽ eius. Carnes ẽt eius coꝛrigũt qõlibet qd coꝛrigibile eſt. Et valet diuturnis eius egritudib⁹ quaꝝ mater fuit colera: ⁊ maxime aduſta. ⁊ humoꝝ oĩum aduſtionẽ aut ſãguinis ĩfectionẽ coꝛrigũt. ⁊ eſt ꝓpꝛia medicina leꝓſis ⁊ ethicis ꝓpꝛie cũ lacte ⁊ ictericis ⁊ ſupcalefactis in epe ⁊ felle. ¶ Dixit Agaç experimẽtatoꝛ magn⁹ de athenaꝝ ciuitate. Lacca remouet oẽs epis oppilatõeš ⁊ affert iuuamentum magnũ idropicis ex calã cã. Dixit grec⁹ fu. meu. ⁊ lacca ſubtiliſſime puluericata cũ decoctõe yſopi: ⁊ ſaturegie eſt magni iuuamenti. doſis eſt. ʒ. ij. ¶ Sirupus hyp. vlis epi ĩflãmato ⁊ poſſeſſoꝛi oppilationũ venaꝝ. ℞. folioꝝ tamariſci berberis. añ. ʒ. ij. endiuie epatice ſcolopẽdrie apij: lupuloꝝ. añ. ʒ. i. miraſolis. M. i. ſandali albi. ⁊ rubei. añ. ʒ. ij. çuccari lib. ij. doſis. ʒ. ij. da ieiuno ſtõ cu3 tepida vel frã nõ veri frigoꝛis. ¶ Dixit Ameni⁹ d ſimplicib⁹ aq̃ decoctionis exterioꝛis coꝛticis fiſticoꝛu3 data mundificat canales epis: ⁊ maxie cõfoꝛtat ſtõm. ¶ Pillule hyp. ꝯ oppilatõe3 epis: ⁊ egritudies iueteratas. ℞. agarici. ʒ. ij. ſcoꝛie. ʒ. i. aloes optimi: ⁊ loti. ʒ. iij. lacce floꝝ tamariſci. añ. ʒ. i. maſt. çiçi. añ. ʒ. i. reubar. ſpice. añ. ʒ. iij. cõfice cũ ſucco fumi terre. doſis eſt a. ʒ. ij. vſq3 ad. iij. Lotura v̾o aloes cũ aq̃ decoctiõis ſpẽrum elefangie boni odoꝛis eſt faciẽda. rectificat. n. aloem ⁊ bonificat opationẽ eius. Sũt. n. ex his q̃ ꝯfectionez ierepigre ĩgrediunť: q̃ illud hñt opari ꝓut docuit. H. ſeptimo terapẽtice ⁊ abo. qnto canone aſſignauit cãm.

¶ Capi. v. de ꝑcuſſiõe caſu ⁊ obuiatõe ſup epar ⁊ cura ei⁹.

Percuſſio caſus ⁊ obuiatio rei dure ſup epar nõ eſt egritudo: ſ3 ei⁹ egritudinum exterioꝛ cã: puta ſolonis ⁊ apatis plurimũ ⁊ aliaꝝ puta cõplonis ⁊ ꝯpoſitiõis ⁊ eſt manifeſta. ¶ Curã ei⁹ in cura egritudinũ epatis quaꝝ cã eſt ꝑmitiua ⁊ exterioꝛ iuenies: ſ3 quid ⁊ qbus ꝯſiſtit ex his q̃ dcã ſũt ſupꝛa in paſſiõe ſtõi diſces. Jlluc ergo recurre: ⁊ illas itentiones ⁊ res hic ꝓſequaris cum epi appꝛopꝛiatis: quoꝝ aliq̃ ex narratis hic ⁊ ibi ſũt cõia q̃ exte videas. ⁊ ex appꝛopꝛiatis in hoc loco ſunt ſimplicia ⁊ cõpoſita. Simplicia q̃dam ſũt frã ſtiptica repcuſſiua hũoꝛũ fluentiũ ex qbus timeť apa: ⁊ retinẽtia ſeu ꝓhibentia fluxum ſanguĩs q timeť: vt ſũt ſpodiũ coꝛallus ſandal: ⁊ ſpẽs nõ aromatice cãphoꝛa terra ſigil. lutũ armenũ lutũ ſeniũ ⁊ alie ſpẽs luti ematites marcaſita. ſanguis dracõis herba ⁊ ſuccus coꝛigiole ſucc⁹ ꝯſolide vtriuſq3 ligna ceruina: cauda eqna citonium mirta roſa. neſpula ſoꝛba albumẽ ouoru3 gũmi dragagãtũ: ⁊ gũmi arabicũ cũ farina ſiligis panicij ⁊ milij riçi: ⁊ oꝛdei mirabo. çarur acatia ipoq̃ſtidos ⁊ acetũ pue acredis ⁊ agreſta ⁊ alia q̃ ĩ cura flux⁹ dicenť q b⁹ oꝫ in ꝑncipio. Quedã ſũt ſtiptica tpata vel paꝝ calida vt karabe lacca alumẽ: maſtix thus ⁊ coꝛtex ei⁹ cipſſus et nux ei⁹ ⁊ ſuba reubarbari: qb⁹ vtaris ꝑpceſſu cũ repcutere ⁊ retinere volueris ⁊ reſoluere. Et ex ꝓpꝛijs ĩ hoc cãu ẽ plãtago coꝛiãdrũ extra appꝛoximatũ ⁊ mũia rubea ⁊ vinũ nigrũ ſtipticũ vt calabꝛẽſe. Et q̃dã ſũt doloꝛẽ mitigãtia vt ẽ abſinthiũ. ⁊ ꝓpe cũ oleo de alcãna ſcõ ceroto lacca. acorus ⁊ ſilia q̃ in cura doloꝛis ei⁹ dicenť ſi ſãcti ſpũs grã nobis adſit. Et q̃dã ſũt calã reſolutiua pauce ſtipticitatis q bus vtẽdũ eſt ĩ fine cũ reſolõnẽ mãe itendis: vt ẽ croc⁹ ſãſucus: eupatoꝛiu3. abſinthiũ: ſpica: flos ſqnãti: arſenicũ citrinũ in pua q̃titate: qm eſt mirabil' v̾tutis in repercuſſione ⁊ reſolõne ſanguis: apium: calamẽtũ: ⁊ calam⁹ aromaticus: yſopus ſicca: ciminũ: ⁊ huiuſmõi q̃ iterius ⁊ exteri⁹ ꝑ oẽm modũ appꝛoximabis. ¶ Et ex ꝯpoſitis ẽ medicamẽ ꝯferẽs ad illõ in ꝑncipio cũ ẽ calitas: ⁊ iflãmatio: ⁊ timeť currere curſus ſanguĩs. ℞. ſube reubarbari balauſtiarum ſanguis draconis: alumĩs iameni. añ. ptes eq̃les. puluericã. Et doſis ei⁹ ſit aur. i. cũ çuccaro ro. antiq̃to ⁊ ꝓpe ex roſis albis cũ aq̃ citonioꝝ. Et ex vltimis in hoc caſu ſũt trociſci nr̃i quos in antidotario nr̃o dixim⁹ de terra ſigillata. ¶ Aliud medicamẽ qñ fuerit illic calitas plurima ⁊ volueris repcutere reſoluere ⁊ ꝯfoꝛtare. ℞. karabe. ʒ. x. roſarum rubearum. ʒ. v. acatie. ʒ. iiij. ſpice inde: croci: amboꝝ. añ. ʒ. vi. maſt. coꝛticũ cappis. añ. ʒ. iiij. luti armeni. ʒ. vij. nucũ ciꝑeſſi. ʒ. viij. Cõficiãť cũ aq̃ arnogloſſe. ⁊ fiãt ide tro. vſq3 ad aur. i. Et ex vltimis ĩ hoc cãu ſũt tro. de karabe: quos ĩ ãtidotario nr̃o dixim⁹. ¶ Aliõ medicamen ad idẽ. ℞. aq̃ neridẽ. ʒ. x. lacce ablute. ʒ. vij. reudeſeni. ʒ. iiij. cro. ʒ. iij. ⁊ ſ. baſſe. ʒ. iiij. ciceꝝ nigroꝝ. ʒ. vij. luti armeni. ʒ. x. Cõficianť cum olõ de lilio ĩ quo diſſoluta ſit mumia. Et fiant ex eis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0307-5
DFG

trociſci.ʒ.i.doſis ſit.i.ij.iij.cum aqua ro.⁊ ſirupo mirtino. Et ex expertis eſt raued ſeni lutum ſigillatū ⁊ grana mirti.añ.ʒ.i.pulueriçati ⁊ ſumpta cū ſucco caude equine ligue ceruine vel ꝯſolide. ¶ Aliud medicamē quo vtendū eſt ī fine cū ſanguinē mortuū ⁊ cōgelatū reſoluere ītendis. ℞. reudeſeni lacce çinçi.añ.ʒ.5.fiāt ex eis trociſci.ʒ.i. cū vino ꝑdicto:⁊ adde paꝝ arſenici citrini.⁊ da cū vino vnum. ¶ Itez linimētū ad hoc. ℞.xilo aloes:croci:⁊ fac lauari:⁊ bdelij:⁊ calami:aromatici:maſt.añ.ʒ.ij.mumie.ʒ.iij. Cōfice cū oleo çaraki:⁊ almeiſus ⁊ cera ⁊ ſupponat̄. ¶ Itē aliud ex ſola mumia cū iſto oleo ⁊ non eſt ei ſil'e. ¶ Emplm̄ cōferens ei qḋ ex ꝑcuſſione incipit apoſtemari ⁊ indurari eſt emplaſtrum roſaceum cum ſcebzan.

¶ Caplm̄.vi. de ſciſſura ⁊ īciſione epis ⁊ cura eius.

Ciſſura ſeu īciſio accn̄s ī epate ē reſol'o ꝯtinui ī eo
s eueniēs aut in pāniculo ei⁹ tātū:aut in ſuba eius:⁊
hoc aut eſt in carne pēnulis ⁊ venis ei⁹ ſubtilibus diſſeminatis in eis:aut ī ꝓfunda ei⁹ ſuba:⁊ eſt ꝑueniēs ad magnas venas:⁊ vbicūq; ſit aut eſt ſimplex:aut cōpoſita. Et cā eſt duplex.īterior ⁊ exterior. īterior eſt multitudo ⁊ acuitas ſanguis:⁊ eſt īcipiēs a venis:⁊ ꝓcedit ad carnē vt apa:⁊ ꝓprie dubelatū ⁊ vlceratiuū ⁊ eſt īcipiēs econuerſo .ſ.a ſuba carnoſa ⁊ ꝓcedit ad venas. Exterior eſt ꝑcuſſio enſis vel gladij:⁊ ſil'ia. ¶ Signa.nā ſi qdez ſit in pāniculo eius tm̄ dolor ⁊ pūctio in hypocundrio dextro ſentit̄:⁊ qḋ currit ex eo deſcēdit ī vētrē.⁊ tūc grauitas ſupra pectinez ꝑcipiet̄ ex illi⁹ aggregatiōe ibidē cū tumore ſi fuerit multū. ¶ Qȝ ſi ſit in ſuba ⁊ venis ei⁹ ſigna erūt dolor grauatiu⁹ in hypocūdrio dextro ⁊ flux⁹ ſanguis ꝑ vrinā ſi ſit in ꝑte gibboſa vel per ſeceſſū ſi fuerit in ꝯcaua ꝑte:⁊ ſi fuerit in ꝑuis ꝑuus erit.⁊ ſi in magnis magn⁹ erit fluxus: nec aliqd deſcēdet ex eo in vētrē:⁊ ꝓprie cū fuerit extrinſeca: nec tāgat pāniculū ⁊ eſt paledo coloris ⁊ defectio nāliū v̇tutū oīm ⁊ in ſtō ⁊ toto corpore. Et ſi qdem a cā iteriori ꝑuta multitudīe ſanguis fuerit ſigna apparebūt plectorie ꝑuia. Si v̇o eius acuitas ſigna cachochimie cal'e q̄ ſunt nota. Si vero apa ſigna ꝓcedentis apatis illi⁹ dubelati ⁊ aperti ſeu vlcerati q̄ꝫ īfra dicent̄. Si v̇o fuerit a cā exteriori ſigna ex ꝑceſſiōe ei⁹ manifeſta. ¶ Curā ei⁹ dupl'r ꝯſiderabis gn̄aliter:⁊ ſpāliter. General'r aūt ex cura ſol'onis ſtōi dicta ſupius cōprehēdes. Cōſiſtebat.n. in q̄tuor reb⁹ q̄s te oꝫ hic ſil'r ꝓſeq; ⁊ cōplere cū adminiſtratōe medicinarū appropriataꝝ epi:ex qbus ſūt ſtiptica ⁊ ꝯglutinatiua q̄ ſint lēptomeris ſube vel aliquibus aperitiuis ⁊ diureticis admixta ⁊ ꝓprie ſi īciſio ſit in gibbo:ſic.n.in cura oppilationū ei⁹ aperitiuis ⁊ diureticis ⁊ ꝓp̄e fortib⁹ oꝫ admiſceri aliqḋ detentiuū qḋ retrahēdo ipſa ad ſtōm ꝓhibeat eorum velocem penetrationē ad vrinalia mēbra ita in cura ſol'onis continui ipſius ſtipticis ⁊ conglutinātib⁹ oꝫ admiſceri q̄ eoꝝ virtutem difficilē pertranſibilem ad ipm̄ epar adiuuent penetrare. Talia āt ſtiptica ꝯglutinātia tā ſimplicia q̄ꝫ compoſita ex his q̄ dicta ſunt ſupra in cura ſol'onis ſtomaci ⁊ fluxus ſanguinis narium atq; ſputi:⁊ ex his que in cura flux⁹ epatis dicent̄:eligere poteris:⁊ ſil'r coadiuuantia ꝑtranſire ex cura oppilatiōis iam dicta. ¶ Specialiter aūt cōſiderabis:nā ſi ſit in pāniculo eius tantū ⁊ ſimplex cū predictis ſtipticis ⁊ cōglutinātib⁹ curabis interius approximatis:⁊ exterius magis. Si vero ſit in ſuba penulis ⁊ venis paruis ⁊ ſimplex curabis cū ꝑdictis exterius approximatis ⁊ iterius magis. Si vero ſit cum diminutione partis magne vel penule maxime:⁊ ꝓprie cum cibis multū ſanguinē generātibus q̄ partem ſanguineā habeant generare:lꝫ ſpermaticā ſemper regenerare nō poſſint:nec omnem niſi capita paruarū venarum tantū ⁊ in circumſtantijs calidis ⁊ humidis. Et ſi cum vlcere cōpoſita eſt mundificabis ꝑus:deide conſolidabis. Si expletoria euacuabis.ſi ex cacochimia expurgabis. Si ex apoſtemate dubelato ⁊ vlcerato cura eſt cura illi⁹: q̄ īfra xpo duce dicet̄. Qȝ ſi īciſio peruenerit ad magnas venas eſt īcurabilis ⁊ ꝓprie ſi cum deperditiōe ſube fuerit. Ingt.n. hyppo. veſicam inciſam:aut epar mortale eſt. Ait eniz.G. verum eſt cum īciſio ad cōcauam veniat venāz.⁊ q̄ꝛ inde multus ſanguis fluxus ꝑuenit:⁊ q̄ꝛ nō pōt apponi medicina:q̄re infirm⁹ morit̄ anteq̄ꝫ ꝯſolidatio fiat. Trociſci de reudeſeni cōferentes ad grauitatē in epate ⁊ ſplene:⁊ apoſtemata in eis:⁊ percuſſionē cadentem in epate. ℞. reudeſeni.ʒ.viij.rube lacce. añ.ʒ.iiij. ſeminis apij:ſucci eupatorij.aniſi.añ.ʒ.iij.terant̄ ⁊ cribellent̄: ⁊ fiant trociſci.ʒ.i. et det̄.i.cū eo qḋ conuenit materie.ſunt enim efficaciſſimi. dixit filius ſerapionis. Et ex expertis eſt medicamē ſcḋm inuentionem noſtrā qḋ diximus in antidotario.caplo de reubarbaro ⁊ reupontico.eſt ꝓprium cū ſucco caude equine pulueriçate ſumptum.

¶ Caplm̄.vij.de apoſtemate epis ⁊ cura eius.

Poſtema epatis eſt tumor ꝑter naturam eueniēs
a ei:aut in velamīe eius aut ī ſubſtātia: ⁊ hoc aut in
parte gibboſa aut in concaua aut in aliqua pēnularum ſuaꝝ aut in toto:⁊ illud eſt rarum ⁊ mortale plurimum. Cauſa aūt eius omnis ex cauſis apoſtematū īfra ſectione ſecunda numeratis vbi de cura apoſtematum ſcḋm vniuerſalez modum locuti erimus duce ſacro flamine erit manifeſta. Et ex cauſis materialibus ei⁹: qḋ in velamine ꝓuenit plurimū eſt aquoſa vel ventoſa ꝑut anathomia declarat. Et q̄ꝛ inuentio eius in animalibus degētibus in locis aquoſis ⁊ paludoſis eſt magna:cui⁹ cauſa ē vapor ex eius digōnis malitia reſultans petens circunferentias: ſed ꝓpter denſitatem velamis nō reſoluit̄. Sed eius qḋ in ſubſtantia euenit plurimū eſt humoroſa ſāguinea vel colerica:raro flegmatica vel melica:nō vētoſa:cū ſit ventoſitas in ramos ⁊ venas expāſibilis nō colligibil' in vnū cipum:imo in eis retenta ꝓpter oppilationē: vel vſq; ad velamē expulſa coadiuuāte caliditate ⁊ raritate ſube membri ibidē ꝓpter ſoliditatem velamis congregatur. Et ſcḋm diuerſitatem cārum ipſarum materialiū diuerſe erunt ſpēs apoſtematis ei⁹:q̄ꝛ calidū ⁊ frigidū.⁊ calidum plurimū ſanguineum.⁊ frigidū fl'cū.melançolicū: ⁊ aquoſum. Et ex cauſis effectiuis eius plurimum eſt oppilatio:ꝓhibet.n.nutrimentū in ipſius ſubſtātiā diffundi ⁊ ſuperfluitates ex eo expelli:imo eas quas conſueuit interdum recipere ab omnibus mēbris ad inteſtina: ⁊ ſtomacum nō tranſmittit vt Galie.dixit cum ait. Egeſtio autez egrediens a natura fortaſſe ſignificat q̄ membra que ſunt in ventre ſunt tantum īfirma:⁊ fortaſſe ſignificat q̄ effunditur ad hec membra q̄ ſunt ſuper ea humiditas.qḋ eſt:q̄ꝛ ſtomacus continuat̄ omnibus membris mediante epate:⁊ recipit ſuperfluitates omnium membrorum mediante ipſo. Et fortaſſe quod effunditur ad ipſum expellitur a natura cum vult mundificare totum corpus: aut aliquod ex membris eius:aut duo membra:aut multa:et multotiens eſt illud ſecundum viam accidentis:quare remanentes in eo neceſſarium eſt venas eius replere magnas ⁊ paruas vſq; ad minimas ⁊ ex eis preter naturaꝫ effundi aliquid reſudans in vacuas regiones ſubſtantie ei⁹ etiam chilus:vel nutrimentum ſi qḋ diffunditur ipuimēdo vel ꝓpter malam complexionez:nec conuertitur:nec expellitur:quare ſuperfluens neceſſe eſt ipſū aggregari: ⁊ vtroq; modo neceſſariū eſt ipſum oppilari:ac etiā apoſtemari:nec etiam inconueniens cū chilus ſimilis ſit flegmati:vt dixit Abo.vel in ipm̄ ꝯuertat̄ ſi per idigōnē nō in ſanguinē ⁊ humores alios cōuertat̄:lꝫ illud ſit raro. Sed ipſius ꝑterea apoſtema conuenit terminari vel ad bonū: q̄ꝛ ad reſolutionem ⁊ euacuationē per fluxum ſanguinis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0308-1
DFG

narium vrinam ⁊ ſudorem ſi fuerit in gibbo: vel vomitū
fluxum ⁊ ſudorem ſi fuerit in ſima. vel ſaniationē vel per
mutationē ad min⁹ periculoſuꝫ mēbrū: puta renes īteſti
na vel ſplenē. aut ad malū: qꝛ ad ſuffocationē ⁊ permuta/
tionem ad nobilius mēbꝛum. puta coꝛ ⁊ cerebrū putrefa/
ctionem vel ſcliroſim: ⁊ qñqꝫ ꝑducit ad idropē. ¶ Signa
apatis eius q̄dā ſunt cōmunia: ⁊ quedā ꝓpria. Cōia ſunt ī/
uentio doloris ⁊ grauedīs in hypocūdrio dextro maioris
q̄ſ ſint in oppilatiōe īſeparabilis ēt abſqꝫ vehemētia hanc
landi iuente: ⁊ cū extenſiōe vſqꝫ ad furculā ⁊ attractio fur
cule ad īferioꝛa ꝓꝓ attractionē ad īferius ſuſpēſoriū: q̄re
accidit duricies in anelitu: ⁊ magis ſi fuerit in gibbo. Et
qñqꝫ accidit ī apatib⁹ epis q̄ nō pñt dormire ſup lat⁹ dex
trum ꝓꝓ ꝯpreſſionē. ⁊ grauat eos dormire ſup ſiniſtrū ꝓꝓ
tenſioneꝫ ſuſpēſoꝝ ad īferius: īmo plurimū īclinant̄ dor
mire ſupine: ⁊ accidit alteratio ī forma ⁊ colore: qꝛ īflatio
in facie ⁊ mēbris: ⁊ coloꝛ ad citrinū tendens vel palidū: et
vrina in colore vergēs in opos in ſuba ſpiſſa obūbꝛata in
ſuperficie cōfuſa manifeſte liuēs ſupius cū ſpuma citrina
rubea vel alba: ⁊ egō chiloſa ⁊ viruléta. ¶ Propria vero
ſūt duplicia: quedā q̄ indicāt locū: quedā nām apatis. lo/
cum. nā ſi in velamīe fuerit: ſigna erunt grauedo cū dolo/
re acuto: lꝫ minoꝛ: ⁊ ꝓpꝛie apud cōpreſſionē tactus febris
ꝑmittit̄: ⁊ ꝓpꝛie ſi fuerit colericū pulſus q̄ſi ſerinus qm̄
arterie eius ſūt diffuſe in pāniculo ei⁹ ⁊ cū rūpit̄ currit in
ventrē: ⁊ cū fuerit aquoſum ſeu vētoſuꝫ tollerat̄ abſqꝫ im
pedimēto multo: niſi ſit valde magnū. Si v̄o in ei⁹ gibbo
ſigna ꝓpꝛia erūt duricies ⁊ tumoꝛ in dextro hypocūdrio
tactu ꝑceptus ſi corpus nō ſit pigue: ⁊ in hoc lꝫ cōicet apa
lacertoꝝ ventris: tñ differt ab eo ī figura tumoris: qm̄ apa
tis epis tumoꝛ eſt figure rotūde lunaris: ſꝫ apatis lacerto/
rum tumoꝛ ē oblōgus ꝓcedēs ſm̄ ſitū lacertoꝝ ad modū
caude muris. Etiā dīt in accñtib⁹ alijs ꝓpꝛijs q̄ ſunt apa/
ti epatis: ⁊ ēt cōibus epati ⁊ alijs īterioꝛib⁹ mēbꝛis. Et ex
eis eſt. nā cū vides mirach declinare ad tenebꝛoſitateꝫ: ⁊
tenuitatē: tūc extima q̄ nō eſt apa lacertoꝝ ſed epis. Etiā
accidit tuſſis ſicca ⁊ conſtrictio ſeu duricies in ānelitu ꝓꝓ
tractionē ⁊ cōpꝛeſſionē diafragmatis ꝓp̄e cū adeſt vehe/
mētia anelandi ⁊ mioꝛatione nāe. Et qñqꝫ retinet̄ oīo ꝓꝓ
oppilationē gibbi: ⁊ ꝓp̄e cū apa eſt magnū: ⁊ vrina cuꝫ ru/
bore: ceperit in fe. acuta: ⁊ cū rubedine fuerit turbida ⁊ ta
liter ꝑmāſerit apa ſignificat in epate. Et vt dixit Abo. qm̄
caliditas apatis ipaꝫ rubeā reddit ⁊ ebullitionē faciēs diſ
ſoluit mām quāqꝫ oppilatio fit. q̄re redditur ſpiſſa cū pſe
uerantia maxīe cū humores ꝯcurrāt ad ipꝫ: ⁊ fit liueſcēs
ꝓpter caloris ſuffocatōeꝫ a mā collecta ⁊ ꝯcurrēte ſimul.
Et cū apa eſt magnū: egō eſt chiloſa virulenta ⁊ retinetur
humoroſa. Et cū ei aſſociat̄ vētris ſolō humoroſa moꝛtal̄
eſt. ait. H. ſi hoc apa ſine epatis defectōē fuert egōnē ꝓhi/
bebit ⁊ maxīe ſi fuerit in ſima ⁊ calīm. ¶ Itē ꝑdicta accñ
tia cū eſt in gibbo nō erunt vel ſi gdem ſint ꝓꝓ epis ꝓtiuꝫ
ꝯtinuātiū minoꝛant̄ ⁊ ſunt debilia. Et plurimū ſeq̄t̄ idro
piſis ꝓꝓ nocumētū digōnis q̄ celebꝛat̄ in ea. ¶ Signa v̄o
eius qđ eſt in penulis ſūt ꝓꝓortiōalia illis: ſed ſūt debilio
ra. Si v̄o ſit adeo magnū q̄ cōpꝛehendat totū ⁊ oēs par/
tes ei⁹ ſigna ꝑdicta ꝯcurrēt oīa. Que v̄o idicāt nām ipſi⁹ ⁊
nām ſūt. nā ſi apa fuerit calīm illic erit fe. acuta: ⁊ ꝓpꝛie ſi
fuerit in carnoſa ꝑte: ⁊ ſit vehemēs ablatio deſiderij: nau
ſea vomit⁹ ſingult⁹: rubedo ligue: deide nigredo frig⁹ ex/
tremoꝝ ⁊ ſincopis: ⁊ totū cū eſt ī ſima. Cū v̄o ē in gibbo ac
cidit cū fe. malitia anhelit⁹: ⁊ doloꝛ extenſus a dorſo vſqꝫ
ad furculā ⁊ tuſſis. ⁊ cōicat ī his accñtib⁹ cū pleureſi. veꝝ
dīt ab ea qm̄ in pleureſi fe. eſt acutioꝛ: doloꝛ lateris ē acu/
tus: malitia anhelit⁹ maioꝛ: tuſſis ē ſemꝑ. ⁊ ꝑmo ſicca ⁊ ꝑo
hūida cū maturat̄ pulſus ſerin⁹. ¶ In apatib⁹ v̄o epis do
lor eſt grauatiu⁹ ſub coſtis ſemꝑ icipiēs. Et tuſſis ſemꝑ ſic

ca ⁊ pulſus eſt vndoſus. Et ſi eſt flegmonicū appꝛent ſigna
dominij ſāguis. Si v̄o colericū ꝑdicta erūt ſigna acutioꝛa
⁊ cū ſignis dominij colere. ⁊ cū reſoluit̄ ceſſāt accñtia. Si
vero collectionē fecerit accñtia itendunt̄: ⁊ cū fcā ē ſedant̄
⁊ auget̄ grauitas in loco. Et cū rūpit̄ accidit oꝛripilatio ⁊
exitus puris ⁊ ſanici ꝑ egōnē ſi fuerit in ſima: vel ꝑ vrinaꝫ
ſi fuerit ī gibbo. Et cū fuerit alba ⁊ ſeq̄t̄ alleuiatio eſt bōa.
ſi v̄o cenoſa vel ſic̄ amurca ⁊ fetēs ⁊ ſeq̄t̄ debilitas ē mala
vt hyp. ait in affo. ¶ Si v̄o frīn ſigna erūt ꝯria vel mitio
ra. q̄ꝫ q̄ ſunt cū ſignis dominij flātis vel mlīe vel vētoſita
tis: de qua īfra dicet̄. Et cū īdurat̄. qđ eſt plīmū ꝓꝓ iobe/
dientiā māe ⁊ exceſſū diafoꝛeticoꝝ ⁊ admiſtrationem in
groſſantiū apocruſticoꝝ ſigna ſūt grauitas mlta tūoꝛ ſine
doloꝛe ⁊ fe. ⁊ cōicat ī his cū oppilatōe. ſꝫ dīt ꝓꝓ reliq̄ q̄ ſūt
dcā. ⁊ ſeq̄t̄ illud idropiſis ⁊ egō ꝯturbata nigra in ꝑncipio
egritudis acute ſignificat apa eſſe calꝫ magnū in epe: ⁊ in
ꝓceſſu ē viruléta: deide ſanioſa cū ꝑuenerit ad dubelati:
grauitas quoqꝫ ī ipſo maioꝛ ē ea q̄ fit cū apa eſt ī ſima: qm̄
ꝑs ſime ſuſtētat̄ ſupꝛa ſtōm. gibboſa vero nō ſuſtentat̄ ſu
pꝛa aliqđ niſi in eo qđ ē vehemēter adherēs ⁊ ꝯtinuatum
coſtis falſis. Sed ei⁹ qđ ē ī ſima: ſigna ſūt ꝑuatio duriciei:
⁊ tumoꝛis ī dextro hypocūdrio niſi ſit magnū: ⁊ ꝓp̄e ī pin
gui. grauitas mioꝛ ꝓꝓ dictā cāꝫ. ⁊ doloꝛ vehemētioꝛ ꝓꝓ cō
preſſionē. Et in hoc: lꝫ cōicet apati meſeraicaꝝ: tñ dīt ab il
lo qm̄ grauitas in apate meſeraicaꝝ ē mioꝛ. ⁊ eſt cū tēſio/
ne magna ⁊ ꝓfunda v̄ſus ſtōm ⁊ ventrē: ⁊ egō ē chiloſa ꝓꝓ
oppilationē ⁊ debilitatem ipaꝝ ⁊ ſubtilis ꝓꝓ ſtōi dbilita/
tem in digōne. ⁊ ſi gdē ſit fe. ꝓꝓ ei⁹ calitatē erit leuioꝛ q̄ꝫ ī
eo qđ eſt in epe. In apate aūt epis eſt ꝯꝫ. Itē ex ſubſeq̄nti
b⁹. nā ſi egrediat̄ aliqđ ſpumoſū poſt dies aliquos ſi gdeꝫ
ſit illud ad rubedinē ⁊ citrinitatē declinās erit ab epate ⁊
vomit⁹ abomīatio deſiderij ablatio atqꝫ ſingult⁹ ꝓꝓ illđ
qđ effundit̄ de epe ad ſtōm ꝓꝓ vicinitatē: ⁊ ꝓꝓ colligātiā
īter epar ⁊ ipm̄ ī neruo ſubtili: ⁊ ꝓp̄e cum apa eſt magnū ⁊
calīm: ⁊ ſm̄ hyp. cū ait. In epe flegmonē patiēti ſingultus
ſupuenit. ait. H. nō ſupuenit apati epis ſingult⁹ niſi apa ſit
magnū: ⁊ ꝓp̄e calīm. ¶ Cura. apatū epis caloꝝ duplex eſt
ītētio. gn̄alis. ſ. ⁊ ſpālis. gn̄alis ꝯſiſtit in q̄tuoꝛ reb⁹. ſ. ī eūo/
ne vlī totius corpis. in eūone partis ſeu māe apantis. in re
gimīe: ⁊ q̄rto in accñtiū correctiōe. ſpālis aūt ꝯſiſtit in ꝯſi/
deratione ſpāli apatis. ſ. cāe ei⁹ mālis ꝓpꝛie nāe loci. ſ. mē
bꝛi: vt epatis ⁊ partiuꝫ eius: de gbus dictū eſt ſupꝛa ac īuē
tione auxilioꝝ ꝓpꝛioꝝ gbus ꝑdicte. iiij. cōpleant̄ res ge/
neralis ītentiōis: nec nō ⁊ apti modi vtendi eis. ¶ Si er/
go apoſtema epatis ſit flegmonicū vt ꝑmā reꝫ compleas
generalis ītentionis flobotomiā de ſaphena vel de baſili
ca partis cōtrarie vel eiuſdem ꝑmittes. prout exigit diſpō
. ſ. vſqꝫ ad defectionē. Ingt enī hyppo. Et vbi opꝫ vſqꝫ ad
defectionem ducere: ⁊ hoc facere ſi ſufficiat egrotās. Qđ
approbans Gal. ait. In acutiſſimo eniꝫ apoſtemate maxi/
mo doloꝛe ⁊ in febꝛibus peracutis nulla medicina melioꝛ
hac eſſe pōt. educit. n. māꝫ generatā ⁊ influentē ⁊ foꝛtaſſe
īfluxā: ſed opꝫ eā ꝑmittere. ait. n. Gal. q̄ ante eaꝫ oē aliud
auxilium per recurſum. ſ. ⁊ per extractū eſt inefficax ⁊ pe
riculoſum. q̄ ſi virtus nō ꝑmiſerit partiri oꝫ eā cū reitera
tione nō omittere: etate v̄o nō ꝯcedēte aliqđ ꝓpoꝛtiōale
illi ꝑmittes: vt ē ꝓuocatio ſāguis nariū cum iſtro ex ſetis
poꝛcoꝝ fcō qđ ē notū: ⁊ cū fuſo ītromiſſo ī nares: vel cum
vnguib⁹: vel ſaltē cū ſāguiſugis appoſitis narib⁹ ſi apa fue
rit in gibbo: vel aptione emoꝛoidaꝝ cū fricatiōe ex folijs
ꝑitarie vel fic⁹: vel cū naſtali ex pane poꝛcio ſeu bꝛonia ⁊
ſcarificatio cruriū: ⁊ ꝓp̄e ſi fuerit ī ſima. ¶ Deide ꝑmiſſa
eūone vlī ad ſcđam reꝫ. ſ. eūonem partis: ſeu māe apoſte/
matis veniēdo: opꝫ aūt vt eaꝫ cōpleas cū admiſtratione
eoꝝ q̄ mām recurrere faciunt repellunt ⁊ trāſmittūt: ⁊ ſi
gđ influat trahunt ⁊ deriuant: ⁊ q̄ fluxa eſt: nec recurrere

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0309-8
DFG

poterit euacuant: ⁊ etiaꝫ que per modum congeſtiõis fuerint aggregata recurſum vel repulſum ⁊ traſmiſſum complẽt frigida ⁊ ſtiptica iteri⁹ vel exterius approximata ſm oẽm modum ſimplicia ⁊ cõpoſita q̃ infra dicent̃. hec eniꝫ nõ ſolum ĩfluentem repellũt mãm. ſed cõfortant epar ne tranſmittat: nec nõ ea q̃ per modum cõgeſtionis aggregãtur ꝓhibent generari. Simplicia ꝓpria: q̃ interius ſunt approximanda in ꝑncipio ſunt aq̃ endiuie cuꝫ ſirupo acetoſo õ çuccaro: aqua portulace: virge paſtoris aq̃ granatorum acriũ: ⁊ muçoꝝ: aqua cucumeris ⁊ cucurbite: aqua ordei hñs virtutẽ cuſcute: calami arõatici: abſinthij: ⁊ ſĩliũ. Exterius approximãda in ipſo initio ſũt ſucci ſtiptici: frigidi. ſicut aq̃ mirte de folijs: maloꝝ ⁊ citonioꝝ ⁊ ſpõgia infuſa in aceto: ⁊ aq̃ fra: ſucc⁹ portulace: ſempuiue: aq̃ ro. ſandali ꝑputia vitiũ ꝯtrita ⁊ emplãta cũ roſis ĩmaturis: vel ſuccis maturis ⁊ hmõi tẽperatis in ſtipticitate ⁊ frigiditate. Excedẽtia. n. in eis apa indurãt ⁊ ꝯſtipãdo retinent coleram: q̃re addũt in apatis magnitudinẽ ⁊ magis ſi ſit ĩ ſima q̃ꝫ ſi fuerit in gibbo: qm̃ ad gibbũ nõ perueniũt cũ vtute integra: ſed cũ ipſa cõfracta. Et qñq꜡ accidit ex eis vehemẽtia doloris ꝓpter ſuffocationẽ mãe ⁊ ſoliditatẽ mẽbri: q̃re tardat̃ reſolõ: ⁊ accidit mortificatio mẽbri. Opꝫ ergo ꝓpterea vt eis ſi illis cares admiſceas aliq̃ ſubtiliãtia ⁊ aperitiua: q̃ ſuperi⁹ nota fecim⁹: nec opꝫ vt ea admiſtres actu fra ẽt ſi ſit apa calidũ: ſꝫ tepida aut nõ veri frigoris. Cum võ verificatũ fuerit ꝙ iaꝫ ſit apa vt ꝙ mã nõ ceſſet aggregari: imo ſit in fine ꝑncipij: ⁊ ꝑncipio augmẽti: oꝫ vt tu admiſtres tũc emplã facta de citonijs ⁊ aceto: ⁊ aq̃ ro. q꜡ ſunt meliora: Et de illis eſt vt terant̃ citonia cuꝫ farina ordei: ⁊ aq̃ ro. ⁊ emplaſtrent̃: aut citonia decocta in aceto: ⁊ aqua ro. donec bis cocta ſint: vel miſceant̃ cuꝫ ſandal: ⁊ oleo ro. Et ex illis eſt vt decoquant̃ citonia cũ vino odorifero in quo ſit ſtipticitas: ⁊ addat̃ eis virga paſtoris vel plãtagõ ⁊ ſauic ordei: ⁊ ꝯfortet̃ cũ abſinthio vel ſpica vel cipero: ⁊ admiſtret̃. Et qñq꜡ fit ex citonijs decoctis cũ abſinthio. Et ex illis eſt oleũ de citonijs. ⁊ maſt. ⁊ ſĩlia cũ preceſſerit in augmẽto. Tractionẽ aũt ⁊ deriuationẽ complebis cũ fricationib⁹ fomẽtis mordacibus vẽtoſis in cruribus: coſſis: brachijs anchis: ⁊ dorſo: nec nõ emplaſtris calefactiuis in eis applicatis ex flamula tapſia ſq̃lla cantaridibus calce nõ extincta ⁊ ſĩlibus factis. ¶ Cũ võ iam fuerit in fine augmẽti a ꝑncipio ſtatus addes ꝑdictis maſticẽ camomillã: mellilotũ: fenugrecũ ſemẽ lini. ⁊ ſĩlia. ¶ Procedente võ ſtatu cũ iam tota fluxerit mã ad eius euõneꝫ flomabis baſilicã dextrã ⁊ ſi q̃dem reſoluat̃ bene q̃deꝫ: ſi aũt nõ: ſtudebis euãre mãm in apate contentã ⁊ virulentam ⁊ reſudataꝫ ab eo. Et ſi q̃dem fuerit in gibbo cũ diureticis q̃ ſunt nota ſupra: ſi vero in ſima cũ ſoluẽtibus vẽtrem ⁊ trahẽtib⁹ ad ĩteſtina: q̃lia ſunt q̃ docuit Gal. cliſteria ꝓprie ex ſale nitro: ⁊ mellicrato que oĩ tpe ꝯpetũt: ⁊ ꝓprie lenitiua vt naturã lenẽ teneãt: ⁊ mãꝫ ſime ad regionẽ ꝯuenientẽ ſue expulſiõi inclinent vt vrticã ſcabioſaꝫ mercurialẽ epythimũ: ⁊ polipodiũ: ⁊ q̃cunq꜡ moderate ducũt cõmiſcendo ſeu coquẽdo cibarijs ⁊ ꝓprie ptiſanã: ⁊ ẽt fortiora illis vt cortices nigri ellebori paꝝ admiſtrabis ⁊ magis cũ fuerit in declinatiõe. ¶ Exteri⁹ võ ſuppones cataplãta ⁊ emplã ex diaforeticis q̃lia ſunt eupatoriũ camõilla: mellilotũ flores abſinthij: ſpica crocus caſſia lignea calamus aromatic⁹. ⁊ alia ꝯſĩlia: debilia nõ fortiora cũ ĩdurent apa reſoluẽdo ſubtile: ⁊ dimittẽdo groſſum: nãm debilitent ſupflue reſoluẽdo. Quare oꝫ ſtiptica illis fortib⁹ cum expedit admiſceri q̃ vtutem detineãt ⁊ conſeruẽt robur ipſi⁹: ⁊ ſine acuitate ne mordicẽt ⁊ ꝯmouẽdo materiã apatis: atq꜡ reuma ꝓuocãdo apa augmentent. ꝙ ſi apa colericũ fuerit flomiã minoratiuã miniſtrabis de baſilica ĩ ꝑncipio cuꝫ ꝓpter nãm mẽbri raro ſit ſine peccato ſãguinis: deinde minorabis colerã ĩfluentem ⁊ q̃ñtatã cũ adminiſtratiõe colegogi ex aqua fructuũ tamarindis melle caſia mãna aqua ordei ⁊ çuccaro violato ſucco roſaꝝ ⁊ reubarbaro: ⁊ aloe rectificato: ⁊ ſĩlibus: leuiter educentibus ſine agitatõe ⁊ ꝯfortantib⁹. Et cliſteria ex leniẽtib⁹ ſi apa fuerit in ſima: vel diuretica frigida nota ſi fuerit in gibbo: deinde calĩa gradatim ꝑueniẽdo ad fortiora: ⁊ deĩde apocruſtica ĩterius fortiora q̃lia ſunt coriandrũ aqua melõis idꝫ: ⁊ ſĩlr nenufaris alkechengi iuiubaꝝ: ⁊ aq̃ pſilij. ⁊ ſirupus eoꝝ cum endiuia cuſcute vel ſpica. Et exteri⁹ emplm ex ꝑdictis ⁊ epithimata cũ cãphora ſandalis: ⁊ lenticul' aque actu frigidis paꝝ. Et diaforetica debiliora vel mixta vel pura ſuis tẽporibus: q̃lia ſunt cuſcute lacca abſinthiũ eupatoriũ: ſpica. ⁊ ſĩlia: ⁊ çuccaꝝ intus ſumpta ⁊ exterius approximata per oẽm modũ ſimplicia ⁊ ꝯpoſita. Et ſi q̃deꝫ totum reſoluat̃ ſana remanebit ꝑticula: ſi võ nõ: ſed tranſeat in dubelati ⁊ ſuppurationẽ ꝓpter mãe diſpõnem: qḋ oñdit ꝓlongatio ei⁹ vſq꜡ in diẽ quadrageſimũ ſine defectu fe. ⁊ doloris vt dixit hyp. tunc oꝫ vt maturationẽ eius ad ſtatũ perducas ĩcolumẽ. ꝙ ſtudiuꝫ tuum exerceas ſm regulas ſex: quas ſupra ĩ cura pleureſis dixim⁹: illuc ergo recurre: ⁊ eas cũ ꝓprijs medicis cõpleas. Et lꝫ q̃ ibi dicta ſunt epi nõ ſint ꝓpria: tñ a ſcõa virtute in his intentõibus cõplendis opationẽ hñt ꝓpter ꝓpĩqtatẽ. Sic̃. n. q̃ frangunt lapidẽ in veſica frangunt ⁊ in renib⁹. Ita q̃ maturãt aperiũt ⁊ mundificãt ĩcarnãt: ⁊ ꝯſolidãt ĩ pleura. illa agẽt in epate multo magis. ſic̃ ẽt aperitiua oppilationũ ſplenis ſũt aperitiua eaꝝ epatis. Et ex medicis appropriatis adiuuãtibus in maturatiõe apatis epatis ſunt lac aſininũ cuꝫ çuccaro albo: aut çuccarũ almuſet: ⁊ ſicut aqua de radicibus cũ paſſis ficub⁹ dactilis. ⁊ alijs ſimilibus cõibus ⁊ decoctio polij in ieiunio. Et ex illis ſunt emplã ex farina ordei calamẽto cepe aſſato: radice lilij farina fenugreci. ⁊ radice altee. Et potus aq̃ mellis cum aq̃ ordei: ⁊ de taraſacõ ſicco. ʒ. i. ⁊ cum lacte aſine. Et ex medicinis iuuantib⁹ ad eruptionem apatis epis appropriatis in q̃bus etiã cũ ſubtiliatione eſt confortatio eſt ſcabioſa ⁊ ſuccus eius: naſturciuꝫ: ⁊ ſic abſinthiũ crocus ⁊ ſpica radix peonie ⁊ radix alhaſce ⁊ radix rubee ⁊ grana alfagredi ⁊ ſucc⁹ eupatorij ⁊ radix centauree ⁊ oleum de neriden ⁊ oleum de arbore maſticis ⁊ de lilio. Et ex illis eſt emplaſtrum de farina ordei baurac, fimo columbino: calamento glutine albotiꝫ ⁊ pice. ⁊ ſimilibus. Et ex illis eſt balneationis aſſiduatio ⁊ dormire ſupra epar ⁊ exercitari ⁊ deambulare quantum poſſibile eſt. ¶ Facta eruptione oportet vt adminiſtres mundificantia ⁊ abſtergentia ex parte declinatiõis materie. Et ſi quidem declinet ad vias inteſtinorum ſanies: dabis aquam mellis ſimplicem cum ſucco ſcabioſe: vel cum diureticis ſi declinet ad vias vrine. Sed oportet vt diuretica non ſint fortia que ledant ⁊ vlcerẽt ſimul cum ſanie meatus vrine: qḋ ſi accidat tunc rectius eſt vt ſit aqua mellis decocta cum equalitate ⁊ permixta cum aliquo glutinatiuo pauco. ſ. amido ouo ⁊ oleo roſa. Et cibetur cum candariſio ⁊ maluis. Et potetur cum aqua ordei cum gũma dragaganti. ¶ Cum autem fuerit mundificatio facta perfecte opꝫ vt ſumat in ieiunio incarnantia ⁊ conglutinantia. Et ex proprijs eſt vt ſumatur thuris ſanguinis draconis. añ. aur. vnum: ſeminis endiuie: ſeminis apij: maſticis. ana. aure. i. Et ſumatur in potu cum aqua mellis vel iuleb: ⁊ poſt illud cibetur cum ſtipticis vt confortetur. Qđ ſi materia ſeu ſanies erupta effundatur ad ſpacium ventris: tunc neceſſarium eſt: vt incidatur cutis apud inguia ⁊ diſcooperiatur lacertus adeo vt appareat ſiphac nominatus biteron. deinde fiat in eo foramen et ponatur in eo cancella per quã currat pus: paulatiꝫ: deinde cũ emplaſtris appropꝛiatis conſolidabis: ⁊ totuꝫ hoc ſi per

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0310-9

materiam non reſoluatur qḋ plerūq; fieri conſueuit per
ipſam trahentem ſaniem per mediū oſſ's. ¶ Tertiā rem
pncipij cōplet debita ſex rerum non nālium adminiſtratio.
¶ Et ēt q̄rtam rem ↄplēt auxilia pura ⁊ diuerſa ⁊ vnicui
q; ꝓpria ſm pluralitatē ⁊ diuerſitatē accñtium q̄ dcā ſūt
⁊ aliorum q̄ dicta ſūt ſm modū ſupra in cura apatis ſtōa/
ci declaratū: illuc ergo redi. ¶ Qz ſi apa frigidū fuerit et
fleūi vel melancolicū: qḋ eſt raro: eſt in plibus eſt ꝓcedē/
dum. pmo. n. facta flomia de baſilica ꝓpter cāz iam dcāz
in minori q̄ntitate tāq; in ꝓcedenti. Et loco colegogi admi
niſtrabis flegmagoga in via minoris cāe leuia: vt ē aqua
albulet ⁊ gelenıabin: vl' melagogū: vt aq̄ ſene boraginis ⁊
bugloſſe ⁊ polipodiū. ¶ Et pus cliſteria ex abſtergētib⁹:
⁊ aperiētib⁹ mixta cū aromatibus in pncipio ſimplicia et
compoſita q̄ ſupra dcā ſunt in cura oppilatōis. Et ex pro/
prijs eſt oleū de keruia ⁊ de geſemis qḋ de çanbrica nūcu/
paī ⁊ ſambucinū. Et ex emplaſtris ꝓprijs meli⁹ eſt em/
plaſtrum ſtomaticū ſeu cerotū ſtōaticon. H. ⁊ de ſemib⁹.
Et ex electuarijs diacurcuma dialacca. ⁊ ſilia. ⁊ trociſci d
ſpica ⁊ fiſtici ſunt magni iuuamēti. Et ſirup⁹ de ſemib⁹ cū
camedreos polipodio ⁊ ſilibus. Et diaforetica fortia illis
mixta vel pura temporib⁹ ſuis q̄lia ſunt q̄ ſupi⁹ dcā ſunt.
¶ Qz ſi ꝑueniat ad ſcliroſiz qḋ eſt plurimū ꝓpter idiſpō/
nem māe ad reſolōnē ⁊ exceſſum diaforeticoꝝ ⁊ malitiā
regimis: tūc ſi ↄfirmatū ſit ⁊ quietum nō curaī. Si vero
fuerit in pncipio ſui curaī. ¶ Et q̄nq; perdurat cū vita: ⁊
q̄nq; tranſit in idropem ſm. H. Et ſi ſeqtur fluxus moriī.
¶ Cura apatum frigidorum eſt due res. vt ſupra in cura
ſtōi dictū eſt. ſ. mollificare ⁊ reſoluere: quas ↄplere oz cū
bis q̄ dicta ſunt ibi. ⁊ cū ꝓprijs epati q̄ hic diceñ ſimplici
bus ⁊ ↄpoſitis ītus ⁊ extra approximaris. Simplices ad
has itentōes ſunt grana pini maioris medulle ⁊ adipes tē
perate calē ſemen lini fenugrecū altea: gluten albotı ⁊ po
tus apoçimatis coſti ⁊ eupatorij fenugreci: ⁊ paſſularuz ⁊
oleū amigdalaꝝ dulciū: ⁊ de nucibus recētibus. Et ex eis
q̄ valde ↄferunt ad reſolōnē poſtq̄ tres regulas attēdiſti
in ea: q̄rum pma eſt vt aperias cū ſubtilib⁹ rebus vt v̄tus
reſoluentiū ⁊ inundificātiū ſubintret. Scd̄a eſt vt pmit/
tas calefaciētia ſubtiliantia ⁊ icidentia humorē groſſuz ⁊
frigidū atq; viſcoſum q̄ eſt mā eius. Tertia eſt vt pmit/
tas mollificātia vel admiſceas ea cū eis; vt eſt ſonus ſup
latus dextrū. Et coſtus eſt vehemētis iuuamenti cū ex eo
ſumiī in potu a. ℨ. ß. vſq; ad aur. i. cū aq̄ mellis: aut vio. Et
q̄nq; ↄfert ſumere in potu oleū coſtinū aut de neriden de
keruia: aut de balſamo cū aq̄ d̄coctōis rute: ⁊ aneti. ⁊ ſit q̄n/
titas olei de neriden. ℨ. iiij. ⁊ adminiſtreī per hebdomadaz
⁊ ↄfert maxie. Et ex illis eſt ſemē agni caſti in ſirupo d eu
patorio ⁊ de arnogloſa ſicca cū aq̄ feniculi: apij: ⁊ endiuie.
Et decoctio lupinoꝝ cū ſpica aromatica: ⁊ amigdal'. ama.
in vino. Et bace lauri: ⁊ radix fu. ⁊ cicer nigrū ⁊ poliū: ⁊ ca/
medreos. ⁊ porrum. Et ex cōpoſitis ↄfectōibus ↄferētib⁹
ad illud eſt diacurcuma athanaſia tiriaca diateſeron dia/
lacca: diacoſtū: ⁊ ſagenea. Et ex trociſcis troci. de ſpica. Et
ex emplaſtris bonis ad illud eſt empl'm de melliloto i an
tidotario dictū: aut de diamorō d̄cocto cū vio pōtico aut
ſpica: ⁊ oleo de fiſticis: ⁊ de praſſio ⁊ de aneto decocto. Et
ex cerotis cerotū yſopi: ⁊ diapente. Et ex medicis bonis ē
ſz. H. vt ponanī ſupra mēbꝝ vētoſe calefacte ſine ſcarifi/
catiōe: deide adminiſtrenī medicie fortiores in ſubtiliatōe
⁊ reſolōne ⁊ fac adherere ea loco q̄ ſunt ſic nitrū ⁊ ſulfur
citrinū per hebdomadā vel mediam. deide adminiſtra epi
thimata cū ſinapi ſingul'. x. dieb⁹ poſtea fac vomere egrū
cū rafano. Qz ſi iobediēs fuerit apa adminiſtra elleborū al/
bū. Et q̄nq; deuenit ad cācrū ⁊ nō ē ſpes in eo. Jngt enim
hyp. q̄buſcūq; cancri abſcōditi fiūt nō curari eſt meli⁹. cu
rati. n. citius pereūt nō: curati lōgius tp̄s proficiunt.

¶ Capitulum octauum de apoſtemate meſeraicarum et
lacertorum ventris ⁊ cura eius.

c T cum apa fuerit in meſeraicis cura eſt cura apa
tis concauitatis epis. Et cuz apa eſt in lacertis al/
mirac: curaī cum apocruſticis ⁊ reſoluētibus for/
tioribus: q̄m itentio q̄ ſumiī a ꝑicula in illis eſt nulla vel
modica: in epate magna. Quapp oz q̄ repercutias i epate
⁊ reſoluas cautius: ⁊ cū minori audacia q̄z in illis. Compo
ſite ſunt medicie q̄ ex ꝓdictis cōponunī ad vnāquāq; itē
tionē ꝓprijs q̄ ſequunī. ¶ Deſcriptio empl'i reſoluentis
apata epis laudabile ⁊ expertum. ℞. ſtoracis cerc. an̄. da/
uic. iiij. olei de arbore maſti. olei ro. an̄. dauic. iiij. vini coti
las. ij. ß. liq̄ fiat cera ⁊ oleū ⁊ miſceaī cum eis. ¶ Aliud ad
idez. ℞. lilij: amōi: folij. an̄. dauic. i. ſtoracis cere. an̄. dauic
i. olei de arbore maſt. q̄ntum neceſſe ē. ¶ Aliud. ℞. aloes
. ℨ. iij. maſticis. ℨ. i. camomille: ⁊ melliloti. an̄. ℨ. vi. olei d li/
lio q̄ntum ſuffic. ¶ Aliud reſolutiuū ⁊ ↄfortatiuū. ℞. cro/
ci. ℨ. ij. bdelij. ℨ. vij. ſordes vrceoli. ℨ. iiij. amomi: ſpice rōa/
ne: carpobalſami. an̄. ℨ. vi. olei de lilio q̄ntum ſuffic. ¶ Ali
ud reſolutiuū: ⁊ ꝓprie ei: qḋ induratōi eſt ꝓximū: ⁊ cōfert
in dolorib⁹ ſplenis ⁊ renū. ℞. ſqlle aſſate: lilij celeſtis: aſſa
ri: dauci: ſemis apij: aniſi: ſpice arōatice. caſſie. caſtorei: ca/
lamēti mōtani: ⁊ fluuialis: cimini: acori: piretri. pipis lon.
nucis muſ. amomi: apij: euforbij: ſemis altee: ſticados: po/
lij: ſiſeleos: ſemis rute: ſe. fenicu. corticū radicis capparis:
ariſtol. ro. cinamomi groſſi: çinçiberis: bacaꝝ lauri: ſemis
iuſqami albi: coſti: ameos: ſemis karui oīum. ana. ꝑtem. i.
Cōficianī cū melle diſpumato ⁊ appliceī poſtq̄ applica/
tum fuerit ſufficienter empl'm de mucillaginib⁹. ¶ Me
dicamen aliud factū ex aleis cāpeſtrib⁹. ℞. aleoꝝ gētiāe
albe: eupatorij: coſti: ariſto. keiſim: ſiſeleos. pipis longi. an̄
dauic. iiij. ſemis apij: aſſari meu. fu. nucis muſ. ameos an̄/
uidē nigre. an̄. dauic. xv. caſtorei ⁊ aq̄ ro. an̄. dauic. xij. ſol/
uanī oīa iſta cū vino. ⁊ alea teranī ⁊ miſceanī cū melle: ⁊
approximenī i modū cataplaſmatis. ¶ Jngt iſaac ſi apa
fuerit ex ꝑcuſſione vel caſu: vel colliſiōe ꝓcedēte flomia.
deñ reubarbari. ℨ. ij. cū vino vel ſero caprino. Et rubee. ℨ. i.
cū vino ⁊ ariſtolo. ro. ℨ. i. cū aqua cal'a. Et ſi ifirmus patiaī
in epate calorē damus balauſtiā: bolum armenū cū aqua
arnogloſſe vel ſucco ſolatri. ¶ Puluis valens ad percuſ/
ſionem epatis ⁊ caſum. ℞. balauſtiaꝝ violaꝝ: mirte: boli:
amidi. an̄. ℨ. iij. ſanguis draconis: lacce. ana. ℨ. i. ß. doſis. ℨ. i.
cuz apocimate de roſis: maſtic. ⁊ arnogloſſa. ¶ Medica
men aſclipiadis factū cū melle: ipm naq; expertū ē cōfer
re pp illud qḋ in ipſo eſt de ſpēbus medicinaꝝ valentiuz
ad illud ſm conditiones ſuas quas dixim⁹. ℞. camepithe
os ⁊ praſſij: ſemis apij montani: gētiane: ſemis agni caſti:
fellis vrſi: ſemis cucumeris ſcolopēdrie radicis oppopo/
naci: amiloꝝ lilij rubee: ſemis caulis: ariſto. piperis: ſpi/
ce inde: coſti: ſeminis apij ortulani: ⁊ eruce: herbe iudaice
polij: apij: eupatorij: granorum iuniperi: ana partes equa/
les: terantur ⁊ conficiantur cum melle. doſis pondus aue
lane cum vino.

¶ Capitulum nonum de inflatione epatis.

i Nflatōis epatis modū cāz ⁊ locū h̄uiſti in ꝓcedē/
ti caplo. Et ḡnaliter cās ⁊ ſigna eius atq; curaz ex
dictis ſupra in cura iflationis ſtōi poteris ↄprehē
dere: illuc ergo recurre: ⁊ cū ꝓprijs itētionē ↄplētib⁹ opa/
re q̄ tibi enarrata ſūt ſupi⁹. Et ſi qdem fuerit in ſimo cum
cliſteribus cibis ⁊ potibus operare magis. Si v̄o in gibbo
cum diureticis intus ⁊ cataplaſmatibus exterius magis.
Si in vtraq; parte cum vtriſq;: ⁊ fe. ſuperueniēs eſt cura
vtriuſq; cum conſumat inflationis cauſam.

¶ Caplm. x. de dolore epatis ⁊ hypocundrioꝝ.

i Ngt hyp. q̄buſcūq; dolor fit circa hypocun. ſine
flone fe. his ſuperueniens ſoluit dolorem: qui eſt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0311-5
DFG

accidens actionis leſe ipſius ſequēs ꝓdictas egritudines eius. Et eſt grauatiuus: ſed nō fit vehemēs: niſi cū apate calo͛ aut vētoſitate ⁊ ſimilaꝛ dolori hypocūdrioꝝ. dr̄t tn̄ ab illo vt ſuperius dictū eſt. Qui cū fuerit in hypocūdrys qn̄qꝫ eſt ꝓprius qn̄qꝫ ex cōitate epatis cū eſt in dextro: qn̄qꝫ ex cōitate ſplenis cū eſt in ſiniſtro. qn̄qꝫ cōitate diafragmatis: ⁊ eſt in vtroqꝫ: ⁊ qn̄qꝫ cōitate ad coſtas apatas i lacertis: ⁊ qn̄qꝫ cōitate totius vt cū accidit in febrib⁹. ⁊ cū tenſione multiplicaꝛ in peſtilentialibus ⁊ qn̄qꝫ accidit ꝑꝑ apata itrinſeca alia: ⁊ qn̄qꝫ accidit in criſib⁹ cū mā tendat ad iferiora vt egrediaꝛ ꝑ ea. Et qn̄qꝫ accidit ēt ꝑꝑ tenſiones ſpaſmoſas ſeq̄ntes malitiā cōplōnis. Cauſas ⁊ ſigna ei⁹ locū: ⁊ curā ex iam dictis in hac ſūma ⁊ ſupra i dolore ſtōi poteris ꝯprehēdere. Illuc ergo recurre ⁊ canōes illos iſtuc reducas ⁊ cōpleas cū adminiſtratōe ꝓpriaꝝ mediciarum epati q̄ ſuperius hic ſunt narrata nām epatis in oib⁹ attendēdo. Et ex medicis ſpālibus in dolore epatis i qb⁹ fiducia eſt hn̄da ſunt ſimplices ⁊ cōpoſite. Ex ſimplicib⁹ vero eſt abſinthiū emplatū cū oleo de alchāna: vel decoctum in oleo ſimplici ſm̄. G. ⁊ cū oleo camomellio i hypocundrys. Trociſci de reubar. cū deſcriptionibus ꝓdictis diuerſis in antidotario noſtro. Cōfectio de reubar. ⁊ diacurcuma. Cōfectio meu. ſolutiua de cordumeni ⁊ de ceſare athanaſia minor. Et ꝯfectio aſclipiadis dicta ſupra. Et ex expertis eſt ſucci folioꝝ pſici. ℥. ij. cū ſirupo acetoſo: aut decoctio eoꝝ cū reubar. ʒ. ß. ⁊ croci. ℈. i. ⁊ ſeīs apy: ⁊ feni. an̄. ʒ. ß. Et. G. vidit in ſōno q͛ flōmia arterie iter policē ⁊ indicem exn̄tis curat dolorem eius. ¶ Cōfectio medicaminis ad dolorē epis experti. ℞. ro. ʒ. iiij. ſpice: maſti. an̄. ʒ. ij. ſucci eupatorij: abſinthy: lacce: reubar. croci: ſuperioꝝ corticum ſq̄nāti: rubee tinctoꝝ: aſſari: trium ſeminū: xilo alo. crudi. an̄. ʒ. i. xilobal. ʒ. ß. ¶ Cōfectio medicaīs cū dolor ē cū ſolōne vētris. ℞. fecis vini decocti lacce: ſpice: reubar. an̄. aur. i. ſcorie ferri. ʒ. viij. bibanꝛ de eis puluerizatis: permixtis. ʒ. ij. cū. ℥. ij. aq̄ coriandri. Et ex emplis eſt emplꝫ ō cordumeni de melliloto de euforbio. ⁊ ſilia ſunt meliora. Et regimē ⁊ dieta ſint extenuatiua. ¶ Cōfectio trociſcorū Açenſis froꝝ ad dolorē epatis. ℞. folioꝝ meçerēō tritorum agarici. mira. citrinoꝝ: ſerapini. ana. ʒ. v. ireos. ʒ. iij. ſucci eupatorij ſpice. an̄. aur. ij. Cōficianꝛ cū melle. doſis a. ʒ. iij. vſqꝫ ad. iiij. ¶ Cōfectio trociſ. Açenſis caloꝝ ad dolorē epatis forte. ℞. meçercon: calceumenō: ſtercoris columbini. an̄. eq̄lr: ⁊ q̄rta pars haꝝ euforby. Cōficianꝛ cū iuleb. doſis. ʒ. ij. ß. Aut cū ſirupo violato iformenꝛ pillule de qbus i potu tribuanꝛ cū aq̄ paſſulaꝝ de coraſceni. Sitqꝫ cib⁹ eius eſca aut cib⁹ cū ſumac aut acetū cū oleo: aut ſirup⁹ acetoſus. ¶ Cōfectio ad dolorē epatis calim. ℞. açē ſuc. ʒ. v. ſemis citri. endiuie: portulace. feni. ana. ʒ. ij. ß. ſucci ligri. ʒ. i. ß. roſaꝝ. ʒ. i. fiāt trociſci cū aq̄ ro. ⁊ denꝛ i potu cū ſirupo acetoſo aq̄ endiuie. ⁊ aqua ſolatri: vel abſinthy.

¶ Serapio. ꝯfectio pillulaꝝ de eupatorio ad dolorē epatis icteritiā ⁊ fe. iuuatiuaꝝ. ℞. aloes: ſucci eupatorij: mira. citrioꝝ. an̄. partes eq̄les. ꝯfice cū aq̄ apij. ¶ Iude⁹. qn̄ ex groſſa vētoſitate fuerit dolor epis itrare tinā decoctiōis abſinthy: floꝝ camōille: ⁊ ſq̄nāti eſt vtile valde ſi fe. ⁊ apa nō adſint. Et ex ꝓprys ad idē ſpōgia iſuſa in aq̄ decoctionis abſinthy: eupatorij: ſq̄nāti: aniſi: acori. ⁊ ſpice. Et emplaſtrū ex abſinthio ⁊ oleo ro. in ꝑncipio ⁊ ꝓprie vbi timetur apa ⁊ in ꝑncipio cū ceroto fcō ex eo ⁊ olo͛ de alcāna vl ſtercore capraꝝ montanaꝝ ⁊ olo͛ facto emplo͛ ſm̄ Abo.

¶ Capitulum. xi. de debilitate epatis.

d Ebilitas epatis eſt leſio v̄tutis ⁊ actōis nālis ipſi⁹ ſicut dolor eſt leſio v̄tutis ⁊ actōis eius ſenſibilis. Simplr̄ āt ⁊ ſpāliter ſumi pōt. ⁊ qd ſit vtroqꝫ mō ſumpta ⁊ cauſe eius: q̄ ſint extrinſece ⁊ intrinſece ⁊ q̄ proprie ſunt ei ⁊ ex cōitate alioꝝ mēbroꝝ vicinoꝝ vt fellis ⁊ ſplenis: ⁊ remotoꝝ vt ſtōi iteſtinoꝝ renum veſice. ⁊ ſpūalium vt cordis pulmonis ⁊ diafragmatis: ⁊ aialium vt cerebri ⁊ totius corporis vt in febricitantib⁹ ⁊ algoratis ⁊ reſolutis corporib⁹: ⁊ ēt mēbris currentib⁹ ex eis ad ipm̄: ex qbus maxie ⁊ plurimū ꝯtingat ex cāis ſupra. caplo͛ de debilitate ſtōi. habes. ⁊ ſpāliter ſumpta poteris colligere ex generali. ¶ Sed ſigna ipſi⁹ habes ſumpta: vel ſil: nec nō ⁊ cārum eius in ſpāli ꝓut ea variat ipſi⁹ nā a nā ſtōaci diuerſa iueſtigando ſic vnicuiqꝫ applicabis. Nā ſi qdem debilitatē epatis quis abſolute ⁊ ſimplr̄ patiaꝛ: quē. G. epaticum appellauit. ſigna erunt mutata q̄litas ad citrinū vel albedinem vel viriditatē: ⁊ qn̄qꝫ ad fuſciditatem ꝓut ſupra in ſignis cōplexionū ſtōi: ⁊ epatis fuit dictū. Cum enī color corporis ex rubeo ⁊ albo fuerit admixtus ſanitatē eius ſignificat. Et exeūtia. ſ. vrine ⁊ egō mutata ſm̄ plurimū ꝓpter illud qd̄ ſupra dictū eſt a nāli in colore citrio vl̄ palido rubeo vel glauco: in ſuba ſubtili groſſa ⁊ aquoſa: et ſedimīe multo vel pauco ſm̄ diuerſitatē faciētis cāe: ⁊ ēt actio leſa. nā plurimos coꝝ q debilitatē hn̄t: in ſuo epate cōcomitaꝛ ⁊ ꝓprie cū penetrat cibus dolor leuis extēſus vſqꝫ ad crura. ¶ Si vͦo debilitatem patiaꝛ ſpāliter ⁊ ꝑncipaliter digōnis ipſi⁹: ſigna erūt qm̄ ſanguis egrediēs i flomia erit aquoſus: qm̄ mēbris nō vniꝛ nec aſſimilaꝛ: q̄re iflāmaꝛ ⁊ ꝓprie facies ⁊ oculi. Etiā vrina ⁊ egō ſm̄ plurimū eſt ſicut lotura carnis: qm̄ nō ſeparaꝛ aquoſitas a ſanguine: ſed trāſit ſanguis cū ea vel ſubtile ei⁹ niſi illud ex debilitate retentiue ſit: q̄ tā diu nō retinuit donec digeſtiua perfecte cibū in ſanguinē alteraret. ¶ Et ſigna debilitatis digōnis qn̄ eſt ꝑncipalis: ⁊ qn̄ eſt ex peccato adminiſtrantiū ſupra de debilitate ſtōi habuiſti: aut q2 generatū ſanguinē totum cōtinere nō pōt: ſed pars aliqua egrediꝛ nō retenta cum vrina vel egeſtione: vn̄ ſeq̄tur ſicut dixit. Ha. fluxus ſanguis: ⁊ ꝓprie vrina ſanguinea. ¶ Inq̄t Abo. ⁊ eſt ꝑterea cum egritudib⁹ acutis ſanguīcis: vrina ſic ſanguis ipſe emittiꝛ apertiōe vene in ea nō exn̄te: ſignificat repletionē ſanguis ſupfluā: ⁊ talis fluxus lōgus in ꝓceſſu nō mutaꝛ: ⁊ ſit in hn̄te cōplexionē calidā coleric⁹ virulentus: deide ſic fex ⁊ ſic ſanguis nigrefactus aduſtus: ⁊ i habente cōplexionē frigidā ſit ſicut ſanguis nigreſcēs cōgelatus dn̄s ab aduſto in multitudīe opacitate ⁊ obſcuritate nigredis ⁊ doloris ꝑuatiōe ⁊ ꝑueniūt ambo ſimꝛ ad fluxum diuerſoꝝ coloꝝ in fine: ⁊ illud oſtēdit q͛ digō ſit mutata ad corruptionem. ¶ Et ſi egeſtio fuerit alba ⁊ vrina ꝓprie alba tranſlucens erit ſignū q͛ eius digō omnimode ſit ablata. vnde debilitas corporis ſeqꝛ mlta: nec erūt ſigna ſuperfluitatis cū non ſuperfluere poſſit vt ſupra de debilitate ſtomaci eſt oſtenſum. ¶ Debilitatē aūt attractiue ſpāliter ⁊ ꝑncipalr̄ ſignificat egeſtio chiloſa: niſi ſit ꝑꝑ oppilationem meſeraicaꝝ c⁹ ſignū diſtinctiuū ē: qm̄ in oppilatione eaꝝ citius egrediꝛ chiloſa egō: ⁊ eſt groſſior ꝑꝑ ſubtile chili: qd̄ tractū fuit ad epar groſſo nequiuit penetrare: ⁊ eſt minoris q̄ntitatis ꝓpter hoc. Et qn̄ cū hoc fuerit vrina tincta ſignificat q͛ nocumētū eſt in attractiua tantū: nō in digeſtiua: vrīa. n. ē magis ſignificatia dbilitatis digeſtiue: egō aūt magis attractie. Et certificat debilitatē digeſtiue debilitas corpis: debilitatē vero retentiue ipſi⁹ ſpāliter ⁊ ꝑꝑe ſignificat q͛ ab epate feſtinat expulſio cibi: qm̄ ad debilitatē vni⁹ ſeq̄tur fortitudo alteri⁹ ⁊ ecōuerſo vt ait. G. Quo expulſo āteqꝫ fiat hūoꝝ gn̄atio ſeqꝛ ſupfluitatū triū miōratio nō tātū hūoꝝ ⁊ ēt vrīe ⁊ tincture eius. ⁊ ēt tinctura egōnis minoraꝛ: qm̄ colera nō gn̄aꝛ q̄ tingat vtrūqꝫ. ⁊ minoraꝛ ēt neceſſitas ſurgēdi ad ſellam cum colera nō tranſmittaꝛ ad inteſtina: q̄re perducit qn̄qꝫ ad colicā: ⁊ mlta cū nō genereꝛ ad ſplenē nō trāſmittitur: nec de eo ad os ſtomaci vt excitet appetitū quare minoraꝛ. Et apparēt ſigna debilitatis digeſtiue ex debilitate

ipſius: ⁊ ſunt qꝛ nutrimētū perueniens ad membra eſt illaudabile iperfecte digeſtū ⁊ aquoſum: q̄re nō bene vnit̄ nec ꝯuertit̄ in mēbra: ſed ſupfluēs in eis cauſat iflationē cū mollicie: ⁊ colore ſubalbido. Et q̄nqꝫ pducit ad hidropiſim. Sed ſigna cauſaꝝ ꝺbilitatis abſolute: ⁊ ſpecialiter ſumpte extriſecaꝝ ⁊ itriſecaꝝ ⁊ pparū: ⁊ ex cōitate exiſtētiū ex ſignis p̄dictaꝝ cauſaꝝ eius cognoſcere poteris: nec nō ⁊ curā. ❡ Cura ergo ītuere illic ⁊ illa reducas in hunc locū: ⁊ put oꝫ curā cū pprijs opare p̄dictis ſimplicib⁹ ⁊ cōpoſitis: ⁊ que hic ſubiūgem⁹ cū auxilio yh̄u xp̄i oipotētis: cui⁹ nomē ſit per īfinita ſecula benedictū. ❡ Medicamē bonū ad debilitatē epis Abo. ℞. lacce ablute: ariſtologie aloes: añ. ʒ. iij. ſucci eupatorij: ſemis feni. ⁊ attriplicis: ana. ʒ. v. abſinthij romani. ʒ. vij. ſemis endiuie ⁊ aneti: añ. ʒ. v. ſe. apij. ʒ. iiij. fiant ex eis trociſci: aut ſuſuf. ❡ Aliud medicamē. Hali. exptū. ℞. paſſularum enucleataꝝ: aur. xxv. croci aur. i. ⁊. ſ. calami aro. aur. ij. bdelij iudaici. ʒ. ij. ſ. cinamomi aur. i. caſſie. aur. ſ. ſpice aur. iij. ſqnāti aur. ij. ſ. mirre aur. iiij. gūmi albotin aur. iiij. darſeſahan aur. ij. mell' aur. xvi. vini q̄ntū ſufficit. Et q̄nqꝫ ponit̄ in ipo opiuꝫ: ⁊ ſemen iuſqami cū aſſociata ē ꝺbilitas caliditati: ⁊ pp hoc filoniū ꝯuenit. Et extimauit. G. ꝙ hoc medicamē ē ex ꝯueniētib⁹ ei cū ſuis pprietatib⁹. ❡ Euaporatio ꝯferēs valde. ℞. cinamomi: caſſie: añ. ℥. ſ. ſpice. ʒ. i. ſube abſinthij: eupatorij: añ. ʒ. v. buliāt in vino odorifero: ſtiptico: i quo ſint cōmixte tortelle: ⁊ addat̄ olei de neriden. ℥. i. ⁊ infuſa lana fiat euaporatio ſi debilitas ex cā fuerit frigida. ❡ Siv̄o ex calida fiat hoc. ℞. endiuie cū radicib⁹. M. i. ſandali vtriuſqꝫ ſpodij: añ. ʒ. ij. cuſcute: florū abſinthij: añ. ʒ. vi. buliāt in aq̄ ro. cū ſucco granatoꝝ muçoꝝ: vel paꝝ aceti: ⁊ predicto mō fiat euaporatio. ❡ Emplꝫ bonū ad idē i cā calida. ℞. roſaꝝ ppurioꝝ vitis albe: cimarū rubi. añ. M. i. violaruꝫ ʒ. ſ. ſpodij: ſandali endiuie: floꝝ ſquināti: añ. ʒ. ij. ⁊ ꝯfice cū oleo ro. ⁊ cera. ❡ Emplm̄ bonū in cā frigida. ℞. cipi. maſticis: ſpice: thuris: galie nucis cipreſſi: añ. ℥. ſ. cimaꝝ ſqnāti: aniſi: feniculi: apij: ſemis: añ. ℥. iij. muſci. ʒ. i. aceti. ℥. i. ſuc. eupatorij. ℥. ij. olei de reubar. ⁊ cere qd̄ ſufficit: ⁊ q̄nqꝫ additur aloes. ❡ Inquit Abo. cū vides ipreſſionē debilitatis epatis ꝑuenietē ad digeſtionē: ꝯfortat cū his in qbus ē ſtipticitas ⁊ caliditas cū mēſura: ⁊ aromaticitas. Et ſi in eis maturatio ſit: ſicut ſunt medicīe ꝯpoſite ex his: vt ſpica folii: nux muſ. coriādꝝ vl' cardamomū: maſtix: calam⁹ aro. ciperi: ⁊ ſilia. Et ſi fuerit ꝑueniēs ad retētiuā adde i ſtipticitate: ⁊ minue de calefactōe: aut ꝯforta huiuſmodi medicinas cū medicis ꝯpoſitis ei: cū īfrigidatiōe: ſic̄ ſūt balauſtie roſe hipoqſtidos: ⁊ ſimiles. Et ſi ꝑuenerit ad attractiuā: ꝯforta cū eis i qb⁹ eſt parua ſtipticitas ea mēſura que ꝯſeruet v̄tutē epatis: ⁊ ſit in eis caliditas ⁊ aromaticitas q̄ ex p̄dictis eligere debes ſimplices ⁊ ꝯpoſitas ſm̄ moduꝫ approximatas ſtudēdo in aptiōe oppilationū: Et ſi ꝑuenerit ad expulſiuā ꝯfortabis cuꝫ calefaciētib⁹ aromaticis: ⁊ ⁊ hūectātib⁹. Et calefac renes: ſplenē ⁊ viſcera: ⁊ aperi oppilatōes. his p̄dictis medicis obuiabis malitie ꝯplexiōis a qua plurimū ꝺbilitas abſoluta ⁊ ſpālis ꝑuenit. Et qꝛ ex oi malitia ꝯplōnis ꝑuenire poterit ſtudebis ipam cognitā cū p̄dictis alterare: ⁊ cū dieta extenuatiua vl' reſūptiua ſibi: put oꝫ: ⁊ vbi pſpera iuenies: ſi xp̄s voluerit. ❡ Hali. elm̄ valēs ad ꝺbilitatē epis mūdificat canales ei⁹ ⁊ fell'. ſubtiliat hūores: ꝑuocat vrinā: ꝯfortat epar ꝯfortatōe magna. ℞. lignialoes: roſaruꝫ: ſpice nardi: cinamomi. añ. ʒ. ij. lacce: reubar. gariofi. añ. ʒ. ſ. aſari: ani. maiorane: maſticis: granoꝝ balſami: añ. ʒ. iij. ſu. meu. ſquināti: ſpodij: añ. ʒ. i. camepitheos: cuſcute: añ. ʒ. i. ſ. Cōficiant̄ cū aq̄ ſyrupo de lignoalo. aqua ro. ⁊ çuccaro. doſis a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij.

❡ Capitulum duodecimum de caceſia: ⁊ eſt qualitas mutata.

c Aceſia ſm̄ Ax. gn̄al'r ſumpta ē mala corpis diſpō quā ſequit̄ egritudo. Special'r aūt ē mutata qualitas. ſeu habitudo corpis añs hidropiſiꝫ. Cuius cā mediata eſt debilitas epatis: ⁊ pprie digeſtiue ei⁹: cui⁹ cās imediate pmiſim⁹. Cū. n. debilitat̄ ipi⁹ digeſtiua ſanguis gn̄atio fit fl'atici ⁊ aquoſi: cū digō ſcd̄m. G. iſpiſſando ꝓcedat: q mēbris nō vnit̄. vt ait. G. q̄re remanet i facie iporū: ⁊ ſupfluēs hitudinē ipoꝝ imediate nālēꝫ pmutat: alterat ⁊ iflat: ⁊ tunc d̄r caceſia. Et cū ſupfluit ita ꝙ fl'a vel aqua adeo vincat in ſanguīe: ꝙ nā ſegregare nequeat: ſꝫ trāſeat cū ſanguine ad mēbra: ⁊ i coꝝ vacuitatib⁹ aggreget̄: ſeq̄t̄ hidropiſis: d̄ns a caceſia i q̄nto ei⁹: qd̄ ē ex toto gn̄e preter nām: ⁊ cognoſcit̄ ex pmutatiōe coloris corpis ⁊ faciei ad albedinem ⁊ citrinitateꝫ: ⁊ apparet iflatio in palpebris: ⁊ extremitatib⁹ manuū ⁊ pedū: ⁊ q̄nqꝫ ſpargit̄ in totū corp⁹ ita vt fiat ſicut maſſa in q̄ ipreſſiōes dimittunt veſtigia ⁊ ꝯcauitates. Et q̄nqꝫ appetit⁹ mutiplicat̄ ꝓpter flegmatis acris multiplicationeꝫ ex debilitate digōnis. Et quādoqꝫ debilitat̄ appetit⁹: ⁊ creſcit ſitis cū digō corrūpit̄ in ꝓceſſu: ⁊ feroſe: ⁊ nitroſe ſupfluitates veniūt ad ſtōꝫ: ⁊ accidūt tūc vigilie. ⁊ i cōmiſſuris ⁊ gigiuis cal'itas: ⁊ prurit⁹ pp vaporē corruptū aſcēdētē. ⁊ minorat̄ vrina ⁊ ſudor: ⁊ multiplicat̄ vētoſitas ex q̄ accidit iflatio in mirach: ⁊ deſcēdit ⁊ inflat̄ burſa teſticuloꝝ: ⁊ cū accidit i coꝝ corporib⁹ vlcus fit difficil' ꝯſolidatiōis pp ꝯplōnis corruptioneꝫ ⁊ hūiditatis abūdātiam. Cura caceſie eſt due res. vna ē epatis cōfortatio ⁊ digeſtiue ei⁹ pprie: nec nō ⁊ alioꝝ. ſ. ſtōi ⁊ membroꝝ: vt māe nō generent̄. Alia eſt exiccatio gn̄ate hūiditatis multiplicate in ſanguine. ❡ Primā rē cōplēt que i p̄cedēti caplo habuiſti: ⁊ i cura debilitatis ſtōi ⁊ digeſtiue ei⁹: illa ergo p te videas. ❡ Scd̄aꝫ rē ꝯplebis cū his q̄ i cura male ꝯplōnis ſtōi hūide meri ⁊ epis dixim⁹: ⁊ ſpecial'r ⁊ pprie cū euationib⁹ hūiditatū p oēm regionē ꝯueniētē ei: puta p ſeceſſuꝫ: ⁊ hoc cū cliſterib⁹ ⁊ abſterſiuis cū apitiuis ſubtiliātib⁹ ⁊ icidētib⁹: ⁊ ꝯfortātib⁹: ⁊ foluētib⁹ in p̄ncipio cū facilitate. Deide cū fortiorib⁹ q̄ ſunt ex predictis nota cū farmacijs: ⁊ pprie ex yera Hali. factis ſi caliditas fuerit mixta: vel cuꝫ yeris magnis. ſ. col'oqntide pp fl'a. ⁊ yeralogodion: ruffina ⁊ alijs. Mūdificāt. n. hec ſāguinē ⁊ mēbra p̄dicta a ſupfluitatib⁹ abſqꝫ hūiditatib⁹ inanitis. Flebotomia aūt i hoc locū nō hꝫ: niſi raro. ſ. cuꝫ debilitas fuerit ex repl'one ſanguīs: vl' retētiōe: ⁊ ꝓpe mēſtrualis in mulierib⁹: ⁊ hemoroidalis i viris: ⁊ tūc i p̄ncipio locuꝫ hꝫ anteq̄ debilitas creſcat: ⁊ i pauca q̄ntitate: ⁊ diſpartita: donec ꝯpleat̄ idigētia: ⁊ v̄t⁹ meli⁹ tolleret: ⁊ cū vomitu ꝓuocato cū his q̄ nām reſpiciūt ppriā: q̄ ſupi⁹ i cura ſtōi dcā ſūt. Et cū ꝓuocātib⁹ vrinā hic ſupra i cura oppilationis ⁊ apatis epis dictis: ⁊ ſudorē ꝓuocātib⁹: vt ſunt vnctiones potiōes: ⁊ balnea naturalia termaꝝ: ⁊ artificialia ſicca nō hūida. Fricatōes: ⁊ exercitia ſupra i cura ſtōi dcā: ⁊ cū regimine exiccatiuo in oibus nō naturalibus reb⁹ ſuperius declarato: que omnia infra in cura hidropiſis ſerioſe ſpecificata ſubiungemus duce chriſto.

❡ Capitulum tertiumdecimum de hydropiſi.

b Ydropiſis vario mō notificat̄. a Ioānitio. n. ꝙ ſit mala ꝯpl'o hūida mālis. ab Abo. apa aquoſum vl' egritudo male ꝯpōnis i q̄ntitate ſupfluitatis magnitudis mēbroꝝ. a G. ꝙ eſt diſpō. vel mala q̄litas ſeu habitudo corpis ſeq̄ns peccatū digōnis: ⁊ vnionis actꝫ. nutritiue v̄tutis. Nec mirū cū ſm̄ cū nihil mirādū. eadeꝫ ſigna tres hr̄e rōnes in d̄ntib⁹ habitudib⁹. ⁊ ſana ⁊ egra et neutra dici. ſil'r eandē egritudinē diuerſis ꝯſideratōib⁹ i diuerſis gn̄ib⁹ egritudinū ⁊ diuerſis p̄ter nām reb⁹ reponi nō eſt mirabile. Cuiuſcūqꝫ āt gn̄is ſit: tres ſūt ei⁹ ſpēs. ſ. aſclites hypoſarca. ⁊ timpāites. hypoſarca v̄o anaſarca ⁊ leucoflantia ſinonima ſunt ſpēi ſe. Eius aūt cā duplex

eſt:cōis ⁊ ꝓpria vnicuiqꝫ ſpēi. Cōis eſt qncuplex nāl': loca
lis efficiens formalis ⁊ finalis. Materialis eſt mā frigida
ō gn̄e flegmatis aquoſa vel vētoſa. Localis eſt vacuū vē
tris. iter girbū ⁊ ſiphac. in quo mā ꝑdicta colligiť aut ſpō/
gioſitas mēbroꝝ corporis vniuerſi. Efficiēs ē triplex cōiun
cta añs: ⁊ ꝑmitiua. ꝯiuncta ē duplex: vere ⁊ q̄ſi vere. ꝯiun
cta eſt mā ipa frigida mēbra alterās: ⁊ i tumorē eleuans.
q̄ſi ꝯiuncta eſt debilitas epatis: ⁊ digōnis ei⁹ ꝯtinue illam
materiam regenernas: dicēte Hali. omnis hidropiſis cau
ſa pp iſortuniū ſanguificatiōis ē fiēs. Añs ē mala diſpoſi
tio epatis: ⁊ alioꝝ mēbroꝝ digōnis de gn̄e male ꝯpl'onis
pure. vel hūoralis ex ſe: vel vicinitate ſol'o ꝯtinui ⁊ apa ha
bēs efficere nocumētū in digōne. Primitiua ē oīs cā exte
rior nocumētū in digōne iprimēs: ⁊ debilitatē maiorē q̄ꝫ i
caceſia ꝑdicta. que ſuperius dicte ſunt hic: ⁊ ſupra de cura
ōbilitatis ſtomaci: ⁊ digōnis ei⁹. Cauſa aūt formalis ē ſua
eēntia habita per notificationē ipi⁹. Cauſa finalis eſt vt
deſtruat totalr̄ digeſtiuā epis: ⁊ ad iteritū ꝑducat: ⁊ pluri/
mū ita eſt cū fuerit antiquata ⁊ ꝯfirmata: ⁊ ꝓprie aſclites
deinde timpanites: deīde hypoſarca: vt ifra patebit. Cā
aūt ꝓpria vnicuiqꝫ ſpecieꝝ ei⁹ ex varietate cauſaꝝ ꝑdicta
ruꝫ pōt aſſumi. Cū. n. epar ⁊ digeſtiua ei⁹ fuerit debilitata
ꝑncipalr̄: nō tn̄ multū. qꝛ generet ſanguinē: ſꝫ flegmaticū
qꝛ traſiens ad mēbra digōnis tertie ifrīdata nō ꝑfecte co
quiť: nec in ſanguinē ꝯuertiť purū: ſꝫ in flegmaticū poti⁹.
quare eis nō vniť: ſed ſupfluēs coꝝ ſpōgioſitates replet. ⁊
cū nō poſſit reſolui ⁊ multiplicať: ⁊ ea eleuat in tumorem
⁊ tūc efficit hypoſarcā. q̄ cū a ōbilitate digōnis minori ꝓ/
cedat. ⁊ cām cōiunctaꝫ ⁊ diffuſaꝫ habeat in oībus mēbris
minoris periculi erit. Et lꝫ aquoſitas ⁊ vētoſitas ſint dif/
fuſibiles magis q̄ꝫ flā per oīa mēbra: tn̄ qꝛ ſunt facile re/
ſolubiles: ita diffuſe ⁊ nō ꝑmanēt hypoſarcā: q̄re nō va/
lebūt ſicut flaticitas ipa. Cū v̄o epar ⁊ digeſtiua ipius fue
rit debilitata ꝑncipalr̄ ⁊ in ſe: ⁊ fuerit augmētata valde et
ꝑfecte adeo q̄ nō gn̄et ſanguinē flicuꝫ: vt ꝑus: ſꝫ oīo eius
ꝯtrariū: qđ eſt aquoſitas q̄dā ſupabūdās multū i ſangui/
ne pauco nec poſſit ſeq̄ſtrari ab eo: ⁊ expelli ad ꝯſuetas re
giones: aut pp debilitatē expulſiue epatis: ⁊ attractiue re
nū: aut pp multitudineꝫ ⁊ abūdantiā ei⁹: aut pp viaꝝ ob/
ſtructionē: nec mēbra illā trahāt cū abhoreāt: remanens
in epate cū nā ſibi illā nequeat ſuſtinere ꝑ reſudationem
q̄dā ꝑ poros velaminis ei⁹ trāſit in vacuū vētris: ⁊ ibi col
ligiť: ⁊ tūc efficiť v̄a ⁊ ꝓpria hidropiſis: que aſclites dr̄: q̄ ē
aquoſitatis collectio. Et qꝛ mā ei⁹: q̄ ē cā ꝯiūcta ſimul col
lecta ē: ⁊ a cā maiori: ⁊ q̄ſi ꝑfecta debilitate ꝓcedēs: iō ma
gis ꝑiculoſa dignoſciť: ⁊ quoqꝫ qꝛ ſpūalib⁹ eſt magis ꝯiun
cta. Cū v̄o debilitas digōnis icipit in ſtō: pp aliq̄ꝫ ſuaruꝫ
cauſaꝝ: fueritqꝫ caliditas ſtōi ⁊ iteſtinoꝝ debil' in ſe: vl' lꝫ
in ſe fortis: debilis tn̄ reſpectu cibi. qꝛ fuerit groſſus viſco
ſus: vel naturalr̄ vētoſus multiplicabiť vētoſitas i eis cū
aliq̄li hūiditate pp diminutā decoctionē cibi: q̄ tranſiens
ad epar nō corrigiť i eo pp debilitatē ipi⁹ ex ꝯpaſſiōe grā
di ad ſtōꝫ: ſic̄ ſupra de ōbilitate ſtōi. auctoritate. H. ē dcm̄.
Et cū hoc nō poſſit expelli aliq̄ ꝓhibēte cā: nec nā valeat
tollerare ibidē ſubtilitate ſua penetrabit per poros vela/
minis in vacuū vētris: ⁊ ibi faciet iflationē: q̄ improprie ⁊
abuſiue dicta ē hidropiſis ad ſiītudinē tumētis vētris in
hydropiſi: ꝓprie tn̄ a modernis dr̄ timpanites a ꝓprieta/
te timpani: qđ ꝑcuſſum reſonat pp ꝑcuſſionē aeris: ꝑ pel/
lis extēſioneꝫ. ab antiq̄s v̄o ſicca dr̄ hidropiſis cum vētri
nō iſit aquoſitas aliq̄: de q̄ ſit curādū: imo vētoſitas ſicca
q̄ a caliditate ꝓceſſit: ⁊ hidropiſis v̄a a frigiditate ꝓcedat.
vnde hyp. ipam idropē noīauit ſiccā: que cū a debilitate
minori digeſtiōis ꝓcedat: ⁊ a caliditate min⁹ deficiēte q̄ꝫ
aſclites: ⁊ maiori q̄ꝫ hypoſarca: ⁊ cauſa eius coniuncta ſit
magis reſolubilis tenebit medium in inferendo pericu/
lum ⁊ mortem inter predictas ſpecies eius ¶ Signa: hi
dropiſis quoqꝫ ſigna habet cōmunia: ⁊ propria. Cōia v̄o
ſunt duplicia: q̄dā ſunt cōia ſpecieb⁹: inq̄ꝫtū hmōi: ⁊ q̄daꝫ
ſunt cōia eis iq̄ꝫtū ex cōib⁹ cāis ꝓcedūt. Prima ſūt ex p̄te
qualitatis mutate. qꝛ coloris alteratio ad citrinū: palidꝫ
viride: ſeu nigrū ⁊ iflatio palpebraꝝ. ⁊ oculoꝝ pp cām ſu
peri⁹ dictā iflatio extremoꝝ: ⁊ ꝓprie pedū pp elōgationē
a fonte caloris pp motū ⁊ ſitū eoꝝ ifimū: ⁊ pp māe grau/
tatē ⁊ fe. tepida plurimū. Et ſunt alia ex actōe leſa. vt ſitis
clamoſa. a q̄ nō euāť: cui⁹ cā ē triplex. ꝑma ē ꝓpria paſſio
ſtōi. ⁊ nutritiuoꝝ ex q̄litate nitroſa ⁊ acuta. aquoſitatis co
lecte i eis que iflat ⁊ exiccat ea. Scđa cā ē ꝯpaſſio coꝝ ad
ſpūalia: ⁊ ē ꝯſtrictio anhelit⁹: ⁊ iflāmatio ſpūaliū ex vapo
rib⁹ aſcēdētib⁹: vt i aſclite ⁊ timpanite: ſicut dicit Hal. vel
pp mām crudā in ſpūalib⁹ aggregatā. ſicut i hypoſarca.
Et tertia ē. qꝛ potus aq̄ nō penetrat ad mēbra exiccata. vt
ponit Abo. pp oppilationē q̄ ꝑcedit: vel cōcomitať pluri/
muꝫ: vel ſeq̄tur neceſſario. Et paucitas appetitus cibi niſi
accidat a frigiditate epis: vt cū ꝓuenit ex potu aq̄ frigide
ſupfluo i hora nō ſua. Et alia ſūt ex exeūtib⁹ a corpe. Nā i
oīb⁹ ſpēb⁹: ⁊ ꝓprie in aſclite minorať vrina: ⁊ i plib⁹ diſpo
ſitionib⁹ rubet pp ipotētiā ſequeſtratiōis ipius a ſanguie
⁊ col'a ru. nō ergo oꝫ vt iudiceť ꝑ tincturā vrie ⁊ rubedinē
ei⁹ caliditatis hidropiſis frē: nec col'ice frē: nec oppil'onis
ex frigidis hūorib⁹: ſicut nec ꝑ ei⁹ albedineꝫ frigiditas fe.
acute ⁊ freneſis. vt ait Abo. ¶ Et ml'totiēs accidit eis ho
thor: q̄ erupte emittūt aq̄ꝫ citrinā. ⁊ multiplicatio egōnis
ſanguinolēte: ⁊ ꝓprie i hypoſarca ⁊ timpanite. Et breuiter
ſigna cōia ſpēb⁹ hidropiſis ſunt cōia ſignis caceſie: ⁊ cadē
ſpē ſcđm plurimum. drn̄tes tn̄ in q̄ꝫto: ſicut ⁊ cāe. ſi. n. ſint
parue demōſtrāt caceſiā ꝑſentē: ⁊ ꝓnoſticare futuraꝫ hi/
dropiſim: ſi v̄o augeanť demrāt hydropiſim ꝑſentē tn̄.
Cōia v̄o ſigna iq̄ꝫtū ex cāis oīb⁹ ꝓcedūt ſunt. Nā ſi fuerit
ex ꝓpria epis paſſiōe debilitāte ipm ⁊ digeſtiuā ei⁹: ſigna
ſunt i eo icipiētia ⁊ perdurātia. Et ſi q̄dē ſit mala ꝯplexio
calida: ⁊ egritudo acuta debilitās ipam ſigna ſunt iflāma
tio ⁊ fe. plurimū tepida. qꝛ effimera pp dictam cām. ſitis.
amaritudo oris: citrinitas coloris: caſus appetit⁹: vōit⁹ co
leric⁹ viridis: ⁊ citrin⁹: vrina citrina: nō nc̄ario pp cām di
ctā. Et ſi ſit caliditas liquefaciēs: ſigna erūt liquefactōes
in vrina ⁊ egōne: ⁊ anteceſſio vrine. ⁊ egōnis lauatiue ⁊ vi
rulēte. Si v̄o mala ꝯplexio fuerit frigida: ſigna erūt ꝯ̄ria
Et ſi q̄dē cauſa debilitatis fuerit mala ꝯpō: puta oppil'o
ſigna ꝑcedēt oppil'onis ꝑdicta. Si v̄o ſol'o ꝯtinui ſigna ſo/
lutiōis preibūt. Si ēt apa. ſigna apatis ei⁹ iaꝫ dicta: ⁊ tuſ/
ſis. Si v̄o debilitas cā ſit ex cōpaſſione ad aliud mēbruꝫ.
ſigna paſſiōis mēbri illi⁹ precedēt: ⁊ debilitas erit varia/
tionē recipiēs ſm̄ itēſionē ⁊ remiſſionē illi⁹ paſſiōis. Et ſi
q̄dē fuerit ex ꝯpaſſione ad aialia ⁊ ſpūalia. ſigna egritudi
nū illoꝝ precedēt. Si v̄o ad nutritiua: ⁊ illa ꝑcedent ſigna
egritudinū iteſtinoꝝ. qꝛ colica ⁊ ileon. ⁊ ſi ex cōpaſſiōe ad
renes precedent ſigna egritudinum renum diuerſarum.
⁊ ſi ex compaſſione ad ſplenem precedent ſigna egritudi/
nis ſplenis. ſ. debilitatis ⁊ oppil'onis plurimū: ⁊ color decli
uis ad viriditatē. ¶ Signa ꝓpria ſunt ēt duplicia: quedā
ſunt ꝓpria vnicuiqꝫ ſpēi: ⁊ quedā vnicuiqꝫ ſpāli cāe. ꝑma
ſunt. nā in aſclite ſunt grauitas ſenſibilis cū tumore ma/
gno i vētre: ⁊ cū ꝑcutiť nō ſonat: ſꝫ cū cōmoueť audiť ſo/
nitus aque cōmote: ⁊ tact⁹ eius eſt tactus vtris pleni aq̄
nō iflati: ⁊ mēbra: ⁊ extrema in eo nō fiunt grauia ⁊ tumi/
da: ſicut in hypoſarca: imo ſi inflanť in ꝑncipio ei⁹. in fine
areſcūt ⁊ iflať virga ⁊ teſtes: ⁊ eſt paucitas vrine ⁊ pulſus
eſt paru⁹ frequēs tendēs: ad mollicīē pp humiditatem.
Et qn̄ aſclites eſt eueniēs ſubito: poſt lapidē renū exeūtē
abſqꝫ cauſis in epe manifeſtis: ⁊ alys mēbris: tūc ſcias q̄
vna duarum viarum. ſeu pororum vritidum eſt diſrupta.

In hypoſarca autem apparet inflatio in corpore toto: ⁊ in
extremis mēbris ⁊ facie ⁊ proprie oculis ⁊ ꝓſſio cū digitis
relinqt foueā in eis. Neqꝫ eſt de īflatione in vētre eius ⁊
ſumine illud qḋ ē ī aſclite: ⁊ tīpanite. Et ſcḋm plīmuꝫ ſeq
tur cā fluxus ſanguinolētus: ⁊ lenitas nāe tēdens ad albe
dinē: ⁊ pulſus ē magis mollis: q̄ꝫ in alijs ꝓp diffuſaꝫ hūidi
tatē in mēbris ⁊ brachijs. Sꝫ in tīpanite egredit̄ ſumē: ⁊
vmbilicus multuꝫ: ⁊ tēſio ſine grauitate: ⁊ cum ꝑcutit̄ ſo
nat: vt timpanū nō gurgulat: ⁊ mēbra extrema nō ſunt in
flata: imo tēdūt ad rarefactionē: vt eſt appetens eructua
tionē q̄ iuuat̄ ⁊ exitu vētoſitatis. ⁊ pulſus ē lōgior ⁊ durior
q̄ꝫ in alijs. imo ē ſicut ſpaſmoſus. Signa ꝓpa vniuſcuiuſ/
q̄ ſpēcāe ex ꝑdictis ſunt manifeſta q̄ per te diſcernas. Hidro
piſis quoqꝫ ſignificatiōes: ⁊ iudicia hꝫ ꝓpria ⁊ cōia. Cōia ⁊
ex pte antecedētiū: ⁊ ex pte cōcomitātiū: vel cōitātiū: ⁊ ex
pte ꝯñtium. Antecedētiū. ſ. cauſaꝝ. Nā q̄ accidit a cā ꝓpa
epi que plurimuꝫ eſt mala ꝯplō deterior ē ea q̄ accidit ex
cōitate. ⁊ cōpaſſione: ⁊ que ex cōpaſſiōe eſt plurimū eſt ex
lūbis ilijs. ⁊ renibꝰ. ⁊ q̄ accidit ī egritudine acuta deterior
ē. vnde hyp. oīs hidrops in acuta egritudine malū. īfeſtat̄
enī ſe. grauedine ⁊ dolore. cōſurgit aūt ex lūbis ⁊ ilijs: ⁊ ēt
ab epe. Ex pte cōitantiū. ſ. circūſtantiaꝝ: nā que cū ſimili/
bus accidit leuior ē in via gn̄atiōis. ꝑiculoſior vō via cura
tiōis. At que ex cā calida ꝑuenit. ꝑiculoſior ē via vtraqꝫ. ſ.
gn̄atiōis: eo q̄ frigidus morbus exiſtēs a ꝯ̄ria cauſa proce
dit ⁊ ī mēbro calido. ſ. epe fit. Et via curatiōis cū mā hidro
piſis: ſeu cā ꝯiuncta exigat calida: ⁊ cura cāe q̄ſi ꝯiuncte. ſ.
caliditas ꝯtraria regrat ⁊ frigida: ⁊ ꝯtraria ē. ⁊ ꝯpoſita cu
ra. Ex parte vō ꝯñtium. Nā ſi ſupueniat fluxus vel vrina
educēs māꝫ hidropiſis de loco ſuo. bonū erit ꝑ viā ſigni ⁊
cāe. Si vero nō. ſꝫ ex cōpaſſiōe alioꝝ mēbroꝝ fuerit ma
lū eſt. Itē ſi tuſſis ſupueniat. malū ſignū. vnde hyp. hidro
picus ſi tuſſim habeat. deſperatꝰ ē. H. n. oſtēdit ꝯpaſſionē
ſpūaliū ad mēbra nutritiua ex māe exuberantia: ⁊ trāſla/
tiōe ad ſpūalia. ¶ Pria aūt iudicia ſunt duplicia. ſ. ꝯpara
tionis: ⁊ abſoluta. ꝯparatiōis ſunt. nā aſclites ꝑiculoſior ē:
deide hypoſarca ꝓp dictā ſuperiꝰ cām. Abſoluta vō ſunt:
nā ſi aq̄ ꝯuerſa in vaporē per vritides trāſlata fuerit ī ve/
ſicā. vt multiplicet̄ vrina: vel ꝑ īteſtina in cōcauū coruꝫ: ⁊
extra ducat̄ ſolō ſeqt̄ ipiꝰ aſclitis. vnde hyppo. qbuſcūqꝫ
īter renes ⁊ vētrē flā cōcludit̄: ⁊ dolorē preſtās non hñs
exitū in vētre: hīs ſcḋm venas in veſicā ꝯuerſo flāte. i. aq̄
ſolō fit mōbi. ⁊ dr̄ q̄ qñꝫ accidit hñti vlcera īteſtioꝝ. vt vē
ter eiꝰ īflet̄ ſic aſclitici ꝓp effuſionē egōis ad vētrē eiꝰ: ⁊ ñ
morit̄. niſi ī lōgiquo. Sꝫ expiētia dictat nō eē veꝝ cū illō
mors antecedat: ⁊ ꝓprie cū vlcus: ⁊ eruptio fuerint ī ſupio
ribꝰ. Et multotiēs epar īplet̄ aq̄: ⁊ fiūt in pāniculo eiꝰ veſi
ce: ⁊ cū rūpunt̄ currit aq̄ ad pāniculū ītrinſecū ſiphac: ⁊ vē
ter īplet̄ aq̄: ⁊ morit̄ ſic dixit hyp. in affo. Et ꝓprie ſi nō fue
rit educta. Et cā ē quā. H. dicit. qḋ eſt. q̄r hec aq̄ deterior ē
in ſua ſuba aq̄ aſclitis: q̄re corrūpit̄ in ſpatio: ⁊ īficit vapo/
re ſuo. Et qm̄ epatis tunica ipm̄ ꝯtinens eſt corrupta. In
hypoſarca ſi qdē dyaria ſupuenerit fortis ſoluit egritudi/
nē: vt dixit Hyppo. In timpanite ſi qdē ꝑcutiat̄ venter
manu: ⁊ reſonat ſic̄ timpanū eſt ſignū malū. Eruptio vē
toſitatis ꝑ os ⁊ anū ſi ſit cōtinua: ⁊ multa bonū. Regimē
ſiue cura hidropiſis duplex ē: cōe. ſ. ⁊ ꝓpriū. cōe aūt cōmu
nicat in re ei qḋ cōuenit caceſie. ſic̄. n. cōmunicāt in cauſa
efficiēte ſcōꝫ rē: ſolū aūt differebāt ī q̄ꝫto: ita ⁊ in cura: que
plīmū vertit̄ ad ptē cāe: dr̄nt tñ in q̄ꝫto. Erit ergo regimen
eiꝰ tres res. pma erit cōfortare digōnē: ⁊ mēbra eiꝰ debili
tata: vt mām nō regeneret. Scḋa ē mām gn̄ataꝫ eūare. ⁊
tertia ē corrigere accidētia. ¶ Primā cōplent res due. ſ.
adminiſtratio reꝝ abſcindētiū cās debilitatis: ⁊ res q̄ cō/
fortare hñt ꝓprie mēbra digōnis: ⁊ totū corpꝰ. Ex qbus
ſunt cibi ⁊ medicine ſimplices ⁊ compoſite ad ſiccitatem
declines ꝓprie. dicit. n. H. Mala cōplexio hūida precedit
⁊ ſeqtur hydropiſis. ſicca aūt ꝑcedit: ⁊ ſeqtur cōſumptio ⁊
macies: quoꝝ oīum ſuperiꝰ tibi noticiā fecimꝰ. ¶ Scḋaꝫ
rē cōplēt due res. pma eſt que mām illā hꝫ educere ꝑ oēꝫ
eūonis modū qui ē q̄druplex ſcḋm iſaac. pmꝰ ē per ſoluti
ua vētris cliſteriçata ⁊ ſuppoſita: ⁊ ſupra ⁊ ꝓuocātia vomi
tū. ſcḋs ē ꝑ diuretica. tertiꝰ eſt ꝑ ſudorē ꝓuocātia: reſoluen
tia: ⁊ euaporātia exiccātia. q̄rtus eſt ꝑ cauteria ⁊ inciſiōes
⁊ flo[?]iaꝫ. Solutiua vētris ꝓuocātia vomitꝰ ſunt. q̄ edu
cere hñt flā: ⁊ aquoſitatē ventoſitatē quoqꝫ extenuare ⁊
reſoluere: q̄ ī nr̄o antidotario ſūt dſcripta: ⁊ ſimplicia: ⁊ cō
poſita: vt ſupra ī ſūma ſcḋa huiꝰ: diuretica: et ſupra hec ca/
pitulo de cura ſcḋm vl'em modū: ⁊ de cura oppilōnis ēt di
cta ſūt. ſudorē ꝓuocātia ſunt fricatōes ⁊ vnctiōes cū aqs
⁊ oleis decoctiōis reꝝ ſeu medicinaꝝ ꝓprietatē ī hoc ha
bētiū: q̄s ſupra ꝑcedēti ſūma caplō de cura aꝑatis ſtōi di/
ximꝰ. Et balnea ſicca aerea nō aquoſa. niſi aquaꝝ ſalſaꝝ
ſulfureaꝝ: aluminoꝝ: ⁊ ſiliuꝫ: vt ſunt termaꝝ ⁊ artificia
liter ꝯſtructa. Reſoluētia: euaporātia ſunt fricatōes mul
te ⁊ aſpere: ⁊ cū exiccātibꝰ vt eſt baurac: ſal nitruꝫ: ſpuma
maris: ſulfur: ſpōgia: ⁊ ſilīa. Et cū rubificātibꝰ vt tapſia: vr
tica: ſtaphiſagrie: ⁊ ſilībꝰ. Emplā vnctōes euaporatōes ex
rebꝰ ꝑdictis: ⁊ reſoluere hñtibꝰ vt: ſunt camomilla: melli/
lotū: feniculus anetū: calamentū: laurꝰ: ⁊ alia ſimplicia ſu
periꝰ dicta. Et ꝯpoſita in antidotario dicta. Et ex eis eſt
ſtercꝰ vaccaꝝ: ⁊ capraꝝ mōtanaꝝ: ⁊ lumacie cōbuſte cum
corticibꝰ ſuis linite ⁊ ſupaſperſe. Sepeliri ī arena: ⁊ reuol
ui ī ea: ⁊ ſub ſole ſtare: ⁊ iuxta ignē: ſeu clibanū ītrare calꝫ
ſufficienter: ⁊ exercitia tempata: prout poterit ſuſtinere:
⁊ exiccātia: vt famis tolerātia: ⁊ ieiunia abſtinētia a cibo
brodiali: ⁊ humido: ⁊ potu proprie: cauteria autem ⁊ inci/
ſiones ſunt de vltimis: ⁊ īciſiones ſunt proprie aſcliti. cau
teriçationes ei: ⁊ hypoſarce. ¶ In quibꝰ omnibus ſic ſe/
cundum ſpeciem diſtinctis attendenda ſunt hec. ſ. locꝰ q̄ꝫ/
titas: tpꝰ: ordo: ⁊ modꝰ. vt Ioānitiꝰ dixit. In ſolutiuis enī
eſt vt īcipias adminiſtrare ea poſt digeſtiuoꝝ ꝑmiſſiōeꝫ q̄
eductiua ſūt flātis ⁊ aquoſitatis: ⁊ ventoſitatis q̄ ſupra in
cura male ꝯplōnis epis ⁊ ſtōi: caplō dicta ſūt īcipiēdo a le/
uioribꝰ in q̄ꝫto: ⁊ vtute. ⁊ ſilibꝰ: ⁊ ſi expediat ꝓcedere grada
tim ad fortiora ⁊ ꝯpoſita: pꝰꝫ nā tollerare valuerit: ⁊ prio
cū colirijs ⁊ cliſteribꝰ: deide dare ꝑ os. Et ſit eis admixtū
ſtipticū aromaticū: vt eſt xiloalo. crudū qḋ ꝯfortet robur
ſtōi ⁊ membroꝝ: q̄ ſūt minera vtutū: ⁊ a malitia taliū far/
macorū defendat: ꝓp qḋ debent rectificata adminiſtrari
ꝓut ī ꝓprio loco diximꝰ. ſitqꝫ hora qetis ⁊ nō fe. damꝰ ⁊ ꝑ
īterualla: ⁊ ī medio tpe aliqḋ digeſtiuū ⁊ apitiuū det̄. In
ꝓuocatiuis aūt vomitꝰ oꝫ vt fiat cū ꝓprijs educētibꝰ flā
⁊ aquoſitatē eiꝰ cū aq̄ rafani. pmo. deide cuꝫ ellō: ⁊ alijs q̄
ſupra diximꝰ ī hoc libro ⁊ antidotario nr̄o: ⁊ fit leuiter pro
uocatꝰ añ cibū ꝓprie: vl' poſt: ꝓut meliꝰ videbit̄ expedire
In diureticis vō oꝫ q̄ īcipiat̄ a debilibꝰ ⁊ ſimplicibꝰ: ⁊ d/
ide ꝓcedat̄ ad fortiora ⁊ ꝯpoſita. ⁊ ſint vehemēter ī tritu
ratōe ſubtiliata. vt facile ꝑueniāt ad gibbū eiꝰ: ⁊ mēbra vri
neꝑ poſt q̄ oꝫ vt adminiſtres aliqḋ de iuribꝰ ꝑiguibꝰ ⁊ ꝓpe
galline: ne a fortitudine vtutis diureticoꝝ: ⁊ ꝓprie cātari
dū vlcerent̄ membra: qḋ ēt dabis ī die ſolōnis: vt īcitatio
multiplicata mitiget̄: ⁊ oīa iura ꝓhibent̄ niſi ciceꝝ galli
antiq: ⁊ galline ī hoc caſu. ¶ In ꝓuocantibꝰ ſudorē oꝫ: vt
poſt eūonē cū ſolutiuis ꝑdictis ſint approꝑiata. ⁊ forti vtu
te exñte. vt ait hyppo. Et ꝓprie ī balneo. ſilr aūt ⁊ in reſol
uētibꝰ ⁊ euaporātibꝰ. ¶ Inqt. n. H. euaporantia farmaca
multitudine exñte ī toto corpe. ꝑiculis qbuſdā allata re
plēt magis q̄ꝫ eūent vniuerſo corpi diſſoluēdo magis q̄ꝫ re
ſoluēdo nocumētū ꝑſtāt. ⁊ ex eis exercitiū ē qḋ magis ꝯue
nit hypoſarce. ſepeliri quoqꝫ ī arena: ⁊ ſub ſole ſtare: vl' cir
ca ignem: ⁊ clibanū ītroire. Sꝫ oꝫ vt ſit illō ī loco ī quo nō

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0315-9 DFG

ſit ventus: nec caput ſit diſcoopertum ſoli. In rubifican-
tibus quoq; oꝫ: vt i extremis applicenť: ⁊ coſſis ⁊ anchis:
ſꝫ paꝝ ē iuuamēti i eis. ❡ In emplis aūt vnctiōib⁹ ⁊ ꝯſimi
lib⁹ oꝫ ꝙ attēdať ꝓprietas ⁊ locus vbi apponanť. In hy-
poſarca.n.ī mēbris vniuerſi corpis. In tīpania ⁊ aſclite in
vētre: ⁊ ī oīb⁹ in epe q̄ alterēt ⁊ cōfortēt. In cauteriȷs aūt
ſciēdū q̄ cōia ſint hypoſarce ⁊ aſcliti: ſꝫ oꝫ vt fiāt poſt ſolu
tionē ꝑ tres dies: vel q̄tuoꝛ. ⁊ poſt abſtinētiam. Et ſint ſex
cauteria: tria ī latitudine: ⁊ tria ī lōgitudine īcipiēdo a caſ
ſo: vſq; ad femur. Inciſio. Sciēdū ē ꝙ ꝓpria ē aſcliti: ſꝫ pa
rū ꝓficit: niſi ī corpe valde forti qđ potēs ē tollerare exer
citiū tēperatū famē ⁊ ſitim. Et fac vltimo cū alia nō ꝯtu-
lerit: ⁊ cū fit ñ oꝫ: vt mľtū ð aq̄ ſubito educať ne cadat vt⁹
ſꝫ paulatī. Inq̄t.n.hy. Quicūq; ēpici: aut hidropici vruнť
aut īcidūť ſanie: aut aq̄ mľta ⁊ ſubito educta ī̄pēte moriū
tur. ❡ Mod⁹ āt īciſiōis ad extrahēdū aq̄: vt aſirni⁹ ait
eſt vt erigat ſe eger equalr ſi pt: vel ſedeat eq̄li ſitu: ⁊ ꝯpri-
māt ſeruiētes latera ei⁹: vt expellāt aq̄ ad īferioꝛa ſumi-
nis. deīde adminiſtreť īciſio: ita vt mēſuret īferioꝛa ſumi
nis q̄titatis triū digitoꝝ ꝯiūctoꝝ: deīde īcide ſi fuerit ini
tiū hidropiſis ab īteſtinis. Et ſi fuerit a pte epis fac īciſio
nē a latere ſiniſtro ſumis. Et ſi fuerit a ſplene īcide a late
re dextro ſuminis ⁊ ſubleua ipm vt ſcindať ſiphac. deīde
excoꝛieť mirac: vſq; ad ſiphac parūper ad īferioꝛa lateris
ſciſſiōis mirach īferi⁹ ſub foramine ſiphac: q̄ten⁹ cū extra
hiť cāna cooperiať illō: ⁊ retineať aq̄ ꝓpter diuerſitatem
duoꝝ foraminū. deīde ītromitte in ipam canulā eream.
Cūq; accepis fac ipm iacere reſuppinū. Et oꝫ vt ꝯſideres
pulſū: ⁊ cū īceperit debilitari parūper retine ipam aquā
Cūq; aquā extraxeris: ⁊ ī fine extractōis remāſerit aliq̄d
tūc iā ſufficiet vt laboꝛēt ī ea medicine ſolutiue. Et q̄nq;
fiūt poſt īciſionē cauteria q̄ dixim⁹. Et q̄nq; fiūt ī ſtō epe
⁊ ſplene: ⁊ ī īferioꝛib⁹ ſumīs cauteria minuta. Et q̄nq; ſub-
tiliātur q̄dā. ⁊ faciūt currere aquoſitatē ad ſiphach ⁊ veſi
cam quam faciunt cauteria: ⁊ incidunt illam: ⁊ faciunt
currere aquam illam paulatim. Et eſt conueniens regi-
men ad illud. ⁊ adiuuat ad illō ſternutatio. ⁊ qđ facit cur-
rere aquoſitatē ad īferioꝛa. Et oꝫ vt caueať ne veniat res
cū ruptura. Et q̄nq; pūgim⁹ īflaturā teſticuloꝝ cū acub⁹
multis: vt aqua reſudatiōes habeat plīmas: ⁊ cū ſolō ſuc-
cedit doloꝛ ⁊ pūctura oꝫ vt adminiſtreť effuſio olei aneti
ni. vľ camomelini: ⁊ oleoꝝ vicinoꝝ. Et empľa facta ex fe-
nu greco. ſemīe lini: ⁊ altee. Et effuſio aq̄ caľe. ⁊ olei ſuffic̄
q̄nq;. In flomia v̄o q̄ īciſiōis ē ſpēs: ſciēdū ꝙ ipa nō ꝯue
nit: niſi cū fuerit ex cā calida: ⁊ ex retentōe ſanguis ꝯſueti
euāri: ⁊ cū ſignis replōnis. ⁊ proprie tūc ꝯuenit in ꝑncipio
dū virt⁹ ē fortis: ⁊ fľa ⁊ aquoſitas nō vincūt ī ſanguīe mul
tū: ⁊ ꝑinde oꝫ gradatim. ⁊ cū trepiditate ꝓcedere in eo.
❡ In fine v̄o cū ſit extra. negeť ne ſubtrahat nutrimētū ⁊
faciat excreſcere aquoſitatē vētoſitatē vľ fľa. Et ei⁹ ꝯpetē
tia ī hypoſarca ē magis. ī aſclite min⁹. ī timpanite medio-
criter. ſolonis v̄o ꝯpetētia magis ī hypoſarca ⁊ aſclite: mi-
nus ī tīpanite. Ait.n.G. cuꝫ hūoꝛ paꝝ ē a nā ſanguis diſtās
floma audacter. cū v̄o plus verēter: cū v̄o plīmū nequaq̄
Manifeſtū aūt ꝙ fľa ē a nā ſanguis paꝝ diſtās: aq̄ v̄o plī
mū. vētoſitas mediocriter: cū ex flate gn̄eť. Res coꝛri-
gēs accñtia ē. q̄ īſtat ⁊ mitigat ea diuerſimode ſcđꝫ coꝝ di
uerſitatē ⁊ pluralitatē. Et ē ꝑ añcedētia ⁊ ſequētia nota.
Propriū āt regimē ē qđ cuilibꝫ ſpēi ipi⁹ debeť cā ſi⁹ vniuſ-
cuiuſq; gerat auxilia ꝓpria. q̄b⁹ ꝑdicte res cōis regimīs: ī
quolꝫ obſeruādi hn̄t ꝯpleri. ❡ Si ergo ſit ei⁹ ſpēs hypo-
ſarca. ⁊ cā ei⁹ efficiēs ſit caľa cū ſignis ꝑdictis replōnis ꝑ-
mittať flomia ſcđm ꝑdictū modū: qđ liberabit a prefoca
tōe multitudinis. deīde ſequať euātio minoꝛatiua fľatis
ex coliriȷs ⁊ cliſterib⁹ ⁊ vomitib⁹. ⁊ digeſtiua ipi⁹ ex ſyru-
pis de endiuia: ⁊ abſinthio roſ. ⁊ aliȷs apitiuis calidis mi

xtis cū frīdis ſupra ī cura ſcđm modū vľem dictis ⁊ troci
ſcis: ſicut ſunt troci. de roſis ſiccis: de alkekengi: de lacca: ⁊
ð ſpodio: ⁊ ſiľes. Et altereť epar cū tēperatis vľ frīdis paꝝ
excedētib⁹: vt ſandalis ꝑꝑ caliditatē ei⁹. Deīde ſequatur
purgatio cū reubarbaro ⁊ pillulis ei⁹ aloe rectificato ſuc-
co roſ. ⁊ aq̄ mirabola. citrinoꝝ: ⁊ kebu. ⁊ agarico. deīde re
ſoluať ⁊ euapoꝛeť reſiduū modis ꝑdictis. ꝓꝑe cū balneo
⁊ vnctionib⁹ mēbꝛorum digōnis tertie ex rebus hn̄tibus
ꝯfortare illa. ⁊ digōnē coꝝ. vt ſunt camomilla mellilotuꝫ
lupne: ⁊ folia citri. ⁊ alia calida tēperate. Si v̄o cā ei⁹ ſit fri
gida: poſtponať flomia. ⁊ minoꝛeť mā̄ cū vomitib⁹ cliſte-
rib⁹ ⁊ coliriȷs ꝓprie. q̄ īfra in colica ſpūs ſancti auxilio di-
cturi ſum⁹. Digerať quoq; fľa cū ſyrupis. ſ. de eupatorio: ð
iſopo: de calamēto: ⁊ trociſcis de reubar. ð eupatorio cum
aqua iuniperi qđ ē ꝓpriū ⁊ aqua radicū: et eliȷs: vt ē dya-
lacca: dyacurcuma ꝓprie. ⁊ ꝯfoꝛteť epar cū tēperate caľis
ſuperi⁹ dictis: vt ē oleū nardinū. de cinamomo: pilo aloe ⁊
ꝯpoſitis. Deīde purgeť cū agarico elleboꝛo albo. q̄b⁹ ī eſt
virt⁹ attractiua hūoꝝ ab extremitatib⁹ coꝛpis ⁊ ſerapino
⁊ ꝓprie cū pillulis ei⁹: ⁊ pillulis ð raued cū gūmis q̄s ī an-
tidotario nr̄o ðſcripſim⁹. deīde reſiduū reſoluať: ⁊ euapo
reť modis ꝑdictis ſi expediat gradatim de ſpē leuioꝛi ad
foꝛtioꝛeꝫ trāſeūdo: ⁊ ꝓꝑe cū balneis ⁊ vnctōib⁹ membꝛoꝝ
tertie digōnis ex reb⁹ hn̄tib⁹ ꝯfoꝛtare illa: ⁊ digōneꝫ coꝝ
cū caľitate manifeſta: vt ſūt ſticados: amomuꝫ: ſādaraca
coꝛdumeni: laur⁹ ⁊ ſiľia. Et dieteť ſubtilr ī vtraq; cā ⁊
cū ſiccis ad caliditateꝫ declinātib⁹: vľ fridītateꝫ: put exi
git diſpō cāe. Si v̄o ſit ſpēs aſclitis ei ꝯueniens regimen ē
regimē exiccatiuū ⁊ eductiuū aq̄ citrine: q̄ eſt cā ꝯiūcta ⁊
mālis ipi⁹ ſcđm omneꝫ modū dcm̄ ī cōi regimine: ⁊ ſūt ea
q̄ ī nr̄o antidotario enumerauim⁹ q̄ ſūt de gn̄e lacticinoꝝ
⁊ aperientiū vꝛinatiuoꝝ. Et ſi q̄deꝫ a cā frīda epis calidi
tateꝫ nāleꝫ extiguente fuerit facta digeres ꝑmo cū ſyru-
po de eupatorio: de ireos: calamento: ſyrupo acetoſo: ſq̄lli
tico: ⁊ cū aqua ſquinātī: amomi: ſpice: ⁊ alioꝝ ſubtiliātiuꝫ:
⁊ minoꝛabis cuꝫ cliſterib⁹ ⁊ coliriȷs ꝓꝑe: deīde dabis di-
geſtōe apparēte aliqđ ex ꝑdictis farmaciȷs ſimplicib⁹: qđ
fuerit leui⁹ ⁊ ſalubꝛi⁹: vt eſt ireos: ſemen vꝛtice excoꝛtica-
tū ⁊ ꝯfectū cū melle: ⁊ aqua folioꝝ rafani: ⁊ armoniacuꝫ:
vľ ſerapinū: aſcebꝛā ⁊ euforbiū cū vitello ouoꝝ: ⁊ vinū ī-
fuſiōis pulpe colognitide: vľ eris vſti ⁊ tubel eris ī q̄titate
ʒ.i. deīde ſuccū ebuli. vľ mediane coꝛticis ſambuci ⁊ pul-
ueris carnis ericij exiccate ī hipoſarca. Et caricas cū lacte
titimali. ʒ.i. cū guttis. ʒ.i. cocōdij: ſterc⁹ colūbinū ī ſyrupo.
deīde ſuccuꝫ cucumeris aſinini. vel radiceꝫ ei⁹ cū ſyrupo
acetoſo. deīde ſyrupū de foliȷs meçereon: deīde folia me-
çereon rectificata cōtrita ⁊ cōfecta cū melle: vľ pulueriça
ta ī ſyrupo: ⁊ eſt de vltimis: vel cōpoſita ex eis: q̄ īfra duce
xpo diceнť: ſint aūt ſucceſſiue adminiſtrata. ❡ Inq̄t eniꝫ
Gal. varie oꝫ vti farmaciȷs. Et ſint cū īterpolatiōe exhibi
ta. vt geti ⁊ cibo reſumať nā ī medio tpe. Inq̄t.n. Hyp.
cū farmacaueris ſoꝛbitiōib⁹ vtere. Et reſumpta digōne ī-
tendat ꝑꝑ qđ vtile erit ī medio tpe aliqđ digeſtiuū aperi-
tiuū ⁊ ſubtiliatiuū dare. vt eſt dyacurcuma ꝓꝑe ⁊ tiria-
ca: ⁊ trociſc⁹ amigdalaꝝ amaraꝝ de eupatoꝛio: de aſcebꝛā
⁊ alia ſiľia ī antidotario notata. Deīceps v̄o dabis diureti
ca. ⁊ vrinā ꝓuocātia calida ꝑdicta ī caplō vľis cure: īcipiē
do a leuioꝛib⁹. Et ex appꝛobatis eſt lac camelaꝝ fetaꝝ: ſe
rū ei⁹: ⁊ vrina ipaꝝ. Et ꝓprie arabicaꝝ puꝝ: bibitū vľ mi
xtū cū his q̄ ꝓuocāt: vt ſeca: ſpica: amomū: abꝛotanū: ⁊ ſi-
milia. Nec attendenda ſunt ſophiſtaruꝫ verba. ſ. ꝙ nā la
ctis ſiľis eſt hidropiſi. Nā eſt ei ꝯ̄ria ꝑꝑ illud qđ in ipo eſt
de abſterſiōe ⁊ ꝓprietate ſua qua educere hꝫ aq̄ citrinaſ
ꝑꝑ ſimilitudinem. ſicut endiuia in egritudinib⁹ caľis epis
Et experientia cōfirmat hoc. q2 plurimi ex ea ſani ꝯfacti
ſunt: ſꝫ meli⁹ vt tribuať ꝑ ebdomadā: aut trociſci ð aloes

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0316-5

cū.ʒ.ß.ſpodiȷ:⁊ cū nō ſuſtineat fortes in ſyrupo:niſi in exic
catis ⁊ ꝯſumptis corporibꝰ qbus deꝫ hic ꝓprie lac. ¶ Sꝫ
attēdendū in ꝙtitate eius:⁊ nā corporis. Jn ꝙtitate vt ſit
eiꝰ ꝙtitas:quaꝫ bene digerere poſſit:nō aceſcat:nec caſee
tur. Jn nā corpis vt ſi ſit mollis nā:tūc oꝫ vt rectificetur:
⁊ modus eiꝰ eſt notus ex p̄cedētibus in ſūma ſcd̄a. Deīde
fridos fortes.purga cū meçereon ⁊ ſil̄ibꝰ.deide procedas
ad reſolutionē cū balneis termarū ſiccis nitroſis: ⁊ ſalſis:
vel artificialr̄ ꝯſtructis cū fumis ex aqs ſubtiliātibꝰ reſol
uētibꝰ p̄dictis ſupra in hypoſarca. Et ſit appropriata:⁊ cir
cūſcripta regioni vētris.ſicut in hypoſarca in corpore vni
uerſo:⁊ ꝓinde per modū embroce ⁊ īfuſiōis p̄dicta appro
xienꝫ. Unctiōes quoqꝫ ⁊ ēpl̄a ſuꝑ regionē vētris ex reſol
uētibꝰ ⁊ euaporātibꝰ ſꝫ vtilia. Et ſupra eꝑ approxiabis ſti
ptica arōatica v̄tutē ⁊ robur eiꝰ ſeruātia: deide ad caute
ria:⁊ vltimo ad icīſiōes ſi expedit eſt veniēdū. Si v̄o fue
rit ex cā calida facta aſclitis calorē nālē epatis reſoluen
do debilitatē cū qua eſt plurimū fe.⁊ īflatio regimen p̄di
ctū exiccatiuū ⁊ euacuatiuū cāe ipiꝰ ē cuꝫ ꝯtrariȷs quodā
modo ꝯplendū:puta cū frigidis ꝯpetēter. Nec attēdat
verba ſophiſte dicētis ꝙ idropiſis nō curaꝫ.niſi eo modo
quo oīs egritudo curaꝫ:⁊ illud ē cuꝫ ꝯtrariȷs.ſicqꝫ cū idro
piſis ſit egritudo frigida curaꝫ cū calidis:cum.n.ſua cura
ꝓprie vertaꝫ ad partē cāe. vt ſuperius dictū eſt: ſi q̄dē cā
efficiēs ſit calida.niſi illa alteretur priꝰ ſemꝑ cā ꝯiuncta ⁊
materialis regenerabiꝫ ⁊ multiplicabiꝫ: qua mlt̄iplicata
hidropiſis augebiꝫ. Uñ. Halie. Qui curat morbum auget
cauſam:qui auget cauſam auget morbum.ergo qui curat
morbum: auget morbum. Oportet ergo vt principalis
cā ⁊ efficiēs añs que ē mala ꝯpl̄o epatis calida debilitans
epar ⁊ digeſtiuā eiꝰ p̄mitꝰ in eūone ⁊ exiccatiōe īſpiciatur
⁊ auferaꝫ qua īſpecta ⁊ ablata exiccatio ⁊ eūatio cāe mā
lis ꝯiuncte cuꝫ calidis erit facilis. Alteratio aūt ipiꝰ erit
cū regimine frido ꝯpetēter puta cōpoſito ⁊ mixto calido
ſcd̄m variā ꝯpoſitionē ꝯtrarioꝝ morboruꝫ:hidropiſis.ſ. ⁊
febris per eq̄litatē ⁊ īequalitatē eorum. Unde. H. ſinguli
morbi ſimplices ſimplici medicina medicabunꝫ: ꝯpoſiti
ꝯpoſitis:equales equalibꝰ:vel vno plus:altero minus.
¶ Hidropici quoqꝫ cū fe.ſic medicādi itelligunꝫ vt pleu
retici ⁊ ſanguinē ſcreātes ⁊ ptiſici. Hi.n. morbi q ſunt ꝯꝫȷ
medicaminibꝰ īdigēt ꝯtrariȷs:eq̄libus ſi equales ſint. Si
v̄o īequales:oꝫ vt fortior mediceꝫ p̄us.alter v̄o non negli
gaꝫ. Intelligas quoqꝫ cōpoſitionē nō ſolū tēporalē:ſꝫ par
tialē ⁊ localem: vt docuit Halie. Si ergo p̄ceſſerit retētio
ſanguis ⁊ ſigna repl̄onis apparēt:fl̄omabis in principio:⁊
minꝰ ꝙ ī aliȷs: deide miorabis māꝫ cū cliſteribꝰ ⁊ coliriȷs
ꝓpriȷs ad hec. Et digere cū ſyrupo d̄ endiuia ⁊ alchechēgi
de cuſcuta:de ſucco ſolatri: ſucco granatoꝝ muçoꝝ ⁊ ſyru
po acetoſo ſimplici. Deide facta digōne aliq̄li dabis ali
qd̄ ex farmacis p̄dictis eductiuis aque. Alterabis cuꝫ aq̄
lactis caprini:aſinini:vel ſucco endiuie: vel roſarū: vel aq̄
ſeminū cōium fridoꝝ:vel ſucco p̄dictoꝝ aliquo. Sintqꝫ
in liqda ſuba:⁊ aquea bibita ꝑꝑ dictā ſuperiꝰ cām:⁊ ordia
te per īteruālla exhibita ⁊ potata. Et in medio tp̄e detur
aliqd̄ alteratiuū ⁊ ꝯfortatiuū.vt trociſcus de berberis.vl̄
de ſpodio:vel mirabo.citrini ſi vēter ſit ſolutꝰ:vel aq̄ fru
ctuū ſi ſit cōſtipatꝰ. Deide dabis diuretica:⁊ vrinā ꝓuocā
tia. ſicut ē aq̄ ſeminū cōium frigidoꝝ ꝯfortata cū aliquo
diureticoꝝ calidoꝝ q̄ ſuperiꝰ ſunt narrata. Et ex illis eſt
aqua lactis caprini vel aſinini: vel etiā lac camelarum:ſi
cā nō fuerit mlt̄ū cal̄a: vel ſi fuerit:ſit cū d̄coctōe endiuie
⁊ ſeminū cōiuꝫ exhibita. Deide ꝓcedas ad balnea vnctio
nes:⁊ empl̄a:embrocationes ⁊ epithimata:ex reſoluētibꝰ
tēperatis:⁊ paꝝ ſtipticis habētibus ꝯſeruare virtuteꝫ mi
rach: nō reſolutionē īpedire .et deide ſi expedit ad icīſio
nes. Cauteria aūt in hoc locū nō hn̄t cū ſint vehementis

iflāmationis:⁊ alia que ſuperiꝰ tradita ſunt. ¶ Regimen
aūt in oibus aliȷs nō naturalibꝰ rebꝰ ſit exiccatiuum: ſitqꝫ
cibꝰ facilis digōnis laudabilis chimi:⁊ paucaꝝ ſuperflui
tatū:vt ſunt carnes puloꝝ:p̄dicū: faſianoꝝ:⁊ auicularum
paruaꝝ mōtanaꝝ nō pinguiuꝫ:caprioloꝝ aſſate nō cocte
exiccate ſumanꝫ ſine brodio: vt in caſu p̄dicto. Et qñ cuꝫ
ſubtiliatiuis ⁊ aperitiuis fuerint cocte. Et panis ſit aliqd
furfuris habens ⁊ ſalis:bene fermētatꝰ clibanaceus ⁊ biſ
coctus:⁊ ſit calidis vel frigidis mixtꝰ: ꝑut cā reqrit. Et po
tus in facta ex calida ſit aque habētis virtutē diureticoꝝ
dictoꝝ: vel vini al.multū limphati cū aq̄ ferri. Jn facta
ex frida ſit potus :ex vino albo limphato ꝯpetēter ſubtili
vel paruo. ¶ Si v̄o fuerit ſpēs timpanitis regimē ꝓpriuꝫ
ei ꝯueniēs eſt regimē dictū iflationis ſtōi ⁊ epatis. Et oꝫ
vt minuāꝫ ſolutiua niſi ꝙtū ꝯueniūt humori flegmatico
qui pōt eē materia vētoſitatis:⁊ ēt diuretica:ſuꝑfluitas.n.
in eis ⁊ ꝓprie calidis p̄ducit ad generationē vapoꝝ pluri
moꝝ. Et multiplicenꝫ reſoluētia vētoſitatē ⁊ eructuatio
nem ꝯmouētia p̄dicta ibi ſupra:⁊ fricatiōes cū aleis:⁊ cū
ſeīe rute: gētiane:⁊ ſil̄ium:⁊ euaporatiōes cū milio ⁊ ſale.
⁊ aliȷs ꝓpriȷs ⁊ vētoſis:⁊ ſil̄ia ex empl̄is:⁊ cataplaſmatibꝰ
⁊ ſpōgiȷs:⁊ balneis.⁊ embrocts cū ſiccis ⁊ extenuātibꝰ di
ctis. Et ſi fuerit ex cal̄a cā reſoluētia vētoſitatē ſint ex tē
pate cal̄is:vt ē feni. apiū:aniſū:carui:mellilotū:camōilla:
anetū:tribuli:⁊ ſil̄ia. Si v̄o ex cā fr̄a ſit ex calefaciētibus
manifeſte.vt ē ciminū:ſpica:ameos:ruta:caſtor.iuniꝑꝝ:
⁊ ſal̄ ſpēs:⁊ cortex thuris. ⁊ ex ꝯpoſitis ꝯfectio d̄ acoro cū
nigella ⁊ coliriū ex baurac.cimino: foliȷs rute cuꝫ melle:⁊
oleuꝫ ruta.⁊ nardi.cliſteriçatū:⁊ oꝫ ꝙ oīa olea ⁊ vnctuoſa
alienenꝫ:oppilāt.n.⁊ ꝓhibēt reſolutōeꝫ inuncta exterius
Dieta aūt cibi ⁊ potus ſit qualis in p̄dictis: vt eſt dicta ⁊
hec ſupra in cura iflationis. Deinceps ad medicinas com
poſitas deueniēdū. quaꝝ multaꝝ deſcriptionē fecimꝰ in
antidotario noſtro ſcd̄m oēꝫ modū ex ſyrupis decoctōibꝰ
ꝯfectionibus electuariȷs trociſcis pillulis vnctionibꝰ em
plaſtris :⁊ oleis appropriatis:que per te īuenies:⁊ approxi
mabis: ꝑut oportet:⁊ te ſcire ſuperius āmonuimus.
¶ Iſaac quoqꝫ deſcriptioneꝫ oīum ſerioſam fecit. Halie.
quoqꝫ ⁊ Abo.in antidotariȷs ſuis:que obmiſſa ꝓpter bre
uitatem per te inuenies ſi oportet. ¶ Syrupus cōtra hi
dropiſim ex frigida cauſa. ℞.origani:camedreos:camepi
theos:ſpine albe:ſicle:calamēti fluuialis ⁊ cāpeſtris:iſopi.
añ.M.ß.capar.ſcolopēdrie.eupatoriȷ:lupuli: capil. vene
ris:endiuie:añ.M.i. aſari:foliȷ:añ.ʒ.ij.qnqꝫ radicū cōiuꝫ
fu.meu paſſulaꝝ enucleataꝝ:corticū capa.añ.℥.i. ſqnanti
abſinthiȷ.thimi:epithimi: ariſtologie rotūde:añ.℥.ß.ſemi
nis aniſi:feniculi:cinamomi.añ.℥.iiȷ.ſeminū cōmunium
℥.ij.çuccari lib.ij.aromatiçenꝫ cū his. ℞.ſpice:aſari:croci:
foliȷ carpobalſami:ciperi:galie muſcate: añ.ʒ.i. doſis.℥.ij.
cum aqua ferrea:tepida donec digeſta ſit materia.
¶ Pillule contra oēm hidropiſim. ℞. folioꝝ meçereon
īfuſoꝝ in aceto: vel oxiçaccara.ʒ.v.mirabolanoꝝ citrino
rum.ʒ.iiȷ.reubar.ʒ.iiȷ. Confice cuꝫ ſucco apiȷ: ⁊ aniſi:aut
feniculi ſilueſtris doſ a.ʒ.i.vſqꝫ ad.i.⁊.ß. Et ex illis ſūt pil
lule reubarbarate: poſite ſupra capl̄o de cura oppilatiōis
epatis. ¶ Inquit Ax.radix feniculi ſilueſtris miniſtrata
ſcd̄m oēm modū curat hidropiſim ex oppilatione.
¶ Medicamē vtile hidropicis in qbus non eſt caliditas
ad educendum aquā in paucis diebus per vrinā. ℞.ame
os:fructus ſauine:cimini:ſalis albi:añ.partes eq̄les teran
tur ⁊ ſumanꝫ cū vino. ¶ Pillule valde vtiles hidropicis.
℞.eris vſti.ſtercoris colūbini:rute ſicce:añ.ʒ.iiȷ.euforbiȷ
ʒ.ij.fiant pillule cum ſucco apiȷ.doſis.ʒ.ij.
¶ Emplm̄ ad ventris inflationē hidropicoꝝ. ℞. ſterco
ris bouini.vel caprini montani exiccati:libr.i.ſucci praſſiȷ
lib.ij.olei cōmunis lib.iiȷ. ſulfuris rubei.℥.iȷ.cuꝫ vitellis

duorum. Confice ⁊ emplaſtra. ¶ Idem operatur ſtercus
caprinũ cũ vrina mixtũ ſi ſuperponat̃. ¶ Emplaſtruꝫ bo
num ⁊ forte. ℞. calcis viue: nitri: ireos: cordumeni: ſulfu/
ris: armoniaci: bacaꝝ lauri: ſtaphiſagrie: ſtercoris colum
bini. Terant̃ ⁊ diſtẽperent̃ cũ vrina. reſoluit. n. aquã mi/
rabil'r ſuperiunctum. ¶ Unguentum Magiſtri Arcbi
dis. ℞. ſanguiſugas curatas triginta: ⁊ pone in fialla vitri
plena oleo camomilino minus tertia parte: ⁊ dimitte do
nec ibi moriant̃. Deinde reple eã vino greco: ⁊ oppila eaꝫ
bene: ⁊ fac bulire eã in vaſe aque dulcis pleno vſqꝫ ad cõ
ſumptionem toti⁹: Deinde auferas ⁊ reponas. fiet. n. ſicut
vnguẽtũ quo liniat̃ vẽter aſclitici mane ⁊ ſero. Et detur
quolibet mane vitellus vnus oui cum limatura calibis.
¶ Cõfectio empl'i ad hidropiſim aſclitem: ⁊ qñqꝫ empla
ſtrant̃ ex eo aquã hñtes: ⁊ eſt exptuꝫ. ℞. farine ordei: cipi:
ſtoracis: origani ſicci: nitri: cimini: baurac: boli armeni: añ.
ptes eq̃les. Cõficiant̃ cum melle: qm̃ exiccãt aquaꝫ v̄tute
forti. ¶ Cõfectio Raſis de kekengi ad hidropiſim ĩ qua
nõ eſt caliditas nec ſolo vẽtris valde. ℞. folioꝝ meçereon
ĩfuſoꝝ in aceto exiccatoꝝ ⁊ tritoꝝ. ʒ. v. agarici: turbit: añ.
ʒ. v. ſucci abſinthy. ʒ. iiy. mirabolan. ʒ. v. roſaꝝ rubearum:
endiuie añ. ʒ. iy. tereniabin. ʒ. x. ſucci ligritie. ʒ. y. decoqua
tur tereniabin donec fiat ſicut mel: ⁊ cõficiant̃ cũ eo: ⁊ de/
tur ex eo in potu. a. ʒ. y. vſqꝫ ad. iiy. ¶ Pillule ꝯferentes
ad febres antiquas ex humorib⁹ diuerſis: ⁊ dolorẽ epatis
⁊ ĩceptionẽ hidropiſis iuuatiue valde. ℞. abſinthy. ⁊ ſuc/
ci eius: ſucci eupatory: mirabolanoꝝ citrinoꝝ: aloes: ma/
ſticis: croci: laudani: lache ablute: aniſi: aſari: ſceitaragi ſic/
ci: yere pigre: añ. partẽ. i. terant̃ ⁊ cribelent̃: ⁊ ꝯficiant̃ cuꝫ
aqua ſolatri: doſis. ʒ. y. cũ aqua tepida ĩ nocte. Et ſi eſt tuſ/
ſis adde ſucci ligritie medietatem medicinaꝝ ponderis.
¶ Pillule xiraſi regis medicoruꝫ ꝯferentes hidropicis.
℞. lactis titimali: ſerapini: añ. ptes equales decoquant̃ cũ
vino: ⁊ fiant pillule: ſic cicer: ⁊ ſit potio ex eis due: aut tres
plurimũ ei⁹ cũ vino pmixto ante cibũ: ⁊ poſt cibum.
¶ Syrup⁹ exptus ad hidropiſim ex cã calida. ℞. endiuie
cũ radice lupul. cũ radice capil'. ve. cicoree epice: añ. M. i.
abſinthy: policarie minoris cuſcute ſcolopẽdrie cũ radice
blete bedeguar: ana. M. 5. radicis feniculi ſilueſtris: ra/
dicis apy: radicis ſparagi reſidentiũ in aceto: añ. ℥. i. ſqnan
ti. ʒ. i. reubar. ʒ. iy. ſpice. ʒ. i. ſe. cõiuꝫ. ℥. i. roſ. mirob. citri. añ.
℥. i. çuccari lib. y. ſucci endiuie: ſucci eupatory: depuratorũ
añ. ℥. v. aceti pdictaꝝ radicũ ⁊ ſucci granatoꝝ: añ. ℥. y. In
pecia rara buliant: ſandali ſpody: añ. ʒ. y.
¶ Syrupus ad hidropiſim ex cã vtraqꝫ. ℞. iſopi abſin/
thy: cuſcute. roſ. endiuie: cum radice capil. veneris: bede/
guar. blete: policarie minoris: añ. ℥. y. ſqnanti: ligr. radicis
feniculi ſilueſtris. radicis apy: ⁊ ſemis eius: añ. ℥. i. 5. aniſi:
feniculi meu. ſu. ameos: añ. ℥. 5. floruꝫ bugloſſe: ⁊ rob eius:
añ. ʒ. i. ſpice: foly: añ. ʒ. iy. reubarbari: maſticis: ana. ʒ. y. oĩa
buliãt in aque lib. x. vſqꝫ ad tertiã partẽ. Deĩde colent̃ cũ
expreſſiõe: ⁊ colature addant̃ çucari lib. y. ſucci endiuie d/
purati: ſucci policarie minoris: ⁊ ſucci apy depurati: añ. li.
5. vel ſucci feniculi: ⁊ abſinthy: ⁊ ſyrupent̃ cuꝫ decoctione
ſandali: ⁊ ſpody. Et in pceſſu ſi vis facere. laxatiuũ adde
ſcdm ĩdigentiam cauſe: vt in timpania. polipodiũ in hipo
ſarca: reubarbaꝝ: vel agaricũ. in aſclite meçereon.
¶ Filÿ ſerapionis pillule ad hidropicos: ⁊ dolorẽ ſplenis
℞. meçereon infuſi in aceto: ⁊ exiccati colognide: ſauich
ordei: añ. partes equales terant̃ ⁊ conficiant̃ cum melle.
⁊ dent̃ omni homini ſcdm q̃titatem virtutis: ſoluũt eniꝫ
aquã valde. ¶ Dyaſcorides inqt. Quãdo ſumitur de ra/
dice cucumeris aſinini ad q̃titatem anoloſath ad minus
⁊ de radice eius q̃titas. iiy. chiſt. laxat colerã: ⁊ flegma. ⁊
proprie in corporibus hidropicoꝝ. ⁊ abſqꝫ q nocumentũ
inferat ſtomaco. Et accipiat̃ ex radice eius lib. 5. ⁊ teratur
cuꝫ duobus chiſt vini: ⁊ maxime babylonici: ⁊ miſceatur
bene: ⁊ teratur cum eo. Et dentur ex eo hidropico. iy. ano
loſath ĩ ieiunio quolibꝫ die: donec diminuatur tumor vẽ
tris: diminutione ꝯpleta excludendo aquã que eſt in ven
tre eius. ¶ Pillule de ſpica aperiẽtes oppilationes epis
⁊ ſplenis conferẽtes hidropiſi: ⁊ ſoluunt naturam. ℞. ſpi/
ce. ʒ. iiy. agarici. amomi: raued: epithimi: maſticis: coſti: ca/
medreos: añ. ʒ. iy. myrre: cinamomi: ſquinãti: gario. ana. ʒ.
i. aloes. ʒ. viy. fiãt pillule cum vino antiquo: doſis. ʒ. y. cuꝫ
vino commixto ante ⁊ poſt cibum.
¶ Pillule ad hidropicos ⁊ timpaniticos: reſoluunt eniꝫ
ventoſitates groſſas: vaporoſas. ℞. ſe. apy: aniſi: maſticis
ana. dauich. y. ariſtologie rotũde: acori: gentiane: ana da/
uich. i. ſalis indi: ſerapini: añ. dauich. i. aloes. ʒ. vi. terantur:
⁊ fiant pillule: doſis. ʒ. y. cũ aqua calida. Et aliqui addunt
galãge: a çedoarie: añ. ⁊c. ¶ Decoctio ſerapiõis ad hipro
picos quãdo non eſt febris. ℞. camedreos: camepitheos:
petroſilini. iſopi ſicce. ſquinanti. ſpice romane delegẽſiter
⁊ eſt ſaguaſſera. fiſeleos: ana. ℥. i. myrre: gentiane: epi/
thimi dauci: ana. ℥. 5. aloes ſucotrenſis. ℥. iy. decoquantur
cum lib. x. aque: donec remaneat tertia. Colentur ⁊ dent̃
in potu ex ea ab. ℥. y. vſqꝫ ad. v. ſcdm quãtitatem virtutis
vniuſcuiuſqꝫ. ¶ Alia cum ſerapino: ⁊ ſoluit cum virtute:
℞ ſerapini ſextaria. y. oppoponaci: armoniaci. ariſtologie
longe: añ. ʒ. iiy. turbit: meçereon: añ. ʒ. y. eupatory: aſſe: fu/
miterre: colognide ĩterioris: calamẽti: ireos: mirabolano
rum: citrinorum: radicum lily celeſtis: ana. ʒ. i. cepe: ſqlle:
ʒ. y. terantur omnia: ⁊ infundant̃ cuꝫ çuccaro: ⁊ ponantur
ad ſoleꝫ. vy diebus. deinde colentur: ⁊ dentur ex eo omni
die. ʒ. y. vel. ʒ. iy. conferunt enim valde.
¶ Emplaſtrum contra omnem ſpeciem hidropiſis. ℞.
farine ordei: ⁊ confice cum ſucco ebuli: ana. ⁊ emplaſtra.
Balnea termarum: ⁊ proprie ſicca ⁊ fumoſa: ⁊ que ex aq̃s
ſalſis nitroſis ſunt: hidropicos iuuant. Et ſunt de vltimis
prout tolerat virtus. Que ſi non inueniantur in regione ar
tificial'r conſtruantur ſic. In tina clauſa ſit tabula: vna p/
forata in medio eius pluribus foraminibus ĩ qua ſtet pa/
tiens: ⁊ in fundo ſit aqua ſalſa decoctionis calamenti: ori
gani: rute: ſauine: iſopi: ⁊ in illam proyciantur lapides mo
lares igniti: ⁊ recipiat̃ fumum tina exiſtente bene clauſa
⁊ cooperta donec ſudet. Aly faciunt: buliri predicta in cal
daria bene cooperta: vt nihil expiret: ⁊ habente concaua
per quã fumus ⁊ vapor perueniat ad tinaꝫ bene coopertã
in qua patiens ſtet ⁊ ſudet ibi fortiter quantum vult. ⁊
tolerat. vt ſuperius dictum eſt. ¶ Emplaſtrum contra ĩ/
flationem tibiarum. ⁊ etiam ventris hidropicorum. folia
vrtice conterantur ⁊ tepefacta emplaſtrentur prodeſt.
¶ Item fomententur tibie. ⁊ euaporentur cuꝫ aqua ma
ris vel ſalita decoctionis ſtribulorum marinorum: camo/
mille ⁊ radice ebuli. Diaſcorides narrat de quodam qui
crura habuit inflata: cui fecit emplaſtruꝫ de fimo colum
bino: farina ordei: ⁊ aceto: ⁊ liberat⁹ eſt. adde ſandarachaꝫ
ſi vis. Et ſi rubor ibi appareat ſemina cõia vetera cũ oleo
ro. cõmixta proſunt: ⁊ adde ſi volueris memite.

¶ Capitulum. xiiy. de fluxu epatico.

q Uoniam fluxus epaticus ẽ ex exeũtibus a corpo
re: ⁊ qd ab epate fluit ⁊ exit de corpore: vt eſt ſupe
rius dictuꝫ: aut per nares ſanguinis fluxu: aut per
os vomitu: aut per poros ſudore: aut per renes: ⁊ veſicam
vrina: aut per inteſtina exit: per que exiens vltra moduꝫ
conſuetuꝫ ꝓprie dicitur fluxus ventris. ideo vſqꝫ ad ſum
mam de medicis egritudinum ĩteſtinorum cum de medi
cinis fluxus ventris loq̃mur xpo pſtãte dñe poſtponim⁹.

¶ Caplm. xv. de icteritia citrina.

d E icteritia citrĩa ⁊ medicis ei⁹ vſqꝫ ad ſũmã q̃rtã
cũ de medicis egritudinũ ſplenis ſermonem affe