¶ Unguentuꝫ ceruſceos: ⁊ vnguentum egyptiacum ſunt
mūdificantia ſaniē: ⁊ putredinē apoſtematū: ⁊ vlceꝝ ma
millaꝝ. ¶ Medicamē ꝑptū exſiccās vlcera mamillaꝝ.
Recipe vini pōtici: lib. xx. ⁊ ꝯfice in eo ſumac lib. i. galla
rū imaturaꝝ lib. ſ. caſſie lignee: lib. ſ. vł gallaꝝ cipreſſi lib.
i. Et dimittaꝰ dieb⁹. xx. deīde coquant: ⁊ cōmoueant cuꝫ
ligno cipſſi donec minuaꝰ medietas. deīde cōmoueātur
fortiter: ⁊ reducant ad ignē: ⁊ caleſcat: ſitqꝫ leuis ignis. Et
ꝯſernet in vaſe vitreato. eſt. n. bonū oībus vlcerib⁹. q̄ acci
dūt in mēbris mollib⁹: ſicut os: lingua: mamilla: teſticuli:
⁊ emūctoria: ⁊ alia exiccat: ⁊ cōſolidat: ⁊ ꝓhibet corroſio
nē. Emplaſtrū ex farina ciceris cū aceto: cōfert vlceribus
cācroſis. Et īfuſio decoctiōis lupinoꝝ cōfert corruptioni.
Lutū armenū cū aceto: ꝓhibet ablutionē putredinis mē
broꝝ. Et virga paſtoris cōfert apatib⁹ calidis vlceratiuis
excoriatiōi: ⁊ vlcerib⁹ papilaꝝ. Auelana aſſa maſticata ⁊
iuncta eſt ſufficiēs ⁊ exꝑta. Qꝫ ſi apa nō dubeleꝰ: ſꝫ lapi
deaꝰ: Emplaſtrū de mucilaginib⁹. ⁊ de mellilote appone
vel dyaglon magnū ⁊ paruū: vł cerotū iſopi: ⁊ cerotū dya
pēte ſcdꝫ noſtrā īuentionē inunge. mollificat. n. ⁊ reſoluit:
⁊ cōfert nodis ⁊ glādulis. Si vō apa ſit frigidū flegmati
cū: ꝯtere apy folia ⁊ emplaſtra: ſil̄r: ⁊ camomillā per ſe: vł
vtraqꝫ miſce. Licer emplaſtratū ꝯfert apatib⁹ glādulosis.
¶ Fili⁹ ſerapiōis. dyamac ad dubelet: ⁊ apa dura: ⁊ reſol
uit vtrūqꝫ. ⁊ ē valde magnū iuuamētū. ℞. taraſacō tritā ſic
cā ⁊ cribellatā. ʒ. iiij. fenugreci cōtriti. ⁊ cribellati. ʒ. ij. ma
tri cribellati. ʒ. i. miſceaꝰ ⁊ ꝯficiant cū lacte recēte mul
cto: ⁊ oleo de lilio: ⁊ emplaſtrent cum eo. ⁊ ſanum eſt cum
chriſti auxilio.

¶ Capitulū quartum de magnitudine mamillarum.

d E magnitudine aūt mamillaꝝ: ⁊ alioꝝ mēbroꝝ
dicere poſtponem⁹: vſqꝫ ad ſectionē tertiā. vbi de
medicinis q̄ ſunt ad decorē: de ea generale caplꝫ.
faciem⁹ ſi deus voluerit. Hic tñ ſpeciał̄r dicem⁹. ſ. q̄ ma
gnitudo ipſarū: nō eſt egritudo: ſꝫ īter egritudines nume
raꝰ: ⁊ ꝑinde idigēt medicina q̄ ꝯſeruent in puritate: ⁊ ꝓhi
beant a magnitudine. ¶ Curatio ī duob⁹ ꝯſiſtit. In gēte
ꝑmo ⁊ abſtinētia ab oībus dilatātib⁹ ⁊ extēdentib⁹: ac tra
hētib⁹ ſanguinē ad ipas: vt eſt mot⁹: fricatio: balneatio.
Scdo in cōſtrictiōe: cū aqs frigidis epithimatib⁹ vnguen
tis ⁊ ēplaſtris ⁊ ſtipticis: ⁊ pōticis ꝑdictis hic: ⁊ ligaturis.
Cū vō magnificate fuerint: minui nō pñt: ſꝫ abſcondi ⁊ ce
lari: ⁊ illud cū diffuſiōe ⁊ dilatatōe earū in partib⁹ ſubaſſe
larū: ⁊ hypocōdrioꝝ: ⁊ ꝯſtrictōe cū camiſia cordelata ſtri
cta ſup eas q̄ꝫtū expedire videꝰ. Et ex his q̄ a ꝓpetate ope
ranꝰ: eſt oleū veſpertilioꝝ inunctū: ꝓhibet. n. augmētum
eaꝝ in puellis: ⁊ fricatio lapidis cū quo acuiꝰ. Et itidēꝫ ex
curantib⁹ eſt teſticuloꝝ augmētū: ſeu magnitudinē. Cata
plaſma vtile reſoluēs tumorē mamillaꝝ: ⁊ corruptioneꝫ
lactis. ℞. farine ſeminis lini: farine lētiū. añ. ꝑtes equales
tēpera cū oleo roſato. ⁊ croco. ¶ Aliō ymay. ℞. maruby:
ebuloꝝ: folioꝝ papaueris albi: abſinthy: rute: cuſcute. añ.
ꝑtes eq̄les. ꝑmiſce tepida: ⁊ appone.
¶ Dyaſcorides. ad idē. ℞. olibani maſticis. ſemis abſin
thy: farine lētiū. añ. ʒ. iij. cere. ʒ. iiij. olei roſati. ʒ. vi. fiat vn
guētū: ⁊ inunge. ¶ Linimētū extiguēs ardorē mamilla
rū: ⁊ tumorē delens. ℞. ſucci ſempuiue: ſucci ſolatri: albu
minis ouoꝝ: ⁊ olei roſati. añ. ꝑtes eq̄les: qō nūc frigidum:
nūc tepidū appone. Qō ſi deueniat ad vlcerationē cirugi
ci tūc auxiliū īuocabis. Si aūt tumor cū īflatione fuerit.
tūc oua cū oleo roſato ⁊ aceto appone. Qō ſi ex retētione
ſanguinis mēſtrualis accidit. flebotomeꝰ ex ſafena. deīde
ſi expedit ex baſilica: ⁊ farmacia deꝰ. ¶ Ad tumorē ī ma
millis ex frigidis hūorib⁹ adhibe farinā fenugreci: cū ſuc
co apy: ⁊ ebulorum commixto.
¶ Aliud. ℞. fimi bouini recētis: ⁊ caꝑni. añ. ʒ. ij. ſucci ma
ruby: ſucci ebuloꝝ: fecis aceti. añ. ʒ. i. miſce ⁊ ſuppōe calꝫ.
¶ Aliō ꝯtra viuos ardores: ⁊ rubicūdos: tēperat. n. eos ⁊
obtūdit audaciā eoꝝ. ℞. mucilaginis pſilij: aceti: olei roſ.
⁊ olei viol. añ pōdus. i. opij: camphore. añ. ℈. i. fiat omniū
mixtio cum farina ordei. ⁊ albo ouorum: ⁊ emplaſtra. Ca
ue tamen a ſuperfluo: ne īpellat ad antrum.
¶ Incipit ꝑticula tertia ſectiōis ꝑme ꝯtinēs: ſūmas qua
tuor. Sūma ꝑma: q̄ eſt de medicinis egritudinū meri.

¶ Prologus.

PRotulimus hucuſque
ſermonē noſtre mētis explicātē ꝯceptū
in medicatiōe egritudinū mēbroꝝ deſer
uiētiū ſpiritui. In quo itētiones ⁊ modos
curatiōis ſumauim⁹ ōbite ordinādo: nec
nō īſeruim⁹ medicinas ſimplices ⁊ ꝯpoſi
tas ꝓprias ⁊ exꝑtas. q̄s ꝑmo phi rōne: ⁊ metodo inuene
rūt. antiq medici iudicio ⁊ exꝑimēto approbauerūt: ⁊ q̄s
ſcdm itentionē noſtrā efficaces vidim⁹ ope: ⁊ effectu: put
dei grā inſpirauit q illuminat phos ⁊ medicos ſuos mini
ſtros de celo creauit. Medicinā quoqꝫ ī terra de ſua lar
gitate ꝓduxit: ꝑ quos viſitaret ⁊ redimeret plebem ſuaꝫ.
¶ Et q2 ſcdm ꝑmiſſuꝫ ordinē ꝓcedēdo ſeqtur. vt deinde
aggrediamur curā egritudinū mēbroꝝ nutricatōis. ſ. ſto
maci ⁊ epatis: ⁊ alioꝝ ſeruiētiū eis. ex qb⁹ cetera nutriunꝰ
mēbra. Qō ē tertie ꝑticule ſectiōis ꝑme. Implorem⁹ auxi
liū ab eo ꝑ quē oīa facta ſunt: ⁊ ſine ipo nihil: Suppl̄r exo
rātes quaten⁹ mittere digneꝰ ſpūm ſanctū ſuū. ſpūm veri
tatis q nos doceat: ⁊ ſuggerat nobis oīa q̄ ad recuperādā
ſanitatē ꝑdictoꝝ celerē ſint efficaciter iuuatiua. ⁊ qō bñ
īcepim⁹ ſui grā ꝓſeq: ⁊ mediare meli⁹ poſſim⁹ ſuo auxilio
īfluēte: ⁊ optime explere ſua potētia confirmāte. ¶ Cōti
net aūt hec ꝑticula tertia ſectionis ꝑme ſūmas quatuor.
¶ Prima ē ō medicinis egritudinū meri: qui ſtō trāſglu
tiēdo miniſtrat. ¶ Scda ō medicinis egritudinū ſtōaci.
¶ Tertia ō medicis egritudinū epatis. ⁊ vēaꝝ. ¶ Quar
ta eſt ō medicinis egritudinū ſplenis. ¶ Pria ſūma cōti
net capła. vi. ¶ Caplm ꝑmū eſt ꝓhemiale: ⁊ eſt generalis
ſermo in meri in egritudinib⁹ ei⁹ cauſis ⁊ ſignis: ⁊ cura ſꝫ
modū vniuerſalē. ¶ Caplm ſcdꝫ. de mala ꝯplexione me
ri: ⁊ cura ei⁹. ¶ Caplm tertiū de īſtrumentalib⁹ egritudi
nib⁹ eius: vel mala ꝯpōne ei⁹: ⁊ cura. ¶ Caplꝫ quartū de
ſolutiōib⁹ ꝯtinuitatis eius. ⁊ eoꝝ que ex illis accidūt: vt ē
fluxus ſanguinis: ⁊ eruptio eius ex ore ⁊ cura. ¶ Caplm
quintum de apoſtematibus ei⁹: ⁊ cura. ¶ Capitulū ſex
tum: eſt de nocumentis tranſglutionis ⁊ cura.
¶ Caplm ꝑmū eſt generalis ſermo in meri: ⁊ egritudini
bus ei⁹: ⁊ cauſis ⁊ ſignis: ⁊ cura ſm modū vniuerſalem.

ſ Ciendū aūt q̄ meri eſt mēbꝝ ad formā inteſtini
exiſtēs ꝯcauū: ⁊ oblongū ex duab⁹ tunicis ꝯpoſi
tum ꝯtinuatū cū orificio ſtomaci: ⁊ ꝑforans dya
flāma: ⁊ ꝓcedēs ſuperi⁹ iter cannaꝫ pulmonis: ⁊ ſpōdiles
colli cū ſuis lacertis trāſiēs terminaꝰ in gutture. Quo me
diāte trāſglutiēdo recipit cibū ab ore. ¶ Poteſt aūt pati
omne gen⁹ egritudinū ſicut alia mēbra habētia regimen:
ex qbus neceſſario operationi eius: ad quā ꝑcipaliter cō
ſtituit ipm ſapiētia: prouenit nocumētum: qō eſt tranſglu
tire cibū ⁊ potum: qui ſunt materia nutrimēti: ad quoꝝ
trāſglutionē ordinate ſtomaco deſiderāte ⁊ trahēte mo
uetur tanq̄ſ ſibi ſeruiēs delatorie. Et ambab⁹ ſuis tunicis
ex quibus ꝯponitur operatur interiori attrahēte naturali
virtute cum vilis in lōgitudine ſituatis in ea: ⁊ exteriori
exꝑmente aliter cū vilis latitudinaliter: ſeu lacertis in ea
poſitis recipiētibus neruum a nucca mediātibus ſpondi
libus colli: qua in vomitu ſolum operatur.
¶ Ingt. n. H. trāſglutio ſtō ꝯſiderāte ⁊ trahēte fit: ſꝫ vōit⁹

nulla oris ſtōaci deſiderante ꝑticula ⁊ trahēte: ſꝫ ſola exte
riori tunica exꝑmente cū vilo latitudinalis in ea ſituato
Adiuuat aūt tranſglutionē grauitas ⁊ lubricitas ſubē ipſo
rum ꝙ petūt deſcenſū. ⁊ ꝑinde difficilior trāſglutōe vomi
tus eſſe ꝯprobatur: ⁊ etiam fluxu ventris.

¶ Jngt. n. H. vomitꝰ oībꝰ difficil' eſt. pꝫ. īferior aūt purga
tio facil'. Signa ex qbꝰ relinqᵗ ꝙ nocumētū trāſglutiōis:
qḋ plimū eſt difficultas ipſiꝰ cōe eſt ſignū oiuꝫ generꝫ ꝑdi
ctaꝝ egritudinū poſiuꝫ fieri in ipō meri: ⁊ ēt egritudinum
alioꝝ mēbroꝝ: quoꝝ vicinitate poterit pati: vt eſt epiglo
tis vel cāna pulmōis: ⁊ eiꝰ lacerti: ⁊ ſpōdiles dorſi iter que
ſituaᵗ: ⁊ ſtomacꝰ: ⁊ totū corpꝰ: ⁊ cerebꝝ cui ſupponiᵗ. Sed
ꝑter hec alia ſunt ſigna ꝓpa: alia magis ꝓpa ꝯſiderāda ꝙ
ad cognitōeꝫ ꝑfectā ꝟe cure ōbitā ſunt nccāriо opportuna
¶ Propa āt ſūt ſigna qbꝰ diſtīguunᵗ gnā egritudinū ꝓpa
rū ꝑdcāꝝ: ⁊ egritudinū mēbroꝝ: quoꝝ cōitate pati pt. Et
ſunt. nā illā cuiꝰ cā ē malitia ꝯplōnis ōbilitas ſignificat ꝙ
ī lōgo tpis ſpatio trāſglutiᵗ qḋ ſumiᵗ: ⁊ cū tepiditate: ⁊ pau
citate feſtinationis ī toto ſpatio meri: ⁊ ſine dolore niſi fi
gaᵗ in parte meri viſibilr: ⁊ ꝯſtrigat illic ſiue extēdat. ⁊ ſen
tiaᵗ dolor cū retētōe eiꝰ qḋ trāſglutieᵗ. ¶ Jllā ꝟo cuiꝰ cā
ē mala ꝯpō: ⁊ oppilō oñdit ī potētia trāſglutōis ēt rei par
ue liqde ⁊ potꝰ. ⁊ cū conaᵗ trāſglutire egrediᵗ ꝑ nares. Et
illā cuiꝰ cā eſt ſolō ꝯtinuitatis māifeſtat ſanguis exitꝰ ab
ore: ⁊ hūiditas nālis: ⁊ ꝓpe cū in ſupma eiꝰ pte fuerit: ⁊ ar
dor vl' pūctio ꝑcepta ī collo: ⁊ iter duas ſpatlas: ⁊ ꝓpe apō
trāſglutōeꝫ: ⁊ vomitū: ⁊ eructuatōeꝫ rei acute ꝗlitatis ma
gis ꝗ̄ excedētis ꝗlitatis. Sꝫ illā cuius cā eſt apā declarat
tumor: ⁊ ꝓpe ſi ſit magnū: ⁊ qñqꝫ febris: ⁊ dolor in illa pte
acutꝰ: ⁊ grauatiuꝰ: ⁊ ꝯpreſſiuꝰ: ⁊ ꝓpe in loco poſt: ꝙ iter ſpa
tulas exiſtit maxie: ſi in ſupiori pte meri ſit vlcꝰ vel apā: ⁊
magis in pte corrñdēte loco: vel pti meri vlcerato vel apa
to: ⁊ magis apō trāſglutōeꝫ vomitū: ⁊ eructuatōeꝫ rei ma
gne ꝗ̄titatis magis ꝗ̄ acute ꝗlitatis. Et difficltas trāſglu
tiēdi ē in vna pte meri magis ꝗ̄ in alia ñ in toto ſpacio eiꝰ
¶ Jllā ēt cuiꝰ cā ē ꝯpaſſio mēbri vicini īſinuat ꝑcedēs paſ
ſio mēbri ipſiꝰ ꝙ ſuīs ꝓpꝛijs ē ꝯſiderāda ſignis. Nec iuenit
ibi tactꝰ dolorē: nec aliquā paſſionē niſi nocumētū actōis
tm̄. Magis ꝓpa ſigna ſunt ꝙ ſpāliū egritudinū ⁊ cāꝝ ſunt
ōmſatiua: ⁊ ſunt ꝙ infra in ſpālibꝰ diceᵗ caplīs. ¶ Cura
īdicatio cure meri egritudinū duplex ē. gnal'. ſ. ⁊ ſpāl'. Gnā
lis ē duplex. vna ꝙ īdicat locū in quo medicīe exteriꝰ ſunt
applicāde: ⁊ eſt vt ī collo: ⁊ loco ꝙ eſt iter duas ſpatulas ap
pliceᵗ. vt iuxta. H. Alia īſinuat modū ſꝫ quē medicīe ite
riꝰ ſunt ſumēde. Et ē vt medicīe nō ſubito degluriaᵗ ꝑut
ī egritudibus ſtōaci opꝫ fieri: ſꝫ in ore retineaᵗ: ⁊ lābēdo
trāſglutiaᵗ vt trahēdo morā in trāſitu: licꝫ decliui impſ
ſione faciāt eaꝝ ꝓpe qualitatis. Spālis eſt ꝙ docet ſpāleſ
talē egritudinē: ⁊ cāꝫ corrigere accñtia: ⁊ regimē ordiare:
necnō ſpāles medicīas cū qbus īſinuat: ⁊ deſcribit ꝙ in ſe
quētibꝰ caplīs ſerioſiꝰ ponemꝰ: nomē dñi iuocando.

¶ Caplꝫ. ij. de mala ꝯplexiōe meri ⁊ cura eiꝰ.

m Ala ꝯplexio meri: aut ē pura: aut cū mā. Pura aut
ē ſimplex aut cōpoſita. ⁊ ſimplex aut cala: aut fri
da: aut ſicca: aut hūida: ⁊ cā eiꝰ eſt ꝑ catartica ſi pura ſit. cā
ꝟo hūoral' cuiuſlꝫ gnīs eē pt. Et ſigna eiꝰ ſūt alteratio ꝑce
pta ī loco cū difficultate trāſglutiēdi abſqꝫ tūore vel vlce
re ī eo exñte. Et ſiqdē fuerit pura cā eſt ꝑ catartica plimū
abſqꝫ iuentōe añcedētis cāe: ⁊ īfectōe oris: ⁊ ligue ex hūo
re: ⁊ fluore hūiditatū. Si ꝟo ſit cū mā erit ibi iuētio añce
dētis cāe cū īfectōe oris: ⁊ ligue ex hūore cꝰ ſpēꝫ tibi color
⁊ ſapor oñdit: ⁊ fluor hūiditatis ſi adſit. Et ſiqdē ſit calida
erit ibi ſēſus īflāmatōis: ⁊ ꝯbuſtiōis: ⁊ calitas ī ſſficie oris
⁊ ligue: ⁊ ſitis. Si ꝟo ſit frida. ⁊ ē illa ꝙ ſupius fit ſigna ſunt
ꝯtria. ſꝫ ſi ſit humida moll' ſignū ē hūiditas oris: ⁊ ligue: ⁊ ꝑ
uatio ſitis. Si ꝟo ſicca ſigna erūt ꝯtraria. Cura male ꝯple
xionis meri ex cura male ꝯplexionis ſtomaci pōt haberi.
¶ Jngt. n. Aboaly. Jn plībus diſpōnibus meri ſequunᵗ
ſtomaci diſpōnes. Eſt. n. via ad ipm ꝯtigua cōſil'is in nā. ⁊
ꝑinde cura vtrorūqꝫ erit eadem vt multum.

¶ Capitulum tertium de egritudinibus īſtrumētalibus
meri: vel mala ꝯpoſitione eius ⁊ cura ipſius.

m Ala ꝯpō meri: ex ꝙ plurimū ē oppilatio ī via eius
tripl'r eē ꝯtingit. ſ. coartatoria: attenuatoria: ⁊ car
noſa. Attenuatoria āt ē ex ꝯpſſiōe ⁊ coāguſtatiōe
parietū ipiꝰ meri. ⁊ ē aut ex cā extrīſeca ꝙ ꝯpſſit ⁊ remāſit
ꝯpſſio: vt ē laqueꝰ vel manꝰ: ⁊ hmōi. Aut ē frigiditas mul
ta cōgelās: aut ē a cā iteriori: aut ī ſe: aut a vicinitate. Jn ſe
a caliditate ⁊ ſiccitate adurēte vt ī febribꝰ acutis: vel ex
ſpaſmo: ⁊ alcuçeç ꝓpinquo lacertoꝝ meri ⁊ viloꝝ: ⁊ ꝓpꝛie
latitudinaliū: ex quoꝝ ꝯtractione ꝯtrahunᵗ latera ipius:
⁊ via coartaᵗ: vel ex vētoſitate coartata inter duas eiꝰ tu
nicas: ⁊ itercluſa ī lacertis eiꝰ ꝯſtrigēte ⁊ ipellēte parietes
eiꝰ ītus: vt coarteᵗ via. Et cā vicītatis ē: vt ab apāte ī lacer
tis epiglotꝫ ꝟſus meri a pte anteriori: vt ī ſgnāticis ꝯtigit:
aut ī lacertis colli reſpiciētibꝰ eū a pte poſteriori: aut a de
clinatiōe ſpōdilis diſlocati ad anteriora ꝟſus meri. Coar
tatoria ē ꝙ cadit in eiꝰ via aliꝗ res exterior. ibi adherēs ſi
cut ſpina: vt accidit ī ꝑfocatiōe: vel hūor viſcoſus. ibi coar
tatꝰ: ⁊ adherēs: vt in apopleticis ⁊ epilēticis: ⁊ reūatiſmis
euenire ꝯtigit: aut ſanguis cōgelatꝰ: ꝙ ad illud ꝯſueuit de
ſcēdere ī fluxu ſanguis nariū aliꝗ pte eiꝰ regurgitāte ꝑ fo
ramina palati ad os: ⁊ deueniēte ad ipm: vel ꝙ in vomitu
ſanguis ī eo remāſit. aut vētres ⁊ lūbrici ī eiꝰ ꝯcauo multi
plicati: ſiue īfixi vt aſſerit Abo. ſe vidiſſe ī quodā notoriꝫ
ſuoꝝ: ex qbꝰ accidit ei difficultas trāſglutiēdi. ¶ Carnoſa
ꝟo ē ex apāte exiſtēte ī lacertis: ⁊ tunicis ipiꝰ yſofagi gre
ce dicti qḋ arabice meri nūcupaᵗ: vel veruca: vel cicatrix
ī eo facta: ꝙ paſſus fuit vulnꝰ: ſeu vlcꝰ ī ipō: ⁊ liberatꝰ fuit:
cuiꝰ cā extitit etas: ſic recitat Gal. ¶ Signa. ꝗ̄s ꝑ cās opꝫ
cognoſcere ⁊ diſtīguere hoc mō. Nā ſi qdē attēuatoria fit
fietqꝫ a cā exteriori ſenſu manifeſte cognoſces ꝑ eiꝰ veſti
gia ⁊ relatu īfirmi: ⁊ aſtātiū ei tibi īdicabiᵗ: ⁊ nocumētuꝫ
trāſglutōis: vtputa difficultas: ⁊ minꝰ ſi quoqꝫ ex frigore
cōgellāte accidit ꝑſentia frigoris: ⁊ eiꝰ anteceſſio īdicabit
Si ꝟo a cā iteriori ī ipō exiſtēte: ⁊ ſiccitate ꝑ īſpectionem
acute feb. illud euenire videbis: ⁊ nocumētū trāſglutōis
maiꝰ erit. ¶ Si ꝟo ex ſpaſmo: ⁊ alguçeç ex ꝓpinquo acci
dit ex cognitōe ipſiꝰ: ⁊ cāruꝫ ꝑcedētiū ſcire poteris ēt ſi
accidat ex vētoſitate ꝑcedēs regimē multiplicās cā ſo
nitꝰ: ⁊ motꝰ: ⁊ dolor extēſiuꝰ: ⁊ ꝯſtrictiuꝰ īdicat illō. ¶ Cū
qꝫ ex cā vicinitatis accidat ⁊ ab apāte ī lacertis epiglotis ⁊
dolor ī epigloto erit cū ſpūs malitia: ⁊ qñqꝫ cū ortomia ⁊
tūore: ⁊ rubore: ibi appēnte. ſ. ī gutture ⁊ ī collo: ⁊ febris.
Si ꝟo ex apāte lacertoꝝ colli reſpiciētibus eū apparebit
dolor colli a parte iteriori cum difficultate mouēdi ⁊ icli
nādi collum ⁊ ꝓpꝛie ad poſteriora. Si quoqꝫ ex declinati
one ſpondilis ad īteriora: ex ꝯcauitate in collo apparente
ꝑcipies: vt cū icliaᵗ collū ad poſteriora difficilior trāſglu
tio erit. Sꝫ ſi qdeꝫ ſit coartatoria: eritqꝫ a cā exteriori ca
dēte ⁊ īfixa: vt ſpina pūctio: ⁊ ꝓpꝛie ad motum ibi ꝑcepta
⁊ relatio īfirmi tibi īſinuat. Sꝫ ſi ſit ab hūore viſcoſo regi
mē ꝺclarat: ⁊ ꝑſentia egritudinū ꝑdictaꝝ. Si ꝟo ſanguis
cōgelatꝰ fuerit: fluxꝰ ſanguis ab ore: vel ex naribꝰ ꝙ regur
gitauit ad os ⁊ guttur: tibi oſtēdit. Si ꝟo vermes: ⁊ lūbri
ci ⁊ nauſea mordicatio: ⁊ vomitꝰ ⁊ ſincopis tibi oſtēdunt.
Et ſi qdeꝫ ſit carnoſa ex apāte: ſigna apātis dicta ſupiꝰ ti
bi īdicāt: ⁊ ꝙ īfra ī caplō ꝓpō tibi ponemꝰ ī ſpāli. Si ꝟo ſit
veruca ē īpedimētū partiū tranſglutiōis ī loco: vbi ē: ī to
to ꝟo meri nō: nec ē dolor. ⁊ ē ꝑuatio ſignoꝝ aliaꝝ cauſa
rū. Si ꝟo ſit ex cicatrice tibi ꝑceſſio vlceris ipiꝰ īdicabit.
¶ Cura eſt duplex: generalis. ſ. ⁊ ſpecialis. Generalis eſt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0262-4

due res. vna ē ablatio cauſe. alia ē remotio īpreſſionis fa-
cte: ſi qua remāſit. Spālis ꝯſiſtit ī ablatiōe ſpālis cāe ⁊ in
adminiſtratōe medicinaꝝ ꝓpriaꝝ ad illā. Si ergo fuerit
ex exteriori cā: a q̄ remāſit īpreſſio: ⁊ ꝯſtrictio: amota illa
approximēt̄ balnea: ⁊ fomētatōes circa gutt̄ ⁊ collū ⁊ ſpa-
tulas ex aqs calidis: ⁊ ſimplicibꝰ: vel cū decoctione medi-
ciaꝝ dilatātiū: ⁊ ꝯfortātiū: vt melliloti maluaꝝ: fenugre-
ci: apij: ⁊ ſiliū. Et fricatiōes ſuaues cū oleis tēperate calīs
reddētibꝰ tractabile mēbꝝ: vt eſt oleū de fiſticis: ð amig-
dalis dulcibꝰ: ⁊ de pineis: ⁊ de melliloto: ⁊ camōilla: ⁊ ſili-
bus. Et cerota ex eis ex butiro ⁊ mucilaginibus notis iſo-
po humida: ⁊ dialtea: ⁊ ſilibus. Et cibi iterīꝰ ſumendi ſint
ex calefacientibꝰ: ⁊ humectantibꝰ ſupradictis. Ita ꝙ boli
ſint magni in quoꝝ trāſglutiōe conet̄: ⁊ cū retentōe anhe-
litus. Si vero ſit ex caliditate adurēte ī febre acuta, ꝑmo
oꝫ febrē curare. vt īfra dicet̄. deīde ſiccitatē ⁊ aduſtionez
ibi īpreſſaꝫ remouere. ⁊ hoc cū interius ⁊ exterius appro-
ximādis. Interīꝰ ſicut cū mucilagine dragagāti. ſemine ci-
tonioꝝ: pſilij: ⁊ pulpa tamarindoꝝ: ⁊ tereniabī: ⁊ lacte ſemi-
nū cōiuꝫ: ⁊ ſemis papa. ⁊ ſucco ligritie: ⁊ cū carnibꝰ pruno-
rū. ⁊ aqs fructuū: vt iuiubaꝝ: granatoꝝ: lactucaꝝ: violaꝝ:
cedei: ⁊ cū ſyrupo violato: ⁊ roſato bibitis ſorbēdo. ⁊ reten-
tis in ore: ⁊ gargariçatis: ⁊ cū caudis coꝝ: ⁊ cū cibis ex ami-
do de cucurbita: ⁊ pulmēto ex atriplicibꝰ ſpinachijs: ⁊ la-
ctucis: ⁊ ſilibus. Exterīꝰ cū inunctōibus: ⁊ oleis violatis ð
cucurbitis: ⁊ ſilibus ꝓut ī cura febriū faciemꝰ te ſcire. Si
vō fiat a frigore ꝯgelāte iterius adminiſtrabis diacalamen-
tū: ⁊ dyaciminū dyatrion: ſyrupū de aſce: tyriacā mitrida-
tum: ⁊ oleū balſami cū vino: ⁊ cibos: ⁊ potꝰ calidos notos.
Exterīꝰ vō calefactōes ex aqs calīs paulatiꝫ ſupius dictis
Et vnctiones ex oleo anetino: de lilio: ⁊ eſt proprium: ⁊ de
caſtoreo: coſto: vel alijs calidis ſuperius dictis. Et calefa-
ctiones ex floribus camomille calamento pulegio: flori-
bus lauri: abrotano: ⁊ ſilibꝰ: ⁊ cū pānis calīs: ⁊ calefactis ⁊
ſtupa lini: vel canapis: vel lana ſuccida. Si vō fiat ex ſpaſ-
mo: ſigdē hūido facies vnctiōes: ð oleo ð euforbio: ð pipi-
bus. Et ſi expediat euet̄ur totū corpꝰ cū cliſterijs collirijs
dabiſq; ad bibendū aſſaꝫ cū aq̄ granatoꝝ. vl̄ cū vino pipe-
rata ⁊ ſilibꝰ. Si vō ſit ſiccꝰ adminiſtrabis regimē humecta-
tiuū ex cibis ⁊ potibꝰ. Cibis vt aq̄ gallinaꝝ pinguiū ⁊ iuue-
nū. Et carnes edoꝝ: ⁊ agnoꝝ: ⁊ vitloꝝ lactātiū: ptiſana: pl-
mēta ex amido: ⁊ ale pulloꝝ: ⁊ teſticuli galloꝝ in lacte nu-
tritoꝝ: ⁊ piſces puī: ⁊ petrini: ⁊ oua ſorbilia: lac: butiꝝ: me-
dulle: ⁊ ſilia. Olera ſunt vt boragines: bugloſſe: ſpinachia
atriplices: ⁊ ſilia. Fructꝰ ſunt vt poma dulcia: pinee: fiſtici:
amigdale: ſiſamꝰ: ⁊ ſilia. Potus vt vinuꝫ limphatū: aqua
cū çuccaro: vel iuleb violatuꝫ. Et electuaria humectantia
ſunt dyacodion: dyadragantum: dyaboriginatū. ⁊ dyabu-
gloſſatum: Et electuarium ad reſtaurationeꝫ: ⁊ impingua-
tiuum ſuperius dictum: ⁊ panis aloe: ⁊ ſimilia. Exterīꝰ ve-
ro cuꝫ embrocis: vel epithimatibus ⁊ fomentis ex aquis
dulcibus enarratis: ⁊ fricationibꝰ: ⁊ balneis: ⁊ inunctioni-
bus: ⁊ oleis: ⁊ cerotis: ⁊ hūectātibꝰ: vt eſt oleū amigdalaꝝ
dulciū: pineaꝝ: fiſticoꝝ: violaꝝ: ſuccꝰ maluarū: cucurbite
melonis: cucumeris. Et ſemina: ⁊ aq̄ ipoꝝ: ⁊ ſorbitio facta
ex eis ⁊ graſulis: ⁊ piguedīes gallīe: porci anatis: ⁊ medul̄
vituloꝝ: ⁊ lacte. In domo ⁊ aere locet̄: ⁊ ī qete ⁊ ſōno ſer-
uet̄. Et ſi gdē remāſerit īpſſio ꝯſtrictōis opaberis ad eaꝫ.
vt hic ſupīꝰ hūiſti. Si aūt a vētoſitate fit. dabis iterīꝰ oleū
ð keruā dyaniſuꝫ: dyagalāgā: dyaciminū: ꝯfectōes ð ſemi-
nibꝰ: ⁊ cōmouētia eructuatōeꝫ: vt aniſuꝫ: ciminū: rutā ſic-
cā: erucā: carui: ameos: maſticē: ⁊ thus maſticata vel hau-
ſta: ⁊ ī cibis: ⁊ ī potibꝰ mixta. Exterīꝰ pones vētoſam: ⁊ vn-
ges ex oleo nardino de enula: rutaceo ð aſſa: ⁊ ſilibꝰ ſupīꝰ
enarratis. ¶ Si vō fit a vicinitate apatis gutturis lacer-
toꝝ: vel colli curabis curatiōe ſgnātie: quā ſupīꝰ habuiſti.

¶ Sꝫ ſi fuerit a diſſolutiōe ſpōdilis colli cura ꝓpria poſi-
ta ē īfra. ¶ Silr̄ ſi ſit coartatoria. qꝛ cadit in eiꝰ via aliqd
extraneū adherēs: vt ſpina ⁊ ſilia curabis cura ꝑfocatōis
ſupīꝰ poſita. Et ſi ſit hūor viſcoſus ibi deſcēdēs: ⁊ adherēs
curabis ipꝫ expurgatiōe cū īciſiuis: ⁊ abſtergētibꝰ farma-
cijs: puta cū gargariſmatibꝰ ex ſyrupo acetoſo: ſimplici: vl̄
oximelle ſqllitico: vel aceto eiꝰ cū melle roſato: ⁊ aq̄ mell̄
iſopi: vel ſtaphiſagrie: vel ſinapis: vel piretri: ⁊ calamenti.
origani ⁊ pulegij: paſſulaꝝ: ficuū ſiccaꝝ: ⁊ cū ꝓuocatione
vomitꝰ cū ꝑdictis: ⁊ cliſteribꝰ acutis notis ſupra. Nec non
ſi expedit egritudīes capitis a quo ꝓuenit reumatiſmꝰ: oꝫ
curare vt ſuperīꝰ dcm̄ eſt. Etiam ſi fuerit ſanguis ꝯgelatꝰ
due res cōueniūt in cura eiꝰ. Prima eſt ipꝫ liq̄facere. ſcd̄a
eſt ipꝫ educere. ꝓut īfra de cura ꝯgelatōis ſanguīs in ſto-
maco: ⁊ vētre dicemꝰ: ⁊ hoc cū ſimplicibꝰ ⁊ ꝯpoſitis. Sim-
plicia ſunt coagulū bitumen bdelliū: ⁊ buchuē. cū aq̄ cine-
ris ligni ficus: ⁊ quercus ſumpta et gargariçata.

¶ Scd̄a eſt ipſum educere cum vomitus ꝓuocatione cū
melle: ⁊ ſucco apij: ⁊ terra ſigillata diſſoluta in aq̄: ⁊ fari-
na tartari diſſoluta in ea calīa vel vino.

¶ Ingt. n. G. vinuꝫ coagulata diſſoluit: ⁊ ſuo motu citius
extra pellit: vl̄ fluxu vētris: ⁊ hoc cū cliſteri ex ſucco apij:
oppoponaco diſſoluto in eo cū ſalgēma: ⁊ mele. vel reſolo-
ne ipaꝝ cū emplō facto ex aſce: ſal gēma: oppoponaco cū
melle ꝯfectis. ⁊ approximato gutturi. ¶ Si vō ſit ex lum-
bricis: ⁊ vermibus ibi coadunatis: ⁊ infixis. Cura eſt due
res. ſ. iterficere: ⁊ educere ſicut ſupra ð egritudinū cordis
cura diximꝰ. Et hic breuiter dicamꝰ q̄ illis duobus ſunt ꝓ-
pria. ⁊ ex illis eſt haurac: kebuli: myrra decocta in oleo cē-
tonica: ⁊ cētaurea ſūpta. Et poſtq̄ ꝓuocat̄ vomitꝰ: ⁊ ēpla-
ta kitran: ⁊ petroleon iunctū aloes: ⁊ yera iterficiūt: ⁊ edu-
cūt illos. ¶ Si vō ſit carnoſa: ⁊ ex apate in lacertis: ⁊ tu-
nicis ipſīꝰ meri. Cura ē quā īfra dicemꝰ. ¶ Si vō ſit ex ve-
ruca vel cicatrice. Curabis cū abſterſiuis ſtipticis vel ſub-
tiliatiuis: vt eſt aq̄ mellis cū v̄tute radicis capparis: ⁊ paſ-
ſulis: ⁊ floribꝰ abſinthij: ſgnāto: ⁊ cappares cuꝫ aceto boni
vini. Et ficus ſicce cū granis myrti: ⁊ aq̄ cauliū reſeruata
ꝑ tres dies bibita: ⁊ fiſtici: ⁊ amigdale pinee ſūpte: ⁊ oleuꝫ
eaꝝ ſumptū: ⁊ exterīꝰ inunctū: ⁊ aq̄ nucuꝫ cipreſſi: calami
arōatici: aniſi: melliloti ēbrocata: ⁊ ſilia ꝓut tibi ſapīa mō-
ſtrabit: ⁊ quādoq; eſt incurabilis.

¶ Medicamē diſſoluens ſanguinē ꝯgelatū in ſtomaco ⁊
meri. ℞. coaguli leporis. ʒ. xxxvi. coaguli gaçeli. ʒ. xxxij.
gētiane: ariſtologie rotūde: ſeminis rute ſilueſtris: myrti.
ana. ʒ. iiij. Cōficiant̄ cum melle. Et ſit doſis eius ſicut vis
in aqua calida: aut in ſyrupo acetoſo.

¶ Ca. iiij. de ſolōne ꝯtinuitatis meri. ⁊ eoꝝ q̄ ex ill̄ accīt
vt ē fluxus ſanguinis: ⁊ ruptio eiꝰ ex ore: ⁊ cura eius.

Olutio ꝯtinui meri eueniēs duplex eē ꝯtigit ſim-
plex: vt ē plaga: pūctio: ſciſſio. ⁊ ſilia: aut cōpoſita:
vt ē vlceratō eueniēs ipi: ⁊ qñq; aut ē ſupficial̄: ſic
ē excoriatio: aut ꝓfunda penetrās tunicā vl̄ pelliculā vnā
vel ambas. Simplicis cā ē iterior ⁊ exterior. Interior eſt
hūiditas in ſui ſubā aggregata: ⁊ pelliculis eiꝰ penetrans:
⁊ ꝑforās ſui acuitate: aut ſua q̄titate replēte. Aut ſua ven-
toſitate extēdēte ſcindēs: ipm ꝓfunde: ⁊ qñq; totaliter.

¶ Exterior eſt: vel trāſglutio rei: ſcindētis vel pungētis
vt oſſis acuti: vel ſpine: vel vitri: vel percuſſio: cū re īcidē-
te pūgente ⁊ perforāte. ¶ Et ſuperficialis cauſa interior
eſt cibꝰ acutus: vel medicina: aut humor trāſiens acutus
cū vomitu de ſtomaco ſaliēs: aut dſcēdēs ītrās ad ipꝫ: aut
ē malitia ꝯplōnis calē ⁊ ſicce exiccātis ipm: q̄re ſupficies
eiꝰ adurit̄: ⁊ cadit ſic ī febribꝰ adurētibꝰ ꝯtigit frequēter.

¶ Cā vō ꝯpoſite. ſ. vlceratōis ē duplex. ſ. iterior ⁊ exterior
Interior āt ē aptio apatis: aut plaga q̄ facit ſanguinē: aut
hūor corroſiuꝰ trāſiēs: ⁊ ī cattaris deſcēdēs ad eū vl̄ alias

ibi imbibitus coꝛruptus ⁊ putrefactus coꝛrodens ipſum.
¶ Exterioꝛ eſt q̄ partē de eius ſub̄a ſcindēdo aſpoꝛtauit: ⁊ ē nota. ¶ Signa vlceꝝ eiꝰ dicta ſunt ſupꝛa. Sed diſtinguētia īter vlcera meri ⁊ ſtomaci a tribus ſumunť .ſ. a loco. a tp̄e: ⁊ ab accn̄tibus ꝯcomitantibꝰ. A loco. nā in vlceribus meri doloꝛ pūctio: ⁊ ardoꝛ ſentiť in collo: vſq₃ ad oſſa doꝛſi: ⁊ furculā ſuperioꝛē pectoꝛis: ⁊ illud qđ eſt īter duas ſpatulas. in vlceribꝰ vero ſtōaci doloꝛ punctio ⁊ ardoꝛ ſentiť: in īferioꝛibus oſſibꝰ pectoꝛis: puta furcula īferioꝛi pectoꝛis īfra. A tempoꝛe. nā in vlceribꝰ meri ſentiť dū₃ trāſglutio fit vomitꝰ vel eructuatio rei acute q̄litatis. in vlceribꝰ vero ſtomaci ſentiť poſtq̄₃ trāſglutitus eſt. Ab accn̄tibus cōcomitantibꝰ qn̄ vlcera ſtomaci plurimum ⁊ ꝓprie: ſunt in ſupioꝛi parte ſtomaci ꝓducūt ad minoꝛationē vel ablatōe₃ anhelitus: ⁊ ꝓuocatione₃ ſudoꝛis frigidi: ⁊ ſincopim: ⁊ īfrigidatōe₃ extremitatū. S₃ ſimplicis ſoľonis cāe īterioꝛis humoꝛalis ſignū eſt: īuentio ſignoꝝ antecedētis cāe: ⁊ regimen p̄cedēs multiplicās talē humoꝛē: ⁊ īfectio partiū oꝛis ex humoꝛe acuto: quē doloꝛ ⁊ ſapoꝛ oñdit: ⁊ cōſuetudo paſſionis illiꝰ. Si vero ſit a cā exterioꝛi eſt manifeſta ex ſe vel relatu īfirmi. Sed ſi ſit ſupficialis ardoꝛ: ⁊ pūctio eſt parua cito trāſiens. Et egrediť quādoq₃ f.. truſcula: ⁊ pellicula aduſta. Si vero ꝓfunda doloꝛ eſt foꝛtioꝛ ⁊ diutiꝰ durans: ⁊ egrediť ſanguis: ⁊ humiditas n̄ alis. Et īuentio cāꝝ interioꝝ: ⁊ exterioꝝ ipſas inſinuat. Signum aūt vlceris ipſius fetoꝛ eſt in oꝛe p̄ceptus: ⁊ exitus per os puris: ⁊ ſaniei: ⁊ qn̄q₃ aſſociantur ei pelliculaꝝ fruſta.
¶ Cura ſoľonis ꝯtinui meri difficilis: vel impoſſis eſſe dignoſciť ſicut cura ſoľonis ꝯtinui cuiuſlibet mēbri: qđ eſt via per quā aliqđ extraneū tranſit trahiť vel expelliť: vt ſunt meri inteſtina renes poꝛi vritides: ⁊ veſica: ⁊ maxime cū eſt īt̄rinſeca ꝯpoſita: ⁊ ꝓfunda: ⁊ penetratiua. nō. n. pōt bn̄ medicina apponi: ⁊ ſi apponať nō tam diu ꝑmanet: vt ſua₃ impꝛeſſionē faciat: qꝛ cibi ⁊ potꝰ tranſglutōe abſtergatur: ⁊ aſpoꝛteť q̄ etia₃: ampliati q̄ntitate magis buccellis: ⁊ ſua q̄litate acuta ſi quā hn̄t pungūt: ⁊ doloꝛē faciunt: q eſt ꝓuocatiuꝰ reumatis: ⁊ ſic vlceris augmētationis. Si ergo ſit ſimplex: ⁊ recēs plaga: ⁊ ſupficialꝭ cura eius eſt tres res. p̄ma aufert cām exterioꝛē: ⁊ īterioꝛe₃ abſcindit. ſc̄da ſolutionē vnit. tertia coꝛrigit āccidentia.
¶ Primā re₃ ꝯplent flebotomie de cephalica vel magis cliſteria: ⁊ farmacie ſolutiue vētris: non vomitiue cum ꝓpꝛijs ſtomaci dictis cum ēt cerebꝛo ſi expediat: ⁊ ꝯñter cū ꝯfoꝛtātibus ipm̄: ⁊ retinentibus ipm̄ catarru₃: ⁊ ablatiōe oīs rei exterioꝛis īfixe: aut teli: put īfra đ ſoľone ꝯtinui dicetur: ſi annuat omnipotens.
¶ Rem v̄o ſc̄dam ꝯplent ſtiptica ⁊ ꝯglutinatiua: iterius ⁊ exteriꝰ approximata. Interiꝰ gargariçata ⁊ retēta ī oꝛe: ⁊ lambita ſimplicia: ⁊ ꝯpoſita. ſimplicia ſunt vt grana: ⁊ cime myrtoꝝ: lētiſci: oliuaꝝ: ⁊ rubi: ⁊ grana granatoꝝ: ⁊ citonia: ⁊ coꝛtices balauſtiaꝝ ipoꝝ: ⁊ roſe imature maſticate: ⁊ trāſglutiať ſuccus eoꝝ ſic reſudat: ⁊ gargariçatio cū aq̄s ipſaꝝ: ⁊ cū rob ipaꝝ: ⁊ rob moꝛi: gūmi: dꝛagagāti: lutū armenū. ⁊ lutū ſigillatū: ⁊ thus: albumē ouoꝝ: ⁊ ſilia. Cōpoſitis ad alcola dcā ſunt ſupꝛa: ⁊ que īferiꝰ tibi traduntť ad vlcera: q̄ ēt exteriꝰ per oē₃ modū adminiſtrare poteris: ⁊ ꝓp̄e circa collū ⁊ guttur: ⁊ locū qui īter duas ſpatulas exiſtit.
¶ Tertiā vero re₃ cōplent q̄ doloꝛē ⁊ punctōes coꝛrigūt: q̄ ſequūť. Si v̄o ſit ꝓfunda penetratiua eiꝰ cura ē. iij. res.
¶ Prima eſt vt ſanguinē fluentē reſtringas: ⁊ doloꝛe₃ ſedes: ⁊ illđ cū approximatiōe. ⁊ epithimatōe albuminis ouorū: ⁊ alijs que dicemus in capitulo ſubſequēti. ¶ Sc̄da ē. vt ſicca ſtiptic̄atia. ⁊ cōglutinantia. ⁊ ꝯſolidātia p̄dcā interius: ⁊ exteriꝰ applicenť. ¶ Tertia vt regimen adequeť ī ſex rebus nō n̄alibus ꝓp̄e in cibo ⁊ potu. Seruieť ergo ingete: ⁊ ab oībus dilatātibus: ⁊ aperientibꝰ vomitis ⁊ ꝓuocantibꝰ reuma. Cuſtodiať a cibis calidis: ⁊ a potibꝰ: ⁊ acute q̄litatis: ſ₃ ſint ex lenientibꝰ glutinoſis ⁊ ſtipticis: vt ſunt oua ſoꝛbilia pulmentū ex riſo vel amido cum iure carniū p̄paratū: ⁊ vinū ſtipticū: ⁊ ſilia: ⁊ buccelle ſint parue: ⁊ repletio pauca. ¶ Si āt ſit vlceratio in eo facta curabis cura vlceꝝ: quā tibi inferius ſubiungemus. Fiant foꝛmule ī modū lupinoꝝ: quaꝝ vna retenta in oꝛe: ⁊ ſicut diſſoluiť degļutiť remouet ſoľonē ꝯtinui: ⁊ vlcera meri: ⁊ ꝯſolidat: ⁊ īcarnat. ⁊ lēit. ℞. gūmi: dꝛagagāti: maſticis: thuris albi. ana. ʒ. i. yreos. ʒ. ſ. ligritie. ʒ. i. hypogſtidos: granoꝝ myrte ⁊ cimarū eiꝰ: ⁊ oliuaꝝ. ana. ʒ. ſ. ſeminis citonioꝝ. ℈. ij. luti ſigillati: ⁊ luti armeni. ana. ʒ. i. cōtere ⁊ cōficiať cum rob myrte: vel lētiſci: ⁊ eſt ex īuētione noſtra.
¶ Unguētum aliud expertū ⁊ efficacIſſimū ad vulnera ⁊ vlcera in quacūq₃ parte coꝛpoꝛis ſunt: ⁊ ꝓp̄e capitis cū fractura cranei: ⁊ eſt romanoꝝ. ℞. terbentine. ℥. viij. ſucci betonice. ℥. v. ⁊ ſub̄a₃ eius: miſceanť ſimul. Et ſtēt p̄ duos dies: deinde ponanť ſup ignē leuē: ⁊ caleſiāt donec liquefiat terbētina. deinde colenť per ſtamineā: ⁊ colatura iterū ponať ſup igne₃. ⁊ bulliat vſq₃ ad ꝯſumptionē ſucci. poſtea addať gūmi abietis. ℥. ſ. olei roſ. ℥. ſ. cere. ℥. iiij. ⁊ vtere. Eruptio fluxus ſanguinis ex meri: ex vena apta: ⁊ inciſa fracta vel coꝛroſa ꝓuenit: cuius cā interioꝛ ⁊ exterioꝛ cē pōt ſicut ſupꝛa de ſputo ſanguis habuiſti: ⁊ infra cū de ſtomaco īuenies loq̄mur. in ꝓpoſito eſt ipſiꝰ meri vlceratio ex vena coꝛroſa. Eius aūt ſignū eſt exitus eius cū faſtidio. ⁊ quodā vomēdi motu minoꝛe q̄₃ ſi a ſtomaco ꝓueniret: ⁊ ſi eſt vena fracta īciſa vel cōꝛroſa doloꝛ eſt in collo: ⁊ loco q eſt īter duas ſpatulas ꝓp̄e ſi ſit magna inciſio fractura vel coꝛroſio: ⁊ maxime apud ſumptōe₃ rei acute. Si vero ſit a vena apta nō eſt doloꝛ: ⁊ faciliꝰ retineť. Si vero ſit a vena coꝛroſa ab vlcere eius ſigna ſunt ſigna vlceris ipſiꝰ p̄dicta: ⁊ emiſſio ſaniei ⁊ puris: ⁊ difficultas retentionis.
¶ Cura eius eſt quā ſuperiꝰ de ſputo ſanguinis habuiſti ⁊ de fluxu ſanguinis narium. ⁊ īfra in capitulo de ſtomaco: cuius meri eſt inſtrumentū ad attrahendum. que ſibi ſunt iuuatiua ſufficiēter loquemur.

¶ Capitulu₃ quintum de apatibus meri: ⁊ cura eiꝰ.

Poſtematis meri ſigna ſuperius habuiſti ſingu-
a laria ⁊ ꝓpꝛia q̄bus ſubiungēda ſunt magis ꝓpꝛia.
Et ſunt: nā ſi q̄dē apoſtema eius calidū ſit cū p̄dictis: erit foꝛtitudo: doloꝛis īflāmatio: caliditas: ⁊ ꝓp̄e in partibꝰ oꝛis ⁊ colli p̄cepta. Et qn̄q₃ eſt febꝛis ꝓua: qn̄q₃ magna hoꝛa poſt hoꝛā. Et qn̄q₃ eſt oꝛipilatio: ⁊ eſt cū ſiti vehemēti. Cū ergo maturať ceſſat oꝛipilatio: ⁊ cū aperiť egrediť pus: ⁊ oꝛipilatio redit. Cum aūt eſt āpa frigidum ſigna ſunt contraria. cuiꝰ cura₃ hr̄e poteris ſi eoꝝ memoꝛ eris: q̄ in cura freneſis litargie: ⁊ mamillaꝝ diximꝰ: ⁊ magis ſi īſpexeris q̄ dicemus in cura āpatu₃ ſtomaci.

¶ Capľ. ſextū de nocumētis trāſglutōis ⁊ cura.

Ocumētū trāſglutōis eſt triplex. ſ. coꝛruptio vt ſi
n cu₃ tremoꝛe perficiať. diminutio ſeu difficultas
cū fit cū laboꝛe ⁊ conamine: ⁊ eius ablatio cū nullo mō fieri queat. Et plurimū eſt difficultas trāſglutiēdi q̄ nota eſt ſupius p̄ eiꝰ ſigna diſtinctiua cauſarum in pꝛimo caplo hꝰ poſita. Eſt āt ꝑiculoſa ⁊ vite aīalꝭ ꝯ̄ria: cū . n. vita aīalꝭ n̄ ꝑſiſtat niſi p̄ nutriēs: qđ reſtaurat illđ qđ ex coꝛpe eiꝰ diſſoluiť. talē aūt reſtaurationē facere neq̄at: niſi intra coꝛpus ſumať: ⁊ illud eſt p̄ tranſglutionem: ea ergo facta difficili ⁊ diminuta verēdū eſt ne totalr̄ auferať ⁊ ꝑeat aīal: ⁊ ꝓinde īſiſtendū eſt circa coꝛrectione₃ eius attente tanq̄₃ circa accidēs quod pre ceteris egritudinibus ꝓpꝛius plerūq₃ curā ſibi preiudicat: ſeu coꝛrectionē.
¶ Cura. res p̄ma ⁊ certa eſt abſciſio eiꝰ cāe. ſ. egritudinis ꝓpꝛie: quā comitať que oīs generis eſſe poteſt de qua īfra dicemus vel alterius mēbꝛi cuius cōmunitate patiť

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0264-6
DFG

epiglotis.vȝ.aſſociati vel ſtomaci.cerebri nucce cõtiguo/rum quo lacerti epiglotis mouent̃: ⁊ meri ſpaſmant̃ vel mollificant̃ ⁊ tranſglutio fit difficilis vel auferẽ: ⁊ ſpõdiles dorſi diſlocati: ⁊ iteriꝰ cõuerſi cõprimẽdo viã clauden tes ipſius vel totuȝ corpus vt in febricitãtibus vel morti ꝓpinquis in qbus v̾tutes ſic̃ in toto deficiũt:ita ⁊ in parte de qbus ẽt dictũ eſt: ⁊ de ſtõ infra dicet̃. ❡ Scõa eſt ſtõi: regimen vt mũdificet̃: ⁊ alteret̃:nã in pluribꝰ diſpõnibus ſeqtur meri oris ſtõi cõplõnẽ: ⁊ illud cũ his:q̃ ifra in cura diſpõnũ eius dicent̃ duce deo cõplebit̃. ❡ Tertia eſt ipiꝰ ꝯfortatio. Fiat aũt cũ tẽperantibus ꝯplõnẽ eiꝰ diſcraſiam alterãdo cuiuſcũq; generis fuerit ⁊ ꝓprie fride ⁊ ſicce q̃ plurimũ eſt in cã vt ſupra dictũ eſt. Et ex cõpoſitis ꝯuenientibꝰ frigide eſt balſamũ trãſglutitũ tiriaca diacalamentũ ⁊ aqua rafani ⁊ vinũ cũ eis. Et ex his q̃ iunguntur exteriꝰ eſt oleũ anetinũ: de lilio: de narciſco: de croco nardinũ: muſcelinũ: ⁊ õ balſamo: q̃n ꝯfortãt lacertũ trãſglutiendi ⁊ cerebꝝ: qõ eſt neruoꝝ ꝑncipium: q̃re oȝ vt ex eis iungat̃ caput et nucca colli a q̃ neruus tali lacerto ꝓcedit. Et ꝯfortet̃ oĩbꝰ modis cũ emplr̃is ſacellis: cerotis fomẽtatõibꝰ ex aromatibꝰ calĩs: ⁊ ſtipticis vt caſtoꝛeo: myrra armoniaco ruta praſſio abꝛotano lauro ⁊ ſĩĩbus. Et ex ꝯuenientibꝰ ſicce diſcraſie eius: eſt regimẽ hũectantium. Et ex exterius iungendis eſt butirũ: oleũ amigdalaꝝ dulciũ: pĩguedo galline: porci. ⁊ ſilĩa. Et ex ſimplicibꝰ ꝯueniẽtibus hũide ſunt aniſum vtrũq;: been ſpica celtica: ⁊ foliũ indũ thus: ⁊ minutũ eiꝰ ⁊ cortex ipſiꝰ. ⁊ myrra: ⁊ ſandaraca. ⁊ ſilĩa. Et q̃ñq; oȝ ipſis admiſcere frigida tẽperantia coꝝ calorẽ. Sint aũt ex ſtipticis ꝯfortantibꝰ vt ſunt roſe ſandali: mirta. ⁊ ſilĩa. Ex qbꝰ ſacellatões fiãt ſupra caput ⁊ nuccam ⁊ cũ ex hũiditate ſunt. Et ex exptis ſꝫ magiſtꝝ Arnaldũ eſt vt ſumant̃ mane qõlȝ tres carice cũ iterclu ſo in eis puluere pumicis ⁊ ſandarace puluis eſt ꝓprius. Et cũ ex ventoſitate groſſa iterclũſa fuerit repellente: et ꝓpellente ſupius cibũ ⁊ potũ in quã talis humiditas fuerit conuerſa: quã eructuatio manifeſtat: curet̃ cura inflatõis ſtomaci: ⁊ ventoſitatis ipſiꝰ quã infra dicemus.

❡ Incipit ſũma ſcõa particule tertie ſectiõis ꝑme de medicinis egritudinũ ſtõi continens capitula.xxx.

Eſt autem ſecundum

Gal. ſtomacus miniſter viſcerũ. Cibaria eni ⁊ potus ꝑ meri exteriꝰ ſibi trãſducta recipit tanq̃ȝ lebes. ⁊ a v̾tute ⁊ ꝓpetate q̃ v̾lis dotauit nã illa alterat cogt̃ ⁊ digerit ⁊ alijs mẽbris ĩ re nutrimẽti opationem facientibꝰ apta reddit. Et ſi de ſe ſui ipſiꝰ gr̃a digerit cibũ nõ vt mẽbris alijs aptũ reddat ſicut dixit. G. vij. G. dixit. Stomacus miniſter eſt viſceꝝ. de ſtõ.n. cetera nutriunt̃ mẽbra. ni mirũ: igit̃ ſi in eius ꝯſtructõe ſũma ſapia ſubtiliſſime tãq; in eo: q̃ ẽ pater familias laborauit. Formauit ipm nãq; ꝯcauũ vt ad ꝯtinẽdũ qõ recipit ex cibis ⁊ potibꝰ eẽt aptus: ⁊ q̃ſi rotũdũ vt eẽt capaciſſimꝰ nõ ſolũ cibi ⁊ potus ꝓprij: ſed mẽbroꝝ ẽt alioꝝ: ⁊ vt calĩtatis alterãtis ipiꝰ ⁊ decoq̃ntis circa cibũ totũ ex q̃lȝ ſui pte iſluentia eẽt calidi. Et ſibi ſubaȝ dedit pãniculoſam ⁊ neruoſam vt ĩ recipiẽdo cibũ ⁊ potũ ꝓ toto ſufficientẽ poſſet recipe extẽſionem: nec nõ vt tpe digõnis eẽt totalr̃ ꝯbibile ſup ipſum. Ipſum ẽt ex duplici cõpoſuit tunica exteriori. ſ. magis neruoſa vt res ſibi occurrẽtes ſentiret meliꝰ ⁊ diſcernẽdo eligeret: qõ bonũ eſt ⁊ reprobaret malũ ⁊ iteriori magis carnoſa calĩa: cꝰ calĩtas cũ mediatiõe attingẽdo cibũ meliꝰ alteret decoquat: ⁊ trãſmutet: ſic̃ ignis mediãte olla melius cibaria decoqt. In qbus villos triplicis generis ordiauit. quoꝝ ꝯſideratõe Auer. dixit ipm ex triplici tunica cõpoſitũ eſſe: queãdmoduȝ. G. eꝫ aſſeruit de vtraq; veſica: fellꝰ. ſ. ⁊ vrine qbus v̾tutes opantes ĩ ipſo vterent̃ ſic̃ ꝓprijs organis: vt in eo qõ ĩtendũt habiliꝰ opent̃. Quibꝰ multis et varijs ipm fulciuit ⁊ adoꝛnauit ſapia ſũma. Et ꝓinde mẽbris ipm ꝑncipalibꝰ alligauit neruis mediãtibus cerebro queãdmodũ pte eius ſupiorẽ vt eẽt multi ſenſus ĩ ſentiẽdoꝰ ſuã ianitionẽ ⁊ ꝯplẽdo deſideriũ ſui ipſiꝰ ⁊ mẽbrorum oĩum arterijs cordi. ⁊ venis epati. Ipm quoq; mẽbris calidis circũdauit q̃ in alteratõe illoꝝ ſue calĩtati õbili ſuggerãt ſupplemẽtũ: a quo ꝓtraxit duo mẽbra ꝯtinuata vt due vie ductiles. ſ. meri a pte ſupiori orificij ſui deſeruiẽs trãſglutiendo deferẽdo cibũ: ⁊ iteſtinũ duodenum ĩferiꝰ a poꝛtenario ſibi deſeruiẽs delatorie vt ĩfra dicet̃. Si ergo ſeq̃ntes nãm ſapiẽtiſſimã vt hyp. iuſſit in cura egritudinũ eiꝰ adeo ſollicite ꝓcedamꝰ vt nomẽ dñi ĩuocãdo vt ĩgeniũ ⁊ modũ curatõis ĩueniamꝰ atq; medicinas ſimplices: ⁊ ꝯpoſitas: ⁊ exptas cũ oĩ diligẽtia pergramꝰ: qbꝰ ſanitatẽ amiſſam recupare valeat ⁊ ĩ tẽperãdo alimẽtũ quo corpus ſubſiſtat ꝑdurare oĩ ꝓpulſo erroꝛe. Erroꝛ.n. in eo nocumẽtũ gñat: qõ cõe exiſtit toti corpi: ⁊ ꝑncipalibꝰ mẽbris qbus notabilr̃ alligat̃. Cõtinet aũt hec ſũma capl̃a plura ſm pluralitatẽ egritudinũ q̃s ſtõs pati põt: quoꝝ.

❡ Capl̃m ꝑmum de cura egritudinuȝ ſtomaci ſcõm modum vniuerſalem.
❡ Capitulum ſecundum de cura male cõplexiõis calide ſtomaci ſimplicis ⁊ pure.
❡ Capl̃m.iij.de cura male complexionis frigide.
❡ Capl̃m.iiij.de cura male cõplexionis ſicce.
❡ Capl̃m.v.de cura male cõplexionis humide.
❡ Capl̃m.vi.de cura male cõplõnis ꝯpoſite ⁊ pure.
❡ Ca.vij.õ cura male ꝯplõnis cũ mã ſimplicis ⁊ ꝯpoſite.
❡ Ca.viij.de cura egritudinũ in plaſmate ⁊ ꝑmo de regimie eiꝰ cꝰ ſtõs eſt rotũdus paruꝰ ⁊ ꝓtenſus vl̃ magnꝰ.
❡ Capitulum nonum de cura egritudinũ accidentiũ ei ĩ vijs. ſ. oppilationum eius.
❡ Capitulum decimũ de cura repletiõis eius. ſ. nauſeatiue ſatietatis ⁊ inanitionis ipſius.
❡ Capitulum vndecimũ de cura inflationis ſtomaci rugitus tortõis ⁊ gurgulationis ipſius.
❡ Ca.xij.õ ꝑcuſſiõe obuiatõe ⁊ cãu ſupra ſtõȝ ⁊ cura.
❡ Ca.xiij.de ſolõne ꝯtiũi vlcere ⁊ ruptura ſtõi: ⁊ cura eiꝰ.
❡ Capi.decimũq̃rtũ de medicis apoſtematum eius.
❡ Capl̃m.xv.de correctõe accñtiũ ſequentiũ egritudĩes dictas. ⁊ ꝑmo de debilitate ſtomaci.
❡ Capl̃m decimũſextũ de medicis doloris ſtõaci.
❡ Capl̃m.xvij.de nocumẽtis appetitus ex qbus eſt debilitas ſeu diminutio deſtructio: ſeu ablatio ⁊ corruptio.
❡ Capitulum decimũoctauum de medicis appetitus canini famis ſincopalis ⁊ boliſmi.
❡ Capl̃m decimũnonũ de medicis appetitus corrupti.
❡ Capl̃m vigeſimũ de ſiti ⁊ medicinis eius.
❡ Cap. vigeſimũ ꝑmũ de nocumentis digõnis ex qbꝰ eſt debilitas deſtructio: ⁊ corruptio ⁊ cura eaꝝ.
❡ Ca.xxij.õ nocumẽtis retẽtõis ex qbꝰ ẽ tarditas ⁊ velox deſcẽſus. cibi digeſti de ſtõ in vẽtrẽ ⁊ cura eius.
❡ Ca.xxiij.de lenitate ſtõi ſiue lubricitate. ſiue liẽteria.
❡ Capitulũ vigeſimũquartũ de nocumẽtis expulſiõis: ⁊ ꝑmo de eructuatione ⁊ cura eius.
❡ Capl̃m vigeſimũquintum de ſingultu.
❡ Caplȝ.xxvi.de ſubuerſiõe nauſea faſtidio võitu ⁊ eructuatione ſeu anxietate cũ turbatione ſtomaci ⁊ cura.
❡ Capitulum vigeſimumſeptimum de vomitu. Et ꝑmo de flegmatico ⁊ cura eius.
❡ Capl̃m vigeſimũoctauũ de cura vomitꝰ colerici.
❡ Capl̃m vigeſimũnonũ de cura vomitꝰ melãcolici.
❡ Capl̃m trigeſimũ de cura vomitus ſanguinei.