¶ Lohoc ex īuentione nr̃a. remouēs aſperitatem vocis: ⁊ raucedinem. ℞. dragagāti. ʒ. v. gūmi arabici amigdala/rum dulciū: amili: ſemis cucumeris. añ. ʒ. iiij. ſemis citonio/rum: liquiritie: ſemis citrulloꝝ. añ. ʒ. ij. penidiarum. ℥. ij. Confice cum melle colato.

¶ Aliud ex īuentōe nr̃a. ℞. ficuum piguiū ſiccaꝝ: carniū dactiloꝝ. añ. ℥. i. calamēti ſicci. ʒ. ſ. dragagāti: cubebe. añ. ʒ. i. ⁊ ſ. Confice cum melle colato.

¶ Iſaac iſrahelita. Cōfectio pillulaꝝ de croco ꝯferētiuꝫ cū v̄tute dei aſperitati: ⁊ raucedini vocis ex friditate. ℞. croci. ʒ. iij. cubebe. ʒ. i. ⁊ ſ. ſucci ligritie: olibani. añ. ʒ. i. Fac pillulas cū rob: ⁊ ſint pillule magne: ⁊ teneat vnā ſub lingua: ⁊ glutiat ſaliuam eius: ⁊ eſt expertū bonum.

¶ Iſaac eben amaran. Medicamē cōferēs dolori gule: ⁊ aſperitati: ⁊ raucedini expertū. ℞. croci: myrre bone: piperis albi. añ. aur. i. paſſulaꝝ enucleataꝝ: dragagāti albi. añ. aur. iiij. amigdalaꝝ dulciū mundataꝝ aur. viij. Tere oīa ⁊ cōfice cū melle colato: ⁊ recōde in vaſe vitreo. Doſis eius eſt ſicͤ auellana. i. teneat ſub lingua.

¶ Sabor. Cōfectio medicamīs cōferētis raucedini vocis ꝑꝑ cāꝫ calam: ⁊ dolori q̄ ē ī lacerto vocis: ⁊ remouet īflāmationē: ⁊ ſedat ſitim. ℞. gūmi arabici: dragaganti: ſemis cucumeris. añ. ʒ. i. ſucci ligritie: amili: ordeacei vł̄ frumēti. añ. ʒ. ij. Tere ⁊ ꝯfice cū meibureg vel cū mucillagine ſemis citonioꝝ: ⁊ pſilij. Et fac formas ſimiles auellanis: ⁊ accipiat lambendo mane: ⁊ ſero.

¶ Democritus. Medicamē ꝯferēs abſciſſiōi vocis a caliditate: ⁊ ſedat ſitim. ℞. ſemis cucumeris mundati. ʒ. vi. ſucci ligritie. ʒ. vij. ſemis portulace. ʒ. i. Cōfice cū albumīe oui. ⁊ fac trociſcos: ⁊ teneat mane ⁊ ſero. i. ſub lingua.

¶ Incipit ſumma ſecunda de medicinis egritudinuꝫ pulmonis: ⁊ primo de aſmate.

Asma quandoqꝫ cōtingit ꝓpter cām̄ q̄ eſt in ipſo pulmone. ⁊ ꝑtibus ei⁹: ⁊ qn̄qꝫ ꝓpter ꝯfluentiā ad ipſu a cerebro: ⁊ ꝑtib⁹ capitis: qn̄qꝫ ꝑꝑ cōitatē ipſi⁹ cū alijs mēbris. Et ꝯtigēs cā pulmonis qn̄qꝫ cōicat ei torax ī occupatōe: ⁊ cōpatiunť in alterutrū: ⁊ tūc ꝓpe cū ſepeliť pulmo in torace eadē occupatione cōcluſi ⁊ ē illud qd̄ ē ſuſpectū: ⁊ timoroſum. pereūt. n. plurimi ſubita ꝑfocatōe: ⁊ īterdū q̄ſi ꝑfocati ſpumas emittūt: ⁊ turget eoꝝ facies: ⁊ liuet: ⁊ oculi quaſi foras ꝑeminent: ⁊ qn̄qꝫ ē ꝑꝑ īpedimētū in ipſo pulmōe ⁊ ꝑtibus eius tantū. ¶ Eſt āt egritudo hec ſenib⁹ familiaris: ⁊ nō ſanať in eis. Pueris v̄o ēt accidit: veꝝ qn̄qꝫ ſanať ī eis ī ꝑmutatōe etatis eoꝝ: ⁊ iuuenib⁹ raro tolliť: ⁊ qn̄qꝫ cūꝫ eo ſeneſcūt. Mulierib⁹ v̄o nō ſepe accidit: ⁊ citius ſanať in eis q̄ꝫ ī maſculis. Contingit āt ī hyeme ⁊ maxie ī fine hyemis ſc̄m plurimū: ⁊ ꝯtingēs ī eſtate eſt prauū: ⁊ multiplicať ī locis humidis: ⁊ ī antris ⁊ cauernis: ⁊ teſtudib⁹. Eſt ēt familiaris his q̄ metalica operanť: ⁊ mineralia: ⁊ q̄ vtunť odore ſulfuris: ⁊ colophonie: ⁊ picis ⁊ q̄ exercent artes plumbeas: q̄ cōflāt argētū viuū. Et curanť qn̄qꝫ ꝑ elōgatōꝫ ab ipſis. ¶ Diſtiguēdū āt in ſpēb⁹ aſmatis hoc mō.

¶ Si cā eſt in pulmone ipſo ꝓpe: ⁊ ē mā groſſa adherens aut ꝯcluſa ī pulmone ipſo: ⁊ cauernis: ⁊ meatib⁹ ſpūs: ⁊ eſt illud qd̄ eſt ſc̄m plīmū: Tūc eius cura ē. v. res. Prima ē cōmenſuratio regimīs in q̄uib⁹ reꝝ ſex. Scd̄a eſt adequatio mãei eius. Tertia eſt ſubtractio ei⁹. Quarta ē diuerſio ei⁹ Quinta eſt correctio accidentium.

¶ Primam q̄dē rē ꝯplēt ꝯmēſuratōes regimīs ei⁹: ꝑmo aeris: vt locenť ꝓpe in aere tꝑato declināte ad ſiccitatem magnā: ⁊ laudať eis cibi abſtinētia ⁊ pot⁹: ⁊ ꝑcitas corum imo gradatio fiat in eis iuxta v̄tutis exigētiā ⁊ morbi tolerantiā. Et ſint cibi eoꝝ ꝓprie calidi ⁊ ſorbitōes calide: ⁊ ſint boni chimi. ⁊ ſint q̄ ventrē lubricum faciant: ſicͤ aq̄ ordei. ⁊ ꝓprie aq̄ ciceꝝ cū amigdalis amaris: ⁊ aq̄ ordei cuꝫ meliloto aut fenugreco. Danda ēt ſūt iuſcula ex maluis cū amigdal' aut ex criſolocāna: aut bleta. Deīde ꝓueniendū eſt ad vitella ſorbilia: ⁊ ad carnes teneras ⁊ ſūt ꝓpe ex aīalib⁹ carnes leporis: ⁊ caprioloꝝ: ⁊ carnes algaçel: ⁊ vulpis ⁊ hericij: ⁊ cerui ⁊ ſiliū. Et ex volātib⁹ carnes pulloꝝ gallinaꝝ ⁊ perdicū ⁊ ſimiliū. Et pulmōes aīaliū ſūt mirabiles ei⁹: ⁊ ꝓprie vulpis: ⁊ hericij. Panis v̄o quo vtuť ſit coctus hn̄s ſemia ꝓpe ſicͤ aniſuꝫ: ciminū: fenicul⁹: nigella: cartam⁹: naſturciū: ⁊ ſilia. Ex piſcib⁹ vtanť piſcib⁹ ſq̄moſis ⁊ petroſis: ⁊ agilib⁹. Et ſaturitas ē eis mala. Potus aūt eoꝝ ſit vinū ſubtile antiquū pauce q̄ꝫtitatis: ⁊ vinū dulce eſt amicū eis ꝯfortatū cū aliquo ex ſubtiliatiuis: ⁊ hydromel eſt eis potus bon⁹ ⁊ pot⁹ ſupra cibū ē eis malus: q̄re oꝫ vt expecteť ſupra cibū diu: deīde bibat paꝝ hora poſt horā. Vitent aūt repletionē ⁊ nauſeam: imo ſi accidat vomitu expellať: ⁊ ex bono regimie eſt vt eis ſꝑ aſſidueť vētris lubricitas cū eis q̄ ſunt ſicͤ ius galli antiq̄ cū medulla carthami: ⁊ aq̄ volubił: ⁊ ſicle: ⁊ ꝓpe admīſtrata añ alios cibos: ⁊ ꝯferūt ad hoc carnes cōdite ſalite ⁊ oua tarachi.

¶ Si āt cū his nā nō leniať: admīſtreť aq̄ ordei cocta cū modico euforbij paꝝ poſt paꝝ: eſt. n. iuuamenti ſublimis: aut aq̄ ordei cū puluere ireos: aut aq̄ decoctōis epithymi cū rob aut melle: aut decoctio ficuū cū ireos: aut cū haſce aut calamto: aut decoctio calamēti cū melle: aut yſopi cū rob: aut paſſulaꝝ ⁊ fenugreci cū melle origani perſici. Decoctio cū aq̄ ordei eſt mirabilis: ⁊ ꝓpe cū melle: ⁊ ſilr̄ praſſii: ⁊ radicū rafani ⁊ ſimiliū. Vitēt ſōnū ſupra cibū: ⁊ parcitent ſōnū: ⁊ iaceāt ī domo lucida: ⁊ mod⁹ ſit accubit⁹: vt videanť poti⁹ ſedere: q̄ꝫ iacere. Sedendo. n. melius q̄ꝫ iacendo reſpirāt. Iacēdo aūt difficulter. Exercitari aūt opꝫ cū gradatōe ex tardo ad velocē: ex paruo ad magnuꝫ: ⁊ q̄liſcūqꝫ fuerit in ieiunio. Et exercitatio per loca decliuia: ⁊ arenoſa ꝯfert: ⁊ ſilr̄ currere ꝑ ea īterdū iuuat: ⁊ vehi ꝑ mare: ⁊ nō multū: ne v̄tus defatigeť: ⁊ ſilr̄ duci de loco ad locum lecto penſilij. Exercitia autem aīmi iocunda conferunt eis.

¶ Scd̄aꝫ rē ꝯplēt admīſtratōes medicaminū morbi materiā carminātiū: ⁊ maturātiū: ⁊ aggregātiū ī ſe hūectatiōnē: ⁊ ſubtiliatōeꝫ ⁊ īciſionē vt cadat maturatō ī corp⁹ mãe īegra. Quare vitāda ſūt ſubtiliātia ⁊ īcidētia pure: ⁊ ꝓuocantia ne excludať: ⁊ ſepareť ſubtile a groſſo ⁊ nō ampli⁹ recipiat curā. Ex vere āt maturātib⁹ eſt ius galli antiqui ꝑparati ſc̄m artē. ⁊ oximel ſq̄lliticū cū aq̄ paſſulaꝝ: ⁊ ēt ſirupus de yſopo: ⁊ decoctio de yſopo: ⁊ ſirup⁹ recipiēs paſſulaꝝ enucleataꝝ: ⁊ fenugreci ꝑtes eq̄les. q̄ꝫ ē iuuatiuus valde: ⁊ ſirup⁹ de praſſio ⁊ alia quoꝝ narratōꝫ faciem⁹ ꝑ⁹. Et inunganť pectora eoꝝ ꝯfricādo fricatōe ꝯueniēti vel vehemēti cū oleo de keiri: ⁊ ꝓpe citrina: ⁊ anetino olō: ⁊ camomillino: aut laurino tepidis: ſupponēdo eis lanas yſopi calidas. Et ex vnctōib⁹ magni iuuamēti ē oleū de lilio: ⁊ oleū de ireos: ⁊ eis forti⁹ eſt yſopi cerotū: ⁊ cerotuꝫ nr̃m: cui⁹ narrationē faciem⁹ poſt ſi deus voluerit.

¶ Tertiā rē ꝯplēt admīſtratōes euōnū ex flomia: ⁊ ſolōne vētris: cū medicia: ⁊ enematib⁹ ſolutiuis: ⁊ ſiqdem mā fuerit calida ſāguinea cōfert flomia baſilice: ⁊ ſi cōtingat paſſio ꝓpter retentionē emoroidaꝝ aut mēſtruoꝝ coruꝫ prouocatio eſt iuuamenti decentis. Si abundat cum ſanguine colera ſoluať natura cum trociſcis de violis: quorum narrationeꝫ faciemus: ⁊ ſcribemus: ⁊ ſimilib⁹. ¶ Si vero contingat ab exuberātia flegmatis viſcoſi ⁊ pinguis ⁊ eſt id qd̄ eſt ſecundū plurimuꝫ euacueť cum cochijs: aut iera: ⁊ pillulis de agarico: ⁊ pillulis de colloquintida: quarum permixtionem ſcribemus poſt ⁊ alijs. Et ſi nō fuerit natura obediens: faciemus cliſteria precedere purgatio/

nem:⁊ ꝓprie ſi opꝫ acuta. Et ex bono regimine eſt vt fiat
euacuatio:⁊ ꝓprie renouãs numerum:⁊ cadat iter purga
tionem ⁊ purgationẽ adminiſtratio vomitꝰ poſt rafanuꝫ:⁊
piſces ſalitos:⁊ almuri. Et ſunt ex hoibꝰ q infigunt fuſtes
ellebori albi in rafano:⁊ ꝓpinant rafanū poſt diem ⁊ no
ctem extracto ide elleboro. Et ſunt q ꝓuocãt vomitū cū
ſinapi:⁊ ſale ⁊ almuri:in aq̃ ⁊ melle:aut i oximelle: aut cū
ſinapi ⁊ baurach:⁊ oximelle:⁊ caue ne cadat in viciſſitudi
nem adminiſtrationum frequentia:⁊ debilitetur virtꝰ:ſꝫ
ſit interpollatio competens.
¶ Quartã rẽ ꝯplẽt fricatões facte i extremitatibꝰ:⁊ ven
toſatões facte in ſcapulis ⁊ cruribus.⁊ appoſitiones rubi
ficantiū:⁊ cauteriū in ꝗbendeq:⁊ ſimilia.
¶ Quintã rẽ ꝯplẽt adminiſtrationes medicaminū anheli
tum facilitantiū:aut mãs q̃ ſunt i pectore per ſcreatū faci
le educentiū:aut humiditates ſupfluas exiccantium.
¶ Medicinaꝝ aūt anhelitū facilitantiū:ſūma hec ẽ:ſqil
la aſſata ⁊ adminiſtrata cū melle:aut trociſci ex ea cuꝫ rob:
aut oximel ipſiꝰ:⁊ acetū:⁊ lohoc ipſiꝰ elargant anhelitꝰ vi
as:⁊ abſtergũt. Et ex rebus mirabilibꝰ ad hoc:eſt pulmo
vulpis ſiccus:⁊ ꝓprie.ʒ.ij.cū eo qð ꝯuenit ex potibꝰ. Et ex
eis eſt yſopꝰ:⁊ haſce:⁊ calamẽtū:⁊ origanũ perſicū:⁊ aniſū
⁊ piper. ¶ Galienꝰ aūt dicit ꝙ ꝺcoctio paſſulaꝝ enuclea
taꝝ:fenugreci:⁊ rute cū modico caſtoreo:comodiꝰ freq̃n
ter data operatur. ¶ Item dixit.ꝙ gutta armoniaci pro
pinata cū oximelle:potenter liberat. Et ex eis eſt decoctio
yſopi cū melle ⁊ ficibꝰ. Et ex eis eſt crocꝰ cum melle. elar
gat.n.anhelitū:⁊ ſilr ciminū mixtū cū aceto. Et ex valde
expertis difficultati anhelitꝰ:eſt laurꝰ ⁊ grana eius:⁊ ole
um ipſius ſꝫ oẽm modū adminiſtrationis eoꝝ:ſiue bibitū
ſiue lohoc ex eis:ſiue vnctões. Et ex rebꝰ expertis eſt enu
la ⁊ ſuccus eius. Et ex vnctõibꝰ expertum eſt oleuꝫ lauri
num:⁊ oleum de ſpica:⁊ oleū rutaceum: yſopi cerotū ⁊ ſi
milia. Et ex eis que emplaſtrant̃ ſunt anetum ⁊ camomil
la.⁊ ſanſucus:q̃ decoquant̃:⁊ euaporent̃ eius pectꝰ ⁊ par
tes vicine. Ex medicis aūt cõpoſitis q̃ cõferunt ſtricture
anhelitus:⁊ difficultati eiꝰ ſunt mitridatū:⁊ tiriaca:⁊ atha
naſia magna:⁊ parua:⁊ medicina de muſco dulcis:⁊ ama
ra:⁊ diaſulfur:⁊ diamarte ꝓpe ⁊ ſagçenea magna:⁊ parua:
⁊ filoniū:⁊ ꝓprie diatrion pipereon:⁊ alia:quoꝝ narratio
nes faciemus poſt. ¶ Medicinaꝝ vo pectus mūdifican
tium:⁊ pulmonẽ ab hūore groſſo:⁊ putrido:⁊ oppilatione
ſūma hec eſt. Iſopus ꝓprie ſm oẽm modū adminiſtratiõis
eius:⁊ haſce:⁊ origanū:⁊ ſerapinum:⁊ ꝓprie cū vino:⁊ me
dicina de ſqlla:vrtice vo ⁊ ſemis eius iuuamẽtū eſt mani
feſtū:educit eni hūores groſſos ſepultos in pulmone:⁊ pe
ctore:⁊ ꝓprie ſorbitiones decoctiõis eius in aqua mellis:
⁊ ordei:⁊ ficubus ſiccis:⁊ radix alfeſare ſm oẽm modum
adminiſtratõis eius eſt mirabilis:⁊ ſilr tali eius in p̄mis cū
eleuant̃:⁊ ex eis ẽ naſturtiū cū inciſiõe ⁊ ſubtiliatõe ſua:⁊
ſilr capparis ſalita:⁊ ſilr porrū:⁊ ſemẽ eius cū aqua ordei:
⁊ melle:⁊ decoctio volubilis cū oximelle ẽ mūdificatiuū
bonum:⁊ ſilr ſiſeleos cum melle:⁊ ſilr ireos:expellit eniꝫ
materias:⁊ mūdificat pectus efficaciter. Serapinū auteꝫ
cū aqua rute eſt ex mūdificãtibus pectus fortiter extra
hens ab eo humores crudos:⁊ ꝓpe eiꝰ.ʒ. vniꝰ. tertie due.
Mundificant ẽt pectus oẽs ſpẽs granorum pini a ſanie:⁊
groſſis hūoribus ſm oẽm modum adminiſtratõis eoꝝ. Iu
uamentū decoctõis calamẽti cū ficubus:aut paſſulis enu
cleatis in extractõe groſſoꝝ hūoꝝ ex pectore:⁊ pulmõe:⁊
dilatatiõe anhelitꝰ eſt ſublime:⁊ ſilr facit cõmeſtio ipſius
cū amigdalı̃:⁊ çuccaro:aut melle:aut ficubꝰ ſiccis:hꝰ ẽt itẽ
tõis ẽ alhaſce.⁊ ſaroꝛ arabicū:⁊ laurꝰ ⁊ grana eiꝰ cū melle.
¶ Medicinaꝝ aūt exiccãtiū ſuperfluã hūiditatẽ aggre
gatam in pectore ⁊ pulmone:qbꝰ vtenduꝫ eſt in ſubfumi
gijs:⁊ interdū potiõibꝰ. Sūma hec eſt arſenicū tritū:⁊ di

ſtemperatum cū vitellis ouoꝝ. Deinde accipe ferulã:⁊ ſ
cide eam per fruſta rotunda:⁊ ibibant̃ p̄dicta medicami
na:⁊ dimitte exiccari. Et fiat ſubfumigatio cuꝫ eis:⁊ reci
piat̃ fumus in os per traiectorium:⁊ aſſiduet̃ per aliquos
dies oi die ter:qm̃ ſanat. Et ſi dereliquat̃ vehemẽtia exic
catõis in pectore ⁊ pulmone redeundū ad mollificatiõeꝫ
ꝓprie ſic̃ eſt ſirupus de cheſmes.⁊ ꝺcoctio ficuū:⁊ ius gal
lie:⁊ ius atriplicū:⁊ maluaꝝ decoctaꝝ cū gallis ⁊ que hoc
curſu ꝓcedunt ⁊ ad iunctões pectoris. Deĩde redeunduꝫ
ad adminiſtratões medicaminū ſūme huius ⁊ nõ negligat̃
operatio hec:qm̃ ſanat. Huius etiam itentionis eſt ſulfur
citrinum mixtum cū arſenico:⁊ ꝓprie ſint eorum partes
equales:⁊ fac formas ſimiles auellanis cū adipe renū ca
prarū:aut vacce. Et vtere ſic̃ diximus per traiectoriū. Et
ex eis eſt myrra:coſtus:ariſtologia:⁊ caſſia:⁊ crocus ⁊ arſe
nicum. Fiant ex eis forme cū adipe capno. Et vtere. Silr
arſenicum ⁊ ariſtologia ſilr cum adipe caprarum. Ex eis
aūt huius itentionis q̃ dantur per os eſt ſulfur cū ouis ſor
bilibus:aut ſulfur:⁊ arſenicum cum ouis:⁊ cuꝫ melle. Aut
arſenicum cum aqua mellis. Aut pillule ex arſenico:⁊ gū
mi pini:⁊ nos plura intentionis huius ſcribemus poſtea:
ſi deus voluerit.
¶ Cura aūt aſmatis facti a materia catarrali eſt due res.
Prima eſt itentio:quã adhibere opꝫ in prohibitionem ca
tarri.⁊ hoc quideꝫ dictū eſt in cura eius. Scđa eſt itentio
in maturatõe ⁊ expulſiõe eius qð aggregatū eſt in pecto
re ⁊ pulmone:⁊ hoc dictū eſt in p̄ſenti caplo. Factum ãt a
cõplexionis malitia ſine materia curat̃:cum eis que dixi
mus:⁊ ſiqdem fuerit a ſiccitate:⁊ corrugatiõe pulmonis
ad ſeipm:tūc põt cõtingere ſcđm duos modos. Aut.n.eſt
ſine febre. Et cura eius eſt.inunctio pectoris cum enema
tibus aut cum emplaſtrationibus vel vnctionibus mol
libus. ⁊ frequentatio potus lactis: ⁊ proprie caprini: aut
aſinini:⁊ comeſtionis eius:⁊ opꝫ:vt ſit paſtus aĩalium ex
rebus hūidis ſicut ꝓprie herba ordei: lactuca: ⁊ malua:⁊
ſimilia. Et frequentet̃ balneatio in tina cū fricatõe facta
cū ouis:⁊ mica panis ĩfuſa. Et ſint cibi eoꝝ iuſcula ex atri
plice:⁊ malua:⁊ portulaca:aut pullus:aut oua ſorbilia. Et
accipiãt ex lohoc: ⁊ alijs medicinis curãtibus ſiccitatem
pectoris:de qbus loquemur poſt. Si autẽ fuerit cum fe
bre. Cura eius eſt potꝰ aque ordei: ⁊ iuleb ſubtile: ⁊ aqua
melonū indorum:aut cucurbite.aut aqua carū cum çuc
caro:aut per ſe:⁊ ſit cibꝰ eorum ꝓprie cucurbite: lactuce:
olera: ⁊ herbe humide cū oleo amigdalarum dulcium:⁊
detur in potu i matutinis: ⁊ in ſero mucillago pſilij i aq̃
citruli:⁊ cucurbite:⁊ melonis idi. Inungat̃ autem pectus
eorum cū ceroto Galieni:aut cū cera ⁊ oleo violato: imbi
bitis in mucillagine pſilij:aut in aqua portulace:aut lactu
ce ⁊ citrulli:⁊ ſimilium:⁊ vtant̃ lohoc: ⁊ ſirupis: ⁊ medici
nis cõuenientibꝰ:que dicent̃ poſt. Cum aūt febris decli
uerit:iret tinam ⁊ fricet̃ corpus ſicut iam diximus. Factū
autem a ſupercalefactione pulmonis ⁊ pectoris: curatur
ſicut hic ꝓxime diximus. ¶ Galienꝰ autem. cum peruen
tum ad acceſſionem fuerit tunc potius blandiendum q̃
curandum. Peruenit̃.n.interdum ad p̄uocationeꝫ i exic
catione medicaminum q̃re regimina diſtinguenda ſunt.
Et p̄mo in regulatione vite eoꝝ vt parcitent cibis:⁊ poti
bus cum gradatione ſicut nã expoſtulat: ⁊ regulentur in
alijs generibus rerum ſicut ſcis. Secundo ꝓuenit̃ ad ma
turantia ⁊ proprie mediocris abſterſionis:aut debilis ex
his que ſcis. ⁊ gradatim ad linimenta ⁊ vaporationes ex
his que ſcis. Tertio ad fricationes: ⁊ ligaturas in extre
mitatibus cum gradatione. Quarto ſi ſigna plenitudinis
ſanguinis appareãt flobotomentur ex baſilica. Si au
tem ſigna aliorum humorum appareant differant a pur
gatione ⁊ vomitu: ⁊ cliſteriçatõe quouſq; iam vehemen

tia paroxiſmi ceſſauerit: ⁊ maturatiuorum: ⁊ facilium ex/
creatuum apparuerit abundantia: ⁊ anhelitus meliora/
tio. tūc. n. audēdū eſt ſup his cum cautela. ¶ Quito ſi pa/
roxiſmus vſq; ad q̄draginta dies nō declinauerit: tūc īter
ſpatulas ventoſet̄ cū ſcarificatōe vſq; dū ꝯpetēs ſanguis
eius fiat. Deide adminiſtrent̄ yerc. ⁊ eūones note: ⁊ cliſte/
ria acuta cū gradatione: ⁊ vomica medicina: ſic̄ in canone
diſtictū eſt. ¶ Sexto. ſi adhuc vlteri⁹ paroxiſmus exten
datur ſinapiſmus in pectore: aut medicamen rubificati/
uum apponetur. hac enim operatione: ⁊ ordine tollit̄ egri
tudo. ſi deus voluerit.

¶ Demochrytus. Dandū in p̄mis q̄ aptāt materiā: ⁊ dige
runt: ⁊ ad terminū facilitatis: ⁊ maturatōis adducūt: q̄lia
ſunt fenugrecū: vue paſſe: ficus ſicce ⁊ pigues: dactili pin/
gues: ⁊ mel: ⁊ ſyrup⁹ ex eis. Et ex eis ſunt vnctōes circa pe
ctus. ⁊ ꝓp̄e ex iſopi ceroto cū calida lana. Cū aūt mā ⁊ ſpu
tamina digeſta apparuerint adminiſtrāda deiceps ⁊ ma/
turātia p̄dcā. ⁊ māz digeſtā educētia: pectus quoq; mūdi/
ficantia: q̄lia ſunt vrtice ſemia cū hydromelle: ⁊ origanū:
⁊ iſopus ſicca: ⁊ calamētū: ⁊ ireos: ⁊ pulegiū. Hec. n. pect⁹
mūdificāt. Et ſi materiei apparuerit exuberātia: vomitū
ꝓuocabis: ⁊ cū iteratōe: ⁊ ꝓp̄e cū ellō in radice rafani īclu
ſo ⁊ oximelle. Et ſi adhuc opus mai⁹: per ventrē māz edu
ces. ¶ Ultimo āt cum res magis ꝓceſſerit: dāda ſūt que
exiccāt māz: ⁊ pect⁹ elargāt: q̄lia ſunt ſqlla in aceto cocta:
pumices: baurac: feces vini ꝯbuſte: aur̄ pigmētū: ſulfur: ō
ſingul' partes equales. Fiat eoꝝ ꝯtritio bona. ⁊ miſce cū
melle: ⁊ da mane quolibet coclearīū. i. Hoc nanq; medi/
camen aſma difficile ⁊ tuſſim curat.

¶ Fili⁹ Zacharie araſi. In p̄mis vtendū eſt rebus: q̄ māz
maturēt in pectore: ſicut eſt ꝓp̄e ꝯcoctio h̄. ℞. ficuū ſicca
rū. ʒ. x. paſſulaꝝ enucleatarū. ʒ. x. dactiloꝝ pinguiū. ʒ. vij.
ſemis apij: fenicl'i: capilloꝝ veneris: ligritie: iſopi: praſſij: fe
nugreci: ān. ʒ. v. Coquant̄ in aq̄ ſufficienti: ⁊ da ex ea oī die
circiter lib. ſ. cū mell'. ℥. i. Et cū maturatōis ſignū apparue
rit: da ex decoctiōe p̄dicta cū. ʒ. ij. ꝯfectiōis hui⁹. Cui⁹ hec
ē ꝑmixtio. ℞. ſucci ligritie: iſopi: capilloꝝ veneris: ān. ʒ. x.
cordumēi: pipis: amigdalaꝝ: amaraꝝ: ariſtolog. rot. ſemis
vrtice: ireos: baurac: naſturcij: ſemis rafani: ana. ʒ. v. mell'
diſpumati q̄tū ſufficit. Eſt. n. medicina bn̄dicta ad expel/
lendū ſupfluitates ſepl'tas ī pectore. Potēter eni repellit
eas. Cū āt hoc ꝑ octo dies: aut ampli⁹ feceris ꝓuocabis vo
mitū: ⁊ ꝓp̄e poſt eſum ſinapis: ⁊ mellis. Et poſtq̄ȝ hoc fece
ris: tertio ventrē ſolues cū pillulis: q̄ꝝ deſcriptio hec eſt.
℞. agarici. ʒ. iiij. pulpe collogntide: iſopi. ʒ. ij. ⁊. ſ. ſucci ligri
tie. ʒ. iij. praſſij: ireos: ſemis vrtice: ſinapis. ān. ʒ. i. ⁊. ſ. turbit
yerepigre. ana. ʒ. v. Doſis eaꝝ eſt a. ʒ. ij. vſq; ad. iiij. Dabis
aūt ter vſq; in hebdomadā: pfecte eni mūdificat̄ pect⁹: ⁊
ſi poſt hec tota nō tollat̄ egritudo redi ad adminiſtratio/
nē oīum que dcā ſunt ſm̄ ſcriptū ordinē. ⁊ hoc facias vſq;
dū tollat̄ egritudo. ſi deus voluerit.

¶ Iſaac eben amaran. Curauit quēdā patiētē difficl'tatē
anhelit⁹: ⁊ tuſſim difficilē ſm̄ hunc modū. ¶ In p̄mis de
dit maturātia: ⁊ digerētia mām. ¶ Scdo euauit cum his
pillis q̄s noīauit cochias. ℞. aloes rubei. ʒ. vi. agarici. ʒ. iiij
maſtic: collogntide: ſarcocolle. ān. ʒ. ij. ſticados: baſce: ſca
monee: ān. ʒ. i. ⁊. ſ. Fiāt pillule ſic̄ cicer cū aq̄ fenicl'i hūidi.
Doſis eaꝝ eſt. ʒ. ij. ⁊. ſ. de q̄rto in q̄rtū diē in mane. Deide
hēat cibū pullos coctos cū malius: aut atriplice. ¶ Ter/
tio ꝯdit ꝯ electuario hmōi: qd ꝯfert tuſſi ⁊ ꝯſtrictiōi anhe
lit⁹. ℞. ſeminū melonis: citrulloꝝ mūdatoꝝ: alkerenben:
feniculi: aniſi: amigdalaꝝ: pineaꝝ mūdataꝝ: iſopi: capillo
rū veneris: ān. ʒ. x. croci. aur. ij. caſſie: dragag. ligritie. ana.
ʒ. ij. opij. aur. i. Tere ⁊ ꝯfice cū lib. i. penidiaꝝ. Et doſis ei⁹
aur. i. in mane cū decoctōe iſopi: ⁊ ī ſero ponat ex eo ſub li/
gua circiter. ʒ. i. ⁊ tranſglutiat ſaliuā eius. ⁊ ſumat oī mane
iuſculū ex amilo: ⁊ furfure cū penidijs: ⁊ amigdal'. ⁊ ſemi/
nib⁹ fenicl'i tritis. ⁊ ī ſero comedat maluas: vel atriplices:
vel bletas cū pullis: vl' pullos cū çuccaro: croco: ⁊ amigda
lis: ⁊ paſſulis: ⁊ pauco aceto. Et erat ei ꝯ ꝯſuetudine ſi cor/
pus erat plenū abūdās poſt q̄rtā purgatiōeȝ. ⁊ ſi tp̄s foue/
bat flebotomare patientē de baſilica: ⁊ precipiebat trahi
de ſanguine a. ʒ. l. vſq; ad. ʒ. lxxx. Et ſecundum iſtaȝ viam
curauit plurimos.

¶ Iſaac eben amarā. Fecit cuidā patiēti aſma. ⁊ difficul/
tatē anhelit⁹: ⁊ tuſſiȝ. ℞. farine ciceꝝ: amigdalaꝝ dulciū:
ſemis melonis: dragagāti: thuris maſculi: botron: ān. ʒ. x.
praſſij: capilloꝝ veneris: iſopi: calamēti. ana. ʒ. iiij. iuſqami
albi: ligritie: ſemis papaueris albi. ana. ʒ. x. Tere ⁊ confice
cū mellis duplo pōderis oīum. ⁊ recōde in vaſe vitreo. do
ſis ei⁹ ē. ʒ. ij. teneat ſub ligua: ⁊ trāſglutiat ſaliuā eius.

¶ Zeid. Medicamen ꝯferens tuſſi: ⁊ aſmati: ac ſtricture
anhelit⁹. ℞. ſemis melonis: citrulli. cucumeris: cucurbite
mūdate: ſemis lactuce: ligritie: amigdalaꝝ dulciū: ⁊ ama
raꝝ: granorū elmeluth magnoꝝ. ana. ʒ. x. papaueris albi.
ʒ. xx. ſtoracis: grāoꝝ mahalep mūdatoꝝ: ſemis malue ān.
ʒ. v. croci: opij. ān. ʒ. ij. Cōfice cū melle ⁊ çuccaro. Et ſit do/
ſis ei⁹ ſicut nux cū aq̄ tepida. ⁊ iungat̄ pect⁹ cū aliquo coꝝ
q̄ ꝯueniūt. ⁊ ieiūet oī die ſup medicamie circiter horas. vij.

¶ Idē. Loch ꝯferens aſmati ⁊ tuſſi ſiccis factis a colera
ſicca: ⁊ facit ſpuere: ⁊ ꝯfert apoſtemati pulmōis: ⁊ pānicu
li: ⁊ ē expꝑtū. ℞. farine fabaꝝ. ʒ. x. amili. ʒ. v. ſeminis cucu/
meris melōis: ana. ʒ. vij. ſeminū citōioꝝ: malue dragagā/
ti: ligritie: alkeberō: ana. ʒ. vij. papaueris albi. ʒ. xxx. Tere
⁊ cōfice cū rob. ʒ. c. penidiaꝝ. ʒ. xxxx. Et fac formas ſimi/
les nucib⁹: ⁊ teneat ſub lingua: ⁊ trāſglutiat ſaliuaȝ eius.
Deinde bibat ſorbitōes furfuris tenues cum pauco oleo
amigdalaꝝ dl'ciū: ⁊ penidijs: ⁊ in ſero comedat ſpinachia
aut atriplices: aut ſiclā cū oleo ſiſamino aut amigdalaꝝ.

¶ Hamech. Sirupus de praſſio mirabilis ꝯferens cum
auxilio dei aſmati: ⁊ difficultati anhelitus: ⁊ tuſſi: ⁊ fleg/
mati aggregato in pectore ſenū bonū: ⁊ expꝑtū. ℞. paſſu/
laꝝ pinguiū enucleataꝝ: iuiubarū pinguiū ſine oſſibus:
⁊ ſebeſtē: ana. ʒ. c. ficus pigues. xxx. capilli veneris: iſopi:
calamēti ligritie: an. ʒ. xx. corticū radicū apij: feniculi: ani
ſi: ana. ʒ. x. praſſij. ʒ. l. aque pluuialis lib. xv. Buliant vſq;
ad lib. iiij. ⁊ pone ſup reſiduo aque lib. vi. ⁊ buliāt vſq; ad
lib. ij. deinde accipe vtrāq; aquaȝ: ⁊ pone ſuper eā mellis
boni ⁊ penidiaꝝ: ⁊ meibuchег: ana. ʒ. cl. Et ſit doſis eius
. ℥. iij. cū aqua calida. Et ſit cib⁹ eoꝝ ſorbitiones facte ex
furfure aut tritico cū melle: aut penidijs: ⁊ oleo amigdali
no: ⁊ carnes cū tritico: vel bletis cū ſpēbus humidis: ſicut
eſt ꝓp̄ie çinçiber: aniſum: darſeni: ⁊ ſimilia.

¶ Hamech. Sirupus alius de praſſio mirabilis ꝯferens
cū auxilio dei tuſſi flegmatice: ⁊ aſmati difficili: ⁊ aggre/
gationib⁹ flegmatis ī pectore ſenum. ℞. praſſij. ʒ. xx. ligri
tie: iſopi: calamēti. capilli veneris: ana. ʒ. x. radicū apij: fe/
niculi: aniſi: ana. ʒ. v. amigdalaꝝ: pinearū mūdatarū: ⁊ fe/
nugreci: ana. ʒ. ij. ⁊. ſ. paſſularū enucleatarū. ʒ. c. iuiube ⁊
ſebeſtē: ana. l. fic⁹ ſiccas. x. mellis: rob: penidiarū: ana. lib.
ij. Fiat ſicut prius: bonū ⁊ expertum.

¶ Hamech. Syrupus iuiubinus confert aſmati: ⁊ egri/
tudinib⁹ pectoris ſanguineis: ⁊ colericis: ⁊ aſperitati: ⁊ ſic/
citati ipſius ⁊ dolori. Accipe pulpe iuiubarum pinguium.
⁊ pulpe ſebeſten. ana. ʒ. centum: liquiritie mundate: capil
lorum veneris. ana dragmas triginta. ſeminis malue. dra
gaganti. ana. ʒ. xx. ſeminum melonis. dragmas viginti. aq̄
pluuialis calide lib. xv. Dimitte die ac nocte. deinde bul/
liant lento igne. vſque ad libr. v. deinde cola. ⁊ pone ſuper
reſiduo iterum aque libr. viij. ⁊ coque vſque ad libras. iij.
Deide accipe vtranq; coctōeȝ: ⁊ pone mediū pōdus aque
ex penidijs: ⁊ çuccaro: ⁊ fiat ſyrup⁹. Et ſit doſis ei⁹. ℥. i. cuȝ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0209-3
DFG

aqua calida. Et ſi adſunt vigilie adiunge ſeminum papa/
ueris: ⁊ corticū eius: ⁊ ſeminū lactucaꝝ: ana. ʒ. x. vel expri
me lac coꝝ. ⁊ miſce cū ſyrupo. ⁊ da. bonū ſi de⁹ voluerit.
❡ Damech. Si aſma ſit ex groſſis humorib⁹ deẽ ſyrup⁹
pectus ⁊ pulmonē a groſſis humorib⁹ mundās. ⁊ ꝯferens
anhelitui. ℞. radicum apij: feniculi: aniſi: ana. aur. vi. radi
cū ligritie. aur. iiij. amigdalaꝝ dlciū: ⁊ amaraꝝ. ana. ʒ. iiij.
aniſi: iſopi: ſeminū malue. aā. ʒ. v. paſſulaꝝ enucleatarū:
carniū iuiubaꝝ. aā. ʒ. xx. fic⁹ ſiccas ſex. Coque ī lib. vij. aq̃
vſq; ad tertiā ptē. Et da bibere cū melle: aut pēidijs. ⁊ da
vſq; ad hebdomadā vnā. Deīde da cū eodem ſyrupo ele/
ctuariū qđ recipit ireos: iſopi: orobi: ariſtologie rotūde: ca
lamenti: haſce: caſſie. ana. ʒ. ij. coſti: ſpice: ana. aur. ß. praſſij:
aur. i. ⁊ ß. ficuū ſiccaꝝ pinguiū: dactiloꝝ pinguiū. ana. v.
paſſulaꝝ enucleataꝝ: amigdalaꝝ dlciū ⁊ amaraꝝ: pinea/
rū mundataꝝ. ana. ʒ. vi. Cōfice cū melle colato q̄ntū ſuffi/
cit. Et ſit doſis eius. ʒ. iiij.

❡ Damech. ſi aſma: ⁊ tuſſis fuerit cū dominio ſanguis:
aut colere flebotomeẽ baſilica. deīde ſuccus ſcariole: aut
ſolatri: ⁊ feniculi humidi coct⁹ ⁊ depurat⁹ deẽ cū melle vł
çuccaro viol. aut ſyrup⁹ violatus cum aqua cucurbite: ⁊ ſi
īdiget mūdificatōe ſoluaẽ cum aq̃ fructuū que eſt ſꝫ hūc
modū. ℞. carniū iuiubaꝝ. ʒ. xx. ſucci cucurbite decocte in
paſta. ℥. iiij. ſucci ſolatri. ⁊ feniculi humidi: ana. ℥. ij. caſiefi
ſtule çuccari violati: tereniabī: aā. ℥. i. olei amigdalaꝝ dul
ciū ⁊ recētiū. ʒ. vi. lactis mulieris iuuēcule. ℥. i. pect⁹ autē
īungaẽ cū ceroto ſm hūc modū. Accipe olei violati. ℥. iiij.
cere albe. ℥. i. ꝯquaſſenẽ ꝑus in aq̃ dulci ꝑ vices plēs: dein
de ꝯquaſſenẽ cū mucilagine ſeminū citonioꝝ. ⁊ mucilagi
ne pſilij: ⁊ mucilagine dragagāti: ⁊ lacte mulieris ꝯq̃ſſati/
one ſuper ꝯquaſſationē vſq; dū impingueẽ.

❡ Cōfectio loch ꝯueniēs eis. ℞. ſeminū melonis: ⁊ citrul
li: ⁊ cucumeris. ⁊ cucurbite: ana. ʒ. i. ſeminū lacte: ⁊ portula
ce: aā. aur. i. papaueris albi. aur. ij. Teranẽ oīa ꝯtritione vl
tima. ⁊ inolue ea cū oleo amigdalaꝝ dulciū ⁊ recēti. Dein
de ꝯfice cū ſyrupo. Cuius hic eſt modus. ℞. aque cucurbi
te cocte in paſta. lib. i. ⁊ ß. ⁊ ꝓyce ſuper ipſam ſeminum cito
nioꝝ aur. ij. pſilij. ʒ. ij. Dimitte eas ꝑ horas. xij. deīde ꝯq̃ſ/
ſetur manib⁹. ⁊ coleẽ. accipe mucilaginis coꝝ. ℥. vi. ſyrupi
violati. ℥. viij. coquaẽ vſq; dū mediocrē habeat ſpiſſitudi/
nem. ⁊ fiat loch cū alijs. Et ſit doſis ei⁹. ʒ. ij. vel. iiij. cū la/
cte recēti: ſi non eſt febris: ⁊ ſi eſt febris cū aqua ordei: aut
cucurbite: aut citrulloꝝ: aut ſeminū portulace: ⁊ cōfert ēt
febribus exaſperantib⁹: ⁊ ſiti vehementi cum aqua frigi/
diſſima. Et ſi adſunt vigilie: da cum lacte: qđ mulgetur ex
papauere albo ⁊ aqua frigida.

❡ Dyaſcorides dixit. Aquā decoctionis ficuū: iſopi ſicce:
fenugreci: eē mūdificatiuū bonū pectoris ⁊ pulmōis: aut
aquā decoctōis iſopi: paſſulaꝝ: ⁊ fenugreci cū melle. Et di
xit aquā decoctōis ordei cū vrticis: ſilr mūdificare plmo
nem. ⁊ pectus a groſſis humoribus: aut ſemē vrtice cū aq̃
ordei ⁊ melle: ⁊ eſt forti⁹. Dixit iteꝝ: porroꝝ elixaturā: aut
ſemē coꝝ in aqua ordei cū melle: valere aſmati. ⁊ mūdifi/
cāt pect⁹. Et ſi fiat vomit⁹ cū ea. ⁊ baurac ē iuuamēti ſub/
limis: Et dixit ꝙ ius galli multe antiquitatis. ⁊ ꝓprie cū iſo
po: ⁊ haſce ⁊ cartamo ē ad aſma medicīa mirabilis. Et de/
coctio q̃nq; galli: ⁊ yreos: ꝯfert ſilr. abſtergit eni ⁊ mūdifi
cat abſterſiōe ſiue mūdificatōe forti. Et q̃nq; addiẽ poli/
podiū cum aneto. Dixit iterum. Grana lauri cum aqua iſo
pi: paſſulis: ⁊ melle: eſſe medicamen ſublime: aut cū aqua
calamenti: ⁊ haſce ⁊ melle.

❡ Hermes tradidit medicinas mirabiles ad aſma: ⁊ tuſ
ſim: ⁊ ei⁹ deſcriptio ē. ℞. ſauine: folioꝝ ſiccoꝝ tritoꝝ: ſicut
alcohol. ℥. i. inolue cū butiri vaccini plies loti: aur. iiij. Cō/
fice cū melle colato: q̄ntū ſuffiē. ⁊ poſt ipm alij addiderūt
ligritie. ʒ. v. pinearū purgatarū: amigdalaꝝ mūdataꝝ. aā
ʒ. iiij. Doſis eius eſt ab aur. ij. vſq; ad aur. iij.

❡ Paulus. Medicamē ad idē. ℞. ſauine: aur. ij. mellis: ⁊
butiri q̄ntum ſuffiē ad aggregandū. Et ſit doſis. ʒ. ij. cū de
coctione paſſularum ⁊ iſopi.

❡ Ruffus inq̄t. Trado medicam̄ exptū: ⁊ ex maxime ſe/
cretis. Et ē vt des pulmōis vulpis ſicci. ʒ. ij. cū aq̃ mell ſu/
mat cū celeritate: ⁊ ꝓpē frequēs ipſi⁹ ſit admiſtratio.

❡ Fili⁹ Zacharie araſi. Modus decoctōis iſopi: ⁊ ē deco
ctio mior ꝯferēs tuſſi: ⁊ aſmati a caliditate: ⁊ aſperitati pe
ctoris. ℞. fic⁹ ſiccas. x. ⁊ iuiubas. xxx. ſebeſtē: totidē: paſſu/
larū enucleataꝝ: ligritie: roſe: ana. ʒ. x. ſeminū altee: citōio
rū: iſopi. violaꝝ ſiccaꝝ: ana. ʒ. v. Decoquanẽ cū aq̃ lib. ij.
vſq; ad lib. i. Et doſis ei⁹ oī die ſit. ℥. ij. cū myroba. violaꝝ
ab aureis. iiij. vſq; ad. ℥. i. Et ſumat poſt illō māe: ⁊ ſero ex
hoc loch. qđ ℞. capillorū veneris: ſeminū melonū: citrul
loꝝ. aā. ʒ. v. Cōfice cū ſyrupo violato. Et ſit doſis ei⁹. ʒ. ij.
⁊ ſi ſuffiē bonum. Et ſi fuerit cum eo febris deẽ ei in potu
cū vadit dormitū mucilago pſilij: cū aq̃ citrulli: aut cucur
bite: aut cū aq̃ que mulgeẽ ex ſemīe portulace: ⁊ teneat in
ore ſuo formas ſīles lupinis: q̄ꝝ hec ē deſcriptio. ℞. ſucci
ligritie. ʒ. x. ſeminū cucurbite citrulli: portulace. ana. ʒ. v.
Cōfice cū mucilagīe pſilij: ⁊ albumine oui: ⁊ bibat cū aq̃
ꝑmixtiōis iuleb. ❡ Si āt nō fuerit cū eo febris deẽ lac re
cēs ad potandū: ⁊ comedendū cū pane: ⁊ ſorbēdū ex ea ho
ra poſt horā: vt frangaẽ ſitis: ⁊ ſit lac qđ mulgeẽ ꝓprie ex
capris: q̄ꝝ paſtus ſit herba ordei: ⁊ lactuce ⁊ ſīlia. Et ꝯfert
emplāre pect⁹ cū cera: ⁊ oleo violato ībibitis ī mucilagīe
pſilij: aut aq̃ portulace: aut lactuce: ⁊ ſīliū. Et ſit cib⁹ coꝝ
pedes: ⁊ capita edoꝝ. aut pulli cū cucurbitis: aut kiſt cum
oleo amigdalīo: aut ſorbitiōes ex ſauic ordei: aut tritici cū
çuccaro: ⁊ frangit aquā frigidā cū iuleb. ❡ Si aūt ſit ī pe/
ctore aut pulmōe mā calīa aliq̄d groſſitiei hñs admiſtren/
tur trociſci cū decoctione iſopi ꝑdicta. quorū hec eſt dſcri
ptio. Recipe ſucci ligritie: violaꝝ ſiccaꝝ. aā. ʒ. x. amigda/
larum amararū: ſeminū altee: dragagāti: ſeminū feniculi:
ana. ʒ. iij. Confice cū mucilagīe pſilij: ⁊ ſemine lini: ⁊ cito/
niorū: ⁊ da cū ſyrupo violato. Feſtinant. n. maturatiōes: ⁊
faciūt ſputū facilē. ❡ Si aūt mūdificatione corporis īdi/
geret: ſoluaẽ natura ð q̄rto in q̄rtū diē cū hac īfuſiōe. Re
cipe pulpe: caſie fiſtule: myroba. violarum: ſiracoſt. aā. ℥. i.
trociſci de violis. ʒ. ij. Diſtemperenẽ cum decoctione iſo/
pi predicta: ⁊ da in mane.

❡ Cōfectio trociſcorū de viol eſt huiuſmodi. ℞. folioꝝ
violarū mediocriū ī exiccatōe: ⁊ humectatōe. ʒ. vi. turbit
boni arūdinei. ʒ. iiij. ſucci ligritie: tereniabī: aā. ʒ. ij. ſcamo
nee. ʒ. ij. Fac trociſcos: valēt aūt ad ꝯſtrictōeꝫ anhelitus ⁊
leniūt naturam: ⁊ mūdificant pectus.

❡ Fili⁹ Zacharie. Modus ꝯfectiōis iſopi: ⁊ eſt decoctio
maior ꝯferens etiā tuſſi: ⁊ aſmati a materia groſſa multe
humiditatis. mūdificat eni pectus. ⁊ pulmonē ab ea ⁊ ſa/
nie ſi fuerit in ipſis. Recipe ficuū ſiccarū albarum: ⁊ pin/
guium. x. numero: ⁊ dattiloꝝ pinguiū tantundem. fenu/
greci: radicū apij: feniculi: ſeminis vtriuſq;: ſeminū vrtice:
aniſi: iſopi ſicce: calamēti: ireos: praſſij: aā. ʒ. v. ligritie mū/
de. ʒ. x. capillorū veneris. ʒ. vij. Decoq̄nẽ in lib. iiij. aq̃ vſq;
ad tertiā. Et ſit doſis ei⁹. ℥. ij. cū melle. Et daẽ ꝯueniēter.

❡ Medicamen de gētiana: quod maturat: ⁊ educit a pe/
ctore humorem groſſum aut ſanioſum. Recipe capillo/
rum veneris. ʒ. x. amigdalarū amararū. ʒ. v. ireos. ʒ. ij. cor
ticū radicū capparorū: orobi: ſeminū apij: ⁊ fenicli. aā. ʒ. ij.
gētiane: ariſtologie rotūde: aā. ʒ. v. ꝯfice cum melle diſpu
mato. Et ſit doſis ei⁹ a. ʒ. duab⁹. vſq; ad aur. ij.

❡ Cōfectio formarū ſimilium lupinis ꝯferentiū dyſnie
que tenentur in ore: ⁊ conferunt vehementer. Recipe ſuc
ci liquiritie: papaueris: çuccari: ana. partes equales. Fiant
inde predicte forme.

¶ Cõfectio vnguenti qđ maturat ⁊ lenit materias in pe/
ctoꝛe. Accipe cere citrine.℥.i.olei de keyri:⁊ ꝑpe citrine.ʒ.
iiij.adipis anatis.⁊ galline:⁊ mucilagis:fenugreci: ⁊ ſemi/
nis lini:ana.ʒ.q̃nq̃:ſtoꝛacis.ʒ.vi.Fiat eoꝝ aggregatio bo/
na:⁊ vngaẽ pectus ex eis:eſt.n.expertũ bonũ.
¶ Cõfectio pillaꝝ de agarico ex nr̃a iuentõe mũdificans
pect⁹⁊ pulmonẽ:⁊ ↄferens aſmati:⁊ tuſſi antiq̃. ℞.agarici
ʒ.vi.ireos:praſſij:ana.ʒ.ij.turbith.ʒ.viij. yere pigre.ʒ. viij.
colloquintide:ſarcocolle:ana.ʒ.iiij.myre.ʒ.ij.Confice cuꝫ
rob.Et doſis earum ſit.ʒ.ij.
¶ Cerotũ ex iuentõe noſtra:leniens pect⁹ maturãs mãs
in pectoꝛe ⁊ pulmõe. ℞.iſopi humide.ʒ.xij.cere citrine.ʒ.
iiij.olei de keiri citrina.ʒ.xl. medulle cruris vituli: adipis
anatis ⁊ vituli ⁊ galline:an̄.ʒ.viij.myrre:bdelij:mucilagi/
nis fenugreci:ſemis lini:an̄.ʒ.viij.ſigie:terbẽtine:an̄.ʒ.vi.
mucilaginis altee.ʒ.iij.Cõfice ſic.myrra:⁊ bdellium redi/
ganẽ in ſubtilem puluerem:⁊ miſceanẽ cum mucilagini/
bus:vſq; dũ diſſoluaẽ in eis.Deinde cum ceteris fiat vn/
guentũ.⁊ fiat inunctio ex eo tepido.
¶ Joãnes ſerapiõis. Loch ad aſma ↄferens:⁊ ↄſtrictõeꝫ
anhelit⁹.⁊ ſubtiliat humoꝛes groſſos. ℞.ſqlle aſſate.ʒ.vi.
radicũ lilij celeſtis.ʒ.iiij.iſopi:praſſij:ana.ʒ.ij.myrre:croci
ana.ʒ.i. Tere ⁊ confice cum melle.
¶ Loch aliud eiuſdẽ bonũ ad aſma.⁊ cõſtrictionẽ anhe/
litus. ℞. ſiſami excoꝛticati:naſturtij:an̄.ʒ.xxx. penidiaꝝ.
ʒ.xx.iſopi.ʒ.vij.Confice cum penidijs.⁊ ſit doſis eius.ʒ.v.
cum decoctione iſopi.
¶ Confectio vapoꝛis exiccantis humiditatẽ in pectoꝛe:⁊
ↄfert aſmati:⁊ tuſſi humide. ℞.arſenicũ:⁊ tere ↄtritõe bo
na:⁊ diſtẽpera cũ vitello oui.⁊ accipe ferulã ſiccam.⁊ diui
de eã in rotũdula multa:ſicut ẽ magnitudo nucis:deinde
illinias eam cum medicamine:⁊ dimitte ſiccari.⁊ cum vo
lueris vnge eam cum ſepo renum capꝛarum:aut bouum:
⁊ fiat ſuffumigiũ ex vna poſt vnam per hebdomadaꝫ:⁊ re
cipiat patiens vapoꝛem oꝛe aperto.
¶ Aliđ. Accipe arſenicũ:⁊ ſulfur:⁊ fac foꝛmas ſiles auel/
lanis cũ ſepo renũ capꝛaꝝ: ⁊ vtere ſilr.
¶ Aliud ↄferẽs tuſſi:⁊ aſmati plĩme humiditatis. ℞.ari/
ſtologie rotũde:myrre:ſtoꝛacis:thuris:an̄.ʒ.i.arſenici.ʒ.v
Tere ⁊ ↄfice cũ butiro vaccino.⁊ fac foꝛmas ſiles auella/
nis:⁊ ſuffumigeẽ vna poſt vnã.Ea aũt que bibunẽ ſꝫ hãc
itentõeꝫ aut lambendo ſumunẽ dicta ſunt in canone.

¶ De tuſſi.

t Uſſis quedã eſt humida:quedã ſicca:⁊ q̃cunq; ea
ruꝫ fuerit:aut eſt cã in mẽbꝛis ipſius ſpũs:aut ab
alijs mẽbꝛis ſicut tuſſis catarralis. Et tuſſis q̃ fit
cum cõitate alioꝝ mẽbꝛoꝝ ſicut ſtomaci epatis:⁊ ſplenis:
aut coꝛpoꝛis totius:ſicut in febꝛibus. ¶ Tuſſis quidem
catarralis cura ſunt due res. Pꝛima eſt ſedatio fluxus ca
tarri:⁊ diximus curã eius.Secunda eſt ſecundum duos
modos. Pꝛimus eſt maturatio eius quod fluxit. Secun/
dus eſt eductio.⁊ abſterſio eius ex eis que dicemus iam.
¶ Cura autem tuſſis que fit a cõmunitate:eſt due res.
Pꝛima ẽ rectificatio illius mẽbꝛi.Secũda ẽ occurrere i/
p̄ſſioni illate in ſpiritualib⁹ mẽbꝛis ex his que dicem⁹.
¶ Tuſſis aũt humida cuius cã ẽ in ſpũalibus mẽbꝛis eſt
ſm vnũ duoꝝ modoꝝ:aut a malitia cõplexionis ſine ma
teria:⁊ dicta ẽ cura eius:aut cũ materia calida ⁊ frigida:
groſſa vel ſubtili:⁊ dicta eſt cura eoꝛum in capitulo de aſ
mate ſufficienter. ¶ Sicca aũt tuſſis ẽ ſm duos modos
aut cũ febꝛe:aut ſine febꝛe:⁊ qualiſcũq; ſit:dicta eſt cura
eius in capitulo de aſmate a ſimili cauſa.
¶ Mabemet araſi. Tuſſis catarralis a catarro acuto ca
lido:⁊ ſubtili ſm intentionẽ pꝛimã curatur cũ rebus pꝛo/
pꝛie ingroſſantibus: ⁊ coadunantibus ipſuꝫ ⁊ tardãtibus
velocitatẽ ſui fluxus:ſicut ꝓpꝛie ſirupus de papauere: ⁊
foꝛtius ẽ eo iacur:⁊ gargariçet ante ſomnũ aquã decoctio
nis balauſtie:⁊ roſaꝝ ſiccaꝝ.deinde ponat ſub lingua ſua
ex his trociſcis. Recipe amili: dragagãti:amigdalaꝝ dul
cium excoꝛticatarũ farine fabaruꝫ:ſeminis papaueris al
bi:⁊ nigri:⁊ coꝛticũ eius:gũmi arabici:⁊ boli armeni. Fac
ex eis foꝛmas ſimiles lupinis cũ mucillagine pſilij:⁊ ſemi
nis citonij:⁊ detur eũti doꝛmitũ: ex diacur circiter vnã.ʒ.
⁊ eſt foꝛti⁹ eis.Et ſi ſignificatur cũ hoc plenitudinẽ eſſe i
ſanguine phlobotomamus cephalicã poſt ſedationẽ acui
tatis:⁊ inflãmationis ſupflue.Et mane damus aquaꝫ oꝛ/
dei decoctionis iniubarũ:⁊ ſebeſten:cũ myroba.viola. et
cũ ſirupo de papauere in ſero.Et damus cibos ſoꝛbitões
ex faria fabaꝝ ⁊ aqua oꝛdei cũ eo: qđ mulgetur ex ſemĩe
papaueris albi:aut ex ſemine ⁊ coꝛtice. ¶ Si.n.vigile ad
ſunt cũ oleo amigdalino dulci:⁊ penidiarũ. Et damus ẽt
atriplicẽ:⁊ maluas:⁊ etiã ex lactucis cũ amigdalis ⁊ ſoꝛbi
tiones ex tritico donec diſſoluatur:aut ex ſãiic. ¶ Si ãt
indigent ventris ſolutione ⁊ tuſſis fuerit ſicca:⁊ aſpitas i
pectoꝛe.tũc accipe iniubaꝝ:⁊ ſebeſten:ana.xx.nũero: paſ
ſulaꝝ enucleataꝝ.ʒ.x.violaꝝ:liquiritie: ana.ʒ.v. ficuum
ſiccarũ numero.x.Decoque in lib.iij.aque vſq; ad.i.⁊ diſ
ſolue i ea caſie fiſtule.tereniabin:ana.℥.i.Et ſi patiatur ca
loꝛẽ cũ hoc da myroba.de violis:aut aquã oꝛdei. Si autẽ
iã ſcreare ceperit occurrit nobis iam intentio ſecunda. et
cũ volum⁹ vt vẽtris ſolutione pectus mũdificetur: dabi/
mus tũc myroba. violatũ cũ decoctiõe iſopi minoꝛe:quã
diximus i cura aſmatis calidi:⁊ ſimilia pectus mundificã
tia.Si aũt fuerit tuſſis a catarro frigido:⁊ groſſo :tũc pre
cipimus vt lambat omni ſero ex myrra circiter.ʒ.i.cum
melle:⁊ gargariçet añ ſomnũ ꝓpꝛie myrrã:⁊ crocũ cũ aq̃
mellis:aut rob:aut cũ iacur:ſi neceſſitas expetit. Et ſi ne/
ceſſaria ẽ vẽtris ſolutio:fiat illud cũ pillulis cochijs: aut
cũ iera diacoloquintide.⁊ ſi poſt illđ foꝛtioꝛe indiget me
dicamĩe:da ex his pillulis. Recipe ſtoꝛacis liq̃de: myrre:
thuris maſculi: opij:croci:ſucci liqritie:ana. Fiant pillule
ſicut cicer.Doſis a.ʒ.iij.vſq; ad.iiij.⁊ ſumat ex eis i nocte.
Cũ aũt qđ aggregatũ ẽ in pectoꝛe iã maturatur: ⁊ expuiẽ
da decoctõeꝫ iſopi maioꝛẽ.⁊ alia que dicem⁹ in tuſſi a mã
groſſa ⁊ humida. ¶ Si aũt catarrus cũ his non ſiſtitur:⁊
tuſſis ſupfluit opꝫ vt dem⁹ aliq̃ ex ſtupefaciẽtib⁹: ⁊ catar
ri vehementiã ſedãtib⁹ ex his q̃ dicem⁹. ¶ Si aũt hec ñ
ſufficiũt tũc opꝫ vt radaẽ caput.⁊ fricẽẽ in loco çuendeg i
balneo cũ pãno multe aſpitatis:donec loc⁹ rubeat:⁊ ſi nõ
ſuffic̃ liniaẽ in eodẽ loco cũ emplõ ex ſinapi ↄtrita: ⁊ deco
ctiõe ficuũ:⁊ dimittaẽ dõec veſiceẽ loc⁹.Deide apianẽ ve
ſice.⁊ nõ ↄſolidenẽ tpe extẽſo.Et ſi adhuc nõ ↄtulerit cau
teriçeẽ ſup çuẽdeg:⁊ teneaẽ cauteriũ lõgo tpe aptũ. Hec
ãt tuſſis curãda ẽ exq̃ſite cũ ml̃ta ſollicitudĩe. Perduc̃.n.
ad ptiſiꝫ plerũq;. ¶ Medicĩe frigide ad tuſſiꝫ catarralẽ.
m Abomet araſi. Cõfectio ſyrupi de papauere mira
bilis ad tuſſim ex catarro calđ:⁊ ptiſim. ℞.papa/
ueris albi:⁊ nigri.an̄.ʒ.c.ſemis lactuce.ʒ.cc.ſemis
iuſquiami albi.ʒ.xxx.coquanẽ in aq̃ lib.viij.vſq; ad lib.ij.
Deide cola ⁊ ꝓijce ſup ipꝫ mucilagis pſilij.lib.ſ.rob.libꝛ.i.
coquãtur donec iſpiſſentur ⁊ adminiſtrenẽ.
¶ Idem. Cõfectio trociſcoꝛum de papauere ↄferẽs vt ſu
pꝛa. Recipe papaueris albi.ʒ.xxx. ſeminis cucurbite: ci/
trulli:iuſqami albi:ana.ʒ.xx.amili:dragagãti: gummi ara
bici. ana.ʒ.xv. Confice cuꝫ mucilagine pſilij. Doſis.ʒ.ij.
cũ ſyrupo de papauere aut cum aqua oꝛdei:ſunt eniꝫ boni
ad tuſſim calidam catarralem cum qua eſt ſputum ſubti/
le citrinũ bonum expertum.
¶ Idem. Confectio pillularum de papauere ad tuſſim
ſiccam:que infeſtat in nocte: ⁊ ad catarrum calidum.
Recipe opij: amili: gummi arabici: ſucci liquiritie: ana
partem vnam.papaueris partes duas. Fiant pillule ſicut

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0211-9
DFG

cicer.⁊ da ex eis a.ij. vſqꝫ ad.iiij.in ſero.cõueniunt etiam
pueris q vomũt:⁊ nõ pñt dormire ꝓpter tuſſim.De iacur
⁊ de diacodion:dictum eſt in grabadin noſtro.
¶ Dyapapauer ex ĩuentione nr̃a ↄferens cuꝫ auxilio dei
tuſſi catarrali noui:⁊ multi tpis:⁊ maturat egritudies pe/
ctoris:⁊ ẽ mirabilis.℞.papaueris.ʒ.xxx.ligritie:dragagã/
ti penidiaꝝ.añ.ʒ.xxx.gũmi arabici:ſucci ligritie:farine fa
baꝝ:feniculi:aniſi:ſemis lactuce: amili:ſeminis portulace:
malue.añ.ʒ.x.ſeminũ cucumeris:melõis:cucurbite.añ.ʒ.
v.Confice cũ melle colato:aut cum penidijs. ⁊ melle:ana
quantum ſufficit. Doſis eſt aur.ij.
¶ Syrup⁹ de papauere ex ĩuentione nr̃a ↄfert catarro: ⁊
tuſſi ab eo:⁊ ꝓprie cum caliſtate.⁊ aſperitate.Expertũ. ℞.
papaueris albi.ʒ.xxx.papaueris nigri.ʒ.x.ſeminũ malue:
gũmi arabici:dragagãti:ſeminũ citrulli:⁊ citõioꝝ:añ.ʒ.v.
ligritie.ʒ.xv.pſilij.ʒ.vi. oĩa ꝑter pſiliũ ↄtunde. ⁊ pone ſup
ea aq̃ lib.vi.⁊ dimitte die ac nocte.⁊ fac bullire vſqꝫ dum
redeat ad lib.iij.Deinde cola.⁊ pone ĩ eo bueg.lib.i. peni/
diaꝝ.lib.ſ.Coque lẽto igne vſqꝫ ad mellis ſpiſſitudinem.
Da.bonum ſi deus voluerit.
¶ Hamech fili⁹ Zacharie.Syrup⁹ de papauere confert
tuſſi:⁊ catarro. ℞.papaueris albi cuꝫ corticib⁹ ſuis.ʒ.xxx.
papaueris nigri:dragagãti:gũmi arabici:ana.ʒ.x. ligritie:
ſemĩs malue:ana.ʒ.xv.ſebeſten.xxx.Cõtũde oĩa.⁊ fac coq
cũ aq̃ lib.v. vſqꝫ ad lib.ij.deinde cũ meibutheg:⁊ çuccari:
añ.℥.viij.Fiat ſyrup⁹ bonus ſi de⁹ voluerit.
¶ Idẽ.Dyapapauer cui⁹ iuuamẽtũ eſt ſublime ad tuſſiꝫ
catarralẽ cũ caliſtate ⁊ aſpitate:⁊ ſiti: ⁊ ad raucedinem vo
cis.⁊ ad pleureſim.℞.papaueris albi:pẽidiaꝝ.añ.ʒ. xxxv
ſucci ligritie:gũmi arabici:dragagãti:añ.ʒ.x. amigdalarũ
dulciũ.ʒ.viij.amili:ſemĩs citonioꝝ:ſeminis portulace: añ
ʒ.v.ſemĩnis cucumeris citrulli:melõis.⁊ cucurbite:lactu
ce:⁊ malue.ana.ʒ.iiij.Tẽpera cũ ſyrupo violato.Doſis ei⁹
ab aur.ij.vſqꝫ ad.℥.ſ.cũ aqua ordei decoctiõis iuiubarũ:
⁊ ſebeſten.Et ſi habet vigilias cum eo quod mulgetur ex
papaueris ſemine, cum cortice ſuo.

¶ Medicine ad tuſſim catarraleꝫ frigidã.

Amech araſi.Cõfectio pillulaꝝ de ſtorace ad tuſ
b ſim catarralẽ abſqꝫ caliſtate que ingetat in nocte:
⁊ inducit vigilias.℞. ſtoracis ligde albe: olibani:
myrre: ſucci ligritie: opij:ana partes eq̃les. Fiant pillule
ſicut cicer.Doſis earum eſt.ij.aut.iij.
¶ Sabor Birges.Cõfectio pillulaꝝ quaꝝ iuuamẽtũ eſt
vltimũ ad tuſſim catarralem ⁊ ptiſim.℞.ſtoracis:myrre:
croci:opij:olibani:caſtorei:yreos:pinearum purgatarum:
ana.Confice cum galbano:⁊ ſtorace diſſolutis cum pauco
melle.da bis vel ter in hebdomada. Da.ij.vel.iij.
¶ Galien⁹.Cõfectio trociſcoꝝ ad tuſſim catarralẽ:qui te
nent̃ ſub ligua.⁊ ſiſtũt cataꝝ.⁊ ſedãt tuſſiꝫ.⁊ ↄferũt ptiſi.
Recipe medicamis trociſcati qd̃ habuim⁹ ab ãdromaco:
pineaꝝ purgataꝝ:añ.aur.v.amili:gũmi arabici: dragagã/
ti:papaueris albi:añ.aur.ij. Fac formas ſimiles lupinis.⁊
da in ſero tenẽdas ſub lingua.
¶ Alexãder dixit canonẽ quẽ ꝑterire ñ iubeo. Et.n.ante
curabis catarrum q̃ egritudines catarrales:niſi in duob⁹
caſib⁹.ſ.cũ timueris ne ꝓfocet̃:⁊ ſuccurres tunc cũ vomi/
tu.Et cũ timueris aduentũ apãtis in parte nobili preueni
es cũ flebotomia. Et dico ꝙ narcotica poſtq̃ ex catarro ĩ
pectore:⁊ pulmõe plenitudo acciderit:dare ſuſpectuꝫ eſt.
Dabis igit̃ ante plenitudinẽ. Poſt vo plenitudinẽ cũabis
ꝑus. Deĩde ſecurius dabis:ſi iſta dari oportet.
¶ Alexãder.Cõfectio pillulaꝝ ad tuſſim catarralẽ:⁊ ẽ ex
medicinis bñdictis:⁊ eſt ex ſecretis:⁊ ↄfert ad oẽs egritu/
dines catarrales:⁊ vocantur pillule alchabei:⁊ dicte ſunt
in capitulo de catarro.
¶ Idẽ.Cõfectio alia pillulaꝝ expta ad tuſſim. ⁊ ad alias
egritudines catarrales.Recipe ſtoracis myrre:opij: ana.
Fac pillulas cũ melle diſpumato. Alie ſm eũdẽ modum
myrre: opij: galbani.ana.Fac vt ꝑus.
¶ Iſaac eben amaran.Pillule ſedãtes tuſſim antiquã:⁊
nouã.℞.ſtoracis:caſtorei:opij:grãoꝝ pini.añ.partẽ.i.cro/
ci partis.i.tertiam.Confice cum rob.
¶ Joãnes filius Serapiõis.Cum tuſſis ſicca:⁊ aſpera cũ
caliditate fuerit:⁊ rubore:⁊ apparuerit ſanguinis plenitu
do:ſicᷓ diximus in aſmate a ſili cã facto facies.ſ.vt flebo/to
mes admiſtrãdo deĩceps aquã ordei:cũ ſebeſtẽ:cũ ſirupo
violato:aut miroba.de violis:⁊ ĩungimus pect⁹ cũ cerotõ
Galieni ĩbibito ĩ mucilagĩe pſilij :aut ex cera:aut oleo vio
lato ſilr ĩbibitis. Et ſi eſt neceᷓ materiã ſepultã in pectore
educere:dabis miroba.ꝑdictũ cũ decoctõe iſopi:frigida ⁊
dabis ſpecies loch ex mucilaginib⁹ pſilij:⁊ citonioꝝ cũ gũ
mis ⁊ granis:⁊ medullis ex his q̃ dicem⁹.Cibabis aũt eos
ſorbitiõibus:⁊ ꝓpe cũ farina fabaꝝ ⁊ pẽidijs: ⁊ oleo amig
dalino dulci:aut ordeo ↄfracto.Et qñqꝫ miſcemus ꝓpter
vigilias illud qd̃ mulget̃ a ſemine papaueris albi:⁊ aq̃ or/
dei:damus etiã ſorbitiones. ⁊ ex tritico ↄfracto cum çuc/
caro:nec non ⁊ iuſcula ex atriplice:⁊ maluis. ⁊ qñqꝫ miſce
mus pullos ⁊ pedes edoꝝ: ⁊ capita:⁊ aues minutas tene/
ras cũ eis:aut vitella ouoꝝ diei ſui.⁊ cucurbita eſt bonus
cibus eis:⁊ medulle fride:ſicᷓ citrullus.⁊ cucumer. Et ſilr
bleta:⁊ portulaca cũ amigdal̃. Bibãt aũt aquã ordei: aut
aquã frigidã:⁊ iuleb cũ maturatiõis ſigna apparuerint: ⁊
ſputũ iã incipit ĩpinguari: dandũ ea q̃ facilitant ipſum ad
excreanduꝫ:ſicut decoctio iſopi frigida proprie. ⁊ electua
ria que lambuntur.⁊ ſimilia.
¶ Confectio loch q̃ ſumit̃ in hora hac. Recipe paſſulaꝝ
enucleataꝝ pineaꝝ: fiſticoꝝ: amigdalaꝝ dulciũ: ſeminũ
citrulli:melonis.⁊ cucurbite:dragagãti:gũmi arabici: pa/
paueris albi:ſucci ligritie portulace:zuccari tabarçet:⁊ pe
nidiaꝝ.ana. Fac formas ſiles lupinis.⁊ teneat ſub lingua
vnã ex eis. Pect⁹ aũt ex maturatiuis ĩungat̃. Si ãt corp⁹
mundificatõe ĩdiget:fiat iſtõ cũ trociſcis de viol̃.ʒ.ij.pul
pe caſiefiſtule.℥.i.çuccari violati:⁊ tereniabin.ana.aur.v.
diſſolutis cũ decoctione iſopi frigida.
¶ Joãnes Serapionis. Loch ↄferẽs tuſſi facte ex calita
te ⁊ ſiccitate:⁊ aſpitate multa: ⁊ eſt medicamen bonũ. ℞.
amigdalarũ dulciũ: excorticataꝝ.ʒ.xij.ſeminũ maluea/al
tee.añ.ʒ.x.ſeminũ citrulloꝝ mũdatoꝝ.ʒ.x. gũmi arabici.
dragag.armili:granoꝝ citonioꝝ excorticatoꝝ: ſucci ligri/
tie:grãoꝝ dlciũ pini.añ.ʒ.viij.pẽidiaꝝ ſabari.℥.i. Terant̃
oĩa ↄtritõe bona:⁊ miſceant̃ cũ ſyrupo. Cui⁹ hᷓ ẽ ꝑmixtio.
Accipe paſſularũ dulciũ:radicũ ligritie:ſebeſtẽ: iuiubaꝝ.
añ.ptes eq̃les.Decoq̃ in aq̃ dõec ĩſpiſſent̃ .deiñ cola:⁊ pu/
ce ĩ eã rob q̃tum ſuffic.deĩde coagulent̃ cũ ea medicĩe. ⁊
da cũ ſorbitõib⁹ ex aq̃ furfuris:⁊ ordei cũ farina fabaꝝ:cũ
penidijs.⁊ oleo amigdalio dulci:⁊ bibat ſup ipꝫ aq̃ ordei
¶ Idẽ. Aliud valẽs ſilr. Recipe pſilij:granorum citonio
rum.ana.ʒ.v. ſeminis papaueris albi.ʒ.x. ſebeſten.l. iuiu
be.xxx.radicis ligritie.ʒ.vij. keſmes.ʒ.xv.caſiefiſtule mũ
date.℥.i.Decoque in aque lib.viij.donec ĩpinguentur.dei
de cola.⁊ ꝓijce ſuper ea rob.lib.ij.çuccari ſaliemeni: ſyru
pi violati:penidiarum:ana.℥.vi.farine fabarum.ʒ.iij.dra/
gagãti:gũmi arabici:añ.aur.iiij.coquant̃ vſqꝫ dũ tranſeãt
in eẽntiã mellis.Deĩde. ℞.ſeminis cucurbite:melonis:cu
cumeris.citrulli:añ.aur.ij.papaueris albi.aur.iij.aniſi:fe/
niculi.ana.aur.ij.Cõfice ⁊ ↄſerua in vaſe vitreo.Doſis ei⁹
eſt ab aur.ij.vſqꝫ ad.iij.teneat parũ ſub ligua.deĩde bibat
aquã ordei.eſt.n.medicamẽ benedictũ.
¶ Cõfectio formaꝝ ſiliũm lupinis ↄferentiũ tuſſi ⁊ aſpi/
tati:⁊ eſt ex ĩuentione noſtra. Recipe dragaganti gummi
arabici:ſemĩs malue:ſeminũ cucũeris:⁊ citrulloꝝ: amig
dalarũ dulciũ:farine fabarum.ana.ʒ.iij.ſemĩs portulace

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0212-5

amili:ana.ʒ.ij.fac formas cum mucilagine pſilij. Et ſi vigilias patit͠ adde ſeminū lactuce:papaueris: an̄.ʒ.iij.

¶ Filius Zacharie araſi. Cōfectio pillulaꝝ ꝯferentium tuſſi calide ⁊ ſiccitati:⁊ auferunt eā. ℞. ſucci ligritie:amili:dragagāti:gūmi arabici:amigdalaꝝ excorticataꝝ: ana.ʒ.i.çuccari tabarçet.ʒ.iiij. Cōfice cū mucilagine ſeminū citonioꝝ:⁊ fiāt īde p̄dicte forme:⁊ teneat ī ore die ac nocte.

¶ Idē. Pillule bichichie que ꝯferunt ſilr̄. ℞. ſucci ligritie:çuccari tabarçet.an̄.aur.vi.amili:dragagāti:amigdalarū dulciū:an̄.ʒ.iiij. Cōfice cū mucilagīe pſilij vl' citonioꝝ.

¶ Idem. Cōfectio trociſcoꝝ feſtinantiū maturatiōez in tuſſi calida:⁊ pleureſi facilitantiū ſputū. ℞. ſucci ligritie violaꝝ:an̄.ʒ.v.amili:dragagāti ſeminū altee: feniculi:an̄.ʒ.i.⁊.ſ. ꝯfice cū mucilagine pſilij:⁊ ſemine lini: ⁊ ſemine citonioꝝ. Da cū aqua ordei:⁊ ſirupo violato.

¶ Idē. Cōfectio alia trociſcoꝝ ad tuſſim ſiccā cū calitate vehemēti ⁊ ſiti. Recipe ſucci ligritie: violaꝝ:ana. aur.iij.ſemis citrulloꝝ:cucurbite:tereniabi ana.aur.i.⁊.ſ. Fac trociſcos cū mucilagine pſilij:⁊ ſeminum citonioꝝ. Doſis aur.ij.cum aqua ordei:⁊ ſyrupo violato.

¶ Filius Zacharie. Loch conferēs tuſſi calide: ⁊ maturans eā ⁊ facilitās in ea ſputū. ℞. iuiube.xx.ſebeſten.xl.ficus.vi.ligritie mūde:paſſulaꝝ enucleataꝝ:an̄.ʒ.x.capillorum veneris.ʒ.v.aque lib.v.bulliāt vſq3 ad lib.i. Deinde recipe penidiaꝝ: ⁊ rob. ana.ʒ.v.coquātur cum facilitate: vſq3 dum ſint ſicut mel currens. Deinde. Accipe ſeminis lactuce:cucumeris:cucurbite:portulace:fabaꝝ excorticatarum:ana.ʒ.iij.gūmi arabici: dragaganti:amili: papaueris albi:amigdalaꝝ dulcium: ana.aur.i. Confice cum predictis. Doſis.ʒ.v.

¶ Idem. Confectio ſimilis lupinis cōferens tuſſi calide ⁊ abſciſſioni vocis:⁊ ſedat ſitiz. Recipe ſeminis cucumeris mūdati.ʒ.vi.ſucci liquiritie.ʒ.vi.ſemis portulace aur.ii. Aggrega ea poſt bonā ꝯtriturationē cū albumine oui. Fiant īde p̄dicte forme:⁊ teneat quotidie ſub lingua.

¶ Sabor. Cōfectio pillulaꝝ cōferentium tuſſi. Recipe dragagāti:gūmi arabici:ſeminū cucumeris:papaueris albi:portulace:amili:croci:çucari vel penidii:ana: confice cū rob:⁊ teneat quotidie ſub lingua. eſt enim expertum ſi deus voluerit.

¶ Sabor rex. Medicamen mirabile conferens tuſſi calide antique ⁊ egritudinibus pectoris a caliditate ⁊ ſiccitate expertum. Recipe mucillaginis pſilij extracte ſm̄ ſciam lib.iij.rob.penidiarū çuccari:ſaliemeni:ana: lib.i.⁊.ſ.coque lento igne: vſq3:ad mellis ſpiſſitudinē auferēdo cōtinue ſpumam eius. Deinde recipe ſeminū cucumerū: melonū:citruloꝝ:cucurbitarū mūdataꝝ:ana:au.x.amili amigdalarū dulciū:granoꝝ pinee maioris:ana.ʒ.xv. gūmi arabici:dragaganti albi:ſeminis lini aſſi:ana.ʒ. viij.ſeminum citonioꝝ mūdatoꝝ.ʒ.iij.croci.ʒ.i.aniſi.ʒ. vij. opij aur.i.ſeminis lactuce.ʒ.x. Tere ⁊ pulueriça:⁊ pone ſuper medicamine. Et ſi non pōt dormire:adde cū predictis ſeminis papaueris.ʒ.xx.iuſquiami.ʒ.xv.recōde in vaſe vitreo. Doſis eius ē.ʒ.iij.vel.iiij.teneat ſub lingua ⁊ glutiat ſaliuā eius:eſt enim medicamen benedictum.

¶ Syrupus de iſopo ex īuentōe noſtra ꝯferens cum auxilio dei tuſſi calide difficili:⁊ cōfert ptiſi:⁊ dolori laterū. Recipe liquiritie:radicū feniculi:vel ſeminum eius:ana ʒ.x.iſopi: capillorū veneris:ana.ʒ.v.ficus pigues.vij.pruna.x.iuiubas.xx.paſſulaꝝ enucleatarū.ʒ.xxx. ſebeſtē.c. Decoque cū aque lib.v.vſq3 ad libr.ij. Da tepide.℥.i.cum ʒ.vi.çuccari roſati vel violati. Et ſi vis accipe hui9 aque lib.ij.⁊ pone ſuper eā pēidiarū ſabari:çuccari:meibutheg ſirupi violati:ana:lib.ſ.dragagāti.℥.iiij. Et eſt valde bonū tuſſi ſicce:vel ptiſi ⁊ ſiccitati pectoris ⁊ aſperitati. Da cum aqua cucurbite aſſe:vel citruli.

¶ Aliud valens ſimiliter. Accipe p̄dicte decoctionis lib.ij. ⁊ pone ſuper ea penidiarū lib.i.olei amigdalarum dulcium.℥.iij.granorū alben excorticatorū lib.ſ. Fac decoq ⁊ accipe violarū ſiccarū tritarū:⁊ cribellatarū: dragaganti:ana.℥.i.gūmi arabici.℥.ſ. Pone in vaſe vitreo. Doſis eius eſt ſicut galla:bonum ⁊ expertum.

¶ Syrupus alius de iſopo ad tuſſim:⁊ aſma:ex aſperitate pectoris. Recipe iſopi:capilli veneris:ana.ʒ.xvi. violarum:papaueris albi:ordei mūdi:ſeminis malue:ana.ʒ.x. ſeminum citoniorum:lactucarū cucumeris:ana.ʒ.v. paſſularum enucleatarum.ʒ.x. ficus.x. iuiubas:ſebeſtē: ana xl.cū.çuccari lib.ij.fiat ſirupus.

¶ Syrupus alius de iſopo ad tuſſim: ⁊ aſma: ex aſpitate cū calitate. ℞. ligritie.ʒ. xx. ſemis malue: cucumeris:ordei mūdi.dragag:ſemis citrullorū:ana.ʒ.iij.maratri:apij: capillorū veneris:iſopi:an̄ ʒ.x.ſemis citoniorū:malue:aniſi:ana.ʒ.v.iuiube ſebeſten:ana.xl.ficuū pinguiū albarū.x. paſſularū enucleatarū.ʒ.x.çuccari:lib.ij. Fiat ſyrupus.

¶ Dyaſcorides dixit.q̄ fruct9 algipur antiqu9 aſſus igni: deīde comeſtus ī ſero cū melle ꝯfert tuſſi difficili ⁊ laborioſe. Et dixerunt qdam ex poſteriorib9: q̄ ſi infigant͠ in eo tria grana thuris:ita q̄ ſepeliant͠ in ipō:⁊ deīde aſſet͠:⁊ comedat͠ in ſero cū melle:cōfert mirabilr̄. Seruet͠ tn̄ illo ſero ſine cena: ⁊ eſt exptum.

¶ De tuſſi humida.

Lia aūt tuſſis humida ponit͠ ꝯplexional' alia materiał'. Mālis qdem ē ſm̄ alterū duorū modorū: aut cū cal'itate aut cū frigiditate: ⁊ huic qdem cū cal'itate:cura eſt tres res. Prima eſt adequatio cauſe ei9. Scđa eſt ſubtractio ipſi9 cum ſubtractiōe cōi. Tertia eſt eductio ipſius eductione propria.

¶ Primam igit͠ rem ꝯplent ꝯmenſurare regimini ei9 ſex res:quēadmodū in capl'o de aſmate dcm̄ ē. ⁊ poſt illō adminiſtrare ex medicaminib9 que ipſi9 mām digerunt: ſic͠ eſt decoctio capillorū veneris p̄p̄e. ⁊ ſyrup9 ex eis ſyrup9 ex iniubis:⁊ decoctio ſebeſten in aq̄ ordei:⁊ decoctio iſopi facta de papauere albo:⁊ fabis excorticatis. ⁊ ordeo cum çuccaro roſato aut violato:⁊ ſimilia.

¶ Scđam vero rem ꝯplēt eūones facte cum iteratione: ⁊ facte de quarto in quartū diem ex caſiafiſtula:⁊ tereniabin:⁊ miroba.de violis cū decoctione iſopi facta. Et qn̄q3 addimus ei qđ eſt ſicut trociſci de violis ⁊ ſilia. Et damus iter ſolutiuū: ⁊ ſolutiuū ex moderate vomere faciētibus ſic͠ eſt rafan9 aſſus cū oximelle aut ſyrupo acetoſo de radicib9. Aut radices aſſas:⁊ oximel ⁊ ſi l'ia. Et ſi corp9 eſt plenū:⁊ facies pulchra cū abūdantia ſanguis flebotomam9 ex baſilica. Et qn̄q3 cū flebotomia remouente materiam

¶ Tertiā rem cōplent admiſtratōes medicaminū plenitudinē pectoris ⁊ pulmōis p ſcreatū educentiū:ſicut loch de pino:⁊ p̄p̄e loch de fabis:⁊ loch de iſopo: ⁊ ſyrupus de iſopo:⁊ confectio de orobo:⁊ ſimilia.

¶ Humide vō: ⁊ frigide tuſſis cura eſt qnq3 res. Et p̄ma quidem eſt digeſtio:⁊ maturatio cauſe eius. Secunda eſt ſubtractio eius ſubtractione cōi. Tertia eſt eductio eius eductione propria. Quarta exiccatio reſidui ſuperflui humidi eius. Quinta corrigit accidentia.

¶ Prima qdē res p̄ficit͠ cū adminiſtratione medicaminū ſicut in capitulo de aſmate diximus.

¶ Scđam rem ꝯplent eūones facte cum eo qđ eſt ſicut pillule cochie. ⁊ yera dyacollogntide. ⁊ pillule de agarico: quas diximus in capitulo de aſmate. ⁊ p̄p̄ie cū iteratiōe: ⁊ iteratione:⁊ cū interpollatiōe adminiſtratiōis rei vomite. Et ſi oportet vt deueniat͠ ad adminiſtrationē ſolutiuorum:etiā ſicut in capl'o de aſmate diximus.

¶ Tertiam rem ꝯplent adminiſtrationes medicinarum materiā educentiū a pectore quas in capl'o de aſmate diximus:⁊ deinceps oſtendemus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0213-1

¶ Quartam reȝ complent adminiſtrationes medicami
num mãȝ diſſoluentiũ: ⁊ reſoluentiũ ⁊ ꝯſumentium: ⁊ hu
iuſmodi qdem medicamĩa ꝯſueuerũt medici exiccatiua
vocare que adminiſtrãda ſunt poſtq̃ adm ſtratiões mũ/
dificantiũ cõmuniuȝ: ⁊ ꝑprioꝝ cum iterationibus ꝓceſſe
runt ꝯuenientib⁹: vt exiccet̃ reſiduum rei. Adminiſtrare
aũt ea in ꝑncipio eſt ꝓfocare ⁊ ponere egrũ ad mortẽ: Ad/
miniſtratio aũt hmõi eſt ſcd̃m duos modos. ſ. aut lamben
do ſeu bibẽdo: aut vaporãdo: ⁊ nos plenã faciem⁹ narrati
onem ex his. Et hui⁹ qdeȝ ſumme eſt lãbere ex myrra. ʒ. i.
cũ melle: facilitat enĩ anhelitum: ⁊ cõſumit humiditateȝ.
Hui⁹ etiã intentõis eſt ſtorax: ⁊ oppoponacũ: ⁊ ꝑprie cuȝ
ouis: aut melle: aut ſerapino factis ex eis pillul' cum aqua
rute: aut glutẽ albotin cũ melle: aut alkitran cũ melle: aut
ſulfur cum ouis ſorbilibus: aut arſenicum ſilr cum ouis:
aut cum grano pini ⁊ ſimilia.

¶ Ex euaporatõibus aũt ad tuſſim antiquã eſt arſenicũ:
citrinũ cũ ariſtologie rotũde partib⁹ eq̃libus. Cõfice cuȝ
butiro vaccino: ⁊ fac formas ſiles auellanis: ⁊ fiat ſuffumi
giũ ꝑ embrocũ in ieiunio. dr̃ enĩ qȯ ſtatim liberat.

¶ Uapor alius. ℞. arſenici citrini ſtercoris leporis: fari/
ne ordei: corticũ fiſtici. añ. fac formas cuȝ vitello oui: ⁊ ſuf
fumiget̃ cum eis tribus vicibus.

¶ Ali⁹. ℞. ariſtologie rotũde: ſtoracis: galbãi. añ. arſenici
ad põdus oĩuȝ. aggrega cũ butiro vaccino ⁊ vtere.

¶ Ali⁹. ℞. ſtoracis: myrre: thuris: ariſtologie. añ. arſenici
pondus oĩum. aggrega cũ butiro vaccino. Fiat ſuffumiga
tio omni die bis vel ter: ⁊ bibat ſuper ipſum aquã cum bu
tiro ouino. ¶ Plura huius itentõis ſcripta ſunt in capitu
lo de aſmate canone vltimo.

¶ Quintã reȝ ꝯplent adminiſtrationes medicaminũ ꝯfor/
tantium pectus ⁊ pulmonẽ: aut elargãtium: ⁊ ſi vigilie ad/
ſint: cũ ſedatõe tuſſis ſomnũ inducentiũ. ¶ Summa aũt
ſedantiũ tuſſiȝ cũ ꝯfortatiõe pectoris: ⁊ pulmonis ẽ hec.
rob: aut ſirup⁹ factus ex ſucco granoꝝ myrthi ꝯpletorum
eſt ad illud mirabil': ⁊ hoc in tuſſi calã. Sed ĩ frigida: qdẽ
cũ myrra: ⁊ croco modico: pl'monis ãt vl'pis ſicci iuuamẽ
ẽ ſublime ĩ calĩ ⁊ frida. In calã qdẽ aur. i. ex eo cũ ſyrupo
myrtino. In frida vero cum melle: ⁊ aqua calida. Huius
aũt intentionis eſt crocus cũ ſyrupo myrtino: aut cum ſy/
rupo de iſopo: ⁊ ſilr ſandaraca: cuȝ melle: ⁊ nux cipreſſi cũ
vino ⁊ melle: ⁊ grana pini ſunt ex rebus magnis ĩ hac par/
te. ex medicinis magnis aũt que ſedant tuſſiȝ: ⁊ pectus cõ
fortant ſunt tyriaca: ⁊ mitridatũ: ⁊ diamuſc⁹ dulcis ⁊ ama
rus: ⁊ athanaſia magna ⁊ parua: ⁊ diamarthe ẽ ꝯfectio mi
rabilis Rabit regis quã ſcribem⁹: ⁊ ſilia. ¶ Summa ãt
medicinaꝝ pect⁹ elargantiũ ſcripta eſt in caplõ de aſma/
te. ¶ Summa aũt medicinaꝝ tuſſim ſedantiũ: ⁊ corrigẽ/
tium ſupfluitates vigiliaꝝ dicet̃ qñ de medicis ſtupefaci
entibus ſermonẽ faciemus ſi deus voluerit. Afferant̃ ad
hunc locuȝ plura que ſcripta ſunt ĩ capitulo de aſmate hu
mido ſiue calõ ſiue frigido: ⁊ proprie medicina quaȝ ſcri/
pſit filius Zacharie.

¶ Filius Humaim. Modus decoctõis de capillis vene
ris ꝯferens tuſſi humide cũ calore. ℞. capilloꝝ veneris ĩ
vltime recentiũ. ℥. i iſopi ſicce: fabaꝝ excorticataꝝ: ſemĩs
fenicli: aniſi: ſeminũ lactucaꝝ: portulace: papaueris albi:
amigdalaꝝ dulciuȝ: ⁊ amaraꝝ: ordei excorticati. ana. ʒ. v.
ſemĩs melõis: cucurbite grãoꝝ myrti: añ. ʒ. iij. gũmi arabi
ci: añ. ʒ. ij. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ʒ. xv. dactilos pingues. v.
ficus ſiccas. v. iuiubas. xxx. decoquant̃ in aq̃ libr. iiij. vſq̃
ad li. i. ⁊ ſ. ⁊ da oĩ mãe. ℥. iij. cũ çuccaro roſato aut violato.
Et ſi volueris accipe ex hac decoctõe lib. ij. ⁊ cũ meibueg
⁊ çuccari. ℥. x. fiat ſyrupus. Doſis ei⁹ eſt. ℥. i.

¶ Fili⁹ Amarã. Sirup⁹ de iſopo ꝯferẽs tuſſi hũide cũ fri
ditate. ℞. iſopi ſicce. ʒ. v. capillorũ veneris: ligritie: añ. ʒ.
vi. corticũ radicũ apij: fenicli: ⁊ ſemis aniſi: añ. ʒ. v. folioꝝ
praſſij. ʒ. iij. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ℥. i. iuiubaꝝ. xx. yreos: fe
nugreci: ana. ʒ. ij. ⁊ ſ. ſemis malue: ⁊ biſmalue: ana. ʒ. ij. fic⁹
piguiũ. vi. numero: dactiloꝝ. v. folioꝝ calamẽti: aur. i. De/
coquant̃ in aq̃ lib. v. vſq̃ ad lib. i. ⁊ ſ. cũ melle: ⁊ meibueg
ana lib. ſ. Fiat ſyrupus. Doſis. ℥. i.

¶ Idem loch ꝯferens tuſſi: ⁊ egritudibus pectoris: ⁊ pul/
monis: ⁊ eſt exptũ. ℞. farine fabaꝝ: ligritie mũdate: thu/
ris maſculi: gũmi albotin: amigdalaꝝ dulciũ ⁊ amararũ:
añ. ʒ. x. ſemis fenicli: aniſi: croci: ſucci ligritie: dragagãti al
bi: ſemis citõioꝝ mundatoꝝ: papaueris albi añ. ʒ. vij. cala
mẽti: praſſij: ana. ʒ. x. opij. ʒ. iij. Tere ⁊ cerne: ⁊ adde eis pe/
nidie. ʒ. xxx. Deide cõfice cũ melle colato. ʒ. cl. ⁊ ꝯtunde ĩ
mortario. ⁊ ſit doſis. ʒ. ij. ĩ mane cum decoctione iſopi: ⁊ in
ſero teneat ex eo ſub ligua.

¶ Democbrytus. Modus ꝯfectõis ad tuſſim humidam
cũ friditate. Accipe calamenti fluuial'. ʒ. v. granorum pini
ʒ. vi. ſemis vrtice: ireos: ana aur. i. piperis nigri: ſemis lini:
añ. aur. ij. Cõfice cũ melle: ⁊ keſmes. Et ſit doſis ab aur. i.
vſq̃ ad. ij. cum decoctõe iſopi.

¶ Idem. Loch bonũ ⁊ expertũ ꝯferens ad ideȝ. ℞. mell'
boni. ℥. iiij. vitelloꝝ ouoꝝ recẽtiũ: ⁊ butiri: ana. ʒ. iij. Mel
⁊ butiꝝ decoquant̃ vſq̃ dũ habeant modicũ ſpiſſitudis.
deide dimittat̃ modicũ ĩfridari: ⁊ miſce cum eis vitella
ouorum commixtione bona: Deinde miſce piperis nigri
pulueriçati. ʒ. xij. ⁊ ſumatur ex eo lambendo mane: ⁊ ſero
eſt enĩ expertum.

¶ Paulus. Pillule q̃ tenẽtur ĩ ore ꝯferũt ad tuſſiȝ fridã
⁊ ſiccã: ⁊ ſunt expte. ℞. myrre: croci: granoꝝ pini: granorũ
coti excorticatoꝝ: fenicli: aniſi. amigdalaꝝ dulciũ: ⁊ ama
rarũ papaueris albi: ſucci ligritie: añ. Cõfice cũ penidiarũ
partib⁹. iij. ⁊ ſucco feniculi humidi.

¶ Hamech fili⁹ Zacharie. Cõfectio ꝯferẽs tuſſi antiq̃ ⁊
fride: ⁊ vẽtoſe. ℞. pẽidiarũ. ʒ. xx. praſſij: capilli veneris: iſo
pi: fenicli. aniſi: añ. aur. iiij. croci: calamẽti: çuccari. añ. aur.
ij. ſucci ligritie: pĩearũ purgataꝝ. ⁊ amigdalaꝝ dulciũ: añ.
℥. i. Cõfice cũ melle diſpumato q̃tum ſuffic. da. ʒ. iij.

¶ Hamech araſi. Syrup⁹ de praſſio ꝯfert tuſſi ỏ flegma
te groſſo: ⁊ vẽtoſitate. ℞. praſſij. ʒ. xl. ligritie: iſopi: calamẽ
capilli veneris: añ. ʒ. xx. radicũ feniculi: apij: añ. ʒ. x. amig
dalarũ mũdatarũ. pinearũ purgatarũ: fenugreci: ſemis fe
niculi: añ. ʒ. v. maſticis: darſeni: çinç. añ. ʒ. ij. paſſularũ enu
cleatarum. ʒ. c. iuiube: ſebeſten: ana. c. aque cale: lib. xxiiij.
Dimitte die ac nocte. deinde coque vſq̃ dum redeat ad
lib. x. Deinde adde mellis: ⁊ rob: ⁊ penidiarum: ana. lib. ij.
Deide ſuſpende in medicamie croci. ʒ. i. Doſis earum ab
℥. i. vſq̃ ad. ij.

¶ Idem. Loch cõferens vt ipſum. Accipe ligritie: amig
dalarum: dulcium ⁊ amararum. ſemis lini aſſi: ana. ℥. iiij.
ſemis feniculi: farie fabarum: ⁊ pinearum mundatarum:
ana. ʒ. iij. myrre croci: olibani: darſeni: ana. ʒ. i. ⁊ ſ. penidia/
ruȝ. ℥. ij. Confice cum rob. Et fiant forme ſimiles lupinis:
⁊ teneat ſub lingua.

¶ Sabor. Confectio Loch de alleis: que cõfert tuſſi fleg
matice: ⁊ maturat materiam eius bonum: ⁊ expertum. Ac
cipe alleorum mundatorum: lib. ſ. ⁊ elixa ea in aqua deco
ctionis cicerum: ⁊ yſopi ſicce vſq̃ dum ſint bene diſcocta
Deide colentur ⁊ terãtur allea ſicut medulla: ⁊ ꝑyce ſup
ea mellis ⁊ butiri: ana. ℥. vi. ⁊ decoquantur lento igne vſq̃
ad terminum loch: ⁊ vtere. bonum eſt.

¶ Idem. ℞. ſucci cauliũ. lib. v. lẽto igne coque auferẽdo
ſpumã ei⁹ vſq̃ dũ redeat ad lib. ij. Deide coquat̃ cũ rob: ⁊
mellis lib. i. vſq̃ dũ igroſſent̃. ⁊ bonuȝ eſt.

¶ Idem. Loch de ſqlla expertũ ⁊ efficax ĩ tuſſi humida:
educit enĩ ex pectore mãȝ eius. Recipe ſucci ſqlle: ⁊ mel
lis: ana. coquantur vſq̃ dum ingroſſentur.

¶ Idē. Cōfectio medicamīs ad tuſſiꝫ humidā cū friditate. ℞. ſpice: croci. ana. ʒ. i. iſopi ſicce. praſſij. aā. ʒ. iij. myrre: ireos. ʒ. ij. farine orobi: ⁊ fabaꝝ. aā. ʒ. vij. pipis. ʒ. i. ⁊. ſ. keſmes: ⁊ carniū dactiloꝝ: ficuū piguiū: ⁊ pineaꝝ mūdataꝝ. aā. ʒ. vi. Cōfice cū lohoc de caulib⁹. Uerꝫ ⁊ expertū.

¶ Cōfectio medicaminis ex īuentione nr̄a. Syrupus valens aſmati: ⁊ tuſſi: ⁊ maturat eas: ⁊ cōfert vlcerib⁹ renum ⁊ veſice: ⁊ eſt medicamē bonum. Accipe ficus albas: ⁊ pingues. l. numero: iuiubas. c. Decoque in aque lib. v. vſqꝫ ad iij. ⁊ cū ꝫ rob. lib. ſ. çuccari lib. i. Fiat ſirupus.

¶ Syrup⁹ alius. ℞. ficuū ſiccaꝝ pinguiū. ℥. ij. iſopi ſicce: capilloꝝ veneris. aā. ℥. i. rute: praſſij. ligritie. aā. ʒ. iij. radicū maratri: apij. aā. ʒ. v. aniſi. ſemis malue. aā. ʒ. ij. carniuꝫ iuiubaꝝ. ℥. ij. Fiat ſyrupus cū melle. ⁊ rob lib. i.

¶ Alexāder. Electuariū mūdificās pectus ⁊ pulmonē: ⁊ ꝯferēs tuſſi. Accipe granoꝝ pineaꝝ: amigdalaꝝ dulciuꝫ. aā. ʒ. x. dattiloꝝ pinguiū. ʒ. xv. piguedinis ficuū. ⁊ keſmes aā. ℥. i. dragagāti: albi ſemis fenicli. aā. ʒ. vi. ireos. ʒ. xv. Cōfice cū melle crudo. Doſis a. ʒ. ij. vſqꝫ ad aur. i.

¶ Alexāder. Ad tuſſiꝫ que ingetat in nocte: ⁊ nō ſinit dormire: ⁊ ad tuſſim catarralē. fiant pill'e ex ſtorace: myrra: ⁊ opio. aā. croci partis. i. quarta. Cōfice cū melle aut rob in forma ciceriꝫ. ⁊ da in ſero. ij. aut. iij. Aut ex myrra opio: ⁊ galbāo: ⁊ pauco croco. Aut ex ſtorace. ℥. i. galbāi: ſulfuris viui: opij: pipis: terbētine. aā. ℥. i. Aut ex ſtoracis ꝫinꝫ. opij: croci: galbāi: granoꝝ pini. aā. partib⁹ eq̄lib⁹. Cōfice ⁊ vtere. Iſta enī ſedant tuſſim antiquā ⁊ nociuam.

¶ Galien⁹. Medicamē qđ ponit Rabit rex: ⁊ dicit̄ ꝙ eſt tante v̄tutis ꝙ nullū aliud ei eq̄paret̄ ad ſedatiōeꝫ tuſſis. Eſt. n. mirabile. ℞. radicū oppopōaci. ℥. i. ⁊. ſ. ⁊ loco radicū opponaci ponat̄ oppoponaci. aur. v. caſtorei: ſemīs lini aſſi: ana. aur. iiij. ſemis lactuce. aur. v. folioꝝ rute ſiccorū: myrre. aā. aur. ij. ⁊. ſ. opij: croci. aā. aur. ij. ⁊. ſ. ꝯfice cū melle colato. Et da in ſero febricitātibus cuꝫ aqua calā: ⁊ non febricitātibus cū vino. Et ſit doſis eius ſicut magnitudo fabe. Eſt enim expertum ⁊ bonum.

¶ Galien⁹ ex libro decē tractatuū. Cōfectio pillulaꝝ: q̄ꝝ iuuamentū eſt vltimatū ad tuſſim antiquam humidam: aut catarralē. Accipe: caſtorei: myrre: maſticis: liquiritie: opij: galbani: aniſi: feniculi: enule: ⁊ in alio raſen: genciāe: iſoppi ſicce: ireos: dragagāti: gūmi arabici: ana: croci ptis. i. tertiā. Confice cū rob: da poſt menſes tres.

¶ Galienus ex codē libro. Confectio Lohoc: qđ expertus ſum ad tuſſim: ⁊ ad aſma ex materia groſſa difficilis eradicationis. Recipe liquiritie: ireos: ſtoracis liquide: fiſticorū mundatoꝝ: amigdalarū dulciū: ⁊ amararū: granoꝝ pini: ana: aur. iij. olibani: glutini albotin: gummi: dragagāti: agarici: cinamomi: ſeminis feniculi: ana. ʒ. ij. ⁊. ſ. aloes. myrre: ana: aur. ij. keſmes. ℥. i. Tere ⁊ ſicca: ⁊ pulueriça. Medulas vero cōtere cōtritōe vltima: aloe vero: ⁊ myrrā infunde in rob. circiter. ℥. ij. aut. iij. mellis colati ⁊ cere quātū ſufficit. Deinde diſſolue in eo ſtoraceꝫ. Confice cō tundendo in mortario cum ceteris. Et ſit doſis eius. a. ʒ. i. vſ qꝫ ad aur. i.

¶ Inquit Galienus. Faciebā hāc medicinaꝫ p̄cedere ſirupum alkemes: ⁊ iſopi: ⁊ decoctionē eorū ⁊ alia ex maturantibus: quorū forma ē apud te: ⁊ hoc tp̄e cōueniēti vt digeratur ⁊ maturetur materia.

¶ Galienus. Trociſci cognominati aſſemus: ⁊ ſunt trociſci ſtelle cōferunt huic tuſſi iuuamentū ſublime: ⁊ ꝓprie dati cum rob. Et ſit doſis a tertia. ʒ. vnius. vſqꝫ ad. ʒ. ſ. Et ſunt ex hominibus qui dāt cū aqua ordei.

¶ Humain. Cōfectio alba cui ē iuuamentū: ⁊ operatio vehemens ad tuſſim difficilē. ⁊ antiquā ex mataria groſſa: ⁊ viſcoſa: ⁊ aperit oppillatōes pectoris: ⁊ pulmōis: ⁊ mundificat ea: ⁊ clarificat vocē: ⁊ educit ſaniē ⁊ materias corruptas ex pectore ⁊ ꝯfert ptiſi. ℞. ſemis lini aſſi: paſſulaꝝ enucleataꝝ: aā. ℥. iiij. amigdalaꝝ dulciū: ⁊ amararū: granoꝝ pini: aā. ℥. ij. auellanarū aſſaꝝ: ireos: glutini albotin. aā. aur. ij. thuris maſcl'i. croci. myrre. aā. aur. i. Fac ex eis trociſcos cū lacte aſine: ⁊ dimitte ſiccari. Deiā tere: ⁊ ꝯfice cū melle: ⁊ ē doſis ei⁹. ʒ. i. mane ⁊ ſero teneat ſub ligua.

¶ Archigenes. Cōfectio que cognoſcitur mirabilis conferens cō virtute dei ad ſputū ſanguinis: ⁊ ad tuſſim cronicā ⁊ antiquā ex materia putrida ſanioſa ex vlcere: ⁊ ptiſi. Mūdificat. n. ⁊ abſtergit cū virtute dei a materia groſſa ⁊ putrida: ⁊ ſunt vſi hac medicina prudentes. Et cum ſit ex fortibus: nō ambigitur ſup ea: ⁊ cōfert p̄focationi matricis: ⁊ paraliſi: ⁊ veſice: ⁊ ꝯfert fluxui vētris ⁊ piodis febrium: ⁊ reſiſtit venenis: cuius pmixtio hec ē. Recipe caſtorei: piperis lōgi ⁊ nigri: ſtoracis: ſpice: coſti: galbani: opij: ana. ʒ. iiij. croci. ʒ. ij. Cōfice cū melle diſpumato q̄tū ſufficit. Doſis eius ē ſicut faba cū aqua mellis.

¶ De fluxu ſanguinis ab ore.

s Anguinis exitus ab ore eſt ſecundū vnū quatuor modoꝝ: aut. n. expuitur tm̄: ⁊ eſt ex parte oris: aut egredit̄ cū raſcatione: ⁊ eſt aut a colatorio: aut ab vuula: aut a palato: ⁊ partib⁹ eoꝝ. Et qn̄qꝫ egredit̄ cuꝫ vomitu: ⁊ ē aut a meri: aut a ſtōaco: aut ab epate: aut a finib⁹ eoꝝ. Et qn̄qꝫ cū tuſſi: ⁊ ē aut ex pectore: aut a pulmōe: aut a cāna: aut lacerto vocali: aut epigloti. Et quideꝫ qualiſcūqꝫ hoꝝ fuerit eſt ſm̄ vnū. iiij. modoꝝ. Aut enī eſt ſcđm ſemitā redūdationis ex aliquo ſic a venis: aut arterijs: ⁊ ꝓprie qn̄ accidit ebullitio in ſanguine aut agitatio: aut apate ſanguineo: cuius materia eſt facilis reſolutiōis. ¶ Secundus eſt ſecundum ſemitam redundationis: ſicut accidit pluribus a retentione mēſtruoꝝ: ⁊ cōſtrictione emoroidarum non ſcđm ſapientiam: ⁊ ſicut accidit pluribus ꝓpter exuberantiam ſanguinis in toto. ¶ Tertius vero ex ruptura vene: ⁊ apertione eius cū vulnere: aut ſine vulnere. ¶ Quartus ex vlcere ⁊ corroſione ſuper venā. Sanguinis aūt qui expuit̄: dicta cura eſt in capitulo de vulneribus ⁊ vlceribus oris: ⁊ partiū eius. Cum vero egreditur cum raſcatione cura dicta eſt in capitulo de fluxu ſanguinis narium: ⁊ in capitulo de vlceribus vuule ⁊ palati: ⁊ in capitulo de alcola. Et ꝯferunt eis gargariçatiōes ex reb⁹ ſtipticis: ⁊ ſi n̄ tollit̄ flebotomet̄ ex cephalica flebotomia ſubtili vice poſt vicē. Et fiant alia que ſunt dcā ibi. Egreſſionis aūt ſanguīs cū vomitu cura eſt tres res. ¶ Prima eſt rectificatio membri: a quo eſt paſſio. ¶ Secunda eſt: vt fiat diuerſio: ⁊ hoc fit cum ſubtractione ſanguinis ex vena ſeruiente illi membro: ⁊ cum applicatione ventoſarum ſuper ipſo ⁊ ſimilibus. Et ſi eſt a corpore toto ꝓpter exuberantiam ſanguinis in ipſo: fiant flebotomie cuꝫ iteratione ex baſilica: nunc dextra: nunc ſiniſtra. Et quandoqꝫ ex ſaphenis. ⁊ hoc q̄dem differenter. Nam ſi ſolum in q̄ntitate exuberat flebotomia larga neceſſaria eſt vel mediocris largitatis. Si autem acuitas: ⁊ īflammatio ſit in ſanguine: cum ſubtilitate ⁊ ebullitiōe ſubtili flebotomia vtendum eſt. ¶ Tertia eſt adminiſtratio rerum conglutinantium ⁊ conſolidantium: ſicut competit ex his que dicemus. Nunc vero eorum que compingunt: ⁊ ingroſſant ſanguinem ex his que dicemus. Sanguinis autem egreſſio cum tuſſi eſt ex pectore aut pulmone: ⁊ eius cura eſt praua. Dixit enim Hyppocrates. Screatum ſanguinis ex pectore aut pulmone. ſi concomitatur ſputuꝫ putredinis ⁊ poſt illud ptiſis: ⁊ poſt illaꝫ deſperatio ⁊ mors. Uerꝫ qđ eſt ex pectore eſt minus ſuſpectum eo qđ eſt ex pulmone. Raro q̄dem ſolutio continuitatis in pulmone ſanatur: ⁊ illud eſt propter quinqꝫ res. ¶ Et prima quidem res eſt quoniam motio reſiſtit ꝯſolidatōi: imo addit ad ipſam: et dilatat eā. Et noſti ꝙ pulmo in ſil'itudinē folliū fornacis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0215-3

dilatatur ⁊ conſtringitur cõtinue ob cauſam vi͛e. ¶ Se-
cunda vero eſt. quia ſanies in ſpongioſo membro diu reti-
net̃: ⁊ diu retenta magis acuit̃: ⁊ magis acuta ꝓfundat vl
cera. ¶ Tertia eſt. qm̃ ſolutio ↄtinuitatis cadẽs ĩ pulmo-
ne dilatat ipm̃. ⁊ retardat officiũ ei⁹ qḋ diximus: quare fu-
mi caſi difficulter egrediunt̃: ĩmo cumulant̃ in ſol'onis lo
co: ⁊ iflammant̃: ⁊ addũt ad ſolutõez: ⁊ diſpſi p corp⁹ ſunt
cã deſiccationis mẽbroꝝ: ⁊ febris ethice. ¶ Quarta eſt.
qm̃ pulmõis caro multe paſſibilitatis eſt: ⁊ teneritatis ci-
to ſubiecta putrefactioni: ⁊ illud iõ quoniã nutrimentuꝫ
eius eſt ex ſanguine ſubtili ⁊ acuto: ⁊ eſt ipm̃ receptaculuꝫ
flegmatis: q̃re cito fit in eo repugnatio ↄtrarietatis ĩ alte-
rum. ⁊ ex hoc cito accidit putrefactio: ⁊ corruptio. ¶ Qui
ta eſt ſubſiſtẽtia eius catarris paulatim vulnerantibus ⁊
vlcerantib⁹. Ex his aũt pꝫ: ꝙ ex pulmone ſanguis excrea
tio: aut in eo ↄtinuitatis ẽ ſol'o ſuſpectior. Et qdeꝫ Hyp. di
xit ſanguis ſcreat⁹ ex ꝓfundo q̃liſcũqꝫ aſcẽdens ſuſpect⁹
eſt: a ſupiorib⁹ aũt fluens non eſt ſuſpectus.

¶ Egreſſiõis ãt ſanguis ex pectore aut pulmõe: cura ẽ ẜꝫ
duas itentões. vꝫ. v̾l. ⁊ pticularẽ. Ul'is ãt itẽtio eſt q̃tuor
res. Prima eſt ſanguis adeq̃tio. Scõa ẽ diuerſio. Tertia
ẽ mũdificatio. Quarta eſt accñtiũ correctio.

¶ Primã igit̃ rem ↄplent correctiones cadẽtes in exube
rantia in q̃litate ⁊ q̃titate ſanguinis: aut in vtriſqꝫ. Et q̃ti
tate qdeꝫ cũ diminutõe cibi ⁊ potus: ⁊ dimiſſione vini. Et
ſi excuſari nõ potes: ſit multe pmixtionis cũ aq̃. ⁊ ſit vinũ
ſtipticũ. Et dimittat dulcia: ⁊ pulmẽta ex lacte: ⁊ frumẽto
⁊ tritico: ⁊ vitet oĩa gñal'r: que dilatant ⁊ multiplicãt ſan-
guinẽ ex his que comedunt̃ ⁊ bibunt̃. Et abhorreat geris
ſupfluitatẽ multiplicãtẽ mãs ſomni: ⁊ ꝓpe ſub radys ſol'
⁊ lune: ⁊ abhorreat laborẽ in horis vehemẽtis caloris: ⁊ la
borẽ agitatiuũ: ⁊ clamorẽ ⁊ irã: ⁊ portatões ponderꝝ: ⁊ coi-
tus ſupfluitatẽ: ⁊ frequẽtationes balnei dulcis: ⁊ ſil'ia. Et
ſit ↄtent⁹ ſorbitõib⁹ fcis ex ſauic ordei ⁊ riço: ⁊ milio: ⁊ cõ-
cedit̃ caſeus recẽs. ⁊ lac ex quo extractũ ſit butirum: ⁊ fru
ctus ſtiptici. Et ex olerib⁹ portulaca: ⁊ lactuca: ⁊ endiuia: ⁊
atriplices: ⁊ cucurbite: ⁊ citrulli. Et ex carnib⁹ perdicum:
turdoꝝ: ⁊ minutaꝝ auiũ minus pinguiũ: leporis: ⁊ ſimiliũ
decocte cũ fructib⁹ ſtipticis: ⁊ ſuccis eoꝝ. Et ex granis co-
medãt lẽtes excorticatas ⁊ mes: ⁊ ſauic ordei: ⁊ riçũ: ⁊ mi-
liũ: ⁊ geguers: ⁊ farinaꝫ fabaꝝ. Ex piſcibus piſces degẽtes
ĩ locis petroſis: ⁊ cãcros aquaꝝ dulciũ coctos ĩ lacte ſine
butiro: ⁊ aqua ordei: ⁊ q̃ hoc curſu ꝓcedunt. Bibãt autem
aquam roſatã. aut decoctionis roſaꝝ: ⁊ aquaꝫ de minera
ferri: aut aquã in qua extiguit̃ ferrũ cuꝫ rob myrtino. aut
aquam ordei. decoctionis cancroꝝ aque dulcis ⁊ ſimilia.

¶ Si aũt peccatũ ſit ex parte acuitatis ſanguis: ⁊ ebulli-
tionis: ſedamus id cum rebus extinguentibus inflamma
tionem: ⁊ ingroſſantib⁹ ſanguinem. Sicut ſunt ꝓpe cibi ⁊
potus frigidi: ⁊ ꝓpe ſtiptici: ⁊ extinctiui iflammationum:
ſic̃ cibi ↄgelati ex lentibus cum ſuccis aliquibus ſtipticis:
aut ex cucurbita: aut citrullis: ⁊ portulaca eſt ex rebus mi
rabilibus ad illõ. Sedat. n. iflammatõeꝫ: ⁊ ſtringit ſangui
nem: ⁊ ↄcedunt̃ eis cibi pauce acetoſitatis: ſic̃ çeroſkie: ⁊
ſumakie: ⁊ cucurbita cũ granatis acrib⁹ ⁊ dulcib⁹: aut mu-
çis tritis cũ granis ſuis: ⁊ carnes pulloꝝ: ⁊ paruaꝝ auiũ cũ
ſuccis ſtipticis. ⁊ ↄgelatũ ex eis. Et ↄfert eis iuuamẽtũ ma
gnum adminiſtratio pſily aſſi ↄquaſſati in aqua roſata cũ
coriãdro aſſo: ſil'r ãt ſemẽ portulace cuꝫ aqua roſaꝝ: ⁊ hoc
in matutinis. Hec eniꝫ igroſſant: ⁊ ipinguant ſanguinem.
Hui⁹ ẽt itentõis eſt lac acetoſuꝫ extracto butiro ex eo: ⁊ ſi
extiguat̃ in eo ferꝝ magnificat̃ ei⁹ opatio: ⁊ caſeus recẽs
eſt bonus eis: ⁊ laudant̃ eis iuiube: ⁊ aq̃ decoctiõis caruꝫ:
⁊ fructus ſtiptici: ⁊ ſucci eoꝝ: ⁊ ſil'ia. Et ex rebus ẽt ſangui
nis iflammationeꝫ ⁊ acuitatẽ ſedantib⁹ ſunt emplaſtrati-
ones: ⁊ epithymata circa epar ⁊ cor exreb⁹: ⁊ ſuccis frigi-
dis: ⁊ ſtipticis. ⁊ appõnes aque veri frigoris cum aliquib⁹
eoꝝ circa ipſa: ⁊ ſedere in aq̃ frigida: ⁊ ſil'ia: que diximᵘ in
capl'o de fluxu ſanguinis ex naribus. ¶ Si ãt peccatũ in
q̃titate ſanguinis ſimul ⁊ qualitate fuerit tunc noſtra oc
cupatio erit circa vtrunqꝫ.

¶ Scđam rem ↄplent adminiſtrationes flebotomie cũ
iteratõibus. ſi opꝫ ex vena baſilica: nũc dextri: nũc ſiniſtri
brachy mediocris apertõis: ſi ſolũ in q̃titate ſanguis exu
berat: aut ſubtil' aptiõis ſi ſubtilitas ⁊ acuitas dominant̃
in ſanguĩe. Et qñqꝫ ↄuertimus ſanguinẽ ad lõginquaꝫ di-
uerſitatẽ: ſic̃ ad ptes iferiores: ⁊ hoc cũ flebotomia ſaphe
ne: ⁊ vẽtoſatõe cruriũ: ⁊ ſcarificatõe ĩ ipſis. Et qñqꝫ exigit
diſpõ emorroidaꝝ aut mẽſtruoꝝ ꝓuocatõeꝫ: ⁊ facimᵘ id.
Et ↄferũt vẽtoſatões in hypocõdrys ſine ſcarificatione.

¶ Et dixit Ruffus: qñqꝫ accidit mulieri. vt ſpueret ſan-
guinem poſtq̃ꝫ lac delituit in mãmillis eius: ⁊ reſtrictus
eſt ꝓuocato lacte: ⁊ accidit ei illud tertio: ⁊ curata eſt poſt
exuberantiam lactis.

¶ Tertiã aũt rẽ ↄplent admiſtratiões medicaminũ ſan-
guinẽ mũdificantiũ. ⁊ ſiqdeꝫ fuerit acuitas: ⁊ inflãmatio:
⁊ ebullitio ĩ eo ꝓpter pmixtionẽ colere acute in ipſo: oꝫ q⁹
euacuet̃ colera pꝰus. deide flebotomet̃. Hoc. n. eſt ſcđꝫ ca
nonẽ artis: demũ ſequat̃ ĩfrigidatio: ⁊ ſi opꝫ vltima ĩfrigi
datõe. Colera aũt euacuabit̃ cum aq̃ fructuũ facta ex eo:
qḋ mulget̃ ex ſemibus portulace pꝰus aſſis. Et ĩ reubarba
ro eſt v̾tus mirabilis ĩ hac parte. Euacuat. n. colerã: ⁊ ſtri-
git de ꝓꝓetate ſanguinẽ: ⁊ ꝓpe cuꝫ ucco ligne arietis: aut
cuꝫ aqua q̃ mulget̃ ex ſeminib⁹ portulace. Si aũt flegma
abũdat cũ ſanguĩe faciẽs exuberare ipm̃ euacuet̃ flegma
cũ eis q̃ ſcis. Deide flebotoma. Et ex eis ẽt que mũdificãt
ſanguinem ſil': ⁊ diuertũt motũ eius: ⁊ ĩclinãt ĩferius ſunt
adminiſtratões cliſterioꝝ debiliũ. ⁊ ſi opꝫ hñtiũ acuitatẽ
ex his q̃ ſcis niſi timueris agitatões fieri ĩ ipſo: ⁊ ꝓpe apõ
ebullitõeꝫ eius. Tũc aũt oꝫ blãdiri cũ cliſterib⁹ debilib⁹
Hec eſt eni operatio ſcđm ſapientiam.

¶ Quartã reꝫ ↄplẽt nũc abſtinentia ⁊ ceſſatio a reb⁹ mo-
uẽtibus ⁊ agitantib⁹ ſanguineꝫ. Nunc aũt ꝓuentio: ⁊ pſer-
uatio a fluxu eius: ⁊ ꝓpe in expoſito ad illud. Nunc vero
remotio nocumẽti faciẽtis cadere ĩ illud. Res aũt mouẽ-
tes ⁊ agitantes ſanguinẽ ſunt cibi acuti: ⁊ medicĩe acute: ⁊
labor vehemẽs: ⁊ ebrietas ml'ta: ⁊ rixe ⁊ vociferationes: ⁊
caſus: ⁊ pcuſſio ⁊ his ſil'ia. Expoſiti ãt ad ſputuꝫ ſanguinis
ſunt hñtes pect⁹ ſtrictum: ⁊ nudũ: ⁊ humeros ſic̃ curuatu
re alaꝝ: ⁊ collum ſubtile: ⁊ longũ. ⁊ depreſſum iter alas: ⁊
humeros: ⁊ frequẽtat eis tuſſicula cũ punctura iterdum:
nũc apõ dextrã: nũc apud ſiniſtrã ſpatulã: nũc apõ aliquã
mamillaꝝ. Hos ãt ꝓueniemus ne cadãt in illud cũ flebo
tomia ex baſilica. ⁊ iclinatõe ſanguis ad ĩferiora cũ flebo
tomia ſaphene: ⁊ põne vẽtoſaꝝ: ⁊ ꝓuocatõe emorroidaꝝ:
aut mẽſtruoꝝ: ⁊ fricatõe facta ĩ extremitatib⁹. ⁊ correcti-
one ĩ ſex gñibus reꝝ ſicut ſcis. Et hec oĩa maxime obſer-
uanda ſunt ꝓprie in ꝑncipio veris: ⁊ ĩ toto vere. Eſt enim
tempus exuberare faciẽs ſanguinem.

¶ Nocumẽta aũt facientia cadere in ſputũ ſanguis ſunt
ſic̃ catarrus acut⁹ tuſſis vehemẽs: apa pleureticũ: aut peri
pleumonicũ: aut epaticuꝫ: ⁊ ex his eſt retẽtio mẽſtruoꝝ: ⁊
ↄſtrictio emorroidaꝝ ↄſuetaꝝ fluere. Et qdem iaꝫ catar-
ri curã ſcripſim⁹: ⁊ tuſſis. Et ĩ pleureſi ſiqdem: ⁊ peripleu-
monia ſanguineis apparens ſputũ eſt ſignũ laudabile. re
ſudat. n. ex apate aliqd poſt aliqd ex eo ꝙ mã eius eſt reſo
lubilis nõ ꝓhibita ꝓpter adherentiã aut ↄpactioneꝫ. In
apate aũt epatico eſt ei⁹ apparitio aliqñ cã ad malũ. ⁊ ꝓpe
cũ apa eſt magnũ exuberãs. Et qñqꝫ eſt ſignũ boni: ⁊ ꝓpe
apõ reſol'oneꝫ ipius. Emorroidaꝝ aũt aut menſtruoꝝ cõ-
ſtrictio nõ ſcđm ſapientiaꝫ ſi faciat cadere in illud: aut ſi
ſit ſuſpectio de illo: tũc eoꝝ ꝓuocatio excuſat a ſuſceptõe

vel ſuſpitiōe ſicut Gal. ſuper vbis Hyppo. dixit. Jngt eniꝫ
cronicus emoꝛoidaꝝ fluxus totaliter conſtrictus ⁊ ſubi/
to cadere facit in hydropiſim: aut maniam: aut ſanguinis
ſcreatum ⁊ ptiſim.
¶ Particularis aūt ītentio habet q̄tuoꝛ modos. Prim⁹
cogit vertere ītentionē noſtram ad curationē ſcreat⁹ ſan
guis: qui cōtingit ꝓpter reſudationem ipſi⁹. Et ſiquidem
fuerit ab a̅pate ſanguineo cui⁹ mā ponit̄ in reſolōne alicu
ius caſus poſt aliquid curari non indiget: eſt enim ſignifi/
catio ſalutis. ¶ Si autem fuerit ſ̄m ſemitam reſudatio/
nis ex venis pulmonis: aut arterys: vel ēt pectoꝛis ꝓpter
agitationem ⁊ ebullitionē cadentē in ſanguīe dabim⁹ me
dicamina ſanguis feruoꝛē repꝛimentia: ⁊ ipꝫ cōpingētia.
Et huius op̄ationē facientiū ſūma hec eſt: poꝛtulaca ꝓ/
prie cōmaſticata frequēter ⁊ paꝝ poſt paꝝ deglutitus ei⁹
ſucc⁹ potenter ſtringit ſanguinē: ⁊ ſedat ebullitionē eius:
⁊ cōpingit ipm̄. Et ſil'r ſemen eius aſſuꝫ ⁊ tota planta ipſi/
us: ēt ſ̄m oēm modum admiſtratōis ei⁹. Et ſil'r album pa
pauer aſſum. Juiube aūt ſunt hui⁹ ītentōis: ſcd̄m omnem
modum admiſtratiōis eaꝝ. Jn mucillagine aūt pſily cuꝫ
lapide ematithe diligenter loto ⁊ cōtrito cōtritione vltia
īeſt virtus mirabilis: ⁊ ſil'r in coꝛiandro. Et ſil'r in lapide
ematithe cū ſucco arnogloſſe. Pſiliuꝫ aūt aſſum ⁊ ꝯquaſ/
ſatum cū aqua expreſſionis poꝛtulace: aut ſemis ei⁹. vſq3
dum fiat mucillaginoſum: eſt ad id mirabile. Et ſil'r ſemē
iuſquiami cū ſucco arnogloſſe. Hui⁹ etiā eſt ītentiōis lac
coctum cū lapidibus fluuialib⁹ aut cū ferro ignito. Pri⁹
extracto butiro ex eo. Et ſil'r lac acetoſum extracto ex eo
butiro: ⁊ caſeus recens ſil'r. Lutum aūt aſſemē ⁊ lutuꝫ ar/
menū ⁊ ſigillatū ſunt ex medicis veris ad illud: ⁊ ꝓpe cū
ſucco plātaginis. Jſta.n. cum v̄tute infrigidatōis ⁊ cōglu/
tinatiōis: ⁊ ex eis cōpoſita ſunt vltima ad id: ⁊ q̄cunq3 ſūt
hui⁹ ītentiōis. Et laudat̄ eis aq̄ ferri: ⁊ aqua pluuialis cuꝫ
gūmi arabico aſſo: aut dragagāto. Et laudat̄ eis ēt aqua
oꝛdei: ⁊ ꝓprie aſſi cum cancris fluuialibus aut ſpodio: ⁊ ſi/
milibus. Et q̄ñq3 exigit neceſſitas apud vehementem agi
tationem: ⁊ vigilias vt cū eis aliqua ex narcoticis tribua/
mus ⁊ tunc facimus id cum cautela.
¶ Scd̄s modus docet vertere ītentionē noſtrā ad cura/
tioneꝫ ei⁹ ſcreat⁹ ſanguis: q̄ fit ſ̄ꝫ ſemitā redūdatōis: ⁊ h⁹
curā iā diximus: q̄ñ mōs diuertēdi fluxū ſāguis docuim⁹.
¶ Tertius modus qui eſt ad curandum apertionem aut
rupturam vene cum vulnere: aut ſine vulnere indiget
admiſtratione medicaminū ſtipticoꝝ: ⁊ conſolidatiuoꝝ.
Et hoc quidē facientiū ſūma hec eſt: ſanguis draconis ꝓ/
prie ⁊ carabe: ⁊ bolus ⁊ lutū ſigillatū: ⁊ balauſtie: ⁊ roſe: ⁊
coꝛnu ceruinū aduſtū. ⁊ coꝛalli aduſti: ⁊ kachie: ⁊ hyppog/
ſtidos: ⁊ coꝛtices ⁊ floꝛes granatoꝝ: ⁊ emathites: ⁊ gūmi
aſſum: ⁊ mumia ⁊ reubarbaꝝ ꝓprie aſſum: ⁊ coꝛtices thu
ris ⁊ coꝛtices: maſticis: ⁊ coagulū lepoꝛis: ⁊ coꝛiandrū: ⁊ ſe
men lingue arietis: ⁊ capita ⁊ virgulta roſarum: ⁊ fructus:
⁊ folia myrthi: ⁊ ſpodiū: ⁊ coꝛtices cancroꝝ vſtoꝝ: ⁊ ſil'ia.
Fundamentū aūt ⁊ medicia cū q̄bus hec miſcenda: ⁊ pro
pinanda ſunt: vel aliq̄ eoꝝ: hec ſunt ſucc⁹ ꝓprie plātagis:
⁊ ſuccus albutſandani: ⁊ ſucc⁹ poꝛtulace: ⁊ ſucc⁹ albedaro
gi ⁊ aqua al ſauic: ⁊ aqua pluuialis ī̄fuſiōis gūmi aſſi: ⁊ aq̄
roſata: ⁊ ſuccus citonioꝝ: ⁊ miua: ⁊ ſucc⁹ granoꝝ myrthi: ⁊
ſirupus ex eis: ⁊ mucillago pſily: ⁊ ſemē citonioꝝ: ⁊ aq̄ ſu/
mac: ⁊ ſil'ia. Medicinas āt cōpoſitas ſcribem⁹ poſt: ſi de⁹
voluerit. de quarū ſūma eſt çuccaꝝ roſatū ꝓpe: eſt.n. me/
dicamē eis benedictū: ⁊ miua: ⁊ ſirup⁹ de roſis ſiccis: ⁊ ſi/
rupus de iuiubis: ⁊ ſirupus myrthin⁹: ⁊ ſirupus de pomis
ſtipticis ⁊ trociſci de charabe: ⁊ trociſci de terra ſigillata:
quorum memoꝛiam fecimus in antidotario.
¶ Medicamina aūt q̄ admiſtrant̄ emplaſtrādo aut lini
endo extra. Sūma hec eſt. Oleū roſatū cum maſtice aut
oleum myrtinū: ⁊ ex eis eſt oleū de citonys: ⁊ oleū nardi/
num: ⁊ ſucc⁹ coꝛiādri hūidi cū ſauich: aut farina oꝛdei: aut
cū ſandalis: aut ſpodio ⁊ roſis: cū modico camphoꝛe. Hec
.n. ēplaſtra cōferūt. Uel accipe acatie: hyppogſtidos: fa/
rine ſauich: ⁊ farine oꝛobi. añ. Cōfice cū albumīe oui: ⁊ ſu/
perpōe. Uel accipe pl'uerē thuris ſubtiliſſimū ⁊ admiſtra
cū albumīe oui. Et quidē de reb⁹ melioꝛibus in hac par/
te eſt ſubtiliter inquirere ad inueſtigandum locum vehe
mentie doloꝛis. Jllic enim emplaſtrationes: ⁊ linimenta
vtiliſſima ponentur.
¶ Quartus aūt mod⁹ docet abſcīdere cauſas vlceratio/
nū: ⁊ coꝛroſionū cadētiū ī ptes pectoꝛis: ⁊ pulmōis ⁊ ꝓpe
pulmonis ſ̄ꝫ plurimū. hoc eni eſt id q̄d ē ſuſpectū: ⁊ tumo
roſum maxime. ⁊ h⁹ q̄dem curationē ſcribemus in capl'o
de ptiſi: ſi deus voluerit: ⁊ p̄miſerit curari huiuſmōi.
¶ Sa. ſi accidit ſputū ſāguis a catarro tūc erit ꝯſideratio
nr̄a: vtꝝ ſit acut⁹: aut nō acut⁹. Et ſi fuerit q̄dē acut⁹. ⁊ co
lericus: aut ſalſuginoſus: ſedabim⁹ ipetū acuitatis ei⁹ p̄us
cū regimīe bono diſtincto in capl'o de catarro. Poſtq̄ āt
vehemētia acuitatis ſedata fuerit ſoluat̄ nā cuꝫ eo q̄d eſt
ſicut īfuſio mirobalanoꝝ: ⁊ ſil'ia. Et ſi fuerit ſalſuginoſus
cū eo q̄d ē ſic pillule cochie. Deide ꝑcipim⁹ cū flobotoma
ri de vena cephalica flobotomia ſubtili: ⁊ ſi oꝫ cū iteratōe
⁊ fricam⁹ extremitates ei⁹ vice poſt vicē ⁊ trahimus ma/
terias ei⁹ a capite cū cliſterib⁹ acutis: ⁊ ſi oꝫ foꝛtis acuita/
tis: ⁊ cū pōne ventoſaꝝ in cruribus: ⁊ ſup emoꝛoidas poſt
apertionē eaꝝ cū flobotomo. Et ꝯfert eis poſt illud admi
ſtratio aq̄ oꝛdei cū cācris fluuialib⁹: ⁊ ſirup⁹ de papauere.
Et ſi īdiget medicamīe foꝛtioꝛi: dentur trociſci alſcēdene:
quoꝝ rememoꝛabimur poſt. Et foꝛti⁹ eſt ex eis trociſci de
charabe: ⁊ ꝓprie cū ſirupo de papauere: aut ſirupo myrti/
no: aut rob eius. Et ſi res fuerit p̄uatioꝛ nō ē excuſatio ad/
miſtratōis medicinaꝝ foꝛtiū: ſicut tiriace ꝓprie: ⁊ mitri/
dati: ⁊ athanaſie: ⁊ trociſci ſtelle: ⁊ ſil'iū. Et iā q̄dem mulie
ri cuidā: ⁊ plurib⁹ poſt illā cui acciderat ſputū ſanguis ex
catarro cōmenſurauim⁹ regimia: q̄ iā diximus: ⁊ īſtituim⁹
poſt illa: vt poneremus ſup caput eius: ⁊ ꝓpe ī pte çuendeg
medicamen ex fimo colūbino poſtq̄ egreſſa eſt balneū: ⁊
adiunximus: ⁊ dedim⁹ ſibi tiriacā recentē āni ſui vt faceret
eā doꝛmire: ⁊ in craſtinū īiunximus fricari extrema ipſi⁹
⁊ cōſtringi īſtitis: ⁊ admiſtrari ex tiriaca recēti q̄ntitatē mi
noꝛem: ⁊ minuim⁹ quotidie q̄ntitatē eius dōec deuenim⁹
ad admiſtrationē ſolius mellis: vt mūdificet̄ pulmo ſuf/
ficienter: ⁊ nō receſſim⁹ ab admiſtratōe alicui⁹ ex rubifi/
cantib⁹ ſuper ptem q̄ dicit̄ çuendeg: ⁊ ab aſſiduitate frica
tionis extremitatū: donec diuerteret̄ catarrus: ⁊ remāſit
nobis poſt hec ſola vna neceſſitas. ſ. vt deide cōſolidaret̄
vuln⁹: ⁊ dedim⁹ ei filoniū perſicū: ⁊ iterdū trociſcos de lu
to ſigillato cū çuccaro roſato ⁊ q̄ñq3 çuccaꝝ roſatū ſolū ī
q̄ntitate m'lta: ⁊ fecim⁹ īterpolatiōes ī admiſtratōe ipſoꝝ
et viciſſitudies: ⁊ q̄ñ ex eoꝛum vſu ſtringebat̄ anhelitus:
cōuertebamus ſtudiū noſtrū ad admiſtrandū res q̄ dila/
tant ipm̄: ⁊ educunt ſaniem ſicut ꝓprie decoctōes yſopi ⁊
ſimilia: ⁊ cum elargabat̄ anhelit⁹ tunc reuertebamur ad
filonium ⁊ trociſcum ⁊ çuccarum roſatum. cū hac viciſſi/
tudine ⁊ ſanata eſt. Et nō eſt mō cōꝑhenſibilis nūer⁹ co/
rum qui ſanati ſunt ſecundum doctrinam hanc.
¶ Filius Zeçar. Cōfectio trociſcoꝝ ꝯferētiū tuſſi: ⁊ ſpu/
to ſanguis. ℞. gūmi arabici: boli armeni. añ. ʒ. x. ſemis poꝛ
tulace. ʒ. viij. ſpody: folioꝝ roſaꝝ: ⁊ ſemis caꝝ. añ. ʒ. ij. dra
gaganti: amili. añ. ʒ. v. Fac trociſcos cuꝫ ſucco lingue arie/
tis: ⁊ da cum eodem ſucco.
¶ Jdē. Cōfectio trociſcoꝝ de papauere cōferentiū ſcrea
tui ſanguis: ⁊ tuſſi cū febꝛe: ⁊ doloꝛi pectoꝛis. ſi de⁹ volue/
rit. Accipe roſarum: gūmi arabici. añ. ʒ. iiij. amili: papaue/
ris: dragagāti: ſucci ligritie. añ. ʒ. ij. ſpody. croci. añ. ʒ. ß. Cō/

fice cū triplicato melle: aut rob: ⁊ da cū tereniabī: ⁊ aq̄.

¶ Idē. Cōfectio trociſcoꝝ emantithicoꝝ exptoꝝ ⁊ iuuamentoꝝ ad ſcreatū ⁊ ſputū ſanguīs: ⁊ manatōez eiꝰ vndecūq;. ℞. corticū cancroꝝ fluuialiū aſſoꝝ. ℥. xvi. coriādri aſſi. ℥. vij. ſemis papaueris. ℥. xv. boli armēi: ⁊ terre ſigillate. aā. ℥. vi. ſemis portulace: folioꝝ roſaꝝ cū capitibꝰ ſuis: gūmi arabici: dragaganti. aā. ℥. v. lapidis ematithis loti. ℥. iiij. euſiſtidos: acatie: cornu cerui aduſti: karabe: balauſtie ſemis myrti. aā. ℥. iiij. cōculaꝝ incenſaꝝ. ℥. ij. margaritaꝝ nō perforataꝝ. ℥. i. Fac trociſcos cū ſucco lingue arietis. Ex rebus mirabilꝰ iuuamēti ſūt trociſci de terra ſigillata: ⁊ trociſci de charabe dicti in antidotario.

¶ Diaſcorides. Portulaca ſanguis ſputum ſedat ex pulmone: ⁊ ꝓpe maſticata ⁊ frequēs ſucci ipſiꝰ deglutitio: et ſilr ſemē eius. Sedenegi aūt ē ad illud mirabilꝰ: ⁊ ꝓpe lotus: ⁊ admiſtratus cū ſucco portulace: aut arnogloſſe. Et ſilr coagulū leporis cū eiſdē ſuccis ſtipticis. Et iā expertum eſt: q̄ ſeminū arnogloſſe: granoꝝ myrti: ⁊ capitū roſarum cū folijs ſuis. aā. ℥. i. ⁊ ʒ. admiſtrata cū ſucco arnogloſſe. ſunt ad illud medicamē vltimū. Et in ſemīe iuſq̄ami ē operatio bona: ⁊ hoc qñ egritudo eſt praua: ⁊ ꝓprie cū aq̄ mellis: ⁊ in mumia ſilr eſt opatio pfecta: ⁊ ꝓprie in ſputo ſanguīs ex percuſſione: aut caſu: ⁊ ſit potio ipſius kirat. i. ⁊ proprie cum vino ſtiptico.

¶ Andromacus. Cōfectio trociſcoꝝ ad ſputū ſanguīs: et ſcreatuꝫ eius. ℞. acatie. ℥. iiij. roſaꝝ: balauſtie. aā. ℥. vi. gūmi arabici. ℥. ij. dragagāti. ℥. i. Cōfice cū aqua pluuiali. Doſis. ℥. i. cū aqua frigida: ⁊ eſt expertum.

¶ Paulus. Cōfectio trociſcoꝝ reſtringentiū ſcreatū ſanguinis: ēt ſi ſit antiquꝰ: ⁊ ſedantiū agitatōes. ⁊ inducētiuꝫ ſomnū. ℞. acatie: ſcēdene. lote: ipoquiſtidos: balauſtie: florum mali granati. aā. ℥. v. gallarum. ℥. i. ⁊ ʒ. opij: croci. ana. ℥. ij. Fac trociſcos cum aqua pluuiali. Doſis aure. ʒ. cum aqua frigida.

¶ Filiꝰ Zacharie araſi. Confectio trociſcoꝝ ſcedene. cōferentiū ſputo ſanguīs: ⁊ eiꝰ manatiōi vndecūq;: ⁊ ſunt expti. ℞. thuris. ſāguis dracōis: balauſtie. aā. ℥. ij. ⁊ tertiā alterius. charabe. ℥. v. ſcēdene. terre ſigillate. aā. ℥. iiij. aluminis. ℥. ij. ⁊ ʒ. opij: cinamomi. aā. ℥. ij. iuſquiami. ℥. i. ⁊ ʒ. Fiāt ex eis trociſci. iiij. Et ſit doſis. i. cuꝫ albedarogi: aut aqua portulace: aut lingue arietis.

¶ Idem. Cōfectio epithymatis q̄ linit̄ pectꝰ: ⁊ ſedat dolorem: ⁊ reſtringit ſanguinē: ⁊ ꝯſolidat: ⁊ linit̄ ſup ſtōacuꝫ apud vomitū ſanguis ⁊ veſicā: ⁊ ſuper renes apud micturam ſanguis ⁊ peſſariçat̄ in matrice apud ſupfluitatē mēſtruoꝝ ⁊ ſtringit fluxū emoroidarum. ℞. ſucci euſiſtides: acatie: ſanguinis draconis: galle: balauſtie: croci: gūmi arabici: myrre: boli armeni: opij. ana. Fiant trociſci: ⁊ line ex eis vbi oportet.

¶ Sabor. cōfectio papaueris ꝯferētis cū auxilio dei ei q̄ ſpuit ſanguinē ꝓꝑ acuitatē ⁊ iſlāmationē ⁊ doloreꝫ pectoris: ⁊ pleureſiꝫ. ℞. roſaꝝ: gūmi arabici. aā. ℥. iiij. amili: dragaganti: papaueris. aā. ℥. ij. ſpodij: croci. aā. ℥. ʒ. ſucci ligritie. ℥. ij. Cōfice cū ſirupo de papauere: da cū aq̄ pluuiali: et ſirupo myrtino aut rob eius: aut ſirupo de papauere.

¶ Idem. Cōfectio trociſcoꝝ cōferentiū ſputo ſanguīs: ⁊ emanatiōi eius vndecūq;. ℞. luti ſigillati. ℥. ij. boli armeni: amili: roſaꝝ. aā. ℥. iiij. charabe. granoꝝ myrti. ana. ℥. vi. cancroꝝ vſtoꝝ: ſemis portulace. aā. ℥. x. coralloruꝫ: dragaganti: ſpodij. aā. ℥. v. gūmi arabici: ſcendene. ſucci ligritie. ana. ℥. iiij. Confice cum ſucco portulace: ⁊ aqua roſata da cum aqua pluuiali.

¶ Iſaac iſrahelita. Cōfectio medicamīs ꝯferēs ſcreatui ſanguīs a pectore: ⁊ pulmone: ⁊ emanatōi eius: ⁊ vomitui: ⁊ hoc medicamen nō ꝑmittit cadere in ptiſim. Accipe pſilij aſſi. ℥. xv. granoꝝ portulace aſſoꝝ gūmi arabici aſſi: boli armeni. aā. ℥. v. papaueris albi: lactuce. aā. ℥. x. charabe aſſe: roſaꝝ cuꝫ pedibus ſuis. aā. ℥. iij. corali aſſi. ℥. ij. Tere oīa ſicͭ alcohol. Doſis eius ē. ℥. ij. cū aqua frigida mār̄ ⁊ ſero. Et ſit cibus eoꝝ vitella ouoꝝ ⁊ pedes arietū ⁊ edoꝝ.

¶ Idem. Cōfectio lohoc q̄ adminiſtrat̄ ad manatiōes ſanguinis ex pectore ⁊ pulmone bona. ℞. dragagāti: gummi arabici: ſanguis draconis: boli armēi: roſaꝝ: amili: ſpodij. aā. ℥. iiij. ſcendenegi: ſemis arnogloſſe: papaueris albi. mumie acatie: ſucci euſiſtides. aā. ℥. ij. penidiaꝝ: ſahari. ℥. iij. Confice cum ſirupo facto ex roſis ſiccis quantū ſufficit: aut cum ſirupo myrtino: ⁊ adminiſtretur.

¶ Filimon. Cōfectio Filonij pſici vehemētis ꝟtutis ad manationē ſanguis vndecūq;: ⁊ ſcreatū eiꝰ cū tuſſi: ⁊ ſine tuſſi: ⁊ ſupfluitatē menſtruoꝝ doloroſam: ⁊ emoroidaꝝ: ⁊ egeſtionē ſanguineā: ⁊ ad mulieres pregnātes: q̄bus erūpunt̄ mēſtrua: ⁊ ꝯſeruat fetus ī mr̄icibus eaꝝ. Cuius hec eſt ꝑmixtio. Accipe papaueris albi: iuſq̄ami. aā. ℥. xx. opij: terre ſigillate. aā. ℥. x. ſedenegi: croci. aā. ℥. v. caſtorei: ſpice euforbij: piretri: margaritaꝝ nō pforataꝝ karabe çedoarie doronigi: ramic. aā. ℥. i. cāphore. ℥. vnius tertiā. confice cum melle roſato colato quātū ſufficit. Doſis. a. ℥. ʒ. vſq; ad. ℥. i. cum ſucco arnogloſſe: aut cum aq̄ roſata: ⁊ modico vini puri.

¶ De pleureſi.

Pleureſis aūt queda ꝟa: q̄dā nō vera. Et ꝟa q̄deꝫ eſt apatio cadens in panicul' ⁊ lacertis diſtiguētibus iter velamē diſtinguēs magnū ⁊ coſtas. ⁊ ꝓprie ſecus extremitates coſtaꝝ termiataꝝ in pectore: aut ſub eo: aut accidēs in pāniculo diſtiguente: ⁊ eſt diafragma. ⁊ eiꝰ mā eſt ſanguis: aut ſanguis colericus: aut colera pura. Et nō vera q̄dē pleureſis eſt: q̄ fit in velamīe ⁊ lacerto extrinſecis cooperiētibꝰ pectus ⁊ diſtinguētibꝰ iter coſtas ⁊ cōmiſſuras eaꝝ: ⁊ cōicantibꝰ cū cute. Et eiꝰ mā: aut eſt flegma putrefactū: ⁊ iſlāmatū: ⁊ hoc eſt raro: aut melācolica: ⁊ hec eſt rarius. Et illa q̄dē: q̄ fuerit in velamīe diſtinguēte coſtas cū cōitate cutis minꝰ ſuſpecta ē. Que ꝟo in velamīe qḋ ē ſub coſtis magis. Que āt in velamīe diſtiguente eſt praua. Fit. n. cum ꝑmixtiōe itellectꝰ circa augmentum ⁊ ſtatū eius: ⁊ illud ideo qm̄ cōicat cum cerebro mediāte neruo magno quodā qui dirigit̄ ⁊ dilatat̄ in ſubſtantiā pāniculoꝝ. Et quidē cōmune eſt intrinſecis ⁊ extrinſecis pāniculis ab omni mā apoſtemari poſſe: veruꝫ a ſanguine ⁊ colera frequentius: a flegmate: ⁊ melancolia rarius: ⁊ illud ideo qm̄ ad mēbrum pāniculare: ⁊ denſum ⁊ raro groſſum: aut viſcoſum penetrant.

¶ Pleureſis aūt q̄liſcunq; fuerit: aut reſoluit̄: aut ſuppurat̄: aut permutat̄. Ars aūt ⁊ igeniatio ad reſolutionē ipſius eſt ſm. vij. res. Et p̄ma q̄dē eſt repercuſſio mãei. Scḋa eſt regimen īgeniatiuū quo req̄rit̄ ſcia vtrū ſit a plenitudine hūorali: aut ventoſali. Tertia ē diuerſio mãei. Quarta eſt ſubtractio eiꝰ ſubtractiōe cōi poſt digōnē ipſiꝰ. Quīta eſt eductio ipſiꝰ eductōe ꝓpa poſt ꝑparationē eiꝰ. Sexta eſt correctio accidentiū. Septima eſt regimen vite eiꝰ qḋ in tota ꝓlatione cure extendendum eſt.

¶ Et p̄mā q̄dē rem complent adminiſtrationes medicaminū membrū ꝯfortantiū ipſiuſq; virtutē coadunantiū vt nō recipiat nec ipm̄ vincat: que ad ipm̄ fluit mā. Et ex hoc q̄dem facientibꝰ eſt emplaſtratio facta ex lentibꝰ excorticatis coctis cū aceto: aut ex farina fabaꝝ cocta cum aceto: aut ſauich cū aceto. Et fortius eis eſt emplaſtratio ex lētibꝰ nō excorticatis lotis in aq̄ calīa: deide coctis cuꝫ aceto. Huiꝰ ēt itentōis eſt euaporatio facta cum ſpongia īfuſa ī aceto decoctiōis roſaꝝ: aut balauſtiaꝝ: aut ſilium. Vex hoc eſt ſuſpectū: niſi cū mā pauca fuerit: aut in p̄ncipio p̄ncipiante cū nō dum mā repſit in locū. Et hec q̄deꝫ cautela eſt vt adminiſtretur regimen diuerſiuuꝫ in codē: tunc enim hec cura eſt ſm ſapientiam.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0218-1

¶ Secundam rem complent adminiſtrationes euapora
tionu3 nũc hũidoꝝ: nũc ſiccoꝝ ſicͤ diſpoſitio mãei exigit.
Et ꝑcipimus ſpongiã marinã aqua calida ĩfuſam ⁊ expreſ
ſam alia euaporatoria ꝑcedere: ꝑus tñ loco palma manus
leuiter fricato: ⁊ op3 vt ſit ſpõgia lata ⁊ ampla: ex oĩ parte
circũdans: ⁊ o3 iter carnẽ: ⁊ ſpongiã pãnũ antiquũ ſubtilẽ
⁊ ſiccũ iterponi: ⁊ ſupra ſiccũ aliu3 ꝑmutari ſingulis itera
tõib9 atq3 iteratõib9 adminiſtratõis ſpõgie. Et o3 eẽ aq̃ dul
cẽ ac leuẽ: ⁊ qñq3 decoctõis camõille aut anheti: aut ſiliũ.
Et aq̃ ſalſa eſt fortioꝛ aq̃ dulci: ⁊ hoc qñ o3: ⁊ qñq3 facim9
illud cũ veſica aq̃ calida ſemiplena. Ex bonis euaporato
rys eſt aq̃ ꝯcoctõis furfuris: ⁊ camomille aut anheti aut
herbe vitri: ⁊ adhuc ſacellatões ex herba vitri ⁊ furfuris:
poſtq3 calefactũ fuerit in latere calido: ſuꝑ quẽ rozatũ pri
us fuerit acetũ ꝑmixtũ aq̃ aut cũ aq̃ ſola. aut aq̃ ſalſa ſm
qđ exigit diſpõ mãe: ⁊ qñ3 madefiũt ĩ aliquo eoꝝ p9: deiñ
calefiunt ⁊ ſupponunt̃. Et fortius his ẽ euaporatoriũ fcm̃
ex orobo: ⁊ ſemib9: aut folys cauliũ ⁊ aceto poſitis ſuꝑ la
nã ĩbibitã oleo aut oleo anetino. Ex ſiccis ãt euaporato
rys eſt ſacellatio facta cũ furfure: ⁊ ſale calefactis aut mi
lio ⁊ ſale calefactis: aut pãico ⁊ ſale. Ex medys iter hũidũ
⁊ ſiccũ ẽ vas eneũ: aut terreũ aq̃ cal'a plenũ: ⁊ o3 vt ſit vas
ãplũ cõuexũ vt ex omni ꝑte circũdet. Et qdẽ ſuꝑ oĩb9 his
canon eſt: quẽ ſemꝑ obſeruari iubem9: qm̃ circa cito: ⁊ tar
de reſolubile itenſe aut remiſſe calidu3: et circa ĩ ſuꝑficie
aut ĩ ꝓfundo poſitũ euaporatoriũ adminiſtratõis o3 cõmẽ
ſurare. ſic. n. tradit̃ ſcia ſm ſapientiã. Et adhuc qde3 canõ
eſt debere ab hũidis ⁊ debilioꝛib9 ĩcipere. Et q̃to ꝯpatioꝛ
⁊ ſiccioꝛ fuerit mã tanto tardi9 ad fortioꝛa ꝓrũpere ne re
ſoluat̃ mãe qđ ſubtile eſt: ⁊ cadat deinde durities in reſi
duo. Hoc nãq3 cauendũ ẽ. Cauẽdũ ẽt ne vapoꝛ ex euapo
ratorys ad egri nares aſcẽdat. Diſſolutionem eni3 ⁊ triſti
tiã: ⁊ anhelit9 ꝯſtrictionẽ gñat: cũ aũt ex ſerie oꝑatiõis h9
ꝑuenerit ad hoc: vt doloꝛ ⁊ pũctura qualiſcũq3 fuerit re
ſoluant̃: aut ſm aliqđ aut itegre: ſubeſt excuſatio trãſeun
di ad aliud. Si vero multiplicat̃ vſq3 adeo vt dilatet̃: ⁊
aſcẽdat doloꝛ vſq3 ad furclãs: aut vſq3 ad hyppocondria
extẽdat̃: tũc certũ eſt ꝙ reſolõnẽ repletio agitatiua ꝓhi
bet: imo adhuc euaporatio dilatat agitatã: ⁊ mltiplicat: ⁊
hoc maxĩe cũ repletio fuerit ĩ toto: tũc ad aliud gen9 cure
ꝓcedendũ eſt: quẽadmodum dicemus iam.

¶ Tertiam igit̃ rẽ ꝯplẽt adminiſtratões medicaminũ ſm
exigentiã vni9 duaꝝ occupationũ. Et ꝑma qdem eſt ꝙ ſi
mã fuerit dilatata aſcendẽs vſq3 ad furculã: ⁊ nõdum ex
toto repſerit: ſ3 adhuc eſt vt repat: flebotomet̃ baſilica ex
latere oppoſito: ⁊ extrahat̃ de ſanguĩe vſq3 dũ alteret̃ co
loꝛ eius: iuxta ṽtutis ⁊ etatis exigẽtiã. Et qñq3 apud plu
ralitatẽ repletõis iubem9 flobotomari ex ſaphena partis
oppoſite. eſt. n. ei9 iuuamẽtũ ſublime feſtinũ: ⁊ ꝓpẽ apud
aſcẽſum materiei ad caput. Hui9 ẽt itentõis ſunt vẽtoſa
tões in crurib9: ⁊ fricatiões in extremitatib9 ⁊ cliſteria le
nia: ⁊ q̃ hoc curſu ꝓcedunt. ¶ Scđa vero eſt ꝙ ſi mã fue
rit decliuioꝛ ad hyppocũdria ꝑponẽda ẽ cliſterizatio. De
inde ſi neceſſitas expetit: flebotomet̃ baſilica ſilr̃ ꝑtis op
poſite: ⁊ nõ excludat̃ ſi ṽtus ꝑmiſerit flobotomia ſaphe
ne. Et vlr̃ qdẽ extractio fecis. ⁊ alleuiatio partiũ vẽtris a
fece ⁊ ventoſitate excuſat ab additõe nocumentoꝝ ĩ hac
egritudine. ¶ Adminiſtrent̃ igit̃ cliſteria lenia facta ex
eo qđ eſt ſicͤ aq̃ ordei: cũ radice maluaꝝ: ⁊ aqua ſicle pau
ca: ⁊ ſimilib9. Et ne excedas in vſu3 eoꝝ niſi vſq3 ad illud
qđ ſignificabit̃ tibi ex diſpõe: qm̃ ꝯſueuit egritudinẽ hãc
fluxus ſanguis ſequi ĩmoderãtia. Et ſiqdem fuerit cũ eis
acceſſus ĩcolumitatis ad anhelitum ⁊ lenteſcentiam fe
brium: tũc eſt hui9 apparitio ſignificatio laudabilis. Si
vero nõ ꝯ̃ria. Ex reb9 aũt maximi iuuamẽti ad diuerten
dũ moꝛbi mãm eſt poſitio vẽtoſaꝝ ſuꝑ locũ doloꝛis: nũc
cum ĩciſiõe: nũc ſine ea ſicut exigit neceſſitas: ſedat̃. n. ex
hoc doloꝛ iterdũ: ⁊ ĩterdũ mã ad partes cutis trahit̃. Ue
rũ op3 operationẽ hanc ꝙ ꝑcedat coꝛpoꝛis mũdificatio
cũ flebotomia ⁊ ſolutõe vẽtris ex his q̃ dicem9. Uel ex hoc
a ſeptimo vſq3 ad decimũq̃rtũ diẽ: ⁊ hoc ꝓprie cũ ĩtellexe
rimus mãm moꝛbi poſſe reuocari ad cutẽ. Hui9 ẽt inten
tionis eſt emplaſtratio ex ſinapi: ⁊ ſimilibus.

¶ Quartam rẽ cõplent flobotomia: ⁊ coꝛpoꝛis mũdifica
tio cũ medicis ſolutiuis ſm neceſſitatis exigẽtiã. Et hoc
qđ nunc diſcutim9: dirigit ĩtentionẽ nr̃am. ad egritudinẽ
iam factã in q̃ repſit ſm totalitatẽ ipſi9 mãe. Neceſſaria
eſt ergo flobotomia: tũc ſi ex ſanguis abũdantia fuerit ex
baſilica partis: q̃ ſequit̃ doloꝛẽ: facta vſq3 ad coloꝛis ſan
guinis ꝑmutationẽ cũ ꝯditõibus ṽtutis ⁊ etatis. Excuſat
eni ab alys hec flobotomia: niſi fuerit cõſtipatio nãe. tũc
eni3 leniẽda eſt nã cũ his q̃ ſunt ſicͤ ſiracoſt. i. mãna ⁊ mu
roba de violis: ⁊ decoctio violarũ cũ iuiubis ĩ aqua ordei.
Et q̃ hoc curſu ꝓcedunt: aut cũ enemate leui. Si aũt mã
colerica fuerit: tũc flobotomia ⁊ vẽtris ſol'o neceſſaria ẽ:
⁊ ſilr̃ ſi flegmatica aut melãcolica fuerit. Uel op3 flobo
tomiã ꝑponi farmatie: niſi ventris fuerit ꝯſtipatio: tũc. n.
ꝑcipimus lenire pri9 naturã. Mũdificatõe3 aũt coꝛpoꝛis
cũ medicina ſolutiua o3 ꝙ ꝑcedãt ꝑparatiua ad materiei
digeſtõe3 neceſſaria. ⁊ ſi qdẽ materia colerica fuerit. req̃
rit ĩflãmatio eius infrigidationẽ maioꝛẽ ⁊ humectatiõe3
nõ tñ expoliãda a virtute abſterſiõis: ⁊ de hoc qdẽ gene
re ſunt aqua citruli ⁊ melonis ĩdi ⁊ cucurbite ⁊ ſiliũm: ⁊
proprie cũ eo qđ ẽ: ſicut ſecaniabin: qđ ſcripſit Hali. cuius
hec ẽ ꝑmixtio. ℞. mellis ꝑtẽ. i. zuccari: ſale meni partes. ij.
aceti ⁊ aque dulcis. añ. partem. i. Ineſt ãt huic ſecaniabĩ
ṽt9 extictõis: ⁊ ſedatiõis ſitis: ⁊ abſterſiõis. ⁊ ſi duplicat̃ ĩ
eo mel ꝓuẽiet ex eo abſterſio maioꝛ: ⁊ ſi addit̃ ei ad aceto
ſitatem ẽ obuiatiuũ colere ⁊ mltiplicatõi ſitis: ⁊ ſit doſis
eius ab. ℥. ij. vſq3 ad. iij. cũ aliquo ex ꝑdictis ſuccis aut cu3
aq̃ hñte tẽperiem iter cal'm ⁊ fri. ſi eſtas fuerit. ⁊ ſi fuerit
hyems det̃ cu3 aqua calida: ita tñ ꝙ in matutinis ꝑcedat
hauſtu3 eius pot9 mucillaginis pſily ex aq̃ ſola: aut ex aq̃
granatoꝝ dulciũ: ⁊ aqua dulci cũ iuleb: ⁊ ſubſequat̃ ipſu3
circiter per duas hoꝛas potus aque oꝛdei.

¶ Si autem rẽ pluris hũectatiõis ⁊ minoꝛis abſterſiõis
diſpõ exigit: ſyrupus violatus cũ aqua iuiubaꝝ dandus
eſt aut aq̃ oꝛdei. cũ violis ꝯditis. Reſcindant̃ aũt omnia:
q̃ infrigidant. ⁊ cõpingũt ſicut poꝛtulaca papauer: ⁊ ſimi
lia niſi aliqua neceſſitas exigat. ſicut dicemus.

¶ Si ãt febris ⁊ eſtuatio anhelituſq3 frequẽtia: ⁊ ſitis ĩ
ualuerint: ſuccurrendũ tũc cũ eo in quo eſt hũectatio ſo
la ſicut eſt mucillago pſily ꝓprie ⁊ iuleb ſubtile ſoꝛbẽdo
ex eo ſemꝑ aliqđ poſt aliqđ. ⁊ ſi fuerit cũ hoc ꝯſtrictio nãe
dandus eſt ſirup9 de prunis cũ mucillagine pſily. ⁊ ſilia.

¶ Si aũt mã ſãguĩea fuerit req̃rit̃ ṽt9 ĩfrĩdatõis mioꝛ: ⁊
abſterſiõis maioꝛ: ⁊ ꝓpẽ cũ eo qđ ẽ ſicͤ ſecaniabĩ ĩ quo du
plicat̃ mel: c9 hauſtũ ꝑcedat ſicͤ in matutis idromel: ⁊ iu
leb factũ ſubtile vtrũq3. ⁊ ſubſequatur aq̃ oꝛdei decoctio
nis capilloꝝ veneris. ⁊ ſiliu3. ¶ Si aũt mã fuerit ſãguis
fl'atic9 req̃rit̃ mioꝛ ĩfrigidatio ⁊ maioꝛ abſterſio cũ eo qđ
ẽ ſicͤ ſecaniabĩ ꝓprie: ⁊ decoctio yſopi: ⁊ radix lily. h9 ẽt ĩ
tentõis eſt idromel. ⁊ ſilia. ¶ Si vero fuerit mã ſanguis
mel'ic9 det̃ ſirup9 mellin9: ⁊ idromel cũ ꝯcoctõe aneti: vl'
lupini: vel bugloſe: ⁊ ireos. ⁊ ſiliũ. Et ſuꝑ his canõ ẽ vt res
leniẽtes: ⁊ remouẽtes aſꝑitatẽ: ꝑcedãt res q̃ abſtergũt: im
mo nõ expolient̃ ab eis. ſic. n. felicitat̃ oꝑatio. ¶ Cũ autẽ
adminiſtrationẽ medicĩe ſolutĩe cognoueris neceſſariã eẽ
in re eſt vt ꝯſideres. Nã ſi febris vehemẽtia ĩualuerit cũ
eſtuatõe: tũc timẽdũ eſt ſolutiuũ ⁊ excuſat ab ipſo ſola fle
botomia in q̃ nõ ẽ timoꝛ niſi foꝛſan apud nãe cõſtipatõe3
⁊ iubem9 ea3 liniri cũ aq̃ oꝛdei. ⁊ viol' ꝯditis ⁊ pulpa caſie

fiſtule: ⁊ mãna. ⁊ ſilibus: aut cũ aq̃ prunoꝝ: ⁊ q̃ hoc curſu ꝓcedunt: aut cum cliſteri lenitiuo ex his que ſcis.

¶ Materia vero euãnda qualiſcũq; fuerit. oꝫ vt euetur cũ eis cũ qbus cũ ſolõne eſt lenificatio: ẽ quoꝝ ſũma ſũt viole ꝓprie humide: ⁊ ſicce: ⁊ cõdite: ⁊ ſirupus ex eis: ⁊ ſiracoſt: ⁊ tereniabin: ⁊ çuccaꝝ alhoſor: ⁊ caſia fi. ⁊ ſimilia. ⁊ ꝓprie ſi mã fuerit colerica. ⁊ q̃nq; miſcet᷑ cũ eis ſicut ſũt trociſci de violis habẽtes aliqd ſcamõee: ⁊ nos ſcripſimꝰ ꝑmixtionẽ eoꝝ in caplõ de aſmate. ¶ Et ſi fuerit flegmatica mã euãnda eſt cũ eo qđ eſt ſič puluis ireos: aut agaricus aut yſopꝰ: aut albaſce cũ muroba de violis mellitis ⁊ tereniabin: ⁊ aq̃ ordei. ¶ Si võ fuerit melĩca cũ eo qđ ẽ ſič elleborus niger cũ aq̃ ordei. ⁊ iã qdẽ galie. ꝑcepit aquã ordei poſt ſolutiuũ ꝓpinari debere: aut aq̃ mell vt lẽificet ⁊ abſtergat ṽtutẽ ſolutiui. ⁊ ſi diſpõ aliq̃ ẽ q̃ exigat: neceſſariũ ẽ vti cliſteribꝰ lenibꝰ medys ⁊ acutis ſꝫ neč̃citatis exigẽtiã ⁊ ꝓpe cũ dolor proclinior ad hypocõdria fuerit.

¶ Quintã rẽ ꝯplent adminiſtratões medicinaꝝ ſputũ facilitãtiũ ipmq; velocitãtiũ. ¶ Et hoc qdem ꝑficit᷑ cũ icohatiõe ab hũectantibꝰ ⁊ lenificantibꝰ ꝓcedẽdo ad res tẽperate abſterſiõis. ¶ Et ſi qdẽ vehemẽs iflãmatio fuerit cũ eo qđ eſt ſič aq̃ melonis indi aut aq̃ citrulli aut cucurbite cũ aq̃ çuccari aut aq̃ or. excorticati decocti in aq̃ pluuiali decoctõe vehementi cũ iuleb. ¶ Et ſi qdẽ nõ adeo fuerit vehemẽs ſufficit aq̃ iuiubaꝝ ⁊ ſebeſten cũ violis ⁊ ſemibus citonioꝝ: ⁊ olõ amigdalaꝝ dulciũ cũ iuleb: ⁊ aq̃ mell aut aq̃ çuccari. ¶ Et nõ ꝑtermittat᷑ poſt illaꝫ aq̃ ordei ſicut poſt horã: ⁊ in ꝓceſſu rei ꝓcedẽdũ vſq; ad id qđ eſt ſič decoctio radicũ lily: ⁊ capilloꝝ veneris in aq̃ ordei cũ idromelle. ¶ Veꝝ aq̃ mellis eſt vltimior ad hũectandũ q̃ꝫ aqua or. ⁊ aqua ficuũ ⁊ paſſulaꝝ eſt hꝰ gñis poſt iſta. ⁊ ꝓprie cũ miroba de violis: ⁊ aq̃ mellis: ⁊ oleo de amigdalis dulcibꝰ: ⁊ ſilr aqua ligritie cũ eis aut ſine eis: ⁊ facimus ſeq poſt illã aquã ordei: ⁊ eſt via rectior: ⁊ q̃nq; ꝑuenimus ad gradũ eoꝝ q̃ ſũt decoctio yſopi: ⁊ ſilia: ⁊ ex rebus ſputũ facilitãtibꝰ eſt ſorbitio facta ex aq̃ ad calitateꝫ declini hora poſt horã: ⁊ ex eis eſt embrocatio facta ſuper locũ doloris cũ aqua calida. minuit. n. dolorẽ ⁊ ſputũ accelerat. ⁊ ſi ſit decoctõis maluaꝝ aut fenugreci. ⁊ ſilium magnificat᷑ opatio eiꝰ. ⁊ ꝯferũt ei cerota ⁊ emplaſtra: ⁊ ex eis qdẽ ſunt meliora i qbꝰ ẽ lenificatio cũ reſolõne nõ eleuata: ſꝫ quaſi in gradu p̃mo. Deĩde ꝓcedẽdũ paulatim ad ea q̃ ampliꝰ eleuant᷑: ⁊ ex rebꝰ vtilibꝰ non eleuatis ẽ cerotũ ex oleo viola. ⁊ cera: aut ex oleo amigdalino: ⁊ cera. et eleuant᷑ ſuꝑ iſta q̃cũq; fiũt ex mucillaginibꝰ aut adipibꝰ alys. ⁊ adhuc ex yſopo hũida: ⁊ ex eis eſt fortiꝰ ex radice lily aut fenugreco: ⁊ ſemĩe lini: ⁊ abſinthio coctis cuꝫ ſucco herbe vitri: ⁊ oleo de camomilla ⁊ pauco melle: ⁊ adhuc eſt fortiꝰ his ex caulibꝰ elixatis cũ butiro aut ex cinere radicũ cauliũ cũ adipe: ⁊ nos qdem plurã ex his ſcribemus poſt. ſi deꝰ voluerit. Et ex his q̃ valde ſputũ facilitãt eſt vt dormiat ĩfirmus ſuꝑ latus doloroſuꝫ ⁊ ſorbeat hora poſt horã paulatim ex aqua calida ⁊ aqua çuccari aut aqua mellis calida. ⁊ ſimilibus.

¶ Sextam rẽ ꝯplẽt adminiſtratões medicaminũ ſedãtiũ accñtia ſupueniẽtia huic egritudini que ſi vltimant᷑ accidit ex eis timor: ⁊ deſperatio: ⁊ ſunt ꝓprie ꝑmixtio itellectus alienatio vigilie ſitis vehemẽs fluxꝰ vẽtris: ⁊ ſãguis ex naribꝰ. ¶ Intellectus ãt ꝑmixtio ⁊ alienatio q̃nq; accidit apud ꝑmutationẽ pleureſis ⁊ nos loquemur de ea. ⁊ q̃nq; accidit ex ꝓprietate cuiuſdã ſpẽi pleureſis: ſič ꝓprie qñ fit in velamĩe diſtinguẽte magno: ⁊ ẽ diafragma ⁊ cõicat cũ cerebro mediãte neruo quodã magno q dilatat᷑ ⁊ cõtexit᷑ i ſubaꝫ pãnicularẽ ⁊ oꝫ i hac pte gemiare curã ſil pleureſis ſič ſcribemꝰ nũc. ⁊ freneſis ſič i ꝓpo loco ſcripſimus: ⁊ hic erit modꝰ curatõis. ſi ẽs hãc egritudinẽ curari ꝑmiſerit. ¶ Vigilie aũt ſi accñt iterdũ acceſſum ad permixtionẽ itellectꝰ ſignificãt: ⁊ ꝓpe dũ multiplicant᷑: ⁊ tũc neceſſaria ẽ adminiſtratio ſpẽrũ de iacur: ⁊ ſirupi de papauere ⁊ decoctõis eiꝰ. ⁊ hoc cũ cautela ne ſputũ cõpigãt et ꝓhibeãt: qđ eſt res deterior eis: ⁊ medicie ex ſemĩe papaueris meliores ſũt eis q̃ꝫ ex cortice. cautela ſocietatis auffert hoc nocumẽtũ ⁊ ꝓpe ſi aſſociet᷑ eis qđ eſt ſič decoctio paſſulaꝝ aut aqua mellis aut rob: ⁊ qđ eſt eis ſimile.

¶ Sitis ãt accñs eis ſedãda eſt cũ hũectãtibꝰ ⁊ vehemẽtiã iflãmationũ extinguẽtibꝰ ſič cũ aq̃ citrlĩ ꝓpe ⁊ melõis idi: ⁊ mucillagie pſily: ⁊ ſilibꝰ de qbꝰ loq̃mur i ꝓpo caplõ Veꝝ oꝫ nõ eſſe frida actu. ⁊ opꝫ admiſceri aliq̃ eis ex abſtergẽtibꝰ ſubtilr vt lenificet᷑ ſputũ: ⁊ ſi fuerit ſitis a caumate ſpũaliũ adminiſtret᷑ libertas aeris tẽpati ꝺcliuis ad hũiditatẽ ⁊ vngat᷑ pectꝰ ẽt ex ceroto de oleo viola. ⁊ cera. ⁊ ſilibꝰ. Si ãt fuerit ab ebullitõe colẽ rubee ꝯfert ſecanabin ſubtile qđ ſcripſit. Galie. cũ aq̃ pluuiali ⁊ ſirupꝰ viola. cũ aqua plũia ſedat hãc ſitiꝫ ⁊ aqua ordei hñs bonitates ſuas ex mõ permixtiõis ſue cõfert ſicut Hyppo. dixit.

¶ Fluxũ aũt ſanguis a naribꝰ ꝯtingẽtẽ eis poſt criſiꝫ ſiſtere nõ debemꝰ: niſi ſupfluat: ⁊ ſi fuerit nõ creticus: ſꝫ ꝑꝑ exuberãtiã ſanguis: ꝯfert tũc flomia ⁊ alia q̃ diximꝰ in caplõ ꝓprio. Fluxus vẽtris accñs eis in morbi ꝑncipio ẽ ſꝫ vnũ duoꝝ modoꝝ. aut. n. ꝑꝑ multitudinẽ mãe cũ ꝑſiſtentia regulatõis nãe: ⁊ ſeqt᷑ ex hoc anhelitꝰ facilitas ⁊ lenteſcentia febris: ⁊ eſt ſignificatio bona. aut ẽ ꝑꝑ exuberãtiã mãe ꝑterq; regulet᷑ a nã: imo ẽ ſič egurgitãs: ⁊ ẽ ſignificatio mala. ⁊ ꝓpe cũ nõ ſiſtit᷑ ꝑ ipm difficultas anhelitꝰ triſtitia ⁊ febris iflãmatio: tũc. n. fortaſſis ſupueniet mors i .iiy. vel ante. ¶ Si ãt accidat fluxus vẽtris i fine morbi eſt ſilr ſꝫm alios duoꝝ modoꝝ. aut. n. expellit᷑ mã ad epar ⁊ viſcera: ⁊ ſeqt᷑ ipſum icolumitas: aut accidit a debilitate epis: ⁊ proſtratione digeſtiue virtutis ⁊ contentiue in ipo ⁊ ſequitur poſt ipſum pernitioſitas.

¶ Septimã rẽ ꝯplẽt adminiſtratões regulationũ circa regimẽ egri i qñibꝰ ſex reꝝ: ⁊ ꝓpe vt dirigat᷑ eis tẽperies in aere q̃ ſit vtcũq; ad calitatẽ decliuis ⁊ timeat᷑ obtuſio et acuitas i ipſo ex mltiplicatõe boree: ⁊ auſtri inq̃tuꝫ poſſe fuerit. ⁊ fiat elõgatio a fumis ⁊ vaporibꝰ ⁊ vẽtoꝝ flatu: ⁊ ab aere agitatõis aq̃ꝝ ⁊ ab eſtuoſo ⁊ ſicco. ¶ Nutriẽs ãt oꝫ ꝯmẽſurari eis ſꝫ ꝯſiderationẽ nr̃aꝫ quã dirigimus aut ad morbũ aut ad patiẽtẽ. Et ad morbũ qdẽ aut ſꝫm q̃titatẽ acuitatis: aut ſꝫ horã acceſſus ⁊ receſſus eiꝰ. ⁊ multitudo qdẽ acuitatis fač nečariã ſubtractionẽ nutriẽtis ſicut ꝑuitas multiplicationẽ ipiꝰ. Et Hyppo. qdẽ dixit apud vehemẽtiã doloris ⁊ acuitatis ſi cibꝰ det᷑ eſt ponere egꝝ ad deſperationẽ ⁊ mortẽ: ⁊ illõ iõ qm nã debil ad alterã duarũ occupationũ aut deficiet aut ad vtrãq;. ⁊ certũ ẽ furiã ex reſiſtẽtibꝰ nãe ⁊ ſuppeditatõe mltiplicari: qr tẽ nutriẽs oio ꝓhibẽdũ ẽ. ⁊ adhuc nutrire circa acuitatis ⁊ doloris aduẽtũ ſeu augmẽtũ horrẽdũ ẽ magis q̃ꝫ circa ipiꝰ vltiatẽ. Apud võ acuitatis ⁊ vehemñtie doloris ꝺcliatõeꝫ nõ ſuſpectũ eſt ⁊ minꝰ apõ lẽteſcẽtiã. Vlteriꝰ ãt nutriẽdũ qñ iã accñtia qeta ⁊ leuia ⁊ facilia fuerit: ⁊ adhuc vlterius qñ iã ex toto rẽiſſa ſũt. ¶ Nutriẽs igr̃ cũ nõdũ i toto dolor leuior fuerit cũ eo qđ ẽ ſič aq̃ or. ⁊ aq̃ çuccari aut aq̃ mell vtriſq; factis ſubtilibꝰ. Et cũ iã a dolore alleuiatũ egꝝ iueneris: ſꝫ ñ itegre ſis ꝯtẽtꝰ aq̃ çucca: ⁊ aq̃ or. ꝺcocti i aq̃ plũia ꝺcoctõe vehemñti: aut aq̃ alteraniabi cũ aq̃ or. ꝺcoctis vehemẽter. facilitãt. n. ſputũ. ⁊ ſi vlteriꝰ ſollicitare volueris. ex amigdal iuſculũ ꝺcoctõis eaꝝ admiſcebis: ⁊ dabis cuꝫ melle modico aut çuc. ⁊ ex eis ẽ aq̃ alkãderes. ⁊ aq̃ triti. ⁊ ꝓpe cũ ampliꝰ egꝝ alleuiatũ iueneris. ſilr iuſculũ ex maluis ⁊ criſolocãna: ⁊ bletis: ⁊ ſicla ⁊ cucurbita ⁊ ſorbitiões eaꝝ ex fabaꝝ farĩa: ⁊ ꝯcedimꝰ i fine febris plimẽta ex butiro. Et poſt febrẽ iuſclã ex herbis cũ carnibꝰ teneris: aut vitell ouoꝝ. Et qdã ex antiqs dabãt panẽ cũ aqua çuccari: ⁊ iuleb. Galie. ãt ꝑcepit qđ ⁊ nũc ꝯprehẽdit vniuerſitas

fermentum nō dari: facit enim apertionem apoſtematis ante digeſtionē. Et azimum nō dari: ſputum enī inuiſcat. ¶ Cum aūt rupturā apoſtematis qrim⁹: damus fermentatum. rupturā enī apoſtematis facilitat. Et vlr gdē cōcedunt̄ eis cāna melle: ⁊ granata dulcia: ⁊ poma dulcia elixata aut aſſata: ⁊ paſſule ſine iterioribus: ⁊ cheſmes ⁊ iniube cōplete: ⁊ amigdale. Et qn̄qȝ extendim⁹ vſqȝ ad piſces degentes in ſcopulis: ⁊ ꝓprie hn̄tes ſquāmas: ⁊ hec ꝓprie tribuant̄ ſicut exigit diſpō. Et in pleureſi gdē flegmatica danda eſt aq̄ cicerū: aut aq̄ ordei ⁊ cicerū cū melle ⁊ aqua caulium cū oleo amigdalino: aut lacte amigdalaꝝ ⁊ cibētur ſicla cum oleo amigdalino: aut lacte earū ⁊ melle: ⁊ detur etiā alteraniabī cū yſopo ⁊ melle: aut pulegio. eſt.n.cibus bon⁹. Et dico ꝙ tp̄s etas: regio: ⁊ ꝯſuetudo in adminiſtratōe q̄ntitatis nutrientiū: ⁊ nūeri vtꝝ paꝝ vel multū ſemel aut amplius dari debeat̄ regulat: q̄re diſtiguēdū ē in illis ſicut ſcis. Potus aūt eis bon⁹ eſt aq̄ zuccari: ⁊ aqua mellis: ⁊ iuleb ſubtile: ⁊ aqua ordei ſubtilis: ⁊ q̄ hoc curſu ꝓcedunt. Aquā āt in hyeme calidā bibāt: in eſtate vō tēperatā. Uerū abhorreāt aquā frigidā niſi in duobus caſibus: ⁊ hoc gdem in tuſſi ſicca: ⁊ aſpera: ⁊ in ſiti: ⁊ caliditate vehemēti: tūc quoqȝ cōcedim⁹ ipam frangētes frigiditatem ei⁹ cū ſecaniabin: ⁊ iuleb: acgrentes ei ex v̄tute icīſionis alſecaniabin v̄tutem penetratōis vt penetret: ⁊ diſcurrat in venas: ⁊ ſigillet̄. Deīde ex frigiditate ⁊ humiditate virtutis aq̄ extinguēs iflāmationē: ⁊ ſedās aſperitatē ⁊ ſitim. Hoc eſt enī qd̄ nō omnes cōprehenderunt. In morbi aūt declinatōe det̄ eis vinū album dulce: ſubtile: ⁊ rob cum aqua pluuiali: ⁊ aqua mellis: ⁊ cōcedit̄ vinū aquoſuȝ eis lene: ⁊ vinū cheſmes: ⁊ aq̄ ꝯcoctiōis alcheſmes: ⁊ aqua paſſulaꝝ: ⁊ iuleb: ⁊ q̄ hoc curſu ꝓcedūt. In flegmatica vō ſorbeant aquā mell̄: ⁊ qn̄qȝ decoctōis yſopi: ⁊ q̄ hoc curſu ꝓcedunt. In melācolica vero cibent̄ ſorbitōib⁹ factis ex ſauic triticeo: ⁊ melle: ⁊ alteraniabin: ⁊ oleo amigdalaꝝ: ⁊ ex ſorbitōib⁹ factis ex farina fabaꝝ: ⁊ iuſculis ex ligua bouis domeſtica ⁊ ſilueſtri. Potent aquā mellis cū aqua lupuli aneti. ⁊ ſimiliū. Et gdē iam dictū eſt in hac egritudine ventrem fluxibilē cū moderantia fieri. Et enī eius ſtrictura vel largitas plurima nō eſt bona. In lubricitate igr̄ vētris ꝓhibenda ſunt iuſcula ex herbis. Dāda vero ſūt apō vētris ſtricturā: ⁊ cū ſitis aſpa fuerit. ⁊ ꝓhibēda ſūt granata ⁊ poma cū vētris ꝯſtipatio fuerit. Dāda vō ſūt apud lubricitatē ipſi⁹: ⁊ ſic itelligendū ē de ceteris. Libare āt aut potum dare: nō niſi a fece purgatis viſcerib⁹: vel ſaltē mēbris digōnis p̄me: Hypp. iuſſit neqȝ accedēte dolore: neqȝ p̄ſente eo: neqȝ in hora deteriori horaꝝ. Silr̄ aūt nec aperias venas fece cōſtipatis viſcerib⁹: aut lubricitate domināte eis: ⁊ ꝓp̄e vehemēti: neqȝ in die cū nā obijcit morbo: ſed in die mioris agitatōis ſi poſſe fuerit. Soluere vō apō ventris cōſtipationē ⁊ apud māci declinationē ad hypocundria cū enematibus magis eſſe conueniens Galienus iuſſit. In euacuādo vero membra nutritiua ⁊ ſpūalia obſidente farmacie opus eſſe p̄cepit: ⁊ enemata vtilia eē nō negauit: ⁊ ꝓprie ſic diſpō exigit. Adhuc aūt op⁹ farmatie abſcindendū eſt apō febris ⁊ accītis vehemētiā: excuſat .n. tunc ab ea ſola flōmie adminiſtratio: niſi forte linire ſiccitatem viſceꝝ oporteat: ⁊ hoc magis cū cliſterib⁹ facias.

¶ Sermo in aqua ordei.

Conſueuerunt antiqui vocare aquam ordei ptiſanam: et conſueuerunt vocare ptiſanum: et chilum eſſe liquores reſultantes ex elixatione alicuius rei in aquoſo ex actione caloris operantis in illa. Uerum chilus hȝ artificē calorē aīalis ⁊ ꝓp̄e in vaſe ꝓprio. Ptiſanum aūt hȝ artificem calorē ignis in vaſe cōmuni ſicut eſt elixatio carniū: ⁊ frumēti: ⁊ ordei. ⁊ aliaꝝ reꝝ nutrientiū: Elixationē aūt. reꝝ medicinaliū ꝯſueuerūt vocare apozima. Et inenerūt aq̄ ordei duplex officiū. ſ. lenitionis cum abſterſione: aut ſine abſterſiōe: ⁊ ſi gdem eſt cuȝ abſterſione: potū medicinalē vocauerūt. Eā vero q̄ ſine abſterſiōe eſt: qn̄qȝ vocauerūt potum tantū: ⁊ qn̄qȝ potuȝ et cibū. Et in his diſtinguit̄ mod⁹ opatōis ſm artē: ⁊ ſciam q̄re duplicem in ei⁹ opatōe iuenerūt artem vnā. ſ. facientem eā potū medicinalē: aliā facientē potū tantū: aut potum ⁊ cibū. Ars vō p̄ma modificat ſic. Accipe ordei excorticati ⁊ fricati: cū pāno aſpero fricatōe vehemēti vſqȝ ad excuſſionē tenuiū corticū circiter lib. i. ⁊ ſit ordeū ſubtile mediū iter antiquū ⁊ nouum: ſup qd̄ nō cecidit de odore corruptōis aliqd: nec de ꝯtagione fumi: aut pulueris: ⁊ cōſeruatū fuerit in loco aeris liberi: ⁊ iā habuerit ꝑfectionē i maturitate ſua: ⁊ pone illud electū in olla noua mūdata lota: ⁊ abſterſa nimis vt nō remāſerit in illa de odore: qꝫ quā oio: ⁊ ꝓijce ſup ipm aq̄ circiter lib. xx. ⁊ ſit aq̄ fontiuȝ dulcis lenis: ⁊ ſubtilis: ⁊ exerce coctionē ipſi⁹ cū oī facilitate inq̄ntū poſſe fuerit. Et hoc ſine fumo auferendo a p̄ncipio ſpumā eius ⁊ decoq̄t̄ vſqȝ ad conſumptionē medietatis aq̄: aut duaꝝ ptiū ei⁹: deīde colet̄ ⁊ ꝯſeruet̄ in vaſe vitreo: hȝ. n. hec aq̄ virtutē lenitiuā reſultātem in ea ab aq̄ ⁊ medulla ordei. Abſterſiuā ⁊ lauatiuaȝ a nitroſitate quadā expāſa in cortice ordei iteriori regente medullā eius. Eſt igit̄ facilis lauatiua: ⁊ ſputi facilitatiua. Uentrē lubricat: oppilatōes aperit: ⁊ vrinā ꝓuocat. Ars vō ſecunda modificat ſm hūc modū. ℞. ordei excorticati circiter lib. i. ⁊ frica illud cū pāno aſpero fricatōe vehemēti vſqȝ ad excluſionem: ⁊ ad ſepationē itriſecoꝝ corticū oio: ⁊ laua illud lauatōib⁹ plurib⁹ cū aq̄ calīa: deīde pone id in olla: ⁊ fūde ſup ipſ aq̄ circiter lib. viij. deīde bulliāt cū facilitate ebullitōe vna ⁊ ꝓijciat̄ ab eo illa aq̄: deīde pone ſup ipſ aq̄ calide circiter lib. xx. ⁊ decoq̄ cū facilitate vſqȝ ad lib. x. vel vſqȝ ad lib. vij. deinde cola ⁊ recōde in vaſe vitreo. Hec aūt aq̄ ſitim ⁊ aſpitatē ſedat: ⁊ iflāmationeȝ extinguit pect⁹ ⁊ pulmonē ⁊ gutt̄ lenit: ſitim extiguit ventrē lubricuȝ reddit: p̄cordia hūectat: ⁊ ſputū facilitat. Hec āt aq̄ vlteriorem recipiēs coctionē īfundēdo adhuc in ea paꝝ poſt paꝝ circiter lib. x. aq̄ calē efficit̄ cibus ⁊ pot⁹: quē gbuſdā colatū: gbuſdā nō colatū ſm neceſſitatis īdigentiā. Hyp. dari p̄cepit. Et qn̄qȝ adhuc vlteriorē recipit decoctioneȝ vſqȝ adeo donec hēat mediocritatē inter iunctū: ⁊ liqdū: ⁊ eſt cibus laudabilis hn̄s bonitates ſolemnes.

¶ Sermo in aqua cicerum.

Dixerunt antiq duplicē in ciceribus ꝓprietatē eē. Et ex eis vna eſt: q̄ eſt expāſa in ſupficie corticum ciceꝝ humiditas baurachia cū caliditate ſubtili q̄ tollit̄ ſola ebulliōe. Et eſt alia ꝓprietas q̄ ſedet in toto corpore eoꝝ: ⁊ eſt humiditas dulcis ſubtil̄ nutribil̄ tamē iflatiua. Si vō coxeris lib. i. ciceꝝ cōſeruātiū adhuc nitroſitatem ſuā cū lib. xx. aq̄ facili decocōe vſqȝ dū redeāt ad lib. x. tunc erit aq̄ eoꝝ potus medicinal̄: ⁊ ꝓp̄e lauatiu⁹: ⁊ abſterſiuus: ⁊ apitiu⁹ oppilationū tā p̄cordioꝝ q̄ꝫ nutritiuorū: ⁊ viaꝝ vrine: frāgitiu⁹ lapidū in eis: ⁊ mūdificat viſcera: ſiti tn̄ nō tollit. Et ſi vlteriorē excipiat coctionē: ⁊ cum plurima aq̄ vſqȝ dū acgrat medioeritatē iter tenue: ⁊ iunctum eſt cib⁹ bon⁹ egritudib⁹ ſ̄flaticis. Ueꝝ oȝ vt det̄ colat⁹. Ex ciceribꝰ āt a qb⁹ iā expoliata fuerit nitroſitas: fiunt iuſc̄la icitātia vētrē: ⁊ ipiguātia. Sermonē i aq̄ mell̄ iā ſcripſim⁹ i antidotario nr̄o: q̄re nō ē hic neceē repetere.

¶ Haboali. Juleb alcheſmes ꝯferēs cū auxilio dei pleureſi: ⁊ dolorib⁹ pectoris. ℞. alcheſmes ⁊ paſſulas ⁊ decoquant̄ in aqua ꝯcoctōe ſufficiēti: ⁊ accipe huius aq̄ partē .i. penidiarum partem. ſ. decoquat̄ vſqȝ dum ſufficit ſm eundem modum fiat iuleb.

¶ Idem. Sirup⁹ ꝯferēs tuſſi: ⁊ pleureſi. ℞. ſucci granatorum dulciū lib. ij. ſucci cānaꝝ mell̄ lib. i. penidiaꝝ tātū

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0221-5
DFG

dem. Fiat ex eis ſirupus bonus: ſi deus voluerit.

¶ Joannitiꝰ. Juleb ſubtile ꝯferẽs pleureſi cũ iflãmatõe ⁊ ſiti. Accipe ſucci melõis idi: aut ſucci cucurbite aſſe lib. iiij. çuccari lib. iij. Fiat ex eis ſyrupꝰ: ⁊ deṯ cũ aq̃ ordei.

¶ Idẽ. ſyrupꝰ violaceꝰ ꝯferens febribꝰ ⁊ pleureſi: ⁊ tuſſi ſicce. ℞. violaꝝ recẽtiũ: ſeminũ citonioꝝ: ⁊ citruli. añ. ʒ. x. ſemis malue. ʒ. xij. gũmi arabici. ʒ. viij. dragaganti. ʒ. iiij. Funde ſup ea aq̃ calide lib. vij. ⁊ dimitte die ⁊ nocte: deinde bulliat ad ꝯſumptõez medietatis. Deide cũ penidiaꝝ lib. ij. ⁊ ſ. fiat ſyrupꝰ. Da cuz aq̃ ordei: ⁊ mucilagine pſilij: mane ⁊ ſero.

¶ Iſraelita. Sirupꝰ ꝯferens pleureſi: ⁊ catarro calido: ⁊ tuſſi calide cũ aſpitate: ⁊ ſiti vehemẽti factis cã ſiccitatis tẽporis. ℞. iuiubaꝝ pinguiũ: ſebeſten: añ. c. violaruz: ſiracoſt. añ. ʒ. x. ligritie: floꝝ lingue bouis domeſtice. añ. ʒ. xij. ſemis malue: citonioꝝ: añ. ʒ. v. ſup ea ꝓyce aq̃ calide lib. vij. ⁊ dimitte die ac nocte: deide coq̃ vſqꝫ ad ꝯſũptionem medietatis: ⁊ cũ çuccari lib. ij. ⁊ ſucci maloꝝ granatoruz dulciũ lib. i. Fiat ſirupꝰ. da cũ aq̃ ordei: ⁊ mucilagie pſilij.

¶ Idẽ. Syrupꝰ ꝯferẽs pleureſi cũ iflãmatiõe: ⁊ acuitate vehemẽti: ⁊ tuſſi difficili. ℞. aq̃ cucurbite libr. iij. ſiracoſt: violaꝝ. añ. ʒ. xx. pulpe caſſiefiſtule. ʒ. x. Infundanṯ oia ꝑ diem ac nocte in ſucco ꝑdicto calido. Deide frica mãibus ⁊ cola: ⁊ cũ ſucci granatoꝝ dulciuz: li. i. ⁊ çuccari lib. ij. fiat ſirupus. da vt ſuperius di[illegible].

¶ Hamec. Sirupus de violˀ ꝯferẽs pleureſi: ⁊ tuſſi caſe. ℞. violaꝝ. ℥. ij. ſeminũ citonioꝝ: ⁊ malue. añ. ℥. i. iuiubaꝝ: ſebeſten. ana. xxx. Decoq̃ in lib. vij. aq̃ cucurbite ad tertie partis ꝯſumptionẽ. Et cũ çuccari lib. ij. fiat ſirupus.

¶ Filius Zacharie. Cõfectio trociſcoꝝ feſtinãtiũ maturationẽ in pleureſi: ⁊ facilitãtiũ ſputũ. ℞. violaꝝ: ſucci ligritie. añ. ʒ. x. dragagãti: amili: ſemis altee: ſeminis feniculi. añ. ʒ. iij. cõfice cũ mucillagibꝰ: ⁊ ꝓꝑe pſilij: ⁊ ſeminũ citonioꝝ: ⁊ ſemis lini. Et ſit doſis. ʒ. i. cũ ſirupo violato.

¶ Idẽ. cõfectio vnguẽti leniẽtis pectꝰ ⁊ facilitãtis ſputũ. ℞. olei violaꝝ. ʒ. iiij. mucillagis ſeis lini. ⁊ ſeis citonioꝝ: ⁊ mucillagis ſeis altee. añ. ʒ. iiij. mucillagis ordei mundi cocti ad ꝑfectionẽ vſqꝫ dũ rubeſcat. ℥. i. ⁊ ſ. ſucci radicũ lilij. ℥. i. cere pure. ℥. i. aggregenṯ oia bona aggregatõe: ⁊ iungatur cum eo pectus: bonũ ſi deus volnerit.

¶ Sabor rex medoꝝ. Deſcriptio vnguẽti ſedãtis dolorẽ ⁊ leniẽtis ſputũ. ℞. olei violati. ℥. ij. cere. ℥. ſ. adipis anatis ⁊ galline. añ. ʒ. v. yſopi hũide. ʒ. viij. butiri ouiũ loti ſepe in aq̃ ordei. ʒ. iiij. mucillagis ſemis lini: ⁊ altee. añ. ʒ. x. Et fiat ex eis vnguẽtũ bonũ: ⁊ expertũ. Et ſi mã cõpactior fuerit: pone pro oleo violato oleum de lilio.

¶ Idem. Cõfectio emplaſtri mirabilˀ ad ea q̃ diximꝰ. ℞. folioꝝ violaꝝ. ʒ. v. radicũ lilij. ʒ. x. farine ordei: ⁊ fabaruz. añ. ʒ. vi. ⁊ ſ. mucillagis maluauiſci: ⁊ ſemis citonioꝝ: ⁊ ſemis lini. añ. ʒ. xij. floꝝ camomille dragagãti. añ. ʒ. vij. cere. ℥. ij. olei violati. ℥. viij. rob q̃ntũ ſufficit aggregenṯ oia ⁊ decoquanṯ: ⁊ ſuppone. Si aũt materia cõpactior fuerit: ⁊ indiget reſolutione addatur in eo farine ſemis lini. ℥. i. ⁊ ꝓ oleo violato ponaṯ oleuz de lilio. Et ſi caliditas itenſior fuerit adde eis ſucci folioꝝ cucurbite: nẽufaris. añ. ʒ. xij. ⁊ ſubtrahimus ſemen lini.

¶ Idẽ. Aliud ſedãs dolorẽ ⁊ maturãs. Accipe farine ordei: melliloti. añ. ꝑtẽ. i. farine fenugreci: ſemis lini. añ. partem. ſ. ſemis papaueris albi ꝑtis vniꝰ tertias. ij. aut corticum papaueris partem. ſ. vitellum oui vnum. rob q̃ntum ſufficit ad aggregandum ea.

¶ Filius amarã. Emplaſtrũ cõferẽs pleureſi. Accipe violaruz ſiccaꝝ: furfuris farine albe: farine ordei ⁊ fabarum malue: camomille melliloti ꝑtes eq̃les. Cõfice cũ cera et oleo violato q̃ntum ſuffic: ⁊ vtere. Et ſi neceſſitas expetit ad maiorem reſolutionem: adde ficus albas farinam ſeminis lini ⁊ fenugreci.

¶ Si aũt reſolutio quã q̃rimꝰ nõ fuerit poſſibil: imo tendit ad hoc vt ſuppureṯ: ⁊ hoc ſignificaṯ ex eo qȯ nõ mũdificaṯ in decimoquarto die: imo multiplicaṯ dolor cuz febre: ⁊ difficultas ⁊ cõſtrictio anhelitꝰ ⁊ tuſſis ⁊ alia. Et tũc diuertemꝰ noſtrã ꝯſiderationẽ ad iueſtigãdũ q̃litatẽ accidentiũ ſignificãtiũ ſup alteꝝ duoꝝ ex his q̃ cõprehenditrõ de eſſe vͭtutis. Nã ſi dolor cũ ꝑdictis acciñtibus nõ mitigatum fuerit: neqꝫ ꝑꝑ ſtomiã: neqꝫ ꝑꝑ ſputũ neqꝫ ꝑꝑ alia ſedaṯ: ⁊ vͭtus nõ fuerit fortis expecta caſum eiꝰ ⁊ mortem.

¶ Et dixit Hyppo. ꝙ qñ pleureſis nõ reſoluiṯ nz mundificaṯ vſqꝫ ad diẽ. xiiij. tunc ꝑmutaṯ ad collectionẽ. Et tũc oz vt ars ꝑducẽdi collectionẽ ad ſuppurationẽ: ⁊ ex ſuppuratiõe ad ſtatũ icolumitatis dirigat itentionẽ nr̃az ad ſex res. Prima qdẽ eſt maturatio apatis. Scḋa eſt igeniatio ad rupturã eius. Tertia eſt abſterſio ⁊ mũdificatio materieꝝ. Quarta eſt mũdificatio: ⁊ ꝯſolidatio. Quita ẽ correctio accidentium. Sexta eſt reꝝ ſex regulatio.

¶ Primã igiṯ rẽ ꝯplent adminiſtratões medicaminuz aggregantiũ in ſe vͭtutẽ lenificatõis vel ſilˀ ⁊ reſolonis vt cadat maturatio eq̃liter in mãm iã collectã: ⁊ illã qdẽ oz vt latitudinẽ cum gradatõe adminiſtrationis medicaminum habeat icipiendo ab eis q̃ ſunt in gradu tẽperate ꝯplexionis extẽdendo ad ea q̃ ſunt maioris eleuatõis: donec perueniaṯ ad gradũ fortiũ. Et ſcias qm̃ ꝑncipiũ opatõis medicamis fortis ineq̃lẽ facit maturationẽ: aut ante maturationẽ apoſtema aperit. ¶ Maturatiuoꝝ ãt q̃dã operantur adminiſtrata iterius ꝑ os. Et q̃dã exteriꝰ. ⁊ ex iteriꝰ operantibus ⁊ tẽperatis eſt aq̃ decoctiõis ficuũ ſiccaꝝ: ⁊ dactilorum: ⁊ fortius eis eſt decoctio vtroruqꝫ: ⁊ ex eis ẽ decoctio fenugreci: ⁊ ficuuz ſiccaꝝ cum rob: aut ſine eo: aut paſſulaꝝ ⁊ fenugreci: aut aqua ordei ꝺcoctõis ficuũ ſiccarum vel radicũ lilij cum melle. Et ex eis eſt fortius decoctio ficuũ: paſſulaꝝ enucleataꝝ: dactiloꝝ: fenugreci: ⁊ ſemis malue cũ meibuteg: ⁊ ſi fuerit in eo caliitas vehemẽs tũc cõueniẽs eſt aq̃ ordei cũ iuleb ſubtili: aut cum aq̃ mellis: aut cum aq̃ decoctiõis maluaꝝ: aut ſeminum eaꝝ aut altee: aut radicis lilij aut ficuũ ſiccaꝝ ⁊ paſſulaꝝ: aut ſeniculi: aut ſeminum citoniorum ⁊ ſimilium.

¶ Cõfectio trociſcoꝝ facientiũ maturationẽ: ⁊ ꝓꝑie cũ nõ eſt caliditas vehemẽs. ℞. ſeminuz malue altee: farine fenugreci: ſemis lini: amili: farine ciceruм: ſucci ligritie terniabin. ana. fac trociſcos cũ mucillagine ſemis lini. Da cũ eo qȯ conuenit ex potibus.

¶ Confectio alia trociſcoꝝ cõferẽs ei cum quo eſt caliditas: ⁊ febris vehemens. ℞. violarum ſiccaꝝ dragaganti: amili: ſucci ligritie: ſeminum citonioꝝ: ſeminuz citrulli: ⁊ melonis: ⁊ cucurbite: ſeminũ malue: altee: floꝝ melliloti. añ. Fac trociſcos cũ mucillagine ſeminũ citonioꝝ: aut ſeminũ lini. da cum eo qȯ conuenit ex potibus.

¶ Extrinſecus aũt operantium q̃dam ſunt embrocationes: ⁊ ꝓꝑie ex aq̃s decoctõis malue aut altee: aut fenugreci: aut ſemis lini: aut citonioꝝ ⁊ ſimilium adminiſtrare cum ſpongys. Et qñqꝫ additur eis: qȯ eſt ſicut mellilotũ: ⁊ anetum ⁊ herba vitri: quando opz ſedare dolorem. Et quando opz ꝙ ſint linitiones ⁊ proprie que ſunt ſicut cera: et oleuz imbibita in mucillagine pſilij: ⁊ ſeminũ malue: aut in mucillagine fenugreci ⁊ ſemis lini: ⁊ altee: ⁊ ſimilium. Et ex eis eſt adeps galline ⁊ anatis: ⁊ ſimilia. Et fortiꝰ eis eſt diaquilon diſſolutũ in oleo de lilio. Et adhuc fortius quod fit ex mucillagine radicum malue: altee: farine ordei: fenugreci: ſemis lini ⁊ ſemis citonioꝝ: ⁊ melle aggregatis cũ butiro loto ⁊ ceroto facto ex oleo ⁊ cera. ¶ Et q̃cunqꝫ ſunt emplaſtratões ⁊ ꝓꝑe cũ eis q̃ fiunt ſiĉ ex farina ordei ⁊ mucillagine ficuũ cũ melle ſilˀ coctis aut ex farina ordei ⁊ mucillagine cũ melle ⁊ oleo veteri aut ex [illegible]

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0222-1

ctilis ⁊ farina frumēti ⁊ rob: ⁊ ex valde bonis eſt qđ fit ex
oleo ⁊ folijs cauliū ⁊ farina fenugreci cū butiro ſil' coctis ⁊
ſil'r ex radice lilij cocta cuꝫ rob: ⁊ butiro. Et forti⁹ eis ē qđ
fit ex farina ordei ⁊ ſemie lini ⁊ fenugreci ⁊ ſemie malue
coctis cū mucillagine ficuū ⁊ altee cum melle ⁊ butiro ⁊
rob ⁊ adipe antiquo. ⁊ adhuc fortius ſi addaꝛ eis galbanū
diſſolutū in rob aut vino dulci. Et adhuc fortius ſi addaꝛ
ex fimo columbino. ⁊ forti⁹ adhuc ſi addaꝛ vtrunqꝫ. Hoc
autē medicamē iterdū collectionē vſqꝫ ad ptes cutis ad
ducit. Et ſi addaꝛ in medicamie herbe albedeſtur aliqđ
operabiꝛ id vehemētius. Et cōfert in hac hora adminiſtra-
tio getis ⁊ ꝓprie in aere geto ⁊ tpato ad caliditatē ⁊ hūidita
tē declini. ¶ Cibos aūt māducēt. maluas blitas ſiclam a
triplicē cum oleo amigdalino. Et ex ſuma oleoꝝ meli⁹ eſt
leureng: eſt. n. ei cib⁹ ⁊ medicina citā ⁊ facilē faciēs apātis
maturationē: ⁊ laudaꝛ eis aliqđ tereniabin ⁊ ius ciceruꝫ
dulciū cū melliloto ⁊ ſorbitōes frumētales ⁊ ius cauliū ⁊
ſimilia. ⁊ cōcedaꝛ eis in ſcđa mēſa ficus ſicce elixe ⁊ dacti
li hūidi ⁊ cheſines ⁊ poma dulcia elixa ⁊ cāna mell' ⁊ ſilia.
¶ Secundam rem cōplent adminiſtratiōes medicami-
nuꝫ aggregantiū in ſe v̄tutē lenitōis ⁊ apertōis cū igenia-
tionibus ex modis operationū. Et ad hoc qdē gen⁹ medi
caminis pueniendū eſt cum iam factū eſt dubelati. ⁊ hoc
quidem ſignificatur ex remiſſione doloris ⁊ febris a mul
tiplicatione grauedinis in loco collectionis.
¶ Medicamia aūt qbus ieſt ꝓprietas hoc facere ex eis
q̄ ſumunꝛ per os ſunt ſicut ſirup⁹ de yſopo ⁊ de praſſio. Et
ex eis efficacior ē ſirup⁹ de ſucco herbe albeduſtur ⁊ mel-
le aut apoçima decoctiōis ei⁹ cū modico fermenti ſiml' di
ſtemperatis ⁊ coctis. Et fortius eis eſt ſucc⁹ ipi⁹ cū fermē
to ⁊ melle. Et adhuc fortius ſi addaꝛ eis baurach modi-
cum ⁊ eſt forte. ⁊ confert in hac hora: ⁊ ꝓprie cum natura
eſt fortis ⁊ febris nō eſt: adminiſtratio tiriace ⁊ mitridati.
¶ Feſtinant enim ⁊ facilitant apertioneꝫ. Et ſimiliter ſi
napis cum aqua mellis aut aſſa fetida cum lacte.
¶ Ex his aūt qbus liniꝛ extra eſt emplaſtrū factū ex her
ba albeduſtur ⁊ butiro aut adipe antiquo ⁊ melle. ⁊ forti⁹
eis eſt ſi addatur ex fimo columbino ⁊ fermento: ⁊ adhuc
fortius ſi addatur baurach.
¶ Modi aūt operationū qbus ingeniamur ad apertōeꝫ
apātis ſunt ꝓuocatio tuſſicule hora poſt horā. ⁊ forti⁹ eo
eſt ꝓuocatio vomitus ⁊ cōfert ante horam eruptionis vt
dormiat ſuper latus infirmū: deide reuoluaꝛ ſubito ⁊ im
petuoſe ad latus ſanū: ⁊ ſunt ex igeniantib⁹ q mouent et
agitant eos lecto penſili aut in cunis ⁊ ſunt qui agitant ſe-
dem in qua ſedent gubernando eos ne cadant.
¶ Et ſint cibi eoꝝ in hac hora ſorbitōes fermētate ex fa-
rina cū melle aut. tri. aut ex farina ordei aut tritici aut ci-
cerū. Et panis fermētatus īfuſus aq̄ mellis aut rob: ⁊ ꝯce
dunꝛ eis oua ſorbilia cū pane. ⁊ lac calidū ſic̄ mulgeꝛ cum
pane ⁊ paſſule ⁊ ficus ſicce cū pane. Et comedāꝛ i ſecūda
menſa grana pinearum cū ficubus ſiccis ⁊ amigdalis dul
cibus ⁊ amaris ⁊ ſimilia. ¶ Uex ſi cū hac arte apā nō rū
pitur: tūc eſt timoroſum: q̄re opꝫ vt aperiaꝛ collectio cuꝫ
flobotomo: aut cauterio vt ſanies egrediaꝛ ⁊ nō ſubito ne
ſupueniat ei qđ eſt ſic̄ debilitatio ⁊ ſincopis ⁊ mors.
Quare oporꝫ vt paulatiꝫ oī die extrahaꝛ ⁊ cū cautela.
¶ Cuꝫ aūt ſanies q̄ expuiꝛ poſt apā iam fractū aut egre-
diꝛ poſt apertionē iā factā fuerit alba ⁊ vncta eq̄lis nō ha
bens de odore corruptōis aliqđ oīo febris ꝯtinuaꝛ remiſ-
ſio paulatim: tunc eſt aliqđ de quo eſt ſpes ad icolumita-
tem: ⁊ ꝓpe qn̄ ꝯtinuanꝛ ei qnqꝫ alie ſignificatōes laudabi
les q̄ ſūt ꝓpe lenitas qēs iocunditas ⁊ deſideriū cibi ⁊ bo
nitas aliaꝝ operationū. vꝫ. nāliū ⁊ ſpūaliuꝫ: q̄re in hac oꝫ
hora vt ꝯſerues v̄tutē cū carnib⁹ ⁊ cibis tēpatis neqꝫ ter
rēdum de febricula: qm̄ eradicabiꝛ paulatī exeūte ſanie.

¶ Cum aūt accidētia in contrarium eoruꝫ que diximus
apparuerint: tunc eſt illud de quo deſperabitur.
¶ Inquit hyppo. terminus rupture h⁹ apātis qnqꝫ p̄ſcri
bitur in. xx. diebus: qnqꝫ. xl. ⁊ qnqꝫ. lx. ⁊ illud iō: qꝛ quāto
accidentia collectionis fuerint vehemētiora: tāto ſtatus
vicinior ⁊ eruptio velocior. ⁊ q̄to accn̄tia leuiora ⁊ pigrio
ra fuerint tanto ſtatus ⁊ eruptio remotior. Accidentia āt
ſup hec ſignificātia ſūt febris ⁊ dolor. Hec. n. vehemētia
aut remiſſa citā aut tardam eruptionem declarant.
¶ Tertiam rē cōplent adminiſtratiōes medicaminū a ſa-
nie mundificantiū poſt collectiōis eruptionem. Et qdem
hoc ſm̄ exigentiā declinatōis ſaniei. In qbuſdā. n. tranſi-
tum habēs per pulmonē excreaꝛ cū tuſſi. In qbuſdaꝫ v̄o
recipiꝛ in vacuitate corporis ⁊ ſubītrans ꝯcauā venā trā
ſit ad epar: ⁊ ſi qdem aūt in ptē cōcauam eius declinabit
ad īteſtina magis ſic̄ ad ꝓpinquores duct⁹ aut ad ptē gib-
boſam ipſi⁹ ⁊ declinabit ad vias vrine: ⁊ i qbuſdā fit poſt
rupturā ad nullā partiū ſaniei declinatio q̄re ꝯculcaꝛ ibi
dem ⁊ ē mā morboꝝ difficiliū ⁊ ptiſis ⁊ qnqꝫ p̄focat mul
titudine ſua. Quib⁹ oībus iā ſuccurrim⁹ vt mundificeꝛ a
p̄ncipio vulnus. Niſi. n. ſic̄ hyp. dixit vſqꝫ ad. xl. dies mun
dificatum fuerit faciet cadere in ptiſim.
¶ Cū āt nā expulſionē ſaniei p os iam fecerit abſterſiua
mūdificatiua lauatiua medicamīa ante dari oꝫ: ⁊ in gn̄e
eoꝝ eſt aq̄ mellis laudabilior ⁊ aq̄ çuccari ⁊ iuleb. ⁊ ſimi-
liter aq̄ ordei ⁊ aq̄ ciceꝝ ⁊ fortius eis eſt ſecaniabin Hal.
qđ ſcriptum eſt in caplō qđ ē ante iſtud. Et adhuc eis for
ti⁹ eſt decoctio yſopi ⁊ ſirupus ipſius ⁊ decoctio radicum
lilij celeſtis: ⁊ ſyrupus eius mellinus.
¶ Huius ēt itentōis eſt lohoc de caulibus ⁊ lohoc de ſql
la ⁊ electuarium de orobo ⁊ loch de aleis eſt vehementis
v̄tutis in hac pte: ⁊ alea aſſa cuꝫ melle ⁊ butiro: ⁊ nos hec
ſcripſimus in capitulo de aſmate ⁊ tuſſi. Plura preterea
⁊ diuerſa ex eis que pectus ⁊ pulmonem a putredinibus
mundificant ſcripſimus ibidem que ibi requirantur.
¶ Cōfert ēt vomitus ꝓuocatio cum interpolatione cum
aq̄ mellis ⁊ ſale aut cū aqua mellis ⁊ baurach aut ſinapi.
¶ Cōferunt ēt ſuper locū embrocationes ⁊ linimenta ⁊
emplaſtratōes ⁊ ꝓpe ex reb⁹ q̄ adiuuāt ad mūdificatōeꝫ.
Et ex ſuma eoruꝫ eſt decoctio albaſce aut yſopi aut yreos
aut ſiliium adminiſtrata cū ſpōgijs. Et qnqꝫ miſceꝛ cuꝫ eis
qđ eſt ſic̄ ſpica ⁊ lignū balſami ⁊ grana ei⁹ ⁊ bueg ⁊ ariſto-
logia rotūda. Et ex eis q̄ liniūꝛ ſup locū. ē oleū de ſpica ⁊
oleū de alcāna ⁊ oleū de lilio ⁊ oleū camomille ⁊ aneti.
et forti⁹ ē eis oleū đ hyreos ⁊ adhuc forti⁹ ē oleū balſami.
¶ Emplaſtratōes aūt opꝫ vt fiāt ex eis q̄ ſūt ſicut camo
milla mellilotū ſpica ⁊ farina ordei fenugreci: ⁊ ſemis li
ni ⁊ ſemis malue cōgregatis cū ceroto qđ fit ex yſopo hūi
da ⁊ oleo de lilio ⁊ oleo nardino ⁊ oleo de yreos ⁊ cera. et
fortius eis ē ⁊ ꝓpe qn̄ q̄riꝛ ex vnctōe ⁊ ꝓpe factū ex alu-
mie ſulfure ⁊ aſphalto aggregatis cū oximelle. Et qdem
ſup his canō eſt medicialia h⁹ nō eē euanda ab aliq̄ triuꝫ
ꝓprietatū. Et p̄ma qdē eſt vt ſit abſterſiua ⁊ mūdificati-
ua. Scđa vt ſit membri p qđ eſt ſaniei trāſitus ꝯfortatia.
Tertia vt ſint expulſiōes facte p illud mēbrū facilitātia.
¶ Et p̄mū qdem pficiꝛ cuꝫ eis q̄ ſūt ſic̄ aq̄ mellis ⁊ aqua
çuccari ⁊ ſirup⁹ mellin⁹ ⁊ alia quoꝝ p̄ceſſit rememoratio.
¶ Scđm vero cū eo qđ eſt ſic̄ yſop⁹ baſce keſmes: ⁊ ſilia
i expulſione facta per pulmonē ⁊ ſic̄ ſpica ⁊ cordumeni ⁊
amigdale amare ⁊ ſimilia in expulſiōe facta per epar ad
vias vrine. ⁊ ſicut trociſci diarodon ⁊ maſtix ⁊ ſuch ⁊ ſimi
lia facta in expulſione per epar ad inteſtina.
¶ Tertiū v̄o pficiꝛ cuꝫ eo qđ eſt ſic̄ yreos ⁊ ſemē alcurat
⁊ cartam⁹ ⁊ ſilia qn̄ ſanies expurgaꝛ ſputo. Et ſic̄ đcoctio
feniculi: ⁊ apij: ⁊ aq̄ ciceꝝ ⁊ ſilia qn̄ expurgaꝛ p vrinā. ⁊ ſic̄
ſal ⁊ baurach ⁊ cartam⁹ qn̄ fit expurgatio per inteſtina.

¶ Et ſunt ex medicis q̄ aggregāt in ſe oēs itentiones ſicꝫ
ius galli antiq ⁊ mel ⁊ ligritia ⁊ capillus veneris. ⁊ yſopꝰ ⁊
caſſiafi. ⁊ māna ⁊ ſilia. Hec.n. adiuuāt ad expulſiōes oēs
quas diximꝰ. Et ſūt ex medicinis magnis q̄ ēt aggregant
oēs has itentiōes: ſed nō ſunt ad miſtrāde niſi cū morbꝰ
ꝓprie cronicaꝫ. ⁊ ſūt tiriaca ꝓpe ⁊ mitridatū ⁊ athanaſia.
mūdificāt enī hec ſufficienter. ⁊ ex eis eſt ꝯfectio mirabi-
lis relata ad Archigenē quā ſcripſimꝰ in caplo de tuſſi. ⁊
ſilr medicamē de piperibꝰ. Verū ſuper his cautela adhi-
benda eſt. oꝫ.n. febre lenteſcēte dari ⁊ nā nō debili exiſtē-
te ⁊ cū melle plurimo aut aqua mellis vt exiccet ſanies ⁊
mūdificet locus. ⁊ ſit potio eorū circiter auellanā vnā vel
duas ſm exigētiā rei: cū eo qd ꝯuenit ex potibꝰ ⁊ ꝓpe cuꝫ
aq̄ mellis. In craſtinū aūt ſic q̄titas eorū minor ſic ſemꝑ
diminuendo donec perueniatur ad mel ſolum.
¶ Et ſi nō plene cū his mundificet: iterū redeat ad illa: ⁊
iterū ſi oꝫ ꝓcedat eadē doctrina vſqꝫ ad id qd exiccet in
totū. Et ſi cū hoc regimie adhuc nō mūdificabit plene: ac-
celerabimus cū ſapiētia ⁊ admiſtrabimꝰ medicinā ex ar-
ſenico ⁊ ſulfure ſm ſciāꝫ traditā a nobis in caplo de aſma-
te: ⁊ tuſſi. Hec.n. exiccāt cū fortitudie. Et ſi cū his ꝯſtrin-
git anhelitꝰ redeūdū eſt ad ea q̄ dilatāt ipm: ⁊ educūt ſa-
nieꝫ ſic aq̄ mellis cū medicamie yſopi. ¶ Et ſi ſupcalefi-
unt ex eorū admiſtratōe: redeundū eſt ad aquā ordei cuꝫ
aq̄ mellis: ⁊ iuleb ⁊ ſilia. Cū aūt hec accidētia ceſſauerint
.ſ. ꝯſtrictio anhelitꝰ ⁊ ſupcalefactio: ⁊ exiccatio iterent̄ ꝑ-
dicta cū viciſſitudine ſecundum exigentiaꝫ neceſſitatis.
¶ Cibi aūt eorū ſint ſicut aq̄ cicerū: ⁊ alterauiabin: ⁊ ſorbi-
tiōes ſubtiles ex farina cicerū ordei ⁊ fabarū cū oleo amig-
dalino ⁊ melle ⁊ çuccaro ⁊ ius cauliū cū oleo amigdalino
⁊ q̄nqꝫ cū gallinis niſi febris vehemētia ꝓhibeat ⁊ ius gal-
linarū antiquarū: ⁊ ius galli antiq: ⁊ carnes pulline ⁊ edie:
⁊ addat eis in cibis: aut iuribꝰ eorū duꝫ res expoſtulat ex
pipere aliqd. adiuuat.n. ad mūdificādū: ⁊ exiccanduꝫ. Et
ꝑcepit Hali. dari cepas ⁊ alleū in ieiunio vt vulnꝰ nō clau-
dat: donec mundificet. Et ꝑcepit duꝫ ſanies ad inteſtina
declinat dari cibaria q̄ ventrē moueant. ſic ꝓprie malua
bleta atriplices ⁊ leureng. Et cū per vias renum educere
volueris: dari q̄ ſunt ſic aſparagi: aut baucia: ⁊ ſimilia.
¶ In ſcda vero mēſa comēdat grana pini amigdalas cū
melle: ⁊ ſemia feniculi: ⁊ dactilos hūidos: ⁊ ſilia. Et cōce-
dunt ēt poſt cibos poma dulcia: ⁊ citonia: ⁊ pira: ⁊ ꝓprie
ſceburc: ⁊ ſilia. Potū aūt damꝰ eis vinū dulce: ⁊ vinū al-
keſmes: ⁊ vinū de paſſulis ⁊ aq̄ mellis: ⁊ aq̄ çuccari.
¶ Si aūt collectio corrūpit: ⁊ diffundit ſanies i loco col-
lectiōis ad nullā partē declinās: tunc oꝫ cauteria ſup co-
deꝫ loco. iiij. vel. v. vel plura ſi neceſſitas expetit imprimi
cū cauterio puncti: ⁊ ꝑforet pectus vſqꝫ ad locū ſaniei. Et
hoc ſi fuerit in pectore. Si āt fuerit in latere aperiat cuꝫ
ſagitella vſqꝫ dū ꝑueniat ad ſaniē: vt extrahat ⁊ exiccet
extractōibus remouētibus māꝫ donec ſanies paulatim
exiccet in totū mundificatōibus ⁊ abſterſiōibꝰ quotidie
factis cū aq̄ mellis. aut cuꝫ vino mellito ⁊ ſimilibus.
¶ Quartā rem ꝯplēt admiſtratōes medicaminū aggre-
gantiū nunc virtutē abſterſiōis ⁊ mūdificatōis: nunc vo
icarnatōis ⁊ ꝯſolidatōis. ⁊ oꝫ medicamia hꝰ ſibi iuicē ſuc-
cedant vſqꝫ dū plena appareat ſanitas. Et dictū eſt aquā
mellis abſterſiuū bonū eſſe. Et dictū eſt de aliis q̄ nō opꝫ
nūc iterare. Et iam qdē cōpertū eſt i lacte caprino: aut aſi-
nino aggregari itentōes duas. ſ. abſterſiōis ex ꝑte aquei-
tatis eius ⁊ ꝯſolidatōis ex ꝑte caſeitatis eius. Et oꝫ vt ſit
lac calidū ſtatim cū mulget: ⁊ ſit poſt bonū paſtū: ⁊ ꝓprie
deſiccatiuū. Verū aſininū lac ſubtiliꝰ eſt q̄ caprinū, capri-
nū vo tēperatiꝰ eſt eo. Et aq̄ decoctōis ordei: ⁊ cācrorū flu-
uialium aggregat ſilr itentōes duas ꝑdictas: ⁊ ſilr lac co-
ctum cū oleis. Medicinarū aūt icarnātiū ⁊ ꝯſolidātium

vulnera pulmōis ⁊ pectoris: ſūma dicta ē in caplo de ſpu-
to ſanguis: q̄re oꝫ: vt pars illa afferat ad locū hunc. Et lo-
q̄mur adhuc de eis in caplo de ptiſi ſi deꝰ voluerit. ¶ Ci-
bi aūt eorū ſint carnes paruarū auiū: ⁊ extremitates edorū
⁊ porcorū iuuenū ⁊ arietū caſtratorū: ⁊ riſum cū gallinis: ⁊
tri. ⁊ ſorbitōes tenere ex frumēto cū carnibus. Et ex va-
de iuuātibus ſunt ſorbitōes ex farina orobi: aut ex farina
riſi cum lacte. Et lac coctū cum eis eſt cibꝰ delectabil: ⁊ ꝓ-
prie cū lapidibus fluuialibꝰ: aut calibe: ⁊ ſilr caſeus recēs
⁊ ſilr ſorbitōes ⁊ pulmēta ex lacte cū farina cicerū: aut fa-
barum: aut amili. Caueat āt idigeſtio eiꝰ. ꝯtingēs.n. ex la-
cte moleſta eſt: ⁊ inimica ⁊ ꝓprie q̄tū eius nutrimētū eſt
amicū. ¶ Potꝰ eorū ſit vinū mediocriter ſtipticū: ⁊ vinū
albū antiquū: ⁊ vinū antiquū dulce eſt bonū eis: ⁊ aqua i
qua extinguit ferrū: aut aq̄ de minera ferri: ⁊ aq̄ roſata ⁊
aq̄ pluuialis iſuſiōis gummi aſſi: ⁊ ſilia: ⁊ laudat eis rob
myrtinū: ⁊ ſirupus eiꝰ: ⁊ miua cū aq̄ maſticis. Et nō negli-
gant excellētie çuccari roſati ⁊ admiſtratōes eius oī ho-
ra. Fortaſſe.n. eſt ipm ſolū medicia curans eos. ⁊ nos di-
ximus in caplo de ſputo ſanguis ſm ſmonē Halie. ⁊ dice-
mus hoc latius in caplo de ptiſi ſi deus voluerit. Medi-
cinarū aūt ſūma: que admiſtrat emplaſtrando dicta eſt in
capitulo de ſputo ſanguinis.
¶ Quintā rem ꝯplent adminiſtratōes medicinarū ſedā-
tium accidentia in tota cure latitudie ſupuenietia: ⁊ ſunt
vehemētia doloris: ⁊ febris: ⁊ prauitas anguſtie: ⁊ ſitis: et
tuſſis vehemēs: ⁊ ſtrictio anhelitus ⁊ vigilie: ⁊ faſtidiū ci-
bi: q̄ tēpore collectōis: ⁊ maturatōis timoroſa ſūt: matu-
rata āt ea ſuſpecta ſūt magis. poſt eruptionē āt ipſiꝰ rema-
nētia mortalia ſūt. Verū ex eis q̄dā remanētia ſunt ſꝫ ma-
gis ⁊ minꝰ ſuſpecta: ⁊ q̄dā corrigi poſſunt: q̄dā āt minime.
Ingt.n. Hyp. dolor ⁊ febris circa ſaniei generationē ve-
hemētiora ſunt. gn̄ata aūt ea remiſſiora: ⁊ amplius remiſ-
ſiora poſt eruptionē ipſiꝰ: ⁊ adhuc amplius mūdificata: ⁊
exiccata ea. Si aūt in ꝯtriū hoc acciderit: tunc nil aliud ni-
ſi peſſimitas ⁊ ꝓfūda corruptio ex prauitate venenoſita-
tis ſignificat: ⁊ hec qdē vere mortalis: ⁊ teſtat hoc virus
apparēs: ſicut amurca ⁊ fetidū. ⁊ hoc qdē icorrigibile de-
ſperandum oio. ¶ Et hoc idē de prauitate anguſtie dici-
mus. ⁊ ſilr de tuſſi ⁊ ꝯſtrictōe anhelitus. Vigilie āt ſitis ⁊
appetitus defectio aliā atqꝫ aliā poſſunt habere cām pro-
pter qd nō iudicāda mala ſimplr. Vigilationē aūt efficit
mala cerebri cōplexio ſicut ſiccitas: ⁊ hauracitas ex ma-
la humiditate occultata in ipſo. Aliquādo aūt efficit fre-
quens agitatio ſuper aliqua re: ⁊ iaꝫ qdem diximus curā
eius in capitulo de ſabara. Sitis etiam cām poteſt habe-
re extraneā. ſicut eſt proprie ſalſuginoſitas ex mala qua-
litate exiſtente in ſtomaco: aut caliditas: aut ſiccitas i ori-
ficio ipſius. ⁊ alia ſicut dicemus in capitulo ſuo: ⁊ curat ſi-
cut dicemꝰ ibi. Et ſilr defectio appetitus pōt hr̄e cauſas
quas etiam dicemus in ꝓpriis capitulis.
¶ Sextam rem cōplent adminiſtrationes regiminū ex
generibus reruꝫ ſex ſm exigentiā quqꝫ canonū ſupraſcri-
ptorum. Et hoc quidem dictum eſt.
¶ Filius Zacharie. Confectio trociſcorum qui admini-
ſtrantur cum aqua ordei cum qua cocti ſunt cancri flu-
uiales: ⁊ ſirupus de papauere: aut rob myrti. Et conferūt
ad cōſolidationē ⁊ mūdificationē vulneris pectoris aut
pulmonis: quorū permixtio. Recipe papaueris albi: ſemi-
nis cucurbite ⁊ citrullorum excorticatorum ana. ʒ. x. ami-
li draganti: gummi arabici: ſucci ligritie ana. ʒ. v. thu-
ris maſculi: ſedenegi loti: boli armeni: ſanguinis draco-
nis charabe ana. ʒ. ij. myrre cinamomi: opij. an̄. ʒ. i. Et fiāt
trociſci: ⁊ adminiſtrentur.
¶ Idem. Cōfectio emplī feſtinantis maturationeꝫ pleu-
reſis: ⁊ ſedātis dolorē eius. ℞. aneti: camomille: violarū

ſiccarum: furfuris: altee: farine ſeminis lini: fenugreci: or
dei: añ. Decoquant̃ in aq̃ donec ſint diſcocta. Deinde ꝯte
rant̃: ⁊ miſce cũ oleo antiquo. Et ſupponat̃ tepidũ: ⁊ q̃ñq̃
addũtur ĩ eo cinis cauliũ ⁊ adeps anatis.

¶ Galienus. Cõfectio loboc mũdificãtis ⁊ abſtergentis
ſanie a pectore ⁊ pulmone. Accipe amigdalaꝝ dulcium ⁊
amaraꝝ: granoꝝ pini: ſeminis vrtice: farine lupinoꝝ: ana
partes equales. Cõfice cũ melle: ⁊ da cũ eo q̃ conuenit.

¶ Plures preterea ex medicinis mũdificãtibus pectus:
⁊ pulmonem a ſanie ⁊ viru dicte ſunt in capitulo de aſma
te ⁊ tuſſi: que requirantur ibi. Et ex medicinis ſanãtibus
vulnera pectoris ⁊ pulmonis: plures dicte ſunt in capitu/
lo de ſputo ſanguinis.

¶ Aboali. Cõfectio trociſcoꝝ ad vlcera que fiunt in pe/
ctore ⁊ pulmone cõſolidantiũ ea. Recipe roſarum balau
ſtie: ana. ʒ. ij. ſanguinis dracõis: amili: olibani: ana. ʒ. ij. dra
gagãti: maſticis: ana. ʒ. i. ⁊ ʒ. acacie: croci: ana. ʒ. vnius ter/
tiã. karabe: ⁊ myrre: ana. ʒ. ʒ. Confice cum rob citoniorum
myrtilorum ⁊ da cum eiſdem.

¶ Confectio medicamĩs ex ĩuentione noſtra: q̃ ẽ medi/
camẽ forte ⁊ expertũ ad vlcera pulmõis ⁊ pectoris: ⁊ mũ/
dificat ea a ſanie: ⁊ materia viſcoſa contenta in eis ⁊ facili
tat expulſionem earum. Cuius hec eſt ꝑmixtio. Recipe
olibani myrre: cinamomi: amomi: granoꝝ pini: radicum
ireos: gũmi albotin croci: talcb: ana. ʒ. iiij. ſpice caſſie fiſtu
le: carniũ dactiloꝝ: ana. ʒ. iij. coſti. ʒ. ij. galbani. ʒ. vnius ter
tias. ij. mellis q̃tũ ſufficit ad aggregandũ ea. Decoquãt̃
mel ⁊ albotin ĩ vaſe duplici vſq̃ dũ habeat ſpiſſitudinẽ.
deĩde ꝑmiſce cũ eis galbanũ: ⁊ fac bullire denuo: deĩde ꝓ
ĩce ſupĩpm puluerẽ aliaꝝ reꝝ: ⁊ da cũ eo q̃ ꝯuenit.

¶ Permutationũ aũt pleureſis ad alias egritudĩes: que
dam ſunt ad bonũ: quedã ad malũ. Permutat̃ aũt ĩ peri
pneumoniã: ⁊ ad ptiſim: ⁊ ad malũ. Et permutatio eiꝰ ad
peripneumoniã ẽ ſm̃ alteꝝ duoꝝ modoꝝ. Q̃ñq̃ eniz fit
ex cõuerſiõe materiei pleureſis ad pulmonẽ. q̃ñq̃ ex con
uerſione virus ad ipſum cũ nõ mundificat̃ vſq̃ ad. xl. di/
es a ruptura collectionis. Et ꝑmutatio eius ad ptiſiz ſimi
liter fit ſm̃ alteꝝ duoꝝ modoꝝ aut mediãte ꝑipneumo
nia: aut ſine mediatõe eius. Et ꝓprie cum ſanies acuta ⁊
mordicatiua reſoluta ab eruptiõe apoſtematis trãſiẽs ꝑ
pulmonẽ vlcerat ſubſtãtiam eius. ¶ Et dixit. Hyppo. ꝙ
q̃ñ pleureſis nõ reſoluit̃ neque mũdificat̃ in. xiiij. diebꝰ:
ĩ empia trãſit: ⁊ ſi empima nõ mũdificat̃ ĩ. xl. diebꝰ a die
rupture ꝑmutatur in ptiſim. ¶ Et dixit Galienus ꝙ mã
pleureſis q̃ñq̃ rapit̃ fluxu vẽtris: q̃ñq̃ natura vincit ſup
ipſã ⁊ expellit eã ad partẽ auriũ: ⁊ fac̃ collectiões ⁊ ẽ ſigni
ficatio ĩcolumitatis. Et q̃ñq̃ apparet victoria morbi ſu/
pra naturã ⁊ ſignificat̃ ex ꝑmixtione ĩtellectus: ⁊ vigilijs
⁊ fit ꝑmutatio ĩ freneſim. Et quãdoque vltimat̃ mã mor
bi ſupra nãm: ⁊ declinat mã ad cerebruz: ⁊ ĩterficit vſque
ad diẽ. iij. ⁊ quãdoque declinat ad neruos: ⁊ facit ſpaſmũ.
Et dixit iteꝝ Galienus: ꝙ quãdo rapit̃ ad partes cordis
multiplicat̃ tremor eius ⁊ ſyncopis: ⁊ ĩterficit ĩ pricipio: ⁊
quãdoque ſubito.

¶ Et dixit Hyppocrates ꝙ aliquando accidit ex praui/
tate ⁊ venenoſitate materie: vt vincat ſupra poſſe natu/
re oĩno: ⁊ cõuertat partes loci vt appareat dorſum patiẽ
tis: q̃ſi dorſum verberati: ⁊ viret latus eiꝰ ⁊ nigret: ita ꝙ
conſueuit de eis dicere vulgus eſſe percuſſos a demone.

¶ Iteꝝ Galienus dixit ꝙ natura multotiens vincit ſu/
pra morbum ⁊ expellit materiaz eius ad loca vacua: ſub/
aſcellarum ⁊ inguinũ: ⁊ partiũ cruriũ: ⁊ auriũ ⁊ pedum: ⁊
conuertit in apoſtemata bene nata ad pleureſim. Signi
ficant enim ſalutem: ⁊ quandoque conuertit materiam ⁊
extrahit vſque ad cutem: ⁊ ducitur ad incolumitatem cũ
apoſtemate ſub cute.

De peripneumonia.

p

Eripneumonia eſt apã. ⁊ ex mẽbri denoĩatiõe no/
mẽ accipit: eſt enim apã pulmonis. Et dixit Galie
nus ꝙ eſt morbus difficilioris cure q̃ȝ pleureſis. ⁊
magis ꝓmptior ad ĩterficienduz. ⁊ illud ꝓpter duas res.
¶ Et q̃dez p̃ma eſt. q̃m in pulmone: ſicut ſcis ſolutio cõti
nuitatis raro ẽ ſuſceptibil' cure ꝓpter cãs in caplo de ſpu
to ſanguinis aſſignatas. ¶ Scõa eſt. q̃r virtꝰ cordis nõ pa
tit̃: imo deficit ab ĩflãmatione eius. creauit. n. ipm ſapia
vt euẽtaret cor. eſt autẽ peripneumonia morbꝰ per ſe: aut
morbus ex altero morbo cãtus. Et ſi q̃dez que cauſat̃ ab
eo, q̃ eſt aptũ natũ eẽ nutrimentũ pulmõis: aut a ſupflui
tate nutrimẽti ipſiꝰ eſt morbꝰ per ſe. Deriuat̃ aut ex alte/
ro morbo: ſic̃ ea q̃ fit poſt catarrũ: ⁊ poſt pleureſim. Fit ãt
peripleumonia ex oĩ materia ſic̃ pleureſis. Et ex ea ẽ q̃dã
vera: q̃daz nõ vera. Et dixit galienꝰ ꝙ vera ꝑipneumonia
eſt q̃ fit a flegmate. Et videt̃ ꝙ dicẽti ꝙ vera ꝑipneumõia
eſt q̃ fit ex colera ſit magis credendũ. Et eñi pulmo ẽ mẽ/
brũ colericũ: ⁊ eiꝰ nutrimentũ eſt ſanguis colericꝰ. Et iam
q̃dem canõ eſt ꝙ morbꝰ: cuiꝰ ꝯplo nõ recedit a cõplexiõe
mẽbri: niſi ſicut naturale ⁊ innaturale eſt morbus ꝓprie
verus. Recedẽs aũt ab eius ꝯplexione in ꝯ̃rium ipſiꝰ eſt
morbus çebdeg. i. morbus notus. Et fortaſſis rõ ꝓ Galie/
no eſt q̃m morbus ꝓprie verus minꝰ moleſtus eſt q̃ȝ çeb/
deg. Et ꝑipneumonia flegmatica nõ eſt in vehemẽtia pra
uitatis ſic̃ colica. Interficit. n. cito colica acuitate ſua: cuz
ſit vicina cordi. ⁊ oppõ cuz ĩfrigidantibꝰ nõ ꝑuenit ad lo/
cum: nec ꝑducitur: niſi poſt eiꝰ alteratione plurimã: eo ꝙ
ꝓpter viaꝝ diſtantiaz calefit. Hoc aũt ſecus ẽ in flegma/
tica: q̃ñ opȝ medicamĩa eẽ maturatiua ⁊ reſolũa: que fa/
cile ſunt ꝑueniẽtia ad locũ nec̃itatis ſine diminutiõe vir/
tutis eoꝝ. ¶ Preterea morbꝰ ꝓprius aliꝰ eſt q̃ fit ẽ mate
ria que deputat̃ ad nutrimentũ alicuius membri: que dũ
corrumpit̃ facit morbũ: aut fit de mã que ẽ ſupfluitas nu
trimẽti illiꝰ mẽbri. Et iaȝ quidẽ Ariſto. dixit ꝙ ſupfluitas
eſt ꝯ̃ria illi rei cuius ẽ ſupfluitas. ſic̃ fumus ⁊ kilus: ⁊ ſicut
vrina ⁊ maſſa ſanguinea: ⁊ ſic̃ ſudor ⁊ humores in venis: ⁊
ſic̃ medulla ⁊ nutrimentũ oſſiũ: ⁊ ſic̃ adeps ⁊ caro ⁊ ſilia:
niſi ſit ſupfluitas delatiua potẽtialitatis eiꝰ a qua decidit̃
ſic̃ ſperma. ¶ Et ſciẽdũ ꝙ pulmo ſic̃ cetera mẽbra partẽ
ſibi ꝓpriaȝ de humoribꝰ recipit: ſȝ q̃ ẽ ſicut ſanguis cole
ricus de ipſis deputat̃ ad nutrimentũ ipſiꝰ. Et ſupfluitas
ſui nutrimẽti: q̃ eſt flegma mittit̃ in vacuitates eius ꝓp
cãs vtilitatũ q̃s ſcis ꝓpter q̃ q̃daz crediderunt Galieno
dicenti: q̃ vã ꝑipleumonia fit ex flegmate: ſic̃ ex ſupfluo
nutrimẽto: ⁊ crediderũt alijs dicẽtibꝰ ꝙ fit ex colera ſicut
ex nutrimẽto cui iaȝ accidit corruptio. Et hoc ſm̃ ĩtentio/
nes ꝓprias. Terminat̃ ãt hec paſſio ſȝ vnũ triuȝ modoꝝ
ſic̃ ⁊ pleureſis: aut. n. reſoluit̃: aut ſuppurat̃: aut ꝑmutat̃.
Et cura eius eſt ſilis cure pleureſis.

¶ De empimate.

e

Mpima quandoq̃ fit ex pleureſi. ⁊ diximus cu/
ram eius. Et quãdoq̃ fit a peripneumonia. ſicut
dictum eſt. Et quandoq̃ ex ſanguinis ſputo. Ue
ruȝ cauſa eorum quandoq̃ eſt a pulmone. quãdoq̃ a pe
ctore ⁊ partibus eius. Et iam q̃dẽ Galienus dixit factã ex
cauſis in pulmone moleſtiorẽ eẽ ea: que eſt ex cauſis in pe
ctore ꝓpter cãs dictas ĩ capitulo q̃ eſt ante iſtud. Et ſili/
ter curam eius difficiliorem eſſe propter cauſas dictas in
capitulo de ſputo ſanguinis. Cura autem oĩs ſpeciei huiꝰ
ſimilis eſt cure empimatis facte a pleureſi quã diximus.

¶ De ptiſi.

p

Tiſis eſt nutrimentũ deſiccationis: ⁊ cõſumptio
nis cadẽs in corpus: ex calore febriũ habitudina
liũ minutarum ex vlceratione pulmonis. Et vlce
ratio quidem huiuſmodi cauſam habet: aut ex p̃cedenti

catarro acuto vlceratiuo inſtillante ⁊ imprimente in pul
moné hora poſt horá ſic accidit ex frequēti īſtillatiōe ſup
petrā: vt pforetur petra. Et qñqȝ fit ex precedēti pleureſi:
aut peripleumōia mediāte tñ empimate. Et qñqȝ tñ ſine
mediatōe. ⁊ qñqȝ fit ex mā putrida diu ſtāte in pulmone:
quā ſeqr̄ putrefactio ⁊ vlceratio. Et accidit nōnunqȝ poſt
ſputū ſanguis ſine mūdificatiōe: ſicut Hyppo. dixit. Poſt
ſanguis ſputū caſus ī ſaniei ſputū: ⁊ poſt ſaniei ſputū caſus
ī ptiſiȝ. Hic āt ſermo ei⁹ eſt ſub ꝯditiōe. Et .n. poſt ſanguis
aut ſaniei ſputū qbus nō reſiſtit̄ fit caſus ī ptiſiȝ. Raro āt
ꝯtingit hec paſſio pueris ⁊ ſenib⁹. Et ſi cadant īterdum ſe-
nes in illā occultari pōt eis: ⁊ diu viuere cū illa. Uiris aūt
⁊ mlierib⁹ frequēter accidit: ⁊ ppe paratis cadere in ipaȝ:
⁊ raro occltat̄ eis. Uex mulierib⁹ occultatur īterdū licet
parū. Cōtingit aūt hec paſſio ſic hypo. dicit a decimo octa
uo anno vſqȝ ad trigeſimū qntū. Expoſiti aūt vt cadāt in
ptiſim ſunt hñtes cerebꝝ debile: q̄re nō ꝓhibet̄ receptio
ſupfluitatum in ipo: nec digerit̄ qd̄ traſmittit̄ de nutrimē
to ad ipȝ: q̄re ſunt catarriçabiles: ⁊ ex parua cā. Et adhuc
expoſiti ad id ſunt hñtes pect⁹ ſtrictū in creatiōe ſua cum
multiplicatōe ventoſitatū in ipo. Et pulmone eoꝝ: ⁊ vici
nis partib⁹: ⁊ hñtes humeros alatos. ſicut ſunt curuature
alaꝝ: ⁊ collū ſubtile ⁊ longū depreſſum īter alas ⁊ hume-
ros. ⁊ freq̄ntat eos tuſſicula cū pūctura alicui⁹ ſpatule: aut
mamillaꝝ: ⁊ pcipue ſi ſint ex iraſcētib⁹ facile ⁊ colericis.
Tempus aūt magis aptū: vt faciat cadere in ptiſim: ⁊ qd̄
vehemētius nocet factis ptiſicis: eſt autūnus: ⁊ ꝯſtipatio
boreal' multū dominās: ⁊ maxīe quādo pceſſit auſter: aut
ꝯſtitutio auſtria: quā preceſſit boreas. Et ex eis ē regio bo
realis mltū frigida ⁊ ſicca. et cibi ⁊ potus ei⁹: ⁊ q̄cunqȝ hoc
curſu ꝓcedunt. Curare aūt ptiſiȝ: que vehemēter ipreſſit:
⁊ diuturnauit impoſſe eſt. ⁊ ꝓprie qñ continuat̄ ei lubrici-
tas vētris: faſtidiū cibi: ⁊ fetor oris curuature vnguium: ⁊
caſus capilloꝝ. Significant .n. ex hoc corruptōeȝ ꝓfunda
ri: ⁊ nutrimētū eſſe abſciſſū. Curare vō nō diuturnam: aut
que nō multū impſſit: ⁊ in qua accñtia timoris nondū ap-
paruerūt fortaſſis pſumendū eſt: q̄uis nō ſit facile. Et itē
tio ī curatōe eius eſt duplex. videlicet vlis ⁊ particularis.
Et vlis qdem ītentio eſt tres res. Et pma qdem eſt corre-
ctio cauſe facientis. Secunda eſt abſciſſio eius. Tertia eſt
regulatio ipſius vite patientis.

❡ Primā igit̄ rem ꝯplent adminiſtratiōes medicaminū
abſcindentiū nocumēta catarri: ſi accidat a catarro. ⁊ hec
ē radix opationis in hac cura. Et iā hec ſcripſim⁹ in caplo
ꝓpo. ⁊ ſi cā ipſi⁹ fuerit ex pcedēti empimate ex pleureſi ⁊
pipleumonia: aut ſputo ſanguinis: cura eoꝝ dcā eſt.

❡ Scdam reȝ ꝯplēt adminiſtratiōes euonum abſcindētiū
cāo: q̄ꝝ pceſſit rememoratio. ⁊ ſiqdē malitiā ꝯplonis cali
dā cognoueris ex plenitudie ſanguis flebotomam⁹ ex ba-
ſilica. Et ſi vtus pmiſerit: demū ex ſaluatella. Et qñqȝ fle-
botomam⁹ flebotomia renouāte numeꝝ ſi neceſſitas ex-
petit adminiſtrādo ex cibis ⁊ potib⁹: ⁊ alijs q̄ boni ſunt nu
trimēti. Et hoc dieb⁹ quib⁹ nō flebotomas. Si aūt colerā
abūdare cognoueris: euā cū eo qd̄ eſt ſic aq̄ decoctiōis ca-
pilli veneris: ⁊ chayare de ſingul' manipulos ſinglos: iuiu
baꝝ: ſebeſtē. añ. xl. prunoꝝ ſiccoꝝ. xx. pulpe: caſiefiſtule: ſi
racoſt. añ. ℥. i. çuccari violati. ℥. xij. ſi neccitas expetit: addat̄
eis qd̄ eſt ſic trociſci de viol' ⁊ ſilia. Si aūt cām leſiuā māȝ
flegmaticā eē cognoueris: euacua cū cochys. ⁊ ſilib⁹ qbus
ex bdellio. ⁊ dragagāto partes addant̄ conueniētes. Et ex
euonibus particularib⁹: ⁊ vtilib⁹ huic egritudini ſunt ꝓuo
cationes emorroidaꝝ ⁊ mēſtruoꝝ: ⁊ maxime ſi ex eoꝝ re-
tentiōe in nocumentū cadat. Et nos de his in caplo ꝺ ſpu-
to ſanguinis. iiij. canone locuti ſumus.

❡ Tertiā reȝ ꝯplent adminiſtratōes regulatōuȝ in q̄ñbus
reꝝ ſex. ⁊ ꝓprie collocent̄ in loco aeris tēperati ad ſiccita-
tē declinis. ⁊ pmutet̄ ad regiones aeris tēperati. Et ſint ci
bi eoꝝ ex eis que ſunt q̄ntitatis pauce ⁊ pluris nutrimēti.
⁊ īſuper ad digerendū faciles: ſic ꝓprie epata gallinarum:
⁊ teſticuli galloꝝ q nō calcauerūt: ⁊ alas pulloꝝ: ⁊ carnes
minutaꝝ auiū teneraꝝ: ⁊ carnes iuuenū pdicū: ⁊ alcubugi.
⁊ colūbaꝝ: ⁊ ſint huiuſmodi elixa: aut iurib⁹ ciceꝝ: aut in
aq̄ ordei: ⁊ ꝓprie quādo q̄rit̄ mūdificatio: ⁊ oȝ vt addatur
tunc in iurib⁹ eoꝝ de melle aliqd: ⁊ ꝯgruūt eis vitella ouo
ruȝ ſorbilia cū melle: ⁊ ꝯcedit̄ ēt eis in hoc caſu ius cauliū
īpinguatū cum gallinis ⁊ ſilia. Qñ aūt ꝯſolidatio ⁊ ꝯgluti
natio vulneris querit̄: tunc opȝ vt ſint cibaria deſiccatia:
nō eleuata in gradu multe exiccatiōis: ⁊ ſint ēt ꝯglutinan-
tia: ſicut ꝓprie extremitates: ⁊ roſtra edoꝝ ⁊ porcoꝝ iuue
nū ⁊ arietuȝ caſtratoꝝ. Pane autē vtat̄ ſimilagineo bene
cocto habēte aliqd maſticis: ⁊ quādoqȝ ponit̄ in eo ocim⁹
⁊ ſilia. Et ex cibis ꝯglutinatiuis ē triticū cū gallinis ⁊ riſuȝ
⁊ ſilia: ⁊ pulmēta ex geguer: ⁊ milio ⁊ ſauic: ⁊ kiſt ordei poſt
bonā decoctionē eoꝝ: ⁊ lentes ſunt bone eis. Et pulmēta
ex orobo: ⁊ ſorbitiones ex farina ei⁹ ⁊ ſilia. Et cibi ex lacte
ſunt eis magni iuuamēti: ⁊ ꝓprie cū nō eſt febris: ⁊ caſe⁹
ſi eſt recēs. Et nos dixim⁹ in caplo de empimate diuerſos
cibos ex lacte. canone q̄rto. ❡ Si aūt fuerit cū ea febris
vehemētia ſit cib⁹ eoꝝ kiſt ordei bene coctum cum cācris
fluuialibus: poſtq̄ abluunt̄ abiectis extremis eoꝝ cuȝ aq̄
⁊ cinere: ⁊ cū iteratōe: ⁊ etiā cancri fluuiales aſſi aut elixi ī
aq̄ ordei. Et qñqȝ dant̄ cocti in lacte aſine: ⁊ qñqȝ in oleis
frigidis: ⁊ qñqȝ in aq̄ ordei aut ciceꝝ: ⁊ qñqȝ in lacte aceto
ſo abſtracto ab eo butiro. ⁊ ſunt iuuamēti ſublimis. ⁊ ad-
dunt̄ eis cucurbita. ⁊ bleta cū oleo amigdalio: ⁊ citrulli: ⁊
ſilia. Et ex reb⁹ cibalib⁹ ſil' ⁊ medicinalib⁹: eſt lac acetoſū
coctū cū tortellis de ſeni: ⁊ ſit ꝓprie lactis. ℥. iij. ⁊ tortellaꝝ
tritaꝝ. ℥. i. In craſtinuȝ adde ex lacte circiter. aur. ij. ⁊ mi-
nue ex tortellis circiter aur. i. Et hec fiāt ſingul' dieb⁹ do-
nec deueniat̄ ad lac ſolū. Cū aūt ꝑuentū fuerit ad egritu-
dinis declinatōeȝ: īcipiam⁹ diminuere ex lacte acetoſo oī
die: ⁊ addere ad tortellas: donec deueniat̄ ad dationē tor-
tellaꝝ tantū. Hunc āt modū decoctiōis lactis acetoſi ſcri
pſit Paulus ⁊ plēs poſt ipm laudauerūt illud.

❡ Opatio aūt lactis acetoſi eſt ſm hūc modū. Accipe lac
caprinū mundū hñs bonitatē ex ſanitate aial': ⁊ ꝯgruitate
paſcui ipſi⁹: ⁊ extrahat̄ ex eo butirū: ⁊ dimittat̄ vna nocte
ī aere tēperato: mane aūt agitet̄ vehemēter. ⁊ excludatur
ſpuma eius. Eſt aūt lac huiuſmodi ſedatiuū vehemētis ca
loris: cōſtrictiuum ⁊ cōſolidatiuum. Potus autem eorum
non febricitantium ſit in pncipio vinum album dulce: ⁊
cum peruenitur ad tempus ꝯſolidationis ſit album ad ſti
pticitatē declinans pmixtum cum aqua pluuiali. Febrici-
tantium autē potus ſit aqua ordei: ⁊ aqua pluuialis: ⁊ rob
mirti: ⁊ ſyrupus eius. ⁊ ſyrupus de papauere: cum vocat
neceſſitas: ⁊ aqua pluuialis decoctionis cancroꝝ: ⁊ aqua
granatorum dulcium: ⁊ ſimilia. Et in ſecunda menſa co-
medant paſſulas cū granis poſt bonam maſticatōeȝ: ⁊ gra
nata dulcia: ⁊ citonia de ſeni cocta in rob ⁊ ſilia. Et opȝ an
te comeſtionē: vt approximēt deambulatiōib⁹ mediocri-
bus: ⁊ poſt ambulationes vtant̄ fricatōibus lenibus. tene-
rum facientibus corpus. ⁊ hoc vt viuificetur calor in ipſis
Et poſt comeſtioneȝ vacent: ⁊ quieti ſint per duas horas:
⁊ hoc in loco tēperati aeris: in quo ſint odores redolentiū
frigidorum ⁊ ſtipticorum cuȝ adminiſtratione gaudij. De
inde vacent ſomno ⁊ qeti quantum poſſibile fuerit. Et ſi
fuerint vigilie accedamus ad medicinas ex papauere: ⁊
hoc cuȝ ſapiētia ne ꝯgelent̄ ſpūs. Elongent̄ aūt a balneis.
reſoluūt .n. virtutē: niſi apd̄ declinatōeȝ. Tunc eñi ſunt iu
uamēti ſublimis queādmodū dicem⁹ poſt. Prohibeat̄ āt
eis oīs lubricitas: ⁊ conſtipatio viſceꝝ: ⁊ magis lubricitas
vehemēs. reſoluit enim virtutem.

❡ Particularis aūt intentio ē qnque res. Et prima qdē
eſt mundificatio ⁊ abſterſio vlceris. Scda ē prohibitio

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0226-5
DFG

curſus materieꝝ ad ipſum. Tertia expulſio materierum
ſaniei eius ⁊ exiccatio earum ex ipſo. Quarta eſt conſoli
datio ⁊ icarnatio ei⁹. Quinta ē correctio accidentium.
¶ Et primā qdē rem ɔplēt adminiſtratões medicinarum
mundificantiū ⁊ abſtergentiū vlcus. ⁊ in genere eoꝝ ex
cellenti⁹ ⁊ nobili⁹ eſt mel: ⁊ aqua eius. Aggregat.n. virtu
tem mūdificationis ⁊ abſterſiōis. Et ṗter hoc ē cib⁹ ⁊ po
tus amicus nature: ⁊ iuuatiuus valde. Et ex eis ē aqua or
dei: ⁊ aqua çuchari: ⁊ aqua ciceꝝ. Et fortius eis ē decoctio
iſopi: ⁊ ſirupus ei⁹. Et adhuc fortius ē lohoc d̄ caulib⁹ ⁊ d̄
ſquilla. Et ex eis que ſunt maximi iuuamēti ē medicamē
Galieni. Ipſum.n. eſt mundificatiuū bonum qd̄ Recipit
ireos: baſce: iſopi: an̄. partes equales. Cōfice cū melle. Da
mane ⁊ ſero a.ʒ.i. vſque ad.ij. cum aqua mellis. Et dixit
Democrytus. Iſopus aut ireos: aut faraſiō ſingulariter
vel cōiuncta cocta i aqua mellis aut i aqua ordei ſūt mū
dificātia bona. Et nos diximꝰ plura ex his i ca. d̄ empiate.
¶ Secūdā rem ɔplēt adminiſtratões medicaminū ma
terias a pulmone ꝓhibentiū. Et hoc quidē perficitur ſm̄
alterum duorum modorum: ⁊ ꝓprie cū ꝓhibitione mate
rie que transfertur ad ipſum ex altero membro: ⁊ cū con
fortatione pulmonis: vt nō recipiat qd̄ ad ipſum transfer
tur de materia. Et ſm̄ plurimū que transferuntur ad pul
monē materie ſunt catarrales aut trāſmiſſe a vicinis mē
bris: ⁊ ex pleureſi ⁊ alijs. Et hoꝝ curā iā diximus. Sūmā
eni medicinaꝝ pulmonē confortantiū etiā diximus i ca.
de tuſſi humida. Et ex eis ē rob mirti ⁊ ſirupus eius cum
ʒ.ij. pulmonis vulpis ſicci. Et ex medicinis quidem mira
bilis iuuamēti aggregantibus virtutem cōfortationis et
mundificationis eſt medicamen Galieni. qd̄ Recipit pul
monis vulpis ſicci: ſucci liquiritie: capilloꝝ veneris ſemi
nis feniculi: aniſi: ana. Cōfice cū çucharo decocto cum aq̄
quantū ſufficit. Et quandoqꝫ conficitur cū rob myrtino
⁊ eſt confortatiuum amplius.
¶ Tertiam rem cōplent adminiſtrationes medicaminū
putredines que ſunt in pulmone exiccantiū. Et nos qdē
diximus in ca. de tuſſi: hec adminiſtrāda eſſe poſt mūdifi
cationē debitā: vt extirpet̄ poſt eas reſiduū putrefactēis
ſio. Et dixim⁹ ꝙ adminiſtratio ex myrre rubee.ʒ.i. ⁊ mell'.
ʒ.iiij. lābendo diebus iterpollatis cum aliqua ex medicis
educētibus ſaniē eſt medicamē vtile. Et forti⁹ eſt lambe
re alkitran cum melle aut cū melle ⁊ galbano ſil' liquefa
ctis. Et ex maxime iuuatiuis eis ſunt medicine magne ſic̄
tyriaca: ⁊ mitridatū: ⁊ alia quoꝝ i caplō de empimate pre
ceſſit rememoratio. ⁊ ſi indiget̄ adhuc medicamie exiccā
te ꝓcedem⁹ ad medicines d̄ arſenico: ⁊ ſulfure ſcriptas in
eodē capitulo. canone tertio. Et nō negligant̄ medicamia
hui⁹ ſumme: qm̄ ad ſanitatē ꝓducūt. ſi d̄s voluerit. Veꝝ
ſi ꝓueniſ ex eis ad ſupcalefactionē ſuccurrendū eſt cū aq̄
ordei. Et iuleb cū trociſcis de cāphora. vſqꝫ dū ceſſet acci
dens: deinde redeat̄ ad exiccatiua ꝑdicta.
¶ Quartā rem ɔplēt adminiſtratões medicaminū aggre
gantiū in ſe duas v̄tutes: mūdificatōis. ſ. ⁊ cōſolidationis.
Et ex medicinis ꝓprijs in hac ſumma eſt lac aſininū cū
v̄tute ſubtiliatōis in ipo. ⁊ lac caprinū cū tēperie ſua. ⁊ lac
muliebre cū ꝓprietatib⁹ tēperiei itra illa. Lac eni aggre
gat itētões tres. eſt.n. res cibal': ⁊ dilecta nimis: ⁊ ē ex reb⁹
velocis cōuerſionis in ſanguinē. Eſt enim ſanguis bis co
ctus: ⁊ ē poſt illō medicina abſtergens vlcus v̄tute ſeroſi
tatis ei⁹: ⁊ cōglutinans ipm virtute caſeitatis eius. Et opꝫ
vt bibat̄ calm cum mulget̄. ⁊ ſi poſſet ſugi ex mamillis: ⁊
hoc in ieiunio ante cibos alios: ⁊ opꝫ vt poſt ipm qeſcant:
ne corrumpat̄ ⁊ aceſcat in ſtomaco eoꝝ. nec dormiāt ſup
ipm: nec ſuſcipiāt cibū: niſi ꝑus deſcēdat. Et opꝫ vt bibat̄
in loco aeris tēperati: ⁊ ꝓprie cum fuerit gaudiū: ⁊ trangli
tas. ⁊ qm̄ ipſum magis mundificatiuū eſſe q̄rimus: dandū
ē cū melle. Et qm̄ ipm magis ɔglutinatiuū ⁊ cōſolidatiuū
querimus: det̄ cum çuccaro roſato: ⁊ ſilibus aut coctum
cū lapidibus. Et ſi ſumēs ipm cōſtipationē patit̄ viſcerū
opꝫ vt eligat̄ ex lacte in quo multiplicat̄ ſeroſitas: ⁊ ſi nō
ſuffic̄ multiplicet̄ q̄titas potus ei⁹ in die ſequēti: ⁊ adhuc
i die tertia: ⁊ ſi adhuc nō ſufficit miſcendū eſt cū eo: qd̄ eſt
ſicut çuccaꝝ ⁊ ſal: ⁊ ſi adhuc nō ſuffic̄ miſcendū eſt polipo
dium cū ipſis. Si aūt ſumens ipm lubricitatē iteſtinorū
patit̄: tunc opꝫ vt miſceat̄ ei qd̄ eſt ſic̄ hypoqſtidos ⁊ ſilia:
Et ſi tuſſim habuerit miſceat̄ cū eo qd̄ eſt ſicut dragagan
tum. Et ſi cū ſtomaci debilitate fuerit: miſcendū eſt cū eo
qd̄ eſt ſic̄ trociſci dyarodō ⁊ ſilia. Et lac qdem de quo bu
tirum extractum fuerit eſt magis ɔglutinatiuū: ⁊ coctū
qdem amplius: ⁊ qd̄ cum butiro eſt: eſt magis humectati
uū ⁊ ipinguatiuū. ¶ Ars aūt in decoquēdo lac eſt hmōi.
Accipe lac mundū. ⁊ recipe ipꝫ in vaſe puro abſterſo. ⁊ po
ne ſup ipo circiter qntam partē ei⁹ ex aqua pluuiali. Dein
de extingue in ipſo lapides fluuioꝝ ignitos ſine fumo vſqꝫ
dū lac fuerit coctū ⁊ ɔſumptis aqueis ꝑtib⁹ in ipo. Lac āt
melius eſt qd̄ ſumit̄ ex aīalibus iuuenib⁹ mediocriter nō
nimis remotis aut vicinis partui: quoꝝ paſcua ſūt ex her
bis mōtanis in qbus eſt ſubtilitas: ⁊ mūdificatio cū ſtipti
citate ⁊ exiccatōe. Et laudauit Galien⁹ herbas hmōi ꝓpu
tādas eē paſcui eoꝝ. ſ. ex herbis cal'is: abſinthiū: iſopū: ba
ſce: poliū: ſcea iabde: fenic'ls: abrotanū ⁊ ſilia. Et ex fridis
rub⁹: ramnū: ſolatꝝ: caiare ⁊ ſilia. Et opꝫ vt dādi lactis q̄ti
tas ɔparet̄ poſſitati virtutis ſuſcipiētis ipm: quare icipiē
dum a q̄titate minori dādo ex eo circiter.ʒ.iij. prima die
⁊ in craſtinū addat̄ ei circiter.ʒ.i. ⁊ ſic in alijs dieb⁹ a ꝑma
die vſqꝫ dū deueniat̄ ad lib.i. vel paꝝ ampli⁹. Demū pau
latim deueniēdū eſt vſqꝫ ad illud qd̄ eſt ſufficiēs. Et iam
qdē diximus cauendū eis eſſe ab īdigeſtione in potu la
ctis. In ipſa.n. eſt timor. Febricitantib⁹ aūt eis: aut caput
dolētibus: aut ſiti vehemēti obſeſſis abſcindat̄ lac dulce:
⁊ laudat̄ eis lac acetoſum de quo extractū eſt butiꝝ ſm̄
doctrinā traditā a nobis in hoc eodē caplō. Dāda eſt ēt
eis aq̄ ordei cocta cū cācris fluuialib⁹ ſm̄ ꝙ etiā dcm̄ eſt.
⁊ ſyrupus de papauere: aut ſyrupus de mirto cum eo. Et
opꝫ cancrorum extrema abſcindi. Deinde lauari corpora
eoꝝ cum aqua. ⁊ cinere fricatione vehemēti. ⁊ hoc cū ite
ratione ⁊ iteratione. Et oportet vt detur in ieiunio. Et ſit
quantitas potus eius circiter.ʒ.iij. ⁊ in craſtinū adde.ʒ.i. ⁊
ſic die quolꝫ: vſqꝫ ad lib.i.ſ. mane ⁊ ſero ante alios cibos.
¶ Summa aūt medicinaꝝ vlcera pulmonis ⁊ pectoris
ɔſolidantium eſt hec. Sanguinis draconis. ⁊ ꝑpe lutum
ſigillatum: bolū armenicum: karabe: ſcedenegi: olibanū:
maſtix: balauſtie: roſe: ⁊ ſemē ei⁹: coralli: euphiſtidos cor
tices cancroꝝ fluuialiū vſtoꝝ: ſemē portulace aſſū: ami
lū aſſum: ſemē malue ⁊ altee aſſū: ſemē arnogloſſe aſſū:
gūmi aſſū: fruct⁹ mirti ⁊ ſilia. Medicamina autem cum
qbus hec danda ſunt: ꝓprie ſunt vitella ouoꝝ: lac dulce: ⁊
acetoſum: aqua pluuialis: ⁊ aqua ordei decoctiōis ciceꝝ:
⁊ cancroꝝ fluuialiū: aq̄ alſauic: ſuccus citonioꝝ: mina: ſuc
cus mirti: roſe ⁊ ſucc⁹ eaꝝ: mucilago pſilij: ſemē citonioꝝ:
ſyrup⁹ de papauere: ſyrup⁹ de iuiubis: ſyrup⁹ de viol': ⁊ ſy
rupus roſat⁹. ⁊ ſilia. Ex medicis aūt ɔpoſitis ſunt hec tro
ciſci de luto ſigil. aut de luto armenico: filoniū ꝑſicū ē vl
timū. mūdificat.n. ⁊ exiccat putredies. ⁊ cōſolidat vlcera.
Et nos ſcripſim⁹ ipꝫ: ⁊ adhuc alia multa hui⁹ itentiōis in
caplō de ſputo ſanguis q̄ efficaciter afferant̄ ad hūc locū.
Ex reb⁹ aūt mirabil' iuuamēti ad ɔſolidatões: ⁊ ſanatões
vlceꝝ pulmōis ē çuccaꝝ roſatū recēs: ſup qd̄ non ꝑteryt
ann⁹. Aggregat̄.n. in eo v̄tus abſterſionis ex ſucco roſaꝝ:
⁊ v̄tus cōſolidatōis ex parte ſube eaꝝ. Et noſti ꝙ virt⁹ ab
ſterſiōis ex roſis ꝓpter antiqtatē abſcindit̄: q̄ adhuc poſſi
det̄ in recētib⁹. Et Galienus qdem ꝑcepit dari çuccarum

roſatum ſingulis diebus in quantitate plurima:etiam cũ
rebus medicinalib⁹ cibalibus: ⁊ potabilib⁹ ſm oẽʒ modũ
adminiſtrationis ei⁹:ita ꝙ etiã cũ pane. Et vſi ſunt eo poſt
ipm plurimi: ⁊ nõ eſt ꝯphenſibilis eoꝝ numerus qui ſana
ti ſunt ex vſu eius tñ ꝑus mũdificationibus ꝑcedentib⁹.
Falluntˀ enĩ vtentes eo a ꝑncipio dũ mũdificatio nõ ꝑceſ
ſerit. Coartat.n.in pulmone mãs. Nos ãt dedim⁹ cũ lacte
caĩo nõ febricitãtib⁹. Febricitãtibus vero cũ aq̃ ordei de
coctõis cancroꝝ fluuialiũ: ⁊ alijs multis modis adminiſtra
tionũ. ⁊ iuenimus eẽ medicamẽ vltimũ. Uerꝝ quotiẽs ex
ei⁹ adminiſtratõe ꝯtingit ꝯſtrĩgi anhelitũ deñ q̃ elargãt
ipm ex eis q̃ educũt saniẽ:ſicut ꝑꝑe ſyrup⁹ de iſopo ⁊ ſilia
Et ſi accidat ſupcalefactio ꝑꝑ deſiccatõeʒ:deˀ ſyrup⁹ ð iu
iubis:aut ſyrup⁹ de violis:aut mucilago pſilij:aut citõioꝝ
cũ aq̃ granatoꝝ:aut aq̃ expſſionis ſeminũ portulace:cum
trociſcis de cãphora dictis ĩ antidotario. Et ſi ſequaˀ poſt
ipm ꝯſtipatio nãe:deˀ muroba:de viol:aut ſyrup⁹ ei⁹ cum
aq̃ ordei. Et poſtq̃ꝫ ceſſauerit hmõi redeaˀ ad çuccarũ ro
ſatum dandum in omnem modum.

⁋ Quintã rem ꝯplent correctões cadẽtes in accñtia ꝯco
mitãtia: ⁊ ſupueniẽtia huic morbo. Et ex ꝯcomitãtibus ẽ
febris ꝯſumptio ⁊ macies ⁊ dbilitas. Et ex ſupueniẽtib⁹ ẽ
tuſſis flux⁹ vẽtris ꝯſtipatio ⁊ faſtidiũ cibi. Etiam quideʒ
hyppocrates dixit mũdificatiuũ vlceris febris lẽteſcẽtiã
ſuccedere debere:q̃ ſi nõ ſucceſſerit ꝯſtat corruptionẽ vl
ceris ꝑfundari. Nos aũt experiemur circa oẽ tꝑs curatõis.
eius iterponere medicamĩa febris vehemẽtiã ſedãtia: vt
ſigillent ex his ⁊ illis bñficia ꝯcordãtia: quoꝝ finis eſt ſa
nitas. Et ſuccurreˀ cõſtipatõi ⁊ arefactõi eoꝝ cũ eis q̃ ade
quant ⁊ humectãt ex cibis ⁊ potib⁹ ⁊ reb⁹ medicinalib⁹: ⁊
adminiſtratõe lactis dulcis ⁊ alijs q̃ dixim⁹. Et cõfert eis
balneatio in aq̃ dulci cal'a:poſtq̃ꝫ morbus in declinatione
fuerit. ⁊ ante illud eſt res prauior: ⁊ eſt ponere egꝝ ĩ deſpa
tione. Forma aũt balneatõis eſt in hunc modũ. Prepare
tur aer balnei. vt ſit liber:nõ hñs de corruptõe odoris:aut
praue q̃litatis oĩo aliqd. ⁊ calefiat vt ſit caliditas balnei:
⁊ aq̃ caliditas tẽperata q̃ exciteˀ: ⁊ nõ reſoluaˀ calor nãlis
⁊ ſit ꝑma mãſionũ remiſſi⁹ calida q̃ꝫ alia. Tũc itret patiẽs
manſionẽ ꝑmã. ⁊ fricetˀ in ea leui fricatõe: ⁊ ꝑꝑe tenerum
faciẽte corp⁹. Deĩde itret manſionẽ ſcdam. ⁊ icipiat laua
re corp⁹ cũ aqua calida vtẽdo leni fricatõe cũ manu. Deĩ
de paulatim itret aquã calidã ⁊ delecteˀ in ea. Deĩde inci
piat lauare corp⁹ eius cũ aqua decoctõis capitũ edoꝝ:aut
cũ aqua ordei cõquaſſata cũ ouis multis: ⁊ oleo amigdala
rum dulciũ. Deinde ducaˀ ad manſionẽ ꝑmam. ⁊ iungaˀ
corp⁹ ei⁹ oleo roſato. ⁊ ducaˀ ad habitaculũ exteri⁹ in quo
ſit aer tẽperatus cũ multitudine redolentiũ ſtipticoꝝ. ⁊
qeſcat in lecto. Deinde poſt duas horas cibeˀ cibis lauda
bilib⁹ pauce q̃ꝫtitatis. ⁊ pluris nutrimẽti ex eis quoꝝ iam
mẽtionẽ fecim⁹. Et ex hinc tota itentio nr̃a ad humectan
dũ ſit occupatior: ⁊ hoc cũ delectatõe ⁊ qete: ⁊ ſomno: ⁊ ſili
tijs: ⁊ ſilib⁹. In craſtinũ aũt aut in die tertio balneeˀ ſilr.
Si aũt patiẽs debilis fuerit ante ꝑ duas horas q̃ꝫ balneũ
itret. Accipiat ſorbitões ex carnib⁹ teneris:aut ex lacte dl
ci. ⁊ qeſcat ſuper ſorbitões ꝑ duas horas. deide intret bal
neũ. Si aũt patiẽs talis fuerit: vt virt⁹ eius tolerare poſſit
ꝑcepit Galien⁹ vt poſt ſufficientẽ lauatiõeʒ in aq̃ cal'a:aut
ĩ aq̃ capitũ arietũ caſtratoꝝ: ſpargi ſup corp⁹ eius in ꝑma
mãſiõe ex aq̃ frigida aliqd ꝑterq̃ꝫ in capite ei⁹. Deide iun
gi oleo roſato. Lauatões etiam in tina ſunt huius itentio
nis: ⁊ ꝑꝑe cum reb⁹ humectantib⁹. ⁊ ipinguantib⁹ corpus
ex his que dcã ſunt. Poſt hec paulatiʒ deueniendũ eſt ad
adminiſtrandũ in balneis lauatiões ex aqs decoctionum
capitũ arietũ caſtratoꝝ: ⁊ ſilia. Et ſi corp⁹ remãſerit debi
le vngaˀ cũ oleo maſticino ⁊ ſilib⁹. Et ſilr paulatim deue
niendũ eſt ad alia cibaria laudabilia ⁊ ſolidiora.

⁋ De tuſſi aũt ⁊ cõſtipatõe vẽtris:aut fluxu q̃ ſupueniũt
eis:dicem⁹ ſicut in ꝑteritis iã diximus. Et ſi accidat eis ca
ſus appetit⁹:cureˀ ſic in caplõ ꝑꝑo dicemus.

p Tiſicis medicamia ꝯueniẽtia: ſcripta ſunt pl'a in
ãtecedẽtib⁹. Ex eis ſunt trociſci Galiẽi ſcripti ĩ ca
pitulo de tuſſi catarrali. ⁊ deſcriptões ſyrupi ð pa
pauere: ⁊ dyapapauer. ⁊ trociſci: ⁊ pillule ð papauere: ⁊ pil
lule de ſtorace: ⁊ alie pill'e de narcoticis ſcripte in eodẽ ca
pitulo: ⁊ hec ꝑꝑe ad ſedatiõeʒ catarri. Medicamia vlcus
mũdificãtia: ⁊ saniẽ ei⁹ abſtergẽtia parti dcã ſunt in caplõ
ð aſmate ⁊ tuſſi. ⁊ partiʒ in caplõ de empimate. ⁋ Sũma
aũt medicinaꝝ vlcera pulmõis ⁊ pectoris ꝯſolidãtiũ dcã
eſt in caplõ de ſputo ſanguinis.

⁋ Cõfectio teſticuloꝝ vulpis eſt ptiſicis. ⁊ cõſumptis me
dicia experta. ⁊ dicta eſt in antidotario.

⁋ Hamech fili⁹ Zeçar. Cõfectio loch que ꝯfert ptiſicis ⁊
mundificat vlcera pulmonis ⁊ ꝯſolidat. ℞. iuiubas.i.paſ
ſularum enucleataꝝ. ʒ. xxx. ſeminis malue. ʒ. iiij. cancroꝝ
fluuialiũ. ʒ. xx. capilloꝝ veneris:caiare:vĝe paſtoris:lingue
arietis. añ. ℥. ſ. ligritie. ℥. i. Decoquantˀ in lib. iij. aq̃ vſq̃ꝫ ad
lib. i. ⁊ adde eis ſyrupi ð papauere: ⁊ çuccari tabarçet, ⁊ ſa
pe. añ. ℥. vi. Decoquantˀ ad mellis ſpiſſitudinẽ. Deinde pu
ciaˀ ſuper ea:ſemis cucurbite mundate. ℥. i. gũmi arabici:
dragagãti:ſeminũ citonioꝝ:amili:ſemis portulace:amig
dalaꝝ dulciũ: añ. ʒ. viij. papaueris albi. ʒ. v. Poſt bonã tri
turationẽ miſceantˀ cũ alijs. da mane: ⁊ ſero circiter ʒ. v.

⁋ Idem. Syrup⁹ de pſilio conferens ptiſicis. ℞. ſpodij:
ſeminũ portulace:ſeminũ citõioꝝ:papaueris albi. añ. ʒ. ij.
pſilij mũdi. ʒ. v. ſucci arnogloſſe cocti ⁊ depurati. ʒ. xx. can
croꝝ fluuialiũ lotoꝝ ſꝫ doctrinã ꝑdictã. ʒ. xx. Decoq̃ntˀ in
lib. iij. aq̃ vſq̃ꝫ ad lib. i. ⁊ cũ lib. i. çuccari. fiat ſyrup⁹. da ma
ne ⁊ ſero cũ ſucco arnogloſſe. eſt.n. efficax. Et q̃nq̃ꝫ daˀ cũ
puluere hmõi. ℞. pſilij: gũmi arabici:dragaganti:boli ar
meni. añ. Da cũ ſyrupo ꝑdicto: ⁊ ſucco lingue arietis.

⁋ Fili⁹ Zacharie araſi. Ulcera pulmõis:cũ non ſunt cro
nica. ſꝫ adhuc aliqd ex ſanguine egrediˀ cum tuſſi curari
poſſia ſunt. Deˀ ergo cũ nõ eſt febris lac recẽter mulſum:
⁊ ſi fuerit cũ eis febris:deˀ aq̃ ordei cũ cãcris fluuialib⁹:
aut cũ ſyrupo de papauere. Et dũ nõ cõſtringiˀ anhelitus
eius adminiſtrentˀ trociſci de papauere: quoꝝ deſcriptio
hec ẽ. ℞. papaueris albi:ſemis cucurbite: ⁊ citrulloꝝ mũ
datoꝝ. añ. ʒ. iiij. dragagãti:amili. gũmi arabici:ſucci ligri
tie: añ. ʒ. v. thuris maſculi:boli armeni:ſanguis draconis:
karabe. añ. ʒ. ij. myrre:cinamomi:opij. añ. ʒ. i. Fiãt trociſci
Da cũ ſyrupo de papauere:aut rob myrti. Et q̃ñ cum iſtis
reb⁹ ꝯſtringiˀ anhelit⁹:deñ in potu ea:q̃ elargant ipm: ⁊
educũt saniẽ:ſicut ſyrup⁹ iſopi ⁊ ſimilia.

⁋ Sabor. Loboc ꝯferẽs ptiſicis ⁊ cõſũptis. ℞. teſticulo
rũ vulpis. ℥. ij. batrembuc:chayare. añ. ʒ. i. ciceꝝ dulcium
tritoꝝ. ℥. ij. ſemis papaueris albi. ℥. i. ⁊. ſ. ordei mũdi. ℥. i.
paſſulaꝝ enucleataꝝ:ficuũ ſiccarũ:carniũ dactyloꝝ:ana
℥. ij. cãcroꝝ fluuialiũ. ℥. iij. Decoq̃ntˀ oĩa in lib. iiij. aq̃ vſq̃ꝫ
ad lib. i. ⁊. ſ. Deĩde accipe çuccari: ⁊ penidiaꝝ:añ. lib. i. te
ſticuloꝝ vulpiũ elixoꝝ ĩ dulci lacte. ℥. ij. aut cũ olei amig
dalini. ℥. ij. Decoq̃ntˀ vſq̃ꝫ dũ ſufficiẽtẽ habeãt coctionẽ:
deide ꝑĳce ſup ea papaueris albi:ſucci ligritie: ſeminũ ci
truli:melonis:cucurbite:cinamomi: ſeminũ bõbicis pur
gatoꝝ:ſemis malue:floꝝ boraginis. ana. ʒ. ij. amili:draga
gãti:gummi arabici. ana. ʒ. ij. carnium dactilorum: paſſu
larum enucleatarũ. ana. ʒ. v. Tere ⁊ confice cũ ꝑdictis.
bonum ſi deus voluerit.

⁋ Filius Serapionis. Cõfectio deiacur conferens ad ca
tarrũ acutũ: ⁊ ptiſim ex eo. ℞. ſemis papaueris albi ⁊ ni
gri. ana. ℥. ij. ⁊. ſ. radicũ ligritie. ℥. i. ⁊. ſ. ſeminũ citonioꝝ:ſe
minis altee. ana. ℥. i. ⁊. ſ. draganti. ℥. ſ. gũmi arabici. ℥. ſ.
ꝑĳce ſuper ea aque pluuialis. li. v. ⁊ dimitte die ac nocte.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0228-6
DFG

Demū decoque vſq₃ ad ꝯſumptionē duarū partiū: ⁊ adde
mell'lib .i. ⁊ rob. libꝛ. i. ʒ. ⁊ penidiaꝝ lib. ʒ. ꝯcoq̄ igni leni vſ
q₃ dū mellis hēat ſpiſſitudinē. Da mane cū aq̄ ordei. Et
accipiat in ſero ex his pillul'. ℞. ſemis portu. ʒ. v. dragagā-
ti: gūmi arabici. aā. ʒ. iiij. ſemis citrulli. ʒ. iiij. ſemis cucurbi
te excorticati: ⁊ ſeminū citōioꝝ: aā. ʒ. vij. ſucci ligritie. ʒ. v.
Fac formas ſilēs lupinis cū mucilagine ſeminū citonio-
rum. Denī tenende ſub ligua.

¶ De egritudinibꝰ cordis.

Egritudines cordis ſunt. debilitas: pulſus: temoꝛ:
e ⁊ ſincopis. Et he q̄dē egritudines caſdē fere hñt
radices: nō alr̄ īter ſe differētes: niſi ſic̄ debiles ⁊
fortes. Cauſantia aūt has egritudies cū ſint debilia: ⁊ re-
miſſa īpꝛimētia debilitatē ꝯtra vigorē minere faciūt de-
bilitatē cordis. Amplīꝰ aūt eleuata vt īpꝛimāt agitationē
leſiuā in ipo faciēte cadere diuerſitatē ī dīntys motꝰ cor-
dis ſenſu ꝑceptibilē q̄ ſunt ex magno ad paruū: ex veloci
ad tardū: ex raritate ad frequentiā ⁊ ecōuerſo. Tūc fiunt
ꝯſtitutiones due: aut .n. fiūt illa nō ītegre: neq₃ in oī hora:
ſed cū quadā īterpollatiōe: ⁊ viciſſitudie: ⁊ fit pulſus cor-
dis: aut ītegre cū q̄dā ꝯtinuatiōe: ⁊ fit tremoꝛ cordis. Cū
fortioꝛa fiūt: vt īpꝛimāt vehemētiꝰ īpꝛeſſiōes fortiꝰ ledē-
tes: īpediētes: aut p̄focātes motꝰ eiꝰ: aut ſepelientes ſpūs
ad īterioꝛa: aut ītercidētes abſq₃ interciſione oīo: aut ag-
gregantes ad p̄ncipiū: aut reſecātes abſq₃ eo q̄ð eſt ī radi-
ce faciūt ſincopim. Uincentia aūt ea vltimata victoꝛia ſu-
per nām: ita vt abſcindat̄ ſpūs ⁊ caloꝛ vite: aut extinguat̄
in minera: ſunt cā mortis. Cāe aūt faciētes has egritudi-
nes: q̄daʒ ſunt cāe coꝛpoꝛee: q̄daʒ extra coꝛpꝰ ſurgētes. Et
coꝛpoꝛee q̄dē aut ſunt in ipo corde: aut in mēbꝛis vicinis
ei: aut in mēbꝛis cōicantibꝰ ei ꝓpinq̄ cōicatione: aut remo-
ta. Cāe aūt exñtes in corde ledētes ipm: aut ſunt malitia
ꝯplōnis ſine mā: aut cū mā: ⁊ malitia q̄deʒ ꝯplōnis domi-
nās cordi fac̄ debilitatē ipſiꝰ: debilitas aūt facta fortis vſ-
q₃ adeo: vt ſit agitatiua v̄tutis facit tremoꝛē. Tremoꝛ āt
ſupueniēs generat ſincopi. Ultimitas aūt facta in ſinco-
pi eſt extinctio ⁊ moꝛs. Sʒ malitia q̄deʒ ꝯplexiōis frigide
ſuſpectioꝛ eſt q̄ȝ calē ꝓpter elōgatōeʒ a re vite: ⁊ ſicca ma-
gis q̄ȝ humida: q̄ꝛuis hūida ſit dominās in diſpōne coꝛpo-
ris: ⁊ cā ēt hꝰ īterdū ſit cā p̄focatōis: ⁊ moꝛtʒ feſtine. Solō-
nem aūt ꝯtinuitatis: aut apationē fieri in corde v̄tus non
patitur: imo ſunt cā diſſolutionis ⁊ moꝛtis: ⁊ q̄ñ ineſt do-
loꝛ in ipſo fit cā ſincopis ⁊ moꝛtis.

¶ Dixit Gal. q̄ malitia cōplexionis pure: aut cū materia
facit in vniuerſaʒ coꝛpoꝛis partē ſenſuʒ leſionis q̄ ē doloꝛ:
⁊ quō non in corde. Fruſtrabit̄ ergo et ſupponēmꝰ altera-
tiones ī corde nō coꝛ curari: ⁊ nos q̄dē diximꝰ q̄ iā radix
ꝑpoſita eſt: ⁊ eni eſſe egritudinū cordis aut nō ꝯfirmant̄:
q₃ nō ſunt māſiue: ⁊ tūc oꝛdo medicatiōis īcolumitat: aut
ꝯfirmant̄ ꝯducentes ad moꝛtē. Diſtiguemus aūt in cau-
ſis leſionū cordis: q̄ ſunt ab alys mēbꝛis: q̄ñ leſio cadēs ī
pāniculis: ⁊ in mēbꝛis q̄ ambiunt coꝛ dū redūdat ad ipm
eſt cā egritudinū eius: p̄dictaꝝ in ipo. Et leſio cadēs in ce-
rebꝛo īterdū eſt cā ad illō ſicut in epilepſia: mania: ⁊ melā-
colia. licet .n. figant̄ in cerebꝛo: terminant̄ tamē in corde:
⁊ ſunt cā egritudinū eius. Et ex eis eſt fluxus ſanguīs na-
rium: aut vndecūq₃ ⁊ cōicat etiaʒ cum corde cōmunitate
magis ꝓpꝛia ſtomacus: ⁊ affert ei cauſas leſionū: ⁊ ꝓpꝛie
cum coꝛrumpit̄ in eo cibus: ⁊ res venenoſa: aut fuerit ī eo
humoꝛ moꝛdicatiuꝰ aut male q̄litatis. aut vitreus viſco-
ſus: aut repletio agitatiua: aut fames vehemēs: aut doloꝛ
acutus ⁊ pūgitiuus: aut fuerit in oꝛificio eius bothoꝛ: aut
vlcus putridum.

¶ Et dixit paulus q̄ egritudines q̄ ſunt in ſtomaci oꝛifi-
cio: aut meri ſunt ꝓpinque cōuerſionis ad ferendum leſi-
onem cordi: ita vt q̄dam putent tremoꝛeʒ factū in oꝛe ſto-
maci eſſe tremoꝛē cordis: ⁊ q̄dam voluerūt debilitateʒ in
ipſo eſſe cardiacā. Et diſpō epatis cū eſt alterata: vt gene-
ret ſʒ plurimū ſanguinē melancolicū impmit. ⁊ eſt cauſa
egritudinū cordis: ⁊ ē pꝛauioꝛ diſpōnibꝰ alys: ita vt faciat
diſpōnē ſilēʒ manie ⁊ melācolie. Adhuc aūt cauſe haruʒ
egritudinū ſunt eūones omnes excedētes terminū: ⁊ ſilr̄
in acuta aq̄ hypocondrioꝛuʒ extractio: aut ſaniei in aper-
tione apoſtematis. Et ex eis eſt p̄focatio matricis: ⁊ pua-
tio menſtruoꝝ: aut exuberātia coꝝ. Et ex eis eſt īpꝛegna-
tio ⁊ huiuſmodi nocumēta ex vermibus: vt ēt appareat
diſpō ſimilis epilepſie. Et ſunt ex vermibus hñtes acule-
os pungentes oꝛificiū ſtomaci punctōe vehemēti: donec
faciat cadere in doloꝛē acutū cauſā ad ſincopim: ⁊ aliquā-
do ad moꝛteʒ: ⁊ ſunt q̄ñq₃ ex penetrātibꝰ vſq₃ ad vicinas
cordis partes: ⁊ q̄ñq₃ vſq₃ ad coꝛ. ⁊ ſunt cā moꝛtis feſtine.
A cōitate aūt totius coꝛpoꝛis ſupueniūt leſiones cordi: ſic̄
ꝓpter febꝛē: aut ꝓpter vehementiaʒ raritatis coꝛpis: aut
ꝓpter vehementiā ſudoꝛis ⁊ ſilia. Ex cauſis aūt extrācis
accidit huiuſmodi: ſicut ex aere peſtilētiali: aut ex odori-
bus fetidis: aut venenoſis: aut aſſumptōe reꝝ venēoſaꝝ:
aut ex moꝛſu venenoſoꝝ aīaliū: aut icurſione timoꝛis: aut
ex balneatōe vehemēti: aut laboꝛe ⁊ ſilibus.

¶ Hic ꝯpletur dicta: ⁊ īponit̄ finis doctrine diui Meſue
licet īperfecte in de appropatis: ⁊ per ꝯſequēs totiꝰ operis
cuʒ auxilio noſtri redemptoꝛis.

¶ Tabula capituloꝝ additionū petri apponi.

¶ Sermo de vnctionibus. car. iiz.
¶ De ſincopi: car. ii3.
¶ De tumoꝛibus mamillarum. car. ii3.

¶ De egritudinibus mēbꝛorum nutritionis.

¶ De doloꝛe ſtomaci. car. ii3.
¶ De medicinis māʒ a ſtō repellētibus ⁊ abſtergētibus
ac villos eiꝰ mundificantibus. car. ii4.
¶ De emplīs linimētis ⁊ vnctōis. car. ii4.
¶ De indigeſtione ſtomaci. car. ii4.
¶ De vomitu. car. ii5.
¶ De ſingultu. car. ii6.
¶ De ſingultus cura. car. ii6.
¶ De ſiti. car. ii6.
¶ De appetitu moꝛtuo. car. ii6.
¶ De appetitu canino. car. ii6.
¶ De egritudinibus epatis. car. ii7.
¶ De egritudinibus ſplenis. car. ii8.
¶ De hydꝛopiſi. car. ii8.
¶ De doloꝛibus vētris. car. ii9.
¶ De fluxu ventris. car. iz0.
¶ Oratio ad memoriā impetrandam. car. iz1.