liditatis q̄ȝ roſatuȝ: ſed nō ē ſic delectabile ⁊ ꝑparaṫ vt roſatuȝ. valȝ ēt aſperitati ⁊ ſiccitati gutturis ⁊ cāne pulmonis. linit eni et alterat ⁊ aperit vias illas. vñ cōfert in ſqnātia colerica ⁊ i pleureſi ⁊ ſilibus paſſiōibꝰ. Et doſis eiꝰ ē vſqȝ ad. ℥ .i. cū aq̄ ordei: vel ſume ipm paulatiē lābēdo. Ubi vtiliṫ eſt notādū q̄ ſic tam roſe quā viole ꝯdiunṫ cū zuccaro vt apparet i lr̄a ſic ēt ⁊ multo magis cū melle. ⁊ ſic hñt diuerſas opatōes efficere ſic mel a zuccaro dīt i ꝯplone. vtiṫ aūt melle roſato ſic dcm̄ ē ſuperiꝰ i diamuſco. ſed melle violato tm̄ in diſſinterijs ad alterādū ⁊ abſtergēdum flegma cū alijs q̄ ponunṫ vt inferiꝰ patebit ⁊ apparebit.

z Uccarum bugloſſatū ꝯfortat cor. Maniacis ⁊ melācolicis ꝯfert. Et ſincopi ⁊ tremorē cordis aufert. Et modꝰ eiꝰ ē ſic zuccarꝝ violatū.

⁋ Zuccarū bugloſatū. accipiunṫ ꝺ ea flores: ⁊ ꝯdiunṫ cū zuccaro: ⁊ ē mltū i vſu tale zuccarꝝ. Eſt. n. mltū ꝯueniēs debilitati cordis ⁊ ipiꝰ tremori ⁊ oibꝰ paſſiōibꝰ melācolicis. reſiſtēs ſupfl̄ue reſolutōi ⁊ calefactōi: marie pmixtū cū zuccaro roſato: margaritis: corallis: ⁊ alijs cordialibꝰ medicinis. de qbꝰ diceṫ iferiꝰ. Et doſis eiꝰ ē vſqȝ ad. ℥ .i. Et eodē mō ꝑparari poterit zuccarꝝ melliſſarꝝ. ⁊ valet ſicut illud: ſȝ nō eſt ſic in vſu.

z Uccarum alchilil ſtomacū cerebrū ⁊ cor confortat. Uentoſitates fugat. Et eius operatio eſt ſic zuccarum roſatum.

⁋ Zuccarꝝ alkilil. i. boraglatū: q̄r factū cū floribꝰ boraginis ē mltū i vſu. Et valet ſic zuccarꝝ bugloſatū. Et iſtorꝝ duorꝝ ſepiꝰ fit admixtio ſil. Et ſic hñtur i vſu. ⁊ marie i paſſiōibꝰ ſupraſcriptis in zuccaro bugloſato. Et doſis eiꝰ ē eadē cū illa.

m El roſatum ſic fit. ℞. foliorꝝ roſarum ꝑparatorꝝ ſic diximꝰ ſupius. ⁊ ſint eius ptes. ij. melliſ boni partes. vi. Coquaṫ cū facilitate. ſic opȝ. Et ſunt q̄ ponūt melliſ ⁊ ſucci roſarꝝ ptes eq̄les. Et nō ponūt aliqd ex folijs oio. Et ſūt q̄ ponūt foliorꝝ ptē. i. ⁊. ſ. ſucci partē. i. ⁊. ſ. mellis partes. iij.

⁋ Mel roſatū ē caliē ꝯplonis. ⁊ ē mltū i vſu. Et lȝ ſuperiꝰ ꝺ ipo dictū ſit: tm̄ hic ēt vtiliṫ replicabo. fit. n. ipm cū ſuba roſarū q̄nq̄ȝ cū ſolo ſucco ipſarū. Et his duobꝰ modis ad formā electuarij reduciṫ cū dlectatōe mlta i eiꝰ aſſūptōe. q̄nq̄ȝ colaṫ ⁊ ad formā ſyrupi reduciṫ. Et his modis ē mltū in vſu q̄lrcūq̄ȝ ꝑpareṫ. Nā virtutes efficaciſſimas hȝ. Eſt. n. digeſtiuū materierū flaticarū cōtētarꝝ i ſtōaco ⁊ meſeraicis: ac ēt i īteſtinis: abſterſiuū illarꝝ ꝯfortatiuū vtutis digeſtiue ſtōaci calefaciēdo ipm. ⁊ eiꝰ vtꝰ nō trāſcēdit regionē epatꝭ. ⁊ vtimur eo marie cū ſyrupo ſimplici aceroſo vel ꝯpoſito i pncipio febrū flaticarꝝ cū aq̄ feniculi vel endiuie ſȝ q̄ cū flate ē mlta vel pauca vel nlla admixtio colere dādo in doſi ℥ .i. vtriuſqȝ ſyrupi: nō tm̄ ꝯueniret i febre pure colerica. Et eiꝰ doſis i forma ſolida ē. ℥ .i. ſ. ſiue ſit cū ſuba roſarꝝ: ſiue cū ſucco. ⁊ ipiꝰ colati doſis p ſe ſolū ē vſqȝ ad. ℥ . z. ſi expedit cū aq̄ ſimplici actualr̄ frida ſeu calīa ſm tps āni. ⁋ Et hic notādū q̄ tpe veris vtile digeſtiuū materierū flaticarū: ac ēt ab egritudīe pſeruatiuū ⁊ ſanitatꝭ ꝯſeruatiuū corporibꝰ ipotētibꝰ. ⁊ alijs qbuſcūq̄ȝ q̄rentibꝰ purgari. vt illo tpe cōiter fit mel roſatū ſex diebꝰ aſſūptū de mane in aurora cū hac decoctione. Recipe paſſularꝝ: aniſi: liquiritie. capillorū veneris. ana. ℥ .i. maſticis: gra. 6. fiat decoctio: vel cū decoctiōe ex radice apij feniculi ⁊ petroſelini. Et hoc erit maioris prouocationis ⁊ apertionis: ſed prima plus vtebatur thomas ſummus practicus.

m El vero violatū eodē mō fit ſic roſatū. ⁊ ſiliṫ bugloſſatum: ⁊ mel alchilil. Sȝ in melle alchilil ſunt q̄ ponūt ſpēs aleſangine note.

⁋ Mel violatum: eſt etiam multum in vſu. ⁊ ſolum vtitur eo in cliſterijs: ⁊ cum oleo ⁊ decoctione herbarum vel cuȝ aqua ordei: ⁊ alijs ad leniendum ⁊ alterandum: ⁊ aliqualiter ad abſtergendum ⁊ maxime acute febrientibus, ⁊ de ipſo ponimus vſque ad. ℥ . z. cum caſſia vel puluere de zuccaro. vel quandoque cum benedicta. vel quandoque cum Yerapigra vſque ad. ℥ . ſ. ſecundum exigentiam. Et modus condiendi eſt ſicut de melle roſato.

Nuces condite. dū ſūt virides: ⁊ acerbe ſūt fride ⁊ ſicce ꝯplonis in pmo. Cū āt ad ꝯpletā maturitatē ꝑueniunt caliditatē acutā acq̄runt i ſcdo ⁊ ſiccitatē i pmo cū nitroſitate quadā linguā vlcerāte ⁊ vnctuoſitate multa. Et modus ⁊ tps ꝑparatōis earū ⁊ cōdiendi eas eſt dum ſunt virides: q̄r nō aliṫ ꝯdiunṫ q̄ȝ pira ⁊ poma vt in lr̄a ponitur aperte. ⁊ aromatarij ſunt bñ docti i ꝑparādo eas cū melle gariofil. ⁊ alijs aromatibꝰ: ⁊ valēt ad ſtōacū cōfortandū. ita q̄ tpe quadrageſime a ieiunātibꝰ multū hēnṫ i vſu ſic ēt amigdale recētes ⁊ arācia parua ꝑparanṫ ab aromatarijs peritis. ⁋ Ultimo hic deſcribam qōdā electuariū mirabile de nucibus ⁊ a qbuſdā practicantibꝰ multū hētur i vſu valȝ. n. pncipalr̄ debilitati ac frigiditati renū ⁊ relaxatōi matricis ⁊ ſupfl̄ue hūiditati eiꝰ. Confert ēt fluxui antiquo mēſtruorꝝ: imo ē eiꝰ curatiuū aliq̄li euatiōe pmiſſa ⁊ cōfert cuilȝ dolori ventoſo frigido in nutritis. iuuat ēt ad digeſtionē cibi in ſtōaco. Et doſis eiꝰ ē de mane vacuo ſtōaco a ſuperfluitatibꝰ cibi vſqȝ ad. ℨ. 4. Cuiꝰ deſcriptio eſt hec. Recipe florꝝ nucis. ℥ . ſ. aniſi. ℥ .i. ſeminū agni caſti: foliorꝝ rute: calamēti: ciperi: cimini. ań. ℥ .i. ſ. Ligni aloes: macis: gariofilorꝝ ań. ℨ .i. Carui: ameos. ań. ℥ . ſ. roſarꝝ rubearū: ſeminū lactuce. Se. portulace: balauſtiarꝝ. ań. ℥ .i. ſ. ſandalorꝝ alborꝝ ⁊ rubeorꝝ: nenufarꝭ ań. ℨ .i. mirabolanorꝝ: chebulorꝝ ⁊ emblicorū. ań. ℥ . ſ. zucari q̄ztū ſuffiṫ. Agnus caſtus eſt arbor nota nō faciēs fructuȝ calide ꝯplonis in pmo: ſicce i ſcdo: hȝ mirabilē ꝓprietatē ad deſiccādū ſperma ꝓhibens deſideriū ad coitū ⁊ virge erectionē: ⁊ ad ſuffumigationes eiꝰ ad matricē tolliṫ ois eiꝰ appetitus. Et ſi rami eiꝰ ſternanṫ i lecto iuxta renes oio ꝓhibȝ pollutionē. Nenufaṫ vtimur ſoluȝ floribꝰ eiꝰ naſciṫ in paludibꝰ ⁊ aquis dulcibꝰ ſtagnorꝝ ⁊ ſūt frigide ⁊ hūide cōplexiōis i ſcdo multū ꝯfert ad ſōnū ꝓuocādū ſȝ oēm modū adminiſtratōis. Reliq̄ vo ſimplicia ſūt ſupiꝰ dclarata.

⁋ Et ſic eſt finis q̄rte diſtictiōis. Incipit quīta.

Ad ſomnū ꝓuocandum.	Ad aſma.
Ad aſperitatem cāne.	Ad catarū ſalſum ⁊ acutū.
Ad tuſſim antiquam.	Prohibens aſcenſum vaporū ad caput.
Ad tuſſim calidam.	

⁋ De ſpeciebus loch.

Quinta diſtinctio eſt de ſpēbꝰ loch ꝺ qbꝰ ſt aliq̄: q̄ fiūt ex dlectabilibꝰ. Et q̄daȝ q̄ fiūt ex horribilibꝰ de qbꝰ p ordinē tractabimꝰ. Et ſcribimꝰ in hac parte ex eis tm̄ famoſiora. In particularibus ⁊ enim ſcribemus nō famoſa: ſed valde vtilia ſi deus voluerit.

⁋ Hec eſt q̄nta pars pncipalis in qua meſue ꝺterminat de loch que ſimilitudinem quandam habet in modo ſube cum electuariis de quorum numero. quedam ſunt delectabilia. ⁊ quedā ad guſtum horribilia. ⁊ q̄re dictum ſit loch dictum eſt ſupius. Pro cuiꝰ intellectu eſt aduertendum q̄ vna ⁊ eadē deſcriptio pōt reduci ⁊ ꝑparari ſi fiat cum zuccaro in forma confectiōis in forma electuarii: ⁊ in forma Loch: differunt tamen in modo ſubſtātie. Et quodammodo in modo operationis. Nam per vlteriorem vel minorem decoctionem ⁊ admixtionē quorundā viſcoſorum fit in eis variatio ſenſibilis ⁊ manifeſta. Reqriṫ. n. ad ꝯfectōeȝ cōſtruēdā maior coctura zuccari vt p ipȝ iduret. ad electuariū vo minor. ad loch āt multū minor oibꝰ: ſȝ i ipo loch vt pluimū q̄dā viſcoſa ingrediuntur vt adherentiam faciāt in ipſo meri. Sed coquitur quidem loch modicū pluſq̄ȝ Julep: ⁊ minus q̄ȝ electuariū. vtimur. n. loch ſolū in paſſionibus pectoris ⁊ pulmonis. ⁊ in his que ſunt in meri. Confectionibus autem ⁊ electuarijs generaliter vtimur in quibuſcunq̄ȝ paſſionibus, ⁊ in quibuſcunque membris exiſtant vt declaratum eſt ſuperius. Plura autē loch fiunt cum melle q̄ȝ cum zuccaro. quia fortius abſtergit. aperit. adheret ⁊ calefacit.

l Och de pino ꝯferēs ad tuſſiȝ antiq̄ȝ ⁊ ad aſma: ⁊ ſputi viſcoſitatē: ⁊ ꝯſtrictionē anhelitꝰ. ℞. granorꝝ pini. ℨ. xxx. amigdalarū dulcium: auellanarū aſſatarum: dragaganti: gūmi arabici: liquiritie ⁊ ſucci eiꝰ: amili: capillorꝝ veneris: radicuȝ lilij celeſtis: ań. ℨ. iiij. carniū dactilorꝝ: cheyron. ℨ. xxxv. amigdalarū amararū. ℨ. iij. mellis: paſſularuȝ. zuccari tabarzet: ⁊ butiri recētis. ań. ℨ. iiij. mellis tabarzet quantum ſufficit. Sumatur ex eo quaſi lambendo. ℥ .i.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0112-0

¶ Loch de pino eſt multū in vſu. ⁊ vbiq preparatū reperit̃ cō ferens ſm̄ p̄ſētez deſcriptiōez ſenib⁹. ⁊ antiqs tuſſientib⁹: ⁊ aliis in qbus maťia flegmatica ꝯtinet̃ in pectore ⁊ pulmone. Eſt enī ꝯueniēs ad viſcoſitatē ſputi: ⁊ ad difficultatē anhelit⁹ ſeu ad aſma factū ex maťia cruda. et oꝫ in ore ꝓ cura illaꝝ paſſionū teneri. ⁊ paulatīe lambēdo deglutiri. ⁊ maxime ieiuno ſtōaco. ⁊ doſis eius eſt pro q̄libet vice. ʒ. 4. ⁊ ei⁹ cōplexio ē calida vſus p̄mū cū pauca ſiccitate. Cui⁹ deſciptio ē hec. ℞ecipe grāoꝝ pini: auellanaꝝ aſſataꝝ: reperiunt̃ domeſtice ⁊ ſilueſtres: domeſtice tamē ſunt meliores. ⁊ ſunt calide ⁊ ſicce in p̄mo cū vnctuoſitate q̄daꝫ: aſſate aūt ſunt ſicciores: dragagāti: amidi: ⁊ eſt ſucc⁹ frumēti iſpiſſatus nō bene maturi. ⁊ eſt calē ⁊ humide ꝯplexiōis vſus p̄muꝫ: Capilloꝝ veneris: radicū lilij celeſtis. ⁊ eſt Ireos. Carniū dattiloꝝ keyron. id eſt ď illa ſpē vel ꝫta. Mell̄ paſſularū id eſt in quo ſteterūt paſſule amotis nucleis earū. zuccari taberzet: añ. q̄ntum ſufficit ad loch ꝯſtruendū.

l Och ď papauere: ⁊ ē dyapapauer: ꝯferēs ad tuſſiꝫ calidā ⁊ pectoris aſꝑitatē: ⁊ cui⁹ ſputū ē tenue: ⁊ idiget maturatōe: ⁊ igroſſatōe. Et cōfert ad febrē calidā: ⁊ dolorē pectōis: ⁊ pleureſiꝫ. Cuius h̄ ē ꝯmixtio. ℞. papaueris albi. ʒ. xxv. amigdalaꝝ dlciū: excorticataꝝ: grāoꝝ pini: gūmi arabici: dragagāti: ſucci liqritie: añ. ʒ. x. amili. ʒ. iiij. ſemis portulace: ſemis lactuce: ſemis citōioꝝ: añ. ʒ. iiij. croci. ʒ. i. penidioꝝ alboꝝ. ℥. iiij. ſyrupi ď papauere q̄ntum ſuffic̄. Et ſit ꝓprie ſyrupus ex capitib⁹ papaueris albi: ⁊ nigri: ⁊ ſemine lactuce ⁊ violis.

¶ Loch ď papauere. ē. n. dyapapauer ⁊ ſic noīatur. ⁊ eſt multū in vſu. ⁊ p̄paratū reperit̃. eſt enī multe vtilitatis ⁊ efficacie ī materieb⁹ calidis ⁊ ſubtilibus cataroſis. ⁊ maxime ſalſis. ⁊ acutis q̄ a capite fluūt ad guttur ⁊ ad pulmonē īducēdo aſperitatē cāne ⁊ caſitatē ī ea. ⁊ ſīme ꝯfert tuſſi ſicce ex dictis cauſis. lenit. n. partes illas materias īgroſſando, vñ ꝓhibet fluxū earū ad pectus. eſt ēt ſomni ꝓuocatiuū. vñ virt⁹ ꝯfortat̃: ꝓhibet. n. aſcēſum vapoꝝ acutorū ad caput in febribus. vñ multū ꝯuenit eis. ⁊ doſis eius eſt vſq ad. ʒ. 4. oī tēpore paulatine lābēdo: ſed melius vacuo ſtomaco. Saluo cū q̄rimus ſomnum ꝓuocare vel materiā ſubtilē in capite ꝯtentā ingroſſare. In his. n. duobus caſibus rectum eſt aſſumere de ſero vna hora poſt cibum. ⁊ eodē mō ď mane ſumpto ꝑādio. Et eius ꝯplexio eſt frigida verſus p̄mum. ⁊ humida in ipſo. Simplicia autem ip̄m componentia ſunt ſuperius declarata.

m Odus ꝯfectōis de iacur ſcd̄ꝫ ītentōez Gal. ⁊ ē dyacodiō puꝝ: ꝯferēs eis qb⁹ ex capite ad pect⁹: ⁊ ad p̄lmonez ſubtiles catarri defluūt: ⁊ ſunt cā tuſſis ⁊ īſomnietatiſ. ℞. x. papauera in qb⁹ ſit mediocritas iter ꝑuitatē: ⁊ magnitudinē: ⁊ humiditatē: ⁊ exiccatōez: ⁊ ꝓijciat̃ ſuꝑ ea aq̄ ſextariū vnuꝫ: ⁊ ſit aq̄ pluuial̄. Et ſi ſint hūida pluſq ſicca dimittat̃ die ac nocte. ⁊ ſi ſint ſicciora: dimittant̃ plus. Tūc coque ea vſq dū diſcocta ſint: ⁊ aq̄ due partes ſunt ꝯſūpte. Tūc vō cola ſuccū ei⁹: ⁊ reſtat p⁹ illō duplex ꝯſideratio. Qm̄ ſi catarrus ſubtil̄ fuerit: ⁊ timet̃ fluxus ei⁹ ad pect⁹ ⁊ pulmonē: ⁊ cānā: ⁊ timent̃ vigilie: opꝫ tunc vt miſceat̃ ex rob q̄ntitas: q̄ ſit medietas aq̄: ⁊ coquat̃ ſuꝑ igne in q̄ nō ſit flāma: nꝫ fum⁹: ſꝫ ſuꝑ prunas tm̄. Et ſi ꝯuenit in hāc itentiōe mel: qm̄ mel ē ex hn̄tib⁹ acumē: q̄re eſt ſubtiliatiuū: ⁊ eſt p̄ter h̄ qō itēdim⁹. Et qm̄ eſt mā ſubtil̄ valde: ⁊ mel ē ex ſubtiliātib⁹. Cū aūt plenitudo ꝯtinet̃ ī torace: ⁊ p̄lmōe: ⁊ velis medicamē fieri abſterſiuū tūc mel ꝯueniētius ē. qm̄ dormire fac̄: ⁊ mās: q̄ ſunt in pectore: ad expellendū habilitat. Et qñq ſit medicamē ex vtriſq qñ cadūt in occupatōe duplicis ītētōis. Et ē doſis ei⁹. ʒ. i. ⁊ plus ⁊ min⁹: ſcd̄ꝫ q̄ exigit diſpō. Et oꝫ vt teneat eā patiēs ī ore ſuo. ⁊ traijciatur ide modicū: qō diſſoluit̃ ex eā ī ſaliua. Si aūt velis vt ſit retētiuū nāe: ⁊ eruptōis ſanguis a locis: q̄ ſunt ſuꝑ dyaphragma: ⁊ ab alijs locis manatōis. ⁊ a partib⁹ viſcerꝫ. Tūc ad vnāquāq lib. ipius ꝓijciant̃ acatie rubee: heuſiſtides: croci: myrre: balauſtie añ. ʒ. i. ⁊ ramic ʒ. iiij. ⁊ adminiſtret̃. Et ſunt q̄ ponūt ide iacur puro loco mell̄ penidias. Et ſunt q̄ ponunt zuccaꝝ. Et qñq exigit diſpō egritudis: q̄ eſt mlte caliditatis ⁊ acuitatis. vt fiat medicamē ex papauere nigro: ⁊ ſint ei⁹ capita vſq. l. Et qñq ex albo aut nigro: Et loco mellis ponit̃ zuccaꝝ: aut penidie.

¶ Modus ꝯfectionis. i. ꝯpoſitionis de Iacur ſcd̄m intentionē Galieni. ⁊ vocat̃ diacodion. q̄ ſic denoīatur. Iſtud eſt tertium loch q̄ multum habet̃ in vſu: ⁊ vbiq ſcd̄m hāc deſcriptionem p̄paratum reperit̃. licet nō reperiat̃ vbi Galienus eā deſcripſit. dicit̃ autē Iacur qō grece idē eſt qō papauer. nā magna pars papaueris īgredit̃. Et habet quaſi eaſdē virtutes ⁊ operationes: quas hꝫ ſupraſcriptum loch dcm̄ dyapapauer. Et eodē modo ⁊ tēpore debet ſumi ſicut illud. ꝑncipaliter tñ ꝯfert his qui inſomnietatē ⁊ vigiliarum īſtātias patiunt̃ ⁊ catari deſcēſum ſubtilis ⁊ acuti ad partes pulmonis. Et ꝯuenit tuſſi ſicce extenuatis ⁊ ꝯſumptis. ⁊ eius cōplexio eſt frigida vſus p̄mum. ⁊ ſicca infra p̄mum cum ſtipticitate manifeſta. Cuius hec eſt deſcriptio. ℞ecipe decē capita papaueris: ⁊ aque ſextarium vnum. ⁊ eſt pōdus lib. z. ſ. ⁊ iij. lib. in medicina qñq reperit̃ ſextarium olei. ⁊ ē pondus lib. i. quādoq reperit̃ ſextarium mellis. ⁊ eſt pondus lib. iii. rob. i. ſape. Et ꝓhibet eius cōfectionē cum melle: ſed vult cum zuccaro. q̄ mel multum calefacit ⁊ ſubtiliat. ⁊ plus acuendō materiā fluere facit. Ramich acatie: ⁊ eſt ſuccus prunorum īmaturorum. Ipoqſtidos ⁊ eſt ſuccus barbe hircine. Et reliqua ſimplicia ſunt declarata.

m Odus ꝯfectōis de moris: ⁊ ē dyamoron ꝯueniens ad ap̄ata gutturis ⁊ vuee. ⁊ ad oīa gña p̄focationū. ℞. expſſiōis moroꝝ dulciū que currūt ſcd̄ꝫ ſemitā ficus ⁊ moroꝝ ď ſeni: añ. lib. i. ⁊. ſ. rob: ⁊ mell̄: añ. lib. i. coquant̃ cū facilitate vſq ad mellis ſpiſſitudinē ⁊ recōde. Et ſūt q̄ faciūt medicamū illō ſimplex ⁊ ſunt q̄ addūt: ⁊ ꝓpe qñ maior vocat neċitas alunis: myrre: croci: ſucci agreſte: añ. partes eq̄les.

¶ Modus ꝯfectionis. i. cōpoſitionis de moris. ⁊ vocat̃ dyamoron. Et ſcd̄m p̄ſentē deſcriptionē nec p̄parat̃: nec habet̃ in vſu ſed ſolum illa que ponitur a nicolao in ſuo antidotario que ad ſimilitudinem ſyrupi reducit̃: ⁊ ſic habet̃ in vſu ad gargarizandum in paſſionibus gutturis cum aqua ordei vel alia decoctione conuenienti.

m Odus ꝯfectiōis ď ſuccis nucū: ⁊ vocat̃ grece dyacaridon ꝯferēs eis qbus a capite ad pectus catarr⁹ acut⁹: et ſubtil̄ defluit: et ad cānā pulmōis: et ē cā ap̄atū: et p̄focationū et morṫ. et ē ad hoc medicamē ſublime. Et ei⁹ modus ē. Accipe ſucci extioꝝ corticū nucū in diebus canicularibus. lib. iiij. Decoq̄ ip̄m bullitōe vna. Deide adde ei mellis lib. ij. et decoq̄ donec ipinguet̃: et fiat ſic̄ mel. et poſt illō nobis occurrēt itentiōes. iiij. Nā ꝓ pueris et mulierib⁹: et humidis nā ſuffic̄ medicamē ſic ſcm̄. Et qñ morb⁹ ē in p̄ncipio: aliqd de ſtipticitate hn̄tibus miſceri oꝫ ſic̄ ſunt roſe et balauſtie. et qñ ī ſtatu ē egritudo croc⁹ et myrra: miſcēda ſunt. In ďclinatōe vō baurac: et ſal armōiac⁹: et ſilia. eſt. n. medicamē ſublime ⁊ expertū.

¶ Modus cōfectōis. i. cōpoſitionis nucum. nō eſt in vſu.

l Och ď ſqlla ē medicamē iuuamēti magni: eis qb⁹ mā gſſa et viſcoſa: et difficil̄ maturatiōis exuberat in mēbris anhelit⁹ reddēs eā facilē ad expellēdū: et ꝯfert difficltati anhelit⁹: et dolori pectoris: et lateꝝ. ℞. ſucci ſqlle: mell̄ diſp̄ūati ꝑtes ꝯuenictes. decoq̄nt̃ ī ſuba loch: et accipiant̃ ſic lābendo.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0113-6 DFG

¶ Iſtð loch ē mixtū ī vſu. ⁊ ꝑparatū repit̄ qð ðnotat̄a ſqlla q̄ ꝓn cipalr̄ īgredit̄ ei⁹ ðſcriptōez vł ꝯpōnē. Et ei⁹ vtilitas ⁊ iuuamē ta maxīe ſūt ſenib⁹ ⁊ ðcrepitꝫ ī qb⁹ abūdat mat̄ia groſſa flatica ⁊ viſcoſa ꝯtēta ī pectore. fac̄. n. eos facile expuere ſubtilīādo īci dēdo deſiccādo. ⁊ opilatiōes viaꝝ aperiēdo: ⁊ alias vtilitates hꝫ q̄s auctor pōit ī ī͠fa. Et ꝯfert aſmati ⁊ difficultati anhelitus. Et ei⁹ ꝯplō ē cal̄a ⁊ ſicca vltra 2ᵐ gradū. Jō caued̄⁹ ē ei⁹ vſus ī iu uenib⁹ ⁊ acute febꝛiētib⁹: ⁊ ī paſſiōib⁹ calidis. Et doſis ei⁹ ē vſqꝫ ad. ʒ. 2. vacuo ſtōaco. ⁊ oīa ſimplicia īgrediētia ei⁹ ꝯpōnē ſūt ſu perī⁹ ðclarata. q̄re reſpice ꝓ eis īueniēdis tabulā īſert⁹ ðſcriptā.

l Och alfeſcera valet ſic̄ loch de ſqlla. Et ei⁹ modus eſt ſic̄ in illo: ⁊ eſt medicamē expertū.

¶ Loch alfeſera. i. vitis albe q̄ bꝛionia dr̄. nō ē ī vſu.

l Och ſanū ⁊ exptū: ⁊ eſt ex īuētiōe nr̄a ꝯferēs ad tuſſiꝫ: ⁊ ad raucedinē vocis: q̄ eſt ꝑꝑ fridi tatē: ⁊ flegma groſſū qð ꝯtinet̄ ī pectoꝛe ⁊ pl̄ mone. accipe cinamōi: iſopi ſicce: ligritie: aā. ℥. ß. iuiu be: ſebeſten: aā. nūero. xxx. paſſulaꝝ enucleataꝝ: ficuū ſiccaꝝ: ⁊ dactiloꝝ pīguiū: aā. ℥. ij. fenugreci. ʒ. v. capil loꝝ veneris: mā̄ipulū. i. aniſi. feniculi: ireos: calamēti: ſemis lini: aā. ʒ. iiij. hec oīa coquant̄ ī libꝛ. iiij. aq̄ vſqꝫ dū remaneāt libꝛe. ij. ⁊ ꝓijciant̄ ſuꝑ ea penidiaꝝ libꝛe ij. ⁊ coquant̄: ⁊ īpinguent̄ vſqꝫ ad ſpiſſitudinē mellis: Deide ꝓijciant̄ ſuꝑ ea pineaꝝ mūdataꝝ. ʒ. v. amigda laꝝ mūdataꝝ: ligritie: dꝛagagāti: gūmi arabici: amili: aā. ʒ. iij. ireos. ʒ. ij. Miſceant̄ oīa: ⁊ agitent̄: vſqꝫ dum medicamē maceret̄: ⁊ albū fiat. Doſis ei⁹ eſt. a. ʒ. v. vſ qꝫ ad. x. ⁊ ſumatur lambēdo.

¶ Loch ſanū ⁊ exptū ſub hoc noīe mixtū habet̄ ī vſu ⁊ vbiqꝫ ꝑ paratū reperit̄. hꝫ. n. vtilitates: ⁊ iuuamēta ꝓncipalr̄ ad tuſſiꝫ an tiquā ⁊ raucedinē vocis q̄ ꝓueniūt a flate groſſo viſcoſo ꝯtēto ī ſtōaco ī pectoꝛe vel ī cāna. ⁊ ē melioris potētie ī īcidēdo ⁊ ſubti līādo mat̄ias groſſas ⁊ viſcoſas q̄ꝫ loch de ſqlla ſic̄ dcm̄ ē: lꝫ po nat alias v̄tutes ⁊ vtilitates: q̄s tu ipe lege in ī͠fa. Et doſis ei⁹ eſt vſqꝫ ad. ʒ. 4. ⁊ ei⁹ ꝯplexio ē calida ⁊ ſicca vltra ꝓmū. Eſt. n. mi rabile ī ſuis opatiōib⁹. R. Cinamōi: ficuū ſiccarū. ⁊ ē ei⁹ ꝯplō ca lida ī fine ꝓmi: ⁊ ſicca ī ꝓn° eiuſdē: hn̄t. n. v̄tutē abſterſiuā cū ni troſitate q̄dā: ⁊ mixta ꝓuocatōe ⁊ apitōe: ⁊ caueat̄ ab ipaꝝ vſu: multiplicāt. n. pediculos ⁊ ſcabiē: ⁊ addit ī eis fenugreci. Semē ei⁹ notū ē qð ē ī vſu. Et ē cal̄e ꝯplōnis ī fine ꝓmi. ⁊ ſicce in ꝓn° eiuſdē. Semis lini notū ē cal̄e ꝯplōnis ī ꝓ°. ⁊ hūide vſus ipꝫ tē dēs ſatis ad equalitatem in ſiccitate ⁊ humiditate. Reliqua ſim plicia declarata ſunt ſupꝛa.

l Och ad caliditatē ⁊ aſperitatē pectoꝛis: ⁊ ad tuſſiꝫ calidā. accipe radicis ligritie. ʒ. xv. cheſ mes pīguiū. ℥. ij. ſebeſtē: iuiube: aā. ʒ. xxv. ðco quant̄ cū facilitate cū. iiij. lib. aq̄. vſqꝫ ad librā. i. ⁊ ꝓij ciat̄ ſuper ipm̄ caſiefiſtule. ℥. i. Deide colent̄ a ſcoſis: ⁊ ꝓijciatur ſuper illð rob. ℥. iiij. penidiaꝝ libꝛ. ß. Deide coquantur donec īpinguent̄. Deide miſceātur cū eis farine fabaꝝ. ℥. ij. ⁊ lambatur ex eo.

¶ Loch ad calitatē ⁊ aſpitatē pectoꝛis nō ē ī vſu. nec ꝑparat̄: ſꝫ loco ei⁹ aſſumit̄ Loch de diadragāte poſitū a nicolao: vł loch de papauere: de quo dictū eſt ſuperius.

l Och alið nr̄ꝫ ī ītētōe hac. accipe ſemis papa ueris. ʒ. x. radicis liq̄ritie. ʒ. vij. ſebeſtē. xx. pſi lij: granatoꝝ: citōioꝝ: aā. ʒ. v. coquantur cuꝫ trib⁹ libꝛis aq̄: vſqꝫ ad. i: ⁊. ß. ⁊ colent̄: et ꝓijciant̄ ſuꝑ illð rob: ⁊ penidiaꝝ. aā. ℥. iiij. et iteꝝ coquant̄ donec ī pinguent̄. Deide miſceant̄ cū eis dꝛagagāti et gūmi. aā. ʒ. v. papaueris albi: ⁊ trium granoꝝ: aā. ʒ. ij.

¶ Loch nr̄ꝫ alið nō ē ī vſu. nec ꝑparat̄ magr̄alr̄. tū ei⁹ vſus ēēt ꝯueniēs ī oīb⁹ ī qb⁹ ꝯuenit loch ð papauē. ⁊ ēt plus.

l Och bonū ꝯferēs ethicis: et ꝯſūptis: et ptiſi cis maxīe: et expellit ſaniē ð pectoꝛe: et mūdi ficat pect⁹: ⁊ pl̄mōnē: et tuſſi lenit. ℞. papaueris albi ſpodij: ſemis lini toꝛrefacti: croci: amigdalaꝝ dulciū: aā. ʒ. iij. amili: dꝛagagāti: gūmi: ſeminū citonioꝝ: ſemi nis citrulli aā. ʒ. vi. granoꝝ naſturcij coctoꝝ: amigda laꝝ amaraꝝ. fabaꝝ: ana. ʒ. i. et. ß. penidiaꝝ. ʒ. lx. diſſol uant̄ penidie in aq̄ fontiū. et coquant̄. et ꝯficiant̄ cum eis cetera. Doſis eſt. ʒ. ij. cū aqua mellis.

¶ Loch bonū ꝯferēs. n̄ ē ī vſu: ſꝫ magr̄alr̄ ꝯuēit ſic̄ loch ð ſqlla.

l Och ad aſma bonū: et ꝯſtrictōez anhelit⁹. et ad tuſſiꝫ ātiquā: et ſubtiliat humoꝛē groſſuꝫ. ℞. ſqlle aſſate. ʒ. iiij. radicis lilij celeſtis. ʒ. ij. iſopi: praſſij: aā. ʒ. i. myrre: croci: aā. ʒ. ß. ꝯfice cū melle

¶ Loch ad aſma. nō eſt in vſu nec pꝛeparatur.

l Och de amigdalis ꝯferens ad tuſſiꝫ: et vehe mētiā ſiccitatꝭ pectoꝛis: et pulmōis. ℞. amig dalaꝝ dl̄ciū et amaraꝝ: ſemis lini toꝛrefacti: granoꝝ pini: aniſi. dꝛagagāti: gūmi arabici: ſucci ligritie: et ra dicis ei⁹: aā. ʒ. ꝛ. ß. zuccari: penidiaꝝ: aā. ʒ. iij. Cōfice cū melle et ſucco feniculi bullitoꝝ q̄titate ſufficiēti.

¶ Loch de amigdalis nō eſt in vſu: nec pꝛeparat̄.

¶ Ultimo nō q̄ iſta ꝑdcā loch ſupi⁹ poſita. ⁊ illa q̄ ēt ponunt̄ a Nicolao: poſſent ⁊ deberēt adinuicē ꝑmiſceri: aut aliq̄ ex eis ⁊ ſic ab expertis pꝛacticātibus ſepiſſime fit ꝓpter diuerſas ītentio nes q̄s hn̄t curādo ꝑficere. verbi grā. qñ fit ꝑmixtio loch ð pino vel loch ſani: que duo loch ſunt cal̄e ⁊ ſicce ꝯplexiōis habēdo re ſpectū ad materiā groſſaꝫ flegmaticā cuꝫ loch de diadraganto: ⁊ diapapauere q̄ ſunt frigide ⁊ humide ꝯplōnis: cū habem⁹ ītē tionē ad materiā calidā: ⁊ ſubtileꝫ exaſperātē cānā ⁊ guttur. Imo ēt ipſa ꝑmiſcemus cū zuccaro violato cū querim⁹ alteratōeꝫ ma ioꝛeꝫ ad frigidū. ⁊ ꝑdcā loch oīa ſunt ſolutiua. Et de eis hec ſuf ficiant reſeruādo que dicent̄ in antidotario nicolai.

¶ Et ſic eſt finis diſtinctōis q̄nte. Incipit ſexta.

Ad ſomnū pꝛouocandū.	Ad idropem.
Ad paſſiōes frigidas cerebꝛi.	Ad oppilationes epatis.
Ad ꝯmotionē dentiū.	Aperitiuum oppilationum.
Ad paſſiōes fridas neruoꝝ.	Ad groſſitiem ſplenis.
Ad aſpitatē cāne ⁊ gutturꝫ.	Ad fluxum.
Ad paſſiōes pectoꝛis.	Ad lienteriam.
Ad tuſſim.	Supercalefactioni renum.
Ad pleureſim.	Ad mēſtrua ſuperflua.
Pꝛohibens aſcenſum va poꝛuꝫ ad caput.	Ad diabetem.
Ad ſingultum.	Pꝛouocās ſudoꝛeꝫ ⁊ vꝛinam.
Ad ſupcalefactōes coꝛdis.	Ad podagrā ⁊ paſſiōes frigidas iuncturarum.
Ad appetitū coꝛruptum.	Ad ſedationem cutis.
Pꝛouocās vomitū.	Ad peſtem.
Ad vomitū ſuperfluum.	Digeſtiuum colere ſubtilis.
Ad ſitim extinguendum.	Digeſtiuū colere ⁊ flegmatis.
Ad oppilationē ſtomaci.	Digeſtiuū materieꝝ groſſaꝝ.
Ad ſtomachū relaxatū.	Digeſtiuum ⁊ ſolutiuū materie rum melancolicaruꝫ.
Ad ſupcalefactōeꝫ epatis.	

¶ Diſtictio ſexta ð ſyrupis et robub.

S Iruporū alij ſunt ſimplices ſic̄ ſpēs iuleb. aliq̄ ext̄ēſe cō pōnis ꝓpter arduitatē: et mł̄titudinē bn̄ficioꝝ ipſoꝝ. Et ſunt q̄ ſunt ex ſpē bus ſecaniabi. Et ſunt q̄ ꝯdiunt̄ cuꝫ ſpēb⁹. Robub āt ſpēs ex ſuccis fiunt tm̄ de operatiōe nihil aliud merē tibus niſi inſpiſſationē ſolam.

¶ Hec eſt ſexta pars ꝓncipalis hui⁹ antidotarij. In qua auctoꝛ dēminat de diuerſis ſpecieb⁹ ſyrupoꝝ Juleb ⁊ ſuccoꝝ. Eſt. n. ſyrupus nomē grecū a quo dꝛiuatur ſyrupus. ⁊ grece idē eſt q̄ potio. potiōes aūt multū diuerſificant̄ adinuicē. Et ꝑmo in mō ſubſtātie penes groſſitiē ⁊ ſubtilitatem. Secundo in modo cō poſitionis ⁊ ſimplicitatis eaꝝ: nā dr̄ia eſt īter ſyrupū: iuleb: rob: robub: aquā: ſuccū. ⁊ decoctōes: que oīa includuntur ſub noīe potionis. Etiā de ſyrupis q̄daꝫ eſt ſimplex ⁊ q̄daꝫ compoſitus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0114-1
DFG