corticũ mādragore.añ. ptes eq̃les. In alio opij. par
tes.ij.croci.partē.i.ↄfice cũ melle diſpumato. Doſis
ei⁹ eſt a.ʒ.ij.vſq₃ ad aureos.ij.
¶ Non eſt in vſu.

3 Azenea expta ad dolorē ſtomachi a frigidi-
tate fcm̃:⁊ oēs dolores fcōs ex ſili cā:⁊ a vē-
toſitate groſſa:⁊ ad dolorē colice:⁊ difficul-
tatē vrine:⁊ dolorē dētiu₃:⁊ ad vētoſitates mřicum.
Et ↄfert iuuamētu₃ maximũ ad ſterilitatē bibitum:⁊
ſuppoſitũ cũ lana:⁊ oleo de lilio. Cuius pmixtio hec eſt.
℞.caſtorei:myrre:opij:pipis:macropipis.galbani:
coſti cinamomi fu:meu:dauci:aſſari:croci:añ. partes
eq̃les. Cōfice cũ melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt aur.i.
Et ſunt q̃ cōficiūt cum rob.

¶ Licet iſtud electuarium non ſit in vſu magiſtraliter:tamē po
teſt ꝑparari.⁊ ego laudo eius vſum in dolorib⁹ ex materia catar
rali frigida ⁊ humida tenēdo ſuper dentē q̃tum eſt granũ fab. il
lius electuarij ſemel aut bis in die timēdo deglutionē ei⁹ ꝓpter
opiũ.ꝑmiſſa tamen digeſtione ⁊ vſi euacuatione illius materiei.
h₃ īſuper ſedare dolorē ſtomaci ⁊ renum ⁊ veſice ⁊ īteſtinorum
factũ a vētoſitate groſſa: vel a materia flegmatica ⁊ ſūme cōfert
colice vētoſe in qua flegma multũ in īteſtinis cōtinetur euacua-
tione tamē ſemp premiſſa:⁊ mirabilr̃ cōfert mulieri ſterili ⁊ que
cũ difficultate īpregnatur:bibitũ ⁊ ſuppoſitũ in matrice cũ lana
in forma groſſi ſtadij.⁊ cũ oleo de lilio.nō tamē vltra tres horas
teneri db₃ nec ſepe ↄtinuari nec īnouari timore opij a quo eſt fu
giēdum:niſi in caſu magne neceſſitatis:vt ſepe dictum eſt. Et l₃
medicine exceſſiue caliditatis īgrediantur in deſcriptione oīum
in q̃bus īgredit̃ opiũ.virtus tamē opij lōgo tēpore durat ⁊ viget
eius potētia cũ virtute exceſſiua ſue ↄplexionis frigide cu₃ eius
occulta ꝓprietate ⁊ in ſui malitia aliq̃alr̃ remittit̃ a virtute me
dicinaꝝ:qua virtute deducit̃ ad mēbra ⁊ loca ad que per ſe ſolũ
trāſire nō poſſet:vſus aūt huius electuarij nō debet eſſe niſi poſt
duos ānos.ſ.elapſos poſt ei⁹ cōſtructionē vſq₃ ad ſeptē ānos in
diſpoſitionib⁹ ante dictis. In dolore aūt dētium ↄuenit poſt ſex
mēſes ad obtūdendũ aliqualiter ſenſum qui eſt in radice dentis
⁊ ad exſiccādum materiā illā.doſis eſt vſq₃ ad aureũ vnũ qui eſt
aliquātulũ plus q̃₃.ʒ. Cui⁹ dſcriptio hec eſt. Recipe caſtorei:mir
re:opij:piperis nigri.macropiperis:galbani:coſti:cīamomi:meu:
dauci:aſari:croci.añ.partes equales.mellis q̃tum ſufficit.

a Thanaſia magna ↄfert ad dolorem epatis ⁊
ſplenis:⁊ oppilōni in eis:⁊ ad dolorē ſtoma-
chi:⁊ ad aſma:⁊ ad tuſſim antiquā:⁊ mũdifi-
cat pect⁹. Et ad fluxum ventris antiquum:⁊ ad dyſen
teriam:⁊ ad fluxum ſanguinis. Et eſt in ſedatione do
lorum:ſicut phylonium. Et cōfert ad dolorem renum:
⁊ emorroidarum. Et galienus quide₃ precepit miſce
ri in ↄfectione hac: epar adib. valet enim ſua ꝓprie-
tate ad morbos epatꝫ. Cuius hec ē permixtio. ℞. cro
ci:opij:myrre.caſtorei:iuſq̃ami albi:coſti:cordumēi:
ſemis papaueris rubei:ſpice:eupatorij:epatꝫ adib:⁊
cornu dextrum de cornibus capre. Et in alio. De cor
nibus cerui. De ſingulis ana partes equales. Et tere
que terenda ſunt:⁊ alia liquefac in vino:⁊ confice cũ
melle diſpumato:⁊ da poſt ſex menſes. Doſis eius eſt
ab aur.ſ.vſq₃ ad.i.cum vino ſuaui ⁊ dulci. Aut cum
rob:⁊ ſucco endiuie:⁊ apij.

¶ Licet non ſit in vſu ſecundum preſentem deſcriptionem:ma
giſtraliter tamē vti poteſt ſecundum ꝑſentem deſcriptione₃ quā
breuiſſime dclarabo:dicitur Athanaſia q₃ compoſitio talis que
hominem a morte preſeruat. nam curat ⁊ confert multum di-
ſpoſitionibus quas auctor ponit in littera. Et lic₃ iſte deſcriptio
nes adinuicem comparate diuerſificentur. ſecundum tamen di-
uerſa tempora ſue conſtructionis ſcilicet principium:proceſſum:
⁊ finem omnibus confert ſicut dictum eſt de tiriaca. Nam tran-
factis ſex menſibus: vſque ad annos tres confert fluxui ſangui
nis maxime exhibita cum ſucco plantaginis aqua endiuie ⁊ ſi-
milibus:quando autem pertranſit tertium annum confert oppi
lationib⁹ epatꝫ aſmati tuſſi.⁊ ſimilibus diſpōnibus.⁊ cum vino
dulci.⁊ aqua apij.⁊ ſilib⁹. ⁊ maxime qñ plus ātiquatur vſq₃ ad
lo.annos ſue ↄſtructiōis. Et doſis ei⁹ eſt vſq₃ ad.ʒ.i. ſicut dcm̃
eſt de filonio. Reſtat nunc declarare alia ſimplicia: reliq̃ ſunt ſu
peri⁹ declarata. Primũ eſt epar adib.i.lupi qđ eſt calm̃ ⁊ humi
dũ verſus ſcđm. valet a proprietate in paſſionib⁹ epatꝫ.⁊ maxi-
me in oppilōnib⁹ ſm̃ q̧ aſſerit Gal. quē allegat Meſue ī hoc
caplo. Cornu dextri capre alſ cerui.⁊ eſt meli⁹:quod eſt frigide
cōplexionis in ꝑmo ⁊ ſicce in ſcđo.⁊ ēt a ꝓprietate operat̃ ī paſ-
ſionib⁹ ſupradictis:l₃ etiam ↄferat ſua ſtipticitate cuilib₃ fluxui
ſanguis ⁊ maxime mēſtruorũ. Rob.i. ſapa.⁊ eſt cal'e ⁊ humide
ↄplexionis in ꝑmo gradu. Endiuia vero eſt cui⁹ ↄplexio dum
eſt recēs eſt frigida in ꝑmo. ⁊ humida īfra ꝑmum.cũ vero ē ſic-
ca eſt frigida īfra ꝑmu₃ ⁊ ſicca in eodē.habet īſuper virtutes di
uerſas frigidas ⁊ calidas quib⁹ mediantib⁹ operat̃ in diuerſis
materijs.licet frigiditas ſuper ei⁹ caliditatem que eſt remiſſa.cō
ficitur cum melle diſpumato.reliqua ſunt nota.

Jaſulfur confert febribus antiquis:⁊ melan
d colicis:⁊ flegmaticis:de conſtrictione anhe-
litus:⁊ antique tuſſi:⁊ ei qui hab₃ pectus ſa-
nioſum. Et confert iuuamentum manifeſtum ad du-
ritiem ſplenis:⁊ hydropiſim:⁊ prouocat vrinam:⁊ frā
git lapidem. Et confert morſui venenoſo. Et ei ſuper
quo timet̃ potaſſe venenũ. Cuius permixtio hec eſt:
Recipe piperis albi:⁊ longi.ana.ʒ.vi. ſulfuris: citri-
ni:thuris:meu:iuſquiami albi:myrre:ſtoracis: cordu
meni añ.ʒ.viij.rute coſti.añ.ʒ.v.opij:mādragore.añ
ʒ.iij.croci.ʒ.ij.⁊.ſ.caſſie.ʒ.vi. ↄfice cũ melle diſpuma
to.⁊ vtere poſt ſex mēſes.
¶ Non eſt in vſu nec ꝑparatum reperitur.

Onfectio de ſtorace ↄferens ad ſuperabun-
c dante₃ fluxũ vētris colericũ:⁊ flegmaticu₃:⁊
ad tenaſmone₃ fcm̃ a frigiditate. Recipe ſto
racis liquide:opij.aſſari:ſeminis. iuſquiami albi: ca-
ſtorei:croci:myrre.olibani.ana partes equales. Mel
lis quantum ſufficit.
¶ Similr̃ non eſt in vſu.

¶ Finis ſcđe diſtictionis. Incipit tertia.

Ad egritudies frīdas capitꝫ.
Ad egritudies calas eiuſdē.
Ad egritudines auriũ.
Ad egritudines oculoꝝ.
Ad egritudines dentiũ
Ad catarrum.
Ad paſſiones ſtomachi a colera ībibita in ei⁹ poroſitatibus.
Ad paſſiones frigidas ſtomachi ⁊ nutritiuoꝝ.
Ad colicam.
Ad paſſiōes frīdas mřicis.
Ad calefactiones epatꝫ.
Ad egritudines epatꝫ ⁊ ſplenis a flegmate aquoſo.
Ad icteritiam.
Ad renes calidos.
Ad cazeſiam.
Ad podagram ⁊ dolores iūcturarum.
Ad feditatem cutis.
Ad aſclitem.
Ad ſcabiem pruritum lepram ⁊ cancrum.
Soluens principaliter flegma ⁊ poſtea colerā citrina₃ a mēbris nutritiuis:⁊ a iuncturꝫ.
Soluens coleram ⁊ flegma
Soluēs colerā ⁊ flegma ſalſu₃.

¶ De medicinis ſolutiuis.

T Ertia diſtinctio eſt de
medicinis ſolutiuis:⁊ ſunt queda₃ ex
eis aloetice. Alie collognitiade. Alie
turbitice. alie ſcamoniace. Et alie ab
alijs denoiatōe₃ ſumētes:de q̃bus lo
quemur per ordinē.⁊ primo de yeris.
¶ Tertia diſtictio de medicinis ſolutiuis.quaꝝ q̃da₃ cōficiunt̃
cũ aloe.q̃da₃ cũ collognitida.quedā cu₃ Turbith.q̃dam cu₃ ſca
monea.⁊ q̃dā cũ alijs medicinis ſolutiuis fortib⁹.q̃dā cũ pluri-
bus ex eis ſicut īferi⁹ ꝑ ordine₃ apparebit.⁊ ſic īcipit.
y Era pigra galieni nomē h₃ amaritudinis: et
eſt medicina ſublimis:in qua aggregant̃ vir-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0103-0
DFG

tutes:⁊ operationes nobiles. Eſt enim ſubtiliatiua:⁊ reſolutiua materieꝝ malaꝝ groſſaꝝ: ⁊ viſcoſaꝝ:⁊ exic catiua eaꝝ:que ibibite ſunt i poris: ⁊ anguſtatiōibus: ſic̄ imbibit̄ in ſpōgia:⁊ ꝑficit̄ ab ea ſolo bona:⁊ ꝯueni ens:⁊ ē calefactiua:⁊ apitiua oppilonuꝫ:⁊ abſterſiua. Et illa in q̄ ꝓꝑcit̄ aloes lotus ꝯfortatior ē. Et ſi nō ſit lot⁹:efficit̄ plus ſolīua: ⁊ minus ꝯfortatiua. Et quidā ꝯficiunt hāc medicinam cū melle: Et quidam ſine eo: imo faciūt trociſcos cum aq̄ bdelij:⁊ draga. Et virtus qdeꝫ hui⁹ medicine affert iuuamēta multa experta ad egritudines capit̄:⁊ ſtomachi ⁊ epat̄: ⁊ iūcturaꝝ: ⁊ re nū:⁊ matricū:⁊ mēbroꝝ frigidas: ⁊ educit hūiditates generatas in eis:⁊ putredies. Cuius permixtio. ℞.ci namomi:maſticis:aſſari:ſpice:carpobalſami:croci: xi loaloes:caſſie:ana partes equales. et qdaꝫ addiderūt floꝝ ſqnanti partē vnā. Et qdaꝫ addiderūt abſinthiū et alij alia. Aloes aūt ſit dupluꝫ ponderis oium.

Yerapigra nomē habet amaritudinis. q2 ipam ꝑncipalr īgre ditur aloes.⁊ dr̄ yerapigra a yera qd̄ eſt ſacra ⁊ pigra qd̄ eſt ama ra:⁊ hmōi yere galiēi due reperiūtur deſcriptōes poſite: ⁊ īuente a galieno q̄ ambe in idē redeūt. vna ponit̄ ſeptimo terapētice. ca pitulo.iz. qd̄ ſic īcipit. opꝫ igit̄ hr̄e. alia ponit̄ ſexto de regimie ſa nitat̄ capitulo penultimo. Eſt eni hec yera magni iuuamēti: ⁊ paſſionibus ſtomachi ꝑncipalr qbus abundāt humor colericus ſubtilis ībibitus in poroſitatibus ſtomaci cū admixtiōe flegma tis aquoſi. hꝫ ēt multas alias vtilitates efficere quas auctor po nit in littera. ⁊ Galienus locis allegatis. Uſus aūt ei⁹ ⁊ modus ꝑparatiōis eſt triplex. Primo ſolū in forma pulueris: ⁊ tūc aſſu mit̄ cū vino vel iure pulli: vel cū aqua mente vel ordei: vel alio liquore ꝯueniente. ⁊ in tali forma ipm̄ deſcribit: ⁊ eo vtebat̄ ga lienus. q2 efficacius operat̄. Scd̄o in forma pillulari. ⁊ ſic cōmu niter practicātes generalr vtūtur. Et iſte modus adinuent⁹ fuit tū ꝓpter amaritudinē pulueris. tū vt maiorē morā in ſtomaco cōtrahens a remotis magis attrahat. Tertio in forma electuarij cū melle:⁊ ſic deſcribit̄ hic a Meſue: ſed non eſt in vſu. ⁊ in hac yerapigra galieni nō īgredit̄ aliud ſolutiuū niſi aloes nō lotū. de quo diffuſe dictū eſt in diamuſco. ⁊ qualrcūqꝫ preparet̄ in ōbira doſi tardat ſolutionē a.iz. horis vſqꝫ ad.z4. Nunc trāſeo ad deſcriptiōeꝫ yerepigre galieni poſite ſeptimo terapētice: q̄ eſt illa que cōiter habet̄ in vſu: ⁊ eſt quaſi cōſimilis cum illa q̄ ponitur ſexto de īgenio ſanitat̄. derelinquēdo pn̄tem hic poſitaꝫ a Me ſue: q2 ſat̄ ab illis variatur. ⁊ iſto mō non hr̄ in vſu. Recipe cina momi:maſticis:aſari:ſpice. ſ.nardi:croci:xilobalſami. ana. ʒ.i. alo es.ʒ.centū. Et illa eſt vera deſcriptio. pul. yerepigre gal. ſ3 ꝙ ipe ponit in locis allegatis. Medici aūt ⁊ aromatarii hodiernis tpi bus de aloe ponūt ſolutiuū duplū pōderis alioꝝ aromatū. ⁊ nō plus cū hāc verā corripiūt. Et mouent̄ maxime ꝓpter hāc dſcri ptionē ibi poſitā a Meſue quā ipſi reducūt ad formaꝫ pillularē ideo min⁹ ſoluūt. Et doſis yere Galieni in locis allegat̄ eſt vſqꝫ ad.ʒ.i. Doſis aūt ei⁹ que hodiernis tpibus ꝑparat̄ eſt vſqꝫ ad.ʒ. i.ſ. ⁊ ſi fit in forma electuarij. vt ponit̄ hic doſis eius eſt vſqꝫ ad ʒ.i. ſed illo modo non habetur in vſu.

Y Era Hermet̄: et ē iera luf. ſuꝑ qua expectat̄ fiducia iuuamētoꝝ multoꝝ: et expertoꝝ: et proprie ad dolorē capit̄: et emigraneā: et ver tiginem: et paraliſim: et epilepſiam: et tremorē et tor turam. et educ̄ ſuperfluitates: et proprie humoꝝ groſ ſorum: et viſcoſoꝝ. et ſubtiliū a capite. et neruis. et iū cturis. et ſtomacho et toto corpore. Et ꝯfert iuuamē tum manifeſtū dolorib⁹ iūcturaꝝ et renū: et colice dif ficili: et dolori mr̄icū. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio. ℞. aloes. ʒ.i. trociſcoꝝ alandal aur. viij. turbit: agarici: luf. vtri uſqꝫ ſicce: ireos: ſerapini: mirobalanoꝝ: citrinoꝝ: che buloꝝ et idoꝝ. an̄. ʒ.i. et.ſ. ꝫiꝫiberis: cinamomi: maſti cis: bdellij. helleborí nigri: euphorbij: aſſari: caſſie li gnee: ſalis īdi: caſtorei: croci: apij: cheiſin: ſeminis me zereon: ſticados. ana. ʒ.i. ſquille aſſate. ʒ.ij. et.ſ. ſcamo nee bone. ʒ.ij. Fiat oium cōtritio bona. Gummi autē ponant̄ in vino odorifero et īuoluat̄ puluer in ſucco cucumeris aſinini quātitate: qua bene īuoluat̄ et exic cet̄: et iterum denuo īuoluat̄ in predicto ſucco: et pau co oleo nucū: et iteꝝ ſiccet̄: et cōficiat̄ totū cum melle diſpumato: q̄ꝫtitate q̄ fiat totū ſicut paſta: et det̄ poſt ſex mēſes. Doſis ei⁹ eſt. a.ʒ.i. vſqꝫ ad.ʒ.ij.

Non eſt in vſu. ſed rogo legentes. vt ipſam cōſiderent ꝓpter virtutes multas impoſitas a Meſue.

C Onfectio yere archigenis deſcriptione ſimi li: que ꝯfert egritudini generate: ex flegmate crudo: et melācolia. Et facit ad vertiginē: et ad epilepſiam. Et valet ad īceptionē egritudinum vi ſus. et raucedinē humidaꝫ: et dolorē gutturis: et dif ficultatē anhelitus: et ſpaſmū: et exituris ex materijs groſſis. Et confert ad aquam citrinam. et ſcabieꝫ. Et quādoqꝫ datur in potu propt̄ dolorē ſtomachi: et vē tris et matricis: cum decoctione rute. et quādoqꝫ po nitur in ea parū caſtorei. vſqꝫ ad ſiliquas. iij. et ad do lores dorſi: et renuꝫ. et inguinū: cum decoctione apij et ad venaꝫ ſciaticam: et ad his ſimilia: cuꝫ aqua cen tauree: et ꝑmiſcet̄ cuꝫ ea ēt ſuccus cucumeris aſinini: et collognida ſiliquas. iiij. in aqua abrotani: et dat̄ in potu ad morſum canis rabidi: et facit ſecuritatē ad ti morem aque. et precipue cum pondere. ʒ. vnius de aduſtione cancri fluuialis. Cuius permixtio hec eſt. Recipe pulpe collogntide: ʒ.ij. praſij: ſticados. helle bori nigri: camedreos: ſcamōee: leucopiperis: macro piperis: oium ana. ʒ.ij. cepe: muris aſſati: euphorbij: aloes: croci: gentiane: petroſelini. armōiaci: oppopo. omnium ana. ʒ.i. polij: cinam. ſerap. myr. ſpic. ſquin: calamēti mōtani. ariſtologie rotū. oium. ana. ʒ.ij. mel lis q̄ꝫtum ſufficit. et ſit doſis aur. iiij. cū decoctiōe epi thimi: et paſſularum mundataꝝ.

Non eſt in vſu. ſed yeralogodion eſt illa que multū habet̄ in vſu: ⁊ ab omnibus ſic ꝑparatur: ⁊ ei⁹ deſcriptio ponitur a nico lao. Etiaꝫ ⁊ alia yerapigra Galieni. que ibidē ponit̄ a nicolao in ſuo antidotario. que eſt multū dr̄ns a Iera galieni. poſita ſe ptimo terapētice. nec reperit̄ vbi galienus eā deſcribit. ⁊ tn̄ illa eſt que generaliter habet̄ in vſu. ⁊ ſic vbiqꝫ ſcd̄m illam deſcripti onem habet̄ in vſu. ⁊ fit in forma electuarij ſm̄ ꝙ ibi deſcribit̄. Quidā tamē reducūt ad formam pillulareꝫ que aliquo loco nō ſunt ſcripte. ⁊ doſis eaꝝ eſt a.ʒ.i. vſqꝫ ad.ʒ.i.ſ. Et doſis Yerepi gre galieni reducte in forma electuarii: vt cōmuniter fit. q2 vſqꝫ ad.ʒ.i. de mane digeſta materia. Et cuꝫ ille pillule de yerapigra galieni que a Nicolao deſcribit̄ ſūme ꝯueniūt oibus diſpoſitio nib⁹ capitis vel paſſionib⁹ depēdētibus a materia frigida ⁊ do lorib⁹ auriū oculorū ⁊ dētium. Cōuenit īſuper deſcenſui catar ri ⁊ paſſionib⁹ frigidis ſtomaci ⁊ oium nutritiuoꝝ: ⁊ ēt paſſioni bus matricis. ⁊ ēt multis alijs ꝯſimilib⁹ quas ibi lege. Et mot⁹ ꝓpter ei⁹ vtilitates ⁊ iuuamēta nō obſtāte ꝙ ēt ipaꝫ declarabo in Antidotario Nicolai. Nūc ponā eius deſcriptionē. Recipe Cinamomi: ſpice nardi: croci ſqnāti: aſſari: caſſie lignee: xilobalſa mi: carpobalſami: violaꝝ: abſinthii: epitimi: agarici: roſaruꝫ: tur bith: coloquintide: maſticis. an̄. ʒ.4. al. ʒ.8. mellis quātuꝫ ſufficit pro ꝯpoſitione electuarii. ſiue vini pro ꝯpoſitione pillularum. Sunt aūt ſolutiua que īgrediunt̄ ꝯpoſitionem huius ierepigre ac Yere archigenis ac Yerelogodion: non obſtante ꝙ aliqua ex eis fuerint ſuperi⁹ dclarata: ⁊ alia quedā ſunt declarāda. Colo quītida eſt medicina multū effrenitās in ſoluēdo amari ſaporis īdigēs multa rectificatione ſm̄ ꝙ ponit Meſue. Eſt. n. ſolutiuū pomum plāte venenoſe ad magnitudinē pomi arācii ſubalbidi iuxta quā plātam nulla orit̄ herba: ⁊ ē calide ꝯpleriōis vltra ter tium gradum. ⁊ ſicce in fine ſecundi. Soluit flegma ꝑncipaliter attrahendo a remotis mēbris: non tamē per ſe ſola eſt exhibēda

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0104-6
DFG

quantuncūq; correcta. Et doſis eius que ponit a Meſue capi-
tulo ꝓprio eſt a chirat.6. vſq; ad.x. chirath aūt eſt pondus qua
tuoꝝ granoꝝ ordei. Sꝫ illa eſt nimis magna doſis hodiernis tē
poribus qualitercūq; aſſumeretur. Epithimum eſt flos vel ra
dix cuiuſdam herbe calide ⁊ ſicce in ſcdo: ſoluit humorē melāco
licū ꝑncipaliter. ⁊ licet non ſit in vſu ipm per ſe ſolū accipe tamē
eius doſis ē a.ʒ.iiij. vſq; ad.ʒ.7. decoctiōis aūt a.ʒ.v. vſq; ad.x o.
q: eſt leuis ſolutionis. Abſinthiū eſt herba nota leuiſſime ſolu
tionis calide ꝯplexiōis in ꝑmo. ſicce in ſcdo. ſoluit leuiſſime cole-
raꝫ ſubtilē ⁊ aquoſaꝫ ab inteſtinis meſeraicis ⁊ ab epate: ⁊ aſſumi
tur a qbuſdā ſuccꝰ eius qui eſt amarꝰ valde ⁊ horribilis. Et do
ſis eiꝰ eſt a.ʒ.x. vſq; ad tres. Et in decoctione ſeu īfuſiōe cuꝫ ali
qua expſſione ab.℥.v. vſq; ad.℥.8. Scamonea eſt succꝰ cuiuſ-
dā herbe īſpiſſatꝰ in forma lupinoꝝ reducit: ⁊ ab India ⁊ antio
chia ſic trāſportat: ⁊ eiꝰ vſus per ſe ſolum nō eſt ꝯueniēs ꝓpter
eius venenoſitateꝫ ⁊ potētiam in ſoluēdo: nec cū aliis medicinis
admiſcet niſi poſt debitā eiꝰ correctionē cū pomo citonij vel cau
libꝰ in paſta vt precipit Meſue: ⁊ ſic correcta vocat diagridiū: ⁊
eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexionis in tertio. ſoluit ꝑncipalr colerā: ſꝫ no
cet ſtomaco ⁊ epati nō correcta. Et doſis eiꝰ cū eſt correcta eſt a
granis qnq; ordei vſq; ad.xx. Et ipſiꝰ ſoliꝰ adminiſtratōeꝫ oēs
ꝓhibent. Et cōſulo ꝙ medicina in quā īgredit retardet ꝗtum
eſt poſſe. Turbith eſt radix cuiuſdā plāte in partibꝰ Indie calide
⁊ ſicce ꝯplexionis in tertio. ſoluit ꝑncipalr flegma: ⁊ eſt multum
in vſu maxime in paſſionibus iuncturarū: ⁊ aſſumit cōmuniter
cū zucaro ⁊ zinzibere in forma pulueris ſm illā deſcriptionem.
Reci. turbith albi ⁊ gumoſi.ʒ.i. vel vſq; ad.ʒ.i.ſ. zinz.℈.i. zuca
ri.ʒ.ſ. ⁊ in mane aſſumat cuꝫ iure pulli vel galli vel alio liquore
ꝯueniēte. Et hic nota ꝙ zinzi. eſt correctiuuꝫ vel velocitat eius
operationeꝫ. qm̄ de ſe eſt tardi motus. Et eiꝰ doſis in ſuba eſt a
.ʒ.i. vſq; ad.x. vt pōit Meſue. ⁊ in decoctiōe a.ʒ.x. vſq; ad.4.
Sꝫ iſte doſes tēporibus ꝑſentibꝰ ſunt nimis magne: ⁊ eiꝰ aſſum
ptio eſt abbominabilis. ⁊ debilitat ſtomacū. Agaricꝰ eſt fungus
quidā adherēs cuidā arbori maxime. Et multuꝫ naſcēs in pede
mōtium. ⁊ eſt calide ꝯplexionis in ꝑmo: ſicce in ſcdo. ſoluit ꝑnci-
palr flegma groſſuꝫ ⁊ colerā rubeā a cerebro a mēbris neruoſis:
ac ē a pectore. vſus tn̄ eiꝰ per ſe ſolū nō eſt multū ꝯueniens: ſed
admixtꝰ cū aliis medicinis vt in electuariis ⁊ pillulis vt cōmuni
ter ſit. Doſis tn̄ eiꝰ in ſuba eſt a.ʒ.i. vſq; ad.ʒ.i.ſ. In decoctione
vero ſiue īfuſiōe eſt vſq; ad.ʒ.iii. Et nota ꝙ agaricꝰ qualrcūq;
aſſumptꝰ īducit vomitū: ſed lōge minꝰ in decoctione vel īfuſio
ne. q: nō ſic adheret parietibꝰ ⁊ villis ſtomaci vel villis īducens
nauſeā. ⁊ corrigat cū maſtice ⁊ ſal gēme vt ꝑcipit Meſue. Sera
pinū eſt gūmi calidū in tertio. ⁊ ſiccuꝫ in ſcdo. ſoluit humores vi
ſcoſos: ⁊ flegma crudū. attrahit a lōginquis mēbris: nō tn̄ per ſe
ſolū vtimur eo. Et doſis eiꝰ ē a.ʒ.ſ. vſq; ad aure.i. Euforbiū
ſm rei veritatē eſt gūmi calidū ⁊ ſiccū in quarto: ⁊ per ſe ſolū nō
ē ꝯueniēs: ⁊ ſoluit flīa groſſuꝫ. Et eiꝰ doſis eſt a granis quatuor
vſq; ad.xx. Ariſtologia rotūda eſt ꝑfectior ⁊ potētior longa in
ſoluēdo: ⁊ vtraq; eſt calida in tertio. ⁊ ſicca in ſcdo. ⁊ ſoluit ſup-
fluitates flegmaticas: ⁊ per ſe ſolū vſus eaꝝ nō eſt ꝯueniēs. El
leborus vnꝰ eſt albus oīo fugiēdus. q: a tota ſpē eſt mortiferus
alē ē niger q p ſe ſolū nō ē ī vſu: ſꝫ admixtꝰ cū aliis medicis ꝑnci
palr ſoluit melāoliā ⁊ colerā groſſā ⁊ flīa viſcoſū fortiē attrahēs a
rēotis. ē tn̄ mīrū ꝓuocās vomitū ⁊ eſt calide ⁊ ſicce ꝯplōnis ī ter
tio. Et doſis eiꝰ eſt a.℈.i. vſq; ad.℈.x. ſꝫ meliꝰ ē vt fugiat niſi
correctus ⁊ admixtꝰ cū aliis medicis. Reſtat nūc alia declarare
q nō ſunt ſolutiua poſita in deſcriptiōe iere archigenis. Et ꝑmo
ꝑ cituras aꝑata ītelligit q̄ veniunt ad ſanīe. Cepe muris.i. cepe
ſqlle. Ultio ē memorādū ꝙ vſus ꝑdicte iere galieni q̄litercūq;
aſſumat dꝫ eē ꝑmiſſa aliqā digōne ſeu ꝑparatōe hūoꝝ in ſtōaco
cū aſſumptōe mellis roſaꝝ colat. vſq; ad q̄titatē vnīꝰ.℥. ꝓ vice
duobꝰ vel tribꝰ diebꝰ ad minꝰ vel cū alio leui digeſtiuo. Siſr
⁊ añ aſſūptionē ierepigre galieni ī q̄ īgrediunt plīa ſolutiua ⁊ for
tia vt eā deſcribit Nicolaꝰ. ēt ē ꝓueniēdū cū digeſtiuo approꝑria
to ſm ꝙ expedit. Et doſis hꝰ ierearchigenis deſcriptiōe pauli.
q: ē melior vſq; ad aur.4. ⁊ archigēis dſcriptōe vlī ē vſq; ad.6.
⁊ confert multis ⁊ diuerſis paſſionibus vt dicit meſue quas tu
ipſe legendo conſidera.

y

Era Archigenis deſcriptioue pauli. Recipe
praſſij: agarici: camedreos pulpe collogntiy-
de: ſticados: oium añ. aur.v. opoponaci. ſera
pini: petroſelini: ariſtologie ro. pipis al. oium añ. aur.
.v. cinamōi: ſpice: polij: croci: añ: aureos. iiij. Tere ex
medicinis: que ſicce ſunt: ⁊ gūmi ꝯquaſſa: ⁊ infunde i
melle ⁊ permiſce. ⁊ ſit doſis aur.iiij. cū ſal' triti ponde
re.ʒ.i. cum aqua mellis.

¶ Non eſt in vſu.

y

Era dya colloquintidos iuentiōe Ruffi: que
mundificat caput: ⁊ ſtomacum: ⁊ totuꝫ cor-
pus ab humoribus groſſis ⁊ viſcoſis. Et ſo
lutione educit coleram nigram. ⁊ confert manie: ⁊ me
lancolie. ⁊ epilepſie: ⁊ vertigini: ⁊ torture: ⁊ paraliſi.
Uentoſitates diſſoluit. Stomacum ⁊ digōnem cōfor
tat. Et eſt medicina bona fiſtulis ⁊ vlceribus malis: ⁊
cancro ⁊ lepre. Cuius ꝑmixtio. Recipe ſticados: aga
rici camedreos: añ.ʒ.x. colloquitide bone: ⁊ electe.ʒ.
.xx. Et in loco alio. Collogntide trociſcoꝝ alandahal
añ.ʒ.xxv. ſerapini oppoponaci: añ.ʒ.viij. petroſelini:
ariſtologie rotunde: piperis: añ.ʒ.v. caſſie.ʒ.vij. cina-
momi. croci: ſpice: mirre: polij: ana.ʒ.iiij. Mirram in
vino infunde. Medicinas tere: et confice cum melle
diſpumato.

¶ Yera collogntidos ſm hanc deſcriptionem raro habet ī vſu
ſed ſolū ſm illam que ponitur a nicolao.

y

Era inuentōe noſtra cōferens obſcuritati vi
ſus: ⁊ ventoſitati groſſe dominanti ſuper ca-
put: ⁊ ſtōacum: ⁊ totum corpus. Et educit ſu-
perfluitates. ſ. vtriuſq; colere ⁊ flegmatis. Cuius per
mixtio. Recipe aloes boni.ʒ.xv. epithimi. coſti: añ.ʒ.
.v. euforbij: croci: ſpice: camedreos: añ.ʒ.vi. agarici.
.ʒ.ix. gariofiloꝝ.ʒ.ij. calami aromatici. maſticis: caſſie
añ.ʒ.vij. xilo balſami. Et in alio xilo aloes.ʒ.iiij. pipe
ris albi ⁊ nigri: gentiane: amomi. ana.ʒ.i. ſcamōee co-
cte in pomo.ʒ.ij. mellis quantum ſufficit. Doſis eius
eſt aur.i.

¶ Yera ex inuentione mea. non eſt in vſu. nec ꝑparata reperit.

y

Era coſt deſcriptōe Irani q̄ eſt medicina be
nedicta: ⁊ maxime in acutis febribꝰ multe ca
liditatis. Sitim extiguit: ebulitiōeꝫ ſanguis ſi
ſtit: ⁊ īflāmatōeꝫ cordis: ſtōaci ⁊ epatis. ⁊ omnē inflā
matiōem ſedat. Cuiꝰ hec eſt permixtio. Recipe al ſira
coſt bōi ⁊ recentis.ʒ.iiij. tamaridoꝝ cheyrō.℥.vi. me
dulle caſſie.℥.iiij. zuccari violati.℥.xvi. ſucci endiuie:
ſucci apij: ſucci maloꝝ dulciū ⁊ acetoſoꝝ: ⁊ muzoruꝫ:
ſucci acetoſitatū citri: añ.℥.ij. Diſſoluant al ſiracoſt:
⁊ tamarindi: ⁊ caſſia fiſtula i liquoribus iā dictis: ꝑus
tamen depuratis. Deide cola ⁊ mūda a ſcoſis. Deide
accipe radices endiuie: apij añ.℥.ij. folioꝝ lupuli. ca-
pilloꝝ veneris: añ.℥.ij. prunoꝝ ſiccoꝝ numero.c. vio
larum.℥.i. ⁊.ſ. roſarum.℥.i. ſpice.ʒ.ij. Decoquant hec
oia in.iij. libris aq̄ fontis vſq; ad lib.i. ⁊.ſ. Et ꝓijce in
ea zuccari tabarzet lib.ij. aceti bōi lib.i. ⁊ coque ebu
litiōe vna. Deide ꝓijce ſuper illud colaturā ꝑorum: ⁊
coque duꝫ mellis hēat ſpiſſitudinē. Ultimo vero ꝓij
ce in medicamine ſandaloꝝ citrinoruꝫ: roſaꝝ: ſpodij:
charabe: berberi: ſemis pōtulace: ſemis acetoſe: ſemi
num cōmunium. ſ. melōis: citrulli: cucumeris: cucur-
bite: añ.ʒ.ij. ligni aloes.ʒ.iiij. cubebe.ʒ.v. camphore
.ʒ.i. Repone in vaſe vitri. Eſt enim medicamen nobi
le. Doſis eius eſt a.℥.i. vſq; ad.ij. cum aqua frigida. ⁊
hoc in eſtate eſtiua.

¶ Syracoſt deſcriptione Rani: non eſt in vſu.

Kiſera perſica experta apud Perſas. ꝛ ꝯfert
t febribus acutis. ꝛ iflãmatõi ſtõaci ꝛ epatis.
Jctericis calidis de oppilatõe icolumitateȝ acquirit. Viſuȝ a fumis colericis deperditũ reparat. Sitim mitigat. Morbos aduſtiõis ꝓhibet. ꝛ eſt medicina magna in eſtate peſti lẽtiali ꝛ autũno. Cuiꝰ hec ẽ ꝑmixtio. ℞. ſucci ſolatri: endiuie: apij: depuratoꝝ: anã lib. i. Et ꝓijciant ſup eos violaꝝ ſiccaruȝ ꝛ viridium anã. ȝ. iij. ſucci lupuli lib. i. foliculoꝝ ſene. ℥. ij. agarici. ℥. i. prunoꝝ damaſcenoꝝ pinguiũ nũero. l. cuſcute. ℥. ß. mirobalanoꝝ citrinoꝝ: chebulorum indoꝝ: ana. ȝ. ij. ſpice: aromatice. ȝ. iij. Buliãt ſup prunas cũ facilitate vſqȝ dũ remaneat lib. i. ꝛ ꝓijciat ſup illa epithimi boni mundi. ȝ. xl. Et inoluant mirobalani in oleo amigdalarum dulciuȝ. Et buliãt ebulitiõe vna: ꝛ deponat ab igne: ꝛ colentur. ꝛ diſſoluant in vna ꝑte iſtiꝰ colature: tamarindoꝝ bonoꝝ ꝛ recẽtiũ. ℥. iij. mãne. ℥. i. ꝛ. ß. pulpe caſſie. ℥. iiij. zuccari violati. ℥. xij. Colet ꝛ mũdetur a granis ꝛ ſcoſis. Et i alia ꝑte aq̃ ꝓijciant zuccari taberzet lib. iij. aceti vini lib. i. Coquant cũ facilitate: Deide ꝓijciat ſup illud qđ diſſolutũ ſit in ſuccis: ꝛ aggregent ſil' in vnũ: ꝛ coq̃nt vſqȝ ad mell' ſpiſſitudinẽ. Vltimo vo pulueriȝent ſup illud raued boni. ℥. iij. mirobalanoꝝ citrinoꝝ. ℥. i. ꝛ. ß. chebuloꝝ indoꝝ. ℥. viij. bell'. emblicoꝝ anã. ȝ. iiij. granatoꝝ: fumi t're: trociſcoꝝ diarodõ: macis: maſticis: cubebe: ſpodij: ſandali citrini: anã. ȝ. ij. ꝛ. ß. q̃tuoꝛ ſeminũ anã. ȝ. ij. ꝛ. ß. aniſi. ȝ. iiij. ſpice. ȝ. ij. Jnuoluantur in oleo violato: ꝛ repone in vaſe vitreo: ꝛ da cum aqua frigida: ꝛ ſucco endiuie: aut ſucco ſolatri. Doſis eius eſt. ℥. i.

¶ Non eſt in vſu: ꝛ eſt ſolutiua: vt in eius deſcriptione reperitur ꝛ apparet: ſȝ illa que nõ eſt ſolutiua poſita in ſcđo de appropriatis capl'o de ſputo ſanguinis cũ tuſſi eſt que generalr habet in vſu: ꝛ ſic vbiqȝ preparatur.

c Onfectio electuarij al barif: ꝛ ẽ elcũariũ boni ſaporis: qđ expoſuimꝰ nos: ꝛ fit in tꝑe eſtatis: qđ iducit ſupfluitates a toto corpe ſtõaco ꝛ epate. Et ꝯſeruat vtẽtẽ eo i iuuẽtute. Recipe mirobalanoꝝ citrinoꝝ: chebuloꝝ idoꝝ: anã ꝑtes eq̃les. Tere ꝛ cribella: ꝛ accipe olei amigdalaꝝ q̃tũ ſufficit ꝛ ifunde ſup ipſos: ꝛ frica manibꝰ: ꝛ hoc facias tribꝰ diebus i ſole: ꝛ dũ iugit oleũ exiccat ſꝑ ſupifunde oleuȝ. Deide q̃titatẽ zuccari albi ſufficiẽtẽ: i decuplo ipſiꝰ aq̃ fontiũ diſſolue cũ aq̃ per tres dies mixturã ꝑdictã ꝯtinue triduo tere: ſemꝑ i ea paꝝ de oleo ifundẽdo: ꝛ hoc facias vſqȝ dũ mirobalanoꝝ amaritudo ceſſet. Deide fac in vmbra ſiccari. Deiñ accipe de h toto. ȝ. xv. turbit boni. ȝ. vi. aniſi: maſticis ana. ȝ. ij. ſpice. ȝ. i. ꝛ. ß. viole ſicce. ȝ. vij. ſeminis apij. ȝ. i. ꝛ. ß. nabit: zuccari albi anã. ȝ. x. Cõfice cum melle diſpumato. Et ſit doſis eius. ȝ. iij. cum aqua calida.

¶ Non eſt in vſu. vide vlterius.

c Onfectio alia electuarij al barif bõi ſaporis qđ ẽt expoſuimꝰ nos: ꝛ fit in tꝑe eſtatis: ꝛ educit ſupfluitates a toto corpe ſtõaco ꝛ epate. Et ꝯfortat ſtõacũ: ꝛ viſcera mollificata. Et valet ad debilitatẽ digõnis ꝛ frigus mẽbroꝝ nutrimẽti. Et facit appetere cibũ. Et fac colorẽ ꝛ odorẽ bonum vtẽtis. Et ſubtiliat ſenſum ꝛ cogitatõeȝ: ꝛ ꝯſeruat in iuuẽtute: ꝛ addit in vſu: ꝛ retardat canos: ꝛ addit i deſiderio coeundi. Cuiꝰ hec eſt ꝑmixtio. Accipe mirobalanoꝝ: chebuloꝝ: ꝛ nigroꝝ: anã ꝑtes duas: emblicorum: bellericoꝝ anã ꝑtẽ. i. ꝛ. ß. citrinoꝝ partes. ij. Tere ꝛ cribella: ꝛ iuxta modũ ſuperioris doctrine: i eoꝝ rectificatõe opus eſt obſeruãdũ. Deide accipe ex h toto. ȝ. xiiij. turbit albi ꝛ mundi. ȝ. vij. ȝiȝiberis heyl: maſticis cinamõi bõi: ligni aloes: gariofiloꝝ: piperis: cucube: galãge: macis: ſeminis apij: ana. ȝ. i. ꝛ. ß. ſpice. ȝ. vnius partes. ij. pinearum mundataꝝ: zuccari tabarzet: ꝛ nabit ana. ȝ. xij. Cõfice cum melle diſpumato. Et ſit doſis eius. ȝ. iij. cum aqua calida.

¶ Non eſt in vſu.

c Onfectio electuarij idi maioris: ſolutõe educens hũoꝝ ſupfluitates: ꝛ ꝓprie flegmaticorum ꝛ putridoꝝ a ſtõaco ꝛ a mẽbris nutritionis: ꝛ vẽtoſitatẽ groſſã i eis reſoluit: ꝛ morbos factos ab eoꝝ exuberantia curat. ſic̃ eſt dolor ſtõaci ꝛ viſcerũ: ꝛ colica et dolões renũ: et educit q̃ ſũt in iũcturis materias. Et ꝯfert iuuamẽtũ mãifeſtũ doloribꝰ eoꝝ. Cuiꝰ h eſt ꝑmixtio. Recipe cinamõi: gariofiloꝝ: ſpice: roſaꝝ: caſſie: macis: ciperi anã. ȝ. iiij. ſandaloꝝ citrioꝝ. ȝ. ij. et. ß. ligni aloes: nucis muſ. anã. ȝ. ij. turbit bõi albi et gũmoſi et arũdinei. ȝ. l. zuccari et penidiaꝝ anã. ℥. xx. galãge: heyl. cardamõi: aſſari: maſticis anã. ȝ. i. et. ß. ſcamonee bõe ꝛ decocte i pomo. ȝ. xij. Oia cũ oleo amigdalio fricent. Deide accipe ſucci citõioꝝ ꝛ granatoꝝ: ſucci apij ꝛ fenicli anã librã. ß. Decoq̃ cũ melle ad ſpiſſitudinẽ. ꝛ ꝯfice cũ ſpẽbus. Doſis eiꝰ eſt aur. iij.

¶ Jſtud electuariũ eſt famoſuȝ qđ generalr ab oĩbus: ꝛ ſm preſentẽ deſcriptionẽ ꝑparat: ponit ſubſequẽter deſcriptio electuarij idi minoris qđ multo plus habet in vſu. Et hoc electuariuȝ idum minus eſt magne efficacie ꝛ vtilitatis in ſoluẽdo ventrẽ a ſuperfluitatibꝰ flegmaticis putridis corruptis. ꝛ marie a mẽbris nutritiuis a iũcturis. ac ẽt i ſoluẽdo ſilr materias colericas. lȝ ſit maioris potẽtie: ꝛ plus ꝯueniat i ſoluẽdo flegma q̃ȝ colerã. Eſt ẽt ꝯueniẽs in reſoluẽdo ꝛ ſubtiliãdo vẽtoſitates groſſas: vñ multum ꝯfert doloribus ſtomaci colicis ꝛ renalibus opilatiões aperiẽdo: hȝ ꝛ alias virtutes q̃ ponũtur in littera. ¶ Sed hic notãdũ ꝙ q̃dã aromatarij reducũt tã deſcriptionẽ electuarij idi maioris q̃ȝ mioris ad formã ſolide ꝯfectiõis cũ zucaro vltimate decoquẽdo. et cõiter vocat ꝯfectio daſrati. Et doſis ꝯfectiõis ſolide idi mioris eſt vſqȝ ad. ȝ. 4. deſcriptio idi maioris eſt hec. ℞. cinamomi. caſſie. f. lignee: turbith arundinei. i. pforati ad moduȝ arundinis ſubtilis. pẽidij ſiũt ex ſolo zucaro vltimate decocto: ꝛ ex lõga agitatiõe ꝯtinue dealbãtur. ꝛ ſunt ca. ꝛ ſic. ꝯplonis in primo gradu. Heil eſt ſpẽs cardamomi: ꝛ ſm quoſdã ẽ cardamomũ maiꝰ. ꝛ ſcđȝ alios eſt meligete que ſunt q̃dã grana aromatica ca. ꝛ ſic. ꝯplonis in tertio. ꝛ portãtur ex idia. Succi citonioꝝ citonia nota ſunt: ꝛ ſunt frigide ꝛ ſicce cõplonis in fine ꝑmi. ꝛ ex ipſis ſit vinũ per eoꝝ expſſionẽ: qđ eſt valde ꝯſtrictiuũ cuiuſlibȝ fluxus vẽtris: ꝛ marie colerici. ꝯcoq̃tur tale vinũ cũ zucaro: ꝛ ſit iulep ꝙ vocat miua ſimplex: qđ ipbatũ cũ aq̃ calibeata ꝛ aſſũptũ, de mane ſilr dictis fluxibꝰ ꝯfert. Addũtur ẽt q̃dã aromata huic iulep. qñ ꝯcoq̃tur ꝛ aromatiȝatũ vocat miua aromatica q̃ ꝯfert dbilitati ſtomaci ꝛ maxime virtuti digeſtiue eiꝰ: ꝛ ꝯtẽriue. ſit ẽt ex eoꝝ pulpa decocta cũ zucaro q̃dã ꝯfectio ſolida que vocat diacitonitẽ ſine aromatibꝰ cuiꝰ. ℥. i. aſſumpta añ cibũ cõfert cuilibȝ fluxui ſtomaci: ꝛ iteſtinali: ꝛ vomitui ꝛ ꝯfert ſi poſt cibuȝ aſſumat: ſȝ cũ difficultate maſticat. põt piſtari ꝛ ꝑparari cũ miua ſimplici. ꝛ ſic aſſumi in põdere dicto. ẽt ex pulpa citonioꝝ ſit diacitonitẽ cuȝ q̃buſdã aromatibꝰ calis vt ȝinȝi. pipere ciamomo ꝛ alijs cũ melle ꝙ a ſanis comedit tẽpore natiuitatꝪ dñi nr̃i Jeſu xp̃i. Succi granatoꝝ. quedã. n. dulcia: ꝛ iſta ſunt frigida ꝛ humida. i prĩo cũ aliq̃li leui caliditate rõne dulcedinis: acetoſa vo ꝛ muȝa ſunt frigide ꝯplonis vltra ꝑmũ. flores eoꝝ qui dñr balauſtie ſunt frigide ꝯplonis in ꝑmo ꝛ ſicce in ſcđo. eſt. n. vinũ dulce granatoꝝ multũ in vſu, decoq̃tur cũ melle ad electuariũ ꝯſtruẽdũ. ꝛ doſis hꝰ electuarij indi maioris ꝑ ſe ſolũ eſt vſqȝ ad. ȝ. 6. diſſe

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0106-7
DFG

peratum cũ decoctiõe cõmuni vt dicet͂ inferi⁹: vel cũ aqua fenicu li vel apij vel cũ aliquo liquore ꝯuenienti: vel in forma dattili aſſumpti cũ zuccaro. ⁊ ſepe admiſcem⁹ hoc electuariũ indũ maius ſiue indũ minus cũ caſſia vel mãna ad velocitandũ opationem caſſie vel mãne: vbi gr̃a. Cũ in pͥncipio aliquaꝝ egritudinuꝫ qͥrimus aliq̃liter mouere materiã abſq; hoc ꝙ tota ſit cõmota exhibemus de caſſia. ℥.i.ſ. de electuario indo ⁊ marſie de minori. ʒ.iij. caſſia lꝫ ſit pͥncipalit͂ purificatiua ſanguĩs ẽt euacuat flegma: ⁊ taleꝫ medicinã diſtẽperamus cũ decoctiõe cõi vel cũ aq̃ ordei vel alio liquore ꝯuenienti. ⁊ ſi ipm̃ in dicto pondere admiſcemus cũ manna. de ipſa mãna accipim⁹ vſq; ad. ℥.ij. Ulterius ẽ notãdũ ꝙ licꝫ meſue ponat doſim h⁹ electuarij indi maioris eſſe vſq; ad aure. iij. hoc veritatẽ hꝫ qñ ad librã mellis ponerent͂. ℥.iij. aromatũ. ſed q: his tp̃ibus ponunt͂ ad lib. mellis. ℥.z. ſolũ aromatũ: ideo pͭ augeri doſis vſq; ad q̃titatẽ ſup͂⁹ dictã. ⁋ Ultimo ſoluo hoc dubiũ diceret aliq̃s in indo maiori eſt maior potẽtia ſcamonee in ſoluendo colerã q̃ꝫ turbith in ſoluẽdo flegma ꝯſideratis vtriuſq; põderib⁹ ⁊ eoꝝ potẽtia. ⁊ tñ dictũ eſt ꝙ indũ mai⁹ a p̃domiõ ſoluit flegma: hoc idẽ dici poſſet de indo minore lꝫ quãtitas turbit ampliet͂ in eo: ⁊ tñ nõ addit͂ q̃titas ſcamõee: Dicẽdum ꝙ ſcamonea nõ ſolũ euacuat colerã ſed ẽt adiuuãdo operationeꝫ turbith ⁊ illã velocitãdo euacuat flegma. Turbith aũt nõ ſic eſt adiuuãs ⁊ velocitãs operationẽ ſcamonee ⁊ eſt pͥncipalr̃ turbith flegmatiſ purgatiuũ ⁊ ſolutiuũ. ⁊ ſic apparet ſolutio ad dubiũ: nõ obſtãte ꝙ potentia ſcamõee ſit maior ĩ indo maiori q̃ potentia turbith multiplicat͂ vel duplicat͂. ⁊ nõ addit͂ q̃titas ſcamõee. vñ ad dubiũ facilius rñdet͂. ⁊ per ꝯñs apparet ꝙ indũ min⁹ eſt vigoroſi⁹ ad ſoluẽdũ materiã flegmaticã ⁊ magis ꝯuenit in diſpõnib⁹ frigidis q̃ꝫ electuariuꝫ indũ mai⁹. ⁊ vt ſic hẽtur in vſu mai⁹. Et cum a medicis abſolute profertur electuarium induꝫ docti ⁊ experti aromatarij intelligunt indum minus.

e Lectuariũ Indum min⁹ hñs intẽtiõem maioris. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio. Recipe turbit. ʒ. .c. zuccari: tantũdẽ: macis: piperis: ziziberis: gariofiloꝝ: ciamomi: heyl: nucis muſca. ana. ʒ. vij. ſcamonee. ʒ. xij. Confice cum melle diſpumato. Doſis eius eſt aur. iij.

⁋ Hoc electuariũ eſt magis in vſu q̃ꝫ induꝫ maius q: minoris caliditatis ⁊ maioris efficacie in ſoluẽdo flegma q̃ꝫ indũ mai⁹. ⁊ per ꝯñs eſt valde ꝯueniens febrĩẽtibus febre flegmatica cũ aliq̃li admixtiõe colere ſemp ſuppoſita digõne materie. ⁊ cõfert oĩb⁹ diſpõnibus q̃bus cõfert indũ mai⁹. Et doſis ei⁹ per ſe ſolũ ẽ vſq; ad. ʒ. v. Cuius hec ẽ ꝑmixtio. Recipe turbith: zinzi. cinamomi: heyl: ⁊ oĩa ſimplicia que hic ponuntur ſunt ſuperius ꝺclarata: conficitur cum melle.

c Onfectio de dactilis: ⁊ eſt Dyaſinicon: quaꝫ ſcripſit filius zezar: ꝯferens ad febres ꝯpoſitas ⁊ cronicas. Et eſt medicia ſecuritatis. Et ꝯfert ad colicã ⁊ dolorẽ vẽtris: ⁊ hũorẽ crudũ ⁊ frigora. Et eſt ſolutiuũ facile ⁊ ꝯueniẽs. Cui⁹ ꝑmixtio. Recipe dactiloꝝ cheyron infuſoꝝ i aceto trib⁹ dieb⁹ ⁊ noctibus ꝑtes. c. penidiaꝝ ſabiri ꝑtes. l. amigdalarũ mũdatarum ꝑtes. xxx. turbit partes. xxxv. ſcamonee partes. xij. zinziberis: piperis lõgi: folioꝝ rute ſiccoꝝ: ciamomi: macis: ligni aloes: aniſi: feniculi: dauci: galãge añ partes. ij. ⁊. ſ. Et fiat oium ꝯtritio bona: ⁊ ꝯfice cũ melle diſpumato q̃tũ ſuffic͂. Eſt eni medicia mirabil͂. Doſis ei⁹ eſt ab aur. iij. vſq; ad. vij.

⁋ Confectio de dactilis ⁊ eſt dyaſinicon ſolutiuũ: ⁊ dicit͂ talis pp dactilos q̃ ĩgrediunt͂ ⁊ dꝫ addi ſolutiuũ ad dr̃iaꝫ dyaſinico nis inferi⁹ deſcripti qđ ẽ emplaſtrũ ꝯſtrictiuuꝫ vẽtris flux⁹. ⁊ hoc electuariũ gñalr̃ ab oĩb⁹ habet͂ in vſu: ⁊ ſcõm p̃ſentẽ deſcriptiõeꝫ vbiq; p̃paratũ reperit͂. ⁊ ĩ opatiõib⁹ ſuis aliq̃lr̃ ꝯuenit cũ electuario indo maiori: ſꝫ iſtud plus ꝯfert febrib⁹ ꝯpoſitis cronicis: ⁊ de mã mixta. ⁊ vſus ei⁹ ẽ maioris ſecuritatis. Euacuat. n. mãm colericã ⁊ flegmaticã v̾tute turbith: ⁊ ſcamonee ⁊ alias opatiões hꝫ efficere q̃s auctor põit in l̃ra. ⁊ potẽti⁹ ſoluit mãꝫ colericã q̃ꝫ idũ mai⁹ vel min⁹. lꝫ ẽt ſatis potẽter euacuet mãm flegmaticã. ⁊ ei⁹ doſis ẽ vſq; ad. ʒ. 4. p ſe ſolũ. ⁊ põt ẽt cuꝫ caſſia vel mãna admiſceri in doſi dicta in electuario indo cui⁹ hec ẽ ꝺſcriptio. ℞. dactiloꝝ infuſoꝝ ĩ aceto. dactili ſunt calẽ ꝯplonis in fine p̃mi grad⁹ ⁊ humide in p̃mo p̃mi grad⁹ dũ ſunt recẽtes ⁊ dũ exſiccãtur p̃mũ gradũ ſiccitatis acq̇rũt: cõueniũt maxime pectoris diſpõnib⁹ ſicut ⁊ ficus ſicce. reliq̃ v̾o ſimplicia ſunt declarata ſuperi⁹.

m Odus electuarij de pſilio ſolõne educẽs coleram citrinã. Et ꝯfert ad febres difficiles ⁊ vehemẽtes: ⁊ ad ſodã ⁊ v̾tiginẽ q̃ fiunt a fumis colericis. Et ꝯfert calefactioni epatis ⁊ icteritie. Cui⁹ ꝑmixtio hec eſt. ℞. ſucci bugloſſe domeſtice ⁊ ſilueſtris: ⁊ ſucci endiuie: ⁊ ſucci apij: coctoꝝ ⁊ diſpumatoꝝ añ lib. ij. ⁊ ꝓijce ſup ipſos cuſcute: aniſi: folicoloꝝ ſene añ. ℥. ſ. capilloꝝ veneris manipuluꝫ. i. ſucci fumi t̃re. ℥. iij. aſſari. ℥. iij. ſpice. ʒ. ij. ⁊ dimitte die ac nocte: ⁊ buliat ebulitiõe vna. Et ꝓijciant͂ ſup ea violaꝝ viridiuꝫ vel ſiccaꝝ. ℥. iij. epithimi. ℥. ij. Et buliant adhuc alia ebulitiõe ꝑua. Deide colet͂ ⁊ exprimat͂: ⁊ i colatura ponat͂ pſilij. ℥. iij. ⁊ dimittat͂ per diẽ ac noctẽ: oi hora tñ agitando illud cũ ſpatula. Deide exprimat͂ viſcoſitas ei⁹ tota. Deiñ accipiat͂ hui⁹ viſcoſitatis lib. iij. ⁊ ꝓijciat͂ ſup eã zuccari albi lib. ij. ⁊. ſ. ſcamonee cocte ĩ pomo. ℥. iij. ⁊. ſ. ⁊ coquat͂ cũ facilitate. Poſtq̃ꝫ coctuꝫ fuerit ꝓijciat͂ ſuper ipm̃ puluis trociſcoꝝ diarodon: ⁊ de ſpodio: ⁊ raued ſeni: añ. ℥. i. trociſcoꝝ ꝺ berberis. ℥. ſ. Doſis ei⁹ eſt a. ʒ. iii. vſq; ad aur. iii. ⁊ vocauit Damech ꝯfectiõem hanc electuariũ trociſcoꝝ. Sũt alij qui addunt aceti lib. i. ⁊. ſ. Alij addunt ſucci violaruꝫ lib. i. ⁊ eſt medicamen nobile.

⁋ Iſtud electuariũ lꝫ nõ ſit in vſu. tñ q: ẽ multe v̾tutis ⁊ efficacie magiſtralr̃ poſſum⁹ eo vti: ſoluit. n. cũ facilitate colerã citrinã ⁊ ꝯfert ad febres difficil͂ eradicatiõis cũ malitia ⁊ vehemẽtia caloris ⁊ valet ad ſodã ⁊ vertiginẽ que fiũt ex fumis colericis ⁊ prauis. ⁊ ꝯfert calefactiõi epatis ⁊ icteritie. ⁊ dr̃ de pſillio ꝓpter pſiliũ ĩgrediẽs ei⁹ ꝯpõnẽ: qđ q̇dẽ pſiliũ ẽ ſemẽ minutũ cuiuſdã plãte: ⁊ hꝫ ꝑtes diuerſas. nã ei⁹ ꝑs ĩtrĩſeca ẽ valde praua calide ⁊ ſicce ꝯplonis ĩ q̃rto hñs ĩ ſe v̾tutẽ venenoſã occultã: Sꝫ ei⁹ ꝑs medullaris ⁊ media ac ẽt cortical͂ extrĩſeca ẽ frigide ⁊ hũide ꝯplonis in ſcđo gradu. ⁊ iſte ſũt mixte ⁊ ſenſibil͂ q̃titatis. vñ toti⁹ ꝯplo q̃ reſultat ẽ frigida ⁊ hũida iuxta ſcõm gradũ. ⁊ per admixtiõeꝫ aliaꝝ ꝑtiũ adiuicẽ remouet͂ venenoſitas ⁊ illa ſuperflua caſitas. ſoluit. n. pſiliũ lubricãdo. i. lubricũ pͥncipalr̃ faciẽdo. ⁊ hũorẽ colericum cũ ſua f̾ritate refrenat: lꝫ vſus ei⁹ p ſe ſolũ nõ eſt ꝯueniẽs nec vſitet͂ ab aliq⁹. ⁊ doſis ei⁹ pſilij p ſe ſolũ ẽ vſq; ad. ʒ. iii. aſſũpta ſolũ ipi⁹ mucilaginoſa expſſiõe. Seq̇tur ei⁹ deſcriptio ꝺclarãdo q̃ nõ ſũt ꝺclarata. ℞. cuſcute: ẽ. n. herba q̃dã adherẽs ſup linũ: ⁊ ẽ multũ nõ q̃ alio nõie vocat͂ podagra lini calide ꝯplonis ĩ p̃mo. ſicce ĩ. z⁹. Scene. ⁊ folliculi ei⁹ ſũt q̇ hñtur ĩ vſu. ẽ. n. ca. ⁊ ſic. ꝯplonis in fine p̃mi. Soluit eni colerã aduſtã. Et doſis ei⁹ ĩ puluere ẽ vſq; ad. ʒ. i. ſ. ĩ ĩfuſiõe a. ʒ. 4. vſq; ad. vi. Sꝫ ab aſſũptiõe ei⁹ caueat hñs caliditatẽ renũ ⁊ parat⁹ ad excoriatiõeꝫ veſice. Capillus veneris herba ẽ nota naſcẽs iuxta fontes aq̃rũ: iuxta ẽt puteos ſatꝫ tẽperate ꝯplonis tñ aliq̃⁹ caliditatis ⁊ ſiccitatis ẽ verſus p̃mũ: virtutẽ hꝫ apitiuã purificatiuã ſãguĩs: ſoluẽdo colerã a ſtõaco ⁊ inteſtĩs ſꝫ p ſe ſolã nõ hẽtur in vſu q: minimũ doſis ei⁹ req̇reret͂ vſq; ad lib. i. Sꝫ in decoctiõib⁹ cũ q̃b⁹ alie medicie diſtẽperant͂ cõfert. Et ſic hẽtur in vſu ⁊ ei⁹ aqua diſtillata multũ confert paſſionib⁹ pectoris calidis ⁊ ſicis. Et fumi terre. eſt f̾ra v̾ſus p̃miuꝫ gradũ cum admixtiõe caliditatis q̃ ẽ in ſupficie folioꝝ ei⁹ q̃ immediãte ſoluit. Eſt aũt ſicce ꝯplonis v̾ſus ſcõm. Soluit leuit͂ colerã ⁊ hũores aduſtos purificãdo ſãguinẽ. Cõfert ſcabioſis a ſtate ſalſo: ⁊ marſie ſyrup⁹ ⁊ aq̃ ⁊ ſucc⁹ ei⁹: ⁊ ſyrup⁹ ei⁹ magis habet͂ ĩ vſu. Et doſis ſucci ẽ vſq; ad. ℥. z. Et doſis ꝺcoctiõis ei⁹ ẽ: vſq; ad. ℥. io. ⁊ doſis pulueris ẽ vſq; ad. ʒ. 4. ſꝫ nõ ẽ ĩ vſu niſi in ſucco vel ĩ ſyrupo vel ĩ aq̃ diſtillata q̃ tũc ſyrupo admiſcet͂. ⁊ ſic nõ ſoluit reliq̃ ſimplicia ĩgrediẽtia ꝯpõnẽ hui⁹ electuarij ſunt ſuperius declarata. Et doſis hui⁹ electuarij eſt vſq; ad. ʒ. 4. obſeruata regula poſita in electuario. de aromatib⁹ galieni.

Poſt electuariũ de pſilio põit͂ quoddã electuariũ quo vtebat͂ gẽtil͂ pp ſingl̃aria ei⁹ iuuamẽta ĩ podagricis. ⁊ gñalr̃ ĩ oĩb⁹ dolorib⁹ iũcturaꝝ ⁊ dꝫ ſumi ĩ mane. ⁊ ei⁹ doſis ẽ vſq; ad. ʒ. 8. cũ vino lĩphato vel

aliquo liquore ꝯuenientı vel in forma ſolida dactili qḋ melius ē. ⁊
ṗt ſumi ſemel ī hebdomada. Cuiꝰ hec ē deſcriptio. Recipe tur
bith boni. ℥. i. ſ. hermodactiloꝝ. ℥. i. ⁊ ſūt ca. ⁊ ſic. ꝯplonis in pⁿᵒ
ſcḋi gradus cū aliq̄li hūiditate viſcoſa dū ſūt recētes: ſ; ſic nō ha
bent̄ in vſu. Soluūt flegmā groſſū marīe a iuncturis. ⁊ iō ſūme
ꝯuenit podagricis ⁊ dolorībꝰ iuncturaꝝ. ⁊ doſis eoꝝ eſt. a. ʒ. i. vſ
q; ad. ii. cū eoꝝ correctiōe: ſibi admiſcendo tertiā ptē doſis: ſ; p ſe
ſolū nō hētur in vſu. zinzi. ℥. i. Eſule q̄ ab Auic. vocat̄ ſcebian. ⁊
a meſue aſceb: ā. ʒ. iij. herba eſt nota ī ptibus nr̄is fortit̄ ſoluēs ſ;
per ſe ſolū nō hētur in vſu: ſ; ſolū radix eiꝰ ṗparat̄ in medicīs: ⁊ a
ruſticis comedit̄ cū q̄rūt ſolutōe;. ⁊ nō curātes de q̄ātitate aſſū
ptōis ipiꝰ q̄nq; moriūtur. ē ēt vomitꝰ ṗuocatiua. ⁊ eſt calide ⁊
ſicce ꝯplonis ī tertio. Soluit ṗncipalr̄ a iūcturis: ⁊ hūores groſ
ſos. ⁊ ēt a cerebro ⁊ a neruis. ⁊ doſis eiꝰ ē vſq; ad. ℈. i. zucari lib.
.ſ. ⁊ reducat̄ ad formā electuarij vel ſolide ꝯfectōis. Si quis tū
vellet: vt vigoroſiꝰ ſoluat: ⁊ marīe mām colericā addat ſcamo
nee correcte. ʒ. i. ⁊ tūc doſis erit vſq; ad. ʒ. 6. qualitercūq; prepare
tur. ⁊ ſine alio potu.

e Lectuarium Eleſcoph: qḋ educit ſupfluita
tes a toto corpe: ⁊ expellit vētoſitatē: ⁊ val;
ad iuncturarū dolorē ⁊ lateꝝ ⁊ colicam. Et
mundificat renes ⁊ veſica;: ⁊ addit in coitu. Cuiꝰ hec
eſt ꝑmixtio. ℞. ſcamonee antiochene bone: turbit al.
ā. ʒ. vi. gariofil. ciamomi: zinzi. emblicoꝝ: nucis mu
ſcate: pollipodij: ā. ʒ. ij. ⁊. ſ. zuccari albi. ℥. vi. Confi
ce cum melle diſpumato. Doſis eius eſt ab aureis. ij.
vſque ad. iij.

¶ Nō ē ī vſu. poſſet tū ꝯuenient̄r ⁊ magiſtralr̄ ṗparari: ⁊ ſūme
ꝯueniret ad ſoluēdū materiā colericā ⁊ flegmaticā: ⁊ ad multas
⁊ diuerſas paſſiōes q̄s pōit ī ſra. ⁊ doſis ē vſq; ad. ʒ. 4. p ſcamo
neā antiochenā ītelligit de illa ꝯtrata que eſt melior oībus aliis
Reliqua ſimplicia ſunt ſuperiꝰ declarata.

c Onfectio medicamis qḋ ſcripſit Hamech: ⁊
valet omni paſſiōi q̄ fit ex colera ⁊ flegmate
ſalſo: ⁊ ṗprie q̄ eſt ſicͭ ipetigo ⁊ ſcabies: lepra
cancer corrodēs: ⁊ ſilia. Et ē medicia ſublimis iuua
menti. Cuiꝰ hec ē ꝑmixtio. ℞. mirobalanoꝝ citrinoꝝ
℥. iiij. chebuloꝝ: ⁊ nigroꝝ: reubarbari boni ā. ℥. ij.
agarici: collognthide: pollipodij: ā. ʒ. xviij. abſinthij:
baſce: ſene: ā. ℥. i. In alio. ʒ. vi. violaꝝ. ʒ. xv. epithimi
℥. ij. aniſi: roſaꝝ: feniculi: ā. ʒ. vi. ſucci fumi tre lib. i.
prunoꝝ numero. lx. paſſulaꝝ enucleataru;. ℥. vi. In
fundant̄ oia in aq̄ caſei q̄ātitate ſufficiēti: ⁊ ponāt̄ ī va
ſe vitreato ſtricti orificij: ⁊ obturet̄ os eiꝰ: ⁊ dimittat̄
ꝑ dies. v. Demū bulliāt ebulitōe vna. Poſtmodu; co
letur: ⁊ ī tali colatura ponat̄ caſſie fiſtule mūde. ℥. iiij.
tamarindoꝝ. ℥. v. tereniabin. ℥. ij. Fricent̄ manibus: ⁊
colent̄: ⁊ ṗiciat̄ ſuꝑ illud zuccari boni albi: lib. i. ⁊. ſ.
ſcamonee. ℥. i. ⁊. ſ. Et coquant̄ vſq; dū hēant ſpiſſitu
dinē mell. Deīde pulueriʒent̄ ſuꝑ illud mirobalanoꝝ
citrinoꝝ: chebuloꝝ idoꝝ ā. ℥. ſ. bellericoꝝ: emblico
rū reubarbari: ſemis fumi terre: ā. ʒ. iij. aniſi: ſpice. ā
. ʒ. ij. Doſis eiꝰ eſt a. ʒ. ij. vſq; ad aur. ij.

¶ Iſtud electuariū habet̄ ī vſu: ⁊ ṗparatū reperit̄ ſub hoc nōie
⁊ ꝯuenit oībꝰ paſſiōibꝰ q̄ ſūt ex colera vel ex flate ſalſo. Et ex
q̄buſcūq; hūoribꝰ aduſtis: vñ ē ſolutiā ꝯueniēs ⁊ ꝯferēs ad oē;
ſcabiē ⁊ pruritū. mā; illiꝰ euāando. Cōfert ēt lepre ⁊ cācro ⁊ cuil;
feditati cutis ṗuenientis a mā calida vel aduſta. ⁊ eiꝰ doſis ē vſq;
ad. ʒ. 4. Quā aūt doſis ſm q̄ ſcribit meſue erat vſq; ad. ʒ. iii. qñ
aromatiʒat̄ ī maiori portōe ponebant̄. Cuiꝰ hec ē dſcriptio. ℞.
mirabolanoꝝ: pollpodij: radix ē herbe note ⁊ ē calide ꝯplonis in
tertio. ⁊ ſicce ī ſcḋo. ſolutiua ē hūoris melācolici ⁊ flegmatici ⁊ mu
cilaginoſi: ⁊ marīe a iūcturis. ⁊ doſis eiꝰ ē vſq; ad. ʒ. iii. ſ; p ſe ſolū
nō habet̄ ī vſu. pruna nūero ſeragita. ſūt. n. nota frigide ꝯplonis
ꝟſus ṗncipiū ſcḋi ⁊ hūide ī ſcḋo. leuit̄ cōprimēdo euāant colerā q̄
in īteſtinis reperit̄. ⁊ doſis ipoꝝ ē vſq; ad. ℥. 6. Infundat̄ ī aq̄ ca
ſei. ⁊ de ipa dictū eſt in ṗma dſcriptōe ſatirion vbi de lacte diſcut̄

ſiuꝰ. Caſſia fiſtula. ipa ē medicia q̄ leniēdo euāat ṗncipalr̄ cole
rā: ⁊ ſubſequēter flegma. ſanguine; purificat a matieb⁹ aduſtis
⁊ p ſe ſola multū habet̄ ī vſu gn̄alr̄ vbiq; locoꝝ. q; ſine nocumē
to opatur. Ita q̄ pueris ⁊ ṗgnātibꝰ dari poſſit. ē calide ꝯplonis
ꝟſus ṗmū gradū: ⁊ hūide ī ṗmo. ⁊ doſis eiꝰ diſtēperate cū deco
ctiōe cōi ē vſq; ad. ℥. x. vel cū aliquo liquore ꝯuenienti ṗparet̄. ⁊
ī forma dactili ſeu electuarii. ⁊ doſis eiꝰ ē vſq;. ℥. i. ſ. ⁊ nō reqrit̄
digeſtiuū ī aſſūptōe eiꝰ: ⁊ ſepe dat̄ in ṗncipio egritudinū matia
liū colericaꝝ ad aliqualē minoratōe; matie. Tamaridoꝝ ſilitu
dinē hn̄t cū prunis. ⁊ ſūt fre ⁊ ſicce ꝯplonis ꝟſus ſcḋ;. ꝯprimēdo
euāant ſicͭ pruna. ⁊ doſis eoꝝ ē vſq; ad. ℥. 4. ſ; p ſe ſolā n̄ hn̄tur ī
vſu. Tereniabin ſūt ſpēs mãne q̄ nō reperiūtur: ſ; loco ipaꝝ acci
pimꝰ mānā. ⁊ ē ros q̄ de nocte cadit ī egypto ſup frōdes aliquo
ru; arboꝝ. ⁊ ē calide ⁊ ſicce ꝯplonis ⁊ hūide ī ṗmo. leniēdo euāat
colerā purificādo ſanguinē. ⁊ doſis eiꝰ ī forma potabili vl̄ ſolida
ē vſq; ad. ℥. iii. vſq; ad hn̄placitū aſſumētis ipm. ⁊ damꝰ aliq̄ñ
ſicͭ dcm̄ ē de electuario īdo. Reliq̄. ſimplicia ſūt ſupiꝰ ḋclarata.

c Onfectio alia Hamech expta ꝯferēs egritu
dibus ḋ colera nigra ⁊ hūori aduſto. ſicͭ ma
nie: melācolie: ꝟtigini ⁊ obliuiōi: ⁊ egritudini
bus cutis. ſicͭ ſcabies: morphea: lepra: cācer: elephan
tia: ⁊ ipetigo. Cuiꝰ ꝑmixtio. ℞. mirobalanoꝝ nigroꝝ:
chebuloꝝ indoꝝ: epithimi: ā. ʒ. i. fumi tre: abſinthij:
ā. ʒ. xx. baſce: calamēti: polipodij: agarici: liqritie: bu
gloſſe: ā. ʒ. x. ſticados: camedreos: camepitheos: be
degar: aniſi: ā. ʒ. v. prunoꝝ: iuiube: ſebeſtē: ā. nūero
. lxx. paſſulaꝝ enucleataꝝ librā. i. Coq̄nt̄ in aq̄ ſufficiē
ti vſq; ad t̄tiā ptē: ⁊ pone ī ea rob libras. ij. mell' lib. i.
ſcamōee. ℥. ij. coq̄nt̄ cū facilitate vſq; ad mell' ſpiſſitu
dinē. Doſis eius eſt. a. ʒ. iij. vſq;. ad. vi.

¶ Cōfectio alia qua; ſcribit Hamech nō ṗparat̄: nec ē ī vſu ſicͭ
ṗma: magiſtralr̄ tū pōt ꝯfici. ⁊ ꝯfert hoc electuariū oībꝰ diſpōni
bꝰ qbꝰ ꝯuenit ṗmū. ⁊ ē ſolutiuū matieꝝ magis colericaꝝ ⁊ adu
ſtaꝝ q̄; ṗdictū. q; abſq; additione in iſto addit̄ ſcamōea. ⁊ doſis
eiꝰ ē a. ʒ. 4. vſq; ad. ʒ. 6. hec ē deſcriptio. ℞. mirobalanoꝝ: baſce
. i. thimi: bedeguar. i. ſpine albe ⁊ ē ca. ⁊ ſic. ꝯplonis ī ṗmo gradu.
⁊ naſcit̄ ī ſepibꝰ cū aculeis valde pūgētibꝰ ⁊ ē multū ṗuocatiū
lactis ſ; oē; modū aſſūptōis ipſiꝰ. Sebeſten ē fructus arboris
pue hn̄s corticē exteriꝰ ⁊ nucleū īteriꝰ: ⁊ ē eq̄lis ī actiuis ſ; ī paſ
ſiuis ē hūide ꝯplonis ī ṗmo: ⁊ īgredit̄ ī decoctōe cōi ⁊ pectorali.
Iuiubaꝝ ſūt note calide ⁊ hūide ī ṗmo gradu: ⁊ ſūt pectorales: ⁊
pone ī ea rob. i. ſape: ⁊ de ipa dcm̄ ē ī athanaſia. reliq̄ ſūt nota.

m Odꝰ electuarij roſati ſolone educēs colera;
ſine moleſtia. Et val; ad egritudies ex ea fa
ctas. ⁊ ad egritudies iuncturaꝝ calidas: ⁊ ad
ſodā calam: ⁊ ꝟriginē: ⁊ oculoꝝ dolores: ⁊ icteritiā ci
trinā: ⁊ ē ſanū ⁊ exptū. Cuiꝰ ꝑmixtio. ℞. ſucci roſaꝝ ru
beaꝝ ꝯpletaꝝ lib. iiij. zuccari tabarzet li. i. ⁊. ſ. terenia
bin puri ⁊ recētis. ℥. vi. ſcamōee ātiochene. ℥. i. ⁊. ſ. Co
quant̄ oia cu; facilitate ſuꝑ ignē: q̄ ſit ſicͭ cādele: vſq;
dū mell' hēat ſpiſſitudinē. Deiñ ṗiice ſuꝑ illḋ trociſco
rū de ſpodio. ℥. i. gallie: croci: ā. ʒ. ij. trociſcoꝝ de ber
beris. ʒ. iiij. Repone ī vaſe vitreo. Doſis eiꝰ ē. ʒ. v.

¶ Hoc electuariū ab oībꝰ ſub hoc nōie ṗparat̄: nō tū ſub hac
deſcriptōe meſue. S; ſ; deſcriptiōe; Nicolai poſitā ī ſuo ātido
tario. ⁊ ego ibidē ad plenū declarabo ſi deo placuerit. ⁊ eſt ṗnci
paliter euacuatiuū materieꝝ calidaꝝ ⁊ aduſtaꝝ.

c Onfectio alfeſara: quā ſcripſit Democritus
mūdificās cerebꝝ ⁊ neruos conferēs iuuamē
tū magnū epilepſie: ⁊ ꝟtigini: ⁊ paraliſi: ⁊ egri
tudibus neruoꝝ frigidis. Cuiꝰ h̄ ē ꝑmixtio. Recipe ra
dicis alfeſare mūdatē ⁊ ꝯtrite: lib. ſ. mell' paſſulaꝝ lib.
iiij. ſqlle aſſate: pineaꝝ mūdataꝝ: ā. ʒ. i. ⁊. ſ. nucis mu
ſcate: cordumeni: macis: zinziberis: ā. ʒ. ij. gariofilo
rū: piperis lōgi: ā. ʒ. i. et. ſ. ſiſeleos. ſallis gēme: gallie
ā. ʒ. i. ſpice. ʒ. ſ. agarici. ʒ. iij. ſticados. ʒ. i. et. ſ. Doſis

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0108-9
DFG

ei⁹ eſt a.ʒ.ij.vſq͡ʒ ad.iiij.Da poſt ſex mẽſes.

¶ Non eſt in vſu nec preparata reperitur.

c Onfectio mãne et inuẽtõe Gal.et ẽ medicia nobil' opatõis et bone.Solõnẽ eni effic̃ facilez:et educit colerã citrinã ſine moleſtia: Et valʒ ad egritudines factas ex ea:et ẽ medicia delectabilis boni ſaporis. Cui⁹ ꝓmixtio. Recipe mãne pure et recentis lib.i. ſcamonee antiochene.℥.i. Diſſoluat̃ mãna cũ ſucco roſaꝝ rubeaꝝ:ꝛ ſit ſucci q̃titas conueniẽs circit̃ lib.i.Et coq̃tur cũ facilitate: donec habuerit ſufficiẽtẽ coctionẽ. Deiñ pone ſuꝑ illð maſticis.ʒ.iij.ꝛ da.℥.ſ. Jngt Gal.Oſtẽdit ꝯpoſitio hui⁹ medicie nobilitatẽ ei⁹.Eſt eni cõpoſita ex partib⁹ ꝯueniẽtibus complexione ꝛ ꝓprietate.

¶ Confectio de mãna inuentõe gal. qð vocat̃ diamãna. Jſtud eſt famoſum electuariũ qð eſt multũ ĩ vſu ꝛ ſub iſta deſcriptõe ꝛ titulo vbiq͡ʒ ꝑparat̃ nõ tñ reperit̃ vbi gal.ip̃ʒ deſcribat. Eſt.n. ꝓncipalr̃ ſolutiuũ colere citrine cuʒ facilitate ꝛ ſine moleſtia ꝛ eſt mirabilis opatiõis ẽt a ꝓprietate.ꝛ ad guſtũ ẽt eſt delectabil' valde. Cõfert ẽt hñtib⁹ epar calidũ renes vel alia mẽbra cũ dominio humoris colerici vel aduſti.ꝛ doſis ei⁹ ẽ a.ʒ.4.vſq͡ʒ ad.6.põt ẽt ꝯmiſceri cũ caſſia vel cũ mãna.vt.℥.i.ſ.caſſie vel.℥.ꝛ.mãne.Et dat̃ hoc electuariũ ſm̃ ṽtutẽ aſſumẽtis:cui⁹ hec ẽ deſcriptio.R.mãne pure:ſcamõee antiochene.tamen corrigi debet. ꝛ vocatur diagridium.reliqua vero ſunt nota.

c Onfectio Almezereõ ex ĩuẽtiõe nr̃a qð ẽ medicamẽ hñdictũ ad hydropiſiʒ.ſolõne.n.educit aquã citrinã cũ fortitudie.Cui⁹ h̃ ẽ ꝓmixtio. R.folioꝝ almezereõ ꝑparatoꝝ ꝑtes.x. carniũ citonioꝝ elixatoꝝ ĩ aceto vini:ꝛ zuccari tabarzet.añ.ꝑtes.lxxx.aq̃ caſei:ĩfuſiõis agarici ꝑtes.xxx. teraniabin ꝑtes.xl.olei almezereon ꝑtes.xij. Diſſoluat̃ zuccaꝝ ꝛ teraniabi in aq̃ caſei ꝑdicta:ꝛ miſceant̃ cũ carne citonioꝝ:ꝛ coq̃nt̃ cũ facilitate:vſq͡ʒ dũ mell' hẽat ſpiſſitudinẽ.Et inoluat̃ puluis folioꝝ almezereõ cũ oleo iam dicto.ꝛ ꝯficiant̃ cũ eis.Et ſit doſis ei⁹.ʒ.iiij.

¶ Cõfectio al mezereõ.i.laureole.h⁹ electuariũ nõ ẽ ĩ vſu:magiſtralr̃ tñ põt ꝑparari ꝛ ẽ medicamẽ hñdictũ ad idropiſim aquoſaʒ q̃ vocat̃ aſcitis. educit.n.aquã citrinã cũ fortitudine.vñ cuʒ magna cautela ẽ exhibẽdũ: ꝛ ſolũ robuſtis ꝛ fortibus.Et doſis ei⁹ ẽ vſq͡ʒ ad.ʒ.q̃tuor.mĩor aũt poſſet dbilioꝛib⁹ exhiberi. Cui⁹ hec ẽ ꝓmixtio.R.folioꝝ almezereon.i.laureole.herba nota ĩ ꝑtibus noſtris.ꝛ ẽ ſpẽs lacticinij calide ꝛ ſicce ꝯplõnis ĩ q̃rto. ſolutõe educit colerã citrinã. Oleũ almezereon fit ſicut oleũ camomillinũ.reliqua ſunt ſuperius declarata.

m Odus ꝯfectõis al ſebrã.Solutõe educẽs colerã nigrã ꝛ flegma:ꝛ aq͡ʒ citrinã.Cui⁹ ꝓmixtio. R.alſebrã boni ꝛ electi : mirobalanoꝝ citrinoꝝ:añ.℥.ij. Pulueriʒent̃ ꝛ cribellent̃:ꝛ ꝓijciat̃ ſuꝑ coꝝ ſũmaʒ ſucci feniculi hũidi q̃titas:q̃ cooperiat:ꝛ pone in ſole dieb⁹.v.ſemꝑ inouãdo modice ſtillatõeʒ ſucci ſuꝑ eos. Deiñ dimitte ſiccari ꝛ repone ĩ vaſe vitreo.Et eſt doſis.ʒ.i.vſq͡ʒ ad.ij.cũ zuccaro ꝛ aq̃ cala.

¶ Modus ꝯfectionis alſebram.nõ eſt in vſu.

m Odus ꝯfectõis de eupatorio mirabil' ad icteritiã:ꝛ initiũ hydropiſis.Cui⁹ ꝓmixtio. R.ſucci eupatorij:raued boni:ana.ʒ.iiij. croci.ʒ.ij. lacce:ſemĩs cuſcute:añ.ʒ.iij.cimarũ ſq̃nãti:ſeis citrulli:cucumeris:põtulace:ſucci abſinthij:añ.ʒ.iij.ſcamonee cocte in citonijs.ʒ.ij.ꝛ.ſ. Fiat oium ꝯtritio bona: Et ſit doſis eius aur.i.cum lacte camellaꝝ:aut aq̃ caſei alcherigi.Et ſi eſt illic caliditas:repꝛime cuʒ ſucco ſolatri:ꝛ endiuie:ꝛ volubilis.

¶ Modus ꝯfectionis de eupatorio.ẽt nõ eſt in vſu.

a Lchechengi eſt medicamẽ magnũ iuuamentorum expertoꝝ ad hydropiſiʒ ꝛ cacheriaʒ:ꝛ egritudies epatis ꝛ ſplenis:ꝛ ad mollificationem mẽbroꝝ nutritiõis:ꝛ corruptionẽ forme.Et confert emoroidib⁹:ꝛ ad egritudies iuncturaꝝ. Cui⁹ permixtio. Accipe ſucci volubil':ſucci endiuie:ſucci apij:purgatoꝝ:añ li.iiij. Proijce ſuper eos mirobalanoꝝ citrinoꝝ chebuloꝝ:añ.ʒ.xij.emblicoꝝ.ʒ.l.indorũ:bellericoꝝ:añ.ʒ.viij.agarici.ʒ.x.abſinthij:cuſcute: radicis apij:feniculi:aniſi:ana.ʒ.iiij.ireos.ʒ.x.paſſularum enucleataruʒ.ʒ.lxxx. Buliant cũ facilitate vſq͡ʒ ad medietatẽ ſuccoꝝ. Deiñ colent̃ poſtq͡ʒ oia fuerint manibus hñ fricata:ꝛ ꝓijciat̃ ſuꝑ partẽ.i.ſuccorũ tamarindoruʒ:cheyron.℥.viij.tereniabin.℥.iiij.caſſie fiſtule.℥.viij. Deiñ colent̃ a ſcoſis:ꝛ in alia parte aq̃ ꝓijciat̃ penidiaꝝ:ſaari lib.iiij. Deide miſce oia ſimil':ꝛ buliãt ebulitõibus duab⁹. Tunc vͦo ꝓijce ſuꝑ illud olei ſiſamini recẽtis.℥.xv. ꝛ agitent̃ oia ſimul. Deide coquant̃ vſq͡ʒ ad mellis ſpiſſitudinẽ. Tũc vero deponat̃ ab igne: ꝛ pulueriʒent̃ ſuꝑ illud trociſcorũ diarodon: trociſcorum de eupatorio:trociſcorũ de abſinthio:ꝛ trociſcorum de reubarbaro:añ.℥.i.ꝛ.ſ.ireos.℥.i.agarici: foliorũ almezereõ nutritoꝝ ĩ aceto:añ.aur.viij. ſcamõee: ſucci eupatorij:ſucci abſinthij:croci:lacce ablute: mirobal' citrinoꝝ:chebuloꝝ:añ.aur.iiij.bellericoꝝ : emblicoꝝ:indoꝝ:añ.aur.iij.ſpice:aniſi: añ.aur.ij. turbit boni.℥.vi. Jnuoluant̃ oia pri⁹ cũ olei almezereõ.℥.iii. ꝛ miſceant̃ cũ ꝑdictis ꝛ hñ ĩcorporent̃.Et ſit doſis ei⁹ a.ʒ.iii.vſq͡ʒ ad.iiij.cum aqua endiuie.

¶ Alchechengi ẽ medicamẽ magnũ ꝓpter ꝯpõnẽ multoꝝ ſimpliciũ.ꝛ ꝓpter ei⁹ efficaciã:ꝛ ẽ electuariũ qð ẽ ĩ vſu.ꝛ ꝑparatũ reperit̃.Eſt.n.ꝯueniẽs ad idropiſiʒ aſcitẽ. ꝛ ad caʒeñã q̃ ẽ ꝑma diſpõ ad idropiſim.ꝛ ad egritudines epatis ꝛ ſplenis factas a ſ̃ſtate aquoſo. Soluit.n.potẽter aquoſitatẽ ꝛ ſ̃ſta. Cõfert ẽt mollificationi mẽbroꝝ:ꝛ rectificat ðprauatũ colorẽ ꝛ fedũ ṽſus cinericiuʒ ꝛ citrinũ.ſoluẽdo ẽt aquoſitatẽ citrinã. Et alias ṽtutes magnas hʒ efficere:ſʒ ẽ ſolutiuũ. q̃re cũ magna cuſtodia dʒ exhiberi ꝓpt̃ ei⁹ potẽtiã ĩ ſoluẽdo.Et doſis ei⁹ ẽ vſq͡ʒ ad.ʒ.iij.cũ aq̃ endiuie ad tẽperãdũ calitatẽ vl' ſine ip̃a:vel cũ alio liquore ꝯueñẽti.cui⁹ hec ẽ ðſcriptio.R.ſucci volubilis.ꝛ ẽ herba q̃ multũ adheret arboribus:ꝛ marie vitib⁹:hñs lacticiniũ faciẽs cãpanellas albas:ꝛ ẽ calide ꝛ ſicce ꝯplõnis ĩ ꝑmo.hʒ ṽtutẽ leuiſſimã ĩ ſoluẽdo aquoſitatẽ ꝑp lacticiniũ ei⁹. Jreos.Et hic vtilr̃ ẽ notãdũ ꝙ ſucc⁹ ireos duʒ ẽ recẽs aſſumpt⁹ ĩ põdere.ʒ.q̃tuor a corporib⁹ fortib⁹ vel q̃ñtuʒ media teſta oui capere poſſit mirabilr̃ educit aquã ĩ idropic.ꝛ ꝑmiſcẽdo cũ zuccaro leuiſſime buliat.vl' cũ melle ſcðʒ ꝙ expedit. ꝛ cũ aſſumptiõe ipſi⁹ ſoli⁹ modo iã dicto vidi plurimos curatos ſumẽdo bis quolibʒ mẽſe cũ regula ſuperi⁹ dicta de tali ſucco. Tamarindoꝝ cheyron.i. de illa ꝯta. Terenlabin. olei ſiſamini recẽtis.ꝛ ſi tale oleũ nõ habes.pone oleũ de amigdalis dulcibus q: fere eiuſdẽ eſt virtutis ꝛ ꝯplõnis.Et in hac deſcriptione multos trociſcos ponit.quos ĩferius declarabo diſtinctione q̃nta .reliqua ex ſupraſcriptis ſunt nota.

c Onfectio electuarij diacitoniten ꝯferẽs colice:ꝛ egritudinib⁹ mẽbroꝝ nutritõis. Et educit ſolõne colerã. Accipe ſucci citonioꝝ lib.iii.mellis tabarzet:lib.ij.ſcamonee.℥.i.ꝛ.ſ.gallie bone:gariofiloꝝ:zinziberis:maſticis: piperis lõgi: cinamomi:nucis muſcate:añ.ʒ.iij.Cõfice oia ſil'.Et ſit doſis ei⁹ ab aur.i.vſq͡ʒ ad.iij. Si aũt volueris vt ſolõne educat colerã ꝛ flegma:ponãt̃ ĩ medicamie ſcamõee.ʒ.v.turbit.ʒ.xij.Si aũt volueris vt ſolũ flegma educat:abiecta ſcamonea:ponatur turbit.ʒ.xxv.cartami excorticati pondus ſcamonee.Et ſi volueris vt cole

ram nigram educat:ponat̄ loco p̄dictoꝝ elleborus niger:aut epithimū:aut polipodiū. Et apud p̄les fit h̄ medicia cū melle. Et apd̄ p̄les cū zuccaro. Et q̄nq̄ fit cū ſucco citonioꝝ. Et aliq̄n cū carnib⁹ ꝛ ſucco ipſoꝝ. Et aliquando cū carnibus tantum.

¶ Non p̄parat̄ nec eſt in vſu ſm̄ preſentē deſcriptionē:ſ; h̄ñ eſt in vſu ſm̄ deſcriptionē poſitā a nicolao in ſuo antidotario. Et hic vltimo notandū q̄ īter oīa electuaria ſolutiua ſupi⁹ dicta illa q̄ magis ꝛ gñal̄r ſunt in vſu ɔueniētia materieb⁹ flegmaticis ſeu frigidis febriētib⁹ vel nō febriētib⁹ ſūt electuariū indū maī⁹ ꝛ min⁹ q̄d plus ɔuenit:ꝛ electuariū diafinicon ſolutiuū ꝛ de iſtis dictū eſt.ꝛ de doſi ꝛ mō aſſumptiōis. Electuaria v̄o ſolutiua materiei calide ſeu colerice q̄ ēt febrientib⁹ ꝛ nō febrientib⁹ ɔueniūt ꝛ q̄ p̄ncipal̄r ſunt ī vſu ſūt ſolū duo.ſ.electuariū q̄d dicit̄ diamāna ſuperi⁹ poſitū ꝛ declaratū.ꝛ aliud eſt electuariū de ſucco roſaꝝ poſitū a Nicolao que duo ſatis ɔueniūt ī mō ſolutiōis ꝛ doſis:ꝛ pñt p̄dicta electuaria oīa per ſe ſola aſſumi:vel in forma boli cū zuccaro vel admixta cū caſſia ꝛ māna ī doſi debita ſ; exigētiā:vel cū aq̄s diſtillatis appropriatis vel cū decoctōib⁹ cōīb⁹ vel aliis dicendis inferi⁹.

¶ Et ſic ē finis h⁹ t̄tie diſtīctōis. Incipit quarta.

Ad egritudīes frigidas cerebri ꝛ neruorum.	Valens in fluxibus.
Senſus intrinſecus clarificāt viſum acuunt.	Ad debilitatem renū ex frigiditate.
Ad mollificationem.	Ad coitum multiplicandū.
Ad aſperitatem gutturis.	Ad relaxatōeꝫ luminis.
Sitim extinguens.	Ad menſtrua alba.
Appetitum incitans.	Leuit̄ exp̄mēdo euāns p̄mo flegma poſtea colerā.
Aſcenſū vapoꝝ p̄hibēs.	Leuiter exp̄mēdo euacuās coleram ꝛ flegma.
Squināntie colerice.	In p̄ceſſu febriū colerica ꝛc.
Cor confortans.	Incendium p̄hibens.
Stomacū confortans.	Digeſtiuū flegmatis ī ſtomacho ī iteſtis ꝛ venis mēſtruaꝫ.
Ad relaxatōeꝫ ſtōaci ꝛ īteſtīoꝝ	
Vomitum p̄hibens.	

¶ Quarta diſtinctio De conditis.

Quarta diſtinctio eſt de conditis. Et cadit h̄ op̄atio q̄nq̄ ī fructib⁹:q̄nq̄ in radicib⁹ plātaꝝ: q̄nq̄ ī ramis ꝛ talis:q̄nq̄ ī florib⁹.ꝛ nos loquemur de eis.ꝛ p̄mo de diuerſis modis condiendi fructus.

¶ Quarta diſtictio ē d̄ ɔditis. In p̄ſenti p̄te p̄ſeq̄tur meſue ad d̄terminādū d̄ ɔditꝫ.ꝛ d̄ his q̄ ɔſeruātur ſiue ī ɔſerua tenētur cū zuccaro vel melle ſic ſūt radices q̄dā herbaꝝ ꝛ fruct⁹ arboꝝ. ac ēt flores ꝛ rami ꝛ cortices ꝛ ſilia. Et īcipit a fructib⁹.

Hebuli ɔditi ſtōacū ɔfortāt.ꝛ appetitū p̄uo-
c cāt.ꝛ digōnē p̄curāt. Senſus ꝛ rōnem vigorāt. Viſū clarificāt. Vētes eis ī iuuētute cōſeruāt.ꝛ modus ɔdiēdi ē:vt accipias ex eis h̄ūidis:ſi h̄ri pñt:vel ſaltē h̄ūectat̄ ſcd̄ꝫ artē:q̄ h̄ūectari pñt q̄titatē quā volueris:ꝛ cū ſtilo p̄ūge eos vndiq̄.ꝛ d̄coque eos ī aq̄ cū facilitate vſq̄ duꝫ tenereſcāt. Poſt h̄ dimitte ipſos ſup tabulā: ꝛ exp̄ime aquā illoꝝ:ꝛ ſubmerge illos ī aq̄ mell̄:ꝛ dimitte eos p̄.ij.dies. Tūc v̄o decoq̄ eos cū igne lēto cū facilitate. Et poſtq̄ d̄cocti fuerit:recōde eos ī vaſe vitreo:ꝛ ſubmerge eos ī melle decoctōis eoꝝ.ꝛ da poſt ſex mēſes. Ars āt auxiliat̄ ipſos ī h̄ūectādo h̄ mō. Infundant̄ in aq̄ p̄luuia: ꝛ exponant̄ radijs ſolarib⁹ p̄ dies.viij. Deide accipe vas magnū ſic doliū:vel ſaltē fiat fouea magna ſub t̄ra in loco h̄ūido:vbi īter multā arenā h̄ūidā pone:ī q̄ diſtū cti ſepeliāt̄:ſepe ac ſepe aq̄ ſup īfundēdo: ꝛ īnouādo arenā de q̄rto ī q̄rtū die vſq̄ dū tumeſiāt: ꝛ h̄ūectēt̄.

¶ Chebuli.ſ.mirabolāi ɔditi: maxīe dū ſe recētes:vt diutius ꝛ mell⁹ ɔſeruētur. Sūt.n.fruct⁹ cuiuſdā arboris naſcētis ī India v̄tutis ꝛ ɔplōnis vt dcm̄ ē ſuperi⁹:h̄ñt īſup ꝛ alias v̄tutes vltra p̄dictas.ſcitāt.n.apetitū proſtratū. Iuuāt ad digeſtiōeꝫ.clarificāt ſenſus īt̄ſecos.acuūt viſum:ꝛ corp⁹ ī iuuētute ꝛ ſanitate ɔſeruāt:ꝛ mām̄ flegmaticā p̄mo.ſcd̄o colericā leuit̄ exp̄mēdo euāt. Et cōiter doſis ē vn⁹ d̄ mane ieiuno ſtōacho:ꝛ pñt ɔtinuari ſingulo mane ad h̄ñplacitū aſſumētis:ſūt.n. ſatis ī guſtu placibiles cū dulcedine:ꝛ aromatica p̄ōticitate.ꝛ modus cōdiendi clare ponitur in littera:quare per te ip̄m lege.

Mblici ɔditi ſtōacū ɔfortāt.ꝛ h̄ūiditatē ipſi⁹
v abſcindūt:ꝛ p̄parant ip̄m p̄paratiōe q̄ p̄tes ꝛ v̄tutes ei⁹ aggregent̄ in ipa.ꝛ modus ɔdiēdi eos eſt. Accipe ex eis q̄titatē quā volueris: ꝛ īfunde ſup eos aquā:ꝛ expone ſoli quouſq̄ tumeſcāt:ꝛ h̄ūectent̄.ꝛ poſt exp̄me:ꝛ pone ī aq̄ mell̄:ꝛ dimitte p̄.ij.dies. Deide coq̄ cū facilitate. Poſtq̄ cocti fuerint: dimitte eos īfrigidari:ꝛ adde cū melle tabarzet.ſ.cū q̄rta p̄te toti⁹:ꝛ reconde. Quidaꝫ vero ſemp ɔdiūt cum ſp̄eb⁹ aromaticis.ſic eſt cinamomū:ꝛ gallia:ꝛ cardamomū:crocus:ꝛ muſcus:ꝛ ſimilia.

¶ Emblici.ſ.mirabolani ɔditi:hec ē alia ſp̄ēs mirabolanoꝝ virtutis ꝛ ɔplōnis ſuperi⁹ dicte ī trifera ſarracenica q̄ leuit̄ ɔp̄mendo ſi̅t euāt colerā ꝛ flegma. h̄ñt ēt plures alias v̄tutes:ꝛ maxīe circa ſtomachū q̄s tu ip̄e lege. Et doſis ipſoꝝ ē vn⁹. Vlteri⁹ eſt aduertēdū q̄ ſicut iſte due ſp̄ēs mirabolanoꝝ cōdiunt̄:ita ꝛ alie poſſent ɔdiri ꝛ haberēt op̄ationes ſuas p̄prias efficere.

Itonia cōdita fluxū vētris:ꝛ vomitū ſiſtunt.
c Stomacū v̄o ɔfortāt:ꝛ digōnē. Accipe citonia magna:mūda a putrefactione: ꝛ mūdent̄ a cortice ſuo:ꝛ granis īteriorib⁹:īcidant̄ ī fruſta cōueniētia:ꝛ decoq̄nt̄ cū iuleb multe aquoſitat̄.ꝛ poſt diē vnū decoq̄nt̄ cū alio iuleb:q̄d ē vicinū p̄fecte coctōi: vſq̄ dū p̄ficiat̄ ī eis decoctio. Deide aromatizent̄ cū muſco:ꝛ ponant̄ ī vaſe vitreo:ꝛ ſepeliant̄ cuꝫ iuleb in quo decocta fuerūt. Et quidā decoquūt cū melle.ꝛ q̄dam cū vino cocto.ꝛ q̄dā ſup ɔdiunt cuꝫ ſp̄ebus aromaticis.ꝛ alij faciunt alia.

¶ Citonia ɔdita.ipa.n.p̄ncipal̄r ɔſtrigūt vel ɔueniūt relaxatōi ſtomaci ꝛ īteſtinoꝝ.reſiſtūt fluxui vētris ɔdita cū zuccaro ꝛ aſſūpta añ cibū.vomitū aūt ꝛ aſcēſum vapoꝝ ad caput p̄hibēt aſſūpta poſt cibū. Et doſ ei⁹ ē vſq̄ ad.ʒ.i. Cōplexio āt citonioꝝ ꝛ v̄tutes dicte ſſ ſupi⁹ ī ɔfectōe d̄ citōijs:ꝛ ī electuario ido maiōi. Et mod⁹ ɔdiēdi iſta:vt lōge a t̄pe ɔſeruēt̄ pōit̄ hic ī l̄ra q̄ ē clara.

Ira ɔdita cor ꝛ ſtomacū confortant.ꝛ mod⁹
p condiendi ea eſt ſicut citonia.

¶ Pira ɔdita ꝛ debēt eligi q̄ ſūt magis aromatica:ꝛ cū zuccaro ɔdita ſtomachū:ꝛ cor ɔfortāt.diuerſificātur āt ī ɔplexiōe ipoꝝ ſm̄ ɔpletā maturitatē mediā ꝛ acerbitatē. Acerba.n. ſūt frigide ɔplōnis ꝛ ſicce v̄ſus z^m.p̄fecte matura ſūt frida ꝛ humida v̄ſus p̄muꝫ cuꝫ aliq̄li caliitate ꝛ ſiccitate. Medie v̄o matura ſunt fride ꝛ ſicce ī p̄lo cuꝫ aquoſa ꝛ corruptibili humiditate. Id̄o nō ɔdita ſunt fugiēda. Cōdiunt̄ āt ſic citonia cuꝫ zuccaro vl cuꝫ melle ꝛ ɔdita cuꝫ melle acq̄runt gradū caliitatis ꝛ ſiccitatis. cuꝫ zuccaro āt minorē gradum caliitatis cuꝫ aliq̄li humiditate ꝛ tēpus aſſumendi eſt ad beneplacitum.

p Oma ɔdita ɔfortāt cor:ſincopiꝫ:ꝛ pulſū cordis ſedāt.et modus ɔdiēdi ea ē ſic citonioꝝ.

¶ Poma ɔdita. ꝛ d̄bēt eligi odorifera:ꝛ ɔdiunt̄ ſic citonia: ꝛ ſunt ɔplōnis fride ꝛ humide ī p̄mo.ſ; ī ɔplōne diuerſificent̄.ſic ꝛ pira cuꝫ ſint in maturitate vel acerbitate ipoꝝ: ꝛ duꝫ ɔdiunt̄ cuꝫ melle ꝛ zuccaro:ſunt.n.alteratiua ſup̄flue caliitatis ꝛ ſiccitatis in ſtomacho epate corde ꝛ renib⁹: ſ; ſunt dure digeſtionis ꝛ mali nutrimenti ꝛ maxīe cruda ꝛ nō cōdita.

Erſica ɔdita ſtomacū calidum:et cor confor-
p tant. Sitim rep̄mūt. Oris fetorē abſcindūt. et modus cōdiendi eſt ſicut citonioꝝ.

¶ Perſica ɔdita ſunt fride ɔplōnis ī fine p̄mi:ꝛ h̄ūide in ſcd̄o.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0110-8
DFG