

In entomologischer Hinsicht fehlt es an einem Werke, wodurch wir von den Insecten Schlesiens eine ebenso vollständige Uebersicht gewönnen, wie wir sie hinsichtlich der Pflanzen durch Wimmer's Flora von Schlesien und Grabowski's Flora von Oberschlesien erhalten haben. Um die Bearbeitung eines solchen Werkes möglich zu machen, muß das bereits Bekannte zusammengestellt und zum weiteren Gebrauche veröffentlicht werden. Da aber der Einzelne nicht alle Gegenden hinlänglich genau durchforschen kann, so erscheint es nöthig, daß diejenigen, welche Gelegenheit hatten, gewisse Gegenden besonders kennen zu lernen, die Ergebnisse ihrer Bemühungen mittheilen. Seit 1819 habe ich Oberschlesien und besonders die Umgegend von Ratibor, naturhistorische Zwecke verfolgend, nach allen Richtungen hin durchforscht und die Ergebnisse gern denen mitgetheilt, welche davon Gebrauch zu machen wünschten. Dergleichen Mittheilungen machen oft viel Arbeit, rauben viel Zeit und bleiben dennoch lückenhaft. Darum entschloß ich mich in vorliegender Arbeit eine **Grundlage zur Kenntniß der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor**, zu geben; um, wenn es die Umstände gestatten, seiner Zeit mit den übrigen Ordnungen der Insecten, in denen ich verhältnißmäßige Vorräthe zusammengebracht habe, fortzufahren und durch Nachträge die weitere Vollständigkeit zu fördern. Leider mußte ich mich über Lebensweise, specielle Anhaltsorte &c. sehr kurz fassen, obgleich es mir wünschenswerth erscheint, daß bei weiteren Bearbeitungen darauf mehr Rücksicht genommen werde, als es bisher, selbst in sonst sehr guten Werken, geschehen ist. Uebernehmen es Andere, die Erfolge ihrer Bemühungen auf ähnliche oder noch bessere Weise zu veröffentlichen, so dürfte es möglich werden, eine vollständige Uebersicht &c. der Insecten Schlesiens zu gewinnen und ein ausreichend belehrendes Werk vorzubereiten. Mich darüber, so wie über die Gründe, warum ich den von dem geheimen Regierungsrath Schmidt in Stettin entworfenen Catalog zum Grunde gelegt habe, und noch über manches Andere weiter auszusprechen, ist jetzt nicht zulässig; darum nur noch einige Bemerkungen zum besseren Verständnisse der nachstehenden Arbeit.

Unter Umgegend von Ratibor verstehe ich allerdings zuvörderst die nächsten Umgebungen der Stadt Ratibor, schließe jedoch im weiteren Sinne alle diejenigen Orte mit ein, welche von mir zwar seltener, aber doch alle Jahre mehr oder weniger oft besucht werden. Die Grenze dieser erweiterten Gegenden beginnt mit der Mündung der Olsa in die Oder, geht die Olsa aufwärts bis zur Grenze des Ratiborer- und Rybniker Kreises. Von da ab zieht sie sich nordöstlich, die Städte Loslau und Rybnik mit einschließend, bis Pilchowitz, wo sie die Birawka bis zu ihrer Einmündung in die Oder verfolgt. Hier, die Oder überschreitend, geht sie in süd-westlicher Richtung über Bauerwitz, Deutsch = Neukirch und Nassiedel an die Oppa, verfolgt die Oppa bis zu ihrer Mündung in die Oder, dann die Oder bis zur Mündung der Olsa in dieselbe. Was außerhalb dieser Grenze liegt, gehört dem weiteren Oberschlesien an, wozu ich, wie auch Wimmer in seiner Flora von Schlesien gethan hat, das diesseitige Klocacz-Gebirge mit dem Teschner Gebiete und das Gesenke rechne.

Die erweiterte Umgegend von Ratibor ist ein Wellenland, worin sich keine eigentliche Ebene vorfindet und wird durch die Oder in zwei der Natur nach sehr

verschiedene Theile getheilt. Der Theil auf der linken Seite der Oder zeichnet sich durch fruchtbares Ackerland aus, so daß verhältnißmäßig nur noch wenig Wald, zum Theil gemischtes Holz, vorhanden ist, indefß die rechte Seite der Oder, außer dem eigentlichen Oderthal und den nächsten Angrenzungen, schon viel todten Sand und ausgedehnte Nadelholz- (meist Kiefer-) Waldungen hat. Durch diese Eigenthümlichkeiten und durch den Einfluß der nur 6 bis 9 Meilen entfernten Gebirge (Gesenke und Klocacz = Gebirge) repräsentirt diese Gegend fast ganz Oberschlesien, wovon ich mich auf meinen weiteren Excursionen überzeugt habe. In diesem eingegrenzten Raume zeichnen sich, wie fast überall, gewisse Orte durch besondere Erzeigbigkeit aus; dahin gehören: die Obora, der Wald hinter Brzezie, beide gehören zu dem etwas über $\frac{1}{2}$ Meile von der Stadt entfernten Höhenzuge, die Brzezier = Berge genannt und bestehen aus gemischtem Laub- und Nadelholz mit vielem Quellgrunde. Der Storchwald, Dominikaner = Wald und Lehnstrocker Wald liegen in ähnlicher Entfernung im Oderthale und sind Reste der früheren Eichenwälder, welche sich im Oderthale hinzogen. Der Pawlauer = Wald, in fast gleicher Entfernung und unweit der Straße nach Bawerwis gelegen, enthält gemischtes Laubholz, das meist als Gebundholz eingeschlagen wird. Der Doctor = Damm ist ein mit Linden beplanzter Spaziergang in der nächsten Umgebung der Stadt. Die Landecker, der Mündung der Ostrawiza in die Oder gegenüber, ist ein Höhenzug, der im Innern Steinkohlen birgt und mit gemischtem Laub- und Nadelholz bewachsen ist. Die Oderufer, die Ränder der Teiche, die Parthien um Borutin, Zawade, Kuchelna, Katscher, Adamowis, Kauden, Rybnik &c. können nicht weiter verührt werden. — So wie die Gegend um Karlsbrunn, Möltzsch, Grätz, Ustron &c. das Gebirge vertreten, so dürften die Gegenden um Rosenberg, Kupp, Kraschew, Falkenberg &c. das eigentliche Flachland repräsentiren. Reiche Ausbeute gewährte mir im Juli 1844 die Gegend um Kupp, wo ich nächst vielen anderen interessanten Insecten, auch die sonst in Schlesien sehr seltene Argynnis Daphne in 40 Ex., ausschließlich auf Brombeersträuchern, fing.

Die mit Cursivschrift gedruckten Species gehören zwar Oberschlesien, aber nicht der Umgegend von Ratibor an. Die hinter den Namen stehenden Ziffern zeigen die Monate an, in denen die betreffenden Individuen gefunden wurden.

Ist kein bestimmter Fundort angegeben, so findet man diese Species an verschiedenen Orten, aber an keinem vorwaltend, oder der specielle Fundort war nicht mehr zu ermitteln.

Die * * deuten an, daß ich davon mehrere, die * * aber, daß ich nur einzelne Ex. abgeben kann.

Die am Ende eingeschlossenen latein. Buchstaben, sind die abgekürzten Namen derjenigen Herren, welche mir über das Vorhandensein der betreffenden Individuen Mittheilung gemacht haben, wofür ich ihnen hiermit den verbindlichsten Dank sage, und um weitere Mittheilungen bitte.

(V. F.) heißt von Fuchs, Forst = Candidat in Kraschew. — (H.) h. Härtel, Stud. phil. in Breslau. — (Kb.) h. Kaboth, Forst = Candidat aus Kupp. — (Ed. od. Rds.) h. Radzay, Oberförster in Thiergarten bei Falkenberg. — (Rdsch.) h. Rendschmidt, Oberlehrer in Breslau. — (Th.) h. Thomas, Cantor in Ratibor. — (V. U.) h. von Uechtritz, Naturforscher und Privat = Gelehrter &c. in Breslau. — (Z.) h. Zebe, Oberförster in Bolpersdorf in der Grafschaft Glaz, früher in der Nähe von Ratibor.

Weitere Abkürzungen sind:

Bmsf. Baumstämme &c. — Bl. Blüten, Blumen &c. — Bschp. — Bischoffskoppe. — Brz. W. Brzezier Wald. — Dw. Dominikaner = Wald. — Dr. D. Doctor Damm. — Dgr. Dünger. — Gebg. Gbg. Gebirge. — Gem. Gmle. &c. Gemille. — Ede. Landecker. — Eb. Laub. — Eblz. Laubholz. — Lhst. Lehnstrock. — M. Moos. — Ob. Obora. — R. Ratibor. — Paw. Pawlauer = Wald. — Stw. Storchwald. — Ubers. Uebersicht der Arbeiten &c. der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. — (Andere Abkürzungen werden leicht zu ermessen sein.)

I. Pentamera.

1. Caraboidea.

1. Cicindela. Linné.

1. * *campestris* L. Sommer. Adamowitz, Rauden Kupp, Karlsbrunn, Ustron, an freien, der Sonne ausgefekten Stellen; im Lande besonders auf freien Sandplätzen, obgleich vereinzelt, dennoch z. häufig.
 2. * *hybrida* L. desgl.
 3. * *sylvicola* Mgl. 6—9. Eble., Adamowitz, Rybnik, Rauden, z. selten; bei Ustron a. Wege nach der Czantovi z. häufig.
 4. * *sylvatica* L. 5—8. Auf freien Sandplätzen des flachen Landes, z. B. Adamowitz, Rauden, Rybnik, Kupp u. z. häufig.
 5. * *germanica* L. 6—8. Auf Brachen bisweilen f. häufig.
- ### 2. Odacantha Pk.
6. *melanura* L. 6. 8. Db., unter Moos, f. selten.
- ### 3. Tarus Clairv. (Cymindis Ltr.)
7. *humeralis* F. 6—8. Db., unter Moos, Altwater, unter Steinen, selten.
- ### 4. Dromius Bon.
8. *sigma* Ross. 6. 7. Db., Borutin, unter Moos, f. selten.
 9. * *fasciatus* F. 5—8. An der Oder, b. Borutin, im Gemille, z. selten.
 10. *4-notatus* Zenk. 6. Db., unter Moos, f. selten.
 11. * *4-maculatus* L. 3—7. Db., Stw., Lublinik, unter Moos, z. häufig.
 12. *fenestratus* F. Bei Lublinik. (Rdsch.)
 13. * *agilis* F. Im Frühjahr unter Moos, Db., Stw., Rybnik, Zawada, häufig.
 14. *marginellus* F. 5. Db., unter Moos, f. selten.
 15. *glabratus* Mgl. 10. desgl.

16. *maurus* Mgl. desgl.
 17. * *foveola* Gyll. 3—10. Db., Kafau, Kupp, unter Moos, z. selten.
 18. * *truncatellus* L. 3—10. Db., Dr. D., Dw., Kupp, Lublinik, Karlsbrunn, Ustron, unter Moos, um Baumstämme, unter Gemille, häufig.
 19. * *quadrillum* Dft. 7. Nur in Ustron, an d. Weichsel unter Steinen, z. selten. var. *2-punctatum*, ebendaselbst, 1 Ex. Anm.: *Dromius punctifer* (s. Bericht d. schles. Ges. für vaterl. Cultur, 1829 p. 53) habe ich nicht wieder gesehen.
- ### 5. Lebia Latr.
20. * *chlorocephala* Gyll. 5—9. Unter Moos, um Baumstämme, im Gemille nach Uberschwemmungen u., im Gebirge unter Steinen, bisweilen z. häufig.
- ### 6. Brachinus Web.
21. * *crepitans* L. Wie 20. var.: *nigripennis* z. selten.
- ### 7. Clivina Latr.
22. * *fossor* L. 5—10. An der Oder auf feuchtem Sande, in Wäldern unter Moos, im Gebirge, an den Ufern der Flüsse, unter Steinen, z. häufig.
 23. * *collaris* Hb. (*discipennis* Mgl.) desgl.
- ### 8. Dyschirius Bon.
24. * *thoracicus* F. 5—7. Auf feuchtem Sande an der Oder, z. häufig.
 25. * *nitidus* Dj. desgl., aber seltener.
 26. * *chalceus* Er. desgl.
 27. *politus* Dj. desgl., eben so selten.
 28. * *aeneus* Zgl. desgl.
 29. * *pusillus* Dj. desgleichen.
 30. * *gibbus*. 4—10. An der Oder wie 24, in Wäldern unter Moos, Ustron an der Weichsel und Karlsbrunn an der Dypa, unter Steinen, f. häufig.

9. *Cychrus* Web.

31. * *rostratus* L. 5—10. In Wäldern unter Moos od. unter Steinen, Db., Ede., Kupp, Krascheow, Ustron, Karlsbrunn ic. z. häufig.
32. *attenuatus* F. 6. 7. Wie 31. bei Grätz, Möltzsch, Karlsbrunn, aber s. selten.

10. *Procrustes* Bon.

33. * *coriaceus* F. Sommer. In Wäldern unter Moos, in hohlen Stöcken, unter Steinen, im angeschwemmten Gemille; Db., Ede., Kupp, Krascheow, Ustron, Karlsbrunn, z. häufig, wenn auch vereinzelt.

11. *Carabus* L.

34. *Scheidleri* F. Beneschau, im angeschwemmten Gemille, in Klocacz-Geb. in einem verfaulten Stöcke, s. selten.
35. * *Preyslери* Dft. Sommer. In der nächsten Umgegend an Wegen, in trocknen Gräben, unter Moos, im angeschwemmten Gemille, früher z. häufig, jetzt z. selten. Am Utwater einige Ex. unt. Steinen.
36. *coeruleus* Andr. 5. Auf dem Radosch im Klocacz-Geb., 2 Ex. unter Steinen.
37. * *catenulatus* Pz. 5—8. In Kieferwäldern unter Moos und zurückgebliebenen Resten von Waldstreu, bei Hammer, Rauden, Krascheow, z. selten; dagegen bei Kupp s. häufig; hier fing ich im Juli 1844 an 50 Ex. und hätte ihn im Mai 1845 eben so oft fangen können.
38. * *arvensis* F. 5—8. Im Lande mit 37 zusammen, aber auch getrennt; im Geb. z. B. b. Ustron, Möltzsch, Karlsbrunn unter Moos und unter Steinen z. selten. var. *virescens* bei Ustron, 2 Ex.
39. * *cancellatus* Jll. Wie 37 u. 38. z. häufig.
40. * *Ullrichii* Zgl. (*morbillosus* Pz.) 5—9. In der nächsten Umgegend v. R., b. Kupp ic. z. häufig. 1844 wurden hier mit einem umgestürzten Blumennapfe, worunter sich

ein tochter Maulwurf befand, an 40 Ex. gefangen.

41. * *granulatus* L. 5—9. In der nächsten Umgegend z. häufig, seltner im Gebirge.
42. *clathratus* L. 7. Zwischen Dypeln und Kupp unter Waldstreu, jedoch selten.
43. *nodulosus* F. Bei Krascheow im Novb. 1845 in Kiefern- und Eichenstöcken 3 Ex. (v. F.) 7. am Utwater, zwischen Waldenburg und Karlsbrunn, bei Hubertskirchen, am Rande der Gebirgsbäche, z. selten.
44. * *auronitens* F. 5—9. Unter Moos oder Steinen, Ede., Kupp, Grätz (die Nymphe in einem verfaulten Buchenstock), Möltzsch, Ustron, Karlsbrunn, überall z. selten.
45. *nitens* L. Sommer. Adamowitz, Hammer, Budzin, Rybnik (im Kupfbünger), Kupp, Krascheow, Klocacz-Geb., Gesenke, überall selten.
46. * *violaceus* L. 5—10. Unter Moos, Gemille, in faulen Stöcken und Stämmen, Db., Ede., Kupp, Rosenberg, Krascheow, Klocacz-Geb. (im Mai 1839 fing ich auf der Czantori an 30 Ex. in einem verfaulten Buchenstamme), im Gesenke, überall häufig.
- * var. *glabrellus* Zgl., s. selten.
47. * *glabratus* Pk. Wie 46, jedoch seltener.
48. * *nemoralis* Müll. 5—8. Db., Ede., selten; Kupp, Krascheow, mit 37 zusammen und besonders Ende Mai sehr häufig, Karlsbrunn z. selten.
49. * *convexus* F. 5—9. In Gärten, Db., Ede., Kupp, z. häufig; Ustron, Karlsbrunn, z. selten.
50. * *hortensis* L. (*gemmatu*s F.) 5—9. Db., Ede., Beneschau, z. selten; Kupp, mit 37 zusammen, aber mehr im Laubholz unter Spänen ic. s. häufig; Ustron selten.
51. *sylvestris* Hellw. 5—8. Im Klocacz-

- Geb. (Radosch, Czantori) und Gesenke (Alt-
vater), z. selten.
52. *Linnaei* Mgl. 5—9. Bei Krascheow in
Fichtenstöcken im Noobr. 1845 eine Menge
Er. (v. F.). Sonst nur im Gebirge, so-
wohl im Gesenke als im Klocacz-Geb. s.
häufig.
53. * *intricatus* L. 5—8. Bschp., Altvater,
Czantori, unter Steinen, z. selten.
54. *Creutzeri* F. 7. Am Altvater um einen
faulen Stock, 2 Er.
55. *Fabricii* Mgl. 5. Auf dem Radosch, im
Klocacz-Geb., 3 Er.
56. *irregularis* F. 7. Am Altvater, zw. Wal-
denburg und Karlsbrunn, an feuchten Stel-
len um Baumstämme und Stöcke, z. selten.
12. *Calosoma* Web.
57. * *sycophanta* L. Sommer. Db., Hammer,
Randen, Peiskretscham, Kupp, Kraschewo,
bisweilen, namentlich beim Raupenfraß s.
häufig; so half er 1840 in Kupp die Rau-
pen von *Bomb. dispar*, *Noctus piniperda*
u. und vor einigen Jahren bei Peiskret-
scham *Bomb. monacha* vertilgen.
58. * *inquisitor* L. An denselben Orten, aber
seltener, auch häufig unter Moos.
59. *sericeum* F. Rosenberg, in Kartoffelfel-
dern. (Rdschm).
13. *Leistus* Froehl.
60. * *ferrugineus* L. (*spinilabris* F.) 5—8.
Unter Moos, Gemille u., Db., Eble., Ustron,
z. häufig.
61. *rufescens* F. 7. Ustron, s. selten.
62. *analys* F. 7. Karlsbrunn, z. selten.
14. *Nebria* Latr.
63. *livida* L. (*sabulosa* F.) 6. An der Oder,
in den Weidenwickeln, 1 schönes Er.
64. * *picicornis* F. 8. Unter einem Steine am
Rande eines Kornfeldes zw. Altendorf u.
Doms-Höhe, 1 Er., Ustron, 1845 an der
Weichsel, unter Steinen, 20 Er.
65. *brevicollis* F. 6. Eble., unter Steinen, 2
Er., auf dem Radosch im Klocacz-Geb. z.
häufig.
66. *Gyllenhalii* Sch. 7. Karlsbrunn, unter
Steinen an der Kl. Dypa, selten.
- Ann.: Auch soll *N. brunea* Dst. nach Sturm
u. Deutshl. Inf. Fauna III. p. 149
u. in öst. Schlessien gefunden werden.
Mir ist d. Käfer noch nicht vorgekommen.
15. *Omophron* Latr.
67. * *limbatum* F. Sommer. Gegend Abend
an der Oder auf feuchtem Sande, s. selten.
16. *Blethisa* Bon.
68. * *multipunctata* F. Bisweilen im ange-
schwemmten Gemille, z. häufig.
17. *Elaphrus* F.
69. * *uliginosus* F. An der Oder, selten.
70. * *cupreus* Mgl. desgl.
71. * *riparius* F. An der Oder und ähnl. feuch-
ten Stellen, bis ins Gebirge, z. häufig, auch
bei Giesmannsdorf unweit Meise (H.).
72. * *aureus* Müll. desgl.
18. *Noctiophilus* Dum.
73. * *aquaticus* F. 5—8. An der Oder auf
feuchtem Sande, an der Weichsel b. Ustron
unter Steinen, Kupp, unter feuchtem Moos.
74. * *palustris* Dst. desgl., auch bei Lubowitz.
75. * *semipunctatus* F. Db. u., Borutin, Kupp,
Krascheow, Ustron, Karlsbrunn u. unter
Moos und unter Steinen, häufig.
19. *Pangaeus* Latr.
76. * *crux major* F. Im angeschwemmten Ge-
mille oft s. häufig, selten unter Moos.
77. 4-pustulatus St. Den 2./4. 43 b. Brzezie
unter Moos 2 Er.
20. *Loricera* Latr.
78. * *pilicornis* F. Db., an der Oder, Kupp,
Möltzsch, Ustron, Karlsbrunn u. unter
Moos, Steinen, angeschwemmten Gemille
s. häufig.

- 21. Callistus** Bon.
 79. *lunatus* F. Lukasine, Brzezie, Freiwaldau in östr. Schlessien, unter Moos, s. selten.
- 22. Chlaenius** Bon.
 80. *vestitus* F. Im angeschwemmten Gemille, z. selten.
 81.* *Schrankii*, 6–8. Dobra, Kupp, Ustron, unter Moos und Gemille, nicht selten.
 82.* *nigricornis* F. desgleichen.
 83. *holosericeus* F. 6–8. Dobra, unter Moos, s. selten.
 84. *sulcicollis* Pk. 6–8. Beneschau, auf feuchten Wiesen z. selten. (Z.)
- 23. Oodes** Bon.
 85.* *helopioides* F. Im angeschwemmten Gemille bisweilen z. häufig.
- 24. Licinus** Latr.
 86. *depressus* Pk. In Neugarten b. R., am Wege laufend, 1 Ex., (Th.)
 87. *Hoffmannseggii* Pz. 7. An der Mooslehne bei Karlsbrunn (v. U.).
- 25. Badister** Clairv.
 87.* *2-pustulatus* F, 6. An der Oder, Db., Zabrze b. Beuthen, z. selten.
 88.* *peltatus*. An der Oder, z. selten.
 89.* *humeralis* Bon. 6–8. Db., a. d. Oder, selten.
- 26. Patrobus** Mgl.
 90.* *excavatus* Pk. 4–10. Db., a. d. Oder, z. häufig; Ustron an d. Weichsel, Karlsbrunn an d. Oppa, unter Steinen s. häufig.
- 27. Dolichus** Bon.
 91. *flavicornis* F. 6–9. Studzienna, Altdorf, an Getreidesfeldern früher z. häufig, jetzt s. selten. Kommt auch bei Rosenberg vor.
- 28. Pristonychus** Dej.
 92. *terricola* Hb. 7. 8. R. und Zawada, in Kellern und ähnl. Orten, s. selten.
- 29. Calathus** Bon.
 93.* *cisteloides* Ill. 3–10. Db., Escheit, Kupp, Krascheow, Ustron, Karlsbrunn ic. unter Moos, Gemille, Steinen ic. häufig.
- 94.* *fulvipes* Gyll. 5–7. Db., Pw., unter Moos und Gemille, z. selten.
 95.* *fuscus* F. 4–8. Wie 93, auch a. d. Oder.
 96.* *glabripennis* St. 5–8. Adamowitz, Kupp, unter Waldstreu, z. häufig.
 97. *micropterus* Zgl. 5–9. An d. Oder im angeschwemmten Gemille, sonst in schattigen Wäldern unter Moos od. Steinen, Db., Karlsbrunn (Grüßberg, Mooslehne) z. selten.
 98.* *melanocephalus* F. 3–10. Unter Moos, Steinen, Gemille bis ins Geb., überall häufig.
- 30. Taphria** Bon.
 99.* *vivalis* Ill. 5–8. Dobra, Ede., Ustron Karlsbrunn wie 97.
- 31. Sphodrus** Clairv.
 100.* *leucophthalmus* L. 7. 8. R., Zawada, Landsberg, Ustron in Kellern und ähnl. Orten, z. selten. 1843 fand ich ihn in Ustron in einer feuchten Wohnstube (in der Nacht) mit *Blaps mortisaga* in einem heftigen Kampfe.
- 32. Anchomenus** Bon.
 (Platynus Bon.)
 101. *scrobiculatus* F. 7. Ede., s. selten. (Anchomenus Bon.)
 102.* *angusticollis* F. 3–11. Ueberall bis ins Gebirge, s. gemein.
 103.* *prasinus* F. 3–11. Unter Moos, um Baumstämme, im Gemille, unter Steinen ic., bis ins Gebirge, aber besonders a. Dr. D., s. häufig.
 104.* *albipes* F. 5–8. Db., an d. Oder, z. selten, b. Ustron a. d. Weichsel s. häufig. var. *ruficollis* besonders bei Ustron z. häufig.
 105. *oblongus* F. 6. 7. Db., Kupp, s. selten. (Agonum Bon.)
 106.* *marginatus* L. 5–9. Db., an d. Oder, Beneschau ic. im angeschwemmten Gemille

- bisweilen s. häufig; sonst unter Laub und Moos, um Baumwurzeln, z. selten.
107. *austriacus* F. Benschau, nach einer Ueber-
schwemmung einige Ex. unter einer Menge
von 108.
108. *modestus* St. Früher, wo die Oder häufiger
ausgoß, unter Gemille um Sträucher,
besonders auf den ehemaligen Fleischer-
wiesen, s. häufig; jetzt, nachdem letztere zu
Ackerland umgeschaffen worden, s. selten.
Ich habe früher sehr viele Ex. als *Agouum*
austriacum Dft. versandt. Der Unterschied
z. 107 u. 108. dürfte durch Uebergangs-
Ex. s. zweifelhaft werden.
109. * *6-punctatus* L. Ueberall, bis ins Geb.,
s. gemein. Die var. b., mit unrein-bräun-
lichen Flügeldecken ließ ich, als alte, aus-
gefärbte Ex., laufen.
110. * *parumpunctatus* F. Wie 109, auch in
verschiedenen Färbungen.
111. * *elongatus* Dj. 6. Bei Köberwitz an ei-
ner nach Salz schmeckenden Quelle einige Ex.
112. * *viduus* Kug. 5—9. Unter Moos, Ge-
mille, Steinen u. bis ins Gebirge, z. häufig.
113. * *versutus* St. 5—8. Dobra, Pw., unter
Moos, s. selten.
114. *lugens* Zgl. 7. 1845 b. Ustron 2 Ex.
115. * *moestus* Zgl. 5—8. Db., Pw., Ustron,
z. selten.
116. * *micans* Nicol. 5—8. An d. D., z. sel-
ten, Bschp., z. häufig.
117. * *gracilis* St. 5—8. Db., a. d. Db., selten.
118. * *picipes* F. 5—9. Db., Pw., a. d. Dd.,
Seitendorf b. Bensch (v. U.) zuweilen z.
häufig.
119. *pelidnus* Hb. Adamowitz, Landsberg
(Rdsch.), s. selten.
120. * *4-punctatus* De G. 6. 7., Dobra, unter
Moos, s. selten.
33. *Olisthopus* Dej.
121. *rotundatus*, 6. 7. Db., Ede., unter Moos,
s. selten.
34. *Pterostichus* Bon.
(*Poecilus* Bon.)
122. *punctatus* F. Bei Lublinig. (Rdsch.)
123. * *cupreus* L. 3—10. Ueberall bis ins
Geb., in den mannigfaltigsten Abänderun-
gen, woraus sich sehr leicht *affinis* St,
coerulescens F., *splendida* Fald., *ery-*
thropus St., *niger* u. a. Var. bilden las-
sen. Als eigene Art dürfte vielleicht
124. * *versicolor* St. sich herausstellen, biswei-
len unter Steinen, Ziegeln u. um altes
Mauerwerk vorkommend.
125. *dimidiatus* Ol. 6—8. Bschp., Altva-
ter, Gotthausberg b. Friedeberg, unter Stei-
nen, selten.
126. * *lepidus* F. 5—9. Db., Ede., Ratsch,
Kupp, Ustron, Karlsbrunn, z. häufig und
zwar in sehr verschiedenen Färbungen.
127. *striatopunctatus* Mgl. 5—7. fand sich
früher in d. Db. unter Moos z. häufig,
jetzt s. selten.
(*Argutor* Mgl.)
128. * *vernalis* F. 4—7. Db., Ede., Ustron,
Karlsbrunn, unter Moos und Steinen z.
häufig.
119. * *eruditus* Mgl. 4—7. Db., Ede., z. selten.
130. * *rotundicollis* Dft. desgl.
131. * *strenuus* Kug. 4—8. Db., Kupp, Ustron,
z. häufig.
132. * *unctulatus* Latr. 5—8. Db., Karls-
brunn (Mooslehne, Veierberg), selten.
(*Oxaseus* Zgl.)
133. * *leucophthalmus* F. 3—10. R., Kupp,
Ustron, Bsch. Gesenke u. s. gemein.
134. * *nigrita* F. desgl., aber nicht so häufig.
135. * *anthracinus* Ill. desgl., nur noch feltener.

136. * *gracilis* St. 6. 7. Db., auf Wiesen unter angeschwemmten Gemille z. häufig.
137. * *minor* D. 6—8. Db., Kupp, unter Moos, Ustron, unter Steinen, z. selten.
138. * *aterrimus* F. 6—8. Db., Kupp, unt. Moos, Ustron, Altvater, unt. Steinen; z. selten.
(*Steropus* Mgl.)
139. *madidus* F. 6. Ede., f. selten
140. *aethiops* III. 7. Kupp, in einem verfaulten Stocke 1 Ex., Karlsbrunn (Mooslehne) (v. U.)
141. *cordatus* Letz. 7. Ustron, am Wege a. die fl. Czantori, Karlsbrunn (Mooslehne v. U.)
(*Platysma* Bon.)
142. *picimanus* Crtz. Wie 108.
143. *maurus* Dft. 7. Im Klocacz-Geb., selten.
144. *angustatus* Mgl. 7. Kupp, unt. Spännen im Laubwalde, 1844, 2 Ex.
(*Adelosia* Stph.)
145. * *latibulus* St. 7. Ustron, 1839 an 30 Ex., Karlsbrunn 1837 einige Ex., im Walde unter Steinen.
146. * *oblongopunctatus* F. 5—8. Db., Ede., Kupp, Möltzsch, Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und Steinen, z. häufig.
(*Pterostichus* Bon.)
147. * *niger* F. 4—9. Ueberall, bis ins Geb., unter Moos, Steinen u. z. häufig.
148. * *fossulatus* Pr. 4—7. Unter Steinen im Klocacz-Geb. (Nadosch, Lissa, Czantori) und zwar im zeitigen Frühjahr am Fuße der Berge, später nur auf Kuppen und Rämmen derselben.
149. * *metallicus* F. 5—8. Db., Ede., Kupp, Klocacz-Geb., Gesenke, unter Steinen, z. häufig.
(*Abax* Bon.)
150. * *striola* F. 5—8. Db., Ustron, Karlsbrunn, Bschkp., unter Moos und Steinen, häufig.
151. * *carinatus* Dft. 5—7. Db., z. selten, Kupp, mit *Car. catenulatus* Pz. zusammen, z. häufig.
152. * *ovalis* Mgl. Wie 150, außerdem auch bei Kupp.
153. * *parallelus* Dft. desgl.
154. * *Rendschmidtii* Hartlieb. Wurde 1826 zuerst von Rendschmidt und mir nach hohem Wasserstande am Oderufer um eine alte Weide in sehr großer Zahl gefunden. Später fand ich ihn auch hinter Mania unter Moos und Gemille unter Sträuchern. Später, nachdem die Oder das Ufer, wo die Weide stand, weggerissen, schien er ganz verschwunden zu sein, bis ihn vor einigen Jahren Herr Cantor Thomas in der Dobra auffand, wo wir ihn im zeitigen Frühjahr an feuchten Stellen unter Moos, wiewohl sehr selten und nur bei fortgesetztem Nachgraben, bis Ende Mai fanden; später ist er spurlos verschwunden. Herr Oberförster Zebe hat seine Ex. von mir.
(*Molops* Bon.)
155. * *terricola* F. 5—8. Db., Ede., Kupp Rosenberg, Ustron, Möltzsch, Karlsbrunn unter Moos und Steinen, häufig.
35. *Brosicus* Pz.
156. * *cephalotes* F. 5—8. Db., Pshaw, Zawada, Kupp, (f. häufig), Krascheow, b. ins Geb., unter Moos u. Steinen z. häufig.
36. *Stomis* Clairv.
157. * *pumicatus* Hl. 5—7. Dr. Dr., Db., Rakau, unter Moos, um Baumstämme.
37. *Zabrus* Clairv.
158. * *gibbus* F. 7—9. Im Gemille und an Kornähren, nicht selten.
38. *Amara* Bon.
159. *patricia* Dft. Im Gemille, selten.

(Celia Zimm.)

160. *ingenua* Crtz. Unter Ziegeln u. um altes Mauerwerk, an Schütthausen, z. selten.
 161. *monticola* Zimm. 7. Altvater (Rdsch.)
 162. *infima* Dej. 3. Ob. unter Moos (H.).
 163. * *hirsuta* Gyll. 4—8. N. z. selten, Ustron häufiger.
 164. *rufocincta* Manh. 7. Kupp, f. selten.
 (Amara Bon.)
 165. *rufipes* Dej. 6. 7. In Gemille, f. selten.
 166. *tricuspidata* St. desgl.
 167. * *plebeja* Gyll. 4—10. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, z. häufig.
 168. * *similata* Gyll. desgl. weniger häufig.
 169. * *obsoleta* Dj. desgl., bes. an niedrigen Flußufer.
 170. * *eurynota* Kug. 5—9. Ob., Kafau, Kupp, unter Moos, (in Varietäten), z. selten.
 171. * *trivialis* Gyll. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, f. gemein.
 172. * *spretata* Zimm. 6. 7. Ob., Ustron, z. selten.
 173. *vulgaris* L. 7. Ede., Karlsbrunn, f. selten.
 174. *curta* Dj. 7. N. u. Ustron f. selten.
 175. * *communis* F. desgl., aber häufiger.
 176. *puncticollis* (v. Uechtr. Verz. schlf. Käfer Nr. 180) 4. Ob., selten.
 177. *varians* a. Altvater. (Rdsch.) kenne ich nicht.
 178. *montivaga* St. 6. 7. Ob., Paw., selten.
 179. * *familiaris* Crtz. 5—8. Ob., Brzezie, Ustron u. f. häufig.
 180. *gemina* Zimm. 7. Ob., f. selten.
 181. *tibialis* Z. Rauden, Krascheow, unter Moos in Nadelwäldern, selten.
 (Bradytus Stph.)
 182. * *consularis* Dj. 3—6. Ob., an d. Oder, Möltzsch, unter Moos und Laub um Baumstämme, z. selten.
 183. * *apricaria* F. 6—8. Ob., Paw., Bschp., Ustron, z. häufig.

184. * *fulva* De G. 5—6. desgl.

(Leirus Mgl.)

185. * *spinipes* L. (*picea* F.) Um N., Kupp. u. z. selten, häufiger im Vorgebirge, z. B. Bschp. u.39. *Anisodactylus* Dej.186. * *signatus* Jll. 5—8. Ob. unter Moos, a. d. Oder unter Gemille, z. selten.187. * *2-notatus* F. Eben daselbst und auch an andern Orten, häufig.188. * *spurcaticormis* Zgl. Wie 187, ab. seltener189. * *nemorivagus* Dft. Wie 188.40. *Diachromus* Er.190. * *germanus* L. Sommer. N., Zabrze bei Beuthen, Ober-Glogau, unter Gemille u. a. Kornähren, z. selten.41. *Harpalus* Ltr.

(Ophonus Zieg.)

191. *punctatulus* Dft. 6. Dw., 1 Er. unter Laub und Moos.192. * *azureus* F. 5. 6. Dw., Ob., 4 Er., wie 191.193. *puncticollis* Pk. 6. 7. Dw., Borutin, wie 191, f. selten.194. *brevicollis* Dj. 5—7. Dw., Bschp., wie 191, f. selten.

(Harpalus Ltr.)

195. * *ruficornis* F. Sommer. Durch d. ganze Gebiet bis ins Gebirge, häufig.196. * *griseus* Pz. 4—8. N., Klocacz = Geb. Gesenke, Bschp. selten; b. Kupp z. häufig.197. * *aeneus* F. Wie 123 und fast in eben so viel Varietäten.198. * *distinguendus* Dft. 4—8. Ob., Paw., unter Moos, selten.199. *honestus* Andr. Wie 198, f. selten.200. * *discoideus* F. 5—7. Ob., Dirschel, unter Moos, selten.201. *ferrugineus* F. 5—7. Kuchelna, Krascheow, unter Spänen, f. selten.

202. *hottentotta* Dft. var. *ped. ferrugineis*.
7. Uftron 1 Cr.

203. *fulvipes* F. 5—9. Db., an der Oder,
Kupp, Bschp., Uftron, Karlsbrunn, unter
Moos, Gemille, Steinen u., z. häufig.

204. ** luteipennis* Dft. 5—8. Db., Kupp,
Bschp. wie 203, selten.

205. ** satyrus* Kn. 5—8. Db., Ede., Uftron,
Karlsbrunn (Mooslehne), wie 203, selten.

206. ** rubripes* Cetz. 6—8. Db., Kupp, Bschp.,
wie 203, selten.

207. *hirtipes* Jll. 6. Db., unt. Laub, f. selten.

208. ** impiger* Mgl. 4—8. Db. an d. Oder,
Kupp, z. selten.

209. ** tardus* Jll. 4—8. Dora, an d. Oder,
Bschp., z. selten.

210. *rugulosus* Heer. 7. Altvater (v. U.)

211. *serripes* Crtz. 6. Ede., 2 Cr.

212. *anxius* Dft. 6. 7. Db., unter Laub und
Moos, f. selten.

213. *servus* Crtz. 5. An d. Oder, unter an-
geschwemmten Gemille, f. selten.

214. ** picipennis* Mgl. 6. Ede., Bschp., unter
Steinen, f. selten.

42. *Stenolophus* Mgl.

215. ** vaporariorum* F. 4—7. Db. unt. Moos,
wo er überwintert, an d. Oder unter Ge-
mille, z. selten.

216. *consputus* Dft. 6. An d. Oder, f. selten.

217. ** dorsalis* F. 4—10. Db., an d. Oder,
Uftron an d. Weichsel, häufig.

218. ** suturalis* Zgl. Den 10. Debr. 1845, Db.,
unter Moos und Heidekraut, f. selten (Th.)

219. *brunnipes* St. 5. Dw., unt. Moos, f. selten.

220. ** meridianus* L. 4—10. R. u. Umgegend,
auch b. Uftron, f. häufig.

221. *flavicollis* St. 6. Db., Kupp, unter Moos,
f. selten.

222. *exiguus* Dj. 6. Db. unt. Laub, f. selten.

43. *Brandycellus* Er.

223. ** collaris* Pk. 5—10. Db., Rakau, Bo-
rutin, Kupp, unt. Moos, z. häufig.

224. *sciapus* Grm. 7. Kupp, unter Moos im
Nadelwalde, f. selten.

44. *Trechus* Clairv.

225. ** discus* F. 5—7. R. um alte Weiden,
f. selten.

226. ** micros* Hb. 7. Uftron, unter Steinen
an d. Weichsel, z. häufig.

227. *littoralis* Zgl. 7. desgl., aber selten.

228. *paludosus* Gyll. 6. Db., unt. Laub, f. selten.

229. *minutus* F. 5—9. Db., Paw., Rakau u.
f. häufig.

230. *obtusus* Er. 6. 7. Db., Uftron, selten;
Karlsbrunn (Janowitzer Heide) häufiger.

var. *alpinus* b. Karlsbrunn (v. U.)

230. *palpalis* Dft. 6. 7. Rakau, Uftron, Alt-
vater, selten.

232. *rotundipennis* Dft. 7. Karlsbrunn an
d. fl. Dypa, selten.

233. ** secalis* Pk. 6—8f Db., an d. D., Uftron,
Karlsbrunn, z. häufig.

var. *alpestris* a. Altvater (v. U.)

45. *Bembidium* Latr.

(*Blemus* Zgl.)

234. ** areolatum* Crtz. 7. Uftron, an der
Weichsel unter Steinen, z. häufig.

(*Tachys* Mgl.)

235. *2-striatum* Mgl. } 7. Uftron, a. d. Weichsel
236. *rufescens* Hflmg. } unt. Steinen u. ange-
237. *5-striatum* Gyll. } schwemmten Gemille,
f. selten.

238. *nanum* Gyll. 6. Db., f. selten (H.)

239. ** 4-signatum* Crtz. 7. Wie 235—237.

240. *pulicarium* Dj. 5. 6. Dr. D., um Baum-
stämme, f. selten.

(*Notaphus* Mgl.)

241. ** undulatum* St. 4—8. An d. D., häufig.

242. ** ustulatum* L. desgl., auch a. d. Weich-
sel b. Uftron.

243. * *obliquum* St. desgl.
 244. * *fumigatum* Crtz. U. denselben Orten,
 aber s. selten.
 (Bembidium in spec.)
 245. * *paludosum* Pz. 5. 6. U. d. Oder, z. selten.
 246. * *striatum* F. desgl.
 247. * *foraminosum* Mgl. desgl.
 248. * *aerosum* Er. 5. 7. U. d. Oder, Bene-
 schau u. u. an Teichrändern, s. häufig.
 249. * *2-punctatum* L. Rakau, s. selten; Ustron
 a. d. Weichsel z. häufig.
 (Peryphus Mgl.)
 250. * *tricolor* F. 6. 7. Ustron a. d. Weichsel
 s. häufig, an d. Dissa und am Prudnik b.
 Wildgrund unter der Bischoffkoppe weniger
 häufig.
 251. * *modestum* F. 5—8 U. d. Oder und a.
 d. Weichsel b. Ustron z. häufig; b. Plesß
 (Hartlieb).
 252. * *lunulatum* And. 5—8. U. d. Oder, selten.
 253. * *Andreae* F. 5—8. U. d. Oder, in Wäl-
 dern unter Moos u. u. a. d. Weichsel u.
 a. Orten s. häufig.
 254. *fluviale* Dj. Bei Borutin (Z).
 255. * *femoratum* Dj. Wie 253.
 256. * *saxatile* Gyll. 7. Ustron a. d. Weichsel,
 häufig.
 257. *prasinum* Mgl. 5. U. d. Oder, s. selten.
 258. * *fasciolatum* Mgl. 5—8. Ustron, a. d.
 Weichsel häufig, var: sehr in Färbung,
 Größe u. wodurch sich einige besonders
 auszeichnen.
 259. *coeruleum* Dj. 7. Ustron a. d. Weichsel,
 Karlsbrunn a. d. Kl. Oppa, selten.
 260. *complanatum* Heer. 7. U. d. Kl. Oppa
 b. Karlsbrunn. (v. U.)
 261. * *tibiale* Mgl. 7. U. d. Weichsel b. Ustron,
 z. selten.
 262. * *decorum* Zenk. 7. Mit 261, und a.
 d. Kl. Oppa b. Karlsbrunn, z. häufig.
 263. *distinctum* Dj. }
 264. *fulvipes* St. } Wie 261., s. selten.
 265. *fuscicornis* Dj. }
 266. *rufipes* Jll. 5. Db. unter Moos, 7. wie
 261., selten; auch var: *palpalis*.
 267. *Heerii* v. Uechtr. (*rufipes* Heer.) Ustron,
 s. selten.
 268. * *albipes* St. 7. U. d. Weichsel b. Ustron,
 z. selten.
 (Leja Mgl.)
 269. * *pygmaeum* F. 4—8. U. d. Oder, Ro-
 senberg, a. d. Weichsel b. Ustron, z. häufig.
 270. * *velox* Er. 4—8. U. d. Oder, Ustron,
 Wiedergrün b. Karlsbrunn, z. häufig.
 271. * *celere* F. 3—10. Wie 269, und unter
 Moos u. an andern Orten, s. häufig.
 272. * *pusillum* Gyll. 5—8. U. d. Oder, z.
 häufig.
 273. * *tenellum* Er. 5—7. Db. unter Moos,
 Dr. D. um Baumstämme, a. d. Oder,
 bisweilen z. häufig.
 274. *Doris* Jll. Db., unter Moos, Rosenberg
 (Rdsch.), s. selten.
 275. *affimile* Gyll. Db., unter Moos, s. selten.
 276. *obtusum* Dj. 5—8. Db., Kupp, unter
 Moos, Ustron a. d. Weichsel, s. selten.
 277. * *guttula* F. 5—8. Db., Str., unter
 Moos, z. selten.
 278. * *2-guttatum* F. 9. Bei Lubowig, Gr.
 Peterwig, Ustron, unter feuchtem Moos,
 selten.
 (Lopha Mgl.)
 279. * *4-guttatum* F. 6—8. U. d. Oder, z.
 häufig.
 280. *4-pustulatum* F. desgl., aber s. selten.
 281. * *4-maculatum* L. 5—9. U. d. Oder,
 Db., Borutin, z. häufig.
 282. * *articulatum* Pz. 5. 6. U. d. Oder,
 häufig.

(Tachypus Mgl.)

- 283.* *caraboides* Ol. (*picipes* Mgl.) b. U. d. Ober selten, häufiger a. d. Weichsel b. Ustron.
 284.* *pallipes* Mgl. desgl.
 285.* *flavipes* L. 5-9. U. d. Ober z. häufig.

2. Hydrocantharida.

1. Halipus. Latr.

1. *obliquus* F. Grabowka, am Teichrande, s. selten.
 2. *fulvus* F. Neugarten, s. selten.
 3* *ruficollis* De G. Neugarten, Ehnst. z. selten.
 4. *impressus* F. Grabowka, Zawade, Ehnst. s. selten.
 5. *fluviatilis* Aub. Grabowka, Borutin, selten.
 Anm.: Sie wurden alle mit Lemnaarten aufgeschöpft.

2. Cnemidotus Ill.

6. *caesus* Dft. Neugarten, wie d. vorigen.

3. Cybister Curtis.

7. *Roeselii* F. Ehnst., Beneschau, früher s. häufig; Rosenberg (Rdsch.)

4. Dytiscus L.

8. *latissimus* L. Ehnst., Adamowiz, selten.
 9.* *marginalis* L. In fast allen stehenden, oder doch wenig Abfluß habenden Gewässern d. Umgegend häufig. Einzelne Ex. an trocknen Stellen, z. B. in der Dora, in der Stadt, wohin sie sich versflogen hatten.
 10. *dubius* Gyll. (v. Weber bestimmt) Adamowiz, s. selten.
 11. *circumcinctus* Ahr. Wie 8.
 12. *circumflexus* F. desgl.
 13. *conformis* Kze. In der Lache am Dr. D., Beneschau, selten.
 14. *dimidiatus* Brgst. Grabowka, selten.

5. Acillus Lench.

- 15.* *sulcatus* L. Babiz, Rauden, Dr. D., Adamowiz u. häufig.
 16. *canaliculatus* Kn. Adamowiz, Babiz selten.

6. Hydaticus Bach.

- 17.* *transversalis* F. R.-Hammer, Adamowiz, Beneschau, z. häufig.
 18.* *Hübneri* F. desgl., jedoch seltener.
 19.* *stagnalis* F. Wie 18.
 20.* *cinereus* L. Adamowiz, Beneschau, s. selten.
 21. *bilineatus* De G. desgl.
 22. *austriacus* Dj. Beneschau (Z.) z. selten.

7. Colymbetes Clairv.

- 23.* *fuscus* L. Dr. D. (im zeitigen Frühjahr, bei noch nicht vollständig aufgethauem Eise einige u. 20 Ex.; einige saßen an den in der Nähe stehenden Linden; Rauden u. z. häufig.
 24. *striatus* L. (Boegmanni Gyll.) Am Dr. D., im Fluge 2 Ex.
 25. *pulverosus* Kn. Adamowiz, selten.
 26.* *notatus* F. Adamowiz, Bojanow, Beneschau, häufig.
 27. *collaris* Pk. Babiz, Grabowka, Beneschau, z. selten.
 28.* *adpersus* F. desgl. aber häufiger.
 29.* *Grapii* Gyll. Babiz, Adamowiz, R.-Hammer, Lufasine, Tworkau, Beneschau, häufig.

8. Ilybius Er.

30. *ater* De G. Ehnst., Beneschau, selten.
 31.* *4-guttatus* Dj. Babiz, selten.
 32. *fenestratus* F. desgl.
 33.* *subaeneus* Er. desgl.
 34. *guttiger* Gyll. Rauden, 2 Ex.
 35.* *fuliginosus* F. Babiz, Adamowiz, Brzezie, Rosenberg, z. häufig.

9. *Agabus* Leach.

36. * *agilis* F. Neugarten, Lukafine, mit Lemna-Arten geschöpft, z. selten.
 37. * *uliginosus* L. Babitz, Beneschau, z. selten.
 38. * *femoralis* Pk. Adamowiz, f. selten.
 39. *congener* Pk. Beneschau (Z.) f. selten.
 40. *maculatus* L. Neugarten, Brzezie, Adamowiz, z. selten.
 41. * *abbreviatus* F. desgl., z. häufig.
 42. * *guttatus* Pk. Brzezie, Ustron, Gesenke, z. selten.
 43. *silesiacus* n. sp. Gesenke. (Uebers. 1843 p. 170.)
 44. *affinis* Pk. Neugarten, f. selten.
 45. * *2-pustulatus* L. Babitz, Adamowiz, Rupp, häufig.

10. *Noterus* Clairv.

46. * *crassicornis* Müll. Ehnst., Neugarten, mit Lemna-Arten geschöpft, z. häufig.

11. *Lacophilus* Leach.

47. * *hyalinus* De G. } Mit Lemna-Arten ge-
 48. * *minutus* F. } } schöpft, z. selten.

12. *Hyphydrus* M.

49. * *ferrugineus* L. Im angeschwemmten Gemille, z. selten.

13. *Hydroporus* Clairv.

50. *reticulatus* F. Neugarten, f. selten.
 51. * *decoratus* Gyll. Neugarten, Adamowiz, selten.
 52. *geminus* F. Wie 51, auch b. Zawade und Beneschau.
 53. *unistriatus* Schrk. desgl.
 54. *alternans* Grv. Im angeschwemmten Gemille.
 55. * *picipes* F. Neugarten, z. häufig.
 56. *ovatus* St. Borutin (Z) selten.
 57. * *palustris* L. Neugarten, z. selten.
 58. *lituratus* F. Neugarten, Borutin, selten.
 59. * *planus* F. Neugarten, z. häufig.
 60. * *piceus* St. Adamowiz, Nauden, z. selten.

61. * *lienatus* F. Neugarten, selten.

62. * *2-lineatus* St. Adamowiz, Zawade, Beneschau, z. selten.

63. *pictus* F. Neugarten, f. selten.

14. *Gyrinus* Geoff.

64. * *natator* L. Ueberall, gemein.
 65. * *mergus* Ahr. Fast eben so häufig, indes mehr in Gewässern sandiger Gegenden.
 66. *bicolor* Pk. Budzin, f. selten.
 67. *minutus* F. Markowiz, in Gesellschaft von 64, jedoch nur einige Ex.

15. *Oreochilus* Er.

68. * *villosus* F. Bei R. 1836 in der Zinna, bei abgelassenem Wasser, auf dem Schlamm, in ungeheurer Menge; Ustron a. d. Weichsel unter Steinen z. selten. Er scheint anderweit selten zu sein, denn ich habe von 60—70 Ex. alle vertauscht bis auf 6.

3. *Brachelytra*.1. *Myrmedonia* Er.

1. * *canaliculata* Pk. 3—10. Unt. M., Gem., St., um Bmst., auch in Gesellschaft von Ameisen, bis ins Geb., hfg.
 2. * *limbata* Pk. 3—10. Ob., a. d. Oder, unt. M., Gem., besonders mit *F. flava* zusammen, z. stn.
 3. * *humeralis* Gr. 3—9. S. d. Colonien v. *F. fuliginosa* u. *rufa*, hfg.
 4. * *cognata* Mrkl. Brzezie, wie 3., f. stn.
 5. * *funesta* Gr. Wie 3, besonders um alte Weiden, nicht stn.
 6. * *laticollis* Mkl. Wie 5.
 7. * *lugens* Gr. Wie 5, jedoch mehr i. Spätherbst.
 8. *Howorthi* Steph. Frühj., a. d. Oder, unt. Gem., f. stn. (Th.)
 9. *collaris* Gr. 8. 9. Brz. W., unt. Laub, f. stn.

- 2. Autalia** Leach.
10. *impressa* Ol. Borutin (Z.) f. stn.
11. *riularis* Gr. 7. Ustron, i. Kuhdgr., f. stn.
- 3. Falagria** Leach.
12. * *sulcata* Pr. 4—9. Im Kuhdgr., unt. faulem Kartoffelkraute, bisweilen f. hfg.
13. * *thoracica* Curt. 4—8. Db., unt. M., Eb., auch um alte Mauern, f. stn.
14. * *obscura* Gr. 4—70. Db., Pw., Str., wie 13, hfg.
15. * *nigra* Gr. Wie 14.
- 4. Helitochara** Mhm.
16. * *lunulata* Pk. 4—10. Db., Pw., Ede., um Pilze, f. hfg.
17. *obliqua* Er. 7. Ustron, i. Baumschwämmen, f. stn.
- 5. Ocalea** Er.
18. *badia* Er. Frühj. u. Herbst. Db., unt. M. u. Heidekraut, f. stn.
- 6. Colodera** Mhm.
19. *nigricollis* Pk. Frühj., unt. Eb., f. stn. (Th.)
20. * *forticornis* Boisd. Frühj., i. Roth, hfg. (Th.)
21. *nigrita* Mhm. Frühj., Db., Dr. D., um Bmst., stn.
22. * *rubicunda* Er. 4—7. U. d. Oder, Ustron a. d. Weichsel, unt. feuchtem Eb., f. stn.
- 7. Taehyusa** Er.
23. * *constricta* Er. 5—8. U. d. Oder, auf Schlamm, f. hfg.
24. * *coarctata* Er. desgl., f. hfg.
25. *scitula* Er. Unt. M., f. stn. (Th.)
26. * *immunita* Er. 5—8. Db., Pw., unt. M., mit Homaloten zusammen, stn.
27. * *atra* Gr. 5—8. In Gärten, auf Schlamm, stn.
28. *umbratica* Er. desgl. (Th.)
29. *lata* v. Kwtr. 5—7. U. d. Oder, auf Schlamm, f. hfg. (Th.)
- 8. Phloeopora** Er.
30. *corticalis* Gr. 6. 7. R., unt. Rinde a. einem Pfahle, Leobschläger Stadtwald unt. Eichenrinde, f. stn. (Th.)
- 9. Homalota** Mhm.
31. * *graminicola* Gr. Frühj. unt. nassem Eb., später auf Bl., f. stn.
32. *umbonata* Er. Mit *F. fuliginosa* zus., f. stn. (Th.)
33. *nitidula* Mkl. i. litt. Wie 32.
34. * *pavens* Er. 6. 7. U. d. Oder, a. d. Weichsel, f. stn.
35. *languida* Er. 7. Ustron, i. Gem., f. stn.
36. *gracilis* Riehl i. litt. R., unt. M., f. stn. (Th.)
37. *labilis* Er. 5—7. An Teichrändern, auf Schlamm, f. stn.
38. * *velata* Er. desgl.
39. *luteipes* Er. R., unter Eb., f. stn. (Th.)
40. * *elongatula* Gr. 3—10. Unt. M., Gem., Dgr. u., überall gemein.
41. * *angustula* Gyll. 3—10. Um faule Bmst., f. stn.
42. *aequata* Er. Db., an einem mit Pilzen bewachsenen Stocke, f. stn. (Th.)
43. * *cuspidata* Er. Im Octbr. 1845 unt. d. Rinde alter Weiden a. d. Straße nach d. Lukasine, f. hfg. (Th.)
44. * *circellaris* Gr. Wie 40, auch unt. *F. fuliginosa*.
45. *depressa* Gr. 6. An Ufern, f. stn.
46. * *socialis* P. Wie 40, aber auch i. Pilzen u. unter Ameisen.
47. *sodalis* Er. Db., unt. M. (H.)
48. *ochracea* Er. 10. Ede., in Pilzen, stn.
49. * *analis* Gr. Wie 47, im Geb. f. b. Ustron, stn.
50. *exilis* Er. U. d. Oder, auf Schlamm, f. stn. (Th.)

51. * *palleola* Er. 5—8. Db., Pw., Ustron, i. Pilzen, z. stn.

52. * *inquinula* Gr. Herbst. Db., auch a. andern Orten, i. Kuhdgr., z. stn.

53. * *cauta* Er. N., Ustron, wie 52.

54. *celata* Er. Herbst, wie 52. (Th.)

55. * *sordidula* Er. Wie 52.

56. *ripicola* v. Kwitr. 5. Auf Schlamm, z. stn.

57. * *livida* Er. 6—9. Pw., Kupp, Ustron, i. Kuhdgr., hfg.

58. * *longicornis* Gr. Wie 46.

59. * *fungi* Gr. 6—10. Unt. M., Eb., besonders i. Pilzen, f. hfg.

60. * *vernacula* Er. 5—10. Unt. Eb., M. u. hfg.

61. * *orphana* Er. desgl., auch unter Ameisen.

62. * *aterrima* Gr. 5—10. Db., Pw., Kupp, Ustron, unt. Eb., M. u. hfg.

10. *Oxygona* Mhm.

63. *ruficornis* Er. 6. Db. Unt. F. *fuliginosa*, f. stn. (Th.)

64. * *luteipennis* Er. 5—8. Pw., Stw., Pw. u. unter faulem Eb., z. hfg.

65. * *vittata* Mkl. 5—10. Wie 63.

66. * *opaca* Gr. 4—10. Db., Pw., Stw., Kupp, Ustron, unt. M., Eb., Ameisen, i. Pilzen, f. hfg.

67. * *alterans* Gr. 7—10. Stw., Db., Kupp u. wie 64.

68. *abdominalis* Mhm. Db., unt. M. (H.)

69. *helveola* Er. 8. 9. U. d. Ober, unt. Eb., Gem., auch um Bmst., stn.

70. *ferruginea* Er. Im Frühj. u. Herbst unt. Linden, stn. (Th.)

71. * *cuniculina* Er. 5—8. N. u. Ustron, i. Nestern d. F. *fuliginosa*, hfg.

72. *exigua* Er. 6. 7. U. d. Ober, Kupp, unt. nassem Eb. u. Gem., z. stn.

73. *fumida* Er. 7. Ustron, in Schwämmen, f. stn. (Th.)

11. *Aleochara* Gr.

74. * *fuscipes* F. Sommer. Im Roth, z. hfg.

75. *rufipes* Er. 5—7. Db., Pw., Ustron, i. Gem., z. stn.

76. *tristis* Gr. 4—7. Im Kuhdgr., f. selten.

77. * *2-punctata* Gr. 5—9. Db., Pw., Ustron, unt. M., i. Kuhdgr., hfg.

78. *brevipennis* Gr. Im Kuhdgr. stn.

79. *fumata* Gr. Kupp, Leobschlüßer Stadtw., i. Pilzen, z. selten.

80. *2-signata* Er. 5—8. Unt. M., f. stn.

81. * *nitida* Gr. Sommer, wie 77.

82. * *lanuginosa* Gr. desgl.

83. *moesta* Gr. 5—7. Db., Ustron, unt. M., Gem., z. stn.

84. *erythroptera* Gr. 5. Pw., unt. M., f. stn. (Th.)

85. *gentilis* Lün. Frühj., unt. M., um Bmst., stn.

86. *morion* Gr. 5—7. Db., Ustron, unt. M. u. Ameisen, i. Kuhdgr., stn.

87. *angulata* Er. Db., Ede., unt. F. rufa, f. stn.

88. *praeusta* Er. Unt. Eb., f. stn. (Th.)

89. *inquilina* Mkl. Db. unt. F. *fuliginosa*, f. stn. (Th.)

12. *Oligota* Mhm.

90. *pusillima* Gr. Db., unt. faulem Eb., f. stn.

13. *Gyrophana* Mhm.

91. * *nana* Pk. In Pilzen, überall f. hfg.

92. *affinis* Sbg. desgl. (hinter d. Schießhaufe) stn.

93. * *congrua* Er. Wie 91.

94. *lucidula* Er. Db., i. Pilzen, stn. (Th.)

95. *manca* Er. 6. 7. In Baumschwämmen, N. stn., Ustron z. hfg.

Anm.: Wahrscheinl. auch *polita* Gr.

96. * *boleti* L. 7. Ustron, i. Baumschwämmen an Fichtenstöcken, z. hfg.
97. *minima* Er. Im Frühj. in Pilzen, f. stn. (Th.)
- 14. Lomechusa Gr.**
98. *emarginata* Pk. Db., unt. M. (H.)
- 15. Silusa Er.**
99. *rubiginosa* Er. Unt. M., um Bmst., stn.
100. *rubra* Er. Db., i. Pilzen, f. stn. (Th.)
- 16. Pronomea Er.**
101. * *rostrata* Er. 6—8. Db., unt. M., Eb. u. z. hfg.
- 17. Myllaena Er.**
102. *gracilis* Heer (*graminicollis* v. Kwtr.) Ustron, a. d. Weichsel, f. stn. (Th.)
103. *intermedia* Er. desgl.
- 18. Hypocryptus Schüpp.**
104. * *longicornis* Pk. Herbst. Pw., Db., Wiesen, unt. M., Gras u. z. hfg.
- 19. Conurus Steph.**
105. *littoreus* L. 6. 7. Db., Ustron, i. faulen Bmstöcken, stn.
106. * *pubescens* Gr. 6—10. Db., Pw., Ustron, um Bmstöcke, unt. Eb., i. Gem., z. hfg.
107. *testaceus* F. 8. Pw., unt. M. u. Eb., stn. Ich halte diesen Käfer für eine eigene Art und nicht für var. v. 106.
108. *fuscus* Gr. 6—8. Db., Pw., unt. Eb., um Bmst. u. z. stn.
109. * *pedicularius* Gr. 5—8. Db., Pw., Stw., Brzw., Lubowik, a. d. Oder, unt. nassem Eb., u. z. hfg.
110. *2-punctatus* Gr. R., unt. Bmrinde. (Th.) Würbenthal (v. U.) stn.
- 20. Tachyporus Gr.**
111. * *obtusus* L. Frühj. bis Herbst, unt. M., Gem. u. f. hfg.
112. * *hypnorum* F. desgl.
113. * *chrysomelinus* L. desgl., jedoch seltener.
114. * *solutus* Er. 5—7. Pw., Ustron, unt. Eb. u. M., stn.
115. * *humerosus* Kn. 6. U. d. Oder, unt. feuchtem Eb., z. stn.
116. * *ruficollis* Gr. 10. Ebke., um Pilze, stn.
117. * *pusillus* Gr. 6—9. Db., Stw., a. d. Oder, Ustron, unt. Eb., M. u. Gem., nicht stn.
118. * *scitulus* Er. 3—8. Db., Ustron, wie 117, z. stn.
119. * *brunneus* F. 3—10. Db., a. d. Oder, wie 100, z. hfg., auch unter Ameisen, bes. *F. fuliginosa*. Uebrigens scheint sich das ganze Gen. mit Ameisen sehr gut zu vertragen, denn ich fand die obigen Spec. sehr hfg. mit der einen oder andern Art der gewöhnl. Ameisen zusammen.
- 21. Tachynus Gr.**
120. *silphoides* L. 6—8. Db., Pw., Beob-schük, i. Dgr., stn.
121. * *rufipes* De G. 3—7. In faulem M., Eb. u. nicht stn.
122. * *flavipes* F. desgl.
123. * *humeralis* Gr. 5—7. Db. u. a. Orten, i. Koth u. auf Bl. hfg.
124. *marginellus* Gr. Db., unt. M. (H.)
125. * *limetarius* Gr. 5—9. Db., Ehnst., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, meist i. Dgr. u. i. Pilzen, hfg.
126. * *collaris* Gr. Wie 125, aber seltener.
- 22. Boletobius Leach.**
127. *analis* Pk. 6. Pw., um Pilze, f. stn.
128. *formosus* Gr. Frühj., Stw., unt. Eb., f. stn.
129. *cernuus* Gr. desgl.
130. *rufus* Fsch. 7. Ustron, unt. Gem., f. stn.
131. *striatus* Ol. (var.) Db., unt. Eb., f. stn. (Th.)
132. * *atricapillus* F. 5—10. Db., Pw., Stw., Ebke., um u. i. Pilzen, f. stn.

133. *lunulatus* L. 6. Stw., Pw., i. Pilzen, f. stn.
134. *exoletus* Er. 7. Leobsch. Stw. f. stn. (Th.)
- 135.* *pygmaeus* F. 5—10. In Pilzen, überall, gemein.
23. *Mycetoporus* Mhm.
- 136.* *longulus* Mhm. 5—8. Unt. M., bes. i. Nadelwalde, z. hfg.
137. *lepidus* Gr. 5—8. Db., Kupp, unt. trockenem M., mit Ameisen zus., z. selten.
138. *pronus* Er. 8. Um Bmst., wie 137.
139. *nanus* Gyll. 8. Pw., unt. M., f. stn.
140. *splendidus* Gr. desgl.
24. *Othius* Leach.
- 141.* *fulvipennis* F. Frühj., Db., unt. M., stn.
142. *melanocephalus* Gr. 6. 7. Db., Kupp, unt. M., stn.
143. *pilicornis* Pk. 6. 7. Db., Kupp, Ustron, unt. M. und Gem., stn. var: *fusco-rufescens*, f. stn.
144. *myrmecophilus* v. Kwtt. 6. Db., unt. M. mit Ameisen zus., f. stn.
145. *gracilis* (v. U.), Db. (H.)
25. *Xantholinus* Dahl.
146. *elongatus* Gr. Db. (H.)
147. *lentus* Gr. desgl.
- 148.* *punctulatus* Pk. 3—10. Db., a. d. 1. Dber Ustron, unt. Amsn., M. u. Gem., z. hfg. var: *ochraceus* Gyll. stn. (dürfte doch wohl eine eigene Art sein.)
- 149.* *tricolor* F. 5—10. Db., Ustron, Karlsbrunn, (Grüßeberg,) unt. M., um faule Stöcke u., z. hfg.
- 150.* *linearis* Ol. desgl., f. hfg.
26. *Leptacinus* Er.
151. *batychnus* Kn. 6. Db., unt. M., stn.
27. *Staphilinus* L.
152. *hirtus* L. Sommer. Adamowig, Borutin, i. Dgr., stn.
- 153.* *maxillosus* L. 4—10. Im Dgr., überall, gemein.
- 154.* *nebulosus* F. 4—10. Unt. M., Eb., i. Dgr., hfg.
- 155.* *murinus* L. desgl.
- 156.* *pubescens* De G. R., Kupp, Ustron, wie 154, f. stn.
157. *fossor* Scop. Frühj., i. Gem., f. stn.
- 158.* *erythropterus* L. Wie 154.
159. *caesareus* Cedh. Im Dgr., stn. var: *flavicornis* Zgl. f. stn.
160. *stercorarius* Ol. Im Dgr., f. stn.
28. *Ocypus* Kirby.
161. *olens* Mllr. 6. Bschp., unt. St., z. hfg.; Zawade, i. Kas (Z).
162. *cyaneus* Pk. R., Borutin, unt. Gem., stn.
163. *macrocephalus* Gr. 7. Ustron, unt. Gem., stn.
164. *alpestris* Er. 7. Ustron, a. Wege n. d. fl. Czantori, unt. St., f. stn.
- 165.* *similis* F. 4—10. Db., Dw., Kupp u. unt. M., z. hfg.
- 166.* *fuscatus* Gr. 6. 7. Db., Ustron, Karlsbrunn, z. stn.
167. *picipennis* F. 6. Adamowig, i. Dgr., f. stn.
168. *cupreus* Rossi. 6. 7. R., Ustron, i. Gem., f. stn.
- 169.* *morio* Gr. Frühj., Db., unt. M., stn.
29. *Philontus* Leach.
- 170.* *splendens* F. 5—7. Db., Rudnik, unt. M. u. Gem., z. stn.
171. *laevicollis* St. U. d. Dber, unt. Gem., f. stn.
172. *intermedius* Boisd. Frühj., wie 171.
173. *laminatus* Crtz. 4—7. U. d. Dber, unt. Sträuchern, Karlsbrunn, stn.
174. *nitidus* F. 5. Db., unt. M., f. stn.
175. *carbonarius* Gyll. 5—7. R., i. Dgr., stn.
- 176.* *aeneus* Rossi. 3—10. R., Ustron, Karlsbrunn, unt. M., Eb., i. Dgr., Kas u., hfg.
177. *scutatus* Er. U. d. Dber, f. stn.
- 178.* *atratus* Gr. 5—8. Db., a. d. Dber, Karlsbrunn, a. Schlaß, i. Kas, feuchtem M., z. stn. var: *coerulescens*, f. stn.

179. * decorus Gr. 5—9. Wie 176. wenig. hfg.
 180. lucens Mhm. 6. Altendorf, i. Mas, stn.
 181. * politus F. Wie 179.
 182. * marginatus F. 7. 8. Db., Uftron, i. Kuhdgr.
 stn.
 183. umbratilis Gr. 6. Pw., i. Dgr., f. stn.
 184. * varius Gyll. 5—10. Db., Pw., a. d.
 Dder, Uftron, unt. M., stn.
 185. 2-maculatus Gr. 6. Pw., unt. M., stn.
 186. * albipes Gr. 6. 7. Db., Kupp, Uftron, i.
 Gem., stn.
 187. cephalotes Gr. 8. Pw., i. Dgr., f. stn.
 188. fimetarius Gr. 5—8. Pw., Giesmanns-
 dorf b. Neisse, i. Dgr., stn.
 189. sordidus Gr. Wie 187.
 190. fascus Gr. R. (H.)
 191. * ebeninus Gr. 4—10. Db., Pw., Kupp,
 Uftron, unt. M. u. Gem., hfg.
 192. * corvinus Er. desgl.
 193. fumigatus Ndm. R. f. stn.
 194. corruscus Gr. R., i. Koth, f. stn. (Th.)
 195. * sanguinolentus Gr. Wie 191.
 196. 2-pustulatus Pz. 6. 7. An d. Dder, a. d.
 Weichsel, stn.
 197. * varians Pk. 5—8. R., Kupp, Uftron,
 in Dgr., hfg.
 198. * opacus Gr. (auch in Variet.) Wie 197.
 199. debilis Gr. 8. Pw., unt. Eb., stn.
 200. ventralis Gr. desgl.
 201. discoideus Gr. desgl.
 202. rubidus Er. desgl.
 203. quisquiliarius Gyll. Wie 197, ab. stn.
 204. * vernalis Gr. 3—6. Db., unt. Ms., 3 hfg.
 205. * splendidulus Gr. Wie 197.
 206. * micans Gr. 6. Db., unt. M., 3. stn.
 207. * fulvipes F. 6. 7. An d. Dder, an dem
 Weichsel, 3. hfg.
 208. * tenuis F. 5—8. An d. Dder, Db., unt.
 Eb. und Gemille, 3. selten.
 209. pullus Ndm. 6. 7. Borutin, Uftron, im
 Gemille, stn.
 210. rubripennis Gr. 7. An d. Dder, Uftron,
 im Gemille, stn.
 211. * aterrimus Gr. 3—10. Ueberall, gem.
 212. punctus Gr. 6. Db., unt. M., f. stn.
 213. procerulus Gr. Giesmannsdorf b. Neisse (H.).
 214. elongatulus Er. 8. Pw., unt. Eb. u. M.,
 f. selten.
 30. **Heterothops** Kirby.
 215. dissimilis Gr. 6. 7. An d. Dder, Kupp,
 3. selten.
 216. 4-punctatus Gr. 6. Db., unt. M., f. stn.
 217. nitens Ndm. Lukasine, unt. Eb., f. stn.
 (Th.)
 31. **Queilus** Leach.
 218. fulgidus F. 6—8. Db., Zaupiz b. Neisse,
 stn.
 219. cruentus Ol. Db., unt. M., f. stn. (Th.)
 220. xanthopus Er. 6. 7. An d. Dder, an d.
 Weichsel, im Gem., 3. stn.
 221. impressus Pz. An d. Dder, im Gemille,
 stn. (Th.)
 222. * brevis Er. 6. 7. Db., Uftron, unt. F.
 fuliginosa, 1 Gr. in d. Nestern d. F. rufa,
 3. stn.
 223. molochinus Gr. Db., unt. M., f. stn. (Th.)
 224. * fuliginosus Gr. 6—8. Db., a. d. Dder,
 unter nassem Laub u., 3. selten.
 225. picipes Mhm. 9. Db., um Pilze, stn.
 226. *fimbriatus* Er. 7. Uftron, auf d. Egan-
 tori, unt. Tannenrinde, f. stn. (Th.)
 227. umbrinus Er. Db., unt. nassem Eb., stn.
 (Th.)
 228. boops Gr. desgl.
 32. **Earyporus** Er.
 229. picipes Mrsh. Frühj., Db., unt. M., f.
 stn. (Th.)
 33. **Oxyporus** F.
 230. * rufus L. 5—10. Db., Lofe., i. Pilz., hfg.

231. maxillosus F. 6. Ebke., in Pilzen, stln.

34. *Cryptobium* Mhm.

232.* *fracticorne* Mhm. 6. 7. Db., a. d. Dber,
a. d. Weichsel, im Gemille, z. stln.

35. *Achenium* Leach.

233. *depressum* Gr. 6. Db., unt. M., stln.

36. *Lathrobium* Gr.

234. *brunnipes* F. Db., an der Dber, Babitz,
Leobschütz, im Gem., unt. M., stln.

235.* *elongatum* L. 5—8. Db., an d. Dber,
an d. Weichsel, Karlsbrunn, hfg.

236.* *fulvipenne* Gyll. desgl.

237. *multipunctatum* Gr. Unt. Ziegeln a. d.
Salzniederlage, f. stln. (Th.)

238. *quadratum* Gyll. Db., unt. M., f. stln.

239. *punctatum* Zett. desgl.

240. *filiforme* Gr. Gzenskowitzger Jägerhaus (H.).

241. *pallidum* Ndm. An d. Dber, Lukasine,
unt. nassem Eb., f. selten. (Th.)

242. *dilutum* Er. Desgl.

243.* *longulum* Gr. 6—8. Db., an d. Dber,
unt. Ameisen, nicht selten.

244. *scabricolle* Er. Brzezie, auf einer An-
höhe, unt. M. u. Steinen, 2 Er.

37. *scopaenus* Er.

245. *laevigatus* Gyll. Frühj., unt. Eb. i. Acker-
furchen a. sonnigen Waldrändern, i. Rhogr.,
f. stln.

246.* *minutus* Er. Desgl.

38. *Lithocharis* Dj.

247. *brunnea* Er. 6. U. d. Dber, i. Gem., f. stln.

248.* *melanocephala* F. Frühj., desgl., auch
um alte Gebäude ic.

249. *obsoleta* Ndm. 8. Pw., im Dgr., f. stln.

39. *stillicus* Latr.

250. *fragilis* Ltr. Stln.

251.* *rufipes* Mllr. Hfg.

252.* *similis* Er. Hfg.

253.* *geniculatus* Ahr. Stln.

254.* *affinis* Er. Hfg.

255. *orbiculatus* Pk. Stln. (Th.)

Im zeitg. Frühj.
u. i. Herbst an
sonnigen Wald-
rändern unt. M.
Eb. ic., nicht stln.
in Gesellschaft v.
Ameisen; Brze-
zie, Db., Pw.
u. a. Orten.

40. *Sonius* Leach.

256. *filiformis* Ltr. Wie 245.

257. *intermedius* Dj. U. d. Dber, f. stln. (Th.)

258.* *angustatus* Pk. 6—8. U. d. Dber, Db.,
Pw., Brzezie, a. sonnigen Stellen unt. M.,
z. hfg.

41. *Paederus* Gr.

259.* *litteralis* Gr. 4—10. U. d. Dber, Db.,
a. d. Weichsel, Karlsbrunn, unter Moos,
Gem. ic. z. hfg.

260.* *longipennis* Dhl. desgl., aber hfg. in
der Ebene.

261.* *riparius* L. Wie 259, aber seltener.

262.* *ruficollis* F. 5—8. Ustron, a. d. Weich-
sel, hfg.

42. *Dianous* Leach.

263. *coerulescens* Gyll. 7. Ustron, a. d. Weich-
sel, im Gemille, überaus selten.

43. *Stenus* Latr.

264.* *2-guttatus* F. 4—10. Ueberall gemein,
besonders auf schlammigem Boden.

265.* *2-punctatus* Krb. Desgl., weniger hfg.,
und mehr an trocknen Orten.

266.* *2-maculatus* Gyll. 5—8. Db. ic. unt.
M., z. häufig.

267. *stigmula* Er. Frühj., um alte Bmst., stln.

268. *Juno* F. Db., unt. M., z. stln.

269.* *ater* Mhm. 5—11. Db., Brzezie, Ustron,
nicht häufig.

270. *carbonarius* Gyll. Frühj., im Dgr., stln.

271.* *buphthalmus* Schrk. R., Zauditz, i. Dgr.,
z. häufig.

272. *morio* Kn. Frühj. unt. Sträuchern, stln.

273.* *speculator* Kn. 3—10. Db., Pw., Brz.,
an der Dber, z. häufig.

274.* *providus* Er. Desgl.

275. *Argus* Kn. 7. Ustron im Gem., z. stln.

276.* *fuscipes* Gr. 5—10. R., Kupp, Ustron,
unt. Moos, z. häufig.

277.* *humilis* Er. Desgl.

278. * *circularis* Gr. Desgl.
 279. *declaratus* Tisch. 6—8. Db., Giesmannsdorf, Uftron, stn.
 280. *campestris* Er. 6—8. Db., Zaudig, stn.
 281. *unicolor* Er. Db., unt. M., selten.
 282. *subimpressus* Kn. Db. (H.)
 283. * *plantaris* Er. 5—8. Pw., i. Dgr., z. stn.
 284. *impressus* Tisch. 3—6. Pw., Brz. W., unter Sträuchern, z. stn.
 285. * *pallipes* Gr. 3—6. Stw., Db., an der Oder, unter Gemille, z. selten.
 286. * *tarsalis* Lj. 5—10. Db., an der Oder, Uftron, im Gemille, z. häufig.
 287. * *oculatus* Gr. desgl., auch bei Zaudig.
 288. * *cicindeloides* Schall. desgl.
44. *Euaesthetus* Kn.
 289. *scaber* Kn. Frühj., Db., unter M., um Eichen, i. einem Garten um Pappeln, f. stn.
45. *Bledius* Leach.
 290. * *3-cornis* Hb. 4—8. Db., Uftron, unter Moos und Gem., z. stn.
 291. *fracticornis* Pk. 5. Db., unt. M., f. stn.
 292. *longulus* Er. 6. 7. An der Oder, an der Weichsel, unt. Gemille, selten.
 293. *dissimilis* Er. U. d. Oder, auf Schlamm, f. stn. (Th.)
 294. *rufipennis* Er. 6—8. An der Oder, unter Gemille, selten.
 295. * *crassicollis* Boisd. Desgl.
 296. *opacus* Block. Wie 293.
 297. *nanus* Er. Desgl.
 298. * *subterraneus* Er. Wie 294.
46. *Platystethus* Mhm.
 299. * *morsistans* Pk. 3—10. Im Dgr., M. ic., gemein.
 300. * *cornutus* Gr. Desgl.
 301. * *nodifrons* Sbg. An ähnl. Orten, ab. stn.
47. *Oxytelus* Gr.
 302. * *rugosus* F. 3—10. Im Dgr., Roth, unter M. u. Gem., bis ins Geb., hfg.
 303. * *insecatus* Gr. Wie 302, etwas seltener.
 304. * *piceus* L. Wie 302.
305. * *sculptus* Kn. 5—8. Db., Brz., im Dgr., selten.
 306. *sculpturatus* Er. desgl., f. selten.
 307. * *nitidulus* Gr. 13—10. Im Dgr., um Dün-
 308. * *depressus* Gr. Gerhaus. Schwärmend, f. hfg.
48. *Phleonaeus* Er.
 309. * *caelatus* Gr. Wie 302.
 310. *caesus* Er. Im Dgr., selten.
49. *Trogophloeus* Mhm.
 311. *dilatatus* Er. 4—6. An der Oder, an d. Weichsel, im Gem., z. selten.
 312. * *2-lineatus* Stph. 4—6. An der Oder, auf Schlamm, nicht selten.
 313. *obesus* v. Kittw. desgl., f. selten.
 314. *riparius* Boisd. 5—8. R., Kupp, i. Dgr., Naß, selten.
315. *elongatulus* Er. desgl.
 316. *fuliginosus* Gr. 5—8. Desgl.
 317. * *corticinus* Gr. 5—8. Um Bmst. f. stn.
 318. * *inquilius* Er. Desgl.
 319. *pusillus* Gr. Auf Schlamm, f. stn. (Th.)
 320. *tenellus* Er. Wie 317.
50. *Coprophilus* Ltr.
 321. *striatulus* F. Unt. Eb., Gem., f. selten.
51. *Acrognathus* Er.
 322. *mandibularis* Gyll. Von Bl. geschöpft, f. selten. (Th.)
52. *Deleaster* Er.
 323. *dichrous* Gr. 7. Uftron, a. d. Weichsel, i. Gem., stn.
53. *Phloeocharis* Mhm.
 424. *subtilissima* Mhm. Unt. M., um Bmst., selten.
54. *Anthophagus* Gr.
 325. * *armiger* Gr. 6. Pw., Bschp, unt. M., auf Bl., z. stn.
 326. *caraboides* L. 5—8. Pw., Dw., Karlsbrunn, desgl.
 327. * *abbreviatus* F. desgl.
 328. *plagiatus* F. Bschp. desgl.
 * *var. nigrita* Mllr. Uftron, desgl.
 329. *melanocephalus* Heer. 7. Karlsbrunn; unt. Bl. (v. U.)

330. * *bicolor* F. 5. 6. An der Oder, Bschfp., unter nassem Laube, z. selten.
331. *punctata* Er. An der Oder, unt. nassem Laube, f. selten (Th.)
56. *Arpedium* Er.
332. *quadrum* Gr. Von Bl. geschöpft, f. selten.
57. *Acidota* Leach.
333. *crenata* F. Unt. nassem. Lb., f. stln. (Th.)
334. *cruentata* Mhm. Unter Moos, selten.
58. *Olophrum* Er.
335. * *piceum* Gyll. 6. Dobra unter Moos, Bschfp., von Bl. geschöpft, selten.
336. *fuscum* Gr. 6. Brzegie (H.)
337. * *assimile* Pk. 4-7. Db., Pw., an der Oder, unter Moos, seltener.
59. *Lathrimacum* Er.
338. * *athrocephalum* Gyll. 4-8. Brz. W., Db., Giesmannsdorf, auf Jarrenkraut, z. stln.
60. *Omalium* Gr.
339. * *rivulare* Pk. 5-10. R., unt. Weidenrinde; Ldke, Giesmannsdorf, unter Moos, nicht stln.
340. *fossulatum* Er. Unt. feuchtem Moos, f. stln. (Th.)
341. * *caesum* Gr. 4-9. Stw., Brz., Paw., Lubowitz, unter Moos, z. selten.
342. * *pusillum* Gr. 6. 7. An der Oder, an d. Weichsel, auch unter Kieferrinde, selten.
343. * *florale* Pk. 5-7. Dobra, Bschfp., von Bl. geschöpft, z. stln.
344. *brunneum* Pk. Lhst. unter Eichen, f. selten (Th.)
345. * *lucidum* Er. 6. Unt. Weidenrinde, stln.
346. *deplanatum* Gyll. An Bäumen, unter Rinde, f. selten.
347. *concinnum* Mrsh. desgl.
348. *planum* Pk. desgl., auch im Leobschützger Stw., f. selten.
349. *luridum* Gyll. Im Herbst, in Baumschwämmen, f. selten.

61. *Anthobium* Leach.
350. *florale* Pk. Db, auf Bl., f. stln.
351. *semicoleopratum* R. 6. Bschfp., auf Bl., z. hfg.
352. * *limbatum* Er. desgl.
353. * *sorbi* Gyll. 6. 7. Grätz, Ustron, Karlsbrunn, auf Bl., bes. Sp. *Aruncus* f. hfg.
354. *abdominalis* Gr. Bschf., Ustron, wie 353, f. selten.
355. * *minutum* E. Db., Wiesen, Karlsbrunn, unter Bl., hfg.
356. * *longipenne* Er. Wie 353.

62. *Proteinus* Latr.

357. * *brachypterus* F. 8-10. Dobra, Ldke., unter Moos, z. selten.
358. *macropterus* Gyll. desgl.
359. * *atomarius* Er. 5-10. desgl. unter M. um Eichen, um Dgr. im Fluge, z. hfg.
63. *Megarhirus* Kby.
360. *depressus* Pk. Db., im Kuhdgr., f. stln.
361. *marginicollis* Er. desgl.
362. * *hemipterus* Jll. Db., Kupp, Leobschütz, in Pilzen, z. hfg.

64. *Micropeplus* Latr.

363. *porcatus* Pk. 6. Im Dgr., auf Kleefeldern, f. selten.

IV. *Sternoxa*.1. *Melanophila* Eschs. (Phaenops Mgl.)

1. *cyanea* F. (*tarda* F.) Kupp, an Kfst., stl.

2. *Buprestis* L.

2. * *Mariana* L. 6-8. Adamowitz, Rauden, Rosenberg, Krascheow, Kupp, an Klaftern und liegenden Kieferstämmen. (Als Larve in alten Kieferstöcken, tief ins Holz gehend Kb.)

3. *Ancylocheira* Eschs.

3. *rustica* L. Pless, Krascheow, Kupp, an Klaftern, auf Bl., z. stln.
4. *punctata* F. Rauden, Borutin, an Klaftern, selten.

5. *8-guttata* L. 7. Rybnik, Rosenberg, Krascheow, Kupp, um 10—15jährige Kiefern und Kieferholz schwärmend, selten.
4. *Eurythyrea* Serv.
6. *austriaca* F. (*Quercus* Hb.) 6—9. N., im Fluge u. 1 Er. i. Quarta, Rosenberg.
5. *Dicera* Eschs.
7. *berolinensis* F. 6—8. N., Kupp, Krascheow, an sonnigen Stellen, s. selten.
- var. *Alni* Mgl. 6. Db. an Erlenklästern z. hfg., aber seit 6 Jahren nicht wieder.
8. *aenea* L. N., im Fluge, Krascheow, stln.
6. *Lampra* Mgl.
9. *rutilans* F. 6—8. N., im Fluge, Kupp, a. einem Zaune, s. selten.
7. *Chrysobothrys* Eschs.
- 10.* *chrysostigma* L. 7. N., Kupp, an Eichenklästern und liegenden Eichen, z. selten.
8. *Agrilus* Mgl.
11. *2-guttatus* F. 6. Kupp, an Eichenklästern oder liegenden Stämmen, s. stln. (Kb.)
12. *sinuatus* Ol. 6. Borutin, Zworfau, im Fluge, s. selten.
13. *viridis* L. 6. 7. Adamowiz, Krascheow, s. selten.
14. *cyanescens* Jll. (*cyaneus* Ol.) 7. Ustron, auf Sp. *Aruncus*, selten, Karlsbrunn, auf *Lonicera nigra*, nicht selten.
15. *angustulus* Jll. 6. 7. Krascheow, Falkenberg, Kupp, wie 11.
16. *pratensis* Rtzbg. 6. Adamowiz, Kupp, auf Bl., z. selten.
- 17.* *tenuis* Rtzbg. 6—8. Krzizanowiz (aus Pfählen erzogen, (Z.), Kupp, Krascheow, Falkenberg, Ustron, wie 11 u. a. Bl., z. hfg.
18. *nocivus* Rtzbg. Falkenberg (Rds).
19. *fagi* Rtzbg. Kupp, Falkenberg, Larve in Rothbuchen, stln.
9. *Coraeus* De Lap.
- 20.* *elatus* F. 6. Adamowiz, an sandigen Stellen, auf Bl., z. hfg.
10. *Anthaxia* Eschs.
21. *nitidula* L. 6. Mit 20 zus., aber s. stln.
22. *4-punctata* L. 6—10. Auf Bl. überall hfg. Die Larven fand Kb. in 10—15j. Kiefern zwischen Bast und Splint.
11. *Trachys* F.
23. *minuta* L. 5—9. Auf Bl., überall, bis ins Geb., hfg.
24. *nana* Pk. Borutin (Z.).
12. *Aphanisticus* Latr.
25. *pusillus* Ol. 5. Auf Bl., s. selten.
13. *Synaptus* Eschs.
- 26.* *filiformis* F. 8—10. Im Gem., unt. M., s. hfg.
14. *Cratonychus* De.
27. *niger* F. N., Krascheow, Kupp, stln.
- 28.* *castanipes* Pk. Db., Ede, Ustron, Würbenthal, auf Bl., besonders auf Sp. *Aruncus*, Sorb. *Aucuparia*, z. hfg.
15. *Adelocera* Latr.
29. *fasciata* L. Ustwater, Uebersf. 1840, p. 81.
30. *varia* Ol. 7. Karlsbrunn, an Stöcken unt. der Rinde, stln.
16. *Lacon* De Lap.
- 31.* *murinus* L. Im Gem., auf Kieferholz u. bis ins Geb., hfg.
17. *Athous* Kschs.
32. *rufus* F. Dypeln auf der Polkoinfel, s. stln. (v. F.)
33. *undulatus* Pk. 7. Ustron, an einer Buche, 1 schönes Er.
- 34.* *scrutator* Hb. Auf Bl, nicht stln.
- 35.* *hirtus* Hb. Auf Bl., im Gem., um Bmst., bis ins Geb., Karlsbrunn, z. hfg.
36. *mutabilis* M. B. Wie 35, seltener.
- 37.* *longicollis* F. Desgl.
- 38.* *haemorrhoidalis* F. desgl. s. hfg.
39. *fuscipennis* St. Vereinzelt unter 38.
- 40.* *vittatus* F. Db., Pw., Dw., auf Bl., im Gem., z. hfg.

41.* *subfuscus* Gyll. Wie 40, auch b. Ustron auf Spierst., Karlsbrunn auf Myrrhis *hirsuta* (v. U.).

42. *obscurus* Sch. Karlsbrunn (v. U.)

18. *Campylus* F.

43. *denticollis* F. 7. Ustron a. Stöcken, Karlsbrunn, an frischen Klästern, Schloßberg v. Johannisberg bei Jauernik, s. selten.

44. *mesomelas* L. 7. Db., Ede, Ustron, Karlsbrunn, s. selten.

19. *Limonius* Eschs.

45. *cylindricus* Pk. Ustron, Karlsbrunn, s. stn.

46.* *nigripes* Gyll. Auf Holzplätzen, im Gem., bis ins Geb., hfg.

47. *mus* Kn. Db., unt. M., s. stn.

48. *serraticornis* Pk. Pw., Ustron, Karlsbrunn, auf Bl., s. stn.

49. *minutus* L. desgl.

50. *lythrodes* Grm. Db., unter Moos, s. stn.

51.* *bructeri* F. 6. 7. Kupp, Bschp., um Bmst., nicht hfg.

52. *2-pustulatus* L. Desgl.

53. *ruficornis* Ahr. 6. Pw., unter Moos, um Bmst., s. selten.

20. *Cardiophorus* Eschs.

54. *thoracicus* F. Unt. Gem., bisweilen z. hfg.

55.* *equiseti* Hb. An Teichrändern z. hfg.

21. *Ampedus*.

56.* *sanguineus* L. Db., Pw., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, Falkenberg, an Klästern, auf Bl. u., z. hfg.

57. *ephippium* F. Db., an Klästern, s. stn.

58. *praeustus* F. desgl., auch bei Karlsbrunn.

59.* *crocatus* Zgl. Auf Holzplätzen, auch bei Grottkau, z. stn.

60.* *elongatulus* F. desgl. auch b. Karlsbrunn.

61.* *balteatus* L. desgl.

62. *aethiops* Frhl. Ustron, Karlsbrunn, s. stn.

63. *nigrinus* Hb. Db., Pw., s. selten.

22. *Cryptohypnus* Eschs.

64. *4-pustulatus* F. 7. Ustron, a. d. Weichsel, unter Steinen, hfg.

65.* *lapidicola* Wstr. 7—9. An der Oder, an der Weichsel, unter St., s. hfg.

23. *Drasterius* Eschs.

66. *2-maculatus* F. 7. Ustron, an der Weichsel, s. stn.

67.* *pulchellus* L. Db., unt. M. u. Gem., s. stn.

24. *Ludius* Ltr.

68. *ferrugineus* L. Doppeln auf der Polkoinfel, Kupp, s. stn.

25. *Corymbites* Latr.

69. *signatus* Pz. Ustron 1 Gr., Sätzdorf bei Freivalde, Ueberf. 1844 p. 69.

70.* *haematodes* F. Zawade, Ustron, nicht hfg.; sitzt gern an den jungen Blättern, auch auf d. Bl. von *Sorb. Aucup.* u. *Samb. racemosa.*

71.* *aeruginosus* F. Db., Ede, s. stn.; Bschp., Karlsbrunn auf Blättern und Bl., s. hfg.

72. *cupreus* F. Beneschau, (Z).

73. *Heyerii* Sax. 7. Karlsbrunn (v. U.).

74.* *pectinicornis* L. Wie 71.

75.* *castaneus* L. Dvora, Beneschau, Bschp. Ustron, selten.

76.* *tesselatus* L. Unter Gemille, auf Holzplätzen, bis ins Gebirge, hfg.

77.* *assimilis* Gyll. Wie 76, aber stn.

26. *Diacanthus* Ltr.

78.* *holosericeus* F. Dvora, Rakau, Kupp u., bis ins Geb., im Gem., um Bmst., hfg.

79.* *metallicus* Pk. desgl., aber selten.

80. *cruciatus* F. Dvora, Kupp, Krascheow, Kessel im Gesenke, z. stn.

81.* *latus*. Wie 78.

82. *melancholicus* F. Karlsbrunn (v. U.)

83. *longulus* Gyll. Pw., auf Bl., s. stn.

84.* *aenus* L. Ueberall, gemein.

27. *Agriotes* Etchs.

85. *pilosus* F. Dvora, Borutin, z. stn.

86. * *gilvellus* Zgl. Auf Bl., bes. im Geb., hfg.
 87. * *lineatus* L. (*segetis* Gyll. *striatus* F.)
 Im Gemille, auch bei Karlsbrunn, z. hfg.
 88. * *obscurus* L. (*variabilis* F.) Ueberall bis
 ins Gebirge, hfg.
 89. * *sputator* L. Desgl.

28. *Sericosomus* Serv.

90. *brunneus* F. Db., Ldke., Bschf., Ustron, stt.
 91. *fugax* F. Desgl.
 92. *sulvipennis* Dj. In der Oberr., vor einigen
 Jahren eine zieml. Anzahl, später nicht wieder.

29. *Delopius* Mgl.

93. * *marginatus* L. Auf Bl., überall, hfg.

30. *Ectinus* Eschs.

94. * *aterrimus* L. Kupp, auf *Salix cinerea*,
 häufig.

31. *Adrastus* Mg.

95. * *limbatus* F. Auf Bl., im Gemille, bis
 ins Geb. hfg.

U n g e h a n g .

96. *Elater hirticollis* Ueberf. 1829 } habe ich
 p. 53. } nicht
 97. *Elater undatus*, Ueberf. 1840 } aufgefunden
 p. 81. } den

V. Malacodermata.

1. *Dascillus* Latr. (*Atopa* Pk.)

1. *cervinus* L. 7. Ustron, auf *Sp. Aruncus*,
 Karlsbrunn, auf *Carduus personatus*, sttn.
 2. * *cinereus* F. 7. Ustron, wie 1, Karlsbrunn
 auf *Cnicus oleraceus*, z. sttn. Nach mei-
 ner wiederholten Beobachtung sind 1 und
 2 nicht m. u. f. sondern eigene Arten.

2. *Elodes* Latr. (*Cyphon* Pk.)

3. * *pallida* F. 6—8. Pw., Ustron, auf Bl.,
 z. hfg.
 4. *livida* F. 6. Pw., auf Bl., f. sttn.
 5. * *grisea* F. 6. Pw., Ustron, Karlsbrunn,
 Bschf., auf Bl., bes. *Sp. Aruncus*, hfg.
 6. *pubescens* F. Wie 4.
 7. *padi* L. Db., wie 4.

8. *coarctatus* Pk. Db. Wie 4.

9. *deflexicollis* Mllr. 6. 7. Db., Ustron, wie 5.

10. * *rufilabris* Mgl. 6. Pw., auf Bl., sttn.

11. *badia* Mg. 5. 6. Db., auf Bl., f. sttn.

3. *Scyrtes* Ill.

12. * *hemisphaericus* F. R., Kupp, auf Bl.,
 Frühj. unter Moos, z. hfg.

4. *Lygistorus* Dej.

13. * *sanguineus* F. 5—8. Db., Ldke., Bschf.,
 Ustron, Gesenke auf Bl., bes. Spiräen, f. hfg.

5. *Dyctyopterus* Latr.

14. * *Aurora* F. 6—8. Db., Ustron, Karlsbrunn
 (Grüzeberg), wie 13, jed. f. sttn.

15. *affinis* Pk. 7. 8. Karlsbrunn, auf *Myrr-*
his arom., sttn. (v. U.)

16. *minutus* F. 7. Gesenke (Glasberg) auf
 Dolden, 3 Er.

6. *Homalium* Geoff.

17. *suturalis* F. 7. Ustron und im Ges., unt.
 Rinde an alten Stöcken, z. stt.

7. *Lampyrus* L.

18. *noctiluca* L. Fast überall und bekannt un-
 ter dem Namen „Johanniswürmchen.“

19. *splendidula* L. Weniger hfg., mehr i. Geb.,
 ist größer und bes. das Weibchen dunkler.

8. *Podabrus* Fisch.

20. *alpinus* Pk. 7. Ustron und im Ges., auf
 21. *rubens* F. 7. Bl., aber f. sttn.

9. *Telephorus* De G. (*Cantharis* F.)

22. * *anticus* Mack. 6—9. Auf Blumen, bes.
 in Gärten.

23. * *fuscus* L. desgl., f. gemein, bis ins Geb.

24. * *varipes* Dj. Wie 22.

25. *dispar*. Wie 22, aber f. selten, auch bei
 Borutin und bei Karlsbrunn.

26. * *pellucidus* F. Wie 24, auch b. Karlsbrunn.

26. *tristis* F. Karlsbrunn a. Vacc. Myrt. (v. U.)

28. * *nigricans* Mllr. Auf Bl., an Klästern,
 bis ins Geb., hfg.

29. *nigripes* Rubch. Im Ges. (Neoslehne,
 Grüzeberg) auf *Abies exelsa* Lam. (v. U.)

30. * *obscurus* L. Wie 28. R., Kupp, Karls-
 brunn u.

31. *lateralis* L. Dora, auf Bl., auch trocken
Bmst., stn.
32. *thoracicus* Ol. Desgl., aber f. stn., vielleicht
nur var. von 33.
33. ^z *fulvicollis* F. 5—10. R., Kupp, Ustron,
auf Bl., hfg.
34. *denticollis* Sch. Ueberf. 1843, p. 193 u.
1844, p. 71.
35. *flavilabris* Fall. Wie 33, aber stn.
36. ^{*} *lividus* F. Auf Bl., überall z. hfg.
37. ^{*} *rufus* L. Desgl.
38. *bicolor* F. Borutin, Karlsbrunn, auf Myrrh.
arom., stn.
39. *praeustus* Dj. R., hinter d. Schloß (H.).
40. ^z *melanurus* F. Ueberall, bis ins Geb., hfg.
41. *pilosus* Pk. Im Gesenke, auch bei Ustron,
aber f. selten.
42. *rufo-testaceus* n. sp. Ueberf. 1844 p. 72.
43. ^{*} *fuscicornis* Ol. Wie 40.
44. *assimilis* Pk. Db., Ede., Borutin, z. stn.
45. *nigricornis* Mgl. 6. Dora, an trocknen
Baumstämmen, 2 Cr.
46. *lituratus* Fall. Bei Karlsbrunn, Moos-
lehne. (v. U.)
47. ^{*} *fulvipennis* Grm. 5. Ustron, an der Weich-
sel, auf Steinen umher kriechend, z. hfg.
48. ^z *testaceus* L. Wie 40.
49. *melanocerus* Sch. Ueberf. 1843 p. 193
und 1844 p. 71.
50. *pallidus* F. Um Ratibor, z. stn.
51. ? *pallipes* F. Desgl.
52. *barbarus* F. Ede., vor Jahren einige Cr.
53. *ater* L. Landeck und bei Ustron, f. stn.
54. *paludosus* Gyll. An sumpfigen Stellen
am Ustrater auf *Hierac. paludosum* (v. U.)
55. ^{*} *rufilabris* Oesk. 6. Dora, Bschf., z. stn.
10. *silis* Mgl.
56. *nitidula* F. } s-s. Rudnik, Pw., Borutin, a.
(*spinicollis* Mgl.) } Dolden, stn.; Karlsbrunn, a.
Myrrhis arom. (v. U.)
57. *ruficollis* F. 5. Pawlauer-Wald, stn.

11. *Malthinus* Ltr.

58. ^{*} *flaveolus* Hb. 6—8. Rudnik, Kupp, auf
Bl., stn.
59. ^{*} *2-guttatus* L. 6—8. Dora, Rudnik,
Kupp, auf Bl., stn.
60. *sanguinicollis* Fall. Wie 59, z. hfg.
61. ^{*} *ustulatus* Ullr. Desgl.
62. ^{*} *marginatus* Ltr. Desgl., auch bei Ustron.
63. *fuscescens* St. i. litt. Auf Bl., f. stn.
64. *obscurus* Ullr. Desgl.
65. *brevicollis* Pk. 6. Pawlauer-Wald, f. stn.
12. *Malachius* F.
66. ^z *aeneus* L. } Sommer. Auf verschie-
67. ^z *2-puslutatus* L. } denen Bl., an Kornäh-
68. ^z *viridis* F. } ren u., Ratibor, Kupp,
69. ^z *marginellus* F. } bis ins Vorgebirge, hfg.;
70. ^z *pulicarius* F. } seltener 69.

13. *Anthocomus* Er.

71. ^{*} *equestris* F. } Wie die *Malachius*-Arten.
72. ^{*} *fasciatus* L. }

14. *Ebaeus* Er.

73. *thoracicus* F. Sommer, Rudnik an Bl.,
f. stn.
74. *praeustus* F. Desgl.
75. *flavipes* F. (*ochraceus* W. Mus.) Dora,
an einem Baumstamm, f. stn.
15. *Charopus* Er.
76. ^z *graminicola* And. 6—8. Dora, Pw.,
Kupp, an Bl. auch unter Moos, um
Baumstämme, nicht stn.
77. *angulatus* F. Desgleichen, aber f. stn.

16. *Dasytes* Pk.

78. *ater* F. 7. Ustron, auf Sp. *Aruncus*, 2 Cr.
79. ^{*} *floralis* Gyll. 6—8. Ratibor, Bischofs-
koppe, auf Bl., nicht stn.
80. *femoralis* Jll. 7. Wie 76, 6 Cr.
81. ^z *nigricornis* F. 5—8. Ratibor, Kupp, auf
Bl., nicht stn.
82. *coeruleus* F. 7. Wie 80.
83. *fuscus* Jll. 6. Dora, unter Moos, um
Baumstämme, f. stn.

- 84.* *niger* F. 5—8. Ratibor, Kupp, Bischofskoppe, an Bl., nicht stn.
 85.* *flavipes* F. Wie 82, hfg.
 86. *plumbeus* St. 5—8. Dvora, Krascheow, Schloßberg bei Johannsberg, f. stn.
 87.* *linearis* F. 6. 7. Adamowitz, Grätz bei Troppau, Zelašno bei Dppeln, stn.
 88.* *pallipes* Ill. Wie 82, hfg.

VI. Xylotrogi.

1. *Tillus* Ol.

1. *elongatus* L. 7. Karlsbrunn, an alten Stöcken, 2 Gr.

2. *Opilio* Latr. (*Notoxus* F.)

2. *mollis* L. R., an trockenem Holze ic., 3. stn.

3. *Trichodes* F.

- 3.* *apiarius* L. Sommer, an Bl., überall, hfg.
 4. *cyanellus* And. 6—8. Dvora, Krascheow, an Klaftern, stn.

4. *Clerus* Geoffr.

- 5.* *mutillarius* F. 6—8. Adamowitz, stn; Falkenberg, die Larve zerstört die Brut der *Hylesinen* (Rd.); Kupp, an Eichenklaftern, 20 Gr. (Kb.)

- 6.* *formicarius* L. 5—8. Ratibor, Kupp, Krascheow, Falkenberg, Karlsbrunn, Ustron, an Nadelholz-Klaffern, hfg. Entschiedener Feind der Bostrichen. (Rd.)

5. *Corynetes* Hb.

- 7.* *violaceus* L. Ratibor, unter Moos und Rinde, an Baumstämmen, 3. hfg.
 8. *pygmaeus* (v. Ullr. best.) Wie 7, aber f. stn.
 9. *ruficollis* F. Wie 7, f. stn.

6. *Lymexylon* F.

10. *navale* L. 6—7. Rauden in alten Stöcken; Falkenberg in halb abgestorbenen Birken; Kupp, 1842 in alten Eichenstöcken; bisweilen hfg.

7. *Hylecoetus* Latr.

- 11.* *dermestoides* L. 6—8. Schillersdorf,

Krascheow, Ustron, Zuckmantel, in Tannenstöcken; Falkenberg, wie 10.

8. *Ptilinus* Geoff.

12. *pectinicornis* L. Schillersdorf, Krascheow, Falkenberg, an alten Stöcken, nicht stn.
 13. *costatus* Gyll. desgl., und bei Kupp an alten anbrüchigen Weiden, wo ihn d. Bohrlöcher verrathen, hfg. (Kb.)

9. *Xyletinus* Latr.

14. *pectinatus* F. Unt. Rinde, f. stn.

10. *Ochina* Zgl.

15. *carpini* Hb. Kuchelna, Falkenberg, Kupp, an schadhafsten Stellen der Weißbuchen, auch auf Kst. a. d. Bohrlöchern sitzend, 3. stn.

11. *Anobium* F.

- 16.* *tesselatum* F. R., Kupp, in anbrüchigen Eichen, Weißbuchen, alten Häusern ic. an den Bohrlöchern sitzend, nicht selten.

- 17.* *pertinax* L. R., Kupp, Falkenberg, in altem Holze, 3. hfg.

- 18.* *rufipes* F. R., Krascheow, Kupp, desgl. besonders in alten Apfelbäumen.

19. *nitidum* F. Grätz bei Troppau (Z.),

- 20.* *striatum* Ol. R., Kupp, Ustron, Karlsbrunn, in altem Holze. Stöcken ic., hfg.

21. *emarginatum* Mgl. R., Kupp, Falkenberg, in alten Fichten; Käfer und Larve scheint nur in und unter der Rinde zu leben; starker Harzausfluß verräth sein Dasein.

22. *pini* Er. Falkenberg (Rd.); Kupp, in 10—15j. Kiefern, a. d. Maitrieben, (Kb.) st.

23. *abietinum* Gyll. Falkenberg (Rd.).

24. *nigrinum* Er. 5. Kupp, auf 5j. Kiefern stn., erzogen aus Zweigen 30j. Kiefernbestandes (Kb.)

25. *molle* L. R., Kupp. im Holze alter Gebäude, f. stn.

26. *abietis* F. Kupp, im Frühj. in den frisch abgefallenen Fichtenzapfen, stn. (Kb.)

- 27.* *panicum* L. R., Kupp in Herbarien, Dblatt und dergl., f. hfg.

11. *Hedobia* Zgl.

28. *imperialis* L. Krascheow, an Säunen, stn.
(v. F.)

12. *Ptinus* L.

29. * *fur* L. Ueberall, im alten Holze, bes.
Möbeln, gemein.

30. *raptor* St. Ratibor, in Möbeln, f. stn.

31. *rufipes* F. Desgl.

13. *Scydmaenus* Ltr.

32. * *collaris* M. et Kze. Dora, an der Oder,
unter Moos und Gemille, z. stn.

33. *elongatus* M. et Kze. Lehnst., an der Oder,
desgl.

34. * *pubicollis* M. et Kze. Stw., Lehnst., desgl.

35. *denticornis* M. et Kze. Desgl. (Th.)

36. *hirticollis* Ill. Dora, Lubowig, desgl.

37. *Hellwigii* Hb. Dora. (H.)

38. *tarsatus* Kze. Pawlauer-Wald, f. stn.

39. *quadratus* M. et Kze. Dora, an der Oder,
z. stn.

VII. *Clavicornia*.1. *Necrophorus* F.

1. * *germanicus* L. Ratibor, in den hohlen
Räumen der von Nas übrig gebliebenen
Knochen, bes. Pferdeköpfen, nicht hfg.

2. *humator* F. Desgl., auch bei Rosenbergr und
andern Orten.

3. * *vespillo* L. Desgl., aber auch im Dgr,
hfg.

4. * *fossor* Er. Wie 3, jedoch stn.

5. *sepultor* Chpt. (obrutor Er.) Meist mit
4 zusammen, jedoch stn.

6. * *mortuorum* F. Ueberall, wie 3, z. hfg.

2. *Silpha* L.

7. * *littoralis* L. Wie 3.

8. * *thoracica* L. Im Nas, Dünger, unter
Laub, überall z. hfg.

9. * *rugosa* L. Desgl., f. hfg.

10. * *sinuata* L. Desgl.

11. *dispar* Hb. Desgl. aber stn.

12. *opaca* L. Wie 11.

13. * *carinata* L. Wie 8.

14. * *4-punctata* L. Ratibor, Kupp, Pleß, an
Eichen, z. stn.

15. * *reticulata* F. Wie 8.

16. *tristis* Ill. Ratibor, 1829, 3 Er., unter
Gemille, f. stn., Karlsbrunn, Ueberf. 1843
p. 174.

17. * *obscura* L. Ueberall, bis ins Geb., gemein.

18. *nigrita* Dfts. Altvater, Ueberf. 1840 p. 81
1843 p. 174.

19. *laevigata* F. Altvater, Ueberf. 1843 p. 174.

20. * *atrata* L. In Laubwäldern, unter Gemille,
bis ins Gebirge, z. hfg.; auch die braune
Varietät.

3. *Pteroloma* Schhr.

21. *Forsströmii* Gyll. (*Holocnemis Graven-*
horstii Schllg.) Ich fand diesen, wie es
scheint, f. seltenen Käfer 1837 am Altvater
in 3 Er.; später siehe Ueberf. 1841, p. 109.

4. *Scaphidium* F.

22. *4-maculatum* F. Grätz bei Droppau (Z.),
Altvater (Rdsch.)

5. *Scaphisoma* Leach.

23. * *agaricinum* F. N., unter Moos und in
Pilzen, z. hfg., a. b. Gräfenberg.

6. *Catops* Pk.

24. *angustatus* F. Db., Pw., Stw., Lehnst., wie
alle folgenden Arten meist im Frühj., unt.
Moos, nassem Laube, Mulm ic., f. stn.

25. *agilis* Ill. desgl.

26. *fuscus* Pz. desgl.

27. *picipes* F. desgl.

28. *grandicollis* Er. desgl. (Th.)

29. * *chrysomelinus* Pz. desgl.

30. *tristis* Pz. desgl. (Th.)

31. *nigrita* Er. desgl.

32. *morio* F. desgl. (Th.)

33. *dissimulator* Sp. desgl.

- 34.* *fumatus* Sp. hfg.
 35. *sericeus* Pz. stln.
- 7. *Colan* Hb.**
36. *clavicornis* Dj. Unter M. u. Gem., f. stln.
 37. *calcaratus* Er. Frhj. unt. Gem., f. st. (Th.)
 38. *brevicornis* Pk. Frhj. unt. Lb. u. M., f. st.
 39. *fuscus* Er. Wie 37.
- 8. *Peltis* Kug.**
40. *grossa* L. 7. Altvater 1837. Später siehe Uebers. 1840, p. 81.
 41.* *ferruginea* L. In feuchten Stuben, R. und Jakobswalde, bisweilen hfg.
 42.* *oblonga* Pk. An alten Weiden, bisw. hfg.
 43. *dentata* Pk. Altvater. Uebers. 1840, p. 81.
- 9. *Thymalus* Latr.**
44. *limbatus* F. Altvater 1837. Später siehe Uebers. 1840, p. 81.
- 10. *Cereus* Latr.**
- 45.* *pedicularius* L. Dw., Wiesen, auf Bl., z. stln.
 46. *sambuci* Mkl. R., Sawade, Gräs, von Bl. geschöpft, stln.
- 11. *Brachypterus* Kug.**
47. *gravidus* Jll. } Alle auf Blumen,
 48. *cinereus* Heer. } mehr oder weniger
 49.* *pubescens* Schüpp. } selten, im Frhj. auch
 50.* *urticae* Kug. } unter Laub, Gem. u.
- 12. *Epuraea* Er.**
- 51.* *10-guttata* F. Auf Bl. und am ausfließenden Saft der Eichen, z. hfg.
 52. *silacea* Hb. Auf Bl., z. stln.
 53. *melina* Er. desgl.
 54.* *ochracea* Er. (*aestiva* L. F.) Ueberall, auf Bl., bes. Spiräen, bis ins Gebirge, Ustron, Karlsbrunn u., hfg.
 55. *neglecta* Heer. Auf Bl., f. stln.
 56.* *obsoleta* F. Wie 51, auch unter Rinde an Rothbuchen.
 var. *minor* v. U. Karlsbrunn unt. Buchenrinde.
 57. *parvula* St. R., Sawade, auf Bl., f. stln.
58. *pygmaea* Gyll. R. auf Bl. f. stln. (Th.)
 59. *pusilla* Jll. Karlsbrunn, Ustron, f. stln.
 60.* *aestiva* Jll. (*floreola* Er.) Auf Bl., z. st.
 61. *melanocephala* Mrsh. Auf Bl., f. selten.
 62.* *limbata* F. Dw., Pw., unter Laub, nicht selten. Im Frühjahr am ausfließenden Saft der Weiden sitzend (Th.)
- 13. *Nitidula* F.**
- 63.* *2-pustulata* L. 4—8. Ratibor, Borutin, unter Rinde, Laub und Moos, z. stln.
 64.* *obscura* F. 4—10. Ratibor, Kupp, Ustron, unter Laub und Moos, auf Bl., bes. Spiräen, f. hfg.
 65. *4-pustulata* F. Sawade, unter Rinde, f. stln.
 66. *flexuosa* F. Neugarten b. R., f. stln. (H.)
- 14. *Soronla* Er.**
- 67.* *grisea* L. (*N. varia* F.) Ratibor, Sawade, Zauditz, im Frühjahr, unter Weidenrinde, Laub und Moos, später auch auf Bl., nicht stln.
- 15. *Amphotis* Er.**
68. *marginata* F. Um Baumstämme, mit *F. fuliginosa* zusammen, stln. (Th.)
- 16. *Omosita* Er.**
69. *depressa* L. Ratibor, Landeck, Karlsbrunn, unter Moos, auf Bl., (Sorb. Auc.) stln.
 70.* *colon* L. Ratibor, unter Laub, auf Bl., in Aas, z. stln.
 71.* *discoidea* F. Im Frühjahr, unter Laub und Moos, auch in Aas, hfg.
- 17. *Meligethes* Stph.**
72. *rufipes* De G. Frühjahr, unter Laub und M., später auf Bl., bis ins Geb., z. stln.
 73.* *pedicularius* Gyll. Desgl., aber f. stln.
 74. *subrugosus* Gyll. Wie 72.
 75.* *aeneus* F. Wie 73.
 76.* *ovatus* St. }
 77. *convexus* Schüpp. } Wie 72.
 78. *symphyti* Kze. }
 79. *coracinus* St. }

80. * *viridescens* F. Wie 73.
 19. *Pocadius* Er.
81. *ferrugineus* F. 7. Oberhalb des Dorfes Weichsel bei Uftron, unter Rinde an einem alten Stöcke, 2 Gr.
 19. *Cycharmus* Kug.
82. * *luteus* Kug. Ratibor, Zawade, Kupp, unter Gemille und auf Bl., 3. hfg.
 20. *Cryptarcha* Shuck.
83. * *strigata* F. Frühjahr, Stw., unter Moos, um Eichen, 3. hfg.
84. *imperialis* F. Frühjahr, am ausfließenden Saite alter Eichen, f. stn.
 21. *Jps* F.
85. *4-guttatus* F. Ratibor, Uftron, unter Rinde an alten Stöcken, f. stn.
86. * *4-punctatus* Hb. }
 87. * *4-pustulatus* F. } Desgl., weniger stn.
 22. *Byturus* Ltr.
88. * *tomentosus* F.) R., Uftron, Karlsbrunn,
 89. * *fumatus* F.) auf Bl., unt. Rinde, hfg.
 23. *Dacne* Latr. (Engis F.)
90. *sanguinicollis* F. Edke., unter Rinde, f. stn.
91. * *humeralis* F. Ratibor, Uftron, Karlsbrunn, in Schwämmen, unter Rinde, 3. hfg.
92. * *2-pustulata* F. Desgl.
24. *Antherophagus* Kn.
93. *pallens* F. Unter Moos, um Bmst., stn.
 25. *Typhaea* Kirby. (Limnesius Er.)
94. *typhae* Fall. An Teichrändern geschöpft, f. stn.
95. * *caricis* Ol. An Teichrändern und auf feuchten Wiesen, geschöpft, hfg.
96. *spargani* Ahr. Desgl., f. stn.
97. *fumata* Mkl. Desgl., f. stn.
 26. *Cryptophagus* Hb.
98. *lycoepardi* Hb. Ratibor, Uftron, Karlsbrunn, unter Rinde, stn.
99. *pilosus* Gyll. Pawlauer = Wald, Stw., Frühjahr, unter Moos, f. stn.
100. *dentatus* Hb. Desgl.
101. *crenatus* St. Desgl.
102. *acutangulus* Gyll. Desgl.
103. *affinis* St. Desgl.
104. *scanicus* L. Desgl.
105. *pusillus* Pk. Desgl.
106. *crenulatus* Er. Desgl.
 27. *Atomaria* Kirby.
107. *ipsoides* Hb. Db., Pw., unter Moos und Laub, auch bei Karlsbrunn.
108. * *fuscipes* Gyll. Pw., Db., Stw., wie 107.
109. * *atra* Hb.
110. *mesomelas* Hb. }
 111. *linearis* Stph. }
 112. *umbrina* Gyll. } Desgl.
 113. *nigriceps* Mkl. }
 114. *terminata* Dhl. }
 115. *apicalis* St. }
116. *fuscata* }
 117. * *analis* } Desgl. Vom Hrn. Prof. Dr. Erich-
 118. * *nana* } son bestimmt.
 119. *pusilla* }
120. *peltata* Er. (n. sp.) davon besitze ich nur 1 Gr.
 28. *Micetaea* Kirby.
121. *hirta* Mrsh. Frühj. unter Moos und Gemille, stn. (Th.)
 29. *Elachistus* Hoffg.
122. *globulus* Gyll. Unt. M. u. Gem., f. stn.
 30. *Trichopterix* Kirby.
123. *atomaria* Gyll. (R., Kupp, u. Dgr. schwärz-
 124. *fascicularis* Hb.) mend, auch unt. Gem., stn.
 125. * *grandicollis* Mkl. R., Kupp, Uftron, Desgl. f. hfg.
126. *sericans* Heer. Wie 123.
 31. *Ptenidium* Er.
127. * *pusillum* Gyll. Wie 123.
 32. *Dermestes* L.
128. * *lardarius* L. Ein Stammgast in Speise- und Vorrathskammern, oft nur zu hfg.
129. *lupinus* Eschs. Zawade (Z.).
130. *affinis* Gyll. fand ich meist an d. Oder im
 131. *murinus* L. angeschwemmten Gem., 3. hfg.

33. *Attagenus* Ltr.

132. 20-guttatus F. Zawade (Z.)
 133. * pellio L. Ueberall gemein. Die Larve arbeitet gern im Pelzwerk (zu Gunsten d. Kirschner), in ausgestopften Thieren und ähnl. Dingen.
 134. * undatus F. Desgl., ist aber viel seltener.
 135. megatoma Dj. Desgl. auch in Ustron.
 136. Schafferi Hb. R. (H.), Zawade (Z.).

34. *Anthrenus* Geoffr.

137. * scrophulariae L. Auf Bl., überall hfg.
 138. verbasci F. Auf Bl., 3. stn.
 139. * museorum L. Auf Bl., unt. M., hfg.
 140. * pimpinellae F. Desgl.
 141. claviger Er. Sehr selten.

35. *Hololepta* Pk.

142. plana Fly. Ging ich vor Jahren auf der Barania in einem modrigen Stocke 3 Er.

36. *Platysoma* Leach.

143. * depressum F. Pw., Db., Brz. W., Kupp, Ustron, unter Rinde an alten Stöcken.
 144. oblongum F. Wie 143, aber f. stn.

37. *Hister* L.

145. * 4-notatus Ser. S. hfg.
 146. unicolor L. S. stn.
 147. * fimetarius Hb. (sinuatus F.) S. hfg.
 148. * cadaverinus E. H. S. hfg.
 149. * carbonarius E. H. S. hfg.
 150. * purpurascens Pk. Stn.
 151. stercorarius E. H. S. stn.
 152. sinuatus Pk. S. stn.
 153. * bis-6-striatus F. Hfg.
 154. neglectus Zenk. 3. stn.
 155. * 2-maculatus L. 3. stn.
 156. corvinus Grm. S. stn.
 157. 12-striatus Pk. S. stn. (H.)

Meist im Dgr., bisweilen unter Moos, im Gemille und Kas.

38. *Dendrophilus* Leach.

158. punctatus E. H. Mit d. v. zus., f. stn.

39. *Paromalus* Er.

159. flavicornis Hb. Unter Rinde, 3. stn.

40. *Saprinus* Er.

160. * nitidulus F. Im Dgr., unter Moos, Gemille u. hfg.
 161. * aeneus L. Desgl.
 162. conjungens Pk. Desgl., aber f. stn.

41. *Trixagus* Kug.

163. adstrictor HHw. 4-8. Db., Kupp, unt. Rinde, stn.

42. *Nosodendron* Latr.

164. * fasciculare Ol. Am ausfließenden Saft der Eichen, bisweilen hfg.

43. *Byrrhus* F.

165. ornatus Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und Gemille, stn.
 166. * pilula. Ueberall, unter M. u. Gem. hfg.
 167. arietinus. Wie 165.
 168. fasciatus. Desgl.
 169. dorsalis. R., unt. M. und Bmst., stn.
 170. * ater. R. und Ustron, im Gemille, stn.
 171. * varius. Wie 166.
 172. * aeneus. Desgl., aber stn.
 173. * nitens. Desgl., 3. stn.

44. *Syncalypta* Dillwyn.

174. * arenaria St. Im Dgr., f. stn.

45. *Simplocaria* Curtis.

175. * semistriata JH. Wie 174.

46. *Limnichius* Zgl.

176. sericeus Dfts. Dora, unter M., f. stn.

47. *Elmis* Latr.

177. * aeneus Mllr. Dora, um Bmst. f. stn.
 178. Maugetii Ltr. Desgl.

48. *Parnus* F.

179. * prolifericornis F. Unt. Rinde, M., hfg.
 180. * auriculatus Kug. Brzejie, Krascheow, Ustron. Wie 179.
 181. rufipes Dhl. Desgl., aber f. selten.
 182. lutulentus Er. Ustron, f. stn.

49. *Heterocerus* F.

183. * fossor Kttwr. An der Ober, auf Schlaß, f. hfg.
 184. * laevigatus R. Desgl., aber stn.

VIII. Palpicornia.

1. Helophorus F.

1. * *nubilus* F. Ratibor, Kupp, auf Schlamm, im Gemille, hfg.
 2. * *grandis* Ill. Auf Schlamm, im Gem., hfg.
 3. * *aquaticus* L. Desgl., z. stn.
 4. * *granularis* L. Desgl., hfg.
 5. * *griseus* Hb. Desgl.

2. Hydrochus Grm.

6. * *elongatus* F. Pawlauer-Wald, Dora, an der Dber, unter Eb., auf Schlamm u., z. hfg.

3. Ochtebius Leach.

7. *pygmaeus* F. Dora, Frühj., unt. Eb., f. stn.

4. Spercheus Kug.

8. *emarginatus* Schall. Auf Schlamm, f. stn.

5. Berosus Leach.

9. *aericeps* Curt. Auf Schlamm, f. stn.

6. Hydrophilus Geoffr.

10. *piceus* L. In stehenden Gewässern, z. hfg.
 11. * *atterimus* Eschs. Desgl.
 12. * *caraboides* L. Desgl., f. hfg., verfliegt sich bisweilen, so daß man ihn an Orten findet, wo er seiner Natur nach nicht leben kann.

7. Hydrobius.

13. * *fuscipes* L. (*scarabaeoides* F.) Ratibor, Kupp u., im Dünger, f. gemein.
 14. * *limbatus* F. Im Dünger, nicht hfg.
 15. * *testaceus* F. (*griseus* Gyll.) Wie 13.
 16. * *melanocephalus* F. Desgl.
 17. * *griseus* F. Desgl., weniger hfg.
 18. * *marginellus* F. Desgl., auch unt. M., z. stn.
 * var: *affinis* Pk. Desgl.

8. Cyllidium Er.

19. *seminulum* Pk. Unter Moos, stn.

9. Cyclonotum Dej.

20. * *orbiculare* F. Im Dünger, im Wasser, unter nassem Gemille, bis ins Gebirge, hfg.

10. Limnebius Leach.

21. * *truncatellus* Pk. Frühj., unter M., stn.

11. Laccobius Leach.

22. * *minutus* L. Im Dünger, unter nassem Gemille, hfg.

12. Sphaeridium F.

23. * *scarabaeoides* L.
 24. * *marginatum* F.
 25. * *2-pustulatum* F. } Im Dgr., überall gem.

13. Cercyon Leach.

26. * *haemorrhoidale* F. Im Dünger, z. hfg.
 27. * *haemorrhoum* Gyll. Desgl., auch b. Ustron.
 28. * *flavipes* F. Wie 27, aber f. hfg.
 29. * *melanocephalum* L. Wie 26.
 30. * *1-punctatum* L. Desgl., aber f. hfg.
 31. *stercorarium* Ullr. Dora, Kupp, Ustron, z. stn.
 32. *terminatum* St. Ustron, im Gemille, f. stn.
 33. * *centrimaculatum* St. Dora, Pw., nicht hfg.
 34. * *pygmaeum* Ill. Dora, Pawlauer-Wald, Ustron, nicht stn.
 35. * *anale* Pk. Dora, Pw., z. stn.
 36. *lugubre* Pk. Dora, f. stn.
 37. *minutum* F. Desgl.
 38. *atomarium* F. Im Dünger, unter Moos, überall, gemein.

IX. Lamellicornia.

1. Gymnopleurus Ill.

1. *pilularius* F. Ustron. (H.)

2. Copris Geoffr.

2. * *lunaris* L. Im Dünger, durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, hfg.

3. Onthophagus Ltr.

3. * *medius* Kug. } Im Frühjahr und
 4. * *vacca* L. } Herbst unter Laub und
 5. * *coenobita* Hb. } Moos, im Sommer
 6. * *fracticornis* Pk. } unt. Dgr., mehr oder we-
 7. * *nuchicornis* L. } niger hfg., selbst i. Geb-
 8. *nutans* F. } Auf der Landdecke, unter Laub
 9. *lemur* F. } und Moos, f. stn.
 10. * *taurus* L. Um Ratibor und Ustron nicht
 selten, besonders die Weibchen.
 11. *capra* F. Mit 10 zusammen, jedoch stn.
 12. * *Schreberi* L. Im Dünger, überall, gem.

13. *furcatus* F. Im Dünger, f. stn.
14. * *ovatus* L. Wie 12.

4. *Oniticellus* Zgl.

15. * *flavipes* F. Fund ich vor einigen Jahren unweit Rybnick im Kuhdünger, z. hfg.

5. *Aphodius* Ill.

Die Aphodien leben überall im Dünger, im Frühjahr und Spätherbst findet man einzelne Sp. auch unter Laub, M., Gem. u.

16. * *subterraneus* L. Bis ins Gebirge, hfg.
17. * *erraticus* L. Desgl.
18. * *fossor* L. Desgl.
var: *sylvaticus* seltener.

19. *terrestris* F. Ustron, f. stn.
20. *scybalarius* F. S. stn.
21. *foetens* F. Desgl.
22. * *fimetarius* L. Ueberall, bis ins Geb., gem.
23. 4-*maculatus* L. Bei Rybnick, 4 Gr.
24. * *haemorrhoidalis* L. Wie 22.
25. *pussilus* Hb. Desgl.
26. 2-*maculatus* F. S. stn.

var: *niger* St. häufiger.

27. 4-*guttatus* Hb. Dora, Rybnick, f. stn.
28. * *rufescens* F. Ratibor, Kupp und andern Orten, gemein.
29. * *sordidus* F. Desgl.
var: 4-*punctatus* seltener.

30. * *immundus*. 3. stn.
31. *nitidulus* F. Ustron, stn.
32. * *merdarius* F. Nicht hfg.
33. * *prodromus* Brhm. Hfg.
34. *melanostictus* Schüpp. S. stn.
35. * *inquinatus* F. } S. gemein.
* var: *nubilus* Pz. }

36. *sus* F. Hinter der Lukafine im Schwein-
dünger, f. stn.
37. *rufipes* L. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn,
f. stn.
38. *luridus* F. Desgl., aber hfg.

39. * *nigripes* F. S. hfg. Dürfte doch wohl eigene Art sein.

40. *pecari* F. Vor einigen Jahren fing ich diesen Käfer f. hfg. auf der Manier Hutung, seit ein Theil derselben zu Ackerland gemacht worden — nicht wieder.

6. *Oxyomus* Eschs.

41. *asper* F. Ratibor und Ustron, stn.
42. * *porcatus* F. Ratibor, Kupp, Ustron, im Dünger und im Fluge, hfg.

7. *Trox* F.

43. * *sabulosus* L. Im angeschwemmten Gemille, f. stn.
44. *scaber* L. Desgl., noch seltener.

8. *Geotrupes* Lir.

45. *Typhoeus* L. Kupp, Krascheow, f. stn.
46. * *stercorarius* L. Ueberall gemein.
47. *politus* Malin. Mit 46 zusammen, seltener.
48. * *sylvaticus* F. Besonders in Kieferwäldern hfg., auch bei Ustron und Karlsbrunn, aber seltener.
49. * *vernalis* L. Wie 48. var: sehr in Farbe (blau, grün, schwarz u.) Größe u. Punctirung.

9. *Bolboceras* Kirby.

50. * *mobilicornis* F. Klingbeutel, in Kartoffelfeldern, Zawade in Laubholz schwärmend, stn.

10. *Oryctes* Ill.

51. * *nasicornis* L. Ratibor, Adamowiz, Falkenberg, Kupp, Krascheow, in faulen, mo-
drigen Holzstöcken, Lohe u., z. hfg.

11. *Anomala* Mgl.

52. * *julii* F. Auf jungen Saalweiden, Erlen, oft hfg.
* var: *Frischii* F. Desgl., auch bei Kupp, Falkenberg u.

53. * *horticola* L. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, hfg.

12. *Anisoplia* Mgl.

54. *agricola* F. Landeck, Falkenberg, f. stn.
55. * *fruticola* F. Rybnick, z. hfg., Kupp, Falkenberg, Krascheow, z. stn.

13. *Melolontha* F.

56. * *fulva* L. 5. 6. Hinter dem Schlosse bei Ratibor, um Weidengebüsch in manden Jahren hfg. und besonders nach Sonnenuntergang schwärmend; auch bei Kupp (im Kieferwalde und an Maulbeerbäumen), Falkenberg, jedoch stn.

57. * *vulgaris* F. } Durch das ganze Geb. hfg.,

58. * *hippocastani* F. } jedoch meist getrennt, so daß in dem einen Jahre 57 in einem andern Jahre 58 häufiger vorkommt.

14. *Rhizotrogus* Latr.

59. * *aestivus* Ol. 7. Ustron, hfg., besonders auf der großen Ezantori, wo er bei schwüler Mittagssonne in großer Menge umher schwärmt.

60. * *solstitiales*. 7. Durch das ganze Geb., besonders bei Ustron, s. hfg.

61. *ruficornis* F. Rybnik, Falkenberg, s. stn.

62. *aprilinus* Crtz. Vdke., s. stn.

15. *Omaloplia* Mgl.

63. * *brunnea* L. Pw., s. stn.; Falkenberg, Kupp, Ustron, spät nach Sonnenuntergang schwärmend, z. hfg.

1822 fand ich in Kupp eine starke Kiefer an der Sonnenseite vor Kienensammern angeschlagen. Der Aufschlag ging etwa ein Drittel in die Kiefer hinein und hatte im Außern etwa 1 Fuß Höhe. In Folge der Sonnenhitze tröpfelte das ausschwitzende Harz auf die untere Fläche, wo es sich bereits in zieml. Menge angesammelt hatte und täglich vermehrte. In diesem Harze fand ich eine Menge von *O. brunnea*, theils todt und mit Harz bedeckt, theils lebend und darauf umherkriechend. Obgleich ich fast jeden Abend diesen Baum besuchte, so fand ich den Käfer doch nie schwärmend, dagegen fand ich an sonnigen Morgen immer neue Anhömlinge aus dem Harze kriechend, die nach und nach wieder mit Harz bedeckt wurden. Einige andere, nicht hierher gehörige Insekten, fanden mit ihm ihr Grab, jedoch schienen andere Käfer diese Gefahr zu vermeiden. Später ließ mir ein Freund diese Harzlage ausfügen und ich sendete sie dem Prof. Dr. Göppert in Breslau. Das Ganze erinnerte deutlich an die im Bernstein befindlichen Insekten u.

64. *variabilis* F. Db., im zeitigen Frühjahr in Ackerfurchen unter Laub, ganz frisch ent-

wickelt, später auch an andern Orten, stn.; Falkenberg (Rd.).

16. *Kopla* Ill.

65. *argentea* F. 6. Bschp., auf jungen Papeln; Kupp a. Gräsern; Falkenberg s. stn.

66. * *pulverulenta* Ol. Im Frühj. bei hohem Wasserstande an d. Oder auf Grashalmen sitzend, bisweilen hfg.

67. *graminicola* F. R., Kupp, Krascheow, Falkenberg, stn.

17. *Osmoderma* Serv.

68. * *eremita* F. R., Krascheow, Rosenberg, Kupp, Falkenberg, besonders in dem Wurmmehl alter Eichen, wo die Larve oft s. hfg. vorkommt.

18. *Gnorimus* Serv.

69. *variabilis* L. (*8-punctatus* F.) Rauben, Landsberg, Krascheow, Kupp, Falkenberg, an Erlen, Flieder u. modriger Erde, s. stn.

70. * *nobilis* G—8. Sawade, Vdke., stn.; Ustron auf Sp. *Aruncus* s. hfg.; Kupp, an dem Ausfluß alter Eichen (Kb.), Falkenberg.

19. *Trichius* F.

71. * *fasciatus* L. Im jungen Laubholz auf Bl., bes. Spiräen, R., Ustron, Gesenke, hfg.

20. *Valgus* Scr.

72. * *hemipterus* L. Wie der vorige, doch auch unter Gemille und Laub.

21. *Cetonia* F.

73. *fastuosa* F. Sawade, Falkenberg, Kupp. Die Larve und Nymphe wurde in der Modererde hohler Eichen (z. Th. beim Ausnehmen wilder Bienen) gefunden und daraus der Käfer erzogen, den man auch an dem ausfließenden Saft sitzend fand.

74. *aenea* And. Auf Bl., besonders Rosen, Spiräen u., in Gärten, nicht hfg.

75. * *marmorata* F. Desgl., z. hfg.

76. * *aurata* L. Ueberall, bis ins Geb., s. hfg. Anm. Unter den Varietäten könnten sich noch andere Arten befinden.

77. * *hirta* F. R., Zawade, Krascheow, Kupp, auf Hierac. Pilosella u. and. ähnl. Blm.

22. *Lucanus* L.

78. * *cervus* L. R., Rosenberg, Krascheow, Kupp, Falkenberg, Freistadt u. Die Larve im Wurmmehl alter Eichen, den Käfer am Tage an Eichen sitzend und nach Sonnenuntergang umherfliegend, nicht stn.

79. * *capreolus* F. R., Zawade, Kupp, Freistadt, lebt auf ähnl. Weise wie 78, jedoch findet man die Larve auch in alten Weiden, 3. stn.

23. *Dorcus* Mgl.

80. * *parrallelepipedus* L. R., Krascheow, Kupp, Falkenberg, in hohlen Eichen, auch in der Rinde alter Stöcke, nicht stn.

24. *Platycerus* Ltr.

81. * *caraboides* L. R., Krascheow, Kupp, Falkenberg, Ustron, Karlsbrunn, an Holzklafftern, unter der Rinde, an Bmst. u. nicht häufig.

82. ? *rupes* F. Db., Bde., auf ähnl. Weise, aber sehr selten.

25. *Sinodendron* F.

83. * *cylindricum* L. R., Grätz, Rosenberg, Kupp, Falkenberg, Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Stöcke u., bisweilen 3. hfg.

II. Heteromera.

I. Melasomata.

1. *Blaps* F.

1. * *mortisaga* L. R., Kupp, Ustron, in Kellern, feuchten Wohnungen u. nicht st., obwohl immer vereinzelt.

2. *Opatrum* F.

2. * *sabulosum* L. Unter nassem Moos und Gemille, auf Schlamm u., überall, hfg.

3. *Microzoum* Dej.

3. * *tibiale* F. Dvora, unter Laub, sehr stn.

4. *Crypticus* Latr.

4. * *quisquilius* L. R., Kupp, unter Moos auf Sandboden, f. stn.

II. Taxicornia.

1. *Eledona* Ltr.

1. *reticulata* L. R., Zawade, unt. Rinde, f. stn.

2. * *agricola* F. R., unt. Rinde u. i. Schwamm an alten Weiden, hfg.

2. *Leiodes* Ltr.

3. *castanea* Kug. 7. Kupp, unter Rinde an einem alten Fichtenstocke 3 Er.

3. *Anisotoma* Kn.

4. *picea* Kug. Zawade, f. stn. (Z.)

5. *Triepkii* Schdt. R., Kupp, unter trockenem Gemille, um Bmst., f. stn.

6. *dubia* Jll. Dvora, Stw., wie 5.

* *var. ferruginea* St. Dvora, Kupp, Ustron, wie 5, weniger stn.

7. *ciliaris* Schdt. Dvora, wie 5. (Th.)

8. *parvula* Shg. Stw. unter Moos, f. stn.

9. *badia* St. Ustron f. stn. (Th.)

10. *dentipes* Gyll. (Colenis Er.) Stw., unter Moos, f. stn.

4. *Neomida* Zgl.

11. *2-color* F. (*aenea* Pk.) R., Katscher in der Modererde hohler Bmst. besonders Weiden, f. stn.

5. *Diaperis* Geoffr.

12. *boleti* L. R., Rosenberg, Ustron, Karlsbrunn, in Baumschwämmen, unt. d. Rinde alter Stöcke, überall stn.

6. *Uloma*.

13. * *culinaris* F. Adamowitz, Kupp, Ustron, unt. der Rinde alter Fichtenstöcke, f. stn.

7. *Hypophloeus* Hllwg.

14. * *castaneus* F. R.-Hammer, Ustron, Karlsbrunn, unt. d. Rinde alter Fichtenstämme, 3. hfg.

15. *fraxini* Kug. R., 2 Er. aus einem Eschenstocke herausgebohrt.

16. *2-color* F. 4. Ratibor, unter Rinde alter Weiden, stn.

17. *piceae* Ritzbg. Rauben, Kuchelna, unter Tannen- und Fichtenrinde stehender Klaf-tern, β . stn.

III. Tenebrionida.

1. *Orchesia* Ltr.

1. * *micans* Ill. Aus Larven, im Schwamm einer hohlen Eiche am Teichdamme b. Brze-
zie in großer Menge erzogen. (Th.)

2. *Hallomenus* Pk.

2. *humeralis* Rhn. Dora, um Bmst., β . stn.
3. * *affinis* Pk. Db., Ustron, um Bmst., stn.

3. *Hypulus* Pk.

4. *quercinus* Quens. Frühj., Dr. D., im Gemille, an Eichen; Krascheow, an alten Stöcken, stn.

4. *Serropalpus* Hell.

5. *barbatus* Schall. Ustron, 1 Ex. aus einer alten, mit vielen Bohrlöchern versehenen Planke herausgebohrt (Th.).

5. *Melandrya* F.

6. * *caraboides* L. (*serrata* F.) Ustron, Karlsbrunn, unter Rinde fauler Stöcke, stn.

6. *Tenebrio* L.

7. * *molitor* L. Im Mulm fauler Bäume β . hfg.; in Bäckereien, Mühlen, Vorrathskammern ist die Larve (Mehlwurm genannt) Stammgast.

IV. Helopida.

1. *Helops* F.

1. * *lanipes* L. Dr. D., im zeitigen Frühjahr β . hfg. um die Wurzeln der Linden, Zawade um die Wurzeln der Eichen, später verschwindet er.

2. * *caraboides* Pz. R., Zawade, Ustron, um Bmst., β . stn.

2. *Mycetochares* Ltr.

3. *flavipes* F. R., bisweilen auf Bl., jed. st.

3. *Omophilus* Mgl.

4. * *picipes* F. G. Bisweilen an Kornähren, β . hfg.

4. *Cistela* F.

5. * *atra* F. R., Kupp, in hohlen Weiden, an alten Stöcken, nicht stn.

6. * *fulvipes* F. R., Ustron, in feuchten, hölzernen Gebäuden, bisweilen hfg.

7. * *sulphurea* L. Brzezie, Dttmachau, auf Bl., β . hfg.

8. *evonymi* F. Krascheow (v. F.) β . stn.

9. *testacea*, Uebersf. 1829, p. 53, habe ich nicht wieder gesehen.

V. Trachelida.

1. *Lagria* F.

1. * *hirta* F. An Getreideähren, auf Bl., hfg.

2. *Pyrochroa* F.

2. * *coccinea* L. Landeck, Ustron, Gesenke, meist auf Bl., β . stn.

3. *pectinicornis* L. Ustron, auf Bl., β . stn.

3. *Notoxus* Geoffr.

4. * *monoceros* L. Auf Bl., im Gemille, unt. Eb. u., überall, hfg.

4. *Anthicus* F.

5. *floralis* L. Dora, unt. trockenem M., β . stn.

5. *Mordella* F.

6. * *fasciata* F. Ratibor, Kupp, Ustron, auf Bl., nicht stn.

7. *sericea* Zgl. Desgl., β . stn.

8. * *aculeata* L. Auf Bl., überall, hfg.

9. *grisea* Fröhl. Auf Bl., stn.

10. *pumilla* Gyll. Ratibor, Bischofskoppe, auf Bl., β . stn.

11. *aterrima* Gyss. Ratibor, Ustron, auf Bl., β . stn.

12. *abdominalis* F. Pw., auf Bl., β . stn.

6. *Anaspis* Geoffr.

13. * *frontalis* L. Auf Bl., überall, β . hfg.

14. * *rufilabris* Lt. R., Kupp, Ustron, auf Bl., β . hfg.

15. *flava* L. Brzezie, auf Bl., β . stn. (H.)

16. * *thoracica* L. R., auf Bl., β . stn.

VI. *Cantharida*.1. *Meloe* L.

- 1.* *proscarabaeus* L. }
 2.* *violaceus* Mrsh. } Im Frühjahr an We-
 3. *tuccius* Rossi. } gen, oder im Grase
 4. *brevicollis* Hllw. } kriechend; 1. 2. 5.
 5.* *variegatus* Don. } d. hfg., bes. 2.

2. *Cerocoma* Geoff.

6. *Schaefferi* L. R., Adamowiz, Ples, an
Kornähren oder auf Brachen, 3. stn.

3. *Lytta* F.

- 7.* *vesicatoria* L. R., Kupp, auf Hollunder,
Esche, Ahorn, Pappeln, oft f. hfg.

VII. *Stenelytra*.1. *Calopus* F.

1. *serraticornis* L. Altvater, Ustron, stn.

2. *Asclera* Dej.

2. *sanguinicollis* F. Zawade, im Ebbholz, auf
Bl., f. stn.

3. *coerulea* L. Ustron, f. stn.

3. *Oedemera* Ol.

4. *podagrariae* L. Ede., Ustron, f. stn.

- 5.* *flavescens* L. R., Kupp, Bschp., Ustron,
auf Bl., 3. hfg.

6. *marginata* F. Brzezie, auf Bl., stn.

7. *clavipes* F. Pw., Db., auf Bl., stn.

- 8.* *virescens* L. Wie 5.

- 9.* *lurida* Mrsh. Desgl., noch häufiger.

4. *Anoncodes* Dj.

10. *adusta* Pz. Karlsbrunn, Ustron, f. stn.

11. *viridipes* Mgl. Ustron, f. stn.

5. *Chrysothia* Schdt.

12. *viridissima* L. Brzezie, auf Bl., f. stn.

- 13.* *viridis* Jll. R., Kupp, Zelasna, auf Bl.,
bes. Hyp. perforatum, 3. hfg.

6. *Mycterus* Ol.

14. *curculioides* F. R., Kupp, f. stn.

7. *Rhinosimus* Latr.

15. *planirostris* F. R., im Gem., f. stn.

16. *ruficollis* Pz. Desgl. (Th.)

17. *roboris* F. R., an einer alten Weide, f. stn.

III. *Tetramera*.I. *Rhynchophora*.1. *Brachus* L.

1. *marginellus* F. 6—9. Brzezie, Kupp, von
Bl. geschöpft, f. stn.

2. *pisi* F. 8. Brzezie, Pw., desgl.

- 3.* *rufimannus* Sch. 8. Dobra, desgl., nicht stn.

- 4.* *granarius* L. 6—8. Dom. W., unter
Moos und auf Bl., 3. stn.

5. *luteicornis* Hllw. 8. Auf Wiesen, geschöpft,
f. stn.

6. *Ioti* Pk. 6—8. Ratibor, Kupp, Ustron, unter
Moos und auf Bl., 3. stn.

7. *cisti* F. 6—9. Brzezie, auf Saroth. vul-
varis, auch aus dem Saamen erzogen, 3. hfg.

8. *seminarius* L. Auf Wiesen, geschöpft, f. stn.

2. *Spermophagus* Steven.

9. *cardui* Stv. 7. Adamowiz, f. stn.

3. *Brachytarsus* Schönh.

10. *scabrosus* F. Meist unter Rinde, auch in
Gärten, gefunden, 3. stn.

- 11.* *varius* F. Ratibor, Falkenberg; Rd. fand
ihn hfg. in der starken Rinde der Kiefer
und Fichte, meist über der Wurzel alter
Stämme, wo die Rinde am stärksten ist.

4. *Tropideres* Schönh.

12. *albirostris* H. 8. Ede., Landsberg, f. stn.

5. *Platyrhinus* Clairv.

13. *latirostris* F. Brzezie, an einer Kloster,
1 Cr.

6. *Anthrabus* Geoffr.

- 14.* *albinus* L. 6—8. Dobra, Brzezie, an
Buchen, 3. stn.

7. *Apoderus* Ol.
- 15.* *coryli* F. et *avellanae* L. 6–10. Durch das ganze Gebiet, auf Haselnusssträuchern, jungen Pappeln, Erlen, Birken, sehr verbreitet.
- 16.* *intermedius* Pz. Edel., Zawade, Karlsbrunn, wie 15, aber z. fltn.
8. *Attelabus* L.
- 17.* *curculionoides* L. 6–9. Wie 15.
9. *Rhynchites* Hb.
18. *Bacchus* L. 6–9. St., Rupp, Kraschew, auf jungem Laubholz, z. fltn.
19. *coeruleocephalus* Schall. Ratibor, Kraschew, wie 18.
20. *aequatus* L. Brzezie, Kuchelna, s. fltn.
21. *cupreus* L. 8. Dvora, s. fltn.
22. *planirostris* F. 6. Pw., s. fltn.
23. *conicus* Ill. (*alliariae* F.) Db., Pw., z. fltn.
24. *pauillus* Grm. Desgl.
25. *minutus* Hb. Desgl.
- 26.* *nanus* Pk. 5–9. Auf Bl., jungem Laubholz, überall s. gemein.
- 27.* *populi* L. Desgl., auch s. hfg.
- 28.* *betuliti* F. Desgl., aber weniger hfg.
29. *pubescens* F. Pw., s. fltn.
30. *tristis* F. Desgl.
- 31.* *betuleti* L. Wie 27.
10. *Rhinomacer* F.
32. *attelaboides* E. 6. Dvora, auf Bl., s. fltn.
11. *Diodyrhynchus* Grm.
33. *austriacus* Mgl. 6. Dvora, auf Bl., s. fltn.
12. *Apion* Hb.
- 34.* *pomoniae* F. Unter Moos, auf Bl. der Obstbäume u., s. gemein.
- 35.* *craccae* L. Auf Bl., bes. Leguminosen, doch auch unter Moos, hfg.
36. *subulatum* Krb. Pw., s. fltn.
37. *stolidum* Gyll. Dv., s. fltn.
38. *vicinum* Krb. Dvora, Dv., fltn.
39. *atomarium* Kr. 5–7. Desgl.
40. *penetrans* Gr. Im Frühjahr hinter dem Schloß unter Moos, fltn.
41. *tenne* Krb. 5–7. Auf Wiesen, z. fltn.
- 42.* *aeneum* F. } In zeitigen Frühj. u. Spät-
- 43.* *radiolus* Krb. } herbst unt. Bl., um Sträucher
- 44.* *onopordi* Krb. } u. Bmst., im Sommer a. Bl., z. hfg.
45. *gibbirostre* Gyll. } Frühjahr, unter Moos,
46. *brevirostre* Hb. } s. fltn.
47. *pallipes* Krb. Brzezie. (H.)
- 48.* *fuscirostre* F. Brz. W., Bschp., auf Saroth. *vulgaris*, s. hfg.
- 49.* *difficile* Hb. 5. 6. Brz. W., unter Heidekraut, nicht fltn.
50. *genistae* Krb. Auf Ginster, aber s. fltn.
51. *flavofemoratum* Hb. Brz. W., Pw., s. fltn.
- 52.* *vernale* F. Frühjahr, unter Moos, um Sträucher und Baumstämme, nicht hfg.
53. *viciae* Pk. Auf Wiesen, von Leguminosen geschöpft, fltn.
54. *dissimile* Grm. } Von Bl. geschöpft,
55. *varipes* Grm. } s. fltn.
- 56.* *apricans* Hb. Frühjahr bis Herbst, unter Moos, auf Bl. u., z. hfg.
57. *ononides* Gyll. An Grabenrändern von Bl. geschöpft, s. fltn.
- 58.* *flavipes* F. Wie 56.
59. *aestivum* Grm. Auf Wiesen, von Bl. geschöpft, s. fltn.
- 60.* *assimile* Gyll. Auf Bl., unter Moos, nicht fltn.
61. *nigritarse* Krb. Dvora, Giesmannsdorf, geschöpft, fltn.
- 62.* *miniatum* Sch. 6–8. Auf Wiesen, bes. von *Rumex Acetosa* geschöpft, z. hfg.
63. *haematodes* St. Auf Wiesen, s. fltn.
- 64.* *frumentarium* L. Pw., auf Wiesen, z. hfg.
65. *sanguineum* De G. Dv., s. fltn.
- 66.* *seniculus* Krb. Db., Pw., Wiesen, z. fltn.
- 67.* *civicum* Grm. Desgl.
- 68.* *foraminosum* Grm. Desgl.

- 69.* *columbinum* Grm. Proschowitz, Dбора, z. stn.
70. *superciliosum* Gyll. Unter Moos, f. stn.
71. *ebeninum* Kb. Desgl.
72. *platalea* Grm. Giesmannsdorf, stn. (H.)
73. *ervi* Krb. Dбора, Bischofskoppe, f. stn.
- 74.* *virens* Hb. Auf Wiesenblumen, unter Moos um Gesträuch ic., nicht hfg.
75. *punctigerum* Grm. Dw., f. stn.
76. *foveolatum* Krb. In Obstgärten, stn.
- 77.* *aethiops* Hb. Unter Moos, auf Bl., z. hfg.
- 78.* *astragali* Pk. Pw., Dбора, unter Moos, auf Bl., z. stn.
- 79.* *vorax* Hb. Dбора, Pw. ic., unter Moos, auf Bl., hfg.
80. *pavidum* Grm. Pw., f. stn.
81. *pisi* Mgl. Von Leguminosen geschöpft, auch im Gefenke, stn.
- 82.* *sorbi* Hb. Dбора, Pw., Zaupitz, unter Moos, auf Bl., z. stn.
83. *dispar* Grm. Pw., Tschait, f. stn.
- 84.* *atratum*. Dбора, Landecker, Bischofskoppe, auf Bl., nicht hfg.
- 85.* *humile* Grm. Dбора, Pw., auf Bl., z. stn.
86. *simum* Grm. Desgl., f. stn.
87. *minimum* Hb. Brz. W., auf Bl., f. stn.
88. *violaceum* Krb. Db., Desgl.
- 89.* *marchicum* Hb. Auf Wiesen, geschöpft, z. stn.
90. *angustatum* Krb. Desgl., f. stn.
91. *aterrimum* Krb. Desgl.
13. *Thylacites* Grm.
- 92.* *pilosus* F. Rudnik, Pw., Bschlp., im jungen Laubholz, z. stn.
14. *Caeorhinus* Schoenh.
93. *geminatus* F. R., Kupp, Falkenberg, an jungen Erlen, Birken u. Kiefern, nicht hfg.
15. *Strophosomus* Billg.
- 94.* *coryli* F. Im jungen Laubholz, unter M. ic., überall, hfg.
- 95.* *cervinus* Grm. Desgl.; er ist kleiner und weniger hfg.
- 96.? *affinis* Dj. R., Kupp, wie 94, z. stn.
97. *faber* Hb. Krascheow. (v. F.)
98. *squamulatus* Hb. Pw., unt. Eb. u. M., f. stn.
16. *Sciaphilus* Schvenh.
- 99.* *muricatus* F. 6—10. Wie 94.
17. *Brachyderes* Schvenh.
- 100.* *incanus* L. Frühj. und Herbst unt. M. um Bmst.; im Sommer an Kiefern, Tannen, Kastenholz ic. Er durchsicht die jüngsten Triebe der jungen Kiefern, daß sie später umknicken. (Kb.)
18. *Eusomus* Grm.
- 101.* *oculum* JH. Auf Weiden und jungen Pappeln f. hfg., bisweilen auch auf Bm.
19. *Tanimecus* Grm.
102. *palliatum* F. Wie 100, wird auch oft mit demselben verwechselt.
20. *Sitones* Schoenh.
103. *griseus* F. Pw., an Klastern, f. stn.
104. *regensteniensis* Hb. Pw., unt. M., f. stn.
- 105.* *lineellus* Bonsd. Unter Moos, Gemille, auf Bl., z. hfg.
106. *tibialis* Hb. Desgl.
107. *sulcifrons* Thbg. Desgl.
- 108.* *lineatus* L. } Desgl., f. hfg.
- 109.* *hispidulus* F. }
21. *Scytropus* Schoenh.
- 110.* *mustela* Hb. Auf Bl., z. stn.
22. *Chlorophanus* Dalm.
111. *viridis* L. } Auf Weiden a. d. Ober,
- 112.* *graminicola* Mgl. } im jung. Ebhlz., n. stn.
23. *Polydrusus* Grm.
- 113.* *undatus* F. Frühj. und Herbst unter M.; sonst im jungen Ebhlz., f. hfg.
114. *flavipes* De G. Auf Weiden, z. stn.
115. *coruscus* Mur. Desgl.
- 116.* *cervinus* L. Wie 113.
- 117.* *picus* F. Desgl.

118. * *sericeus* Schall. Auf Weiden, jungen Birken, Pappeln u., in vielen Abänderungen, s. hfg.
119. * *micans* F. Im jungen Ebhlg., in der Ebene nicht so hfg. als im Gebirge.
120. *amoenus* Grm. Uftron, im Ebhlg. geschöpft, z. stn.
24. *Metallites* Schoenh.
121. * *mollis* Grm. Ob., Kupp, Falkenberg, Bschfp., Uftron, Karlsbrunn, auf Blättern und Bl., hfg.
122. * *atomarius* Ol. Desgl.
25. *Cleonus* Schoenh.
123. * *marmoratus* F. Ebke., an einer Klft., 2 Gr.
124. *nebulosus* L. Krascheow, auf Kiefern u. Pappeln, nicht stn. (v. F.)
125. *sulcirostris* L. N., Kupp, Krascheow, an Klaftern u., vereinzelt, jedoch nicht stn.
126. *albidus* F. Brz. W., an Klaftern, s. stn.
127. *glaucus* F. Krascheow, Kupp, Falkenberg, an Kiefern-Stangenholz, an Klft., z. stn.
26. *Alophus* Schoenh.
128. * *3-guttatus* F. An Klaftern, im Gem. u., überall, z. hfg.
27. *Liophloeus* F.
129. * *nubilus* F. Unt. Moos, Gemille, an Wegen, auf Ebhlg., Klaftern, überall, gemein.
130. *Herbstii* Mgl. Nur 1 Gr., i. Gem. gefangen.
28. *Barynotus* Grm.
131. * *obscurus* F. Wie 128.
29. *Tropiphorus* Schoenh.
132. *mercurialis* F. Unt. M. u. Gem., s. st.
30. *Lepyrus* Grm.
133. * *colon* F. } Wie 129.
134. * *2-notatus* F. }
31. *Tanyssphyrus* Grm.
135. *lemnae* F. Kupp, s. stn.
32. *Hylobius* Schoenh.
136. * *abietis* L. Ueberall, bis ins Gebirge, auf Klaftern, behauenenem Holze, in Tannen-, Fichten- und Kieferwäldern, s. hfg.
33. *Molytes* Schoenh.
137. *coronatus* Ltr. Uftron u. Karlsbrunn, st.
138. * *flavomaculatus* Mgl. Einige Gr. bei Katscher an d. Blättern von Petas. off.; hfg. im Gesenke auf ders. Pfl. und auf *Cac. albifrons*.
139. *germanus* L. Karlsbrunn. (Ol.)
34. *Leiosomus* Krb.
140. *cribrum* Mgl. Uftron, s. stn.
35. *Plinthus*.
141. *Megerlei* Pz. Altvater, s. stn.
36. *Phythonomus* Schoenh.
142. * *punctatus* F. 6–8. Unter trockenem M., Gem., Klftn., nicht stn.
143. *oxalis* Hb. Desgl., stn.
144. *elongatus* Pk. } Desgl.
var. *variabilis* Zgl. }
145. *mutabilis* Grm. Desgl.
146. * *rumicis* L. Auf Wiesen, unter Moos, Gemille u., z. hfg.
147. * *Pollux* F. Desgl.
148. * *suspiciosus* Hb. Desgl.
149. *plantaginis* De G. Desgl., z. stn.
150. *murinus* F. Wie 146.
151. *variabilis* Hb. Wie 149.
152. * *polygona* L. Wie 146.
153. *meles* F. Wie 149; bes. auf Kleefeldern.
154. * *nigrirostris* F. Wie 146, bes. auf niedr. Pflanzen.
37. *Phyllobius* Schoenh.
155. * *calcaratus* F. 6–8. Um N., übht. in der Ebene z. stn.; im Geb., bei Uftron, Karlsbrunn, am Glaserberge, auf verschiedenen Pflanzen, s. hfg.
156. *pyri* L. Dora, Falkenberg, Karlsbrunn, z. stn.
157. *psittacinus* Zenk. Auf verschiedenen Pfl., z. stn.
158. * *argenteus* L. Durch das ganze Geb., bes. auf Weiden, s. hfg.

159. *maculicornis* Grm. R., Falkenberg, z. stn.
 160. * *oblongus* L. Wie 157.
 161. * *sinuatus* F. Dvora, auf Moos, z. stn.
 162. * *vespertinus* F. Brzezie, Falkenberg, Gesenke, auf jungem Laubholz, nicht stn.
 163. *viridicollis* F. Dvora, Falkenberg, Gesenke, z. stn.
38. *Trachyploeus* Grm.
164. * *scabriusculus* L. 6—8. Unt. M., z. stn.
 165. *setarius* Sch. Desgl., f. stn.
39. *Omius* Grm.
166. *hirsutulus* F. Unter Moos, f. stn.
 167. * *brunnipes* Ol. 6—8. Lhust., Stw., unter Moos um Eichenstämme, z. hfg.
40. *Ottiorhynchus* Grm.
168. *niger* F. 7. 8. Karlsbrunn und Ustron, unter St., auf den Blättern von *Pet. vulgaris*, *Cac. albifrons* u., stn.
 169. *villosopunctatus* Zgl. Desgl., z. stn.
 170. *fuscipes* Ol. Desgl., f. stn.
 171. * *tenebriocosus* Hb. Durch das ganze Gesenke und Klocacz-Gebirge, f. hfg.
 172. * *irritans* Hb. 7. 8. Ratibor, stn.; Kupp, auf *Sal. cinerea* und *aurita*, f. hfg.
 173. *laevigatus* F. Ratibor, Falkenberg, f. stn.
 174. *morio* F. 7. Karlsbrunn. (H.)
 175. *unicolor* Hb. 7. Ustron, Karlsbrunn, f. stn.
 176. *nigrita* F. 6. Bschp., unter St., f. stn.
 177. * *lepidopterus* F. 6—8. Bschp., Ustron, unter St. und Gemille, z. stn.
 178. * *gibbicollis* Schdt. 7. Dvora, Stw., Ustron, unter St. und Gemille, z. stn.
 179. *orbicularis* Hb. Wie 175.
 180. *pauper* Zgl. Im Gesenke und Klocacz-Gebirge, f. stn.
 181. * *hirticollis* Hb. 6. Bschp., im Ebholz, geschöpft, z. stn.
 182. * *raucus* F. Ratibor, unter Moos und Gemille, im Ebholz, nicht stn.
 183. * *septentrionis* Hb. R., Kupp, wie 182.
184. * *ligustici* L. Unter Gemille, an Wegen u., z. hfg.
 185. *austriacus* F. Unt. M., um Bmst., z. stn.
 186. * *aerifer* Schüpp. Ratibor, Ustron, Karlsbrunn, unter Moos und St., z. stn.
 187. *costatopunctatus* Dj. Desgl.
 188. * *ovatus* L. 6—8. Ratibor, Borufin, Bschp., Ustron, Karlsbrunn, nicht stn.
41. *Lixus* F.
189. * *appendiculatus* Kn. Db., an Teichrändern, z. stn. und meist schon sehr abgestäubt.
 190. *bardanae* F. Rauden. (H.)
42. *Pissodes* Grm.
191. * *piceae* Ill. Ratibor, Kupp, Krascheow, Falkenberg, im Gebirge, auf Holzschlägen z. hfg. Er geht oft bis einige Linien tief ins Holz hinein.
 192. *pini* L. Desgl., führt auch eine ähnliche Lebensweise, hält sich aber mehr an Kiefern als an Tannen u.
 193. *notatus* F. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, leider nur zu sehr verbreitet und gefanat.
43. *Magdalinus* Grm.
194. * *violaceus* L. 6—8. Adamowitz, Rauden, Kupp, Krascheow, Falkenberg. In Kiefern-Schonungen an den jungen Trieben oft f. hfg. Ich fand die Larve stets in der Markröhre von oben nach unten arbeitend, hfg. auch Nymphen und z. Th. ausgebildete Käfer.
 195. *duplicatus* Grm. Desgl., aber f. stn.
 196. *phlegmaticus* Hb. R., Falkenberg, f. stn.
 197. *carbonarius* F. Desgl.
 198. *atramentarius* Mgl. (*aterrimus* Hb.) R., Falkenberg. Brütet in Rülsterästen. Rd.
 199. * *pruni*. In Obstgärten, an Baumstämmen und Planken sitzend, z. hfg.
44. *Erirhinus* Schönh.
200. * *acidulus* L. Frühjahr bis Herbst, unter Moos, Gemille, auf Holzplätzen, bis ins Gebirge, f. hfg.
 201. *aethiops* F. 7. Ustron, f. stn.

202. * vorax F. Dvora, Pw., unter Moos,
im jungen Laubholz, nicht stn.
 203. * tremulae Pk. Desgl.
 204. * taeniatus F. Desgl.
 205. * majalis Pk. Desgl.
 206. * pectoralis Pz. Desgl.
 207. * infirmus Hb. Auf Wiesen, geschöpft,
z. stn.
 208. tortrix L. Desgl., aber stn.
 209. * dorsalis F. Dvora, Bschp., im jungen
Laubholz, stn.
46. Grypidius Schönh.
 210. * equiseti F. Sommer. Von Pfl. an
stehenden Gewässern geschöpft, z. stn.
 211. brunnirostris F. Im Gem. um Bmst., stn.
47. Ellescus Mey.
 212. * 2-punctatus L. 6—8. Dvora, Ede.,
Bschp., von Bl. geschöpft, z. hfg.
48. Brachonyx Grm.
 213. * indigena Hb. 5—8. Ratibor, Falken-
berg, Kupp, an den Maitrieben der Kie-
fern, z. hfg.
49. Anthonomus Grm.
 214. * pomorum L. 6—9. R., Falkenberg, z. hfg.
 215. rubi Hb. R., von Bl., geschöpft, f. stn.
 216. druparum, R., Falkenberg, z. stn.
50. Balauius Grm.
 217. nucum L. 8—10. R., Falkenberg, auf
Ebholz., besonders Haselnußsträuchern, z. stn.
 218. glandium Mrsh. 6—9. R., Falkenberg, Desgl.
 219. venosus Dhl. Desgl.
 220. villosus Hb. Desgl., f. stn.
 221. * crux F. Ratibor, Bschp., auf Ebholz.,
geschöpft, nicht stn.
 222. * brassicae F. Desgl.
 223. * pyrrhoceras Mrsh. Desgl.
51. Amalus Schönh.
 224. scortillum Hb. Von Bl. geschöpft, z. stn.
52. Tychius Grm.
 225. * 5-punctatus L. Ratibor, unter Moos,
auf Bl., nicht stn.
 226. venustus F. R., Bschp., auf Bl., stn.
 227. * tomentosus Hb. Ratibor, unter Moos,
um Baumstämme, z. hfg.
 228. * picirostris. Desgl., f. hfg.
53. sibynes Schönh.
 229. viscaria L. Ratibor, unter Moos, um
Gesträuch, f. stn.
 230. primitus Hb. Desgl.
 231. sodalis Schüpp. Desgl.
54. Phytobius Schmidt.
 232. 4-nodosus Gyll. Db, unter M., z. stn.
 233. * 4-tuberculatus F. Dvora, Leobschütz,
Stadtwald, z. hfg.
55. Anoplus Schüpp.
 234. * plantaris Naez. 6. 7. Pw., Bschp.,
auf Bl., z. stn.
56. Orchestes Ill.
 235. * quercus L. 6—8. Pw., Kupp, Bschp.,
im Laubholz, f. stn.
 236. scutellaris F. 7. Ufron, im Ebholz, f. stn.
 237. * fagi L. 5—7. Brz. W., Bschp. Kupp,
Krafscheow, Falkenberg, auf jungem Ebholz.
besonders Rothbuchen, z. hfg.
 238. Jota F. Db., Kupp, auf jungem Ebholz.,
z. hfg.
 239. * populi F. 5—11. Auf jungem Laubholz,
überall, gemein.
 240. rusci Hb. 5—10. Dvora, Pw., auf jun-
gem Laubholz, nicht hfg.
 (Tachyerges Sch.)
 241. bifasciatus Sch. Ratibor, Ufron, stn.
 242. salicis L. Ratibor, Bschp., z. stn.
 243. stigma Grm. Desgl.
 244. * sulcatus Sch. Ratibor, Kupp, z. stn.
57. styphlus Schönh.
 245. setiger Beck. Ratibor, f. stn.
58. Trachodes Sch.
 246. hispidus L. R., unt. trockenem Gem., f. stn.
59. Lyprus Schönh.
 247. cylindrus Pk. Ratibor, unter Moos
und Semille, z. stn.

60. Bagous Grm.

248. 2-notatus L. 6. 7. An der Oder, fltn.
 249. lutulentus Gyll. 6. Dobra, unter feuchtem Moos, fltn.

61. Baridius Schönh.

250. artemisiae Hb. 6. Ratibor, von Gräsern geschöpft, f. fltn.
 251. chlorizans Mllr. Desgl., fltn.
 252. lepidii Mllr. Desgl.
 253. * T-album L. Auf feuchten Wiesen von Gräsern geschöpft, bef. b. Dw., f. hfg.

62. Cryptorhynchus Ill.

254. * lapathi 5—9. Ratibor, Falkenberg, Kupp, Krascheow, bis ins Gebirge, hfg. Die Larve lebt in 3—6jährigen Erlen, bei 10—20jährigen nur in den Nestern, wo sie bis in die Markröhre eindringt. Wülste und Knoten verrathen ihr Dasein. An Weiden und Kiefern habe ich die Larve noch nicht gefunden.

63. Coeliodes.

255. rufirostris Sp. 6. Unter Moos, f. fltn.
 256. * rubicandus Pk. 6—8. Brz. W., Kupp, unter Heidekraut, z. fltn.
 257. epilobii Pk. 6. Im Ebholz., geschöpft, f. fltn.
 258. * guttula F. 6—8. Desgl., z. hfg.
 259. * subrufus Hb. Desgl.
 260. * didymus L. Desgl., auch unter Moos, um Bmst., hfg.
 261. punctum St. Im Ebholz., geschöpft, z. fltn.
 262. gerani Pk. Desgl.

64. Mononychus Schüpp.

263. pseudacori F. Vdk., im Ebholz., geschöpft, f. fltn.

65. Centorhynchus Schüpp.

264. suturalis E. 6—8. Dobra, Dw., unter Moos, auf Bl., fltn.
 265. syrites Grm. Desgl.
 266. * assimilis Pk. Desgl., nicht fltn.
 267. depressicollis Gyll. Desgl., fltn.

268. * erysimi F. 4—8. Ratibor, Lubowig, Katscher, Kupp, unter Moos, an Weg und Wiesenrändern, auf Bl., hfg.

269. contractus Mrsh. 6—8. Unter M., z. fltn.
 270. atratulus Gyll. Von Bl. geschöpft, f. fltn.
 271. terminatus Hb. Desgl.

272. * floralis Pk. 4—9. Ratibor, Kupp, Bschkp., auf Bl., besonders Glockenbl., f. hfg.

273. convexicollis Sch. Von Bl. geschöpft, f. fltn.
 274. * ericae Gyll. 7—9. Dobra, Brzezie, auf Heidekraut, hfg.

275. consputus Grm. 8. Pw., auf Bl., f. fltn.
 276. eehii F. 6. Pw., unter Moos, um Birken, f. fltn.

277. viduatus Gyll. Desgl.

278. raphani F. Im Laubholz geschöpft, fltn.

279. borraginis F. Dobra. (H.)

280. fulvitaris 5. Pw., unter Moos und auf Bl., fltn.

281. litura F. 6. Brzezie, auf Bl., z. fltn.

282. asperifolium Krb. Desgl., f. fltn.

283. chrysanthemi Mllr. Desgl.

284. arquatus Hb. Desgl.

285. melanosticticus Mrsh. Desgl.

286. marginatus Pk. Db., unt. M., auf Bl., fltn.

287. * punctiger Mgl. 5—8. An der Oder, auf niedrigen Pfl., z. fltn.

288. * sulcicollis Gyll. Dobra, Wiesen, geschöpft, nicht fltn.

289. * alauda F. 5—9. Dobra, Pw., auf Bl. zwischen Ebholz., hfg.

290. rapae Gyll. 5—7. Dobra, Bschkp., im Ebholz., z. fltn.

291. hirtulus Schüpp. 5. 6. Pw., Brz. W., unter Moos, fltn.

292. * troglodytes 5—9. Ratibor, Tworkau, Bschkp., auf Bl., hfg.

293. ignitus Grm. Unter Moos, f. fltn.

- 66. Rhinocerus** Schönh.
 294. * *castor* F. 6—9. Ratibor, Kupp, unter Moos, auf niedrigem Pfl., z. hfg.
 295. *bruchoides* Hb. }
 296. *inconspectus* Hb. } R., unter Moos, um
 297. *pericarpus* F. } Gesträuch, f. stn.
 298. *subfasciatus* Gyll. }
 299. *albicinctus* Sch. }
- 67. Poophagus** Schönh.
 300. * *sisymbrii* F. Ratibor, an der Oder, auf Bl., stn.
- 68. Rhytidosomus** Schönh.
 301. *globulus* Hb. R., unter Moos, f. stn.
- 69. Orobitis** Grm.
 302. * *cyaneus* L. Frühlj., unt. Eb. u. M., stn.
- 70. Cionus** Clairv.
 303. * *scrophulariae* L. } Ueberall, f. hfg.
 304. * *verbasci* F. }
305. * *thapsi* F. Ratibor, Grabowka, Kupp, hfg.
 306. *hortulanus* Mrsh. Brzezie, f. stn.
 307. * *blattariae* F. Adamowiz, Rauden, stn.
- 71. Gymnaetron** Schönh.
 308. *labilis* Hb. 7. Uftron, f. stn.
 309. *verbasci* Rossi. 6. Grabowka, f. stn.
 310. * *antirrhini* Pk. Von Bl., geschöpft, z. stn.
 311. *netus* Grm. 6. Bschp., f. stn.
 312. *longirostris* Dj. 7. Pw., f. stn.
 313. * *campanulae* L. 6—10. Im Ebbholz, auf Bl., bes. auf Camp. persicif., überall, hfg.
 314. * *graminis* Gyll. 6—8. Im Laubholz, auf Bl., z. stn.
- 72. Mecinus** Grm.
 315. * *pyraster* Hb. 3—6. Stw., an der Oder, unter Moos und Laub um Eichen und Pappeln, nicht stn.
- 73. Nanophyes** Schönh.
 316. * *lythri* F. 5—7. Ehnst., Brz., unter Moos, hfg.
- 74. Sitophilus** Schönh.
 317. * *granarius* L. In Getreidevorräthen, ein schlimmer Gast für Roggen, Weizen und Gerste, bisw. f. hfg.

75. Cossonus Clairv.318. *linearis* F. Bodland bei Kreuzburg. (v. K.)319. *ferrugineus* Clairv. Ratibor, f. stn.**76. Rhyncolus** Crtz.320. *chloropus* F. } 4—6. Pw., Stw., un-321. *porcatus* Mllr. } ter Moos, um Bmst.,322. *crassirostris* Mgl. } bes. Eichen, aber immer323. *truncorum* Sch. } nur in einzelnen Ex.**77. Dryophthorus** Schüpp.324. *lymexylon* F. Kupp, Krascheow, in Kiefern und Tannenstöcken, oft f. hfg.

II. Xylophaga.

1. Hylastes Er.

1. * *ater* Ph. R., Rauden, Kupp, Krascheow, Falkenberg, unter Kieferrinde, hfg.2. *brunneus* Er. Falkenberg, nur in Stöcken. (Rd.)3. *cunicularis* Kze. Brzezie, Falkenberg, desgl.4. *attenuatus* Er. Falkenberg. (Rd.)5. *angustatus* Kb. R., Kupp, Falkenberg, in Kiefernklästern und Kieferrinde, z. stn.6. *opacus* Ill. Adamowiz, Rauden, desgl.7. *decumanus* Er. Falkenberg. (Rd.)8. *palliatu*s Gyll. Zawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg unt. Fichten- u. Kieferrinde hfg.9. *polygraphus* L. Rauden, Falkenberg, meist in Fichtenstangen, auch wenn sie im gemischten Holz stehen, f. hfg.

2. Hylurgus Lr.

10. *ligniperda* F. Rauden, Falkenberg, in Kiefernstöcken, z. stn.

3. Dendroctonus Er.

11. * *piniperda* L. Ueberall, bis ins Gebirge, unter Kieferrinde, hfg.12. *minor* Hrtg. Rauden, Kupp, Falkenberg, desgl.; er scheint 11 nachzufolgen, ist aber seltener und kommt auch in Fichten vor.13. *pusillus* Kn. Altwater. Ueberf. 1844, p. 68.

4. *Hylesinus* F.

14. * *crenatus* F. S. N., Krascheow, Kupp, Falkenberg, in alten Eschen, bisweilen hfg.
 15. *fraxini* F. N., Kupp, Falkenberg, in abgestorbenen Eschen, in deren Ermangelung greift er auch gesunde, sogar 8—20j. Stämme an.

5. *Xyloterus* Er.

16. * *domesticus* L. N., Grätz, Ustion, aus alten Rothbuchen herausgegraben, hfg.; Falkenberg hfg. in Birken. (Rd.)
 17. *lineatus* Ol. N., Kupp, Falkenberg, in Kiefernstangen und Klästern, nicht stln.

6. *Crypturgus* Er.

18. *cinereus* Hb. Kupp, Falkenberg, im Bast der Kiefern, hfg.
 19. *pusillus* Gyll. N., Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Fichten und Tannen, hfg.
 20. *pityographus* Rtzbg. Kupp, Falkenberg, in Fichtenhölzern, aber nicht hfg.
 21. *Lichtensteinii* Rtzbg. Falkenberg, in Fichten bis auf den Splint gehend.

7. *Cryphalus* Er.

22. *piceae* Rtzbg. N., Kupp, Falkenberg, in alten Tannen.
 23. *asperatus* Gyll. Gesenke. Uebersf. 1844, p. 68.
 24. *abietis* Rtzbg. N., Kupp, Falkenberg, in Kiefernklästern, nicht stln.

8. *Bostrichus*.

25. * *typographus* L. N., Kupp, Falkenberg, Ustion u., besonders auf liegendem Fichtenholze, s. hfg.
 26. *stenographus* Dft. Zawade, Kupp, Falkenberg, in Kiefern-Klafterholz, oft hfg.
 27. *laricis* F. Zawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Kiefernklästern und alten Lärchenstämmen, nicht hfg.
 28. *suturalis* Dj. N., Kupp, Falkenberg, in Kiefernstöcken, z. hfg.

29. *curvidens* Grm. Zawade, Kupp, Falkenberg, in Tannenklästern, alten Tannen; in deren Ermangelung greift er gesunde Stämme an.

30. *chalcographus* L. Zawade, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in Kiefernklästern, s. hfg.; man findet die Brut durchs ganze Jahr.

31. * *bidens* F. Kuchelna, Kupp, Krascheow, Falkenberg, in verkrippelten und abgestorbenen Kiefern, die Brut wie bei 30.

32. *autographus* Kn. Kuchelna, Kupp, Falkenberg, in Fichten, nicht stln.

33. *cryptographus* Kug. Falkenberg. (Rd.)

34. *villosus* F. Rauden, Karlsbrunn, auf Klästern, s. stln.

35. * *2-color* Hb. Zawade, Grätz, Kupp, Falkenberg, meist in Rothbuchen, z. hfg.

36. *dispar* Hllwg. N., Kupp, Falkenberg, in jungen Eichen, z. stln.

37. * *monographus* F. N., Kupp, Krascheow, Falkenberg in Eichen, z. hfg.

38. *dryographus* Er. Falkenberg. (Rd.)

39. *Saxesenii* Rtzbg. Rauden, stln.

40. *eurygraphus* Er. Falkenberg. (Rd.)

9. *Eccoptogaster* Hb.

41. * *scolytus* F. N., Kupp, Falkenberg, besonders in Rüstern (*Ulmus camp.*) z. hfg.

42. *destructor* Ol. Falkenberg. (Rd.)

43. *multistriatus* Mrsch. N., Falkenberg, wie 41, aber stln.

44. * *pygmaeus* Hb. N., Falkenberg, wie 41.

45. *intricatus* Koch. Kupp, Falkenberg, in Eichenstämmen, hfg.

46. * *pruni* Rtzbg. N., Kupp, Falkenberg, in Pflaumenbäumen, hfg.

47. * *rugulosus* Koch. Desgl.

48. *carpini* Er. Falkenberg. (Rd.)

10. *Platypus* Hb.

49. *cylindrus* F. N., Kupp, Falkenberg.

11. *Apate* F.
 50. * *capucina* L. R. stln., Kupp, Kraschew, Falkenberg, in morschen Eichen, hfg.
 12. *Cis* Ltr.
 51. * *boleti* Scop. In Baumschwämmen, an alten Stöcken, bis ins Gebirge, f. gemein.
 52. *micans* F. Desgl., aber f. stln.
 53. * *hispidus* Pk. Wie 51, aber nicht f. hfg.
 54. *festivus* Block. Gröz. (Z.)
 55. *glabratus* Dj. 7. Ustron, in den Schwämmen an Fichtenstöcken, nicht stln.
 56. * *nitidus* F. Dora, Ustron, wie 51, aber nicht f. hfg.
 57. * *affinis* Gyll. R., Ustron, wie 51.
 13. *Corticaria* Mrsh.
 58. *pubescens* Jll. R., Giesmannsdorf, unter Moos, f. stln.
 59. *crenulata* Sch. Desgl.
 60. *serrata* Pk. Dora, unter Moos, f. stln.
 61. *elongata* Sch. Db., Kupp, unt. M., f. st.
 62. * *gibbosa* Hb. R., Kupp, Ustron, unter Moos, gemein.
 63. *transversalis* Sch. Dora, unter M., f. st.
 64. *fuscula* Mgl. Desgl.
 14. *Lathridius* Hb.
 65. *elongatus* Curt. R., unter Moos, f. stln.
 66. *acuminatus* Pk. Kuchelna (Z.).
 67. * *sculptilis* Sch. Db., Stw., Brz., unter Moos, f. hfg.
 68. *porcatus* Hb. Um Graswurzeln, stln.
 69. * *parallelus* Sch. Db., Stw., unt. M. z. hfg.
 15. *Mycetophagus* Hllwg.
 70. * *4-maculatus* F. R., Gröz, Ustron, unter der Rinde alter Fichtenstöcke, hfg.
 71. *atomarius* F. Ustron, desgl., aber f. stln.
 72. *variabilis* Hllwg. R., Ustron, wie 70, z. st.
 73. *multipunctatus* F. Schillersdorf, wie 70, st.
 74. *fulvicollis* Zenk. R., wie 70, f. stln.
 16. *Triphyllus* Mgl.
 75. * *2-fasciatus* F. Dora, Borutin, Ustron, wie 70, z. stln.
 76. *punctatus* Hllwg. Stw., unt. M., f. st.
 77. *fumatus* L. Borutin (Z.)
 78. *fagi* Chr. Stw., unter Moos, f. stln.
 17. *Tetratoma* Nllwg.
 79. *fungorum* F. Im Schwamm an alten Weiden, stln.
 18. *Cerylon* Ltr.
 80. * *histeroides* F. Ueberall, bis ins Gebirge, unter der Rinde alter Fichtenstöcke, f. hfg.
 81. *deplanatum* Gyll. Ustron, Karlsbrunn, wie 80, z. stln.
 19. *Monotoma* Hb.
 82. * *picipes* Pk. Stw., unter M., um Eichen, z. hfg.
 20. *Rhizophagus* Hb.
 83. *ferrugineus* Pk. Ustron, Karlsbrunn, unt. der Rinde alter Stöcke, nicht hfg.
 84. *depressus* F. R., im Fluge, Zawade, Schillersdorf, Gröz und wie 83.
 85. *dispar* Pk. Wie 83.
 86. * *1-pustulatus* F. Wie 83.
 87. *nitidulus* F. Wie 83, aber f. stln.
 21. *Bitoma* Hb.
 88. * *coenata* F. Db., Zawade, Kupp, Gröz, Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Bmst., hfg.
 22. *Lycus* F.
 89. * *canaliculatus* F. 6. Ede., unter d. Rinde alter Baumsstöcke, z. hfg.
 23. *Teredus* Dj.
 90. *nitidus* F. 7. Ustron, unt. Buchenrinde, z. st.
 24. *Colydium* F.
 91. *elongatum* F. Kupp, Rosenbergl., Falkenberg, Ustron, unter Rinde alter Stöcke, z. st.
 25. *Nomosoma* Desm.
 92. *elongatum* Ltr. Kupp, unter der Rinde alter Stöcke, f. stln.
 26. *Silvanus* Ltr.
 93. *1-dentatus* F. Karlsbrunn, wie 92.
 27. *Trogosita* Ol.
 94. *caraboides* F. Karlsbrunn, 1837, unter der Rinde eines alten Fichtenstöckes, 2 Ex.
 28. *Cucujus* F.
 95. *depressus* F. Ustron, Karlsbrunn, unter der Rinde alter Stöcke, z. hfg.

29. *Laemophloeus* Dej.
 96. *monilis* F. Grätz, Ustron, wie 95, f. stn.
 30. *Uleiota* Latr. (Brontes F.)
 97. *flavipes* F. R., um Obstbäume: Schillersdorf, um Eichen; Ustron, unter Rinde alter Stöcke, überall z. stn.

III. Longicornia.

I. Spondylis F.

1. * *buprestoides* L. R., Durch das ganze Gebiet, bis ins Geb., auf Kiefern-Klasterschlägen, f. hfg.
 2. * *faber* L. Deögl., aber viel seltener.

3. Prionus Geoffr.

3. * *coriarius* L. Wie 1; jedoch auch in alten Kieferstöcken und in alten Eichen.

4. Hammaticherus Megh.

4. *heros* F. Adamowiz, Rauden, Rybnik, Semboowitz, Kupp, Falkenberg, Dypeln, an alt. Eichen sitzend, z. stn.

5. * *cerdo* L. Falkenberg. (Rd.)

5. Aromia L.

6. * *moschata* L. R., Malapane, Kupp, Fikbg., hfg. an alt. Weiden, in deren Mulm die Larve lebt.

6. Criocephalum Dej.

7. * *rusticum* L. Auf Holzplätzen, z. hfg.

7. Isarthron Dej.

8. *luridum* F. R., Landsberg; Kupp, Fikbg., Krascheow, Ustron, in Kiefern- und Fichtenklastern und Stöcken, nicht hfg.

var. *aulicum* F. habe ich nur in Ustron gnd.

8. Asemum Eschs.

9. *striatum* L. R., Kupp, auf Holzpl. und Klasterschlägen nicht stn.

9. Hylotrupes Serv.

10. * *bajulus* L. R., Kupp, Krascheow, Fikbg., auch im Gebirge, an Kiefern- und Fichtenklastern, Planken u., nicht stn.

10. Callidium. F.

11. *dilatatum* Pk. Rybnik, Kupp, auf d. Bl. von *Salix cinerea*, z. hfg.; obwohl nicht jedes Jahr.

12. * *violaceum* L. Durch das ganze Gebiet, b. ins Geb., an alten Weiden, auf Klasterschlägen und Holzplätzen, hfg.

13. *clavipes* F. Mit d. vorigen zsm., aber f. stt.

14. * *sanguineum* L. Db., Kupp, Fikbg., Ustron, auf Bl. und an Klastern, z. stn.

15. *alni* L. Db., Landsberg, an Erlenkfst., f. stt.

16. * *variabile* L. (*lennicum* F.) R., Krascheow, Kupp, Falkenberg, an alten Weiden, Eichen, auf Holzplätzen u. z. hfg.

11. Clytus Laichtg.

17. *detritus* L. Vor längerer Zeit fing ich 2 Ex. a. d. Ldke. im Fluge, dann nicht wieder.

18. * *arcuatus* L. R., Rauden, Kupp, Fikbg., Ustron auf Bl. und Holzplätzen, oft f. hfg.

19. *liciatu*s L. (*hafniensis* F.) Malapane, f. stn. (v. F.)

20. *arietis* L. Falkenberg, stn. (Bd)

21. * *gazella* F. R., Krzizanowiz, Ustron auf Holzpl., Bl. bes. Spir. Aruncus, nicht stt.

22. *massiliensis* L. Steinsdorf b. Reife, Ustron, auf Bl., f. stn.

23. * *verbasci* F. R., Ldke., Zawade, Ustron, a. Holzpl., Bl. bes. Samb. Ebulus, nicht stt.

24. *misticus* L. Zawade, Polkoinsel b. Dypeln, z. stn.

12. Obrum Mgl.

25. *brunneum* F. 6. Bschp., auf Bl., f. stt.

13. Necydalis L. (Molorchus F.)

26. * *major* L. (*abbreviatus* F.) R., Falkenberg, an alten Weiden, z. stn.

27. *minor* L. (*dimidiatus* F.) R., Fikbg. Bschp., an Kiefernklastern, im jung. Lbhlg., a. Bl., z. stn.

28. *umbellaturum* F. Ustron, auf Bl., bes. Spiräen, f. stn.

44. Acanthodercus Serv.

29. *varius* F. Brz. W., an Eichenklastern, stt.

15. *Astynomus* Dej.
30. *aedilis* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, auf Holzplätzen, bes. Kiefernklästern, hfg.
16. *Leiopus* Serv.
31. *nebulosus* L. Brz. W., an Eichenkfst., s. stt.
17. *Pogonocherus* Mgl.
32. *fasciculatus* F. R., Sawade, Ffkg., Ustron, auf Klästerschlägen, an Planken, z. sttn.
33. *hispidus* L. Im Gesenke, auf alten
34. *pilosus* F. Stöcken, s. sttn.
18. *Monohammus* Mgl.
35. *sartor* F. Nauden (H.), Malapane (v. F.)
19. *Pachystola* Dej.
36. *textor* L. Durch das ganze Gebiet, auf Holzpl., an Wegen, a. alten Weiden u., z. hfg.
20. *Mesosa* Mgl.
37. *curulioides* L. Brz. W., an Eichenkfstn., Ustron auf alten Stöcken, sttn.
21. *Anaesthetis* Dej.
38. *testacea* F. 7. Ustron, auf Sp. *Aruncus*, s. sttn.
22. *Saperda* F.
39. *carcharias* L. Auf *Populus nigra*, z. stt.
40. *scalaris* L. Auf einer alten Weide 1 Ex.
41. *tremula* F. Krascheow. (v. F.)
42. *populnea* L. Durch das ganze Gebiet, b. ins Gebirge, auf jungen Aspen, Pappeln, auch Bl., z. hfg.
23. *Stenostola* Dej.
43. *nigripes* F. R., Bschp., im jungen Ebhlz., stt.
24. *Anaetia* Dj.
44. *praeusta* L. Auf jungem Laubholz, auch bei Ustron, z. sttn.
25. *Oberca*.
45. *oculata* L. Auf Holzplätzen, Bl., bis ins Gebirge, z. hfg.
46. *erythrocephala* F. Ede., Ustron, Karlsbrunn, an Klästern, sttn.
47. *linearis* L. Kupp, Falkenberg, Krascheow, sttn.
26. *Phytoecia* Dej.
48. *affinis* Pz. Vor einigen Jahren in der Dora hfg., jetzt s. stt.
27. *Agapanthia* Serv.
49. *cardui* F. Ede., Gesenke (Gabelhäuser) sttn.
50. *angusticollis* Gyll. Dora, Ede., im jungen Laubholz, sttn.
51. *violacea* F. Ede., an einer Klaster, 1 Ex.
28. *Rhagium* F.
52. *mordax* F. An Kiefern- und Fichtenklästern, bis ins Gebirge, z. hfg.
53. *inquisitor* F. Desgl., besonders im Gebirge, s. hfg.
54. *indajator* F. Wie 53.
55. *2-fasciatum* F. In der Ebene sttn., im Gebirge z. hfg.
29. *Rhamnusium* Mgl.
56. *salicis* F. Ratibor, hinter dem Schloß, Mosurau, an einer Gartenplanke, s. sttn.
30. *Toxotus* Mgl.
57. *cursor* L. 7. Auf der Barania im Klocacz-Gebirge in einem faulen Fichtenstamme gegen 20 ganz frisch entwickelte Ex., sonst nur einzeln an alten Stöcken.
58. *noctis* F. 1 Ex. auf dem Ustater gefangen und vom verst. Weber in Berlin bestimmt, kann kein Weibchen von 57 sein und eben so wenig zu 59 gehören.
59. *meridianus* L. Ratibor, auf Holzplätzen, an behauenen Stämmen, nicht hfg.
31. *Pachyta* Mg.
60. *4-maculata* F. Ede., sttn.; Möltzsch, Grätz, Ustron, sehr hfg. auf Spiräen.
61. *maculata* F. Ratibor, z. sttn., sonst wie 60.
62. *3-fusciata* F. fand ich vor Jahren an der Barania auf alten Stöcken, z. hfg.
63. *clathrata* F. Desgl.
- var: *reticulata* F. Desgl., aber seltener.
- Anm.: 62, 63 und var: scheinen sehr sttn. zu sein, denn sie haben so guten Abgang gehabt, daß ich selbst nur noch

ein Paar defecte Ex. besitze. Leider habe ich diese Gegend seit Jahren nicht wieder besuchen können.

- 64.* *virginea* L. Auf Holzplägen, alten Weiden, Bl., bes. Spiräen, hfg., auch im Geb.
65.* *collaris* L. Desgl.

32. *Strangalia* Serv.

- 66.* *attenuata* L. An Holzstößen, bes. aber auf Bl. in Gärten, s. hfg.
67.* *calcarata* F. Pdfe., Kupp, z. stn.; im Gebirge auf Bl., bes. Spiräen, s. hfg.

33. *stenura* Dej.

- 68.* *4-fasciata* L. Ratibor, Zawade, Kupp, im Klocacz-Geb. u. Gesenke auf Bl., z. hfg.
69. *villica* F. Krascheow, im Holze von *Pop. tremula*. (v. F.)
70. *atra* F. Pdfe., Gröz, auf Bl., nicht stn.
71. *nigra* F. Wie 70, aber s. stn.
72.* *melanura* L. Ratibor, Kupp, im Gebirge, auf Bl., hfg.
73.* *2-fasciata* Mllr. Desgl.

34. *Leptura* L.

- 74.* *virens* L. Im Klocacz-Gebirge, im Gesenke, auf Bl., besonders Spiräen, hfg.
75.* *testacea* L. Durch das ganze Gebiet bis ins Gebirge, auf Holzschlägen, Bl. u., s. hfg.
76. *scutellata* F. Schillersdorf, Gröz, auf Buchen und Bl., z. stn.
77. *cincta* F. Ustion, zw. Fulneck und Tropaupau, z. stn.
78.* *sanguinolenta* L. Ratibor, z. stn.; im Gebirge, auf Bl., z. hfg.
79.* *maculicornis* D. G. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, auf Bl., s. hfg.
80.* *livida* F. Desgl., weniger hfg.
81. *2-notata* Dj. Ples, auf Rosen und andern Gartenbl., z. stn.
82. *6-guttata* F. Altvater. 1841 p. 109.
83. *rufipes* Schall. Dobra, auf Bl., s. stn.
84. *lineata* n. sp. Uebers. 1843. p. 173.

35. *Grammoptera* Serv.

- 85.* *laevis* F. Wie 79.
86. *lurida* F. Dobra, im jungen Ebbholz, s. stn.
87. *ruficornis* F. Dppeln, z. hfg. (v. F.)

IV. *Chrysomelina*

1. *Donacia* F.

Diese Käfer habe ich nur auf den um stehende Gewässer wachsenden Pfl. gefunden, ohne ermitteln zu können, welche Pfl. sie besonders lieben.

- 1.* *crassipis* F. Nicht stn.
2. *dentata* Hoppe. S. stn.
3.* *2-dens* St. Stn.
4.* *dentipes* F. Hfg.
5.* *lemnae* F. Hfg.
6.* *sagittariae*. Hfg.
7.* *impressa* Pk. z. hfg.
8. *thalassina* Grm. Stn.
9.* *sericea* L. z. hfg., in verschied. Varietäten.
10. *rustica* Sch. Stn.
11. *variabilis* Dhl. Stn.
12.* *discolor* Hoppe. Hfg.
13. *affinis* Kze. S. stn.
14. *nigra* F. S. stn.
15.* *menyanthidis* F. Bei Stolzmitz, stn.
16. *simplex* F. Hfg.
17. *linearis* Hoppe. Stn.
18. *semicuprea* Pz. Hfg.
19. *fennica* Pk. Brzezie, Zawade, stn.
20. *hydrocharidis* F. S. stn.

2. *Orsadaea* L.

- 21.* *cerasi* F. 6—8. Ratibor, z. stn., im Gebirge hfg., auf Bl., bes. Spiräen.

3. *Zengophora* Kze.

- 22.* *subspinosa* F. R., Bschp., Frühj. und Herbst, unt. W., sonst auf Bl., nicht stn.
23.* *flavicollis* Mrsh. Desgl.

4. *Crioceris* Geoffr. (Lema F.)

- 24.* *merdigera* L. Auf verschieden Bl., z. hfg.

- 25.* *brunnea* F. Desgl.
- 26.* *12-punctata*. Desgl., bes. auf Spargel.
- 27.* *asparagi* L. Meist nur auf Spargel, z. hfg., auch die Variet. mit in Längs-
striche verlaufenen Flecken.
28. *melanopa* L. Auf Bl., z. stn.
29. *rugicollis* F. Desgl.
- 30.* *cyanella*. Desgl., f. hfg.
5. *Hispa* L.
31. *atra* L. 6. Ratibor, Bschp., um Gras-
wurzeln, f. stn.
6. *Cassida* L.
- 32.* *equestris* F. (*viridis* L.) An Gräben,
von Mentha-Arten u., geschöpft, nicht stn.;
bisweilen auch unter jungen Eichen.
33. *hemisphaerica* Hb. Ratibor, im Ebholz,
geschöpft, f. stn.
34. *vittata* F. Desgl.
- 35.* *murraea* L. Dvora, Pw., Dw., im Ebholz,
auf jungen Pappeln, Birken u.; Bl., bes.
Hieracien; Früh. und Herbst unter Moos,
um Bmst., z. hfg.
- 36.* *sanguinosa* Crtz. (*prasina* Hb.) Wie
35, weniger hfg.
- 37.* *rubiginosa* Jll. (*viridis* F. Ent. Syst.)
Meist im Laubholz, auf Blättern junger
Eichen, Pappeln, Birken u., nicht stn.
38. *vibex* L. Ratibor, Zawade, von Pfl.,
zwischen Gesträuch, geschöpft, stn.
- 39.* *chloris* Suffr. (*prasina* Jll.) Im jungen
Laubholz, geschöpft, nicht stn.
- 40.* *nobilis* L. Durch das ganze Gebiet, im
jungen Laubholz auf Eichen, Birken, Pap-
peln u.; im Frühj. und Herbst unter M.,
um Bmst., f. hfg.
41. *oblonga* Jll. Db., im jungen Ebholz., stn.
42. *obsoleta* Jll. Pw., Dw., desgl.
43. *ferruginea* F. Wie 42.
- 44.* *nebulosa* L. Frühj. und Herbst unter
Moos um Bmst., im Gem., sonst im jun-
gen Laubholz auf Eichen, Birken, Pappeln
u., hfg.
7. *Adimonia* Laichty.
- 45.* *tanaceti* L. Ratibor, auf niedrigen Pfl.,
an Wegen durch Gebüsch u., umherkriechend,
auch unter Gemille, f. hfg.
- 46.* *rustica* Schall. Desgl., jedoch seltener.
- 47.* *capreae* L. Durch das ganze Gebiet im
jungen Laubholz, auf Birken, Pappeln,
bes. auf Saalweiden, f. hfg.
8. *Galleruca* Geoffr.
- 48.* *calamariensis* F. Auf Pfl. an stülfehen-
den Gewässern, z. hfg.
- 49.* *viburni* Pk. Im jungen Laubholz, z. hfg.
- 50.* *nymphaeae* L. Wie 48.
- 51.* *lineola* F. Desgl., auch unt. M. u. Gem.
- 52.* *nigricorne* F. Im jungen Ebholz., stn.
9. *Agelastica* Chev.
- 53.* *alni* L. Durch das ganze Gebiet, auf Er-
ten, jungen Weiden, Birken, f. hfg.
10. *Phyllobrotica* Chev.
54. *4-maculata* L. Pw., Falkenberg, im jungen
Laubholz, stn.
11. *Luperus* Geoffr.
- 55.* *rufipes* F. R., stn.; Kupp, Krascheom,
Gibg., Ustron, an alten Stöcken, z. hfg.
56. *flavipes* L. Desgl. jedoch seltener.
- 57.* *pinicola* And. Desgl., f. hfg.
12. *Calomicrus* Dillwyn.
58. *suturalis* Jll. Vdfe., a. einem Fichtenst. 1 Cr.
13. *Graptodera* Chev.
- 59.* *oleracea* L. Ueberall, f. hfg.
var. *eruciae* F. 3. stn.
14. *Crepidodera* Chev.
60. *transversa* Mrsh. Auf Bl., f. stn.
- 61.* *exoleta* F. Frühj. u. Herbst unt. M., sonst
auf Bl. durch d. gg. Gebt., b. i. Geb., f. hfg.
- 62.* *nididula*. Desgl.
- 63.* *helxines* L. Desgl., aber weniger hfg.
64. *sulvicornis* F. Db., Kupp, auf Bl., z. stn.
- 65.* *moderi* L. Db., Pw., auf Bl., nicht hfg.

- 66.* *pubescens* E. H. Db., Pw., Desgl.
15. Phyllotreta Chevr.
 67.* *armorariae* E. H. Ratibor, Frühj. und Herbst, unt. M., im Sommer auf Bl., nicht hfg.
 68.* *tetrastigma* Kze. Desgl.
 69. *brassicae* F. Desgl., aber f. stn.
 70. *sinuata* Dj. Wie 69.
 71. *flexuosa* Jll. R., Kupp, Falkenberg, f. stn.
 72.* *memorum* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, wie 67, f. hfg.
 73.* *atra* F. Wie 67.
 74.* *lepidii* E. H. Desgl.
 75. *obscura* Jll. Zawade, f. stn.
16. Aphanthia Chevr.
 76.* *cyparissiae* E. H. Auf Brachen, von niedrigen Pfl., geschöpft, hfg.
 77. *lutescens* Gyll. Db., Brzezie, auf Bl., stn.
 78.* *euphorbiae* Schr. R., Frühj. und Herbst unter Moos, im Sommer auf Bl., hfg.
 79.* *pygmaea* Ullr. Desgl., aber weniger hfg.
 80. *rubi* Pk. 7. Ustron, auf Bl., f. stn.
 81. *salicariae* Pk. Ratibor, auf Bl., f. stn.
17. Teinodactyla Chevr.
 82. *verbasci* Pz. 8. Grabowka, Zawade, auf Bl., f. stn.
 83. *atricilla* L. 6. Dora, unter Moos, f. stn.
 84.* *nasturcii* F. An Gräben, von Pfl., geschöpft, 3. stn.
 85. *pratensis* Pz. Auf Wiesen u. wie 84.
 86. *longicornis* 106. Ratibor, Kupp, auf Brachen, geschöpft, 3. stn.
 87. *pussilla* Gyll. 6. Pw., auf Bl., f. stn.
 88.* *lurida* Rossi. 6—8. Db., Pw., auf Pfl., nicht hfg.
 89.* *parvula* Pk. 5—9. Auf Wiesen, im Laubholz, von Bl. geschöpft, hfg.
18. Psylliodes Lr.
 90. *hyoscyami* L. 5. Pw., unt. M., f. stn. (Th.)
 var. *chloromera* St. Desgl.
 var. *coerulea* E. H. Desgl.
 91. *chrysocephala* L. 6. Pw., unt. M., f. stn.
 92.* *rapae* Jll. (napi F.) 6. Dora, Ustron, auf Bl., 3. stn.
 93. *cuprea* E. H. 6. Dora, auf Bl., f. stn.
 94.* *affinis* Pk. 5—8. Pw., Pw., auf Bl., 3. hfg.
19. Plectroscelis Chevr.
 95.* *semicoerulea* E. H. 5—8. An der Dder, auf Pfl., 3. hfg.
 96.* *dentipes* E. H. 5—8. Dora, Ede., Kupp, auf Pfl., hfg.
 97. *Sahlbergii* Gyll. 6. Dora, auf Bl., f. stn.
 98.* *aridella* Pk. 6. 7. Pw., Dw., Kupp, auf Bl., 3. hfg.
 99. *aridulla* Gyll. 5. Db., unt. Moos, f. stn.
20. Balanomorpha Chevr.
 100. *rustica* L. 6. An der Dder, auf Pfl., stn.
 101. *chrysanthemi* E. H. 7. Pw., an der Dder, auf Bl., stn.
21. Podagrica Chevr.
 102.* *fuscicornis* L. Frühj. und Herbst unter M., im Sommer auf verschiedenen Pfl., hfg.
22. Argopus Fisch.
 103. *testaceus* F. Frühj. unter Moos, stn.
23. Timarcha Mel.
 104. *coriaria* F. 7. Karlsbrunn, 1 Gr., unter Steinen.
 105.* *metallica* F. 2. ein Pärchen, und 4. 1843. 1 Gr. in der Dora, unter Moos; sonst im Klokaz-Gebirge und Gesenke hfg.
 106. *splendens* Köhl. 5. 1843 Dora, 2 Gr. unter Moos, 6. 1842, 2 Gr. bei Ustron. unter Steinen.
24. Chrysomela L.
 107. *atra* Dahl. Karlsbrunn. Uebers. 1842 p. 155.
 108.* *göttingensis* L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, unter Moos, Gemille, St. u., hfg.
 109. *sturmii* (v. Ullr. best.) Dora, 2 Gr., unter Moos; Ustron, 2 Gr., unt. Steinen.
 110. *Dahlia* Kn. 7. Karlsbrunn, unt. St., stn.
 111.* *haemoptera* L. (hottentotta F.) R., unt. M. u. Gem., Ustron u. Karlsbrunn, unter St., f. hfg.

112. * *sanguinolenta* L. Wie 108.
var. *marginalis* Besser. Mit 112 zus., aber
seltener.
113. *limbata* F. 6. Dvora, unter M.; Karls-
brunn, unt. St., Rosenberg (Rdsch.) sttn.
114. * *marginata* L. 6-9. Db., Karlsbrunn,
auf Bl., 3. sttn.
115. *analis* L. var. *schach*. F. Db., 1 Cr. unt.
M.; Ustron, 1 Cr. unter St.; ein etwas
größeres, b. Groß-Strehliß gefangenes Cr.,
mehreren Entomol. fremd, scheint auch hier-
her zu gehören.
116. *lamina* F. 7. Db., Ddte., 3. sttn.
117. *geminata* Pk. 7. Db., 1 Cr.; Ustron,
Karlsbrunn, f. sttn.
var. *brunsvigensis* Kn. Nur b. Ustron u.
Karlsbrunn, f. sttn.
118. * *fucata* F. (*gemellata* Rossi.) An Gräben,
auf *Mentha*-Arten, bisweilen f. hfg.
119. * *varians* F. Durch das g3. Gebiet, bis
ins Gbg., auf verschiedenen Pflz. und in
verschiedenen Färbungen, f. hfg.
120. * *fulgida* F. R., Kupp, Ustron, Karlsbr.,
im jung. Ebhlz. a. Pappeln, Birken, Wei-
den, nicht sttn.
121. * *graminis* L. An dens. Orten, außer auf
Tanac. vulg. auch auf andern Pfl., 3. hfg.
122. * *fastuosa* L. Wie 120, in verschd. Färbgn.
123. * *menthae* Schrk. Durch d. gze. Gebiet,
an Gräben auf *Mentha*-Arten, bes. *Mentha*
sylvestris, hfg.; seltener im Gebg.
124. *cerealis* L. Dvora, Grätz, f. sttn.
* var. *Megerlei* F. Dvora, 3. sttn.; Ustron,
f. hfg. unter Gemille.
125. * *staphyleae* L. Ueberall, im jung. Ebhlz.,
unter Moos und Gemille, f. hfg.
126. * *polita* L. Desgl., scheint bes. Saalwei-
den zu lieben.
25. *Oreina* Chevr.
127. *gloriosa* F. 7. Karlsbrunn, auf Bl., 3. hfg.
128. *alpicola* Hoppe. Mit 127 zusammen.
129. *senecionis* Köhl. Desgl., 3. sttn.
130. * *phalerata* Ill. 7. Im Gesenke, bes. am
Glaserberge; auf Bl., hfg.
131. *cacaliae* Schrk. Desgl.
132. * *speciosa* L. Desgl.
133. *intricata* Grm. Desgl.
Anm. Von 127 — 133 hatte ich meist über
60 Cr., die aber, bis auf einzelne, vertauscht
worden sind.
26. *Lina* Mgl.
134. * *populi* L. Ueberall, im jungen
Laubholz u., gemein.
135. * *tremulae* F. }
136. * *cuprea* F. Dvora, Ddte., Ustron, Karls-
brunn, auf Bl., 3. stt.
137. * *aenea* L. Desgl.
138. * *20-punctata* F. Desgl.
139. *collaris* F. Karlsbrunn, auf jung. Ebhlz.,
f. sttn.
27. *Gonioclena* Chevr.
140. * *viminalis* L. 6-8. R., Kupp, Bschp.,
im jungen Ebhlz., Pappeln, Birken, Saal-
weiden u., hfg.
141. * *haemorrhoidalis* F. Nur bei Kupp a.
Sal. cinerea, f. hfg. Dürfte doch wohl
eigene Art sein.
142. *rulipes* De G. R., Bschp., mit 140 zus.,
selten.
143. * *pallida* L. Wie 140.
(*Spartophila* Chevr.)
144. *6-punctata* F. Karlsbrunn. (H.)
145. * *litura* F. 6-8. Wie 140.
28. *Plagiodera* Chevr.
146. * *armoraciae* L. 5-8. Unt. M., a. Bl., hfg.
29. *Gastrophysa* Chevr.
147. * *polygoni* L. Auf Pfl. um stehende Ge-
wässer, auch im Ebhlz., unter Moos, hfg.
148. * *raphani* F. R., Kupp, Gleiwitz, sttn.;
Karlsbrunn hfg.
30. *Phratora* Chevr.
149. * *vitellinae* L. Ueberall, auf Weiden, gem.
var. *vulgatissima*. Dürfte doch wohl eigene
Art sein.

- 31. Phaedon** Mgl.
150. *carniolicus* Mgl. Karlsbrunn, von Pfl. geschöpft, f. stn.
151. *pyritosus* Rossi. Ustron, von Pflanz. geschöpft, f. stn.
152. *neglectas* Dj. Desgl.
- 153.* *cochliariae* F. R., unter M., auf Bl., nicht hfg.
- 154.* *auctum* F. R., Ustron, z. hfg.
155. *gramica* (Ullr. bst.) Ustron, f. stn.
- 32. Prasocuris** Latr. (Helodes Pk.)
156. *marginella* L. R., im jung. Ebhlz., stn.
- 157.* *phellandrii* L. An d. D., um stüßhd. Gewässer, von Pfl. geschöpft, oft f. hfg.
- 158.* *beccabunga* Hllwg. Desgl., aber f. st.
- 33. Bromius** Chevr.
- 159.* *obscurus* L. R., Kupp, im Ebhlz., bes. auf Saalweiden, hfg.
160. *vitis* F. R., an einem Gartenzaune 2 Cr.
- 34. Pachnephorus** Chevr.
161. *arenarius* Crtz. Db., 1841. 1 Cr. unter Moos um eine alte Kiefer.
- 35. Clythra** Laichtg.
162. *4-punctata* L. 6—8. R., Ebke., Ustron, Karlsbrunn u., im jungen Ebhlz., z. stn.
163. *laeviuscula* Btzb. Desgl., weniger stn.
- 36. Lapidostomis** Chevr.
164. *cyanicornis* Dahl. 9. Kupp, um Wald-ränder, von *Salix cinerea* geschöpft. stn.
165. *3-dentata* L. 6—8. Db., Pw., im Ebhlz., z. stn.
166. *fulgida* Dahl. 5. R., Katscher, auf Wald-pflanzen, stn.
167. *longimana* L. 6—8. R., Ustron, Karlsbrunn, im Ebhlz., nicht hfg.
- 37. Coptocephala** Chevr.
168. Hierher dürfte *Clytus diversipes* Letzner gehören. Ueberf. 1839, p. 114 — 116. Desgl. 1844, p. 198.
- 169.* *scopolina* L. R., Kupp, auf Bl., besd. Dolden, z. hfg.
170. *tetradyma* Mgl. Desgl., aber stn.
- 171.* *4-maculata* F. Desgl., auch an Kiefern, nicht stn.
- 38. Cyaniris** Chevr.
172. *aurita* L. Ebke., f. stn.
- 173.* *affinis* Hllwg. 6. R., Bschp., im Ebhlz., z. hfg.
- 174.* *cyanea*. Desgl., noch häufiger.
- 39. Parchybrachis** Chevr.
- 175.* *hieroglyphica* Laich. 6—8. R., Kupp, Ustron im Ebhlz., bisweilen hfg.
- 40. Cryptocephalus** Geoffr.
176. *2-maculatus* F. Beneschau. (Z.)
- 177.* *2-punctatus* L. R., Zawade, Katscher, Kupp, Karlsbrunn im jungen Ebhlz., nicht selten.
178. *lineola* F. Db., Pw., Zawade, im Ebhlz., aber nie mit 177 zus., f. stn.
179. *coryli* L. R., Bschp., im Ebhlz., z. stn.
180. *cordiger* F. R., Zawade, Karlsbrunn, im Ebhlz., f. stn.; v. U. fand ihn besonders auf Sal. Caprea.
181. *variabilis* Schn. Katscher, Zawade, Karlsbrunn, im Ebhlz., f. stn.; v. U. fand ihn auf Sal. Caprea und avrita.
- 182.* *6-dunctatus* L. R., Ebke, Zawade, Ustron, Karlsbrunn, im Ebhlz., z. stn.
- 183.* *variegatus* F. Wie 182.
var. *distinguendus* F. Nur 1 Cr.
- 184.* *4-puocatus* Ol. R., Ebke., Zawade, im Laubholz, z. stn.
185. *laetus* F. Dborá, an jungen Birken, f. st.
186. *10-punctatus* L. Desgl.
- 187.* *frenatus* F. Db., Pw., Zawade, an der Oder, auf Birken, Weiden und den dazwischen stehenden Bl., hfg.
- 188.* *flavescens* F. Desgl., weniger hfg.
- 189.* *Moraei* L. Durch d. g3. Gebiet, im Ebhlz. und besonders auf Kleefeldern, f. hfg.
190. *3-pustulatus* F. 6—8. Db., Pw., Kupp, im Laubholz, nicht hfg.

191. * *sericeus* L. Durch das gze. Gebiet, auf verschiedenen Bl., besonders Hieracien und Ranunkeln, s. hfg.
var. *auratus* Mgl. R., Ebke, Ustron, Karlsbrunn, z. stn.
192. * *chlorodius* Mgl. Wie 191; ist doch wohl eigene Art.
193. *violaceus* F. R., Krascheow, auf jungen Birken, 2 Gr.
194. *nitidulus* F. Pw., Zawade, Jägerndorf, Karlsbrunn, im jungen Ebhlz., z. stn.
195. *nitens* L. Desgl.
196. *flavifrons* F. Desgl.
197. * *flavipes* F. Desgl., jedoch weniger stn.
198. *frontalis* Mrsh. Katscher, im Ebhlz., 2 Gr.
199. *flavilabris* F. Desgl.
200. *sulceratus* Grm. Ich fing ihn vor Jahren um R. in großer Menge mit 187 zusammen und vertauschte die Gr. bis auf 1, da ich hoffte, ihn auch ferner noch oft zu finden; leider ist er mir nicht wieder vorgekommen.
201. *marginatus* F. Wie 200. Ich fing später nur noch 2 Gr.
202. * *geminus* Mgl. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gbg., hfg.
203. *Wasastjernae* Gyll. Dw., auf Wiesenbl. geschöpft, s. stn.
204. * *labiatus* L. Wie 202.
205. *Hübneri* F. Ustron, auf Wiesenbl. geschöpft, s. stn.
206. * *vittatus* F. Db., Dw., Rudnik, Kupp, im Ebhlz., z. hfg.
207. *2-lineatus*. Wie 205.
208. *elegantulus* Ol. Dora, Ebke., Ustron, im Ebhlz. und unter Moos, selten.
209. *pusillus* F. Brz. W., Kupp, von Bl. geschöpft, z. stn.
210. *minutus* F. R., Kupp, an Bl. geschöpft, hfg.
41. *Disopus* Chev.
211. *pini* L. R., Kupp, Falkenberg, Ustron, an Kiefern, nicht hfg.
42. *Triplax* Hb.
212. *russica* L. (*nigripennis* F.) R., Ebke., unt. Rinde an alten Stöcken, z. stn.
213. * *aenea* Pk. Ratb., in Baumschwämmen, nicht stn.
214. * *2-pustulata* F. R., Grätz, unt. Rinde, z. stn.
44. *Phlaecrus* Pk.
215. * *corruscus* Pk. Frühj., unter Moos um Bmst., s. hfg.
45. *Olibrus* Er. (*Phalacrus* Pk.)
216. * *corticalis* 6-8. R., Bschp., Kupp, unt. Rinde u. Moos, um alte Stöcke, z. hfg., bes. bei Kupp.
217. * *aeneus* F. Frühj. unt. M., später unter Bl., nicht stn.
218. * *2-color* F. Desgl., bes. auf Maibl., z. st.
219. *millefolii* Pk. (*ulicis* Gyll.) 6. Db., unt. M., s. stn.
220. *pusillus* Dj. (*pygmaeus* St.) Desgl., z. selten.
221. * *geminus* Ill. (*testaceus* Gyll.) Frühj. unt. M., später auf Bl., nicht hfg.
46. *Amphicyllis* Er.
222. (*Agathidium*) *globus* F. 6. Dr. D., Ehnst. unter Moos und Gemille, s. selten.
var. *tota rufo-ferruginea*. Desgl. (Th.)
47. *Agathidium* Ill.
223. *atrum* Hb.
224. *seminulum* L. } Dora, Ehnst., Pw., im
225. *hadium* Zgl. } Frühj. unter Moos und
226. *laevigatum* Er. } Gemille, s. stn.
227. *rotundum* Gyll. }
228. *marginatum* St. }
229. *glabratum* Wld. Zaupiz b. Neife. (H.)
(*Clambus* Er.)
230. *minutum* St. Ehnst., im Frühj. unter M., s. selten.
231. *armadillo* De G. (*punctulum* St. ?) Desgl., auch unter Dgr., s. stn.

IV. Trimera.

1. Hippodamia Chev.

1. * mutabilis Ill. 5—9. Auf Bl. u. Blättern im jungen Ebhlg., bis ins Vbg., hfg.

2. * 13-punctata L. Desgl.

2. Anisosticta Chev.

3. * 19-punctata L. 5—9. Zawade, Borutin, z. hfg.; sonst stn.

4. M-nigrum F. 6—7. Brz. W., Zawade, Ede., Kupp, im Ebhlg., stn.

3. Coccinella L.

Diese Käfer leben vom Frühj. bis Herbst meist auf Bl. und Blättern, jungen Stämmen, selbst Kiefern. Sie suchen überhaupt die freien, der Sonne ausgesetzten Stellen, an welche andere Insecten ihre Eier absetzen, deren Larven sie verzehren und dadurch nützlich werden.

5. * hieroglyphica L. Ob., Rudnik, z. stn.

6. * 2-punctata L. Durch d. g. Gebiet z. hfg.

7. * 6-pustulata L. R., z. stn.

var. 4-pustulata F. R., hfg.

var. dispar Ill. R., f. stn.

8. * 7-punctata L. Durch das ganze Gebiet, bis ins Gebirge, hfg.

9. * 5-punctata L. Desgl.

10. 16-punctata F. Ede., Krascheow, f. stn.

var. marginepunctata F. Ede., f. stn.

11. * impustulata L. Durch das g. Gebiet, bis ins Gebirge, hfg.

12. * conglobata L. Desgl.

13. * 22-(20-)punctata L. R., Ede., Bschfp., z. hfg.

14. * variabilis Ill. Desgl., weniger hfg.)

15. humeralis Sch. R., Bschfp., z. stn.

16. * 12-pustulata F. Wie 11.

17. * 14-pustulata L. Wie 11.

18. * ocellata L. Desgl., aber z. stn.

19. * oblongoguttata L. Wie 18.

20. tigrina L. R., Kupp, f. stn.

21. * 16-guttata L. Wie 18.

22. bis-7-guttata F. R., Krascheow, stn.

23. * 14-guttata L. Bes. auf Haselnußstrüchern hfg.

24. * bis-6-guttata. Wie 23, aber seltener.

25. 18-guttata L. Brzezie, Budzin, z. stn.

5. Hyperaspis Chev.

26. lateralis Pz. Dvora, Pw., z. stn.

5. Micraspis Chev.

27. * 12-punctata L. Frühj. unt. M., später auf Bl. u. Blättern, hfg. in der Ebene als im Gebirge.

6. Chilocorus Leach.

28. * renipustulatus Scr. 3. hfg.

29. * 2-pustulatus L. 3. stn.

30. * 4-pustulatus L. Hfg.

31. meridionalis Dj. 5. stn.

32. * auritus Scr. 3. stn.

Durch das g. Gebiet, bis ins Ob., im Frühj. unt. M., später a. Bl. u. Blät., bes. im jungem Laubholz.

7. Cynegelis Chev.

33. * globosa Schn. Ueberall, f. hfg.

34. * impunctata L. Desgl., aber nicht f. hfg.

8. Scymnus Kug.

35. nigrinus Kug. 6—8. Ob., Bschfp., Ffkg., im jungen Ebhlg., stn.

36. flavipes Pz. Falkenberg. (Rd.)

37. ater Kug. 6. Dvora, unter Moos, f. stn.

38. parvulus F. 6—8. Dvora, Borutin, f. stn.

39. haemorrhoidalis Hbst. 3—5. R., unter M., stn.

40. analis F. Dvora, Falkenberg, f. stn.

41. flavilabris Pz. Dvora, f. stn.

42. frontalis F. Stw., Kl. Herlitz, f. stn.

43. bis-2-pustulatus F. Dvora, f. stn.

44. 4-notatus Mgl. Desgl.

45. 4-pustulatus St. Desgl.

46. discoideus Schn. Pw., Falkenberg, stn.

47. abietis Pk. Ob., Zawade, Ffkg., z. stn.

9. Nundina Dj.

48. litura F. 6. Dvora, um Bimst., f. stn.

10. Coccidula Kug.

49. * scutellata F. Dvora, Brzezie, Borutin, Bschfp., z. hfg.

50. *pectoralis* F. Karlsbrunn. (v. U.)
 11. *Endomychus* W.

51. *coccineus* L. 6—8. R., hinter dem Schlosse,
 auf Bl., jungen Weiden, z. hfg.

V. Dimeria.

1. *Tychus* Pk.

1. *niger* Pk. Stw., im Frühj. unt. M., um
 Bmst., f. stn.

2. *Euplectus* Krb.

2. *sulcicollis* Mgl. Im Frühj. geschöpft, auch
 in der Nähe von Pilzen (b. Schießhause),
 f. stn. (Th.)

3. *Karstenii* Rchb. Db., im Frühj. unter M.,
 um Bmst., f. stn. (Th.)

4. * *ambiguus* Rchb. Stw., unter M., z. stn.

3. *Briaxis* Koch.

5. * *sanguinea* Pk. R., unt. M., um Bmst., z. hfg.

6. *longicornis* Leach. Stw., unt. M., f. st. (Th.)

7. *fossulata* Rchb. Stw. unt. Moos, an der
 Oeder unter Gemille, z. stn.

8. * *haematica* Rchb. Db., Stw., Pw., unter
 Moos um Bmst., hfg.

4. *Hythinus* Leach.

9. *Curtisii* Leach. Frühj., im Stw., unter M.
 um Eichen, stn.

10. * *Burellii* Denny. Desgl., z. hfg.

11. *luniger* Aubé. Stw., unt. M., f. st. (Th.)

12. *bulbifer* Kn. Stw., unter Moos, f. stn.

13. *glabricollis* Rchb. Wie 11.

14. *clavicornis* Pz. Wie 12.

5. *Pselaphus* Hb.

15. *Heisii* Hb. Wie 11.

6. *Claviger* Pr.

16. *foveolatus* Mllr. 6. Db., unter Laub mit
 Ameisen zus., z. stn.

Nachtrag.

Während des Druckes stellten sich noch ein:

1. * *Cryptophagus dermestoides* Hb. 7. Ustron,
 an der Weichsel, unter St., z. hfg.

2. * *Cryptophagus tetragraphus* Grm. Desgl.

3. *Diacanthus impressus* F. 5. R., unt. Gem.,
 f. stn.

4. * *Adrastus axillaris* Er. R., Ustron, z. stn.

5. * *Adrastus pallens* F. Desgl.

6. *Orthoperus* (Cryptoph.) *atomus* Gyll. 7.
 R., Ustron in Baumschwämmen, f. stn.

Übersicht.

I. Pentamera.

1. Caraboidea	285
2. Hydrocantharida	68
3. Brachelytra	363
4. Sternoxa	97
5. Malacodermata	88
6. Xylotrogi	39
7. Clavicornia	184
8. Palpicornia	38
9. Lamellicornia	83
	<hr/>
	1245

II. Heteromera.

1. Melasomata	4
2. Taxicornia	17
3. Tenebrionida	7
4. Helopia	9
5. Trachelida	16
6. Cantharida	7
7. Stenelytra	17
	<hr/>
	77

III. Tetramera.

1. Rhynchophora	324
2. Xylophaga	97
3. Longicornia	87
4. Chrysomelina	231
	<hr/>
	739

IV. Trimeria 31

V. Dimeria 16

Nachtrag 6

2134

Hiervon kommen 1892 auf die Umgegend von
 Ratibor, indeß die übrigen 242 dem weiteren
 Oberschlesien ausschließlich angehören.



