

1034. *Braetea* (480).

1035. *Nudum*, bracteis desitutum (214).

f. 1036. *RACHIS*, Receptaculum filiforme flosculos longitudinaliter adnectens in *spicam*.

g. 1037. *SPADIX*, Receptaculum *Palmae* enatum intra spadicem, in ramulos fructificantes divisum.

a. 1038. *Uniflorus*.

1039. *Multiflorus*.

b. 1040. *Simplex*.

1041. *Ramosus*.

3. HABITUS.

A. GEMMATIO, est Plantae compendium supra radicem, antequam evolvitur, s. *Hybernaculum*.

I. 1042. *BULEUS*, hybernaculum plantae ex rudimento foliorum praeteritorum.

1043. *Solidus*, carnosus intus indivisus.

1044. *Tunicatus* bulbus, tunica extra tunicam.

1045. *Squamatus*, squamis imbricatus.

1046. *Caulinus*, cauli insidens (79).

II. 1047. GEMMA, hybernaculum plantae ex rudimentis foliorum futurorum.

a. ORIGINE

a. *Petiolaris* seu *squamis*.

b. *Stipularis*.

c. *Corticalis* seu *foliis constans*.

b. CONTENTO

a. *Foliaris*, includens folia tantum.

b. *Floralis*, includens flores tantum.

c. *Communis*, includens folia et flores.

B. 1048. VERNATIO, foliorum dispositio intra gemmam,

1049. *Conduplicata*, foliorum lateribus parallele approximatis.

1050.

1050. *Convoluta*, cuculli in modum spirali.
1051. *Involuta*, lateribus versus paginam superiorem utrimque spiraliter contortis.
1052. *Revoluta*, lateribus versus paginam interiorem utrimque spiraliter contortis.
1053. *Imbricata*, decussatim foliolis sibi invicem incumbentibus.
1054. *Equitans*, marginibus conniventia situ opposito, ut alterum includat alterum.
1055. *Obvoluta*, pagina superiore lateribus approximatis, ita ut alterum latus distinguat alterum folium.
1056. *Plicata*, in plicas varias plicato folio.
1057. *Circinalis*, in spiram transversalem coactato folio, ut apex centrum obtineat.

C. AESTIVATIO.

Convoluta.
Imbricata.
Conduplicata.
Valvata.
Inaequivalvis.

D. TORSIO est flexio partium versus alterum latus.

- a. *Conformis.*
- Difformis.*
- b. *Dextra.*
- Sinistra.*
- Reciproca.*
- c. *Resupinata*, corollae labio superiore terram, inferiore caelum spectante.
- Circinalis.*

E. VARIATIO est mutatio plantae a causa accidentalis *Climate, Solo, Colore, Ventis, Cultura.*

COLORIS.

Floris, rubri in album, caerulei in album, lutei in album, albi in purpureum, caerulei in luteum,
rubri in caeruleum.

Foliorum, variegatorum maculis albis.
Seminum, nigri in album.
Radicis, violacei in variegatum, etc.

MAGNITUDINIS.

<i>Plantae</i> <i>Radicis</i> <i>Floris</i> <i>Foliorum</i> <i>Fructus</i>	} orta a <i>Loco, Solo, Climate, Cultura.</i>
--	---

PUBESCENTIAE.

Pilorum.
Tomenti.
Setarum.
Glandularum.
Aculeorum.
Spinarum.

AETATIS.

Foliorum.
Caulis.
Corticis.

2. EXTERNA.

<i>Caulis.</i> <i>Folio-</i> <i>rum.</i>	} <i>Plicata</i> , dum ramuli ita intertexuntur, ut fiat nidus instar <i>Plicae Polonicae</i> .
	} <i>Fasciata</i> , connatis pluribus caulinibus in unum latum, compressum, fasciatum.
<i>Fulcro-</i> <i>rum.</i>	} <i>Latifolia</i> , dum ex plantis laciiniatis et tenui- foliis plura foliola et laciniae connascuntur.
	} <i>Tenuifolia</i> , dum latifoliae finduntur in lacinias et foliola angusta.
<i>Mutica</i> , dum <i>Spinae, Pubes</i> et <i>Aculei</i> caulem vel alias partes multas relinquunt.	

b. IN.

b. INTERNA.

Fructificationis.

- a. Mutilata* flore, non promente corollam, sed tamen perficiente fructum et semina.
- Grandiflora*, dum corollae ad insuetam excrescent magnitudinem.
- b. Multiplicata*, dum corolla duplice, triplice, quadruplici serie petalorum est aucta salvis statim inbus.
- Plena*, dum petala adeo augmentur, ut stamina excludantur, vel stamina in petala excrescent.
- Prolifera*, flore intra florem (saepe plenum) enascente.
- Frondosa*, cum proliferi proles sit foliosa.
- Cristata*.
- c. Vivipara*, germinis rudimento excrescente in folia.
- Bulbigena*, germinis rudimento in bulbum excrescente.

F. SPONSALIA.

- Mas*, Flos qui Antheras solas continet.
- Femina*, Flos qui Stigmata sola includit.
- Hermaphroditus*, Flos qui simul Antheras et Stigma- ta continet.
- Androgyna*, planta quae mares et feminas simul habet.
- Monoeccia*.

G. SEMINATIO, Dispersio seminum post maturitatem, supra tellurem.

Haec peragitur, vi *aeris* ventis procellosis, *aqua* flutibus et aestu maris, decursu fluminum, motu lacustris aquae, torrentibus a pluvia factis; praeterea *animalia* plurima semina dispergunt. Seminatio vero juvatur

- a. SEMINIS*
- Cauda lanata*.

Ala membranacea.

Pappo plumoso et piloso.

Ut sic semina facilius volitare possent, Volumine at non pondere aucto.

Hamulo, acuminato curvato.

Glutine viscoso semen affigente.

Curvatione.

Ut sic semina animalibus adhaereant et aliis locis dispergantur.

b. PERICARPII

Baccatione, quae ob pulpam juvant seminationem.

Inflatione, quod ideo volumine levius factum volitat.

Viscoitate, affigente idem animalibus.

Elasticitate, qua longe propelluntur explosa semina.

H. PLACENTATIO est dispositio cotyledonum sub ipsa Germinatione Seminis.

a. DICO TYLEDONES sunt Plantae, quarum Semina binos cotyledones habent.

Cotyledon est Corpus laterale semen bibulum, caducum.

b. ACOTYLEDONES, ubi nulli exstant cotyledones. Huc et *monocotyledones* pertinent, quod non sint ejusdem cum cotyledonibus naturae, quippe non persistunt intra Semen.

Propagineae, Muscorum.

Perforatae, Graminum.

Unilaterales, Palmarum.

Reductae, Cepae.

c. POLYCOTYLEDONES.

4. STA-