
EXPLICATIO TABULÆ.

Fig. I. Spica feminea tota morboſa, ad §. III.

- litt. *a*. Pedunculus.
- b*. Folii spicæ reliquiae.
- c*. Folia spicam obtentientia.
- d*. Styli.
- e*. Nonnulla germina maturitati propiora fana dissecta.
- f*. Tumor dissectus cui varii alii similes adjacent.
- g*. Genicula pedunculi.

Fig. II. Sectio verticalis intumescentiæ feminis morboſi, quæ interiorem ejus fabricam illustrat. Non ad naturam efficta figura, sed qualis ex plurium observatione abstracta cogitari potest, vulgo *ideale* dicunt. §. VIII.

- A*. Cavum corticis exterioris.
 - a*. Membrana externa, } ejusdem.
 - b*. - - - interna, } ejusdem.
 - c*. Textum celluloſo - vascuſoſum inter utramque.
- B*. Cavum corticis interni.
 - d*. Membrana externa } ejusdem.
 - e*. - - - interna } ejusdem.
 - f*. Textum celluloſo - vascuſoſum inter utramque.
 - g*. Farinæ fanæ parca quantitas.

)

h. Valvula corollæ fana; quæ minus distincte expressa est,
quam hujus figuræ ratio requirere videatur.

n. Pedicellus.

C. Styli, proxime semen; inferior pars morboſa.

i. Canalis styli.

k. Membrana externa } Styli.

l. - - - interna } Styli.

m. Textum celluloſo-vasculoſum inter utramque.

Fig. III. Semen morboſum atque integrum; sed incurvum.

a. Stylus partim morboſus.

b. Ipsum semen morboſum.

c. Basis, qua pedicello infidet.

Fig. IV. Sectio transversalis utriusque glumæ floris morboſæ desu-
per visa.

a. a. a. Et reliqua corpora interiora his similia sunt ipſe val-
vulae utriusque glumæ morboſæ. (pag. 14.)

b. b. Membrana tumorem squatnæ calicis invertiens.

c. Germen, f. semen nondum maturum de reliquo fanum.

d. Substantia interna celluloſa, qualis cuilibet tumoris eſt.
(pag. 8.)