

## §. III.

Quum vix non omnes partes hujus plantæ, isto, cuius naturam pandendam suscepi, morbo afficiantur, singulas ordine nunc pertrahabo; a spica feminea tanquam parte præstantiore plantæ incepturus.

Spica feminea morboſa facili negotio a quolibet, cæteroquin rei *Quo*  
ignaro, in agro deambulante, agnoscitur eo, quod folia spicam, va- *spica*  
ginæ ad instar, obtegentia ob insigne auctum illius volumen plus mi- *morbosa*  
nus distenta & expansa videantur (Fig. I.), spica ipsa monstroſa,  
plus minus nuda, sub oculos cadat, eadem quoque vix non semper  
brevior sit fana, ſepe breviflma; cuius ratio inſra luculentius patescer.

Ablatis foliis spicam obtegentibus, eadem, si tota quanta morboſa, quod ſolenne eft, unam continuam congeriem tumorum ſiftit, (Fig. I.) extus argenteo colore ſplendentium, qui in adultis pulve- rem nigrum, quin potius cum levi viriditate fulcum per involucrum pellucentem includunt.

*Magnitudo* adulorum tumorum, haud ultra crescentium, di- *Magni-*  
versiffima eft, ab illa quæ pifo minori eft, ad eam usque ovi galli- *tudo tu-*  
nacei mediocris: pauciflmi ultra progrediuntur; neque omnes in- *morum.*  
termediae magnitudines in qualibet spica occurrere folent.

*Figura* tumorum vix ulla constans datur, diversa pro varia parte *Figura*  
ſpicæ affecta & tumorum proximorum figura & magnitudine; hinc *tumor-*  
alii pyriformem, globosam, conoideam, cylindricam, convexo- *rum,*  
concavam, carinatam mox rectam (Fig. II.) mox incurvatam (Fig.  
III.) formam æmulantur: alii in acumen defiunt (Fig. III.), alii  
obtusi, alii compressi ſunt, alii intus toti celluloſo textu repleti (Fig.  
IV.) rurſus alii intus vacui (Fig. II.) ſunt.

Horum tumorum habitum curatiuſ examinanti ſtatiū animad- *Duo ſta-*  
vertere datur, ſingulos, pro varia ætate, iſfignes atque miras muta- *dia tu-*  
tiones oſtendere, que quidem ut melius perſpiciantur, duo ſtadia *morum,*  
notabilia diſtinguere operaē preſtium duco.

---

merfa, separabilis & minus alba, atque vere oleofa ita ut inter digitos  
preſſa oleum fundat; eique ſapor nuciſ avellanæ eft: in facie ſuperiore in-  
tegris ſeminis modo confiſcua, ibidemque zonam albam conſtituens.

*Sta-  
dium  
Incre-  
menti.*

Primum stadium *Incrementi*, quo scilicet tumor omne suum incrementum acquirit. In hoc stadio tumor disiectus intus cernitur tanquam substantia fungosa (d. Fig. IV.), satis quidem compacta, quæ cellularis est & tota alba; dein sensim spongiosior evadit, inde vero cellulae ampliores redduntur, latice limpidissimo, crystallino turgidae, cujus quantitas sensim augetur, quemque manu presso tumore, cellulae plorant inodorum *ii*) insipidumque prorsus. Unde etiam intelligitur tumores ipsos cellulis copiose latice distentis magnitudine augeri; verum tumores sensu stricto quoque crescere mihi visum est. Hunc apparatum includit simplex & unica membrana *b. b.* (Fig. IV.) a substantia cellulari inseparabilis istique continua, extus polita, candida atque splendens, per quam guttulae laticis crystallini translucent.

*Sta-  
dium  
Conver-  
sionis.*

Alterum stadium, *Conversionis* mihi vocare liceat, sequentia absolvunt. Tumor ubi ad hunc terminum pervenit, in conspectum mox prodeunt ad ejus basin, & quidem in meditullio sive axi, puncta fusca pulverem datura, que brevi augmentur & volumine & copia; una cum interjecta substantia cellulari alba, dædaleis sinibus discurrentia. Sensim vero deinde puncta illa fusca incrementa capiunt, decrescit intermedia alba substantia ac simul ipse latex, cuius in locum, substantia illa fusco viridis, nunc vero declaratus jamjam pulvis, per involucrum album translucens cedit. Quo in statu si non decerpuntur tumores isti, maceratur eorundem involucrum, putredine inficitur rumpiturque. Eodem tempore pulverem istum fistere pultem admodum nigram plus semel vidi; atque mox deinceps totam putrescentem spicam simul cum pedunculo, præ nimio pondere a culmo suo decidere semper observavi.

Amicissimus GERTNERUS litteris me docuit, se in agro Hanoviensi duas species spicarum morbosarum, quas differentes esse putat reperiisse; alteram cuius spicæ pulvere roseo partim obtecta, partim vero ipsa integra semina, (tumores meos sine dubio intelligit) in tam-

---

*ii)* Cl. TILLETT in *Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences de Paris*, année 1760. & Cl. BONNET in egregio libro *Recherches sur l'usage des feuilles*. Gotting. 1754. pag. 328. eundem fœtidum dicunt.

lem pulverem transmutata sint; alteram vero cui loco pulveris rosei pulvis niger sit. Roseum hunc pulverem prorsus nunquam mihi animadvertere contigit, neque intra tumorum subtilitatem, neque tumores eodem extus conspersos vidi, utique haud raro ipsam membranam tumorum, præcipue in culmo & foliis occurrentium, roseum colorem referre observavi.

Ipsa interna tumorum fabrica cellularis adhuc melius perspicitur, cum exsiccantur atque dein per longitudinem dissecantur; eo-  
rum tumo-  
rundem involucrum nunc valde tenuerit, papyraceum & excusso  
pulvere impalpabili, quo cellulæ turgent, ipsæ luculentissime patent;  
sunt enim istæ plus minusve amplex longæque, ut canales posses patet  
nuncupare; non raro enim bipollicari longitudine easdem vidi. Ea-  
rum cava, longe plurima, non cylindrica sunt, sed angularia, multa  
simplicem rimam sicut sunt, cum axe tumoris parallela: cellulæ ipsæ  
componuntur membrana tenuissima, & si hæc a polline libera effet,  
alba, fibrillis plus minusve conspicuis picta, quæ totidem vascula  
sunt. Structura hæc interna non in omnibus prorsus eadem cernitur,  
in multis enim evidenter magis fibrofa quam cellulosæ est, præcipue  
ad tumorum basin; quod ejusmodi tumores ipsi cortices seminum,  
pluribus vasis prædicti, sint, deinceps patebit. De ipso polline infra  
uberius dicendi erit occasio.

#### §. IV.

Anni tempus quo morbus oritur & primum momentum quo *is a Tempus*  
rei gnaro agnoscere potest determinare non possum; ego enim morbum *quo*  
primas spicas infestantem non in suis cunabulis inveni; quia morbus *morbus*  
non nisi quum jam aliquousque progressus effet, prima vice obser-  
vavi. Scilicet casu fortuito primum mihi die 9. Augusti præteriti anni  
vibus est. Verum eodem tempore, quum segetes curatius perquirerem,  
jam putrescentes spicas brevi decisuras reperi; attamen spicas mor-  
bosas vix non omnis ætatis, si excipias morbi primordia, observavi;  
forsitan & hæc ipsa quoque aderant; sed quum tota hac de re antea  
nullo modo essem præmonitus, & ea me maxime ac primum invit-  
arent, quæ erant præ aliis conspicua, subduxerunt se ista sine dubio meis  
oculis. Nam observationes certæ me edocuerunt, quod morbus meus