

## §. VIII.

Jam singularem morbosí semenis fabricam, quæ constans atque *Semen* semper eadem est, sed nulli auctori adhucdum perspectam, ostendam. *morbos* *semis*

Supra jam docui semen duplici cortice instructum esse, quorum interior in semine morbosó egregie atque distinctissime appareat, minus in statu semenis fano. Utrique una eademque structura est. Circa eorundem status fani descriptionem non morabor, quum is optime ex eorum volumine insigniter auctorum morbosó statu eluceat. Morbosus autem status ejusmodi est.

*Exterior* cortex efformatur duplici (Fig. II. *a.* & *b.*), tenuissima *Exte-* totidem quasi fascos sistente membrana, exteriori *a.*, interiorique *b.*, *cortex* hæc corticem internum *d. e. f.* respicit eumque proxime arabit; inter utramque membranam *a.* & *b.* jam supra memoratus apparatus vasorum & cellularum *c.* pulvere referatarum reperitur, prout in reliquis intumescentiis floris partium (*d.* Fig. IV.) observatur & partim jam dictum fuit *n).* Differt autem cortex hic exterior morbosus ab omnibus reliquis intumescentiis essentialiter, eo, quod, quum in statu naturali cavum, vesice alicui simile, formet, quod corticem internum, atque hic ipsam farinam condit, ita idem morbosus cavum prægrande (*A.* Fig. II.) relinquit, cuius parietes æque politi & argenteo colore splendidi sunt, ac superficies exterior ejusdem corticis: eandemque formam pre se ferunt reliqui tumores omnes, quamvis haud eadem illis sit fabrica.

Eadem prorsus fabrica cortici *interiori* (*d. e. f.* Fig. II.) est, & *Inte-* *rior* *cortex* *tex* *fe-* *minis.* eadem ratio; ita tamen ut longe rarius intumescat.

Ceterum in his semenum tumoribus varias quoque modificationes & varietates reperi, quas sicco pede præterire non licet; frequentil-  
time sic inveni.

Cortex *exterior* in insignem molem intumescit, quæ sæpiissime pyriformis sæpe tamen quoque globosa esse solet, & cavum prægrande tumori plus minus proportionatum intus tenet, quod corticem

---

*n)* In plurimis majoribus speciminiibus ad basin corticis exterioris contextum dense stipatum, maxime ex fibrillis constantem, pauciore textu celluloso intermedio deprehendi, ille sūlum versus aucto textu celluloso sénsum laxior fit.

internum recipit, qui sanissimus est, minor tamen quam in semine perfecto & maturo esse solet, atque liquore lacteo plenus, qui lapsa temporis exsiccatur, tunc sifit farinam albam atque sanam, quæ corticem, qui fundum cavi occupat, ad quadrantem, mox plus mox minus, implet absque ullo vestigio corculi.

Cavum corticis *exterioris*, cuius nullus laudatorum autorum meminit sepe decies volumen corticis *interni* fani superat; sepe is farina plenus: multum vero abest ut perfectum atque torofum semen æquet: corculi nullum quandoque vestigium reperitur; quandoque autem utique corculum præsens conspicitur o), quamquam non adeo perfectum ac in semine illibato & maturo. Admodum frequenter cortex interior fatus prorsus omni farina destituitur, tunc sifit vacum membranaceam atque diaphanam vesiculam, quæ circum circa libera est, excepto eo in loco, quo pedicello innata est. Sæpe in fundo corticis externi morboſi, nil nisi vestigium marcidi germinis vix visibilis adest. Haud raro interior cortex (d. e. f. Fig. II.) simul intumescit plane eodem modo ac exterior, cuius cavum sepe adimplet, ita tamen ut superficies exterior d. interioris corticis cum interna b. exterioris corticis nunquam concreſcat, sed distinctos globos concentricos basi tantum connexos forment; talis cortex internus morboſi, qui intus pariter ac exterior cortex cavum B. (Fig. II.) plus minus spatioſum, pro recipienda farina (g. Fig. II.) habet, fere semper farina destituitur. Hac occasione memorabilis exempli, quod semel tantum mihi occurrit, mentionem faciam, quod demonstrat ipsum corculum quandoque etiam adefeſe, cortice licet utroque, interiore quidem non integre, morboſo. In eodem semine morboſo Singu- lare ex- emplum obſervavi, roſellum longitudine pollicari, absque conspicua plumula, ſeminis corticem internum tumidum & vix ad quartam partem farina cete- morboſi. rum fana impletum, in vaginam cylindricam brevem protrufiſſe, hac que perfoſſa intra utramque membranam (a. & b. Fig. II.) corticis exterioris pariter morboſi ulterius progreſſum eſſe, e quo loco roſellum pulvere conſperſum extraxi.

Sæpe

o) Quod contra Cl. AYMEN lib. cit. p. 363. teſtatur, qui uti videtur, nul- lum tale morboſum ſemen unquam oculis uſurpavit.

Sæpe de cortice interno feminis ne vestigium quidem videre est, sed tunc quoque nulla farina adeft. Haud raro uterque cortex deeft, ita ut pedicellus truncatus quasi videatur.

Sequenti ergo tabula omnes mihi vias diversitates breviter fistam.

Exteriore cortice morboſo exiſtente

Interior vel abeft, vel adeft, & tunc vel

fanus, ſimul & vacuus eft; vel

fanus, - - farina, vel totus, vel vario gradu repletus, vel

morbosus, - - - vacuus; vel

morbosus, - - farinam recondens. (Fig. II.)

De iſpa farina feminis morboſi illud mihi dicendum ſupereft; quod in tot mille intumefcentiis feminum, quas studioſe examinavi, nunquam iſpam farinam ullo modo morboſam & in pulverem nigrum verſam, vel loco farinæ fanæ pulverem iſtum p) deprehenderim; verum conftante lege obſervaverim corticem feminis interiorem vel prorūſ farina caruifē, hinc vacuum eundem me reperiſſe; vel faniffimam farinam condidiſſe, exteriōre licet cortice morboſo. Quandoque femina cæteroquin fana & perfecta occurruunt, quorum cortex externus in aliqua parte tantum intumuit, quod etiam Cl. AYMEN lib. cit. p. 363. obſervavit.

### §. IX.

Jam Styli degenerationem expositurus sum, que qua ratione fiat, ante me nemo, ni fallor, dixit. Eſt ea tanto memorabilior, *Styli morboſa fabrica* quo luculentius ex morboſo ſtatu fabrica illius illuſtratur.

Siste tibi Ben. Lect. corticem externum morboſum, (b. Fig. III.) atque ſursum in cylindrum, craffitie circiter calami ſcriptorii, aut in conum (a. fig. ead.) productum, longitudine unius pollicis aut duorum, & habebis iſpius morboſi ſtyli, quoad exteriōrem formam, rationem. In interiore fabricam ſæpe & reiteratis tentaminibus inquisivi, adeo ut de ea certiſſimum me & plane conviictum eſſe affleverare queam. Scilicet si cortex exteriōr feminis morboſus & ſtylo pariter morboſo prædictus,

p) Quod Cl. AYMEN loc. cit. pag. 362. & TILLET loc. cit. & Cl. BONNET lib. cit. pag. 328. putant & docent, ut ex eorum verbis patet.