

accusare possum *infecta* uti fecit FORSKOHL o) & FORDICE p). Cl. GINANNI q) circa causas Uredinis & Ustilaginis dubius hæret. Evictum esse videtur *Ustilaginem* per contagium, saltem maxima ex parte, propagari r). Idem valere videtur de *Uredine*. Cl. ROFFREDI s) pulvrem Uredinis contagiosum esse haud putat; nec Cl. BECKMANN t) neque alii plures. Quantum adhuc absimus, ut veras causas morborum quæ frumenta tenent perspectas habeamus!

§. XIX.

*Remes-
dia.* Quod tandem remedia adversus meum morbum spectat, Cl. AYMEN l. c. obseruat, paniculas, quæ flores masculinos continent, plerasque resecandas esse, antequam antheræ maturescunt, si enim serius refecentur, quod agricultores in variis Gallie provinciis facere solent, tunc flores feminineos succo necessario privatos, steriles evadere, aut morbo ito infestari. Hicce locorum hæc operatio prorsus ignota est, & nihil feciis longe plurimis annis morbus vel plane non vel raro observatur.

-
- o) FORSKOHL *Anim. Itin. Orient.* p. 78. Tenebrionem arundinaceum sub larva forma arundinem niloticam exedere suspicatur, & inter corticem ac medullam in nigro-bruneam farinam convertere. Unde spicas segetum nigras & quasi adustas similis infecti arrofione fieri credit.
 p) *Elem. of Agriculture and Vegetation.* Lond. 1771. quem pariter tantum ex BECKM. phys. &c. Bibl. T. III. p. 226. novi.
 q) Lib. cit.
 r) VON GLEICHEN *microscop. Untersuch.* nec non Cell. TILLET & TESIER loc. cit.
 s) *Journal de ROZIER* Tom. V. 1775.
 t) Cl. BECKMANN l. cit. XI. B. p. 353.
-

ADDENDA

Ad pag. II. Nec magnum HALLERUM meus morbus latuit; etenim in *Bibl. Botanica* T. II. pag. 445. occasione observationis TILLETI dicit, frequens esse etiam in nostro Bernensi pago malum,